

Bénin



Enquête
Démographique
et de Santé

2017-2018

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN



Cinquième Enquête Démographique et de Santé au Bénin (EDSB-V) 2017-2018

Ministère du Plan et du Développement
Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique (INSAE)
Cotonou, Bénin



ICF
Rockville, Maryland, USA

Avril 2019



Ce rapport présente les résultats clés de la cinquième Enquête Démographique et de Santé au Bénin (EDSB-V) réalisée par l'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique (INSAE) sous la tutelle du Ministère du Plan et du Développement, en collaboration avec les services techniques du Ministère de la Santé, le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), le Secrétariat Permanent du Conseil de l'Alimentation et de la Nutrition (SP-CAN) et le Laboratoire de Parasitologie du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM). Le financement de l'EDSB-V a été assuré par le Gouvernement du Bénin, l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) par le biais d'un financement du Fonds Mondial et la Banque Mondiale par le biais du Projet Multisectoriel de l'Alimentation, de la Santé et de la Nutrition assuré par le Secrétariat Permanent du Conseil de l'Alimentation et de la Nutrition (PMASN/SP-CAN). ICF a fourni l'assistance technique à l'ensemble du projet par le biais du programme DHS, financé par l'USAID, et dont l'objectif est d'apporter un appui et une assistance technique à des pays du monde entier pour la réalisation des enquêtes sur la population et la santé.

Pour tout renseignement concernant la cinquième Enquête Démographique et de Santé au Bénin (EDSB-V), contacter l'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique, 01 BP 323, Cotonou, République du Bénin ; téléphone : (229) 21-30-82-44/21-30-82-45 ; fax : (229) 21-30-82-46 ; email : insae@insae-bj.org ; internet : www.insae-bj.org.

Pour obtenir des informations sur le Programme DHS, contacter ICF, 530 Gaither Road, Suite 500, Rockville, MD 20850, USA ; téléphone : +1-301-407-6500 ; fax : +1-301-407-6501 ; email : info@DHSprogram.com ; internet : www.DHSprogram.com.

Photo de couverture : Ganvié, Bénin. Utilisée avec la permission du photographe, Dr. Ren Ruilin

Citation recommandée :

Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique (INSAE) et ICF. 2019. *Enquête Démographique et de Santé au Bénin, 2017-2018*. Cotonou, Bénin et Rockville, Maryland, USA : INSAE et ICF.

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES.....	ix
REMERCIEMENTS	xxi
PRÉFACE	xxiii
LISTE DES PARTICIPANTS À L’ATELIER D’ANALYSE DE L’EDSB-V 2017-2018.....	xxv
SIGLES, ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES.....	xxvii
LIRE ET COMPRENDRE LES TABLEAUX DE LA CINQUIÈME ENQUÊTE	
DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ AU BÉNIN (EDSB-V) 2017-2018.....	xxxi
INDICATEURS SUR LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE.....	xxxix
CARTE DU BÉNIN.....	xlii
1 PRÉSENTATION ET MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE.....	1
1.1 Objectifs de l’enquête.....	1
1.2 Conception de l’échantillon.....	2
1.3 Questionnaires.....	4
1.3.1 Questionnaire ménage.....	4
1.3.2 Questionnaire femme.....	4
1.3.3 Questionnaire homme.....	4
1.3.4 Questionnaire biomarqueur.....	4
1.4 Anthropométrie, test d’anémie, test du paludisme et mesure de la tension artérielle.....	5
1.4.1 Mesures anthropométriques.....	5
1.4.2 Test d’anémie.....	5
1.4.3 Test du paludisme.....	5
1.4.4 Mesure de la tension artérielle.....	5
1.5 Prétest.....	5
1.6 Formation du personnel de collecte.....	6
1.7 Collecte des données.....	6
1.8 Traitement des données.....	6
1.9 Taux de réponse.....	7
2 CARACTÉRISTIQUES DES LOGEMENTS ET DE LA POPULATION	
DES MÉNAGES.....	9
2.1 Sources d’approvisionnement en eau de boisson et traitement.....	10
2.2 Installations sanitaires.....	11
2.3 Exposition à la fumée à l’intérieur du logement.....	11
2.4 Bien-être économique du ménage.....	12
2.5 Lavage des mains.....	13
2.6 Population des ménages et composition.....	14
2.7 Instruction.....	15
2.7.1 Niveau d’instruction atteint.....	15
2.7.2 Fréquentation Scolaire.....	16
3 CARACTÉRISTIQUES DES ENQUÊTÉS.....	29
3.1 Caractéristiques de base des enquêtés.....	29
3.2 Niveau d’instruction et alphabétisation.....	30
3.2.1 Niveau d’instruction.....	30
3.2.2 Niveau d’alphabétisation.....	32
3.3 Exposition aux médias.....	32

3.4	Emploi	33
3.5	Occupation.....	35
3.6	Couverture par une assurance médicale	35
3.7	Utilisation de tabac	36
4	NUPTIALITÉ ET ACTIVITÉ SEXUELLE.....	59
4.1	État matrimonial	60
4.2	Polygamie	60
4.3	Âge à la première union.....	62
4.4	Âge aux premiers rapports sexuels	63
4.5	Activité sexuelle récente.....	64
5	FÉCONDITÉ	75
5.1	Fécondité actuelle	75
5.2	Enfants déjà nés et enfants survivants	78
5.3	Intervalle intergénéral.....	78
5.4	Insusceptibilité de tomber enceinte	78
5.5	Âge à la première naissance	80
5.6	Fécondité des adolescentes	80
5.6.1	Fécondité des adolescentes	80
5.6.2	Comportements en matière de santé reproductive avant l'âge de 15 ans.....	82
6	PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ.....	91
6.1	Désir d'avoir un autre enfant	92
6.2	Nombre idéal d'enfants	93
6.3	Planification de la fécondité	95
6.4	Taux de fécondité désiré.....	96
7	PLANIFICATION FAMILIALE	105
7.1	Connaissance et utilisation de la contraception	106
7.2	Source d'approvisionnement des méthodes modernes	109
7.3	Choix informé.....	109
7.4	Discontinuité des méthodes contraceptives	110
7.5	Demande en planification familiale.....	110
7.6	Prise de décision sur la planification familiale	112
7.7	Contact des non utilisatrices de la contraception avec des prestataires de planification familiale	113
8	SANTÉ MATERNELLE	133
8.1	Couverture et contenu des soins prénatals.....	134
8.1.1	Prestataires qualifiés	134
8.1.2	Stade de la grossesse et nombre de visites prénatales	135
8.2	Composantes des visites prénatales	135
8.3	Protection contre le tétanos néonatal	136
8.4	Services d'accouchement	137
8.4.1	Accouchement en établissement de santé	137
8.4.2	Assistance durant l'accouchement par un prestataire de santé qualifié	139
8.4.3	Accouchement par césarienne.....	139
8.4.4	Durée du séjour dans l'établissement de santé après la naissance	140
8.5	Soins postnatals	140
8.5.1	Examen postnatal de la mère	140
8.5.2	Examen postnatal du nouveau-né	141
8.6	Problèmes d'accès aux soins de santé	142

9	SANTÉ DE L'ENFANT	159
9.1	Poids à la naissance	159
9.2	Vaccination des enfants	160
9.2.1	Possession et disponibilité d'un carnet de vaccination	162
9.3	Symptômes d'infections respiratoires aiguës	162
9.4	Fièvre	163
9.5	Maladies diarrhéiques	163
9.5.1	Prévalence de la diarrhée	163
9.5.2	Traitement de la diarrhée	163
9.5.3	Pratiques alimentaires	164
9.5.4	Sources des conseils ou traitement	165
9.5.5	Connaissance des sachets de SRO	165
9.6	Traitement des maladies infantiles	165
9.7	Évacuation des selles des enfants	165
10	PALUDISME.....	181
10.1	Possession de moustiquaires imprégnées d'insecticide	182
10.2	Accès aux MII et utilisation des MII dans les ménages	186
10.3	Utilisation des MII par les enfants et les femmes enceintes	187
10.4	Paludisme pendant la grossesse	188
10.5	Prise en charge du paludisme chez les enfants	189
10.6	Prévalence du faible niveau d'hémoglobine chez les enfants.....	191
10.7	Prévalence du paludisme chez les enfants	192
11	NUTRITION DES ENFANTS ET DES FEMMES.....	211
11.1	État nutritionnel des enfants	212
11.1.1	Mesure de l'état nutritionnel des jeunes enfants	212
11.1.2	Collecte des données.....	213
11.1.3	Niveaux de la malnutrition des enfants.....	214
11.2	Alimentation du nourrisson et du jeune enfant.....	215
11.2.1	Allaitement.....	215
11.2.2	Allaitement exclusif.....	216
11.2.3	Durée médiane de l'allaitement	217
11.2.4	Aliments de complément	217
11.2.5	Minimum alimentaire acceptable.....	218
11.3	Prévalence de l'anémie parmi les enfants.....	220
11.4	Présence de sel iodé dans les ménages	221
11.5	Consommation de micronutriments et supplémentation parmi les enfants	221
11.6	État nutritionnel des femmes	222
11.6.1	État nutritionnel des femmes	222
11.7	Prévalence de l'anémie Chez les femmes.....	224
11.8	Consommation de micronutriments parmi les mères	224
12	MORTALITÉ DES ENFANTS.....	241
12.1	Mortalité des enfants de moins de cinq ans	242
12.2	Facteurs de risque biodémographiques.....	244
12.3	Mortalité périnatale	245
12.4	Comportements procréateurs à hauts risques	245
13	CONNAISSANCE, ATTITUDES, ET COMPORTEMENTS VIS-À-VIS DU VIH/SIDA ..	251
13.1	Connaissance du VIH/Sida, des moyens de transmission et de prévention.....	252
13.2	Connaissance de la transmission mère-enfant	254
13.3	Comportements de stigmatisation envers les personnes vivant avec le VIH.....	255

13.4	Partenaires sexuels multiples.....	256
13.5	Rapports sexuels payants.....	257
13.6	Couverture en services de tests du VIH.....	257
	13.6.1 Connaissance de services de test du VIH.....	258
	13.6.2 Test du VIH chez les femmes enceintes.....	260
13.7	Circoncision.....	260
13.8	Infections sexuellement transmissibles déclarées.....	261
13.9	Connaissance du VIH/Sida et comportements parmi les jeunes.....	261
	13.9.1 Connaissance.....	261
	13.9.2 Premiers rapports sexuels.....	262
	13.9.3 Rapports sexuels pré-nuptiaux.....	262
	13.9.4 Partenaires sexuels multiples.....	262
	13.9.5 Couverture en services de tests du VIH.....	262
13.10	Connaissance et couverture de l'autotest de dépistage du VIH.....	263
14	POUVOIR D'ACTION DES FEMMES.....	285
14.1	Emploi des femmes et des hommes en union.....	286
14.2	Contrôle des gains de la femme.....	286
14.3	Contrôle des gains de l'homme.....	287
14.4	Contrôle par les femmes de l'utilisation de leurs propres gains et de ceux de leur conjoint.....	288
14.5	Possession de biens par les femmes et les hommes.....	288
14.6	Possession d'un titre de propriété pour la maison et les terres.....	289
14.7	Possession et utilisation de comptes bancaires et de téléphones portables.....	289
14.8	Participation des femmes et des hommes dans la prise de décision.....	290
14.9	Opinion concernant le fait de battre son épouse/partenaire.....	291
14.10	Négociation de rapports sexuels.....	292
14.11	Indicateurs du pouvoir d'action des femmes.....	293
15	MORTALITÉ ADULTE ET MORTALITÉ MATERNELLE.....	317
15.1	Données.....	317
15.2	Éstimation directe de la mortalité adulte.....	318
15.3	Tendances de la mortalité adulte.....	319
15.4	Éstimation directe de la mortalité maternelle.....	320
15.5	Tendances de la mortalité liée à la grossesse.....	321
16	VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE.....	325
16.1	Mesure de la violence.....	325
16.2	Violence physique.....	326
	16.2.1 Auteurs des actes de violence physique.....	327
16.3	Violence sexuelle.....	327
	16.3.1 Prévalence de la violence sexuelle.....	327
	16.3.2 Auteurs des actes de violence sexuelle.....	328
16.4	Différentes formes de violence.....	328
16.5	Contrôle exercé par le conjoint.....	328
16.6	Formes de violence conjugale.....	329
	16.6.1 Prévalence de la violence conjugale.....	330
	16.6.2 Premier épisode de violence conjugale.....	332
16.7	Blessures dues à la violence conjugale.....	332
16.8	Violence Initiée par les femmes à l'endroit de leur conjoint.....	332
16.9	Recherche d'aide et source de l'aide.....	333
	16.9.1 Recherche d'aide parmi les femmes qui ont subi des actes de violence.....	333
	16.9.2 Sources auprès desquelles l'aide a été recherchée.....	334

17	SANTÉ DES ADULTES ET MALADIES NON TRANSMISSIBLES	351
17.1	Dépistage et traitement de l'hypertension artérielle	351
17.2	Prévalence et niveaux d'hypertension artérielle	353
17.3	Prévalence des maladies non transmissibles.....	354
17.4	Connaissance et pratique de l'examen pour le cancer du col utérin	354
17.5	Dépistage et traitement de l'hyperglycémie	355
18	SITUATION DE L'ENFANT	363
18.1	Enregistrement des naissances à l'état civil.....	364
18.2	Enfants orphelins et résidence avec les parents	366
18.3	Discipline des enfants.....	366
18.4	Travail des enfants.....	368
18.4.1	Activités économiques des enfants de 5-17 ans	370
18.5	Développement du jeune enfant	370
18.5.1	Éducation de la petite enfance	370
18.5.2	Soutien à l'apprentissage	371
18.5.3	Matériel d'apprentissage.....	372
18.6	Encadrement inapproprié des jeunes enfants.....	373
18.7	Indice de développement du jeune enfant	374
	RÉFÉRENCES	389
ANNEXE A	PLAN DE SONDAGE.....	391
A.1	Introduction	391
A.2	Base de sondage	391
A.3	Plan de sondage et mise en œuvre	393
A.4	Probabilités de sondage et poids de sondage	394
A.5	Résultats de l'enquête.....	396
ANNEXE B	ÉSTIMATION DES ÉRREURS D'ÉCHANTILLONNAGE.....	399
ANNEXE C	TABLEAUX POUR L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES	437
ANNEXE D	PERSONNEL DE L'EDSB-V 2017-2018	447
ANNEXE E	QUESTIONNAIRES.....	455

LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES

1	PRÉSENTATION ET MÉTHODOLOGIE DE L'ENQUÊTE.....	1
	Tableau 1.1 Résultats des interviews ménage et individuelle.....	7
	Graphique 1.1 Organisation de l'EDSB-V Bénin.....	3
2	CARACTÉRISTIQUES DES LOGEMENTS ET DE LA POPULATION DES MÉNAGES.....	9
	Tableau 2.1 Eau utilisée par les ménages pour boire	18
	Tableau 2.2 Disponibilité de l'eau	19
	Tableau 2.3 Type d'installations sanitaires utilisées par les ménages.....	19
	Tableau 2.4 Caractéristiques du logement.....	20
	Tableau 2.5 Biens possédés par les ménages	21
	Tableau 2.6 Quintiles de bien-être économique	21
	Tableau 2.7 Lavage des mains	22
	Tableau 2.8 Population des ménages par âge, sexe et milieu de résidence	23
	Tableau 2.9 Composition des ménages	24
	Tableau 2.10.1 Niveau d'instruction de la population des ménages : Femme	25
	Tableau 2.10.2 Niveau d'instruction de la population des ménages : Homme	26
	Tableau 2.11 Taux de fréquentation scolaire	27
	Graphique 2.1 Eau utilisée par les ménages pour boire, par résidence	10
	Graphique 2.2 Types d'installations sanitaires utilisées par les ménages, par résidence	11
	Graphique 2.3 Quintiles de bien-être économique par résidence.....	13
	Graphique 2.4 Pyramide des âges de la population.....	14
	Graphique 2.5 Fréquentation scolaire au niveau secondaire par bien-être économique du ménage.....	16
3	CARACTÉRISTIQUES DES ENQUÊTÉS.....	29
	Tableau 3.1 Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés	38
	Tableau 3.2.1 Niveau d'instruction : Femme	39
	Tableau 3.2.2 Niveau d'instruction : Homme	40
	Tableau 3.3.1 Alphabétisation : Femme.....	41
	Tableau 3.3.2 Alphabétisation : Homme.....	42
	Tableau 3.4.1 Exposition aux médias : Femme.....	43
	Tableau 3.4.2 Exposition aux médias : Homme.....	44
	Tableau 3.5.1 Utilisation de l'internet : Femme.....	45
	Tableau 3.5.2 Utilisation de l'internet : Homme	46
	Tableau 3.6.1 Emploi : Femme	47
	Tableau 3.6.2 Emploi : Homme	48
	Tableau 3.7.1 Occupation : Femme.....	49
	Tableau 3.7.2 Occupation : Homme.....	50
	Tableau 3.8 Type d'emploi : Femme	51
	Tableau 3.9.1 Couverture médicale : Femme.....	52
	Tableau 3.9.2 Assurance médicale : Homme	53
	Tableau 3.10.1 Consommation de tabac à fumer : Femme	54
	Tableau 3.10.2 Consommation de tabac à fumer : Homme	55
	Tableau 3.11 Nombre moyen de cigarettes fumées par jour : Homme	56
	Tableau 3.12 Consommation de tabac non fumé et de tabac sous n'importe quelle forme ...	57

Graphique 3.1	Niveau d'instruction des enquêtés	30
Graphique 3.2	Niveau d'instruction secondaire par résidence	31
Graphique 3.3	Sans niveau d'instruction par département.....	31
Graphique 3.4	Exposition aux médias.....	33
Graphique 3.5	Statut de l'emploi par état matrimonial	34
Graphique 3.6	Occupation.....	35
4	NUPTIALITÉ ET ACTIVITÉ SEXUELLE.....	59
Tableau 4.1	État matrimonial actuel.....	65
Tableau 4.2.1	Nombre de coépouses des femmes	66
Tableau 4.2.2	Nombre d'épouses des hommes	67
Tableau 4.3	Âge à la première union	68
Tableau 4.4	Âge médian à la première union selon certaines caractéristiques.....	69
Tableau 4.5	Âge aux premiers rapports sexuels.....	70
Tableau 4.6	Âge médian aux premiers rapports sexuels selon certaines caractéristiques	71
Tableau 4.7.1	Activité sexuelle récente : Femme.....	72
Tableau 4.7.2	Activité sexuelle récente : Homme.....	73
Graphique 4.1	État matrimonial	60
Graphique 4.2	Tendances de la polygamie.....	61
Graphique 4.3	Polygamie par département	61
Graphique 4.4	Âge médian des femmes à la première union par résidence.....	62
Graphique 4.5	Âge médian aux premiers rapports sexuels et âge médian à la première union.....	63
Graphique 4.6	Âge médian aux premiers rapports sexuels : Tendances	63
5	FÉCONDITÉ.....	75
Tableau 5.1	Fécondité actuelle.....	83
Tableau 5.2	Fécondité selon certaines caractéristiques	83
Tableau 5.3.1	Tendance de la fécondité par âge	84
Tableau 5.3.2	Tendance de la fécondité par âge et Indice Synthétique de Fécondité	84
Tableau 5.4	Enfants nés vivants et enfants survivants des femmes	84
Tableau 5.5	Intervalles intergénésiques	85
Tableau 5.6	Aménorrhée, abstinence et insusceptibilité post-partum	86
Tableau 5.7	Durée médiane de l'aménorrhée, de l'abstinence post-partum et de l'insusceptibilité post-partum	87
Tableau 5.8	Ménopause.....	87
Tableau 5.9	Âge à la première naissance	88
Tableau 5.10	Âge médian à la première naissance.....	88
Tableau 5.11	Fécondité des adolescentes.....	89
Tableau 5.12	Rapports sexuels et comportements en matière de santé reproductive avant l'âge de 15 ans	89
Graphique 5.1	Tendances de la fécondité par résidence	76
Graphique 5.2	Tendances de la fécondité par âge pour les 3 années avant chaque enquête	76
Graphique 5.3	Fécondité par département.....	77
Graphique 5.4	Fécondité par niveau d'instruction	77
Graphique 5.5	Intervalles intergénésiques	78
Graphique 5.6	Âge médian à la première naissance par résidence.....	80
Graphique 5.7	Grossesse et maternité des adolescentes par département	81
Graphique 5.8	Grossesse et maternité des adolescentes par bien-être économique du ménage.....	81

Graphique 5.9	Comportements en matière de sexualité et de santé de la reproduction avant l'âge de 15 ans	82
6	PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ.....	91
Tableau 6.1	Préférences en matière de fécondité par nombre d'enfants vivants.....	98
Tableau 6.2.1	Désir de limiter les naissances : Femme.....	99
Tableau 6.2.2	Désir de limiter les naissances : Homme.....	100
Tableau 6.3	Nombre idéal d'enfants selon le nombre d'enfants vivants.....	101
Tableau 6.4	Nombre idéal d'enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques	102
Tableau 6.5	Planification de la fécondité	103
Tableau 6.6	Taux de fécondité désirée.....	103
Graphique 6.1	Désir de limiter les naissances par nombre d'enfants vivants : Tendances	92
Graphique 6.2	Désir de limiter les naissances par nombre d'enfants vivants	93
Graphique 6.3	Taille idéale de la famille	94
Graphique 6.4	Taille idéale de la famille par nombre d'enfants vivants.....	94
Graphique 6.5	Planification de la fécondité	95
Graphique 6.6	Fécondité désirée et fécondité actuelle : Tendances.....	96
7	PLANIFICATION FAMILIALE	105
Tableau 7.1	Connaissance des méthodes contraceptives.....	115
Tableau 7.2	Connaissance des méthodes contraceptives selon certaines caractéristiques sociodémographiques	116
Tableau 7.3	Utilisation actuelle de la contraception selon âge.....	117
Tableau 7.4.1	Utilisation actuelle de la contraception selon certaines caractéristiques sociodémographiques	118
Tableau 7.4.2	Tendances de l'utilisation actuelle de la contraception	120
Tableau 7.5	Connaissance de la période de fertilité	120
Tableau 7.6	Connaissance de la période de fertilité par âge	120
Tableau 7.7	Source d'approvisionnement des méthodes modernes de contraception.....	121
Tableau 7.8	Choix informé de la méthode contraceptive	121
Tableau 7.9	Taux de discontinuation des méthodes contraceptives sur 12 mois	122
Tableau 7.10	Raisons de la discontinuation des méthodes contraceptives.....	123
Tableau 7.11.1	Besoins et demande en matière de planification familiale parmi les femmes actuellement en union.....	124
Tableau 7.11.2	Besoins et demande en matière de planification familiale pour l'ensemble des femmes et pour les femmes non en union sexuellement actives	125
Tableau 7.12	Prise de décision concernant la planification familiale	127
Tableau 7.13	Utilisation future de la contraception	128
Tableau 7.14.1	Exposition aux messages sur la planification familiale.....	129
Tableau 7.14.2	Acceptable de parler de la planification familiale	131
Tableau 7.15	Contact des non utilisatrices de la contraception avec des prestataires de planification familiale.....	132
Graphique 7.1	Utilisation contraceptive.....	107
Graphique 7.2	Tendances de l'utilisation contraceptive	107
Graphique 7.3	Utilisation d'une méthode moderne contraceptive par département	108
Graphique 7.4	Utilisation des méthodes modernes par bien-être économique du ménage	108
Graphique 7.5	Source d'approvisionnement des méthodes modernes de contraception.....	109
Graphique 7.6	Taux de discontinuation des méthodes contraceptives.....	110
Graphique 7.7	Demande en matière de planification familiale	111
Graphique 7.8	Tendances de la demande en matière de planification familiale	111

	Graphique 7.9	Besoins non satisfaits par département.....	112
	Graphique 7.10	Besoins non satisfaits par bien-être économique du ménage.....	112
8	SANTÉ MATERNELLE		133
	Tableau 8.1	Soins prénatals.....	144
	Tableau 8.2	Nombre de visites prénatales et stade de la grossesse à la première visite	145
	Tableau 8.3	Composants des visites prénatales.....	146
	Tableau 8.4	Vaccination antitétanique	148
	Tableau 8.5	Lieu de l'accouchement.....	149
	Tableau 8.6	Assistance au cours de l'accouchement.....	150
	Tableau 8.7	Césarienne	151
	Tableau 8.8	Durée du séjour dans l'établissement de santé après la naissance.....	152
	Tableau 8.9	Moment où le premier examen postnatal a été dispensé à la mère	152
	Tableau 8.10	Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal à la mère	153
	Tableau 8.11	Moment où le premier examen postnatal a été dispensé au nouveau-né	154
	Tableau 8.12	Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal au nouveau-né	155
	Tableau 8.13	Contenu des examens postnatals dispensés aux nouveau-nés	156
	Tableau 8.14	Problèmes d'accès aux soins de santé	157
	Graphique 8.1	Tendances des couvertures en soins prénatals.....	134
	Graphique 8.2	Composants des soins prénatals	135
	Graphique 8.3	Lieu d'accouchement : tendances.....	137
	Graphique 8.4	Naissances dans un établissement de santé par département.....	138
	Graphique 8.5	Naissances ayant eu lieu dans un établissement de santé par bien-être économique du ménage	138
	Graphique 8.6	Assistance à l'accouchement	139
	Graphique 8.7	Assistance à l'accouchement par du personnel qualifié par bien-être économique du ménage	139
	Graphique 8.8	Soins postnatals selon le lieu de l'accouchement.....	141
9	SANTÉ DE L'ENFANT.....		159
	Tableau 9.1	Taille et poids de l'enfant à la naissance	167
	Tableau 9.2	Vaccinations par source d'information.....	168
	Tableau 9.3	Vaccinations par caractéristique sociodémographique.....	169
	Tableau 9.4	Possession et observation des carnets de vaccination, selon certaines caractéristiques sociodémographiques.....	171
	Tableau 9.5	Prévalence et traitement des symptômes d'IRA	172
	Tableau 9.6	Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant présenté des symptômes d'IRA.....	173
	Tableau 9.7	Prévalence et traitement de la fièvre.....	174
	Tableau 9.8	Prévalence et traitement de la diarrhée	175
	Tableau 9.9	Thérapie de Réhydratation par voie orale, supplémentation en zinc et administration d'autres traitements contre la diarrhée.....	176
	Tableau 9.10	Pratiques alimentaires durant la diarrhée.....	177
	Tableau 9.11	Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant eu la diarrhée.....	178
	Tableau 9.12	Connaissance des sachets SRO ou des liquides SRO préconditionnés.....	179
	Tableau 9.13	Évacuation des selles des enfants	180
	Graphique 9.1	Vaccinations infantiles	160
	Graphique 9.2	Tendances de la couverture vaccinale	161
	Graphique 9.3	Couverture vaccinale par résidence.....	161

Graphique 9.4	Couverture vaccinale par département	162
Graphique 9.5	Prévalence de la diarrhée par âge	163
Graphique 9.6	Traitement de la diarrhée.....	164
Graphique 9.7	Pratiques alimentaires pendant la diarrhée	164
Graphique 9.8	Prévalence et traitement des maladies infantiles	165
10	PALUDISME.....	181
Tableau 10.1	Possession de moustiquaires par les ménages	195
Tableau 10.2	Pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide résiduel (PID) contre les moustiques.....	196
Tableau 10.3	Source d'obtention des moustiquaires.....	197
Tableau 10.4	Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII).....	197
Tableau 10.5	Accès à une MII.....	198
Tableau 10.6	Utilisation des moustiquaires par les ménages	199
Tableau 10.7	Utilisation des MII existantes.....	200
Tableau 10.8	Utilisation des moustiquaires par les enfants.....	201
Tableau 10.9	Utilisation des moustiquaires par les femmes enceintes.....	202
Tableau 10.10	Utilisation du traitement préventif intermittent (TPIg) par les femmes pendant la grossesse	203
Tableau 10.11	Prévalence, diagnostic et traitement précoce des enfants avec de la fièvre....	204
Tableau 10.12	Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant de la fièvre	205
Tableau 10.13	Type d'antipaludiques utilisés.....	206
Tableau 10.14	Couverture des tests d'anémie et du paludisme auprès des enfants.....	207
Tableau 10.15	Niveau d'hémoglobine < 8,0 g/dl chez les enfants.....	208
Tableau 10.16	Prévalence du paludisme	209
Graphique 10.1	Possession de MII par le ménage	183
Graphique 10.2	Possession de MII dans les ménages : Tendances.....	183
Graphique 10.3	Possession de MII par département	184
Graphique 10.4	Possession de MII par bien-être économique du ménage.....	184
Graphique 10.5	Prévention du paludisme	185
Graphique 10.6	Source d'approvisionnement des moustiquaires	185
Graphique 10.7	Accès et utilisation des MII : Tendances.....	186
Graphique 10.8	Accès et utilisation des MII.....	187
Graphique 10.9	Utilisation des MII.....	187
Graphique 10.10	Tendances de l'utilisation du TPIg par les femmes enceintes.....	189
Graphique 10.11	Tendance de l'utilisation des CTA par les enfants ayant eu de la fièvre.....	190
Graphique 10.12	Prévalence de faible niveau d'hémoglobine chez les enfants par niveau d'instruction de la mère	192
Graphique 10.13	Prévalence du paludisme chez les enfants par département	193
Graphique 10.14	Prévalence du paludisme chez les enfants par bien-être économique du ménage.....	193
11	NUTRITION DES ENFANTS ET DES FEMMES.....	211
Tableau 11.1	État nutritionnel des enfants	226
Tableau 11.2	Allaitement initial.....	228
Tableau 11.3	Type d'allaitement selon l'âge de l'enfant	229
Tableau 11.4	Indicateurs de l'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) concernant l'allaitement	230
Tableau 11.5	Durée médiane de l'allaitement.....	230
Tableau 11.6	Aliments et liquides reçus par les enfants le jour ou la nuit ayant précédé l'interview	231
Tableau 11.7	Apport alimentaire minimum acceptable.....	232

Tableau 11.8	Prévalence de l'anémie chez les enfants.....	234
Tableau 11.9	Présence de sel iodé dans le ménage	235
Tableau 11.10	Consommation de micronutriments par les enfants.....	236
Tableau 11.11	État nutritionnel des femmes	238
Tableau 11.12	Prévalence de l'anémie chez les femmes.....	239
Tableau 11.13	Consommation de micronutriments par les mères.....	240
Graphique 11.1	Tendances de l'état nutritionnel des enfants.....	214
Graphique 11.2	Retard de croissance chez les enfants par département	215
Graphique 11.3	Retard de croissance chez les enfants par bien-être économique du ménage.....	215
Graphique 11.4	Tendances de l'allaitement initial.....	216
Graphique 11.5	Pratiques d'allaitement par âge.....	216
Graphique 11.6	Tendances de l'allaitement exclusif	217
Graphique 11.7	Indicateurs ANJE sur l'apport alimentaire minimal acceptable	219
Graphique 11.8	Tendances de l'anémie chez les enfants	220
Graphique 11.9	Anémie chez les enfants par département	221
Graphique 11.10	Tendances de l'anémie chez les femmes	224
12	MORTALITÉ DES ENFANTS.....	241
Tableau 12.1	Quotients de mortalité des enfants de moins de 5 ans	247
Tableau 12.2	Quotients de mortalité des enfants sur une période de 5 ans selon certaines caractéristiques démographiques.....	247
Tableau 12.3	Quotients de mortalité des enfants sur une période de 10 ans selon d'autres caractéristiques	248
Tableau 12.4	Mortalité périnatale	249
Tableau 12.5	Comportement procréateur à hauts risques.....	250
Graphique 12.1	Tendances de la mortalité des enfants de moins de 5 ans.....	242
Graphique 12.2	Mortalité infanto-juvénile par département	243
Graphique 12.3	Mortalité infanto-juvénile par bien-être économique du ménage.....	244
Graphique 12.4	Mortalité des enfants de moins de 5 ans selon l'intervalle avec la naissance précédente.....	244
Graphique 12.5	Mortalité périnatale par l'âge de la mère à la naissance de l'enfant	245
13	CONNAISSANCE, ATTITUDES, ET COMPORTEMENTS VIS-À-VIS DU VIH/SIDA ..	251
Tableau 13.1	Connaissance du VIH ou du sida.....	264
Tableau 13.2	Connaissance des moyens de prévention du VIH.....	265
Tableau 13.3	Connaissance « approfondie » sur le VIH	266
Tableau 13.4	Connaissance de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant.....	267
Tableau 13.5	Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	268
Tableau 13.6.1	Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois : Femme	269
Tableau 13.6.2	Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois : Homme.....	270
Tableau 13.7	Rapports sexuels payants et utilisation du condom au cours des derniers rapports sexuels payants	271
Tableau 13.8.1	Couverture du test du VIH antérieur à l'enquête : Femme	272
Tableau 13.8.2	Couverture du test du VIH antérieur à l'enquête : Homme.....	273
Tableau 13.9	Femmes enceintes conseillées et ayant effectué un test du VIH	274
Tableau 13.10	Circoncision.....	275

Tableau 13.11	Prévalence déclarée des infections sexuellement transmissibles (IST) et symptômes déclarés d'IST.....	276
Tableau 13.12	Femmes et hommes ayant recherché un traitement contre les IST.....	278
Tableau 13.13	Connaissance « approfondie » du VIH parmi les jeunes.....	278
Tableau 13.14	Âge aux premiers rapports sexuels parmi les jeunes.....	279
Tableau 13.15	Rapports sexuels pré-nuptiaux parmi les jeunes.....	279
Tableau 13.16.1	Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois parmi les jeunes : Femme.....	280
Tableau 13.16.2	Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois parmi les jeunes : Homme.....	281
Tableau 13.17	Tests du VIH récents parmi les jeunes.....	282
Tableau 13.18	Connaissance et couverture de l'autotest de dépistage du VIH.....	283
Graphique 13.1a	Connaissance du VIH/sida par département : Femme.....	253
Graphique 13.1b	Connaissance du VIH/sida par département : Homme.....	253
Graphique 13.2	Connaissance de la Transmission de la Mère à l'Enfant (TME).....	254
Graphique 13.3	Connaissance de la Transmission de la Mère à l'Enfant (TME) : Tendances.....	255
Graphique 13.4	Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH par niveau d'instruction.....	256
Graphique 13.5	Rapports sexuels et utilisation du condom avec un partenaire non régulier...	257
Graphique 13.6	Test du VIH.....	258
Graphique 13.7	Test du VIH récent : Tendances.....	258
Graphique 13.8a	Test du VIH par département : Femme.....	259
Graphique 13.8b	Test du VIH par département : Homme.....	259
Graphique 13.9	Test du VIH récent par niveau d'instruction.....	260
Graphique 13.10	Test du VIH pendant la grossesse : Tendances.....	260
Graphique 13.11	Tendances de la circoncision.....	261
14	POUVOIR D'ACTION DES FEMMES.....	285
Tableau 14.1	Emploi et type de rémunération des femmes et des hommes actuellement en union.....	296
Tableau 14.2.1	Contrôle de l'utilisation de l'argent gagné par les femmes et importance de l'argent gagné par les femmes par rapport à celui gagné par leur conjoint....	297
Tableau 14.2.2	Contrôle de l'argent gagné par les hommes.....	298
Tableau 14.3	Contrôle par les femmes de l'utilisation de leurs propres gains et contrôle de l'utilisation des gains de leur mari/partenaire.....	299
Tableau 14.4.1	Possession de biens : Femme.....	300
Tableau 14.4.2	Possession de biens : Homme.....	301
Tableau 14.5.1	Possession d'un titre de propriété pour une maison : Femme.....	302
Tableau 14.5.2	Possession d'un titre de propriété pour une maison : Homme.....	303
Tableau 14.6.1	Possession d'un titre de propriété pour des terres : Femme.....	304
Tableau 14.6.2	Possession d'un titre de propriété pour des terres : Homme.....	305
Tableau 14.7.1	Possession et utilisation de comptes bancaires et de téléphones portables : Femme.....	306
Tableau 14.7.2	Possession et utilisation de comptes bancaires et de téléphones portables : Homme.....	307
Tableau 14.8	Participation dans la prise de décision.....	308
Tableau 14.9.1	Participation des femmes dans la prise de décision selon certaines caractéristiques sociodémographiques.....	308
Tableau 14.9.2	Participation des hommes dans la prise de décision selon certaines caractéristiques sociodémographiques.....	309

Tableau 14.10.1	Opinion des femmes concernant le fait qu'un mari batte sa femme.....	310
Tableau 14.10.2	Opinion des hommes concernant le fait qu'un mari batte sa femme.....	311
Tableau 14.11	Opinions concernant la négociation de rapports sexuels sans risque avec le mari/partenaire.....	312
Tableau 14.12	Capacité des femmes à négocier les rapports sexuels avec leur mari/partenaire.....	313
Tableau 14.13	Indicateurs du pouvoir d'action des femmes.....	314
Tableau 14.14	Utilisation actuelle de la contraception selon les indicateurs du pouvoir d'action des femmes.....	314
Tableau 14.15	Nombre idéal d'enfants et besoins non satisfaits en matière de planification familiale selon certains indicateurs du pouvoir d'action des femmes.....	315
Tableau 14.16	Soins de santé maternelle, selon les indicateurs du pouvoir d'action des femmes.....	315
Tableau 14.17	Mortalité des enfants de moins de cinq ans selon certains indicateurs du pouvoir d'action des femmes.....	316
Graphique 14.1	Emploi par âge.....	286
Graphique 14.2	Contrôle des gains de la femme.....	287
Graphique 14.3	Possession de biens.....	289
Graphique 14.4	Participation des femmes dans la prise de décision.....	290
Graphique 14.5	Opinions concernant le fait de battre sa femme.....	291
15	MORTALITÉ ADULTE ET MORTALITÉ MATERNELLE.....	317
Tableau 15.1	Complétude de l'information sur les frères et sœurs.....	323
Tableau 15.2	Taux de mortalité des adultes.....	323
Tableau 15.3	Quotient de mortalité adulte.....	323
Tableau 15.4	Mortalité maternelle.....	324
Tableau 15.5	Rapport de mortalité maternelle.....	324
Tableau 15.6	Tendances de la mortalité liée à la grossesse.....	324
Graphique 15.1	Taux de mortalité adulte par âge.....	319
Graphique 15.2	Tendances du Rapport de Mortalité liée à la Grossesse (RMG) avec intervalle de confiance.....	321
16	VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE.....	325
Tableau 16.1	Violence physique.....	335
Tableau 16.2	Auteurs des violences physiques.....	336
Tableau 16.3	Violence sexuelle.....	337
Tableau 16.4	Âge au moment de la première expérience de violence sexuelle.....	338
Tableau 16.5	Auteurs des violences sexuelles.....	338
Tableau 16.6	Expérience de diverses formes de violence.....	338
Tableau 16.7	Violence pendant la grossesse.....	339
Tableau 16.8	Contrôle exercé par les maris selon les déclarations des épouses.....	340
Tableau 16.9	Formes de violence conjugale.....	341
Tableau 16.10	Violence conjugale selon certaines caractéristiques sociodémographiques.....	342
Tableau 16.11	Violence conjugale selon les caractéristiques du mari/partenaire et les indicateurs du pouvoir d'action de la femme.....	343
Tableau 16.12	Violences conjugales au cours des 12 derniers mois.....	344
Tableau 16.13	Premier épisode de violence conjugale selon la durée de l'union.....	345
Tableau 16.14	Blessures dues à la violence conjugale.....	345
Tableau 16.15	Violence des enquêtées contre leurs conjoints selon les caractéristiques des enquêtées.....	346

Tableau 16.16	Violence des enquêtées contre leur conjoint selon les caractéristiques du conjoint et les indicateurs du pouvoir d'action de l'enquêtée	347
Tableau 16.17	Recherche de l'aide pour mettre fin à la violence	348
Tableau 16.18	Sources/personnes auprès desquelles l'aide pour mettre fin à la violence a été recherché	349
Graphique 16.1	Violence subie par les femmes selon leur état matrimonial	327
Graphique 16.2	Types d'actes de violence conjugale	330
Graphique 16.3	Violence conjugale par département	331
Graphique 16.4	Violence conjugale selon la consommation d'alcool du mari/partenaire	332
Graphique 16.5	Recherche d'aide par type de violence subie.....	333
17	SANTÉ DES ADULTES ET MALADIES NON TRANSMISSIBLES	351
Tableau 17.1.1	Prise en charge de l'hypertension artérielle : Femme.....	357
Tableau 17.1.2	Prise en charge de l'hypertension artérielle : Homme	358
Tableau 17.2.1	Niveaux d'hypertension : Femme.....	359
Tableau 17.2.2	Niveaux d'hypertension : Homme	360
Tableau 17.3	Type de maladies non transmissibles	360
Tableau 17.4	Cancer du col de l'utérus.....	361
Tableau 17.5.1	Glycémie mesurée et traitée : Femme	362
Tableau 17.5.2	Glycémie mesurée et traitée : Homme.....	362
Graphique 17.1	Mesure de la pression artérielle par un prestataire de soins de santé par résidence.....	352
Graphique 17.2	Informé par un prestataire souffrant d'hypertension artérielle par bien-être économique du ménage	353
Graphique 17.3	Prévalence de l'hypertension et niveaux d'hypertension	354
Graphique 17.4	Femmes ayant entendu parler du cancer du col de l'utérus par niveau d'instruction	355
18	SITUATION DE L'ENFANT	363
Tableau 18.1	Enregistrement à l'état civil des naissances d'enfants de moins de 5 ans	376
Tableau 18.2	Enfants orphelins et résidence des enfants avec les parents	377
Tableau 18.3	Discipline des enfants.....	378
Tableau 18.4	Opinion concernant les châtiments corporels.....	379
Tableau 18.5	Implication des enfants de 5-17 ans dans l'activité économique.....	380
Tableau 18.6	Implication des enfants de 5-17 ans dans les travaux domestiques.....	381
Tableau 18.7	Travail des enfants.....	382
Tableau 18.8	Éducation de la petite enfance	383
Tableau 18.9	Soutien à l'apprentissage.....	384
Tableau 18.10	Matériel d'apprentissage.....	385
Tableau 18.11	Encadrement inapproprié des enfants.....	386
Tableau 18.12	Index de développement du jeune enfant	387
Graphique 18.1	Enregistrement des naissances d'enfants à l'état civil : Tendances.....	364
Graphique 18.2	Enregistrement des naissances à l'état civil par département.....	365
Graphique 18.3	Enregistrement des naissances à l'état civil par bien-être économique du ménage.....	365
Graphique 18.4	Travail des enfants.....	369
Graphique 18.5	Ensemble du travail des enfants par bien-être économique du ménage	370
Graphique 18.6	Enfants qui fréquentent un programme d'éducation préscolaire par niveau d'instruction de la mère	371
Graphique 18.7	Soutien à l'apprentissage par bien-être économique	372

ANNEXE A	PLAN DE SONDAGE	391
Tableau A.1	Répartition de la population par département et selon milieu de résidence (RGPH 2013).....	392
Tableau A.2	Répartition de ménages par département et selon milieu de résidence (RGPH 2013).....	392
Tableau A.3	Répartition de ZD et de leur taille moyenne en ménages par département et selon milieu de résidence (RGPH 2013).....	392
Tableau A.4	Allocation de l'échantillon grappes et ménages par département et selon milieu de résidence (EDSB-V Bénin 2017-2018)	393
Tableau A.5	Allocation de nombres attendus de femmes et hommes enquêtés avec succès par département et selon milieu de résidence (EDSB-V Bénin 2017-2018)	394
Tableau A.6	Résultats de l'enquête : Femme.....	397
Tableau A.7	Résultats de l'enquête: Homme.....	398
ANNEXE B	ÉSTIMATION DES ERREURS D'ÉCHANTILLONNAGE	399
Tableau B.1	Variables utilisées pour le calcul des erreurs de sondage : EDSB-V Bénin 2017-2018	401
Tableau B.2	Erreurs de sondage : Echantillon Total, EDSB-V Bénin 2017-2018.....	403
Tableau B.3	Erreurs de sondage : Echantillon Cotonou, EDSB-V Bénin 2017-2018	405
Tableau B.4	Erreurs de sondage : Echantillon Autres villes, EDSB-V Bénin 2017-2018	407
Tableau B.5	Erreurs de sondage : Echantillon Ensemble Urbain, EDSB-V Bénin 2017-2018	409
Tableau B.6	Erreurs de sondage : Echantillon Rural, EDSB-V Bénin 2017-2018	411
Tableau B.7	Erreurs de sondage : Echantillon Alibori, EDSB-V Bénin 2017-2018	413
Tableau B.8	Erreurs de sondage : Echantillon Atacora, EDSB-V Bénin 2017-2018	415
Tableau B.9	Erreurs de sondage : Echantillon Atlantique, EDSB-V Bénin 2017-2018	417
Tableau B.10	Erreurs de sondage : Echantillon Borgou, EDSB-V Bénin 2017-2018	419
Tableau B.11	Erreurs de sondage : Echantillon Collines, EDSB-V Bénin 2017-2018.....	421
Tableau B.12	Erreurs de sondage : Echantillon Couffo, EDSB-V Bénin 2017-2018.....	423
Tableau B.13	Erreurs de sondage : Echantillon Donga, EDSB-V Bénin 2017-2018	425
Tableau B.14	Erreurs de sondage : Echantillon Littoral, EDSB-V Bénin 2017-2018.....	427
Tableau B.15	Erreurs de sondage : Echantillon Mono, EDSB-V Bénin 2017-2018	429
Tableau B.16	Erreurs de sondage : Echantillon Ouémé, EDSB-V Bénin 2017-2018	431
Tableau B.17	Erreurs de sondage : Echantillon Plateau, EDSB-V Bénin 2017-2018	433
Tableau B.18	Erreurs de sondage : Echantillon Zou, EDSB-V Bénin 2017-2018.....	435
ANNEXE C	TABLEAUX POUR L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES	437
Tableau C.1	Répartition par âge de la population des ménages.....	437
Tableau C.2.1	Répartition par âge des femmes éligibles et interviewées	438
Tableau C.2.2	Répartition par âge des hommes éligibles et interviewés	438
Tableau C.3	Complétude de l'enregistrement.....	439
Tableau C.4	Naissances par année de naissance	439
Tableau C.5	Enregistrement de l'âge au décès en jours.....	440
Tableau C.6	Enregistrement de l'âge au décès en mois.....	441
Tableau C.7	Complétude et données de qualité concernant le poids et la taille des enfants	442
Tableau C.8	Taille de la fratrie et rapport de masculinité des frères et sœurs	443
Tableau C.9	Mortalité liée à la grossesse.....	443
Tableau C.10	Nombre de grappes complétées par mois d'interview et selon la région	443

Tableau C.11	Pourcentage d'enfants de 6 à 59 mois dont les résultats du test de diagnostic rapide (TDR) pour le paludisme sont classés positifs, par mois et par département, EDSB-V Bénin 2017-2018	444
Tableau C.12	Nombre d'enfant de 6 à 59 ans ayant effectué le test de diagnostic rapide (TDR) pour le paludisme par mois et par département (non-pondéré), EDSB-V Bénin 2017-2018.....	444
Tableau C.13	Pourcentage d'enfants de 6 à 59 mois dont les résultats du test de gouttes épaisses (Parasitémie palustre) sont classés positifs, par mois et par département, EDSB-V Bénin 2017-2018	444
Tableau C.14	Nombre d'enfant de 6 à 59 ans ayant effectué le test de gouttes épaisses (Parasitémie palustre) par mois et par département (non-pondéré), EDSB-V Bénin 2017-2018.....	445

REMERCIEMENTS

La réalisation de la cinquième édition de l'Enquête Démographique et de Santé du Bénin (EDSB-V) est le fruit d'efforts conjugués de nombreux acteurs et institutions. L'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE), sous le leadership du Ministre d'État chargé du Plan et du Développement, tient à les remercier tous.

L'enquête a bénéficié de la collaboration technique de personnes ressources de différentes Directions du Ministère de la Santé, notamment la Direction Nationale de la Santé Publique (DNSP), la Direction de la Santé de la Mère et de l'Enfant à travers le Service de Planification Familiale et Santé des Adolescents et Jeunes (DSME/PFSAJ) et le Service Nutrition (DSME/SN), l'Agence Béninoise pour la Promotion de la Famille (ABPF), l'Agence Nationale de Vaccination et de Suivi des Soins de Santé Primaire (ANV/SSP), le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), la Direction de la Recherche, de la Formation et de la Médecine Traditionnelle (DRFMT), le Secrétariat Permanent du Conseil de l'Alimentation et de la Nutrition (SP/CAN), le Laboratoire de Parasitologie du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou MAGA (CNHU-HKM), le Conseil National de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme (CNLSTP), le Service de Cardiologie du CNHU-HKM et le Programme National de Lutte contre les Maladies Non Transmissibles (PNLMNT). Nous remercions également le Ministère en charge de la famille à travers la Direction de la Promotion de la Femme et du Genre (DPFG) pour sa contribution.

Nous adressons nos sincères remerciements aux Partenaires Techniques et Financiers dont l'engagement et les appuis ont rendu possible la réalisation de cette enquête.

Nous rendons un vibrant hommage à l'âme de Feu Bernard BARRERE, précédemment Directeur Adjoint de ICF International pour ses apports considérables, mais malheureusement arraché à notre affection, le 14 octobre 2018. Nous saisissons cette opportunité pour renouveler notre reconnaissance à tout le personnel de ICF International pour son appui technique aux différentes étapes de l'enquête notamment à Madame Yodit Bekele et Messieurs Sinaré Tinga, Fidèle Mutima, Michel Toukam, Amadou Sow, Traoré Metahan ainsi qu'à l'équipe de conception et de production du rapport d'analyse thématique. Par ailleurs, nous adressons un remerciement spécial à l'endroit des anciens Directeurs de l'Institut pour leurs précieuses contributions à l'amélioration de la qualité du rapport.

Nous voudrions également témoigner notre profonde gratitude et notre reconnaissance à l'égard des populations enquêtées ainsi qu'aux autorités administratives, locales, coutumières et religieuses pour l'accueil chaleureux qu'elles ont réservé au personnel de terrain.

Enfin, nous adressons toutes nos félicitations au personnel de terrain constitué de superviseurs, d'éditeurs, de chefs d'équipe, d'agents « biomarqueurs » et d'enquêteurs pour leur professionnalisme, leur dévouement et leur endurance qui ont été déterminants pour la réussite de l'enquête. Nous tenons à saluer l'expertise et le dévouement de l'équipe de l'INSAE qui s'est mobilisée pour assurer un succès à cette opération, aussi bien du point de vue technique, logistique, qu'administratif et financier.



Laurent Mahounou HOUNSA
Directeur Général

PRÉFACE

Le Bénin, dans le cadre de la mise en œuvre de sa Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS), vient de réaliser la cinquième édition de l'Enquête Démographique et de Santé (EDSB-V). Elle a été exécutée et coordonnée par l'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE) qui est sous la tutelle du Ministère du Plan et du Développement (MPD).

Le travail a été fait en collaboration avec des services techniques du Ministère de la Santé, le Laboratoire de Parasitologie et de Cardiologie du Centre National Hospitalier (CNHU), le Secrétariat Permanent du Conseil de l'Alimentation et de la Nutrition (SP-CAN).

Le financement de la cinquième édition de l'Enquête Démographique et de Santé du Bénin (EDSB-V) a été assuré par le Gouvernement du Bénin, l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), par le biais d'un financement du Fonds Mondial et le SP-CAN à travers un financement de la Banque Mondiale.

Depuis l'élaboration du protocole en octobre 2016 jusqu'à la publication du présent rapport, le Bénin a bénéficié de l'assistance technique de ICF, une institution américaine en charge du programme mondial des Enquêtes Démographiques et de Santé (DHS), financé par l'USAID.

Grâce à cette cinquième édition de l'EDS, le Bénin dispose d'indicateurs fiables et actualisés sur, entre autres, la fécondité, la planification familiale, l'état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans, la mortalité des enfants et l'anémie, indispensables à la mise en place de politiques et de programmes et plus particulièrement pour le suivi des Objectifs de Développement Durable (ODD) et le Programme d'Actions du Gouvernement (PAG).


La particularité de cette cinquième édition de l'EDS réside dans l'introduction de trois nouveaux modules à savoir, les maladies non transmissibles au sein de la population des femmes (30-49 ans) et des hommes (30-64 ans), les violences conjugales (pour lesquelles les questions ont été posées uniquement aux femmes, suivant un échantillon bien déterminé) et le développement du jeune enfant (enfants de moins de 5 ans).

L'INSAE a expérimenté pour la deuxième fois dans le cadre de l'EDS, l'utilisation des tablettes (mini ordinateurs portables) qui ont permis la saisie directe des données sur le terrain. Le succès avec lequel il a réalisé ce projet confirme à nouveau son leadership et la nécessité de faire confiance à l'expertise nationale. J'exprime donc ma satisfaction et adresse mes encouragements aux cadres de l'INSAE et à ICF pour leur appui technique.

J'exhorte les responsables à divers niveaux et les chercheurs à s'approprier les résultats de ce travail dans les domaines qui les concernent, comme principal cadre de référence pour l'évaluation et la mise en œuvre des programmes de population et de santé, pour une meilleure planification de leurs activités et des interventions plus efficaces en vue d'arriver à un changement réel de l'état de santé et des conditions de vie de la population.

Enfin, au nom du Gouvernement de la République du Bénin, j'exprime ma vive gratitude à l'USAID et aux représentations de l'UNICEF, de l'UNFPA, du PNL (Fonds Mondial) et du SP-CAN (Banque Mondiale) du Bénin, dont les contributions financières ont permis l'aboutissement de ce précieux travail.




Abdoulaye BIO TCHANE
Ministre d'Etat Chargé du Plan
et du Développement

LISTE DES PARTICIPANTS A L'ATELIER D'ANALYSE DE L'EDSB-V 2017-2018

INSAE

Hounsa Laurent Mahounou, Directeur Général
Ahamide Armelle, Directrice Générale Adjointe

Equipe Technique, INSAE

Hounguevou Rémy	Houessou Assaba Gisèle	Dossou Fèmi Christian
Ahovey Elise	Agbangla Sévérin	Houkpodote Eudes R. O.
Zounon Mémounath	Houndonougbo Oscar	Lawani Mouchitaba
Houeha Jeannine	Djagba Bruno	Quenum Charlotte
Yovoga Renaud	Missihoun Kokou	Kiki Gilles

Appui administratif et logistique de l'INSAE

Ablefonlin Eléonore	Awo Hilarion
Ahouangbo A. Cécile	Badjagou Solange

Participants des structures sectorielles

Dodoo Virgile, MS/ANV-SSP	Ahyi José, DSME/MS
Baco Mama Chabi Aminatou, DSME/MS	Yebe H. Cyrillia, DPF/MASM
Koukpolyi Augustin, CNHU-HKM/Parasitologie	Moussa Ibrahim, ABPF
Adanhoume Bernadin, DNSP/MS	Ogoudedji Georges, SP-CAN
Assani Salimatou, CNHU-HKM/Cardiologie	Affedjou Fiacre, SP-CAN
Pio Abou Bakary, PNLP	Houensou Mireille, SP-CAN
Goudjo Gaétan Cyriaque, PNLMT	Houindote Andréa, SP-CAN

Personnes Ressources de l'INSAE (analystes)

Semevo Odette	Kouchoro Georges	Dansou Justin	Atodjinou Candide
Somakou Etienne	Koungblenou Paterné	Ahokpossé Yédodé	Gbokli Antoinette

Personnes Ressources de l'INSAE (lecteurs)

Zounon Kokou	Bankole Maurice Dossou
Nouatin Bruno Magloire	Bankole Victor Valère O.
Djaton Koubadje Sourou	Kodjogbe Nicaise
Tohouegnon J. Thomas	Mensah Victorine

Expert Afristat

Adechian Djabar Dine C.

Participants Partenaire, technique et financières

Onambele Agueh Bertille, USAID
Kouton Narcisse, UNICEF
Attemba Roger, SNU

SIGLES, ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES

ABPF	Agence Béninoise pour la Promotion de la Famille
ANGC	Agence Nationale de la Gratuité de la Césarienne
ANV-SSP	Agence Nationale de Vaccination et des Soins de Santé Primaires
ANJE	Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant
ASC	Agent de Santé Communautaire
AVC	Accidents Vasculaires Cérébraux
BCG	Bacille de Calmette et Guérin
CAN	Conseil de l'Alimentation et de la Nutrition
CAPI	Computer Assisted Personal Interviewing
CCC	Cadre Communal de Concertation
CCR	Cadre Commun de Résultats
CCSC	Communication pour le Changement Social et de Comportement
CDC	Cadre Départemental de Concertation
CDE	Convention Relative aux Droits de l'Enfant
CNERS	Comité National d'Éthique pour la Recherche en Santé
CNHU-HKM	Laboratoire de Parasitologie du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga
CNLS	Conseil National de Lutte contre le Sida
CNLSTP	Conseil National de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme
CNPERS	Comité National Provisoire d'Éthique pour la Recherche en Santé
CNS	Conseil National de la Statistique
CPN	Consultation Périnatale
CSAN	Comité de Surveillance Alimentaire et Nutritionnelle
CSPro	Census and Survey Processing System
CTA	Combinaison Thérapeutique à base d'Artémisinine
DED	Direction des Études Démographiques
DHS	Demographic and Health Survey
DIU	Dispositif Intra-Utérin
DNSP	Direction Nationale de la Santé Publique
DPFG	Direction de la Promotion de la Femme et du Genre
DSME	Direction de la Santé, de la Mère et de l'Enfant
DTC	Diphthérie, Tétanos, Coqueluche
EDS	Enquête Démographique et de Santé
EDSB-V	Cinquième Enquête Démographique et de Santé au Bénin
ET	Ecart-type
g/dl	Gramme par décilitre
GPS	Global Position System
GPL	Gaz Propane Liquéfié
HepB	Hépatite B
Hib	Haemophilus Influenzae type B
HTA	Hypertension Artérielle
IC	Intervalle de Confiance
IMC	Indice de Masse Corporelle
INSAE	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique

IPG	Indice de Parité entre les Genres
IRA	Infection Respiratoire Aiguë
ISF	Indice Synthétique de Fécondité
ISFD	Indice Synthétique de Fécondité Désirée
IST	Infections Sexuellement Transmissibles
MAMA	Méthode de l'Aménorrhée et de l'Allaitement Maternel
MICS	Multiple Indicator Cluster Survey
MI	Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide
MIILDA	Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide à Longue Durée d'Action
MJF	Méthode des jours fixes
MNT	Maladies Non Transmissibles
MPD	Ministère du Plan et du Développement
ODD	Objectifs de Développement Durable
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
ONG	Organisation Non Gouvernementale
NN	Néonatal
PAD	Pression Artérielle Diastolique
PAG	Programme d'Actions du Gouvernement
PANAN	Plan d'Action National pour l'Alimentation et la Nutrition
PANBPF	Plan d'Action National Budgétisé pour la Planification Familiale
PANJE	Pratiques Alimentaires du Nourrisson et du Jeune Enfant
PAS	Pression Artérielle Systolique
PCIME	Prise en Charge Intégrée des Maladies des Enfants
PF	Planification Familiale
PID	Pulvérisation Intradomiciliaire d'insecticide résiduel
PMASN	Projet Multisectoriel de l'Alimentation, de la Santé et de la Nutrition
PNDS	Plan National de Développement Sanitaire
PNLMNT	Programme National de Lutte contre les Maladies Non Transmissibles
PNLP	Programme National de Lutte contre le Paludisme
PNLS	Programme National de Lutte contre le SIDA
PNN	Postnéonatale
PPG	Paludisme Pendant la Grossesse
PSDAN	Plan Stratégique de Développement de l'Alimentation et de la Nutrition
PTME	Prévention de la Transmission Mère-Enfant
RDV	Risque de mortalité maternelle sur la Durée de Vie
RGPH	Recensement Général de la Population et de l'Habitation
RMG	Rapport de Mortalité lié à la Grossesse
RMM	Rapport de Mortalité Maternelle
SIDA	Syndrome Immuno Déficience Acquise
SMR	Solution Maison Recommandée
SNDS	Stratégie Nationale de Développement de la Statistique
SONU	Soins Obstétricaux et Néonataux d'Urgences
SP	Sulfadoxine-Pyriméthamine
SP-CAN	Secrétariat Permanent du Conseil de l'Alimentation et de la Nutrition
SPC	Suivi et Promotion de la Croissance
SRO	Sels de Réhydratation Orale
TAR	Thérapies Antirétrovirales
TBF	Taux Brut de Fréquentation scolaire
TBN	Taux Brut de Natalité
TDR	Test de Diagnostic Rapide


TGFG	Taux Global de Fécondité Générale
TME	Transmission de la Mère à l'Enfant
TNF	Taux Net de Fréquentation scolaire
TPIg	Traitement Préventif Intermittent pendant la grossesse
TRO	Thérapie de Réhydratation Orale
USAID	Agence des États-Unis pour le Développement International
UNFPA	Fonds des Nations Unies pour la Population
UNICEF	Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
UPS	Unités Primaires de Sondage
VIH	Virus de l'Immunodéficience Humaine
ZD	Zone de Dénombrement

LIRE ET COMPRENDRE LES TABLEAUX DE LA CINQUIÈME ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ AU BÉNIN (EDSB-V) 2017-2018

Le nouveau format du rapport final de la Cinquième Enquête Démographique et de Santé au Bénin (EDSB-V) 2017-2018 est basé sur environ 200 tableaux de données. Pour une consultation facile, les tableaux se trouvent à la fin de chaque chapitre et les utilisateurs peuvent aussi y accéder à travers les liens dans le texte dans la version électronique. De plus, ce format plus convivial présente à peu près 90 graphiques qui soulignent clairement des tendances au cours du temps et les tendances départementales et des caractéristiques sociodémographiques. De grandes cartes colorées présentent les données par département au Bénin. Le texte a été simplifié pour mettre en évidence les points clés avec des puces et permettre d'identifier clairement les détails des indicateurs avec des boîtes de définition.

Bien que le texte et les graphiques présentés dans chaque chapitre mettent en évidence certains des résultats les plus importants des tableaux, chaque résultat ne peut pas être discuté ou présenté graphiquement. Pour cette raison, les utilisateurs des données de l'EDSB-V 2017-2018 doivent être à l'aise en lisant et interprétant les tableaux.

Les pages suivantes fournissent une introduction à l'organisation des tableaux de l'EDSB-V 2017-2018, la présentation des caractéristiques sociodémographiques, ainsi qu'un résumé bref de l'échantillonnage pour faciliter la compréhension des dénominateurs. En outre, cette section fournit des exercices afin que les utilisateurs pratiquent leurs nouvelles compétences en interprétation des tableaux de l'EDSB-V 2017-2018.



Exemple 1 : Exposition aux médias : Femme

Une question posée à toutes les enquêtées

Tableau 3.4.1 Exposition aux médias : Femme 1						
Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui sont exposées à certains médias, au moins, une fois par semaine, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018						
Caractéristique sociodémographique 3	Lit un journal, au moins, une fois par semaine	Regarde la télévision, au moins, une fois par semaine	Écoute la radio, au moins, une fois par semaine	Les trois médias, au moins, une fois par semaine	Aucun média, au moins, une fois par semaine	Effectif de femmes 2
Groupe d'âges						
15-19	6,5	22,0	31,0	2,5	59,4	3 350
20-24	4,7	22,6	35,6	2,2	55,2	2 923
25-29	3,3	22,1	37,5	2,1	54,8	2 986
30-34	3,5	21,9	36,8	2,6	56,5	2 202
35-39	2,7	19,1	36,9	2,1	57,7	1 882
40-44	2,1	17,8	38,0	1,6	56,8	1 320
45-49	2,2	14,4	38,0	1,6	58,4	1 265
Résidence						
Cotonou	9,1	60,7	59,2	7,1	21,6	958
Autres villes	6,4	29,8	38,5	3,7	50,4	5 803
Ensemble urbain	6,8	34,2	41,4	4,2	46,3	6 761
Rural	1,9	11,0	31,5	0,7	64,7	9 167
Département						
Alibori	1,5	12,4	26,2	0,7	69,5	1 878
Atacora	0,7	9,1	25,0	0,3	72,0	1 302
Atlantique	4,1	35,2	57,9	2,8	32,3	2 037
Borgou	6,3	14,8	24,7	2,8	67,9	1 839
Collines	1,8	12,4	27,7	0,8	67,9	1 151
Couffo	1,8	14,2	40,2	0,6	56,5	1 041
Donga	1,4	10,9	27,6	0,5	66,8	881
Littoral	9,1	60,7	59,2	7,1	21,6	958
Mono	6,6	20,0	42,5	3,9	53,5	759
Ouémé	7,9	26,6	38,6	4,8	50,9	1 507
Plateau	4,8	16,8	35,3	1,5	57,2	970
Zou	2,8	18,2	27,5	1,0	63,3	1 606
Niveau d'instruction						
Aucun	0,1	10,2	29,1	0,0	67,3	8 785
Primaire	2,4	23,7	39,2	1,2	52,6	3 148
Secondaire 1 ^{er} cycle	10,1	33,3	42,7	4,5	43,8	2 847
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	23,4	63,0	59,4	15,9	20,9	1 147
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	0,5	2,6	21,1	0,0	78,0	2 735
Second	1,1	4,0	25,7	0,1	72,7	3 030
Moyen	1,9	7,2	31,6	0,5	65,4	3 104
Quatrième	3,6	20,6	38,7	1,0	53,2	3 405
Le plus élevé	11,2	60,2	55,6	8,1	24,0	3 654
Ensemble	4,0	20,8	35,7	2,2	56,9	15 928

Étape 1 : Lisez le titre et le sous-titre—surlignés en orange dans l'Exemple 1. Ils vous présentent le sujet et la population de référence que le tableau décrit. Dans ce cas, le tableau porte sur les femmes de 15-49 ans et leur exposition aux médias. Ces questions ont été posées à toutes les femmes de 15-49 ans dans les ménages sélectionnés.

Étape 2 : Examinez les en-têtes des colonnes—surlignées en vert. Ils décrivent la façon dont l'information est présentée. Dans ce tableau, les trois premières colonnes de données présentent les différents types de médias auxquels les femmes peuvent être exposées hebdomadairement. La quatrième colonne présente les femmes qui accèdent aux trois médias au moins une fois par semaine et la cinquième colonne montre les femmes qui n'accèdent à aucun média hebdomadairement. La dernière colonne énumère le nombre de femmes enquêtées.

Étape 3 : Examinez les titres des lignes—la première colonne surlignée en bleu. Les lignes montrent les différentes catégories au sein desquelles les données sont réparties. Dans ce cas, le tableau présente l'exposition aux médias par âge, par milieu de résidence, par département, par niveau d'instruction et par

quintile de bien-être économique. La plupart des tableaux du rapport de l'EDSB-V 2017-2018 sont divisés selon ces mêmes catégories.

Étape 4 : Regardez la dernière ligne du tableau **surlignée en rose**. Ces pourcentages représentent les pourcentages totaux de toutes les femmes qui sont exposées à chaque type de média au moins une fois par semaine. Dans cet exemple, 4,0 %* de femmes de 15-49 ans lisent un journal au moins une fois par semaine, 20,8 % regardent la télévision au moins une fois par semaine et 35,7 % écoutent la radio au moins une fois par semaine.

Étape 5 : Pour identifier le pourcentage de femmes ayant un niveau d'instruction supérieur qui sont exposées aux trois médias au moins une fois par semaine, tracez deux lignes, comme celles qui se trouvent dans le tableau. Cela montre que 15,9 % de femmes de 15-49 ans ayant un niveau d'instruction secondaire 2^d cycle ou plus sont exposées aux trois médias au moins une fois par semaine.

En regardant les variations par caractéristique, on peut voir comment l'exposition aux médias varie au Bénin. Les médias sont souvent utilisés pour communiquer des messages sur la santé. Les gérants des programmes et les décideurs politiques peuvent mieux toucher leurs populations cibles s'ils connaissent comment l'exposition aux médias varie parmi les différents groupes.

*Dans ce document, les données sont présentées exactement comme elles apparaissent dans le tableau y compris le nombre de décimales. Cependant, dans le texte (dans le reste de ce rapport), les chiffres seront arrondis au point de pourcentage entier le plus proche.

Pratique : Utilisez le tableau dans l'Exemple 1 pour répondre aux questions suivantes :

- Quel pourcentage de femmes de 15-49 ans n'accèdent à aucun média au moins une fois par semaine ?
- Dans quel groupe d'âge la proportion de femmes exposées au journal est-elle la plus élevée ?
- Comparez les femmes de Cotonou à celles du milieu rural—dans quel groupe l'exposition à la télévision est-elle la plus élevée ?
- Quels sont les pourcentages minimum et maximum (la gamme) de femmes qui accèdent aux trois médias hebdomadairement par département ?
- Est-ce qu'il y a une association claire entre l'exposition hebdomadaire à la radio et le niveau d'instruction ?
- Est-ce qu'il y a une association claire entre l'exposition hebdomadaire à la télévision et le quintile de bien-être économique ?

Réponses :

a) 56,9 %

b) Femmes de 15-19 ans : 6,5 % de femmes dans ce groupe d'âge lisent un journal hebdomadairement.

c) Femmes de Cotonou, 60,7 % regardent la télévision au moins une fois par semaine contre 11,0 % en milieu rural.

d) Le pourcentage de femmes qui accèdent aux trois médias varie d'un minimum de 0,3 % dans l'Atacora à un maximum de 7,1 % dans le Littoral.

e) L'exposition hebdomadaire à la radio augmente avec le niveau d'instruction : 29,1 % de femmes sans instruction écoutent la radio au moins une fois par semaine, comparé à 59,4 % de femmes ayant un niveau d'instruction secondaire 2^{ème} cycle ou plus.

f) L'exposition hebdomadaire à la télévision augmente avec le quintile de bien-être économique : 2,6 % de femmes du quintile le plus bas regardent la télévision au moins une fois par semaine, comparé à 60,2 % de femmes du quintile le plus élevé.

Exemple 2 : Prévalence et traitement des symptômes d'IRA

Une question posée à un sous-groupe d'enquêtés

Tableau 9.5 Prévalence et traitement des symptômes d'IRA					
Caractéristique sociodémographique	Parmi les enfants de moins de 5 ans :		Parmi les enfants de moins de 5 ans avec des symptômes d'IRA :		
	2 Pourcentage avec des symptômes d'IRA ¹	Effectif d'enfants	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés ²	3 Pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement le même jour ou le jour suivant	Effectif d'enfants
Age en mois					
<6	3,6	1 423	46,5	12,6	51
6-11	4,2	1 517	44,6	17,3	64
12-23	3,3	2 515	41,9	15,5	83
24-35	2,7	2 365	48,3	16,6	63
36-47	2,2	2 450	53,4	24,5	54
48-59	2,0	2 416	(43,7)	(8,6)	47
Sexe					
Masculin	3,0	6 415	45,8	13,8	194
Féminin	2,7	6 271	46,5	18,6	167
Consommation de tabac/cigarettes par la mère					
Fume cigarettes/tabac	7,1	208	*	*	15
Ne fume pas	2,8	12 478	46,8	16,5	346
Combustible pour cuisinier					
Électricité ou gaz	1,9	371	*	*	7
Kérosène	*	6	*	*	1
Charbon/lignite	0,0	124	*	*	0
Charbon de bois	2,4	2 926	53,8	26,5	71
Bois/paille ³	3,1	9 243	43,9	13,1	282
Excréments d'animaux	*	2	*	*	0
Autres combustibles	*	10	*	*	1
Pas de repas préparé dans le ménage	*	4	*	*	0
Résidence					
Cotonou	1,5	558	*	*	8
Autres villes	2,4	4 382	60,8	23,3	105
Ensemble urbain	2,3	4 940	59,7	24,2	113
Rural	3,2	7 746	39,8	12,3	248
Département					
Alibori	5,3	1 718	14,1	6,9	92
Atacora	1,5	1 127	*	*	17
Atlantique	3,9	1 448	(41,6)	(9,3)	57
Borgou	0,8	1 678	*	*	14
Collines	1,8	814	*	*	15
Couffo	4,5	844	(80,0)	(35,9)	38
Donga	0,3	831	*	*	2
Littoral	1,5	558	*	*	8
Mono	6,8	565	(48,7)	(13,8)	39
Ouémé	1,1	1 131	*	*	13
Plateau	5,0	766	(58,5)	(7,2)	38
Zou	2,4	1 206	(73,9)	(26,6)	30
Niveau d'instruction de la mère					
Aucun	3,1	8 301	42,0	15,7	253
Primaire	2,5	2 310	50,3	15,8	58
Secondaire 1 ^{er} cycle	2,6	1 523	(56,4)	(22,5)	39
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	1,9	552	*	*	10
Quintiles de bien-être économique					
Le plus bas	3,2	2 713	30,2	6,5	86
Second	3,8	2 554	49,2	18,8	96
Moyen	3,0	2 559	41,9	14,6	77
Quatrième	2,8	2 549	53,7	18,9	72
Le plus élevé	1,3	2 311	(73,8)	(31,0)	31
Ensemble	2,8	12 686	46,1	16,0	361

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Les symptômes d'IRA incluent une respiration courte et rapide associée à des problèmes de congestion dans la poitrine et/ou des difficultés respiratoires associées à des problèmes de congestion dans la poitrine.

² Sont inclus les conseils ou traitements fournis par le secteur public, secteur médical privé, boutique, marché et vendeurs de médicaments ambulants. Ne sont pas pris en compte ici les conseils ou traitements fournis par un praticien traditionnel.

³ Y compris l'herbe, les arbustes et les résidus agricoles.

Étape 1 : Lisez le titre et le sous-titre surlignés en orange dans l'Exemple 2. Dans ce cas, le tableau porte sur deux groupes séparés : tous les enfants de moins de 5 ans (a) et les enfants de moins de 5 ans qui ont eu des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA) au cours des 2 semaines précédant l'interview (b).

Étape 2 : Identifiez les deux groupes de colonnes surlignés en vert. Tout d'abord, identifiez les colonnes qui se réfèrent à tous les enfants de moins de 5 ans (a), puis isolez les colonnes qui se réfèrent seulement aux enfants de moins de 5 ans qui ont eu des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA) au cours des 2 semaines précédant l'interview (b).

Étape 3 : Regardez le premier groupe de colonnes. Quel pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ont eu des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines précédant l'interview ? Ce sont 2,8 %.

Regardez maintenant le groupe (b). Combien d'enfants de moins de 5 ans ont eu des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines précédant l'interview? Ce sont 361 enfants ou 2,8 % de 12 686 d'enfants de moins de 5 ans (avec chiffres arrondis). Le groupe (b) est un sous-groupe du groupe (a).

Étape 4 : Seulement 361 enfants de moins de 5 ans ont eu des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines précédant l'interview. Quand ces enfants sont répartis par des caractéristiques sociodémographiques, il y a parfois trop peu de cas pour que ces pourcentages soient fiables.

- Parmi les enfants de moins de 5 ans du Mono qui ont eu des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines précédant l'interview, des conseils ou un traitement ont été recherchés pour quel pourcentage ? 48,7 %. Le pourcentage est entre parenthèses parce qu'il est basé sur 25-49 enfants (non pondérés) dans cette catégorie. Les utilisateurs de données doivent utiliser ce chiffre avec prudence—il peut ne pas être fiable. (Pour plus d'information sur les chiffres pondérés et non pondérés, voyez le cas N° 4 de l'Exemple 2.)
- Parmi les enfants de moins de 5 ans du Littoral qui ont eu des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines précédant l'interview, des conseils ou un traitement ont été recherchés pour quel pourcentage? L'astérisque mentionné dans la cellule indique qu'il y a très peu de cas (moins de 25 enfants). Le résultat pour ce groupe n'est pas présenté. Le sous-groupe est trop petit et le résultat n'aurait pas été fiable.

Note : Quand des chiffres sont présentés entre parenthèses ou quand il y a un astérisque à la place d'un chiffre dans un tableau, l'explication doit figurer au bas du tableau. S'il n'y a aucune parenthèse ou astérisque dans le tableau, vous pouvez en déduire qu'il y a suffisamment de cas dans toutes les catégories et que les données sont statistiquement représentatives.

Exemple 3 : Comprendre les pondérations de l'échantillon dans les tableaux de l'EDSB-V 2017-2018

Un échantillon est un groupe d'individus sélectionnés pour une enquête. Dans l'EDSB-V 2017-2018, l'échantillon est conçu pour représenter la population nationale de 15-49 ans. En plus des données nationales, la plupart des pays veulent collecter et présenter des données qui portent sur des plus petites zones géographiques ou administratives. Pour cela, il est nécessaire de disposer d'une taille d'échantillon minimum par zone. L'EDSB-V 2017-2018 est représentative au niveau national, aux niveaux département et milieu de résidence (urbain et rural).

Pour produire des statistiques représentatives du pays dans son ensemble et au niveau des 12 départements, le nombre de femmes enquêtées dans chaque département doit contribuer à la taille de l'échantillon total (national) en proportion de la taille du département. Cependant, dans le cas où certains départements ont des petites populations, un échantillon alloué en proportion de la population de chaque département peut ne pas inclure suffisamment de femmes de chaque département pour pouvoir fournir des résultats valables. Pour résoudre ce problème, les départements avec des populations trop petites sont sur-échantillonnés. Prenons le cas suivant : vous disposez d'assez d'argent pour interviewer 15 928 femmes et vous voulez produire des résultats représentatifs au niveau du Bénin dans son ensemble et de ses départements (comme dans le Tableau 3.1). Cependant, la population totale du Bénin n'est pas répartie de manière égale dans les départements : certains départements, comme l'Atlantique, sont très peuplés alors que d'autres comme le Littoral ne le sont pas. Par conséquent, le Littoral doit être sur-échantillonné.

Un spécialiste en sondage détermine combien de femmes doivent être enquêtées dans chaque département pour obtenir des statistiques fiables. La colonne surlignée en bleu (1) dans le tableau, à droite, présente le nombre réel de femmes interviewées dans chaque département. Dans les départements, le nombre de femmes interviewées varie de 816 dans le Mono à 1 765 dans le Borgou. Le nombre d'interviews est suffisant pour obtenir des résultats fiables dans chaque département.

Avec cette répartition d'interviews, certains départements sont sur-représentés et d'autres sont sous-représentés. Par exemple, la population de l'Atlantique représente environ 13 % de la population du Bénin, alors que celle du Littoral ne représente que 6 % de la population du Bénin. Cependant, comme le montre la colonne en bleu, le nombre de femmes interviewées dans l'Atlantique ne représente que 11 % de l'échantillon total des femmes interviewées (1 702/15 928) et le nombre de femmes interviewées dans le Littoral représente à peu près 9 % des femmes interviewées (1 415/15 928). Cette répartition non pondérée de femmes ne représente pas exactement la population du pays.

Pour obtenir des statistiques représentatives du Bénin, la répartition des femmes dans l'échantillon doit être pondérée (ou ajustée mathématiquement) de manière à ce qu'elle soit proche de la répartition réelle dans le pays. Les femmes d'un petit département, comme le Littoral, ne contribueront que peu au niveau de l'ensemble national. Les femmes d'un grand département, comme l'Atlantique, contribueront beaucoup plus. Les statisticiens calculent donc un « poids » qui est utilisé pour ajuster le nombre de femmes de chaque département pour que le poids de chaque département par rapport au total soit proportionnel à la population actuelle du département. Les nombres dans la colonne surlignée en violet (2) représentent les valeurs « pondérées ». Les valeurs pondérées peuvent être plus petites ou plus grandes que les valeurs non pondérées au niveau du département. La taille totale de l'échantillon national de 15 928 femmes n'a pas changé après

Tableau 3.1 Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés
Répartition (en %) des femmes 15-49 ans par certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Femme		
	3 Pourcentage pondéré	2 Effectif pondéré	1 Effectif non pondéré
Département			
Alibori	11,8	1 878	1 697
Atacora	8,2	1 302	1 392
Atlantique	12,8	2 037	1 702
Borgou	11,5	1 839	1 765
Collines	7,2	1 151	1 403
Couffo	6,5	1 041	1 012
Donga	5,5	881	964
Littoral	6,0	958	1 415
Mono	4,8	759	816
Ouémé	9,5	1 507	1 260
Plateau	6,1	970	952
Zou	10,1	1 606	1 550
Ensemble 15-49	100,0	15 928	15 928

la pondération, mais la distribution des femmes à travers les départements a été modifiée pour représenter leur poids dans la taille totale de la population.

Comment les statisticiens évaluent-ils le poids de chaque catégorie? Ils tiennent compte de la probabilité qu'une femme soit sélectionnée dans l'échantillon. Si vous deviez comparer la colonne en vert (3) à la répartition réelle de la population du Bénin, vous verriez que les femmes dans chaque département contribuent à l'échantillon total avec le même poids qu'elles contribuent à la population du pays. Le nombre pondéré de femmes dans l'enquête représente maintenant exactement la proportion de femmes qui vivent réellement dans le Littoral et dans l'Atlantique.

Avec l'échantillonnage et la pondération, il est possible d'interviewer suffisamment de femmes pour fournir des statistiques fiables aux niveaux national et départemental. En général, seuls les chiffres pondérés sont présentés dans chaque tableau de l'EDSB-V 2017-2018 ; ne soyez donc pas surpris si ces chiffres paraissent faibles : ils peuvent en fait représenter un plus grand nombre de femmes interviewées.

INDICATEURS SUR LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Indicateurs sur les objectifs de développement durable, EDSB-V Bénin 2017-2018

Indicateur	Sexe			Numéro tableau DHS
	Homme	Femme	Ensemble	
2. Éliminer la faim				
2.2.1 Prévalence du retard de croissance parmi les enfants de moins de 5 ans	35,1	29,1	32,2	11.1
2.2.2 Prévalence de la malnutrition parmi les enfants de moins de 5 ans	7,4	6,2	6,8 ^a	na
a) Prévalence de l'émaciation parmi les enfants de moins de 5 ans	5,6	4,3	5,0 ^a	11.1
b) Prévalence du surpoids (obésité) parmi les enfants de moins de 5 ans	1,8	1,9	1,9 ^a	11.1
3. Bonne santé et bien-être				
3.1.1 Taux de mortalité maternelle ¹	na	na	391	15.4
3.1.2 Proportion des naissances assistées par un professionnel qualifié	na	na	78,1	8.6
3.2.1 Taux de mortalité infanto-juvénile ²	104	89	96	12.2
3.2.2 Taux de mortalité néonatale ²	36	24	30	12.2
3.7.1 Proportion de femmes en âge de procréer (âgées de 15-49 ans) dont les besoins en fins de planification familiale sont satisfaits à l'aide des méthodes modernes	na	28,8	na	7.11.2
3.7.2 Taux de natalité parmi les adolescentes par 1000 femmes				
a) Filles âgées de 10-14 ans ³	na	[2]	na	5.1
b) Femmes âgées de 15-19 ans ⁴	na	108	na	5.1
3.a.1 Taux de prévalence ajustée selon l'âge de l'utilisation actuelle de tabac parmi les personnes âgées de 15 et plus ⁵	6,9	1,4	4,1 ^a	3.10.1 et 3.10.2
3.b.1 Proportion de la population cible couverte par tous les vaccins inclus dans leur programme national ⁶				
a) Couverture du vaccin contre le DTC (3 ^{ème} dose) ⁷	53,1	49,5	51,3	9.3
b) Couverture du vaccin contre le pneumocoque (dernière dose du calendrier vaccinal) ⁸	73,5	72,5	73,0	9.3
	71,5	70,1	70,8	9.3
4. Éducation de qualité				
4.2.1 Proportion d'enfants de moins de 5 ans qui sont sur une bonne voie de développement en matière de santé, d'apprentissage et de bien-être psycho-social en fonction du sexe ⁹	55,3	57,7	56,5	18.12
5. Égalité entre les sexes				
5.2.1 Proportion de femmes ayant déjà vécu en couple et de filles âgées de 15 ans et plus, victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques commis par un partenaire intime actuel ou ancien, dans les 12 mois précédant l'enquête ^{10,11}	na	31,9	na	16.12
a) Violence physique	na	11,2	na	16.12
b) Violence sexuelle	na	6,1	na	16.12
c) Violence psychologique	na	28,7	na	16.12
5.3.1 Proportion de femmes âgées de 20-24 ans ayant été mariées ou en union avant l'âge de 15 ans et avant l'âge de 18 ans				
a) Avant l'âge de 15 ans	na	9,4	na	4.3
b) Avant l'âge de 18 ans	na	30,6	na	4.3
5.6.1 Proportion de femmes âgées de 15-49 ans qui prennent des décisions informées concernant les relations sexuelles, l'utilisation de contraceptifs et les soins de santé génésique ¹²	na	25,2	na	na
5.b.1 Proportion d'individus possédant un téléphone portable ¹³	79,5	51,1	65,3 ^a	14.7.1 et 14.7.2
	Résidence			
	Urbain	Rural		
6. Eau propre et assainissement				
6.1.1 Proportion de la population utilisant des services d'eau potable à gestion sécurisée ¹⁴	75,0	63,0	67,8	2.1
6.2.1 Proportion de la population utilisant des services de sanitation à gestion sécurisée, y compris une installation pour le lavage des mains avec eau et savon ¹⁵	22,4	6,3	12,8	2.3
7. Énergie propre et à coût abordable				
7.1.1 Proportion de la population ayant accès à l'électricité	54,2	21,2	34,5	2.4
7.1.2 Proportion de la population ayant une dépendance primaire sur les carburants et la technologie ¹⁶	8,0	1,0	3,8	2.4
	Sexe			
	Homme	Femme		
8. Travail décent et croissance économique				
8.7.1 Proportion et nombre d'enfants âgés de 5-17 impliqués dans le travail juvénile	32,6	33,2	32,9	18.7
8.10.2 Proportion d'adultes (15 ans et plus) ayant un compte dans une banque, dans une autre institution financière, ou avec un fournisseur de service mobile et de transfert d'argent ¹³	14,3	6,4	10,3 ^a	14.7.1 et 14.7.2
16. Paix, justice et institutions fortes				
16.2.1 Pourcentage d'enfants âgés de 1-17 ans ayant subi une forme quelconque de punition corporelle et/ou agression psychologique commis par leurs soignants durant le mois précédant l'enquête ¹⁷	91,1	91,2	91,2	18.3
16.9.1 Proportion d'enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été enregistrée à l'état civil	85,4	85,9	85,6	18.1
17. Partenariats pour la réalisation des objectifs				
17.8.1 Proportion d'individus utilisant l'internet ¹⁸	20,3	6,3	13,3 ^a	3.5.1 et 3.5.2

na = Non applicable. Les estimations entre crochets sont tronquées.

¹ Exprimés en termes de mortalité maternelle par 100 000 naissances vivantes durant la période de 7 ans précédant l'enquête

² Exprimés en termes de mortalité par 1000 naissances vivantes pour la période de 5 ans précédant l'enquête

³ Equivalent au taux de fécondité par âge pour les filles âgées de 10-14 ans durant la période de 3 ans précédant l'enquête, exprimés en terme de naissances par 1000 filles âgées de 10-14 ans

⁴ Equivalent au taux de fécondités par âge des femmes âgées de 15-19 ans durant la période de 3 ans précédant l'enquête, exprimés en terme de naissances par 1000 filles âgées de 15-19 ans

⁵ Les données ne sont pas standardisées pour l'âge et sont disponibles pour seulement les femmes et hommes de 15-49 ans.

⁶ Les données sont présentées pour les enfants de 12-23 mois qui ont reçu tous les vaccins appropriés à leur âge qui sont inclus dans le programme national: BCG, 3 doses de DTC-HepB-Hib, 4 doses du vaccin oral contre la polio, 3 doses du vaccin contre le pneumocoque, 1 dose de vaccin anti-rougeoleux, et une dose du vaccin contre la fièvre jaune.

⁷ Pourcentage d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu les 3 doses de vaccin contre le DTC

⁸ Pourcentage d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu les 3 doses de vaccin contre le pneumocoque

⁹ Mesurés pour enfants de 36-59 mois

¹⁰ Les données sont disponibles seulement pour les femmes âgées de 15-49 ans qui ont déjà été en union.

¹¹ Dans le DHS, la violence psychologique est nommée violence émotionnelle.

¹² Données disponibles seulement pour les femmes actuellement en union qui ne sont pas enceintes

¹³ Données disponibles seulement pour hommes et femmes âgés de 15-49 ans

¹⁴ Mesuré comme le pourcentage de la population utilisant une source d'eau améliorée: le pourcentage de la population de droit dont la source principale d'eau potable est un robinet dans le logement, robinet public ou fontaine, puits à pompe ou forage, puits protégé, source protégée, ou collecte d'eau de pluie. Les ménages utilisant le l'eau en bouteille pour la boisson sont classés comme utilisant une source améliorée ou non-améliorée dépendant de leur source d'eau pour la cuisson et le lavage des mains.

¹⁵ Mesuré comme le pourcentage de la population utilisant une installation sanitaire améliorée : pourcentage de la population de droit dont le ménage contient une chasse d'eau ou une chasse manuelle connectée à un système d'égout, un tank septique ou une fosse d'aisance ; fosse d'aisance améliorée auto-aérée ; fosse d'aisance avec dalle ; ou une toilette à compostage et ne partage pas cette installation avec d'autres ménages.

¹⁶ Mesuré comme le pourcentage de la population utilisant de l'énergie non polluante pour la cuisson

¹⁷ Données disponibles seulement pour enfants âgés de 1-14 ans

¹⁸ Les données sont disponibles pour les femmes et hommes âgés de 15-49 ans qui ont utilisé l'internet dans les 12 mois précédents.

⁹ Le total est calculé comme une moyenne arithmétique simple des pourcentages des colonnes hommes et femmes.

BÉNIN



Dans le souci de mieux opérationnaliser les indicateurs des Objectifs de Développement Durable (ODD) pour le Bénin et d'en faire un meilleur suivi, le gouvernement béninois a réalisé en 2017-2018 la cinquième édition de l'Enquête Démographique et de Santé (EDSB-V). Cette enquête, qui s'inscrit dans le dispositif permanent d'enquêtes auprès des ménages, répond à la mise en œuvre du programme d'actions de la Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS 2014-2016) défini notamment dans l'objectif 3.2¹ de l'axe stratégique. Elle va aussi permettre de disposer des indicateurs pour l'évaluation des progrès accomplis à mi-parcours de l'exécution du Programme d'Action du Gouvernement (PAG 2016-2021). L'organisation de l'EDSB-V est assurée par l'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique (INSAE) en étroite collaboration avec le Ministère de la Santé et l'assistance technique d'ICF par le biais du programme international DHS (The Demographic and Health Survey).

L'EDSB-V 2017-2018 a été financée par le gouvernement de la République du Bénin appuyé par l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) pour l'organisation, la réalisation et l'analyse des résultats. D'autres agences et organisations ont aussi contribué à la réussite de l'enquête par leur appui financier ou technique telles que la Banque Mondiale par le biais du Projet Multisectoriel de l'Alimentation, de la Santé et de la Nutrition assurée par le Secrétariat Permanent du Conseil de l'Alimentation et de la Nutrition (PMASN/SP-CAN), le Fonds Mondial, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), le Laboratoire de Parasitologie Mycologie du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) pour la prise en charge du traitement des échantillons de sang et le dépistage du paludisme.

L'EDSB-V s'est déroulée du 6 novembre 2017 au 28 février 2018, soit un peu plus de 3 mois de collecte de données.

1.1 OBJECTIFS DE L'ENQUÊTE

L'objectif principal de l'EDSB-V 2017-2018 est de produire des indicateurs démographiques et de santé à partir d'un échantillon national représentatif de femmes de 15-49 ans et d'hommes de 15-64 ans. En particulier au cours de l'EDSB-V, des données ont été collectées sur plusieurs indicateurs spécifiques au Bénin tels que :

- le taux de fécondité et l'Indice Synthétique de Fécondité ;
- les taux de mortalité infantile et infanto-juvénile ;
- la fécondité et la mortalité infanto-juvénile ;
- l'utilisation des méthodes contraceptives par les femmes ;
- la santé maternelle, en particulier les soins prénatals et postnatals et les conditions d'accouchement ;
- la santé de l'enfant : vaccination, prévalence et traitement de la diarrhée, de la fièvre et des infections respiratoires chez les enfants de moins de cinq ans ;
- les pratiques nutritionnelles des enfants, y compris l'allaitement ;

¹ Objectif stratégique : Assurer la production régulière de statistiques de qualité répondant aux engagements internationaux et nationaux pris (OMD, SCRP, MAEP, EPT, CIPD, etc.).

- l'état nutritionnel des femmes et des enfants en mesurant leur poids et taille ;
- la prévalence de l'anémie chez les femmes et les enfants par le biais d'un test d'hémoglobine ;
- la teneur en iode du sel utilisé pour la cuisine dans les ménages ;
- la prévention et le traitement du paludisme, en particulier la possession et l'utilisation de moustiquaires ;
- la prévalence du paludisme chez les enfants de 6-59 mois par le biais d'un test rapide et de goutte épaisse au laboratoire ;
- la prévalence de l'hypertension chez les femmes de 30-49 ans et les hommes de 30-64 ans en mesurant leur pression artérielle ;
- la connaissance et les attitudes des femmes et des hommes au sujet des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et du sida ;
- les maladies non transmissibles chez les adultes ;
- la protection des enfants (travail, discipline, et développement) ;
- la violence basée sur le genre, y compris violence conjugale.

Plus précisément, les indicateurs de l'EDSB-V permettront aux responsables politiques, décideurs et gestionnaires de programme de faire une planification stratégique adéquate pour l'amélioration de l'état de la santé de la population.


1.2 CONCEPTION DE L'ÉCHANTILLON

L'échantillon de l'EDSB-V est représentatif au niveau national et des 12 départements, pour la ville de Cotonou et les autres villes et pour le milieu urbain et le milieu rural. Le territoire national a été découpé en 12 domaines d'études correspondant aux 12 départements administratifs et, dans chaque domaine d'études (sauf le département du Littoral qui n'a pas de milieu rural), 2 strates ont été créées : la strate du milieu urbain et celle du milieu rural.

Le tirage de l'échantillon de l'EDSB-V a été fait, strate par strate, à travers un sondage aréolaire stratifié et à 2 degrés. Au premier degré, 555 Unités Primaires de Sondage (UPS) ou grappes ont été tirées à partir de la liste des zones de dénombrement (ZD) établies au cours du quatrième Recensement Général de la Population et de l'Habitation effectué au Bénin en 2013 (RGPH4 2013), en procédant à un tirage systématique avec probabilité proportionnelle à la taille de l'UPS (la taille de l'UPS est le nombre de ménages). Ensuite, un dénombrement des ménages dans chacune de ces grappes a permis d'obtenir une liste des ménages à partir de laquelle a été tiré, au second degré, un échantillon de 26 ménages par grappe aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, avec un tirage systématique à probabilité égale.

Un total de 14 435 ménages (6 528 en milieu urbain dans 251 grappes et 7 907 en milieu rural dans 304 grappes) ont été sélectionnés. Toutes les femmes âgées de 15-49 ans vivant habituellement dans les ménages sélectionnés et présentes la nuit précédant l'enquête, étaient éligibles pour être interviewées (Graphique 1.1).

Graphique 1.1 Organisation de l'EDSB-V Bénin



Dans tous les ménages, les enfants de moins de 5 ans ont été pesés et mesurés de façon à déterminer leur état nutritionnel (émaciation, insuffisance pondérale et retard de croissance). Dans un sous-échantillon d'un ménage sur deux, l'ensemble des enfants de 6-59 mois étaient éligibles pour les tests d'anémie et du paludisme (TDR, goutte épaisse), ainsi que toutes les femmes de 15-49 ans, pour la prise des mesures anthropométriques et le test d'anémie. En outre, dans ce sous-échantillon, les questions sur les violences basées sur le genre ont également été administrées.

De plus, dans le second sous-échantillon d'un ménage sur deux, tous les hommes de 15-64 ans étaient éligibles pour être enquêtés. Dans ce sous-échantillon, toutes les femmes de 30-49 ans et tous les hommes de 30-64 ans étaient éligibles pour la mesure de la pression artérielle.

1.3 QUESTIONNAIRES

Quatre questionnaires ont été utilisés pour la collecte des données de l'EDSB-V 2017-2018 : le questionnaire ménage, le questionnaire femme, le questionnaire homme et le questionnaire biomarqueur.

1.3.1 Questionnaire ménage

Le questionnaire ménage a permis de dresser la liste de tous les membres des ménages et de collecter des informations sur leurs caractéristiques sociodémographiques de base et des logements. Les données collectées au niveau du ménage permettent de mesurer la distribution de la population par âge et par sexe, la taille et la composition des ménages, la proportion de femmes chef de ménage, la proportion d'enfants orphelins, la proportion d'enfants dont la naissance a été enregistrée à l'état civil, la distribution de la population par niveau d'instruction, le taux de scolarisation par niveau d'études, la proportion de ménages possédant des moustiquaires et par type de moustiquaire, l'utilisation des moustiquaires par les enfants et les femmes. En outre, l'établissement de cette liste des membres des ménages permet l'identification des personnes éligibles pour l'enquête individuelle à savoir : les femmes de 15-49 ans et les hommes de 15-64 ans.

Par ailleurs, le questionnaire ménage a permis aussi de collecter des données sur les caractéristiques des logements à savoir : le type d'approvisionnement en eau, le type de toilettes, les matériaux de construction du logement, le type de combustible, la disponibilité en électricité, la possession de biens durables et de moyens de transport. Ces informations permettent en outre de classer la population en quintiles de bien-être économique, selon la méthodologie développée par ICF. Ces quintiles sont ensuite utilisés comme variables explicatives dans l'analyse de tous les indicateurs démographiques et de santé.

1.3.2 Questionnaire femme

Le questionnaire individuel femme constitue le questionnaire central des enquêtes EDS. Il comprend 15 sections qui permettent d'estimer des indicateurs socio-économiques et démographiques à savoir : le niveau d'instruction, les indicateurs de fécondité, les déterminants de la fécondité, la Planification Familiale, les indicateurs de mortalité des enfants, la santé de la mère, la santé de l'enfant, l'allaitement et la nutrition, le paludisme, le VIH/sida et les IST, autres problèmes de santé, le statut de la femme, ainsi que, le ménage et l'activité sexuelle.

1.3.3 Questionnaire homme

Le questionnaire individuel homme comprend 8 sections qui permettent de collecter les informations sur les caractéristiques socio-économiques et démographiques des hommes pour l'estimation de certains indicateurs sur la fécondité et les préférences en matière de fécondité (en particulier le nombre idéal d'enfants, les préférences sur le sexe des enfants) et des mêmes indicateurs que pour les femmes en matière de VIH/sida et des IST, des autres problèmes de santé, des maladies non transmissibles, l'emploi et autres.

1.3.4 Questionnaire biomarqueur

Le questionnaire biomarqueur a servi à enregistrer les résultats des mesures anthropométriques (poids et taille), des tests d'anémie et du paludisme. La réalisation des tests ou des mesures anthropométriques est soumise à l'accord des enquêtés qui remplissent des formulaires de consentement éclairé permettant aux agents enquêteurs et enquêtrices d'expliquer les objectifs de ces tests.

Par ailleurs, des modules additionnels ont été ajoutés aux questionnaires de base du programme DHS de façon à répondre à des besoins spécifiques. Il s'agit des modules portant sur le travail des enfants et la discipline, ainsi que le développement des enfants, basés sur les informations collectées à l'aide du questionnaire ménage. En outre, les modules comme les maladies non transmissibles, la mortalité adulte, la violence basée sur le genre, y compris violence conjugale ainsi que, le développement des jeunes enfants,

conçus à partir des informations collectées au cours de l'enquête individuelle, ont été ajoutés au questionnaire femme. Enfin, un module concernant les maladies non transmissibles a été ajouté au questionnaire homme.

Tous ces questionnaires ont été adaptés à partir des questionnaires modèles de DHS Program pour tenir compte des problèmes démographiques et de santé spécifiques au Bénin.

Enfin, des informations ont été collectées sur les agents de terrain au moyen d'un questionnaire d'agent de terrain auto-administré. Ce dernier a permis de connaître les caractéristiques de base des personnes en charge de la collecte des données sur le terrain à savoir : les chefs d'équipes, les éditeurs, les enquêtrices/enquêteurs et les techniciens de santé.

Par ailleurs, le lancement de la collecte des données a été subordonné d'une part, à une autorisation du Conseil National de la Statistique (CNS) pour l'obtention du visa statistique d'opportunité et de conformité et d'autre part, à celle du Comité National d'Éthique pour la Recherche en Santé pour l'obtention de l'avis scientifique et éthique exécutoire de l'enquête. Ces deux instances nationales ont étudié et validé les documents méthodologiques, financiers et les outils de collectes. Le protocole d'enquête, y compris la collecte de biomarqueur, a été aussi examiné et approuvé par le comité d'éthique d'ICF.

1.4 ANTHROPOMÉTRIE, TEST D'ANÉMIE, TEST DU PALUDISME ET MESURE DE LA TENSION ARTÉRIELLE

1.4.1 Mesures anthropométriques

Dans tous les ménages, tous les enfants de moins de 5 ans ont été pesés et mesurés de façon à déterminer leur état nutritionnel (émaciation, insuffisance pondérale et retard de croissance). Dans un sous-échantillon d'un ménage sur deux, toutes les femmes de 15-49 ans ont également été pesées et mesurées de façon à déterminer leur état nutritionnel à l'aide de l'Indice de Masse Corporelle (IMC).

1.4.2 Test d'anémie

Dans un sous-échantillon d'un ménage sur deux, toutes les femmes de 15-49 ans et tous les enfants de 6-59 mois ont subi un test pour déterminer le niveau d'hémoglobine dans le sang afin d'évaluer la prévalence et le niveau d'anémie.

1.4.3 Test du paludisme

Dans un sous-échantillon d'un ménage sur deux, l'ensemble des enfants de 6-59 mois étaient éligibles pour les tests du paludisme (TDR, goutte épaisse).

1.4.4 Mesure de la tension artérielle

Dans un sous-échantillon d'un ménage sur deux, les enquêteurs ont mesuré la pression artérielle de toutes les femmes de 30-49 ans et de tous les hommes de 30-64 ans. Trois mesures ont été prises au cours de l'interview (au début, au milieu et à la fin) et une valeur moyenne a été calculée.

1.5 PRÉTEST

Les travaux (formation des agents et collecte de données) du pré-test de l'EDSB-V se sont déroulés du 3 au 25 juillet 2017. Cette étape du processus de réalisation de l'enquête s'inscrit dans le dispositif de finalisation des outils de collectes, manuels et validation du dispositif de collecte, en vue de la réalisation de l'enquête principale. Cette phase a nécessité la collaboration de 25 agents enquêteurs occasionnels dont 4 techniciens de santé, répartis dans 4 grappes (2 en milieu urbain et 2 en milieu rural) ne faisant pas partie de l'échantillon national. Les 4 grappes ont été choisies dans les communes d'Abomey-Calavi et de Cotonou.

Aux termes des travaux de collecte qui ont duré du 21 au 25 juillet 2018, 104 ménages sur 112 attendus ont été enquêtés avec succès. Ces ménages ont permis d'identifier :

- 152 femmes éligibles dont : 117 interviewées avec succès ;
- 65 hommes éligibles dont : 47 interviewés avec succès ;
- 89 enfants éligibles pour les biomarqueurs : dont 85 ont été pesés et mesurés avec succès.

1.6 FORMATION DU PERSONNEL DE COLLECTE

La formation du personnel de collecte dans le cadre de la phase principale de l'EDSB-V s'est déroulée du 6 octobre au 5 novembre 2017 dans la commune d'Abomey-Calavi. Elle a concerné 144 candidats enquêteurs, enquêtrices et chef d'équipes, 27 agents de santé et 7 éditeurs de terrain. Globalement, la formation des agents a regroupé plusieurs sessions qui portaient sur les techniques d'interview, le remplissage des questionnaires, le Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), les techniques de prise des mesures anthropométriques et les tests d'anémie et de paludisme.

L'objectif est la maîtrise des différents protocoles et outils de collecte. Ainsi, l'approche utilisée a consisté en i) une lecture concomitante des manuels d'instructions et des questionnaires, ii) des jeux de rôle en salle entre personnel en formation, iii) des pratiques sur le terrain dans des ménages réels et dans des formations sanitaires et iv) l'organisation régulière des évaluations des connaissances acquises. Les différentes phases de la formation étaient accompagnées de discussions en salle.

Au terme de la formation des agents, 88 enquêteurs et enquêtrices, 22 agents biomarqueurs, 22 chefs d'équipe et 7 éditeurs de terrain ont été retenus et déployés sur toute l'étendue du territoire national pour la collecte des données.

1.7 COLLECTE DES DONNÉES

Les travaux de terrain de l'enquête principale ont été réalisés du 6 novembre 2017 au 28 février 2018, par 132 agents répartis en 22 équipes de travail à raison de 6 personnes dont un chef d'équipe, trois enquêtrices, un enquêteur et un agent de santé.

Les 22 équipes ont été placées sous la responsabilité de 7 éditeurs de terrain, 6 superviseurs de terrain dont un provenant du laboratoire du CNHU-HKM en charge des tests du paludisme et le reste de l'INSAE.

1.8 TRAITEMENT DES DONNÉES

Le traitement des données de l'EDSB-V a été facilité en raison de l'utilisation des tablettes comme outils de collecte par la saisie automatique des données au moyen du logiciel CSPro intégré aux tablettes. Pendant toute la durée de la collecte, un dispositif de contrôle de qualité des données, à travers le suivi de certains indicateurs clés (taux de couverture, âge des enquêtés, âges au décès des enfants, etc.), a été mis en place en association avec l'équipe d'édition composée de 7 éditeurs, qui constituent le premier niveau de contrôle. Les erreurs détectées à l'occasion de ces contrôles étaient systématiquement partagées avec les équipes de terrain à l'occasion des missions de supervision technique et par contact téléphonique permanent. La vérification de la cohérence interne des données saisies et l'apurement final de l'ensemble des données ont été réalisés entre avril et mai 2018.

Parallèlement, les travaux d'analyse des prélèvements de sang, en ce qui concerne le test du paludisme et de l'anémie, ont été réalisés par le Laboratoire de parasitologie-mycologie du Centre National Hospitalier Universitaire de Cotonou (CNHU-HKM). Le traitement des échantillons des gouttes épaisses de sang s'est fait au fur et à mesure de la collecte des données sur le terrain.

1.9 TAUX DE RÉPONSE

Au cours de l'EDSB-V, 14 435 ménages ont été sélectionnés dont 14 293 identifiés au moment de l'enquête. Parmi ces 14 293 ménages, 14 156 ont pu être enquêtés avec succès, soit un taux de réponse de 99 % (Tableau 1.1). Les taux de réponses des ménages, en milieu urbain ne sont pas très différents de ceux du milieu rural.

En outre, pour les 14 156 ménages visités, 16 233 femmes de 15-49 ans étaient éligibles pour l'interview individuelle et a été menée avec succès pour 15 928 d'entre elles. Globalement, le taux de réponse des femmes éligibles est de 98 %. Ce taux ne varie pas entre les milieux de résidence (98 % pour chacun).

L'enquête homme a été réalisée dans un ménage sur deux soit 7 782 hommes de 15-64 ans éligibles et identifiés pour 7 595 d'entre eux, l'interview a été menée avec succès. Le taux de réponse s'établit également à 98 % et varie très peu entre les milieux de résidence.

Tableau 1.1 Résultats des interviews ménage et individuelle

Effectif de ménages, nombre d'interviews et taux de réponse par milieu de résidence (non pondéré), EDSB-V Bénin 2017-2018

Résultat	Résidence		
	Urbain	Rural	Ensemble
Interviews Ménages			
Ménages sélectionnés	6 528	7 907	14 435
Ménages occupés	6 447	7 846	14 293
Ménages interviewés	6 364	7 792	14 156
Taux de réponse des ménages ¹	98,7	99,3	99,0
Interviews des femmes de 15-49 ans			
Effectif de femmes éligibles	7 208	9 025	16 233
Effectif de femmes éligibles interviewées	7 045	8 883	15 928
Taux de réponse des femmes éligibles ²	97,7	98,4	98,1
Interviews des hommes de 15-64 ans			
Effectif d'hommes éligibles	3 491	4 291	7 782
Effectif d'hommes éligibles interviewés	3 383	4 212	7 595
Taux de réponse des hommes éligibles ²	96,9	98,2	97,6

¹ Ménages enquêtés/ménages occupés

² Enquêtés interviewés/enquêtés éligibles

Résultats clés

- Un peu plus de sept ménages sur dix (71 %) consomment de l'eau provenant d'une source améliorée. Cependant, cette proportion varie selon le milieu de résidence, 78 % pour le milieu urbain à 66 % pour le milieu rural. En outre, plus de trois ménages sur dix (37 %) disposent d'eau sur place.
- Au Bénin, un peu plus d'un ménage sur dix (13 %), utilise des installations sanitaires améliorées ; à l'opposé environ neuf ménages sur dix (87 %), utilisent des installations sanitaires non améliorées, cette proportion variant de 78 % en milieu urbain à 94 % en milieu rural. Dans plus d'un cas sur deux (54 %), les ménages ne disposent d'aucun type de toilettes : cette proportion est nettement plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain (69 % contre 34 %).
- Un peu plus de six ménages sur dix (62 %) utilisent le bois pour cuisiner, cette proportion variant de 40 % en milieu urbain à 79 % en milieu rural.
- Au cours de l'enquête, l'endroit pour se laver les mains a été observé dans 55 % des ménages. Dans la majorité des cas, il s'agit d'un endroit mobile (46 % contre 9 % quand l'endroit est fixe).
- Au Bénin, un ménage comprend en moyenne 5,2 personnes et ce nombre moyen varie de 4,8 en milieu urbain à 5,5 en milieu rural.
- Globalement un peu plus de la moitié des femmes (51 %) n'ont aucun niveau d'instruction. Chez les hommes, cette proportion est de 34 %.

Les informations collectées au cours de l'EDSB-V 2017-2018 sur les caractéristiques socio-économiques de la population des ménages sont utiles pour interpréter les indicateurs démographiques ; en outre, elles peuvent fournir une indication approximative de la représentativité de l'enquête. Ces informations permettent aussi de mieux connaître les conditions de vie dans lesquelles vivent les populations.

Ce chapitre a pour objectif de présenter les données sur la source d'approvisionnement de l'eau de boisson, l'utilisation de toilettes, l'exposition à la fumée à l'intérieur du logement, le niveau de bien-être économique, le lavage des mains, la composition de la population des ménages, le niveau d'instruction atteint et la fréquentation scolaire.

2.1 SOURCES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU DE BOISSON ET TRAITEMENT

Sources d'approvisionnement améliorées en eau de boisson

Comprennent l'eau de robinet, robinet public/borne fontaine, les puits à pompe/forage, les puits creusés protégés, les sources protégées et l'eau de pluie. Les ménages qui utilisent de l'eau en bouteille pour boire sont considérés comme utilisant une source d'eau améliorée seulement si l'eau qu'ils utilisent pour cuisiner ou se laver les mains provient aussi d'une source améliorée.

Échantillon : Ménages

Les résultats de l'EDSB-V 2017-2018 montrent qu'environ sept ménages sur dix (71 %) consomment de l'eau provenant d'une source améliorée. Cette proportion est plus élevée en milieu urbain (78 %) qu'en milieu rural (66 %). Les puits à pompe/forage (29 %) constituent la source d'approvisionnement améliorée la plus utilisée (**Graphique 2.1**). À l'opposé, les ménages dont l'eau de consommation ne provient pas d'une source améliorée représentent 28 %. Dans leur majorité, ces ménages utilisent l'eau des puits creusés non protégés (21 %) et cette proportion varie de 18 % en milieu urbain à 23 % en milieu rural (**Tableau 2.1**).

Près de quatre ménages sur dix (37 %), disposent d'eau pour boire sur place¹, cette proportion étant nettement plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural (57 % contre 22 %). Le temps de trajet pour s'approvisionner en eau de boisson est estimé à moins de 30 minutes dans 42 % des cas mais dans 20 % des cas, il excède 30 minutes (13 % en milieu urbain et 25 % en milieu rural).

Concernant le traitement de l'eau, les résultats de l'enquête révèlent que, globalement, 92 % des ménages béninois n'utilisent aucun moyen pour traiter l'eau. Ce pourcentage ne varie pratiquement pas entre milieux de résidence (92 % en milieu urbain et 93 % en milieu rural). L'ajout d'aquatab dans l'eau est le moyen de traitement de l'eau le plus utilisé (4 % en milieu urbain et 3 % en milieu rural).


Les résultats montrent aussi que 23 % des ménages ont déclaré que l'eau n'a pas été disponible pendant au moins une journée au cours des deux semaines précédant l'enquête (**Tableau 2.2**).

Tendances : Globalement, de 2001 à 2017-2018, on note une tendance à la hausse de l'utilisation d'eau de boisson provenant de source améliorée au Bénin, passant de 67 % en 2001 à 71 % en 2017-2018.

De même, dans la même période, la proportion de ménages disposant de l'eau sur place a augmenté, passant dans l'ensemble, de 26 % à 37 %. Par contre, depuis 2006, on ne note pas de changement de la proportion de ménages utilisant une méthode appropriée de traitement de l'eau, passant dans l'ensemble, de 3 % à 7 %.

Graphique 2.1 Eau utilisée par les ménages pour boire, par résidence

Répartition (en %) des ménages par provenance de l'eau de boisson



Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100 % en raison de l'arrondissement.

¹ Y compris l'eau provenant d'un robinet chez le voisin

2.2 INSTALLATIONS SANITAIRES

Installations sanitaires améliorées

Comprennent les types suivants d'installations sanitaires non partagées : chasse d'eau/chasse d'eau manuelle connectée à un système d'égout, chasse d'eau/chasse d'eau manuelle reliée à une fosse septique, chasse d'eau/chasse d'eau manuelle reliée à une fosse d'aisances, fosse d'aisances améliorée ventilée, fosse d'aisances avec dalle, toilettes à compostage.

Échantillon : Ménages


L'accès à des installations sanitaires adéquates et la promotion de pratiques hygiéniques constituent des objectifs importants pour la réalisation des Objectifs de Développement Durables (ODD).

Globalement, seulement 13 % des ménages utilisent des installations sanitaires améliorées. Cette proportion est nettement plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural (22 % contre 6 %). Dans 4 % des cas, les ménages utilisent une chasse d'eau ou une chasse d'eau manuelle reliée à une fosse septique (**Tableau 2.3** et **Graphique 2.2**).

Au Bénin, 87 % des ménages utilisent des installations sanitaires non améliorées (78 % en milieu urbain et 94 % en milieu rural). Dans un cinquième des cas (21 %), les ménages partagent les toilettes avec d'autres, 12 % utilisent des toilettes non améliorées et enfin 54 % n'ont aucun type de toilettes. En milieu rural, la proportion de ménages n'utilisant aucun type de toilettes atteint 69 %.

Graphique 2.2 Types d'installations sanitaires utilisées par les ménages, par résidence

Répartition (en %) des ménages par type d'installations sanitaires



En outre, les résultats montrent que les installations sanitaires se trouvent surtout dans la cour/parcelle (29 % contre 9 % dans le logement).

Tendances : De 2001 à 2017-2018, on constate que la proportion des ménages utilisant les installations sanitaires améliorées, non partagées, est en nette progression (3 % en 2001, 6 % en 2006 puis 13 % en 2017-2018).

2.3 EXPOSITION À LA FUMÉE À L'INTÉRIEUR DU LOGEMENT

Au Bénin, 9 % des ménages sont exposés tous les jours à la fumée de cigarette dans le logement. Les ménages du milieu rural sont beaucoup plus exposés à la fumée que ceux du milieu urbain (11 % contre 6 %) (**Tableau 2.4**). Par ailleurs, 94 % des ménages utilisent des combustibles polluants pour la cuisine. Cette proportion varie considérablement selon le milieu de résidence. En effet, en milieu urbain la proportion des ménages utilisant un combustible polluant est de 88 % contre 98 % en milieu rural.

Autres caractéristiques du logement

Le **Tableau 2.4** présente aussi la répartition des ménages selon certaines caractéristiques du logement. Les résultats révèlent que dans l'ensemble, 36 % des ménages vivent dans un logement pourvu d'électricité. Ce pourcentage varie de manière importante selon le milieu de résidence. En effet, plus de cinq ménages sur dix (56 %) en milieu urbain disposent d'électricité contre environ deux ménages sur dix (21 %) en milieu rural.

Au Bénin, la grande majorité des ménages (63 %), habitent dans un logement dont le sol est recouvert de ciment et ce pourcentage est plus élevé en milieu urbain (72 %) qu'en milieu rural (57 %). De plus, 5 % des ménages ont un logement dont le sol est en carrelage, la proportion variant de 9 % en milieu urbain à 1 % en milieu rural. Par contre, dans 29 % des cas, les ménages vivent dans un logement dont le sol est recouvert de terre/sable et ce pourcentage varie de 16 % en milieu urbain à 39 % en milieu rural.

Biens durables du ménage

Le **Tableau 2.5** présente, par milieu de résidence, le pourcentage de ménages possédant certains équipements, des moyens de transport, de la terre agricole et du bétail/animaux de ferme. On constate que les biens électroménagers et de télécommunication sont plus fréquemment possédés par les ménages du milieu urbain que ceux du milieu rural. En milieu rural, la possession de terres agricoles (72 % en milieu rural contre 57 % pour l'ensemble national) et d'animaux de ferme (66 % en milieu rural contre 53 % pour l'ensemble) est plus répandue.

Dans l'ensemble du pays, les résultats de l'enquête montrent que 84 % des ménages possèdent un téléphone portable. En milieu urbain, ce pourcentage est de 89 % contre 80 % en milieu rural.

Tendances : De 2006 à 2017-2018, la proportion de ménages possédant un téléphone portable a augmenté (24 % à 84 %). La possession du téléphone portable est en nette progression aussi bien en milieu urbain (45 % en 2006, 85 % en 2011-2012 et 89 % en 2017-2018) qu'en milieu rural où l'accroissement est plus remarquable (9 % en 2006, 61 % en 2011-2012 et 80 % en 2017-2018).

2.4 BIEN-ÊTRE ÉCONOMIQUE DU MÉNAGE

Indice de bien-être économique


Indice de bien-être économique

On attribue aux ménages des scores basés sur le nombre et le type de biens de consommation possédés, les biens allant de la télévision à une bicyclette ou un vélo, et sur les caractéristiques du logement comme la source d'approvisionnement en eau de boisson, le type de toilettes utilisées et le matériau de revêtement du sol. Ces scores sont générés en utilisant l'analyse en composantes principales. Les quintiles de bien-être économique nationaux sont construits en attribuant le score du ménage à chaque membre habituel (de droit) du ménage, classant chaque personne dans la population des ménages en fonction de son score et en divisant la distribution en cinq catégories égales, chacune représentant 20 % de la population.

Échantillon : Ménages

Le **Tableau 2.6** présente la répartition (en %) de la population de droit par quintile de bien-être économique, selon le milieu de résidence et le département. Le **Graphique 2.3** met en évidence le contraste existant entre les milieux urbain et rural en termes de bien-être économique de la population. En effet, en milieu urbain, un peu plus de trois ménages sur cinq (64 %) se situent dans les deux derniers quintiles de bien-être économique, alors qu'en milieu rural, cette proportion est de 24 %. En milieu rural, 51 % de la population sont classés dans les deux derniers quintiles contre 24 % en milieu urbain.

Graphique 2.3 Quintiles de bien-être économique par résidence



Les résultats par département mettent en évidence un écart important entre le département du Littoral et les autres départements. Dans le littoral, 98 % de la population sont classés dans les deux derniers quintiles de bien-être économique. Par comparaison, dans l'Alibori et l'Atacora, respectivement 63 % et 66 % de la population sont classés dans les deux quintiles les plus pauvres. Cette proportion est également élevée dans le Borgou et le Couffo car elle concerne un peu plus de la moitié de la population, soit respectivement 55 % et 51 %.

2.5 LAVAGE DES MAINS

Le lavage des mains est une action hygiénique importante qui permet d'éviter la transmission de germes cutanés et qui a donc des implications sur la santé de tous les membres du ménage et, en particulier, sur celle des enfants. Au cours de l'enquête, on a demandé à voir l'endroit où les membres du ménage se lavent le plus souvent les mains. L'agent enquêteur devait aussi noter si l'eau et certains produits nettoyants étaient disponibles à cet endroit.

Les résultats du **Tableau 2.7** montrent que dans 55 % des cas, les ménages disposent d'un endroit pour se laver les mains qui a été, en outre, observé. Dans la majorité des cas, cet endroit est mobile (46 % contre 9 % pour un endroit fixe). Parmi les ménages dont l'endroit pour se laver les mains a été observé, plus de la moitié (57 %) ne disposait ni d'eau, ni de savon ou ni d'un autre produit nettoyant.

Une analyse selon le département montre que c'est dans le département du Littoral que la proportion de ménages dans lesquels l'endroit pour se laver les mains a été observé et qui ne disposaient ni d'eau, ni de savon et ni de produit nettoyant est la plus faible (34 %). À l'opposé, dans l'Atacora, la proportion est de 83 %. De plus, on note que du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, la proportion des ménages ne disposant ni d'eau et ni d'un quelconque produit nettoyant diminue, passant de 66 % à 39 %.

2.6 POPULATION DES MÉNAGES ET COMPOSITION

Ménage

Une personne ou un groupe de personnes apparentées ou non qui vivent ensemble dans le même logement, qui reconnaissent un adulte, femme ou homme, comme chef de ménage, qui partagent les mêmes arrangements ménagers et qui sont considérés comme une seule unité.

Population de fait

Toutes les personnes qui sont restées dans les ménages sélectionnés la nuit avant l'interview (qu'elles soient des résidents habituels ou des visiteurs).

Population de droit

Toutes les personnes qui sont des résidents habituels des ménages sélectionnés, qu'elles aient passé ou non, la nuit avant l'interview dans le ménage.

Comment les données sont-elles calculées

Sauf indication contraire, tous les tableaux sont calculés sur la population de fait.

Le **Tableau 2.8** présente la répartition par âge, par sexe et selon le milieu de résidence de la population de fait des ménages enquêtés. La population des ménages de l'enquête est composée de 48 % d'hommes et 52 % de femmes (Données non affichées). La structure par grands groupes d'âges de la population met en évidence la jeunesse de la population béninoise, un peu moins de la moitié de la population (48 %) étant âgée de moins de 15 ans. Les personnes de 65 ans et plus représentent environ 4 % de la population.

La pyramide des âges de la population (**Graphique 2.4**) présente une base élargie qui se rétrécit rapidement, caractéristique des populations à fécondité et à mortalité élevée.

Tendances : Par rapport aux enquêtes précédentes, on ne note aucun changement important, les moins de 15 ans représentaient 49 % de la population en 1996, 48 % en 2001 et 49 % en 2006 et en 2011-2012 et à 48 % en 2017-2018.


Taille et composition des ménages

Dans l'ensemble, les résultats du **Tableau 2.9** montrent que 75 % des ménages béninois sont dirigés par un homme et 25 % par une femme. La proportion de ménages ayant à leur tête une femme a varié un peu depuis 1996, passant de 18 % à 25 % en 2017-2018.

Si la taille moyenne des ménages est de 5,2 personnes (4,8 en milieu urbain à 5,5 en milieu rural), l'enquête indique que, 26 % des ménages comptent cependant plus de 7 personnes.

Graphique 2.4 Pyramide des âges de la population

Répartition (en %) de la population des ménages



Par ailleurs, la proportion de ménages comprenant des enfants de moins de 18 ans vivant sans leurs parents est de 24 %. Dans 29 % des cas, les ménages comptent des enfants orphelins et/ou vivant sans leurs parents. Par contre, 1 % des ménages comptent parmi leurs membres des enfants dont le père et la mère sont décédés (orphelins doubles).

2.7 INSTRUCTION

2.7.1 Niveau d'instruction atteint

Nombre médian d'années d'instruction complétées

La moitié de la population a complété moins du nombre médian d'années d'instruction et l'autre moitié a complété plus du nombre médian d'années d'instruction.

Échantillon : Population de fait des ménages âgée de 6 ans et plus.

L'instruction pour tous, l'un des Objectifs de Développement Durable (ODD), constitue un enjeu majeur du développement économique et une pierre angulaire de l'amélioration des conditions de vie des populations. L'éducation influence tous les secteurs de l'économie et la vie des individus. Au cours de l'enquête ménage, des informations relatives au niveau d'instruction atteint et à la dernière classe achevée à ce niveau ont été collectées pour toutes les personnes âgées de 6 ans et plus.

Selon les résultats de l'enquête (**Tableaux 2.10.1 et 2.10.2**), on constate que globalement 51 % des femmes contre 34 % des hommes n'ont aucun niveau d'instruction. Un peu plus de trois femmes sur dix (32 %) a un niveau primaire, complet ou incomplet. Chez les hommes, cette proportion est de 39 %. En outre, 16 % des femmes contre 22 % des hommes ont atteint un niveau secondaire complet ou incomplet. Le nombre médian d'années complétées est estimé à 0,0 chez les femmes et 1,9 chez les hommes.

Variations par caractéristiques

- Des générations les plus anciennes aux plus récentes, on remarque que le pourcentage de personnes sans niveau d'instruction a diminué de manière importante, passant, chez les femmes, de 93 % parmi celles de 65 ans et plus à 65 % pour les 30-34 ans et à 26 % à 10-14 ans. Chez les hommes, ces pourcentages sont respectivement de 74 %, 40 % et 19 %. Il est important de noter que dans les générations les plus jeunes (âgées de 6-9 ans), plus de trois enfants sur dix (34 %) parmi les filles et plus de deux enfants sur dix (29 %) parmi les garçons, sont toujours sans instruction.
- La proportion de la population sans aucun niveau d'instruction est plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain, ceci aussi bien chez les hommes que chez les femmes. En milieu urbain, 39 % des femmes et 23 % des hommes n'ont aucun niveau d'instruction contre respectivement 59 % et 41 % en milieu rural.
- Les résultats par département montrent que c'est dans l'Alibori (77 % pour les femmes et 67 % pour les hommes), le Borgou (63 % pour les femmes et 50 % pour les hommes) et l'Atacora (62 % pour les femmes et 46 % pour les hommes) que les proportions de la population sans aucun niveau d'instruction sont les plus élevées.

2.7.2 Fréquentation Scolaire

Taux net de fréquentation scolaire (TNF)

Pourcentage de la population d'âge de fréquentation scolaire qui fréquente le niveau primaire ou le niveau secondaire.

Échantillon : Enfants de 6-11 ans pour le TNF niveau primaire et enfants de 12-18 ans pour le TNF niveau secondaire

Taux brut de fréquentation scolaire (TBF)

Nombre total d'enfants fréquentant le niveau primaire divisé par la population d'âge officiel de fréquentation du niveau primaire et nombre total d'enfants fréquentant le niveau secondaire divisé par la population d'âge officiel de fréquentation du niveau secondaire.

Échantillon : Enfants de 6-11 ans pour le TBF niveau primaire et enfants de 12-18 ans pour le TBF niveau secondaire

L'EDSB-V 2017-2018 a collecté des données sur la fréquentation scolaire de toutes les personnes âgées de 5 à 24 ans dans les ménages. Si le taux brut de fréquentation scolaire au primaire est de 89 % (94 % chez les garçons et 84 % chez les filles), le taux net s'établit à 65 % (68 % chez les garçons et 62 % chez les filles). Les taux de fréquentation au secondaire sont plus faibles, 46 % pour le taux brut et 34 % pour le taux net (**Tableau 2.11**).


Variations par caractéristiques

- Le taux net de fréquentation scolaire diffère peu selon le sexe au niveau primaire (62 % chez les femmes contre 68 % chez les hommes). Par contre, au niveau secondaire, il est plus élevé chez les garçons que chez les filles (38 % contre 29 %) (**Tableau 2.11**).
- Les taux nets, quel que soit le cycle d'enseignement, sont plus élevés en milieu urbain qu'en milieu rural : 74 % des enfants de 6-11 ans fréquentent l'école au niveau primaire en milieu urbain contre 60 % en milieu rural. Pour ce qui est du niveau secondaire, ces taux sont respectivement de 43 % en milieu urbain et 27 % en milieu rural.
- Les taux de fréquentation scolaire, qu'ils soient nets ou bruts, augmentent avec le quintile de bien-être économique. En effet, au primaire, le taux net de fréquentation passe de 40 % dans le quintile le plus bas à 83 % dans le plus élevé. Au niveau du secondaire, il passe respectivement de 8 % à 56 % chez les filles et de 15 % à 66 % chez les garçons (**Graphique 2.5**).

Graphique 2.5 Fréquentation scolaire au niveau secondaire par bien-être économique du ménage

Taux net de fréquentation scolaire pour le niveau secondaire parmi les enfants de 12-18 ans

■ Fille ■ Garçon



Indice de parité entre les genres (IPG)

Ratio des filles par rapport aux garçons qui fréquentent le niveau primaire et ratio des filles par rapport aux garçons qui fréquentent l'école secondaire. L'indice traduit l'importance de l'écart entre les genres.

Échantillon : Élèves de l'école primaire et élèves de l'école secondaire

- Au niveau primaire, l'indice de parité entre les genres (IPG) est de 0,91 pour le taux net. Au niveau secondaire l'écart se creuse avec un IPG de 0,78. Ces résultats montrent donc qu'au Bénin, les filles fréquentent l'école moins que les garçons, que ce soit au niveau primaire ou au niveau secondaire.
- L'IPG varie entre les départements. Au niveau primaire, tous les départements ont un indice de parité inférieur à 1 ; seuls, les départements des Collines et du Mono s'approchent de la parité, avec un IPG de 0,99. Le département du Couffo détient l'indice de parité le plus faible (0,84). Au niveau secondaire, on observe la même situation, l'indice de parité entre les genres étant inférieur à 1 dans tous les départements ; il varie de 0,86 dans l'Atacora à 0,47 dans l'Alibori.

Tendances : L'IPG au niveau primaire pour le taux net a légèrement augmenté passant de 0,88 en 2006 à 0,91 en 2017-2018. Au niveau secondaire, cet indice est passé de 0,69 à 0,78 sur la même période. Ces résultats montrent une amélioration de la fréquentation scolaire des filles et un timide resserrement des écarts entre les genres.

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur les caractéristiques de la population des ménages et du logement, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 2.1** Eau utilisée par les ménages pour boire
- **Tableau 2.2** Disponibilité de l'eau
- **Tableau 2.3** Type d'installations sanitaires utilisées par les ménages
- **Tableau 2.4** Caractéristiques du logement
- **Tableau 2.5** Biens possédés par les ménages
- **Tableau 2.6** Quintiles de bien-être économique
- **Tableau 2.7** Lavage des mains
- **Tableau 2.8** Population des ménages par âge, sexe et milieu de résidence
- **Tableau 2.9** Composition des ménages
- **Tableau 2.10.1** Niveau d'instruction de la population des ménages : Femme
- **Tableau 2.10.2** Niveau d'instruction de la population des ménages : Homme
- **Tableau 2.11** Taux de fréquentation scolaire

Tableau 2.1 Eau utilisée par les ménages pour boire

Répartition (en %) des ménages et de la population de droit par provenance de l'eau pour boire et en fonction du temps pour s'approvisionner en eau et pourcentage utilisant une méthode appropriée pour le traitement de l'eau, selon le milieu de résidence, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique	Ménages			Population		
	Urbain	Rural	Ensemble	Urbain	Rural	Ensemble
Source d'approvisionnement en eau de boisson						
Source améliorée	77,8	66,1	71,2	75,0	63,0	67,8
Robinet dans logement/cour/parcelle	19,4	1,6	9,3	17,4	1,3	7,8
Robinet chez le voisin	24,2	7,8	14,9	21,4	6,4	12,5
Robinet public/borne fontaine	7,9	16,9	13,0	8,3	15,4	12,6
Puits à pompe/forage	21,1	34,8	28,9	22,5	34,5	29,7
Puits creusé protégé	4,7	4,2	4,4	4,9	4,5	4,7
Source protégée	0,2	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3
Eau de pluie	0,2	0,5	0,4	0,2	0,4	0,3
Eau en bouteille, source non améliorée pour la cuisine/se laver les mains ¹	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Source non améliorée	21,8	33,5	28,4	24,7	36,7	31,9
Puits creusé non protégé	17,8	23,1	20,8	20,0	26,0	23,6
Source d'eau non protégée	0,7	1,5	1,2	0,9	1,6	1,3
Camion-citerne/charrette avec petite citerne/tonneau	0,4	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5
Eau de surface	2,7	8,2	5,8	3,2	8,5	6,4
Eau en bouteille, source non améliorée pour la cuisine/se laver les mains ¹	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Autre source	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Temps de trajet pour s'approvisionner en eau de boisson (aller-retour)						
Eau sur place ²	57,3	22,0	37,2	53,0	20,5	33,6
Moins de 30 minutes	29,1	52,2	42,2	31,8	53,2	44,6
30 minutes ou plus	12,9	25,1	19,9	14,6	25,8	21,3
Ne sait pas/manquant	0,7	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Moyen de traitement de l'eau pour boire³						
Ébullition	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
Ajout d'eau de Javel/chlore	2,4	2,6	2,5	2,5	2,7	2,6
Passée à travers un linge	0,4	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5
Céramique, sable ou autre filtre	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
Aquatab	4,4	3,0	3,6	4,6	2,8	3,5
Laisser reposer et se déposer	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Autre	0,5	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7
Aucun traitement	91,7	92,6	92,2	91,4	92,8	92,2
Pourcentage utilisant une méthode appropriée de traitement ⁴	7,1	6,1	6,5	7,4	6,0	6,5
Effectif ¹	6 104	8 052	14 156	29 518	43 902	73 420

¹ Les ménages qui consomment de l'eau en bouteille sont classés comme utilisant de l'eau d'une source améliorée ou non améliorée en fonction de la provenance de l'eau utilisée pour cuisiner et pour se laver les mains.² Y compris l'eau provenant d'un robinet chez le voisin.³ Les enquêtés peuvent déclarer plusieurs méthodes de traitement de l'eau et, par conséquent, la somme des pourcentages peut dépasser 100 %.⁴ Les méthodes appropriées de traitement de l'eau comprennent l'ébullition, l'ajout de chlore, Aquatab et le filtrage.

Tableau 2.2 Disponibilité de l'eau

Parmi les ménages et la population de droit utilisant de l'eau d'un robinet ou de l'eau provenant d'un puits à pompe ou d'un forage, pourcentage ayant été confronté à un manque d'eau dans les 2 dernières semaines, selon le milieu de résidence, EDSB-V Bénin 2017-2018

Disponibilité de l'eau dans les 2 dernières semaines	Ménages			Population		
	Urbain	Rural	Ensemble	Urbain	Rural	Ensemble
Non disponible pendant au moins un jour	21,8	23,7	22,8	21,8	22,2	22,0
Disponible sans interruption pendant au moins un jour	76,4	75,8	76,1	76,8	77,3	77,1
Ne sait pas/manquant	1,8	0,5	1,1	1,4	0,5	0,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif utilisant de l'eau d'un robinet ou de l'eau d'un puits à pompe ¹	4 439	4 915	9 353	20 575	25 329	45 903

¹ Y compris les ménages déclarant que l'eau utilisée pour boire provient principalement d'un robinet ou d'un puits à pompe ou d'un forage ainsi que ceux qui déclarent que l'eau utilisée pour boire est de l'eau en bouteille tant que leur source principale d'eau utilisée pour la cuisine et pour se laver les mains provient d'un robinet ou d'un puits à pompe ou d'un forage.

Tableau 2.3 Type d'installations sanitaires utilisées par les ménages

Répartition (en %) des ménages et de la population de droit par type d'installations sanitaires et répartition (en %) des ménages et de la population de droit disposant d'installations sanitaires par endroit où se trouvent ces installations, selon le milieu de résidence, EDSB-V Bénin 2017-2018

Type d'installations sanitaires et endroit où elles sont situées	Ménages			Population		
	Urbain	Rural	Ensemble	Urbain	Rural	Ensemble
Installations sanitaires améliorées	22,4	6,4	13,3	22,4	6,3	12,8
Chasse d'eau/chasse d'eau manuelle connectée à un système d'égout	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1
Chasse d'eau/chasse d'eau manuelle reliée à une fosse septique	9,3	0,6	4,4	8,3	0,5	3,6
Chasse d'eau/chasse d'eau manuelle reliée à une fosse d'aisances	1,3	0,4	0,8	1,4	0,4	0,8
Fosse d'aisances améliorées ventilée	3,4	1,4	2,3	3,8	1,5	2,4
Fosse d'aisances avec dalle	8,2	3,9	5,7	8,6	3,8	5,7
Toilettes à compostage	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Installations sanitaires non améliorées	77,6	93,6	86,7	77,6	93,7	87,2
Toilettes partagées¹	31,2	13,4	21,0	26,5	11,4	17,4
Chasse d'eau/chasse d'eau manuelle connectée à un système d'égout	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chasse d'eau/chasse d'eau manuelle reliée à une fosse septique	0,7	0,1	0,4	0,5	0,1	0,2
Chasse d'eau/chasse d'eau manuelle reliée à une fosse d'aisances	0,7	0,4	0,5	0,6	0,3	0,4
Fosse d'aisances améliorée ventilée	11,3	3,8	7,1	9,2	3,3	5,7
Fosse d'aisances avec dalle	18,4	9,0	13,1	16,1	7,7	11,1
Toilettes à compostage	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toilettes non améliorées	12,2	11,5	11,8	12,9	11,8	12,2
Chasse d'eau/chasse d'eau manuelle non reliée à des égouts/fosse septiques/fosses d'aisances	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1
Fosse d'aisances sans dalle/trou ouvert	10,5	10,3	10,4	11,4	10,7	11,0
Seau/tinette	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toilettes/latrines suspendues	0,5	0,7	0,7	0,4	0,7	0,6
Autre	0,9	0,3	0,6	0,9	0,4	0,6
Défécation en plein air (pas de toilettes/nature)	34,3	68,8	53,9	38,2	70,5	57,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de ménages/population	6 104	8 052	14 156	29 518	43 902	73 420
Endroit où se trouvent les installations sanitaires						
Dans le logement	15,8	3,2	8,6	14,7	2,7	7,5
Dans la cour/parcelle	42,1	18,5	28,7	39,6	18,2	26,8
Ailleurs	7,8	9,5	8,8	7,5	8,6	8,1
Défécation en plein air	34,3	68,8	53,9	38,2	70,5	57,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de ménages/population disposant d'installations sanitaires	6 104	8 052	14 156	29 518	43 902	73 420

¹ Toilettes qui seraient considérées comme « améliorées » si elles n'étaient pas partagées par deux ménages ou plus.

Tableau 2.4 Caractéristiques du logement

Répartition (en %) des ménages et de la population de droit par certaines caractéristiques du logement, pourcentage utilisant du combustible solide pour cuisiner, et répartition (en %) des ménages par fréquence à laquelle on fume dans le logement, selon le milieu de résidence, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique du logement	Ménages			Population		
	Urbain	Rural	Ensemble	Urbain	Rural	Ensemble
Électricité						
Oui	55,5	20,5	35,6	54,2	21,2	34,5
Non	44,5	79,5	64,4	45,8	78,8	65,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Matériau de revêtement du sol						
Terre /sable	16,1	39,0	29,1	17,5	40,1	31,0
Bouse	0,5	1,5	1,1	0,6	1,5	1,2
Planche en bois	0,2	0,6	0,4	0,2	0,6	0,5
Palme/bambou	0,3	0,7	0,5	0,2	0,6	0,4
Parquet ou bois cire	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Band de Vinyle ou d'asphalte	0,3	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1
Carrelage	9,1	1,0	4,5	9,2	1,0	4,3
Ciment	71,9	56,5	63,1	70,6	55,6	61,6
Moquette	1,2	0,1	0,6	0,9	0,1	0,4
Autre	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Pièces utilisées pour dormir						
Une	34,1	31,8	32,8	21,1	18,4	19,5
Deux	41,1	38,8	39,8	40,4	35,2	37,3
Trois ou plus	24,9	29,4	27,5	38,5	46,4	43,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Endroit pour cuisiner						
Dans le logement	39,9	30,0	34,2	36,3	28,7	31,7
Dans un bâtiment séparé	16,3	12,1	13,9	17,2	12,0	14,1
À l'extérieur	42,1	56,1	50,1	45,6	57,5	52,7
Pas de repas préparé dans le ménage	1,3	0,8	1,0	0,4	0,2	0,3
Autre	0,4	1,1	0,8	0,5	1,6	1,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Combustible utilisé pour cuisiner						
Électricité	0,5	0,2	0,3	0,5	0,3	0,4
GPL/gaz naturel/biogaz	9,7	0,9	4,7	7,5	0,7	3,4
Kérosène	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Charbon/lignite	1,8	0,4	1,0	1,7	0,4	0,9
Charbon de bois	43,9	13,7	26,7	41,4	11,0	23,2
Bois	39,9	78,5	61,9	45,7	82,9	68,0
Paille/branchages/herbes	2,2	5,2	3,9	2,3	4,4	3,5
Résidus agricoles	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Bouse	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Autres combustibles	0,4	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1
Pas de repas préparé dans le ménage	1,3	0,8	1,0	0,4	0,2	0,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Pourcentage utilisant un combustible solide pour cuisiner ¹	87,9	97,9	93,6	91,3	98,8	95,8
Pourcentage utilisant un combustible non polluant pour cuisiner ²	10,2	1,1	5,0	8,0	1,0	3,8
Fréquence à laquelle on fume dans le logement						
Tous les jours	5,5	10,7	8,5	6,8	13,7	10,9
Une fois par semaine	5,1	5,7	5,4	5,2	6,0	5,7
Une fois par mois	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Moins d'une fois par mois	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
Jamais	88,6	82,9	85,3	87,2	79,7	82,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de ménages/population	6 104	8 052	14 156	29 518	43 902	73 420

GPL = Gaz propane liquéfié.

¹ Y compris le charbon/lignite, le charbon de bois, le bois, la paille/branchages/herbes, les résidus agricoles et la bouse.

² Y compris l'électricité, le gaz de pétrole liquéfié/gaz naturel/biogaz et le kérosène.

Tableau 2.5 Biens possédés par les ménages

Pourcentage de ménages possédant certains équipements, des moyens de transport, de la terre agricole et du bétail/animaux de ferme, par milieu de résidence, EDSB-V Bénin 2017-2018

Possession	Résidence		
	Urbain	Rural	Ensemble
Biens possédés par le ménage			
Radio	59,2	50,1	54,0
Télévision	44,7	16,6	28,7
Téléphone portable	89,1	79,9	83,9
Téléphone fixe	1,3	0,6	0,9
Réfrigérateur	8,9	1,4	4,6
Groupe électrogène	6,7	7,7	7,2
Cuisinière	3,7	0,4	1,8
Chaîne HI-FI	11,3	2,6	6,3
Lecteur VCD/DVD	34,1	11,7	21,3
Magnétoscope	2,3	0,8	1,5
Machine à laver	0,3	0,2	0,2
Ordinateur	9,3	1,2	4,7
Connexion internet	8,1	1,9	4,6
Montre	38,4	22,1	29,2
Moyens de transport			
Bicyclette	14,2	23,3	19,4
Charette tirée par un animal	2,0	4,2	3,2
Motocyclette/scooter	58,6	54,2	56,1
Voiture/camion	7,2	2,0	4,2
Bateau à moteur	0,1	0,3	0,2
Pirogue	0,8	3,2	2,2
Possession de terres agricoles	37,5	71,5	56,8
Possession d'animaux de ferme¹	37,3	65,5	53,3
Effectif de ménages	6 104	8 052	14 156

¹ Vaches, taureaux, autre bétail, chevaux, ânes, chèvres, moutons, poulets ou autre volaille, porcs, ou lapins.

Tableau 2.6 Quintiles de bien-être économique

Répartition (en %) de la population de droit par quintile de bien-être économique et coefficient de Gini, selon le milieu de résidence et le département, EDSB-V Bénin 2017-2018

Résidence/département	Quintile de bien-être économique					Total	Effectif de personnes	Coefficient de Gini
	Le plus bas	Second	Moyen	Quatrième	Le plus élevé			
Résidence								
Cotonou	0,0	0,3	1,4	12,5	85,8	100,0	3 682	0,27
Autres villes	17,4	9,6	14,1	24,7	34,3	100,0	25 836	0,29
Ensemble urbain	15,2	8,4	12,5	23,2	40,7	100,0	29 518	0,30
Rural	23,2	27,8	25,1	17,9	6,1	100,0	43 902	0,32
Département								
Alibori	34,6	28,1	20,5	12,5	4,3	100,0	9 154	0,24
Atacora	43,0	22,9	18,5	10,2	5,4	100,0	6 369	0,25
Atlantique	8,2	14,7	20,4	24,8	32,0	100,0	8 723	0,40
Borgou	34,0	20,6	17,8	15,2	12,5	100,0	9 300	0,31
Collines	10,9	26,6	29,1	22,5	10,9	100,0	4 763	0,27
Couffo	22,2	28,7	22,8	16,4	9,8	100,0	5 099	0,33
Donga	13,0	18,1	28,6	27,3	13,0	100,0	4 824	0,28
Littoral	0,0	0,3	1,4	12,5	85,8	100,0	3 682	0,27
Mono	19,9	24,0	17,6	20,9	17,7	100,0	3 449	0,37
Ouémé	6,4	10,5	15,2	28,0	39,9	100,0	6 795	0,32
Plateau	21,1	21,9	19,1	24,7	13,3	100,0	4 545	0,35
Zou	8,4	19,5	25,4	28,1	18,7	100,0	6 716	0,34
Ensemble	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0	73 420	0,28

Tableau 2.7 Lavage des mains

Pourcentage de ménages dans lesquels l'endroit le plus souvent utilisé pour se laver les mains a été observé selon que l'endroit est fixe ou mobile et pourcentage total de ménages dont on a observé l'endroit utilisé pour le lavage des mains ; Parmi ces ménages dont l'endroit pour se laver les mains a été observé, répartition (en %) par disponibilité d'eau, de savon et d'autres produits nettoyants, selon certaines caractéristiques socioéconomiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristiques socioéconomiques	Pourcentage de ménages dans lesquels l'endroit pour se laver les mains a été observé :			Effectif de ménages	Parmi les ménages dont l'endroit pour se laver les mains a été observé, pourcentage ayant :						Effectif de ménages dans lesquels l'endroit utilisé pour se laver les mains a été observé	
	et dont l'endroit pour se laver les mains est fixe	et dont l'endroit pour se laver les mains est mobile	Total		Savon et eau ¹	Eau et un produit nettoyant autre que le savon seulement ²	Eau seulement	Savon mais pas d'eau ³	Produit nettoyant autre que le savon seulement ²	Pas d'eau, pas de savon, pas d'autre produit nettoyant		Total
Résidence												
Cotonou	27,3	30,8	58,1	852	49,6	0,2	14,0	1,8	0,1	34,3	100,0	495
Autres villes	10,7	44,8	55,5	5 252	20,4	0,4	20,0	2,2	0,3	56,6	100,0	2 916
Ensemble urbain	13,0	42,9	55,9	6 104	24,7	0,4	19,2	2,1	0,3	53,4	100,0	3 411
Rural	6,6	47,9	54,5	8 052	13,4	0,7	23,1	1,5	1,2	60,0	100,0	4 386
Département												
Alibori	5,5	58,3	63,8	1 192	12,9	0,6	17,4	0,1	0,0	69,0	100,0	760
Atacora	2,6	58,6	61,2	923	6,7	0,0	9,5	0,5	0,0	83,3	100,0	565
Atlantique	15,0	30,5	45,5	1 969	40,1	0,3	10,0	3,7	0,0	45,9	100,0	896
Borgou	17,4	58,0	75,3	1 498	15,8	2,0	40,1	0,5	0,1	41,4	100,0	1 128
Collines	6,3	69,9	76,2	981	18,0	1,1	35,4	0,1	0,0	45,2	100,0	748
Couffo	5,9	34,7	40,6	1 108	24,0	0,0	12,2	0,5	0,0	63,3	100,0	450
Donga	1,5	49,8	51,3	740	10,8	0,0	19,4	0,8	0,0	69,0	100,0	380
Littoral	27,3	30,8	58,1	852	49,6	0,2	14,0	1,8	0,1	34,3	100,0	495
Mono	3,0	11,4	14,4	879	30,0	0,0	7,9	0,0	0,0	62,2	100,0	127
Ouémé	10,1	47,0	57,0	1 633	13,0	0,2	14,1	0,8	0,0	71,8	100,0	931
Plateau	3,5	64,4	67,8	984	2,2	0,0	10,8	8,9	0,7	77,5	100,0	668
Zou	6,0	40,5	46,5	1 399	8,3	0,2	40,7	1,9	8,8	40,1	100,0	650
Quintiles de bien-être économique												
Le plus bas	4,1	50,3	54,4	2 501	7,0	0,5	24,2	0,7	1,2	66,3	100,0	1 360
Second	4,4	49,7	54,1	2 675	10,1	0,9	22,5	1,1	0,7	64,8	100,0	1 451
Moyen	5,2	49,6	54,8	2 798	11,7	0,4	24,2	1,4	1,1	61,2	100,0	1 531
Quatrième	7,9	46,6	54,5	2 951	15,8	0,5	21,2	2,1	1,1	59,3	100,0	1 609
Le plus élevé	22,4	34,8	57,2	3 231	40,9	0,5	16,4	3,0	0,2	39,1	100,0	1 847
Ensemble	9,4	45,7	55,1	14 156	18,4	0,6	21,4	1,7	0,8	57,1	100,0	7 797

¹ Comprend le savon ou un produit nettoyant en morceau, liquide, en poudre ou sous forme de pâte. Cette colonne inclut les ménages ayant du savon et de l'eau seulement ainsi que ceux qui ont du savon et de l'eau et un autre produit nettoyant.

² les produits nettoyants autres que le savon comprennent des produits disponibles localement comme la cendre, la boue ou le sable.

³ Y compris les ménages disposant de savon seulement ainsi que ceux ayant du savon et un autre produit nettoyant.

Tableau 2.8 Population des ménages par âge, sexe et milieu de résidence

Répartition (en %) de la population de fait des ménages par différents groupes d'âges et pourcentage de la population de fait des ménages de 10-19 ans, selon le sexe et le milieu de résidence, EDSB-V Bénin 2017-2018

Groupe d'âges	Urbain			Rural			Total		
	Masculin	Féminin	Ensemble	Masculin	Féminin	Ensemble	Masculin	Féminin	Ensemble
<5	18,4	17,2	17,8	20,1	18,1	19,1	19,4	17,7	18,5
5-9	16,3	15,3	15,8	18,3	16,6	17,4	17,5	16,1	16,8
10-14	13,2	12,2	12,7	14,5	12,0	13,2	14,0	12,1	13,0
15-19	9,3	9,4	9,3	8,9	8,9	8,9	9,0	9,1	9,1
20-24	6,8	8,1	7,5	6,2	7,7	7,0	6,5	7,9	7,2
25-29	7,2	8,5	7,9	6,1	7,7	7,0	6,5	8,0	7,3
30-34	6,3	6,5	6,4	5,1	5,7	5,4	5,6	6,0	5,8
35-39	5,4	5,5	5,5	4,5	4,8	4,7	4,8	5,1	5,0
40-44	4,0	3,6	3,8	3,5	3,5	3,5	3,7	3,5	3,6
45-49	3,5	3,4	3,4	3,2	3,1	3,1	3,3	3,2	3,3
50-54	2,6	2,9	2,8	2,2	3,1	2,7	2,4	3,0	2,7
55-59	1,9	2,3	2,1	1,8	2,7	2,3	1,8	2,5	2,2
60-64	1,4	1,8	1,6	1,5	1,8	1,7	1,5	1,8	1,6
65-69	1,6	1,3	1,4	1,6	1,5	1,6	1,6	1,4	1,5
70-74	1,0	0,8	0,9	1,1	1,0	1,1	1,1	0,9	1,0
75-79	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
80 +	0,5	0,9	0,7	0,8	1,1	0,9	0,7	1,0	0,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Groupe d'âge dépendants									
0-14	48,0	44,6	46,2	52,8	46,7	49,7	50,9	45,9	48,3
15-64	48,4	51,9	50,2	42,9	49,1	46,1	45,1	50,2	47,7
65+	3,7	3,5	3,6	4,2	4,2	4,2	4,0	3,9	4,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Populations des enfants et des adultes									
0-17	53,8	50,4	52,0	58,8	52,3	55,4	56,8	51,5	54,1
18+	46,2	49,6	48,0	41,2	47,7	44,6	43,2	48,5	45,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Adolescents 10-19	22,5	21,5	22,0	23,4	20,9	22,1	23,0	21,1	22,1
Effectif	14 064	15 312	29 376	21 241	22 481	43 722	35 306	37 793	73 098

Tableau 2.9 Composition des ménages

Répartition (en %) des ménages par sexe du chef de ménage et par taille du ménage ; Taille moyenne des ménages ; pourcentage de ménages avec des orphelins et des enfants de moins de 18 ans vivant sans leur parent, selon le milieu de résidence, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique	Résidence		Ensemble
	Urbain	Rural	
Chef de ménage			
Homme	75,3	75,0	75,1
Femme	24,7	25,0	24,9
Total	100,0	100,0	100,0
Nombre de membres habituels			
1	11,2	8,7	9,8
2	10,7	9,3	9,9
3	14,0	13,4	13,7
4	15,4	14,4	14,8
5	15,0	13,7	14,3
6	11,4	11,5	11,5
7	7,9	8,5	8,2
8	5,0	6,1	5,6
9+	9,3	14,4	12,2
Total	100,0	100,0	100,0
Taille moyenne du ménage	4,8	5,5	5,2
Pourcentage de ménages avec des orphelins et des enfants de moins de 18 ans vivant sans leurs parents			
Orphelin double	1,1	1,2	1,1
Orphelin simple ¹	9,8	11,2	10,6
Enfants vivant sans leur parent ²	23,3	24,9	24,2
Enfant orphelin et/ou enfant vivant sans leurs parents	27,1	29,5	28,5
Effectif de ménages	6 104	8 052	14 156

Note : Le tableau est basé sur la population de droit des ménages, c'est-à-dire les résidents habituels.

¹ Comprend les enfants dont l'un des parents est décédé et dont l'état de survie de l'autre est inconnu.

² Les enfants vivant sans leur parent sont les enfants de moins de 18 ans qui vivent dans un ménage dans lequel il n'y a ni leur père, ni leur mère, et dont le père et/ou la mère sont en vie.

Tableau 2.10.1 Niveau d'instruction de la population des ménages : Femme

Répartition (en %) de la population de fait des femmes des ménages âgées de 6 ans et plus, en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années complétées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Aucun	Primaire incomplet	Primaire complet ¹	Secondaire incomplet	Secondaire complet ²	Supérieur	Ne sait pas/ manquant	Total	Effectif de femmes	Nombre médian d'années complétées
Groupe d'âges										
6-9	33,6	66,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	100,0	4 852	0,3
10-14	26,3	55,0	3,4	15,4	0,0	0,0	0,0	100,0	4 562	2,8
15-19	26,7	26,5	2,8	42,6	0,5	0,8	0,2	100,0	3 429	4,6
20-24	40,4	20,5	1,7	32,0	1,2	3,9	0,3	100,0	2 974	3,2
25-29	56,3	18,2	1,8	19,8	0,8	2,9	0,2	100,0	3 039	0,0
30-34	65,4	16,8	1,2	12,7	0,6	3,0	0,3	100,0	2 279	0,0
35-39	72,7	16,8	0,7	7,5	0,5	1,5	0,3	100,0	1 929	0,0
40-44	73,9	18,4	0,8	5,9	0,1	0,9	0,0	100,0	1 327	0,0
45-49	75,8	12,9	1,0	9,2	0,3	0,5	0,2	100,0	1 223	0,0
50-54	80,9	8,6	1,0	8,1	0,2	0,9	0,4	100,0	1 145	0,0
55-59	85,5	8,0	1,3	3,7	0,8	0,5	0,2	100,0	954	0,0
60-64	85,5	8,3	0,8	4,2	0,7	0,5	0,0	100,0	679	0,0
65+	92,8	4,3	0,6	1,4	0,1	0,5	0,3	100,0	1 484	0,0
Résidence										
Cotonou	20,0	36,0	4,1	29,6	2,0	7,6	0,7	100,0	1 644	4,3
Autres villes	41,7	33,2	1,7	20,5	0,6	2,0	0,2	100,0	10 586	1,2
Ensemble urbain	38,8	33,6	2,1	21,7	0,8	2,7	0,3	100,0	12 229	1,6
Rural	59,0	28,8	1,2	10,6	0,1	0,2	0,1	100,0	17 647	0,0
Département										
Alibori	76,9	15,8	0,8	6,2	0,3	0,0	0,0	100,0	3 490	0,0
Atacora	61,5	26,0	1,1	11,0	0,0	0,2	0,2	100,0	2 515	0,0
Atlantique	37,7	37,5	2,0	18,2	1,1	3,1	0,4	100,0	3 632	1,5
Borgou	62,9	22,6	1,3	11,6	0,3	1,2	0,2	100,0	3 607	0,0
Collines	43,9	36,0	0,7	18,9	0,3	0,3	0,0	100,0	1 982	0,8
Couffo	51,7	33,9	1,2	12,7	0,1	0,3	0,1	100,0	2 137	0,0
Donga	53,4	33,8	1,7	10,6	0,2	0,3	0,1	100,0	1 856	0,0
Littoral	20,0	36,0	4,1	29,6	2,0	7,6	0,7	100,0	1 644	4,3
Mono	41,1	37,2	3,6	17,0	0,4	0,7	0,0	100,0	1 417	1,1
Ouémé	37,0	37,0	1,5	22,9	0,1	1,4	0,1	100,0	2 782	1,7
Plateau	54,5	33,4	0,9	10,9	0,1	0,1	0,1	100,0	1 940	0,0
Zou	46,3	32,8	1,2	18,8	0,3	0,6	0,0	100,0	2 874	0,3
Quintiles de bien-être économique										
Le plus bas	76,3	19,4	0,7	3,6	0,0	0,0	0,1	100,0	5 737	0,0
Second	62,2	29,3	0,9	7,4	0,1	0,0	0,0	100,0	5 954	0,0
Moyen	54,1	32,8	1,4	11,5	0,1	0,1	0,1	100,0	5 891	0,0
Quatrième	41,5	36,6	2,0	19,1	0,3	0,3	0,1	100,0	6 108	1,1
Le plus élevé	21,9	35,0	2,6	33,0	1,5	5,6	0,5	100,0	6 186	4,2
Ensemble	50,7	30,7	1,5	15,2	0,4	1,2	0,2	100,0	29 876	0,0

¹ A achevé avec succès 6 classes du niveau primaire.² A achevé avec succès 7 classes du niveau secondaire.

Tableau 2.10.2 Niveau d'instruction de la population des ménages : Homme

Répartition (en %) de la population de fait des hommes des ménages âgés de 6 ans et plus, en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années complétées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Aucun	Primaire incomplet	Primaire complet ¹	Secondaire incomplet	Secondaire complet ²	Supérieur	Ne sait pas/ manquant	Total	Effectif d'hommes	Nombre médian d'années complétées
Groupe d'âges										
6-9	28,5	71,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	100,0	4 859	0,3
10-14	19,0	59,8	3,2	17,8	0,0	0,0	0,2	100,0	4 938	3,1
15-19	19,6	21,5	3,3	53,8	0,7	0,9	0,3	100,0	3 191	6,0
20-24	25,0	17,7	2,0	42,5	2,2	9,9	0,7	100,0	2 283	6,5
25-29	33,4	20,0	2,4	30,2	2,0	10,9	1,0	100,0	2 312	4,4
30-34	39,7	22,5	2,3	21,4	2,2	10,2	1,8	100,0	1 965	2,7
35-39	46,2	24,5	3,0	14,6	1,8	7,8	2,0	100,0	1 710	0,9
40-44	47,9	27,2	2,6	14,8	1,3	3,9	2,4	100,0	1 308	0,1
45-49	45,2	27,2	3,1	18,3	1,1	3,0	2,0	100,0	1 157	1,3
50-54	42,9	21,9	1,8	22,9	1,8	5,8	2,9	100,0	834	1,8
55-59	57,7	19,3	1,8	12,1	1,5	6,2	1,4	100,0	646	0,0
60-64	64,5	16,3	1,4	9,2	1,5	4,5	2,6	100,0	515	0,0
65+	74,3	14,0	2,0	6,1	0,7	2,5	0,5	100,0	1 416	0,0
Résidence										
Cotonou	6,4	32,7	3,2	34,6	2,9	17,1	3,1	100,0	1 351	6,6
Autres villes	25,3	38,3	2,4	25,2	1,5	6,3	1,0	100,0	9 652	3,2
Ensemble urbain	23,0	37,6	2,5	26,3	1,6	7,6	1,3	100,0	11 002	3,6
Rural	40,9	36,9	2,0	17,7	0,5	1,5	0,6	100,0	16 132	0,9
Département										
Alibori	67,1	19,1	1,9	10,5	0,4	0,7	0,2	100,0	3 407	0,0
Atacora	45,5	32,9	0,9	18,1	0,8	1,4	0,3	100,0	2 441	0,0
Atlantique	16,0	45,5	2,9	25,4	1,8	6,6	1,8	100,0	3 257	3,7
Borgou	50,2	27,0	2,2	15,6	0,6	3,3	1,1	100,0	3 416	0,0
Collines	25,1	42,4	1,1	27,2	0,9	2,9	0,4	100,0	1 751	3,0
Couffo	25,7	48,5	1,9	19,5	0,9	2,7	0,7	100,0	1 786	2,0
Donga	34,8	40,9	3,3	17,4	1,0	2,2	0,4	100,0	1 884	1,6
Littoral	6,4	32,7	3,2	34,6	2,9	17,1	3,1	100,0	1 351	6,6
Mono	18,4	43,3	4,6	26,5	1,7	4,6	1,0	100,0	1 335	3,7
Ouémé	17,6	45,4	2,4	27,6	0,6	5,3	1,0	100,0	2 532	3,6
Plateau	33,5	45,2	1,7	15,8	0,6	2,7	0,6	100,0	1 614	1,6
Zou	26,2	40,3	1,3	28,1	0,5	3,2	0,3	100,0	2 360	2,7
Quintiles de bien-être économique										
Le plus bas	60,8	28,8	1,3	8,5	0,2	0,2	0,3	100,0	5 338	0,0
Second	46,4	36,1	2,0	14,4	0,2	0,5	0,4	100,0	5 339	0,0
Moyen	34,1	42,3	2,1	19,3	0,5	1,2	0,6	100,0	5 403	1,6
Quatrième	21,6	44,2	2,4	26,9	0,9	2,7	1,3	100,0	5 403	3,2
Le plus élevé	7,0	34,4	3,1	36,2	2,9	14,7	1,8	100,0	5 650	6,2
Ensemble	33,6	37,2	2,2	21,2	1,0	4,0	0,9	100,0	27 134	1,9

¹ A achevé avec succès 6 classes du niveau primaire.

² A achevé avec succès 7 classes du niveau secondaire.

Tableau 2.11 Taux de fréquentation scolaire

Taux Net de Fréquentation scolaire (TNF) et Taux Brut de Fréquentation scolaire (TBF) de la population de fait des ménages, par sexe et niveau d'études, et indice de parité entre les genres, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Taux net de fréquentation scolaire ¹				Taux brut de fréquentation scolaire ²			
	Masculin	Féminin	Ensemble	Indice de parité entre les genres ³	Masculin	Féminin	Ensemble	Indice de parité entre les genres ³
NIVEAU PRIMAIRE								
Résidence								
Cotonou	85,4	79,6	82,3	0,93	115,5	104,7	109,7	0,91
Autres villes	75,9	69,6	72,7	0,92	106,2	94,0	100,1	0,89
Ensemble urbain	76,9	70,8	73,8	0,92	107,2	95,3	101,2	0,89
Rural	63,1	56,8	60,1	0,90	86,9	77,1	82,2	0,89
Département								
Alibori	34,4	32,5	33,5	0,94	49,2	42,1	45,6	0,85
Atacora	59,2	51,2	55,2	0,87	89,5	71,9	80,7	0,80
Atlantique	84,2	75,3	79,9	0,89	117,0	99,3	108,5	0,85
Borgou	47,2	43,2	45,2	0,92	66,7	59,4	63,1	0,89
Collines	78,1	77,3	77,8	0,99	108,2	103,4	106,0	0,96
Couffo	77,6	65,4	71,7	0,84	105,2	86,0	95,9	0,82
Donga	74,5	69,5	72,1	0,93	106,0	96,8	101,6	0,91
Littoral	85,4	79,6	82,3	0,93	115,5	104,7	109,7	0,91
Mono	86,8	86,1	86,5	0,99	120,6	119,9	120,3	0,99
Ouémé	84,0	80,1	82,1	0,95	112,4	110,4	111,4	0,98
Plateau	75,5	70,6	73,0	0,94	100,5	92,2	96,3	0,92
Zou	77,7	70,0	73,9	0,90	101,6	97,8	99,7	0,96
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	43,7	36,3	40,1	0,83	61,8	48,7	55,4	0,79
Second	60,5	58,1	59,3	0,96	84,5	79,0	81,8	0,93
Moyen	74,2	62,8	68,6	0,85	101,6	87,6	94,7	0,86
Quatrième	84,2	80,0	82,2	0,95	117,0	106,1	111,6	0,91
Le plus élevé	85,0	80,2	82,6	0,94	115,5	108,0	111,7	0,94
Ensemble	68,2	62,3	65,3	0,91	94,4	84,3	89,4	0,89
NIVEAU SECONDAIRE								
Résidence								
Cotonou	66,8	52,0	58,5	0,78	91,3	72,3	80,6	0,79
Autres villes	44,6	37,8	41,2	0,85	62,4	51,5	56,9	0,83
Ensemble urbain	47,1	39,7	43,3	0,84	65,6	54,3	59,7	0,83
Rural	31,9	22,0	27,0	0,69	44,4	27,9	36,3	0,63
Département								
Alibori	16,3	7,6	12,3	0,47	22,6	10,5	17,0	0,47
Atacora	24,3	20,9	22,6	0,86	38,9	27,6	33,3	0,71
Atlantique	48,2	38,0	43,2	0,79	63,3	50,0	56,8	0,79
Borgou	26,1	22,1	24,1	0,85	37,6	28,3	32,9	0,75
Collines	56,3	32,6	43,7	0,58	74,6	41,3	56,8	0,55
Couffo	32,5	23,8	28,0	0,73	45,2	29,3	36,9	0,65
Donga	29,7	24,1	27,4	0,81	43,2	33,0	38,9	0,76
Littoral	66,8	52,0	58,5	0,78	91,3	72,3	80,6	0,79
Mono	45,4	32,5	39,1	0,72	69,3	47,8	58,7	0,69
Ouémé	55,8	46,3	50,8	0,83	74,0	60,8	67,1	0,82
Plateau	31,3	25,0	28,2	0,80	40,8	34,3	37,6	0,84
Zou	52,1	37,7	44,3	0,72	75,1	49,6	61,4	0,66
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	15,1	8,3	11,9	0,55	21,8	10,6	16,4	0,49
Second	27,1	13,8	20,5	0,51	37,7	17,6	27,7	0,47
Moyen	34,5	24,9	29,8	0,72	47,7	30,3	39,3	0,64
Quatrième	47,5	37,6	42,6	0,79	63,7	51,4	57,6	0,81
Le plus élevé	65,9	55,9	60,4	0,85	94,0	75,7	84,0	0,81
Ensemble	37,9	29,4	33,6	0,78	52,7	38,9	45,8	0,74

¹ Le taux net de fréquentation scolaire (TNF) pour le niveau primaire est le pourcentage de la population d'âge officiel de fréquentation du niveau primaire (6-11 ans) qui fréquente l'école primaire. Le taux net de fréquentation scolaire pour le niveau secondaire est le pourcentage de la population d'âge officiel de fréquentation du niveau secondaire (12-18 ans) qui fréquente l'école secondaire. Par définition le taux net de fréquentation ne peut excéder 100 %.

² Le taux brut de fréquentation scolaire (TBF) au niveau primaire est le nombre total d'élèves du niveau primaire, exprimé en pourcentage de la population d'âge officiel de fréquentation du niveau primaire. Le taux brut de fréquentation scolaire au niveau secondaire est le nombre total d'élèves du niveau secondaire, exprimé en pourcentage de la population d'âge officiel de fréquentation du niveau secondaire. S'il y a pour un niveau donné un nombre important d'élèves plus âgés ou plus jeunes que l'âge officiel pour ce niveau, le TBF peut excéder 100 %.

³ L'indice de parité entre les genres au niveau primaire est le ratio du TBF au niveau primaire des filles sur le TBF des garçons. L'indice de parité entre les genres au niveau secondaire est le ratio du TBF au niveau secondaire des filles sur le TBF des garçons.

Résultats clés

- **Niveau d'instruction** : Un peu plus d'une femme sur deux (55 %) et plus du tiers des hommes (36 %) sont sans instruction.
- **Exposition aux médias** : Près d'une femme sur six (57 %) et 42 % des hommes de 15-49 ans ne sont exposés régulièrement à aucun média.
- **Emploi** : Trois quarts des femmes (76 %) et un peu plus de huit hommes sur dix (84 %) travaillaient au cours des sept jours précédant l'enquête.
- **Occupation** : Près d'une femme sur deux (46 %) qui travaillait au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête était occupée dans le commerce. Dans 45 % des cas, les hommes travaillaient dans l'agriculture.
- **Assurance médicale** : Seulement 1 % des femmes et des hommes ont déclaré être couverts par une assurance médicale.
- **Consommation de tabac** : Parmi les femmes de 15-49 ans, 1 % ont déclaré fumer contre 7 % chez les hommes.

Ce chapitre présente les résultats concernant les caractéristiques démographiques et socio-économiques des enquêtés comme l'âge, le niveau d'instruction, le lieu de résidence, l'état matrimonial, l'emploi et le niveau de bien-être économique. Ces informations sont particulièrement utiles pour comprendre les facteurs qui influencent l'utilisation des services de santé reproductive, le recours à la contraception et les comportements en matière de santé.

3.1 CARACTÉRISTIQUES DE BASE DES ENQUÊTÉS

Le **Tableau 3.1** présente la répartition des femmes et des hommes de 15-49 ans selon certaines caractéristiques sociodémographiques, notamment l'âge, la religion, l'état matrimonial, le milieu de résidence et le niveau d'instruction. Au cours de l'EDSB-V, un échantillon de 15 928 femmes et 6 727 hommes de 15-49 ont été enquêtés. Les caractéristiques principales de la population sont les suivantes :

- La population est relativement jeune : 58 % des femmes et 57 % des hommes ont moins de 30 ans. Les jeunes de 15-19 ans représentent 21 % des femmes et 23 % des hommes.
- La population âgée de 40 ans ou plus constitue 16 % des femmes et 18 % des hommes.
- Les religions les plus pratiquées sont l'Islam (30 % des femmes et 33 % des hommes) et le catholicisme (25 % des femmes et 26 % des hommes).
- Les résultats selon l'état matrimonial montrent qu'au moment de l'enquête, sept femmes sur dix (70 %) et un peu plus de quatre hommes sur dix (55 %) étaient en union. Par ailleurs, 24 % des femmes et 43 % des hommes étaient célibataires.

- La répartition selon le milieu de résidence montre que la proportion de population vivant en milieu rural est plus élevée qu'en milieu urbain (58 % des femmes et 57 % des hommes contre respectivement 42 % et 43 %).
- La population masculine (64 %) est plus instruite (primaire, secondaire et supérieur) que la population féminine (45 %) (**Tableau 3.1**).
- La répartition par département montre que trois départements concentrent 36 % de la population des femmes et 38 % de la population des hommes : il s'agit de l'Alibori (12 % des femmes et 14 % des hommes), de l'Atlantique (13 % des femmes et 12 % des hommes) et du Borgou (12 % des femmes et des hommes, dans chaque cas).
- Selon le niveau de bien-être économique des ménages, on constate que 17 % des femmes et 19 % des hommes appartiennent au quintile le plus bas, tandis que 23 % des femmes et des hommes, dans chaque cas, appartiennent à des ménages du quintile le plus élevé.

3.2 NIVEAU D'INSTRUCTION ET ALPHABÉTISATION

3.2.1 Niveau d'instruction


Globalement, les femmes sont moins instruites que les hommes. Un peu plus de la moitié des femmes (55 %) et un peu plus du tiers des hommes (36 %) sont sans niveau d'instruction (**Tableaux 3.2.1 et 3.2.2**). Une femme sur cinq (20 %) à un niveau primaire, contre 23 % chez les hommes (**Graphique 3.1**). Dans l'ensemble, le nombre médian d'années d'études achevées est de 4,1 ans pour les hommes de 15-49 ans.

Tendances : La proportion de femmes de 15-49 ans sans instruction a diminué dans le temps, passant de 64 % en 2006 à 55 % en 2017-2018. Par contre chez les hommes de 15-49 ans, on n'observe peu de changement, la proportion n'ayant aucun niveau d'instruction étant passée de 33 % en 2006 à 36 % en 2017-2018.

Variations par caractéristique

- Le niveau d'instruction s'améliore chez les enquêtés des deux sexes, des générations les plus anciennes aux générations les plus récentes. En effet, le pourcentage de femmes sans instruction passe de 77 % dans le groupe d'âges 45-49 ans à 35 % parmi celles de 15-24 ans.
- Le niveau d'instruction varie de manière importante selon le milieu de résidence. Quel que soit le sexe, le niveau d'instruction est sensiblement meilleur en milieu urbain qu'en milieu rural. En effet, 43 % des femmes et 25 % des hommes vivant en milieu urbain n'ont aucun niveau d'instruction contre respectivement 64 % et 44 % en milieu rural. On retrouve cet écart entre milieu de résidence quel que


Graphique 3.1 Niveau d'instruction des enquêtés



soit le niveau d'instruction : en milieu urbain, 6 % des femmes ont atteint un niveau secondaire complet ou un niveau supérieur contre moins d'un pour cent en milieu rural. Chez les hommes, ces proportions sont respectivement de 14 % et 4 % (Graphique 3.2).

Graphique 3.2 Niveau d'instruction secondaire par résidence


Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans ayant un niveau d'instruction secondaire complet ou supérieur




- Au niveau départemental, on observe d'importantes variations du niveau d'instruction atteint par les enquêtés. Le département de l'Alibori enregistre la plus forte proportion de femmes sans niveau d'instruction (85 %) tandis que celui du Littoral a la plus faible (23 %). Dans le Littoral, 14 % des femmes ont atteint un niveau secondaire complet ou supérieur contre 1 % dans l'Alibori. Notons que les départements de l'Atacora, du Borgou, du Plateau et de la Donga connaissent des proportions de femmes sans instruction au-dessus de la moyenne nationale (55 %) avec respectivement 67 %, 65 %, 62 % et 61 %). Chez les hommes, c'est aussi dans l'Alibori que l'on enregistre la plus forte proportion d'hommes non instruits (69 %) et dans le Littoral la plus faible (7 %) (Graphique 3.3).

Graphique 3.3 Sans niveau d'instruction par département

Pourcentage de femmes de 15-49 sans niveau d'instruction



Pourcentage d'hommes de 15-49 sans niveau d'instruction



- Les proportions de femmes et d'hommes sans niveau d'instruction diminuent au fur et à mesure que le niveau de bien-être économique du ménage augmente, variant chez les femmes de 82 % dans le quintile le plus bas à 25 % dans le quintile le plus élevé, et respectivement de 66 % à 10 % chez les hommes (Tableaux 3.2.1 et 3.2.2).

3.2.2 Niveau d'alphabétisation

Alphabétisation

On suppose que les enquêtés qui ont fréquenté un niveau d'instruction supérieur au niveau secondaire sont alphabétisés. Tous les autres enquêtés, qui ont lu à haute voix une phrase préparée qui leur a été montrée sont considérés comme alphabétisés s'ils ont pu lire toute la phrase ou une partie de la phrase.

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans

Globalement, le taux d'alphabétisation est plus élevé chez les hommes (54 %) que chez les femmes (34 %) (Tableaux 3.3.1 et 3.3.2).

Variations par caractéristique

- Les générations les plus anciennes sont moins alphabétisées que les plus récentes. En effet, la proportion de femmes alphabétisées passe de 17 % chez les 45-49 ans à 51 % dans le groupe d'âges 15-24 ans. Chez les hommes, la proportion des alphabétisés passe respectivement de 43 % à 67 %.
- Quel que soit le sexe, le taux d'alphabétisation est plus élevé en milieu urbain (46 % pour les femmes et 65 % pour les hommes) qu'en milieu rural (25 % des femmes et 46 % des hommes).
- Au niveau départemental, c'est l'Alibori qui enregistre le plus faible pourcentage de femmes alphabétisées (14 %) et le Littoral le plus fort (67 %). Chez les hommes, le pourcentage de ceux qui sont alphabétisés varie d'un minimum de 36 % dans le Plateau à un maximum de 88 % dans le Littoral.
- Les proportions d'enquêtés alphabétisés augmentent du quintile le plus bas au quintile plus élevé, passant chez les femmes de 11 % à 65 %, et chez les hommes de 30 % à 83 %.

3.3 EXPOSITION AUX MEDIAS

Exposition aux médias

On demande aux enquêtés combien de fois ils ont lu un journal, écouté la radio ou regardé la télévision. Ceux qui déclarent *au moins une fois par semaine* sont considérés comme étant exposés régulièrement à ce type de média.


Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans

Les données sur l'exposition aux différents médias (Tableaux 3.4.1 et 3.4.2) sont particulièrement importantes et peuvent aider à la mise en place de programmes d'éducation, de sensibilisation et de diffusion d'informations. Elles permettent d'évaluer l'accès de la population à l'information. Globalement les femmes sont moins exposées aux médias (57 %) que les hommes (42 %).

Quel que soit le sexe, la radio est le média le plus utilisé : un peu plus de la moitié des hommes (51 %) et plus du tiers des femmes (36 %) écoutent la radio au moins une fois par semaine (**Graphique 3.4**).

Graphique 3.4 Exposition aux médias

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui sont exposés à des médias chaque semaine



Tendances : Depuis 2001, le pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans exposés à aucun média a augmenté passant, chez les femmes, de 33 % en 2001 à 46 % à 2011-2012 et à 57 % en 2017-2018 et, chez les hommes de respectivement 13 % à 30 % et à 42 %.

Variations par caractéristique

- L'exposition aux médias varie de manière importante en fonction du milieu de résidence. En effet près de sept femmes sur dix (65 %) vivant en milieu rural ne sont exposées à aucun média, contre 46 % de celles qui vivent en milieu urbain. Le constat est le même chez les hommes, les pourcentages étant respectivement de 49 % et 34 %.
- Au niveau des départements on observe aussi des disparités importantes. En effet dans le département de l'Atacora, 72 % des femmes et 79 % des hommes ne sont exposés à aucun média ; dans le Littoral, ces proportions sont respectivement de 22 % et 11 %.
- L'exposition aux médias augmente avec le niveau d'instruction. La proportion de femmes non exposées aux médias varie de 67 % chez celle n'ayant aucun niveau à 21 % chez celles ayant atteint le niveau secondaire 2^d cycle ou supérieur. La tendance est identique chez les hommes parmi lesquels on observe des proportions de respectivement 57 % et 20 %.
- Les proportions d'hommes et de femmes exposés à aucun média diminuent du quintile le plus bas (78 % chez les femmes et 65 % chez les hommes) au quintile le plus élevé (respectivement 24 % et 20 %).
- Moins d'une femme sur dix (6 %) interviewées a déclaré avoir utilisé l'internet au cours des douze derniers mois. Parmi ces femmes, 59 % l'utilisent presque chaque jour. Chez les hommes du même groupe d'âge, ces proportions sont respectivement de 20 % et 62 % (**Tableaux 3.5.1 et 3.5.2**).
- L'exposition à l'internet varie selon les départements. C'est dans le Couffo et l'Alibori que la proportion de femmes ayant utilisé l'internet au cours des douze derniers mois est la plus faible (2 % dans chaque cas). À l'opposé, c'est le Littoral qui enregistre le plus fort pourcentage avec 29 %. Chez les hommes ces proportions varient de 7 % dans l'Alibori à 66 % dans le Littoral.
- L'utilisation de l'internet au cours des douze derniers mois augmente avec le niveau d'instruction, passant de 3 % pour le niveau primaire à 53 % pour le niveau secondaire 2^d cycle ou plus chez les femmes. Chez les hommes, ces proportions sont respectivement de 8 % et 67 %.
- Le niveau de bien-être économique a une influence sur l'utilisation de l'internet au cours des 12 derniers mois. Chez les femmes, cette proportion varie de 22 % dans le quintile le plus élevé à moins de 1 % dans le quintile le plus bas. Chez les hommes ces proportions sont respectivement de 55 % et 2 %.

3.4 EMPLOI

Travaille actuellement

Les enquêtés qui travaillaient dans les 7 jours qui précédaient l'enquête

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans

Lors de l'enquête, des questions relatives à l'activité ont été posées aux hommes et aux femmes. Ces questions ont permis d'identifier les hommes et les femmes qui travaillaient au moment de l'enquête, c'est-à-dire au cours des sept jours précédant l'enquête, et ceux qui avaient effectué un travail quelconque, à un certain moment, au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête.


Trois quarts des femmes (76 %) et plus de huit hommes sur dix (84 %) de 15-49 ans ont déclaré qu'ils travaillaient actuellement, c'est-à-dire au cours des 7 jours avant l'enquête. En outre, 22 % des femmes et 13 % des hommes ont déclaré qu'ils n'avaient pas travaillé au cours des 12 mois avant l'enquête (**Tableaux 3.6.1 et 3.6.2**).

Tendances : Entre 1996 et 2011-2012, le pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant déclaré avoir travaillé au cours des 12 derniers mois avant l'enquête et qui travaillaient encore au moment de l'enquête a baissé, passant de 86 % à 82 % en 2001 puis à 79 % en 2006 et à 64 % en 2011-2012. Par contre, entre 2011-2012 et l'enquête actuelle, la tendance ne s'est pas poursuivie et on constate une augmentation, le pourcentage étant passé de 64 % à 76 %. Dans la même période, chez les hommes de 15-49 ans, on constate la même tendance, la proportion étant passée de 87 % à 79 % puis à 71 % et à 73 % pour augmenter ensuite et atteindre 84 % à l'enquête actuelle.

Variations par caractéristique

- Les résultats selon l'état matrimonial montrent que ce sont les célibataires qui travaillaient le moins fréquemment au cours des 7 derniers jours. (53 % des femmes et 66 % des hommes). Chez les hommes, c'est parmi ceux en union que l'on observe le pourcentage le plus élevé de ceux qui travaillaient (98 %) ; Par contre, chez les femmes, c'est parmi celles en rupture d'union que le pourcentage est le plus élevé (91 %) (**Graphique 3.5**).

Graphique 3.5 Statut de l'emploi par état matrimonial



- En s'intéressant au nombre d'enfants vivant des enquêtés, on note que plus le nombre d'enfant augmente plus la proportion des femmes qui travaillaient au moment de l'enquête augmente. Elle passe de 54 % pour celles n'ayant pas d'enfant à 89 % pour les femmes ayant cinq enfants et plus. Chez les hommes elles passent respectivement de 68 % à 97 %.

- La proportion de femmes qui travaillaient au cours des 7 jours avant l'enquête varie sensiblement selon le milieu de résidence : 73 % des femmes en milieu urbain contre 78 % en milieu rural. Chez les hommes, ces proportions représentent respectivement 81 % et 87 %.

- Les résultats par département mettent aussi en évidence des disparités : parmi les hommes, on constate que dans l'Alibori (97 %), le Borgou (93 %) et l'Atacora (90 %), la quasi-totalité travaillait dans les 7 jours avant l'enquête. Par contre, dans le Couffo et le Mono, ces proportions sont plus faibles (73 % dans les deux cas) et c'est dans le Littoral que la proportion est la plus faible (69 %). Chez les femmes, on constate un écart entre l'Alibori qui enregistre la plus faible proportion de femmes qui travaillaient au cours des 7 derniers jours (70 %) et les Collines qui enregistrent la plus forte proportion (83 %).

- Chez les femmes comme chez les hommes, la proportion de ceux qui travaillaient au cours des 7 derniers jours a tendance à diminuer avec le niveau d'instruction, passant chez les femmes de 82 % parmi celles sans niveau d'instruction à 55 % parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus ; chez les hommes, cette proportion passe respectivement de 96 % à 70 % (**Tableaux 3.6.1 et 3.6.2**).

- Chez les hommes, les proportions d'enquêtés qui travaillaient au cours des 7 jours avant l'enquête diminuent du quintile le plus bas au quintile le plus élevé, passant de 93 % à 76 %. Chez les femmes, on constate un écart entre le quintile le plus élevé et les autres, la proportion de celles qui travaillaient au cours des 7 derniers jours variant de 77 % dans les quatre premiers quintiles à 72 % dans le plus élevé.

3.5 OCCUPATION

Occupation :

Classés dans les catégories agriculture, industrie, commerce, information et communication, activités financières et d'assurance, activités professionnelles, administration, autres activités de services et autre

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans qui travaillaient actuellement ou qui ont travaillé dans les 12 mois qui précédaient l'enquête


Parmi les femmes de 15-49 ans qui travaillaient au cours des 12 mois précédant l'enquête, la majorité était occupée dans le commerce avec 46 % suivi de l'agriculture (23 %) et de l'industrie (15 %). Chez les hommes de 15-49 ans, c'est l'agriculture qui occupe la première place (45 %) suivi du commerce (19 %) et de l'industrie (11 %) (**Tableaux 3.7.1 et 3.7.2**) (**Graphique 3.6**).

Variations par caractéristique

- Les pourcentages de femmes qui sont occupées dans le commerce diminuent du quintile le plus élevé au quintile le plus bas, passant, de 57 % à 30 %.
- L'agriculture constitue l'occupation principale des hommes du quintile de bien-être économique le plus bas (84 %). Les proportions diminuent au fur et à mesure que le niveau de bien-être augmente passant de 84 % dans le quintile le plus bas à 4 % dans le plus élevé.

Graphique 3.6 Occupation

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui travaillaient au cours des 12 mois précédant l'enquête par type d'activités



Le **Tableau 3.8** présente la répartition des femmes ayant eu un emploi au cours des 12 derniers mois en fonction du type de rémunération, du type d'employeur et de la régularité de l'emploi selon le secteur d'activité (agricole ou non-agricole). Dans le secteur non agricole, les femmes travaillent plus fréquemment à leur propre compte que dans le secteur agricole (83 % contre 58 %). En outre, il est plus fréquent que les femmes travaillent toute l'année dans le secteur non agricole que dans le secteur agricole (81 % contre 31 %). Dans 35 % des cas pour le secteur agricole contre 16 % pour le secteur non agricole, les femmes n'ont pas été payées pour le travail effectué. Seulement, 26 % des femmes travaillant dans le secteur agricole ont été rémunérées en argent contre 78 % dans le secteur non agricole.

3.6 COUVERTURE PAR UNE ASSURANCE MÉDICALE

Les **Tableaux 3.9.1 et 3.9.2** présentent les données relatives à la couverture par une assurance médicale des femmes et des hommes enquêtés. On observe que la quasi-totalité des femmes comme des hommes, ne sont pas couverts par une assurance médicale quelconque (99 % dans les deux cas).

3.7 UTILISATION DE TABAC

Au Bénin, la quasi-totalité des femmes et des hommes de 15-49 ans ne fument pas de tabac (respectivement 99 % et 93 %). Chez les hommes, 7 % fument des cigarettes tandis que chez les femmes, la proportion est de 1 % (**Tableaux 3.10.1 et 3.10.2**). Concernant la fréquence, 5 % des hommes déclarent fumer du tabac quotidiennement et 2 % le font occasionnellement.

Tendances : Chez les femmes, la proportion celles qui ne fument pas n'a pas beaucoup varié de 2001 à 2017-2018, passant de 97 % à 99 %. Chez les hommes, les proportions sont passées de 89 % en 2011-2012 à 93 % en 2017-2018.

Variations par caractéristique

- On constate que chez les hommes les proportions de fumeurs de n'importe quel type de tabac diminuent des générations anciennes aux plus récentes, passant de 10 % parmi ceux de 40-49 ans à 1 % parmi ceux de 15-19 ans. Chez les femmes, on ne note pas de variation importante.
- La proportion de fumeurs est plus élevée en milieu rural (8 % chez les hommes et 2 % chez les femmes) qu'en milieu urbain (5 % pour les hommes et 1 % pour les femmes).
- Le département de l'Alibori enregistre la proportion la plus élevée de femmes qui fument n'importe quel type de tabac (6 %). Chez les hommes, les proportions les plus élevées s'observent dans les départements de l'Atacora (14 %), du Borgou (13 %) et du Plateau (11 %).
- La proportion d'hommes qui fument n'importe quel type de tabac diminue avec le niveau d'instruction : elle passe de 11 % parmi ceux sans niveau d'instruction à 2 % pour ceux du niveau secondaire 2^d cycle ou supérieur.
- La proportion d'hommes qui fument n'importe quel type de tabac diminue avec le niveau de bien-être économique, passant de 13 % dans le quintile le plus bas à 3 % dans le quintile le plus élevé.

Parmi les hommes de 15-49 ans fumeurs de cigarettes, un peu moins de la moitié (48 %) en fume moins de 5 par jour et 9 % ont déclaré en fumer au moins 25 par jour (**Tableau 3.11**).

Au Bénin, les proportions de femmes et d'hommes qui consomment n'importe quel type de tabac non fumé sont respectivement de 1 % et 7 % (**Tableau 3.12**).

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur les caractéristiques des enquêtés, consultez les tableaux suivants :

- **Tableau 3.1** **Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés**
- **Tableau 3.2.1** **Niveau d'instruction : Femme**
- **Tableau 3.2.2** **Niveau d'instruction : Homme**
- **Tableau 3.3.1** **Alphabétisation : Femme**
- **Tableau 3.3.2** **Alphabétisation : Homme**
- **Tableau 3.4.1** **Exposition aux médias : Femme**
- **Tableau 3.4.2** **Exposition aux médias : Homme**
- **Tableau 3.5.1** **Utilisation de l'internet : Femme**
- **Tableau 3.5.2** **Utilisation de l'internet : Homme**
- **Tableau 3.6.1** **Emploi : Femme**
- **Tableau 3.6.2** **Emploi : Homme**
- **Tableau 3.7.1** **Occupation : Femme**
- **Tableau 3.7.2** **Occupation : Homme**
- **Tableau 3.8** **Type d'emploi : Femme**
- **Tableau 3.9.1** **Couverture médicale : Femme**
- **Tableau 3.9.2** **Assurance médicale : Homme**
- **Tableau 3.10.1** **Consommation de tabac à fumer : Femme**
- **Tableau 3.10.2** **Consommation de tabac à fumer : Homme**
- **Tableau 3.11** **Nombre moyen de cigarettes fumées par jour : Homme**
- **Tableau 3.12** **Consommation de tabac non fumé et de tabac sous n'importe quelle forme**

Tableau 3.1 Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans par certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Femme			Homme		
	Pourcentage pondéré	Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Pourcentage pondéré	Effectif pondéré	Effectif non pondéré
Groupe d'âges						
15-19	21,0	3 350	3 335	23,0	1 548	1 559
20-24	18,4	2 923	2 916	16,6	1 118	1 137
25-29	18,7	2 986	2 971	17,2	1 156	1 140
30-34	13,8	2 202	2 195	13,1	881	883
35-39	11,8	1 882	1 905	12,1	812	798
40-44	8,3	1 320	1 333	9,2	620	621
45-49	7,9	1 265	1 273	8,8	592	593
Religion						
Vodoun	8,4	1 331	1 332	10,7	717	715
Autre traditionnelles	0,8	131	137	1,1	71	70
Islam	29,6	4 721	4 677	33,2	2 236	2 200
Catholique	24,7	3 928	3 945	25,9	1 739	1 727
Protestante						
Methodiste	4,9	785	786	3,0	205	219
Autres Protestants	3,8	609	610	4,3	292	307
Célestes	8,0	1 281	1 238	6,1	409	389
Autres chrétiens	13,6	2 169	2 205	8,7	586	614
Autres religions	1,1	174	165	1,1	76	73
Aucune	5,0	798	833	5,9	396	417
État matrimonial						
Célibataire	24,4	3 889	3 897	42,5	2 860	2 892
Marié	55,1	8 772	8 828	44,5	2 991	2 977
Vivant ensemble	15,0	2 396	2 342	10,2	684	667
Divorcé/séparé	3,4	545	539	2,5	169	171
Veuf	2,0	325	322	0,3	23	24
Résidence						
Cotonou	6,0	958	1 415	5,8	390	592
Autres villes	36,4	5 803	5 630	37,0	2 487	2 413
Ensemble urbain	42,4	6 761	7 045	42,8	2 877	3 005
Rural	57,6	9 167	8 883	57,2	3 849	3 726
Département						
Alibori	11,8	1 878	1 697	13,6	917	826
Atacora	8,2	1 302	1 392	8,3	560	604
Atlantique	12,8	2 037	1 702	12,2	822	681
Borgou	11,5	1 839	1 765	12,2	823	798
Collines	7,2	1 151	1 403	6,7	448	554
Couffo	6,5	1 041	1 012	6,1	409	398
Donga	5,5	881	964	6,6	445	480
Littoral	6,0	958	1 415	5,8	390	592
Mono	4,8	759	816	5,3	354	372
Ouémé	9,5	1 507	1 260	9,2	618	519
Plateau	6,1	970	952	5,1	340	329
Zou	10,1	1 606	1 550	8,9	600	578
Niveau d'instruction						
Aucun	55,2	8 785	8 762	36,1	2 426	2 403
Primaire	19,8	3 148	3 116	23,2	1 562	1 515
Secondaire 1 ^{er} cycle	17,9	2 847	2 827	22,9	1 538	1 550
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	7,2	1 147	1 223	17,9	1 201	1 263
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	17,2	2 735	2 856	18,6	1 248	1 280
Second	19,0	3 030	2 976	19,5	1 315	1 285
Moyen	19,5	3 104	2 985	19,1	1 282	1 231
Quatrième	21,4	3 405	3 281	19,6	1 317	1 291
Le plus élevé	22,9	3 654	3 830	23,3	1 565	1 644
Ensemble 15-49	100,0	15 928	15 928	100,0	6 727	6 731
50-64	na	na	na	na	868	864
Ensemble 15-64	na	na	na	100,0	7 595	7 595

Note : Le niveau d'instruction correspond au plus haut niveau d'instruction atteint, qu'il ait été achevé ou non.

na = Non applicable

Tableau 3.2.1 Niveau d'instruction : Femme

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années d'instruction achevées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Plus haut niveau d'instruction atteint						Total	Nombre médian d'années complétées	Effectif de femmes
	Aucun niveau	Primaire incomplet	Primaire complet ¹	Secondaire incomplet	Secondaire complet ²	Supérieur			
Groupe d'âges									
15-24	34,8	22,1	2,1	37,9	0,9	2,2	100,0	4,1	6 273
15-19	28,6	24,6	2,4	43,1	0,5	0,8	100,0	4,6	3 350
20-24	42,0	19,1	1,8	32,1	1,3	3,7	100,0	3,1	2 923
25-29	57,9	16,9	1,8	19,8	0,6	2,9	100,0	0,0	2 986
30-34	67,5	16,0	1,0	12,2	0,7	2,7	100,0	0,0	2 202
35-39	74,7	14,9	1,1	7,3	0,7	1,4	100,0	0,0	1 882
40-44	76,2	16,1	0,8	5,9	0,1	1,0	100,0	0,0	1 320
45-49	77,0	13,0	0,8	8,5	0,4	0,3	100,0	0,0	1 265
Résidence									
Cotonou	22,8	24,2	3,1	36,3	2,3	11,4	100,0	5,5	958
Autres villes	46,0	19,6	1,6	28,7	1,1	3,2	100,0	1,8	5 803
Ensemble urbain	42,7	20,2	1,8	29,7	1,2	4,3	100,0	2,7	6 761
Rural	64,3	16,7	1,4	16,9	0,3	0,4	100,0	0,0	9 167
Département									
Alibori	84,9	4,3	1,1	9,1	0,5	0,1	100,0	0,0	1 878
Atacora	66,7	13,4	1,4	17,9	0,3	0,3	100,0	0,0	1 302
Atlantique	40,7	25,8	2,0	25,1	1,7	4,7	100,0	2,4	2 037
Borgou	65,4	11,3	1,6	19,1	0,5	2,1	100,0	0,0	1 839
Collines	48,9	22,3	1,0	27,0	0,4	0,5	100,0	0,9	1 151
Couffo	53,8	23,1	0,9	21,5	0,2	0,5	100,0	0,0	1 041
Donga	60,5	18,7	2,2	17,7	0,3	0,6	100,0	0,0	881
Littoral	22,8	24,2	3,1	36,3	2,3	11,4	100,0	5,5	958
Mono	44,2	22,3	3,2	28,1	0,9	1,3	100,0	1,9	759
Ouémé	43,3	24,0	1,2	29,1	0,2	2,2	100,0	2,0	1 507
Plateau	62,2	18,1	1,1	18,1	0,3	0,3	100,0	0,0	970
Zou	51,4	19,4	1,1	26,7	0,4	1,0	100,0	0,0	1 606
Quintiles de bien-être économique									
Le plus bas	82,1	10,5	0,9	6,6	0,0	0,0	100,0	0,0	2 735
Second	69,6	16,7	1,2	12,4	0,1	0,0	100,0	0,0	3 030
Moyen	60,4	19,7	1,3	18,2	0,3	0,2	100,0	0,0	3 104
Quatrième	48,5	20,8	2,0	27,6	0,4	0,6	100,0	1,0	3 405
Le plus élevé	24,8	21,6	2,2	41,0	2,2	8,2	100,0	5,7	3 654
Ensemble	55,2	18,2	1,6	22,4	0,7	2,0	100,0	0,0	15 928

¹ A achevé avec succès 6 classes du niveau primaire.² A achevé avec succès 7 classes du niveau secondaire.

Tableau 3.2.2 Niveau d'instruction : Homme

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années d'instruction achevées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Plus haut niveau d'instruction atteint						Total	Nombre médian d'années complétées	Effectif d'hommes
	Aucun niveau	Primaire incomplet	Primaire complet ¹	Secondaire incomplet	Secondaire complet ²	Supérieur			
Groupe d'âges									
15-24	23,2	18,2	2,2	50,1	1,2	5,0	100,0	6,3	2 666
15-19	20,8	19,1	2,5	55,8	0,8	1,1	100,0	6,3	1 548
20-24	26,6	16,8	1,9	42,3	1,9	10,5	100,0	6,5	1 118
25-29	36,9	19,8	2,5	28,0	2,0	10,8	100,0	4,1	1 156
30-34	41,5	20,7	2,5	22,5	2,4	10,5	100,0	2,8	881
35-39	51,6	22,4	2,6	14,3	1,6	7,5	100,0	0,0	812
40-44	50,1	27,3	2,1	15,9	1,0	3,6	100,0	0,0	620
45-49	48,4	26,7	2,0	18,1	1,6	3,1	100,0	0,9	592
Résidence									
Cotonou	6,7	14,1	1,7	49,4	3,9	24,3	100,0	9,4	390
Autres villes	28,4	21,4	2,2	36,1	2,1	9,9	100,0	5,1	2 487
Ensemble urbain	25,4	20,4	2,1	37,9	2,3	11,9	100,0	5,8	2 877
Rural	44,0	21,3	2,5	28,3	1,0	2,9	100,0	2,2	3 849
Département									
Alibori	69,4	8,5	2,2	17,4	0,9	1,7	100,0	0,0	917
Atacora	47,4	17,5	1,4	28,6	1,5	3,6	100,0	2,0	560
Atlantique	15,7	30,2	1,9	39,8	2,1	10,3	100,0	5,6	822
Borgou	48,9	16,0	1,8	25,8	0,9	6,6	100,0	0,9	823
Collines	29,7	23,7	1,4	38,3	1,5	5,4	100,0	4,6	448
Couffo	26,8	28,1	3,6	33,3	2,9	5,4	100,0	4,5	409
Donga	39,1	23,3	5,4	26,4	1,8	4,0	100,0	3,1	445
Littoral	6,7	14,1	1,7	49,4	3,9	24,3	100,0	9,4	390
Mono	17,9	21,5	5,7	43,7	2,8	8,4	100,0	6,5	354
Ouémé	30,9	24,2	1,1	34,9	0,6	8,4	100,0	4,4	618
Plateau	43,3	29,3	1,4	21,6	1,3	3,1	100,0	2,0	340
Zou	24,9	24,1	2,5	43,1	0,9	4,6	100,0	5,2	600
Quintiles de bien-être économique									
Le plus bas	65,8	17,0	2,0	14,7	0,1	0,5	100,0	0,0	1 248
Second	48,4	22,7	1,8	25,8	0,6	0,8	100,0	0,9	1 315
Moyen	36,3	24,3	3,1	33,0	0,8	2,5	100,0	3,5	1 282
Quatrième	26,8	24,7	3,0	40,0	1,8	3,7	100,0	4,8	1 317
Le plus élevé	9,6	16,5	1,9	45,2	4,0	22,7	100,0	8,8	1 565
Ensemble 15-49	36,1	20,9	2,3	32,4	1,6	6,7	100,0	4,1	6 727
50-64	52,9	20,4	1,3	18,3	1,5	5,6	100,0	0,0	868
Ensemble 15-64	38,0	20,8	2,2	30,8	1,6	6,6	100,0	3,7	7 595

¹ A achevé avec succès 6 classes du niveau primaire.² A achevé avec succès 7 classes du niveau secondaire.

Tableau 3.3.1 Alphabétisation : Femme

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans par niveau d'instruction atteint et niveau d'alphabétisation et pourcentage de femmes alphabétisées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pas d'instruction, niveau primaire ou secondaire						Total	Pourcentage alphabétisée ¹	Effectif de femmes
	Supérieur	Peut lire une phrase entière	Peut lire une partie de phrase	Ne peut pas lire	Pas de carte dans la langue de l'enquêtée	Aveugle/ malvoyante			
Groupe d'âges									
15-24	2,2	39,4	9,6	48,7	0,2	0,0	100,0	51,1	6 273
15-19	0,8	45,1	11,1	42,8	0,2	0,0	100,0	57,0	3 350
20-24	3,7	32,8	7,8	55,5	0,2	0,0	100,0	44,3	2 923
25-29	2,9	20,6	6,4	69,5	0,6	0,1	100,0	29,8	2 986
30-34	2,7	16,0	5,4	75,4	0,5	0,0	100,0	24,1	2 202
35-39	1,4	12,6	5,6	79,6	0,7	0,2	100,0	19,6	1 882
40-44	1,0	11,5	3,6	83,3	0,5	0,0	100,0	16,1	1 320
45-49	0,3	12,1	4,9	82,1	0,3	0,2	100,0	17,3	1 265
Résidence									
Cotonou	11,4	45,8	9,9	31,8	1,0	0,2	100,0	67,0	958
Autres villes	3,2	32,8	6,8	56,6	0,4	0,1	100,0	42,8	5 803
Ensemble urbain	4,3	34,7	7,3	53,1	0,5	0,1	100,0	46,3	6 761
Rural	0,4	17,8	6,9	74,6	0,3	0,0	100,0	25,1	9 167
Département									
Alibori	0,1	10,4	3,1	86,4	0,0	0,0	100,0	13,6	1 878
Atacora	0,3	20,3	4,3	75,0	0,0	0,0	100,0	25,0	1 302
Atlantique	4,7	32,3	7,0	55,5	0,3	0,1	100,0	44,0	2 037
Borgou	2,1	19,1	9,6	68,4	0,8	0,1	100,0	30,8	1 839
Collines	0,5	26,8	10,2	62,3	0,2	0,0	100,0	37,5	1 151
Couffo	0,5	20,8	8,7	69,7	0,1	0,1	100,0	30,1	1 041
Donga	0,6	21,0	5,1	73,2	0,1	0,0	100,0	26,7	881
Littoral	11,4	45,8	9,9	31,8	1,0	0,2	100,0	67,0	958
Mono	1,3	32,1	8,8	56,3	1,3	0,1	100,0	42,3	759
Ouémé	2,2	34,5	5,2	57,8	0,1	0,2	100,0	41,9	1 507
Plateau	0,3	18,0	5,9	75,2	0,5	0,1	100,0	24,2	970
Zou	1,0	26,3	8,7	63,4	0,6	0,0	100,0	35,9	1 606
Quintiles de bien-être économique									
Le plus bas	0,0	7,6	3,7	88,5	0,2	0,0	100,0	11,3	2 735
Second	0,0	12,6	7,1	79,7	0,4	0,1	100,0	19,8	3 030
Moyen	0,2	19,8	6,6	72,9	0,5	0,0	100,0	26,6	3 104
Quatrième	0,6	29,9	8,8	60,3	0,4	0,1	100,0	39,3	3 405
Le plus élevé	8,2	48,1	8,2	34,8	0,5	0,2	100,0	64,5	3 654
Ensemble	2,0	25,0	7,1	65,5	0,4	0,1	100,0	34,1	15 928

¹ C'est-à-dire les femmes qui ont fréquenté l'école au niveau supérieur et celles qui peuvent lire une phrase entière ou une partie de phrase.

Tableau 3.3.2 Alphabétisation : Homme

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans par niveau d'instruction atteint et niveau d'alphabétisation et pourcentage d'hommes alphabétisés selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pas d'instruction, niveau primaire ou secondaire						Total	Pourcentage alphabétisé ¹	Effectif d'hommes
	Supérieur	Peut lire une phrase entière	Peut lire une partie de phrase	Ne peut pas lire	Pas de carte dans la langue de l'enquêté	Aveugle/ malvoyant			
Groupe d'âges									
15-24	5,0	53,1	8,6	32,6	0,5	0,1	100,0	66,8	2 666
15-19	1,1	58,8	8,3	31,2	0,3	0,2	100,0	68,3	1 548
20-24	10,5	45,3	8,9	34,5	0,8	0,0	100,0	64,7	1 118
25-29	10,8	32,1	10,3	45,1	1,4	0,3	100,0	53,2	1 156
30-34	10,5	27,9	12,0	46,6	2,8	0,3	100,0	50,3	881
35-39	7,5	22,2	8,9	58,7	2,5	0,2	100,0	38,6	812
40-44	3,6	25,4	9,8	57,9	3,2	0,0	100,0	38,8	620
45-49	3,1	30,6	9,3	54,5	2,0	0,5	100,0	43,0	592
Résidence									
Cotonou	24,3	57,4	6,6	10,6	0,7	0,4	100,0	88,3	390
Autres villes	9,9	42,0	9,6	36,6	1,8	0,1	100,0	61,5	2 487
Ensemble urbain	11,9	44,1	9,2	33,1	1,6	0,2	100,0	65,1	2 877
Rural	2,9	33,3	9,8	52,2	1,6	0,2	100,0	46,1	3 849
Département									
Alibori	1,7	21,2	16,0	60,9	0,0	0,1	100,0	39,0	917
Atacora	3,6	35,6	3,1	57,3	0,5	0,0	100,0	42,3	560
Atlantique	10,3	47,9	7,3	33,1	1,0	0,4	100,0	65,5	822
Borgou	6,6	27,6	7,5	55,5	2,6	0,1	100,0	41,8	823
Collines	5,4	43,5	6,5	44,5	0,0	0,0	100,0	55,5	448
Couffo	5,4	49,5	7,8	36,7	0,0	0,7	100,0	62,7	409
Donga	4,0	39,3	3,8	52,8	0,0	0,0	100,0	47,2	445
Littoral	24,3	57,4	6,6	10,6	0,7	0,4	100,0	88,3	390
Mono	8,4	47,7	16,6	26,9	0,0	0,5	100,0	72,6	354
Ouémé	8,4	36,2	14,8	38,0	2,4	0,2	100,0	59,4	618
Plateau	3,1	24,6	8,5	47,4	16,5	0,0	100,0	36,1	340
Zou	4,6	44,1	12,0	39,0	0,2	0,1	100,0	60,7	600
Quintiles de bien-être économique									
Le plus bas	0,5	20,2	9,3	67,5	2,1	0,4	100,0	29,9	1 248
Second	0,8	29,2	9,6	58,0	2,2	0,2	100,0	39,6	1 315
Moyen	2,5	38,0	9,0	48,3	2,1	0,1	100,0	49,6	1 282
Quatrième	3,7	47,2	10,9	36,5	1,5	0,1	100,0	61,9	1 317
Le plus élevé	22,7	51,6	8,9	16,2	0,4	0,2	100,0	83,2	1 565
Ensemble 15-49	6,7	37,9	9,5	44,0	1,6	0,2	100,0	54,2	6 727
50-64	5,6	27,3	6,3	58,2	2,1	0,4	100,0	39,3	868
Ensemble 15-64	6,6	36,7	9,2	45,6	1,6	0,2	100,0	52,5	7 595

¹ C'est-à-dire les hommes qui ont fréquenté l'école au niveau supérieur et ceux qui peuvent lire une phrase entière ou une partie de phrase.

Tableau 3.4.1 Exposition aux médias : Femme

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui sont exposées à certains médias, au moins, une fois par semaine, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Lit un journal, au moins, une fois par semaine	Regarde la télévision, au moins, une fois par semaine	Écoute la radio, au moins, une fois par semaine	Les trois médias, au moins, une fois par semaine	Aucun média, au moins, une fois par semaine	Effectif de femmes
Groupe d'âges						
15-19	6,5	22,0	31,0	2,5	59,4	3 350
20-24	4,7	22,6	35,6	2,2	55,2	2 923
25-29	3,3	22,1	37,5	2,1	54,8	2 986
30-34	3,5	21,9	36,8	2,6	56,5	2 202
35-39	2,7	19,1	36,9	2,1	57,7	1 882
40-44	2,1	17,8	38,0	1,6	56,8	1 320
45-49	2,2	14,4	38,0	1,6	58,4	1 265
Résidence						
Cotonou	9,1	60,7	59,2	7,1	21,6	958
Autres villes	6,4	29,8	38,5	3,7	50,4	5 803
Ensemble urbain	6,8	34,2	41,4	4,2	46,3	6 761
Rural	1,9	11,0	31,5	0,7	64,7	9 167
Département						
Alibori	1,5	12,4	26,2	0,7	69,5	1 878
Atacora	0,7	9,1	25,0	0,3	72,0	1 302
Atlantique	4,1	35,2	57,9	2,8	32,3	2 037
Borgou	6,3	14,8	24,7	2,8	67,9	1 839
Collines	1,8	12,4	27,7	0,8	67,9	1 151
Couffo	1,8	14,2	40,2	0,6	56,5	1 041
Donga	1,4	10,9	27,6	0,5	66,8	881
Littoral	9,1	60,7	59,2	7,1	21,6	958
Mono	6,6	20,0	42,5	3,9	53,5	759
Ouémé	7,9	26,6	38,6	4,8	50,9	1 507
Plateau	4,8	16,8	35,3	1,5	57,2	970
Zou	2,8	18,2	27,5	1,0	63,3	1 606
Niveau d'instruction						
Aucun	0,1	10,2	29,1	0,0	67,3	8 785
Primaire	2,4	23,7	39,2	1,2	52,6	3 148
Secondaire 1 ^{er} cycle	10,1	33,3	42,7	4,5	43,8	2 847
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	23,4	63,0	59,4	15,9	20,9	1 147
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	0,5	2,6	21,1	0,0	78,0	2 735
Second	1,1	4,0	25,7	0,1	72,7	3 030
Moyen	1,9	7,2	31,6	0,5	65,4	3 104
Quatrième	3,6	20,6	38,7	1,0	53,2	3 405
Le plus élevé	11,2	60,2	55,6	8,1	24,0	3 654
Ensemble	4,0	20,8	35,7	2,2	56,9	15 928

Tableau 3.4.2 Exposition aux médias : Homme

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui sont exposés à certains médias, au moins, une fois par semaine, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Lit un journal, au moins, une fois par semaine	Regarde la télévision, au mois, une fois par semaine	Écoute la radio, au moins, une fois par semaine	Les trois médias, au moins, une fois par semaine	Aucun média, au moins, une fois par semaine	Effectif d'hommes
Groupe d'âges						
15-19	3,5	25,9	41,6	1,3	48,5	1 548
20-24	5,9	27,4	50,3	3,5	42,6	1 118
25-29	7,6	28,0	51,8	4,2	40,7	1 156
30-34	8,8	29,2	54,1	5,4	39,8	881
35-39	6,0	24,5	53,3	4,4	41,7	812
40-44	6,5	29,2	59,1	5,2	36,7	620
45-49	5,8	24,1	56,1	3,4	39,0	592
Résidence						
Cotonou	15,2	73,7	67,6	11,7	10,6	390
Autres villes	7,7	37,4	53,8	5,3	37,1	2 487
Ensemble urbain	8,7	42,3	55,6	6,2	33,5	2 877
Rural	4,1	15,4	47,1	1,7	48,9	3 849
Département						
Alibori	5,9	11,7	35,4	1,2	58,7	917
Atacora	0,9	8,0	17,6	0,5	78,7	560
Atlantique	9,1	37,4	59,1	6,7	30,4	822
Borgou	4,5	30,5	50,6	3,1	40,2	823
Collines	7,2	30,9	70,3	3,7	25,0	448
Couffo	6,9	29,6	66,5	3,3	30,0	409
Donga	3,7	9,6	21,0	1,3	73,5	445
Littoral	15,2	73,7	67,6	11,7	10,6	390
Mono	5,6	22,0	46,0	3,8	47,9	354
Ouémé	6,8	24,5	40,2	4,3	53,0	618
Plateau	2,6	28,4	66,6	2,2	30,6	340
Zou	5,2	30,7	84,2	3,2	13,5	600
Niveau d'instruction						
Aucun	0,2	11,1	39,8	0,0	57,2	2 426
Primaire	2,2	22,4	53,2	0,9	41,5	1 562
Secondaire 1 ^{er} cycle	6,7	33,7	52,6	3,0	37,2	1 538
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	22,3	56,1	67,2	15,3	19,7	1 201
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	1,3	6,8	32,7	0,2	65,1	1 248
Second	3,2	8,4	48,2	0,7	49,3	1 315
Moyen	2,5	15,8	48,7	0,9	47,4	1 282
Quatrième	6,6	31,0	56,0	3,3	35,4	1 317
Le plus élevé	14,8	64,3	64,5	11,3	19,9	1 565
Ensemble 15-49	6,1	26,9	50,7	3,6	42,3	6 727
50-64	7,1	22,5	61,4	4,5	35,2	868
Ensemble 15-64	6,2	26,4	52,0	3,7	41,5	7 595

Tableau 3.5.1 Utilisation de l'internet : Femme

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont déjà utilisé l'internet et pourcentage qui l'ont utilisé au cours des 12 derniers mois ; parmi les femmes ayant utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois, répartition (en %) par fréquence d'utilisation au cours du mois dernier, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	A déjà utilisé l'internet	A utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois	Effectif de femmes	Parmi les femmes ayant utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois, pourcentage qui, au cours du mois dernier, l'ont utilisé :				Total	Effectif de femmes
				Presque chaque jour	Au moins une fois par semaine	Moins d'une fois par semaine	N'a pas utilisé du tout		
Groupe d'âges									
15-19	6,7	5,8	3 350	44,8	33,2	20,5	1,4	100,0	194
20-24	10,7	9,8	2 923	59,0	21,6	15,1	4,3	100,0	285
25-29	8,3	7,3	2 986	58,7	28,7	9,7	2,8	100,0	217
30-34	7,1	6,5	2 202	70,6	20,5	6,9	2,0	100,0	144
35-39	5,3	4,8	1 882	68,1	24,2	7,8	0,0	100,0	91
40-44	4,5	3,8	1 320	79,6	15,0	5,4	0,0	100,0	50
45-49	2,6	2,3	1 265	(43,9)	(34,5)	(21,6)	(0,0)	100,0	29
Résidence									
Cotonou	30,0	28,7	958	69,4	21,7	6,2	2,7	100,0	275
Autres villes	10,8	9,7	5 803	60,2	25,7	12,4	1,7	100,0	561
Ensemble urbain	13,5	12,4	6 761	63,2	24,4	10,4	2,0	100,0	836
Rural	2,4	1,9	9 167	40,4	30,8	24,8	4,0	100,0	175
Département									
Alibori	1,9	1,7	1 878	(66,7)	(21,5)	(11,7)	(0,0)	100,0	31
Atacora	4,4	4,1	1 302	(52,4)	(30,3)	(13,0)	(4,3)	100,0	53
Atlantique	13,4	11,9	2 037	66,3	21,9	10,3	1,5	100,0	242
Borgou	6,0	5,0	1 839	61,1	25,2	10,8	2,9	100,0	93
Collines	3,1	2,6	1 151	(29,6)	(37,0)	(30,9)	(2,6)	100,0	30
Couffo	1,6	1,6	1 041	*	*	*	*	100,0	17
Donga	3,6	2,8	881	(47,2)	(47,3)	(2,5)	(3,0)	100,0	25
Littoral	30,0	28,7	958	69,4	21,7	6,2	2,7	100,0	275
Mono	5,0	4,4	759	(50,3)	(32,7)	(16,9)	(0,0)	100,0	33
Ouémé	8,4	7,7	1 507	49,4	26,8	19,5	4,3	100,0	115
Plateau	4,5	3,7	970	(43,2)	(30,9)	(25,9)	(0,0)	100,0	35
Zou	4,7	3,9	1 606	40,8	29,0	27,9	2,3	100,0	62
Niveau d'instruction									
Aucun	0,5	0,3	8 785	(46,9)	(30,7)	(22,4)	(0,0)	100,0	29
Primaire	3,4	2,9	3 148	60,1	22,4	16,2	1,3	100,0	92
Secondaire 1 ^{er} cycle	11,8	9,8	2 847	44,0	32,9	19,1	4,0	100,0	280
Secondaire 2 ^e cycle ou plus	56,2	53,2	1 147	66,7	22,3	9,0	1,9	100,0	610
Quintiles de bien-être économique									
Le plus bas	0,4	0,3	2 735	*	*	*	*	100,0	8
Second	0,7	0,5	3 030	*	*	*	*	100,0	15
Moyen	1,5	1,2	3 104	(26,4)	(29,9)	(34,6)	(9,1)	100,0	37
Quatrième	5,1	4,1	3 405	47,4	27,3	21,9	3,4	100,0	141
Le plus élevé	24,1	22,2	3 654	63,9	24,6	9,5	2,0	100,0	811
Ensemble	7,1	6,3	15 928	59,3	25,5	12,9	2,4	100,0	1 011

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur au moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 3.5.2 Utilisation de l'internet : Homme

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont déjà utilisé l'internet et pourcentage qui l'ont utilisé au cours des 12 derniers mois ; parmi les hommes ayant utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois, répartition (en %) par fréquence d'utilisation au cours du mois dernier, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	A déjà utilisé l'internet	A utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois	Effectif d'hommes	Parmi les hommes ayant utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois, pourcentage qui, au cours du mois dernier, l'ont utilisé :				Total	Effectif d'hommes
				Presque chaque jour	Au moins une fois par semaine	Moins d'une fois par semaine	N'a pas utilisé du tout		
Groupe d'âges									
15-19	20,0	18,4	1 548	49,0	30,6	16,5	3,8	100,0	285
20-24	33,6	31,3	1 118	61,3	30,7	6,3	1,6	100,0	350
25-29	26,8	24,6	1 156	63,7	26,4	7,8	2,2	100,0	285
30-34	22,3	21,7	881	66,1	26,1	6,9	0,9	100,0	191
35-39	15,9	15,0	812	72,5	17,7	8,9	0,9	100,0	122
40-44	13,6	12,1	620	66,7	15,3	13,6	4,4	100,0	75
45-49	10,2	10,0	592	74,8	13,4	11,8	0,0	100,0	59
Résidence									
Cotonou	68,6	65,6	390	68,4	20,4	8,3	3,0	100,0	256
Autres villes	29,8	28,2	2 487	64,7	23,1	9,9	2,3	100,0	700
Ensemble urbain	35,0	33,2	2 877	65,7	22,4	9,5	2,5	100,0	957
Rural	11,9	10,7	3 849	52,8	35,8	10,1	1,3	100,0	410
Département									
Alibori	8,1	7,3	917	59,9	36,4	3,7	0,0	100,0	67
Atacora	11,4	10,5	560	80,8	11,1	4,7	3,3	100,0	59
Atlantique	32,3	30,6	822	60,5	28,2	10,2	1,0	100,0	252
Borgou	13,3	12,7	823	71,2	17,3	2,6	8,9	100,0	104
Collines	21,8	19,6	448	56,0	35,9	6,8	1,3	100,0	88
Couffo	18,1	15,0	409	41,1	42,5	13,5	2,9	100,0	61
Donga	16,5	15,9	445	69,1	14,9	16,1	0,0	100,0	71
Littoral	68,6	65,6	390	68,4	20,4	8,3	3,0	100,0	256
Mono	22,8	21,4	354	63,6	29,2	7,1	0,0	100,0	76
Ouémé	25,7	24,0	618	61,4	17,9	19,6	1,1	100,0	148
Plateau	14,8	13,8	340	(61,7)	(31,5)	(6,8)	(0,0)	100,0	47
Zou	24,8	23,1	600	46,4	41,1	10,2	2,3	100,0	139
Niveau d'instruction									
Aucun	2,6	2,2	2 426	48,8	38,5	12,7	0,0	100,0	53
Primaire	8,9	8,1	1 562	48,4	34,2	13,6	3,8	100,0	126
Secondaire 1 ^{er} cycle	27,2	24,7	1 538	51,3	32,6	13,1	3,1	100,0	380
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	70,3	67,3	1 201	69,7	21,4	7,3	1,6	100,0	808
Quintiles de bien-être économique									
Le plus bas	2,5	2,3	1 248	(49,7)	(38,5)	(8,9)	(2,8)	100,0	28
Second	5,8	5,0	1 315	34,9	43,6	17,9	3,6	100,0	66
Moyen	12,7	11,2	1 282	57,9	34,2	6,1	1,8	100,0	144
Quatrième	22,3	20,0	1 317	48,0	35,6	12,5	3,9	100,0	263
Le plus élevé	57,5	55,3	1 565	69,1	20,6	8,8	1,5	100,0	866
Ensemble 15-49	21,8	20,3	6 727	61,8	26,4	9,7	2,1	100,0	1 367
50-64	8,5	7,7	868	69,1	19,1	8,1	3,7	100,0	67
Ensemble 15-64	20,3	18,9	7 595	62,2	26,0	9,6	2,2	100,0	1 434

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Tableau 3.6.1 Emploi : Femme

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans en fonction du fait qu'elles travaillent ou non, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	A travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête		N'a pas travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête	Total	Effectif de femmes
	Travaille actuellement ¹	Ne travaille pas actuellement			
Groupe d'âges					
15-19	49,1	2,7	48,3	100,0	3 350
20-24	68,7	2,8	28,6	100,0	2 923
25-29	81,8	2,5	15,7	100,0	2 986
30-34	86,5	1,9	11,5	100,0	2 202
35-39	88,7	1,9	9,4	100,0	1 882
40-44	92,5	1,2	6,4	100,0	1 320
45-49	91,7	1,4	6,9	100,0	1 265
État matrimonial					
Célibataire	53,0	3,0	44,0	100,0	3 889
En union	82,3	2,0	15,6	100,0	11 168
En rupture d'union	90,9	1,3	7,8	100,0	871
Nombre d'enfants vivants					
0	54,4	3,0	42,6	100,0	4 244
1-2	76,1	2,5	21,5	100,0	4 464
3-4	87,2	1,8	11,0	100,0	3 863
5+	88,6	1,5	9,9	100,0	3 357
Résidence					
Cotonou	71,0	2,9	26,1	100,0	958
Autres villes	73,1	2,0	24,9	100,0	5 803
Ensemble urbain	72,8	2,2	25,0	100,0	6 761
Rural	77,7	2,3	20,0	100,0	9 167
Département					
Alibori	69,7	0,2	30,1	100,0	1 878
Atacora	81,2	3,7	15,1	100,0	1 302
Atlantique	75,0	3,5	21,5	100,0	2 037
Borgou	72,3	1,1	26,6	100,0	1 839
Collines	82,6	1,9	15,6	100,0	1 151
Couffo	80,8	5,0	14,2	100,0	1 041
Donga	60,0	2,9	37,1	100,0	881
Littoral	71,0	2,9	26,1	100,0	958
Mono	77,5	3,2	19,3	100,0	759
Ouémé	80,1	0,9	19,0	100,0	1 507
Plateau	80,4	1,8	17,8	100,0	970
Zou	77,9	1,8	20,2	100,0	1 606
Niveau d'instruction					
Aucun	82,0	1,7	16,2	100,0	8 785
Primaire	78,6	2,7	18,8	100,0	3 148
Secondaire 1 ^{er} cycle	61,0	2,8	36,2	100,0	2 847
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	55,0	3,4	41,6	100,0	1 147
Quintiles de bien-être économique					
Le plus bas	77,1	1,7	21,2	100,0	2 735
Second	76,7	2,5	20,8	100,0	3 030
Moyen	77,3	2,8	19,9	100,0	3 104
Quatrième	76,3	2,0	21,7	100,0	3 405
Le plus élevé	71,6	2,1	26,3	100,0	3 654
Ensemble	75,6	2,2	22,1	100,0	15 928

¹ « Travaille actuellement » signifie que les femmes ont travaillé au cours des 7 derniers jours. En outre, les femmes qui n'ont pas travaillé au cours des 7 derniers jours mais qui ont un emploi régulier et qui étaient absentes parce qu'elles étaient en congé, malades ou en vacances ou encore pour d'autres raisons sont incluses ici.

Tableau 3.6.2 Emploi : Homme

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans en fonction du fait qu'ils travaillent ou non, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	A travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête		N'a pas travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête	Total	Effectif d'hommes
	Travaille actuellement ¹	Ne travaille pas actuellement			
Groupe d'âges					
15-19	56,4	6,0	37,6	100,0	1 548
20-24	77,0	5,2	17,8	100,0	1 118
25-29	94,2	2,2	3,6	100,0	1 156
30-34	97,2	1,7	1,1	100,0	881
35-39	98,5	1,1	0,5	100,0	812
40-44	97,2	1,9	0,9	100,0	620
45-49	96,2	2,3	1,4	100,0	592
État matrimonial					
Célibataire	65,8	5,4	28,8	100,0	2 860
En union	97,6	1,8	0,6	100,0	3 675
En rupture d'union	95,6	2,2	2,1	100,0	191
Nombre d'enfants vivants					
0	68,3	5,0	26,7	100,0	3 089
1-2	96,3	2,7	1,0	100,0	1 232
3-4	98,4	1,3	0,3	100,0	1 038
5+	97,4	1,8	0,8	100,0	1 367
Résidence					
Cotonou	69,4	5,6	25,0	100,0	390
Autres villes	82,2	2,4	15,4	100,0	2 487
Ensemble urbain	80,5	2,8	16,7	100,0	2 877
Rural	86,7	3,7	9,6	100,0	3 849
Département					
Alibori	97,0	1,0	2,0	100,0	917
Atacora	89,9	2,6	7,4	100,0	560
Atlantique	77,3	3,2	19,4	100,0	822
Borgou	92,7	2,8	4,5	100,0	823
Collines	80,6	10,8	8,6	100,0	448
Couffo	72,7	7,4	19,9	100,0	409
Donga	87,4	0,7	12,0	100,0	445
Littoral	69,4	5,6	25,0	100,0	390
Mono	73,2	3,1	23,7	100,0	354
Ouémé	79,2	1,5	19,4	100,0	618
Plateau	84,3	0,1	15,6	100,0	340
Zou	84,4	4,4	11,2	100,0	600
Niveau d'instruction					
Aucun	96,3	1,1	2,6	100,0	2 426
Primaire	89,1	2,8	8,1	100,0	1 562
Secondaire 1 ^{er} cycle	70,5	5,3	24,2	100,0	1 538
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	69,8	6,2	24,0	100,0	1 201
Quintiles de bien-être économique					
Le plus bas	92,7	2,2	5,1	100,0	1 248
Second	88,8	3,0	8,2	100,0	1 315
Moyen	83,1	3,4	13,5	100,0	1 282
Quatrième	80,9	4,1	15,0	100,0	1 317
Le plus élevé	76,3	3,8	19,9	100,0	1 565
Ensemble 15-49	84,0	3,3	12,7	100,0	6 727
50-64	91,7	2,2	6,1	100,0	868
Ensemble 15-64	84,9	3,2	11,9	100,0	7 595

¹ « Travaille actuellement » signifie que les hommes ont travaillé au cours des 7 derniers jours. En outre, les hommes qui n'ont pas travaillé au cours des 7 derniers jours mais qui ont un emploi régulier et qui étaient absents parce qu'ils étaient en congé, malades ou en vacances ou encore pour d'autres raisons sont inclus ici.

Tableau 3.7.1 Occupation : Femme

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans ayant eu un emploi au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête par type d'activités, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Agriculture ¹	Industrie ²	Commerce ³	Activités financières et d'assurance	Activités professionnelles ⁴	Administration ⁵	Autres activités de services	Manquant	Total	Effectif de femmes
Groupe d'âges										
15-19	19,7	27,0	22,9	0,0	1,1	0,7	16,8	11,8	100,0	1 732
20-24	21,6	22,2	34,7	0,1	2,8	2,1	5,8	10,6	100,0	2 088
25-29	21,9	14,9	47,4	0,1	3,9	1,9	2,0	7,9	100,0	2 517
30-34	24,6	9,8	52,4	0,3	4,5	1,5	1,8	5,1	100,0	1 948
35-39	24,9	9,5	55,5	0,2	3,1	1,1	1,8	3,8	100,0	1 705
40-44	27,1	10,0	56,8	0,2	1,8	0,6	1,9	1,6	100,0	1 236
45-49	25,8	8,4	60,9	0,0	1,8	0,6	1,4	1,3	100,0	1 177
État matrimonial										
Célibataire	11,5	26,7	27,8	0,2	3,1	2,5	16,3	11,9	100,0	2 177
En union	26,3	13,0	49,0	0,1	2,8	1,1	2,1	5,6	100,0	9 424
En rupture d'union	19,4	9,2	59,5	0,1	3,3	1,0	2,4	5,1	100,0	802
Nombre d'enfants vivants										
0	14,2	25,9	27,7	0,2	3,9	2,1	14,9	11,0	100,0	2 436
1-2	20,8	17,6	42,6	0,2	4,3	2,0	2,9	9,8	100,0	3 506
3-4	23,0	11,7	54,5	0,1	2,9	1,2	1,7	4,9	100,0	3 439
5+	33,7	7,7	54,9	0,0	0,5	0,2	1,6	1,4	100,0	3 023
Résidence										
Cotonou	0,0	8,8	59,2	1,0	8,0	2,6	8,2	12,1	100,0	707
Autres villes	12,4	15,5	53,1	0,2	4,7	1,8	4,9	7,4	100,0	4 360
Ensemble urbain	10,6	14,6	54,0	0,3	5,2	1,9	5,3	8,0	100,0	5 068
Rural	32,0	15,6	40,4	0,0	1,3	0,9	4,1	5,7	100,0	7 336
Département										
Alibori	33,7	11,7	47,7	0,1	1,1	0,4	2,4	3,0	100,0	1 313
Atacora	51,5	12,4	22,6	0,0	1,0	0,4	8,7	3,4	100,0	1 105
Atlantique	6,3	15,9	56,1	0,2	5,3	2,0	4,1	10,2	100,0	1 598
Borgou	39,2	16,8	31,6	0,1	1,8	1,6	6,1	2,7	100,0	1 349
Collines	33,1	19,3	30,2	0,0	2,0	1,8	7,0	6,6	100,0	972
Couffo	41,4	13,4	36,7	0,0	1,2	0,6	1,6	5,0	100,0	894
Donga	21,1	20,2	48,4	0,2	1,3	1,6	4,5	2,9	100,0	554
Littoral	0,0	8,8	59,2	1,0	8,0	2,6	8,2	12,1	100,0	707
Mono	13,6	20,7	48,2	0,0	4,2	1,4	2,7	9,3	100,0	613
Ouémé	3,2	12,8	68,1	0,1	4,3	0,9	1,1	9,5	100,0	1 221
Plateau	16,3	18,2	53,0	0,0	1,9	1,3	1,7	7,7	100,0	797
Zou	14,5	15,9	50,2	0,0	3,0	1,8	6,7	8,0	100,0	1 281
Niveau d'instruction										
Aucun	33,5	12,8	47,0	0,0	0,3	0,2	2,1	4,1	100,0	7 358
Primaire	11,1	24,2	45,5	0,1	1,2	0,3	3,6	13,9	100,0	2 557
Secondaire 1 ^{er} cycle	7,0	16,1	45,6	0,0	5,6	4,9	12,8	8,0	100,0	1 818
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	1,3	3,9	37,3	1,9	30,0	8,6	13,5	3,4	100,0	670
Quintiles de bien-être économique										
Le plus bas	53,5	10,4	30,2	0,0	0,4	0,2	3,3	2,0	100,0	2 156
Second	37,9	15,4	36,1	0,0	0,7	0,7	3,4	5,8	100,0	2 401
Moyen	23,1	16,9	47,4	0,0	0,7	0,6	5,0	6,4	100,0	2 487
Quatrième	8,0	19,8	55,4	0,1	2,2	1,8	4,4	8,2	100,0	2 666
Le plus élevé	1,3	12,6	56,6	0,4	9,7	3,1	6,6	9,7	100,0	2 693
Ensemble	23,3	15,2	46,0	0,1	2,9	1,3	4,6	6,6	100,0	12 403

¹ Comprend : Agriculture, sylviculture et pêche² Comprend : Activités de fabrication, activités extractives et autres activités industrielles³ Comprend : Commerce de gros et détails, transport et entreposage, activités d'hébergements et de restauration⁴ Comprend : Activités professionnelles, scientifiques et techniques administration et appui administratif & support⁵ Comprend : Administration publique et défense, éducation, santé humaine et activités d'action

Tableau 3.7.2 Occupation : Homme

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans qui travaillent au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête par type d'activités, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Agriculture ¹	Industrie ²	Commerce ³	Information et communication	Activités financières et d'assurance	Activités professionnelles ⁴	Administration ⁵	Autre	Manquant	Total	Effectif d'hommes
Groupe d'âges											
15-19	45,9	9,4	16,2	1,5	0,1	1,2	0,2	23,1	2,5	100,0	965
20-24	43,4	11,5	20,4	4,6	0,6	3,1	1,5	11,7	3,1	100,0	919
25-29	43,7	11,0	20,3	7,6	0,3	8,7	2,3	3,9	2,1	100,0	1 114
30-34	42,0	10,6	17,5	10,1	0,3	11,5	2,6	3,0	2,3	100,0	871
35-39	43,7	11,4	19,9	8,7	0,2	9,9	2,4	1,9	1,8	100,0	808
40-44	45,7	12,4	21,1	7,9	0,6	6,4	2,5	1,8	1,6	100,0	614
45-49	54,8	12,0	17,5	5,1	0,0	5,1	1,9	2,3	1,3	100,0	583
État matrimonial											
Célibataire	41,7	10,3	19,5	2,7	0,5	4,4	1,4	16,7	2,7	100,0	2 035
En union	47,2	11,3	18,4	8,4	0,2	7,8	2,1	2,6	1,9	100,0	3 653
En rupture d'union	40,6	13,5	24,0	8,3	0,2	7,1	1,5	3,5	1,4	100,0	187
Nombre d'enfants vivants											
0	41,9	10,5	19,7	2,8	0,5	4,7	1,5	15,6	2,8	100,0	2 264
1-2	40,6	10,7	20,4	8,8	0,4	11,2	2,2	3,5	2,2	100,0	1 220
3-4	43,3	12,1	19,1	9,4	0,3	8,0	3,1	2,1	2,6	100,0	1 035
5+	55,7	11,5	16,5	8,1	0,0	4,4	1,3	1,8	0,8	100,0	1 356
Résidence											
Cotonou	1,4	13,1	32,9	7,7	3,1	20,6	4,4	9,3	7,5	100,0	293
Autres villes	28,4	11,6	26,6	9,2	0,4	9,3	2,8	8,6	3,0	100,0	2 104
Ensemble urbain	25,1	11,8	27,4	9,0	0,7	10,7	3,0	8,7	3,5	100,0	2 397
Rural	58,8	10,5	13,2	4,6	0,0	3,7	1,1	6,7	1,3	100,0	3 479
Département											
Alibori	78,2	4,9	5,5	2,5	0,0	1,6	1,3	5,9	0,2	100,0	898
Atacora	70,8	8,5	8,6	1,3	0,0	4,0	0,5	5,9	0,4	100,0	518
Atlantique	23,7	22,3	22,6	9,2	0,2	8,5	2,5	7,1	3,8	100,0	662
Borgou	59,3	6,2	16,3	4,5	0,0	3,0	1,9	8,1	0,7	100,0	786
Collines	52,0	5,3	15,3	4,6	0,0	5,6	0,9	15,2	1,0	100,0	410
Couffo	32,8	14,8	22,7	10,7	0,6	10,2	2,8	0,8	4,5	100,0	328
Donga	55,7	5,3	13,9	8,1	0,7	5,1	1,1	9,3	0,8	100,0	392
Littoral	1,4	13,1	32,9	7,7	3,1	20,6	4,4	9,3	7,5	100,0	293
Mono	27,5	25,6	23,2	4,0	0,0	10,9	1,0	4,6	3,3	100,0	271
Ouémé	13,6	15,9	36,3	10,8	0,5	10,8	2,7	4,8	4,7	100,0	499
Plateau	47,3	11,2	24,0	5,9	0,0	5,6	2,9	1,8	1,2	100,0	287
Zou	25,3	10,4	27,0	11,6	0,2	6,7	1,8	14,4	2,6	100,0	533
Niveau d'instruction											
Aucun	69,9	9,0	11,8	6,1	0,0	0,7	0,5	1,0	0,9	100,0	2 362
Primaire	37,2	16,6	27,1	9,5	0,0	2,4	1,0	2,8	3,3	100,0	1 435
Secondaire 1 ^{er} cycle	28,9	12,2	25,1	6,3	0,2	4,6	3,1	16,6	2,9	100,0	1 165
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	13,7	6,0	17,0	2,7	1,8	30,8	5,0	20,2	2,8	100,0	913
Quintiles de bien-être économique											
Le plus bas	83,8	4,8	4,5	2,0	0,0	0,5	0,7	3,0	0,6	100,0	1 185
Second	64,9	10,8	10,0	4,1	0,0	1,1	0,6	7,6	0,8	100,0	1 208
Moyen	48,6	11,9	18,6	7,2	0,0	3,2	1,3	7,4	1,8	100,0	1 109
Quatrième	24,6	15,3	27,9	10,9	0,3	7,6	2,7	8,4	2,3	100,0	1 120
Le plus élevé	4,4	12,6	33,7	8,2	1,3	19,6	4,0	11,0	5,2	100,0	1 254
Ensemble 15-49	45,1	11,0	19,0	6,4	0,3	6,6	1,9	7,5	2,2	100,0	5 875
50-64	56,9	9,6	13,7	4,3	0,0	7,5	2,8	3,3	1,8	100,0	816
Ensemble 15-64	46,5	10,9	18,3	6,2	0,3	6,7	2,0	7,0	2,1	100,0	6 691

¹ Comprend : Agriculture, sylviculture et pêche² Comprend : Activités de fabrication, activités extractives et autres activités industrielles³ Comprend : Commerce de gros et détails, transport et entreposage, activités d'hébergements et de restauration⁴ Comprend : Activités professionnelles, scientifiques et techniques administration et appui administratif & support⁵ Comprend : Administration publique et défense, éducation, santé humaine et activités d'action

Tableau 3.8 Type d'emploi : Femme

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans qui travaillaient au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête en fonction du type de rémunération, du type d'employeur et de la régularité de l'emploi, selon le secteur d'activité (agricole ou non-agricole), EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique de l'emploi	Travail agricole	Travail non agricole	Manquant	Ensemble
Type de rémunération				
En argent seulement	25,7	78,0	74,3	65,6
En argent et en nature	34,9	6,0	1,5	12,4
En nature seulement	4,2	0,5	0,0	1,3
Pas payée	35,3	15,5	24,2	20,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Type d'employeur				
Employée par un membre de la famille	38,9	7,9	4,0	14,8
Employée par quelqu'un qui n'est pas membre de la famille	3,0	9,0	15,6	8,1
Travaille à son propre compte	58,0	83,1	80,4	77,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Régularité de l'emploi				
Toute l'année	31,2	80,5	84,1	69,3
Saisonnier	61,5	9,7	5,2	21,4
Occasionnel	7,3	9,8	10,7	9,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes qui travaillaient au cours des 12 derniers mois	2 885	8 695	823	12 403

Note : L'ensemble comprend les femmes dont l'information sur le type d'emploi est manquante et qui ne sont pas présentées séparément.

Tableau 3.9.1 Couverture médicale : Femme

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant une assurance médicale selon certaines caractéristiques, sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Sécurité sociale	Autre assurance fournie par l'employeur	Mutuelle de santé/ assurance communautaire	Souscription individuelle à une assurance privée/autre	Aucune	Effectif de femmes
Groupe d'âges						
15-19	0,1	0,3	0,1	0,1	99,4	3 350
20-24	0,1	0,4	0,1	0,0	99,4	2 923
25-29	0,1	0,6	0,1	0,1	99,0	2 986
30-34	0,2	1,1	0,2	0,2	98,4	2 202
35-39	0,2	0,6	0,1	0,1	99,0	1 882
40-44	0,1	1,1	0,2	0,4	98,3	1 320
45-49	0,2	0,8	0,3	0,2	98,4	1 265
Résidence						
Cotonou	0,3	2,8	0,6	0,6	95,7	958
Autres villes	0,2	0,9	0,1	0,2	98,6	5 803
Ensemble urbain	0,2	1,1	0,2	0,2	98,2	6 761
Rural	0,0	0,2	0,1	0,1	99,5	9 167
Département						
Alibori	0,0	0,2	0,0	0,0	99,7	1 878
Atacora	0,3	0,1	0,1	0,1	99,5	1 302
Atlantique	0,2	1,7	0,3	0,2	97,7	2 037
Borgou	0,3	0,4	0,2	0,2	99,0	1 839
Collines	0,1	0,1	0,1	0,1	99,5	1 151
Couffo	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1 041
Donga	0,0	0,1	0,0	0,0	99,9	881
Littoral	0,3	2,8	0,6	0,6	95,7	958
Mono	0,3	0,8	0,3	0,3	98,3	759
Ouémé	0,0	0,4	0,1	0,4	99,1	1 507
Plateau	0,0	0,7	0,0	0,1	99,3	970
Zou	0,1	0,3	0,0	0,1	99,6	1 606
Niveau d'instruction						
Aucun	0,0	0,1	0,0	0,1	99,8	8 785
Primaire	0,1	0,5	0,2	0,1	99,1	3 148
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,2	0,8	0,2	0,2	98,6	2 847
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	0,9	4,4	0,5	0,9	93,3	1 147
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	0,0	0,1	0,0	0,0	99,9	2 735
Second	0,0	0,0	0,1	0,1	99,7	3 030
Moyen	0,0	0,0	0,1	0,0	99,8	3 104
Quatrième	0,1	0,2	0,1	0,1	99,5	3 405
Le plus élevé	0,4	2,5	0,2	0,5	96,4	3 654
Ensemble	0,1	0,6	0,1	0,2	99,0	15 928

Tableau 3.9.2 Assurance médicale : Homme

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans ayant une assurance médicale, selon certaines caractéristiques, sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Sécurité sociale	Autre assurance fournie par l'employeur	Mutuelle de santé/assurance communautaire	Souscription individuelle à une assurance privée/autre	Aucune	Effectif d'hommes
Groupe d'âges						
15-19	0,1	0,4	0,2	0,1	99,3	1 548
20-24	0,2	0,7	0,2	0,0	98,9	1 118
25-29	0,0	0,4	0,3	0,1	99,3	1 156
30-34	0,0	1,4	0,6	0,2	97,7	881
35-39	0,2	2,1	0,6	0,1	97,3	812
40-44	0,0	0,5	0,9	0,2	98,5	620
45-49	0,0	1,1	0,8	0,2	98,1	592
Résidence						
Cotonou	1,0	4,2	1,1	0,9	93,2	390
Autres villes	0,1	1,1	0,5	0,0	98,4	2 487
Ensemble urbain	0,2	1,5	0,5	0,1	97,7	2 877
Rural	0,0	0,3	0,3	0,0	99,3	3 849
Département						
Alibori	0,0	0,0	0,1	0,0	99,9	917
Atacora	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	560
Atlantique	0,1	2,7	0,7	0,0	96,5	822
Borgou	0,2	0,6	1,6	0,0	97,9	823
Collines	0,0	0,4	0,6	0,3	98,7	448
Couffo	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	409
Donga	0,0	0,2	0,0	0,0	99,8	445
Littoral	1,0	4,2	1,1	0,9	93,2	390
Mono	0,0	1,0	0,0	0,0	99,0	354
Ouémé	0,0	0,3	0,0	0,0	99,7	618
Plateau	0,0	0,2	0,0	0,0	99,8	340
Zou	0,0	0,7	0,2	0,4	98,8	600
Niveau d'instruction						
Aucun	0,0	0,0	0,2	0,0	99,7	2 426
Primaire	0,0	0,2	0,4	0,0	99,5	1 562
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,0	0,7	0,5	0,1	98,7	1 538
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	0,5	3,6	0,8	0,2	95,2	1 201
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	0,0	0,0	0,1	0,0	99,9	1 248
Second	0,0	0,2	0,2	0,2	99,4	1 315
Moyen	0,0	0,1	0,5	0,0	99,4	1 282
Quatrième	0,0	0,6	0,4	0,0	99,0	1 317
Le plus élevé	0,4	2,8	0,8	0,3	95,9	1 565
Ensemble 15-49	0,1	0,8	0,4	0,1	98,6	6 727
50-64	0,1	1,8	0,2	0,3	97,6	868
Ensemble 15-64	0,1	0,9	0,4	0,1	98,5	7 595

Tableau 3.10.1 Consommation de tabac à fumer : Femme

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui fument du tabac sous différentes formes, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage qui fume : ¹			Effectif de femmes
	Des cigarettes ²	D'autres types de tabac ³	N'importe quel type de tabac	
Groupe d'âges				
15-19	1,3	0,1	1,4	3 350
20-24	1,6	0,0	1,6	2 923
25-29	1,5	0,3	1,6	2 986
30-34	1,0	0,1	1,0	2 202
35-39	1,4	0,1	1,4	1 882
40-44	0,9	0,0	0,9	1 320
45-49	1,6	0,0	1,6	1 265
Résidence				
Cotonou	1,7	0,0	1,7	958
Autres villes	0,7	0,1	0,8	5 803
Ensemble urbain	0,9	0,1	0,9	6 761
Rural	1,7	0,1	1,7	9 167
Département				
Alibori	5,8	0,0	5,8	1 878
Atacora	0,3	0,0	0,3	1 302
Atlantique	0,0	0,0	0,0	2 037
Borgou	2,9	0,9	3,1	1 839
Collines	0,2	0,0	0,2	1 151
Couffo	0,1	0,0	0,1	1 041
Donga	0,2	0,0	0,2	881
Littoral	1,7	0,0	1,7	958
Mono	0,7	0,0	0,7	759
Ouémé	0,3	0,0	0,3	1 507
Plateau	1,9	0,1	1,9	970
Zou	0,1	0,0	0,1	1 606
Niveau d'instruction				
Aucun	1,9	0,2	2,0	8 785
Primaire	0,6	0,0	0,6	3 148
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,6	0,0	0,6	2 847
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	1,0	0,0	1,0	1 147
Quintiles de bien-être économique				
Le plus bas	1,9	0,5	2,0	2 735
Second	2,5	0,2	2,5	3 030
Moyen	1,2	0,0	1,2	3 104
Quatrième	0,8	0,0	0,8	3 405
Le plus élevé	0,6	0,0	0,6	3 654
Ensemble	1,4	0,1	1,4	15 928

¹ Y compris un usage quotidien et occasionnel (pas tous les jours).

² Les cigarettes incluent les kreteks.

³ Comprend les pipes à tabac, les cigares, les cheroots, les cigarillos et les pipes à eau

Tableau 3.10.2 Consommation de tabac à fumer : Homme

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui fument du tabac sous différentes formes et répartition (en %) des hommes en fonction de la fréquence de consommation, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage qui fume : ¹			Fréquence			Total	Effectif d'hommes
	Des cigarettes ²	D'autres types de tabac ³	N'importe quel type de tabac	Quotidienne	Occasionnel ⁴	Non-fumeur		
Groupe d'âges								
15-19	1,3	0,2	1,3	0,8	0,6	98,6	100,0	1 548
20-24	4,5	0,5	4,7	2,9	1,8	95,3	100,0	1 118
25-29	7,4	0,9	7,7	5,0	2,8	92,2	100,0	1 156
30-34	9,4	0,7	9,9	6,2	3,8	90,0	100,0	881
35-39	9,5	1,4	10,5	7,9	2,7	89,4	100,0	812
40-44	10,0	0,6	10,5	7,1	3,4	89,5	100,0	620
45-49	10,4	0,3	10,7	8,7	2,1	89,3	100,0	592
Résidence								
Cotonou	2,9	1,4	3,7	1,2	2,8	96,0	100,0	390
Autres villes	5,3	0,4	5,5	3,7	1,8	94,5	100,0	2 487
Ensemble urbain	5,0	0,5	5,2	3,3	1,9	94,7	100,0	2 877
Rural	7,7	0,7	8,1	5,7	2,5	91,8	100,0	3 849
Département								
Alibori	2,9	0,7	3,6	3,0	0,7	96,2	100,0	917
Atacora	14,1	0,1	14,1	11,6	2,4	85,9	100,0	560
Atlantique	6,7	0,6	7,0	3,7	3,3	93,0	100,0	822
Borgou	11,9	2,1	13,2	9,7	3,6	86,7	100,0	823
Collines	9,2	0,7	9,2	5,4	3,8	90,8	100,0	448
Couffo	5,3	0,0	5,3	2,9	2,6	94,5	100,0	409
Donga	6,4	0,0	6,4	6,0	0,4	93,6	100,0	445
Littoral	2,9	1,4	3,7	1,2	2,8	96,0	100,0	390
Mono	1,9	0,3	1,9	1,4	0,6	98,1	100,0	354
Ouémé	0,9	0,1	0,9	0,6	0,4	99,0	100,0	618
Plateau	11,4	0,0	11,4	5,8	5,6	88,6	100,0	340
Zou	4,7	0,4	4,7	2,9	1,7	95,3	100,0	600
Niveau d'instruction								
Aucun	10,3	1,1	11,0	8,3	2,8	88,9	100,0	2 426
Primaire	7,9	0,3	8,0	5,2	3,0	91,8	100,0	1 562
Secondaire 1 ^{er} cycle	3,0	0,3	3,2	1,8	1,3	96,8	100,0	1 538
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	1,7	0,3	1,8	0,6	1,3	98,1	100,0	1 201
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	11,4	1,8	12,5	9,7	3,0	87,3	100,0	1 248
Second	9,9	0,4	10,1	7,6	2,6	89,8	100,0	1 315
Moyen	5,7	0,1	5,7	3,5	2,2	94,3	100,0	1 282
Quatrième	3,6	0,4	3,7	2,5	1,3	96,2	100,0	1 317
Le plus élevé	3,1	0,5	3,3	1,2	2,2	96,6	100,0	1 565
Ensemble 15-49	6,5	0,6	6,9	4,7	2,2	93,0	100,0	6 727
50-64	9,5	0,3	9,6	7,6	2,1	90,3	100,0	868
Ensemble 15-64	6,9	0,6	7,2	5,0	2,2	92,7	100,0	7 595

¹ Y compris un usage quotidien et occasionnel (pas tous les jours).

² Les cigarettes incluent les kreteks.

³ Comprend les pipes à tabac, les cigares, les cheroots, les cigarillos et les pipes à eau

⁴ Occasionnel comprenant un usage moins que quotidien

Tableau 3.11 Nombre moyen de cigarettes fumées par jour : Homme

Parmi les hommes de 15-49 ans qui fument des cigarettes tous les jours, répartition (en %) par nombre moyen de cigarettes fumées par jour, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour ¹					Total	Effectif d'hommes qui fument des cigarettes tous les jours ¹
	<5	5-9	10-14	15-24	≥25		
Groupe d'âges							
15-19	*	*	*	*	*	100,0	10
20-24	(59,5)	(22,3)	(5,5)	(0,0)	(12,7)	100,0	31
25-29	37,1	28,7	10,7	7,1	16,3	100,0	56
30-34	40,8	35,7	13,2	5,6	4,7	100,0	53
35-39	54,2	25,8	6,8	4,4	8,8	100,0	59
40-44	(50,0)	(30,0)	(10,5)	(5,3)	(4,2)	100,0	40
45-49	54,0	29,1	9,3	3,3	4,3	100,0	50
Résidence							
Cotonou	*	*	*	*	*	100,0	4
Autres villes	53,0	28,7	6,5	6,7	5,1	100,0	84
Ensemble urbain	53,3	28,9	6,6	6,4	4,8	100,0	89
Rural	46,2	28,3	11,0	3,6	10,9	100,0	209
Département							
Alibori	*	*	*	*	*	100,0	22
Atacora	46,5	30,6	14,5	6,6	1,8	100,0	62
Atlantique	*	*	*	*	*	100,0	30
Borgou	55,3	24,1	16,6	2,8	1,1	100,0	73
Collines	(33,8)	(36,3)	(8,9)	(4,2)	(16,8)	100,0	24
Couffo	*	*	*	*	*	100,0	12
Donga	(42,3)	(32,4)	(12,2)	(7,0)	(6,1)	100,0	27
Littoral	*	*	*	*	*	100,0	4
Mono	*	*	*	*	*	100,0	5
Ouémé	*	*	*	*	*	100,0	3
Plateau	*	*	*	*	*	100,0	20
Zou	*	*	*	*	*	100,0	16
Niveau d'instruction							
Aucun	49,3	26,8	10,6	5,3	8,0	100,0	187
Primaire	42,7	35,1	10,8	0,0	11,4	100,0	78
Secondaire 1 ^{er} cycle	*	*	*	*	*	100,0	25
Secondaire 2 ^e cycle ou plus	*	*	*	*	*	100,0	7
Quintiles de bien-être économique							
Le plus bas	42,2	25,1	9,6	9,3	13,8	100,0	105
Second	55,3	24,7	11,8	1,2	7,0	100,0	99
Moyen	(42,2)	(40,3)	(7,2)	(0,0)	(10,3)	100,0	43
Quatrième	(55,1)	(31,8)	(5,8)	(7,4)	(0,0)	100,0	31
Le plus élevé	*	*	*	*	*	100,0	19
Ensemble 15-49	48,3	28,5	9,7	4,5	9,1	100,0	298
50-64	42,2	23,5	21,8	9,2	3,3	100,0	65
Ensemble 15-64	47,2	27,6	11,8	5,3	8,1	100,0	362

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur au moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Comprend les cigarettes achetées en commerce, les cigarettes roulées à la main et les kreteks.

Tableau 3.12 Consommation de tabac non fumé et de tabac sous n'importe quelle forme

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui consomment actuellement du tabac non fumé par type de tabac et pourcentage qui consomme du tabac sous n'importe quelle forme, EDSB-V Bénin 2017-2018

Type de tabac	Femme	Homme
Tabac à prise, par la bouche	0,9	1,0
Tabac à prise, par voie nasale	0,1	6,3
Tabac à chiquer	0,1	0,2
Autre type de tabac non fumé	0,0	0,1
N'importe quel type de tabac non fumé ¹	1,0	6,9
N'importe quel type de tabac ²	2,7	12,9
Effectif	15 928	6 727

Note : Le tableau comprend les femmes et les hommes qui consomment du tabac non fumé tous les jours ou de manière occasionnelle (pas tous les jours).

¹ Comprend le tabac à priser dans la bouche, le tabac à prisé par voie nasale, le tabac à chiquer.

² Comprend tous les types de tabac non fumé figurant dans ce tableau plus les cigarettes, les kreteks, les pipes, les cigares, cheroots, cigarillos et pipes à eau

Résultats clés

- **État matrimonial actuel** : Sept femmes de 15-49 ans sur dix (70 %) et un peu plus de la moitié des hommes du même groupe d'âges (55 %) étaient en union au moment de l'enquête. Environ deux adolescentes (15-19 ans) sur dix (18 %) étaient déjà en union.
- **Polygamie** : Environ deux femmes de 15-49 ans en union sur cinq (38 %) ont déclaré vivre en union polygamique et environ un homme sur cinq (22 %) a déclaré être polygame.
- **Âge à la première union** : Les hommes entrent en première union à un âge plus tardif que les femmes. Avant d'atteindre 18 ans exacts, 37 % des femmes de 25-49 ans avaient déjà contracté une première union contre 7 % parmi les hommes du même groupe d'âges. L'âge médian à la première union des femmes de 25-49 ans est estimé à 19,4 ans. Chez les hommes de 30-64 ans, il est estimé à 25,6 ans.
- **Âge aux premiers rapports sexuels** : Les femmes ont leurs premiers rapports sexuels à un âge plus précoce que les hommes : parmi les jeunes femmes de 15-19 ans, 12 % avaient déjà commencé leur vie sexuelle avant d'atteindre l'âge exact de 15 ans contre 6 % chez les jeunes hommes de 15-19 ans. Avant d'atteindre 18 ans exacts, 59 % des femmes du groupe d'âges 25-49 ans avaient déjà eu leurs premiers rapports sexuels contre 39 % chez les hommes du même groupe d'âges. L'âge médian aux premiers rapports sexuels est estimé à 17,3 ans chez les femmes de 20-49 ans et à 18,7 ans chez les hommes de la même tranche d'âges.

L'union et l'activité sexuelle permettent de déterminer dans quelle mesure les femmes sont exposées au risque de grossesse. Ce sont donc des déterminants importants du niveau de la fécondité. Bien que l'âge à la première union ne constitue pas toujours une indication du début d'exposition au risque de grossesse, l'âge aux premiers rapports sexuels ne coïncidant pas forcément avec l'âge à la première union, il n'en demeure pas moins un indicateur démographique important et tous les changements qui affectent les comportements matrimoniaux peuvent avoir une répercussion sur l'évolution du niveau de la fécondité.

Précisons qu'au Bénin, la Loi N°2002-07 du 24 août 2004 portant Code des Personnes et de la Famille en son article 123, fixe l'âge minimal au mariage à 18 ans.


4.1 ÉTAT MATRIMONIAL

Actuellement en union

Les femmes et les hommes qui ont déclaré qu'ils étaient mariés ou qu'ils vivaient ensemble avec un partenaire comme s'ils étaient mariés au moment de l'enquête.

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans

Au Bénin, sept femmes de 15-49 ans sur dix (70 %) et près de six hommes du même groupe d'âges sur dix (55 %) étaient en union au moment de l'enquête. Près d'un quart des femmes était célibataire (24 %). Par comparaison, ce pourcentage est de 43 % chez les hommes. Parmi les femmes qui vivaient en union, 55 % étaient mariées et 15 % vivaient en union consensuelle (**Graphique 4.1** et **Tableau 4.1**).



Les résultats montrent également que les proportions de femmes célibataires diminuent très rapidement avec l'âge, passant de 81 % chez celles de 15-19 ans à 1 % chez celles de 45-49 ans. À l'instar des femmes, la proportion d'hommes célibataires diminue rapidement avec l'âge, passant de 99 % parmi ceux de 15-19 ans à 1 % chez ceux de 45-49 ans.

On note que dans le groupe d'âges 15-19 ans, 18 % des femmes sont en union contre seulement 1 % chez les hommes (**Tableau 4.1**).

Tendances : Depuis 1996, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, on constate une diminution dans la situation matrimoniale des femmes et des hommes de 15-49 ans. Le pourcentage de femmes en union a baissé passant, de 77 % en 1996 à 70 % en 2017-2018. Parmi les hommes, ce pourcentage est passé de 70 % à 55 %.

4.2 POLYGAMIE

Polygamie

Les femmes qui ont déclaré que leur mari ou partenaire a d'autres épouses sont considérées comme vivant en union polygame. De même que les hommes qui ont déclaré avoir plus d'une femme.

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans actuellement en union.

Au Bénin, environ deux femmes de 15-49 ans en union sur cinq (38 %) ont déclaré vivre en union polygame, alors que seulement un homme de 15-49 ans en union sur cinq (22 %) a déclaré avoir deux épouses ou plus (**Tableaux 4.2.1** et **4.2.2**).

Parmi les femmes vivant en union polygame, 28 % ont une seule coépouse et 10 % en ont au moins deux.


Tendances : Le pourcentage de femmes en union polygamique a diminué de onze points de pourcentage entre 1996 et 2017-2018, passant de 49 % à 38 % (Graphique 4.2).

Variations par caractéristique

- Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, les unions polygamiques ont tendance à augmenter avec l'âge. Dans la tranche d'âges 40-44 ans, près de la moitié des femmes en union (49 %) ont des coépouses contre 19 % à 15-19 ans. Chez les hommes, le pourcentage ayant deux épouses ou plus est de 33 % à 45-49 ans contre 8 % à 20-24 ans.
- La polygamie est plus fréquemment pratiquée en milieu rural (41 % pour les femmes et 24 % chez les hommes) qu'en milieu urbain (32 % pour les femmes et 20 % pour les hommes). Les unions polygames sont aussi moins courantes à Cotonou (20 % pour les femmes et 7 % pour les hommes) que dans les autres villes (34 % pour les femmes et 21 % pour les hommes) (Tableaux 4.2.1 et 4.2.2).
- Les pourcentages de femmes et d'hommes vivant en union polygame varient selon le département. C'est dans le département du Couffo que la polygamie est le plus fréquemment pratiquée (51 % pour les femmes et 37 % pour les hommes) et, à l'opposé, c'est dans le département du Littoral que cette pratique est la moins courante (20 % pour les femmes et 7 % pour les hommes) (Graphique 4.3).
- La pratique de la polygamie varie fortement avec le niveau d'instruction, le pourcentage de femmes en union polygame variant de 43 % parmi celles n'ayant aucun niveau d'instruction à 14 % parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus. La même tendance s'observe chez les hommes : 11 % de ceux qui ont le niveau secondaire 2^d cycle ou plus sont polygames contre 27 % de ceux qui n'ont aucun niveau d'instruction.


Graphique 4.2 Tendances de la polygamie

Parmi les femmes de 15-49 ans en union, pourcentage en union polygame



Graphique 4.3 Polygamie par département

Parmi les femmes de 15-49 ans actuellement en union, pourcentage en union polygame



4.3 ÂGE À LA PREMIÈRE UNION

Âge médian à la première union

Âge auquel la moitié des enquêtés sont entrés en première union.

Échantillon : Femmes de 20-49 ans et de 25-49 ans et hommes de 20-49 ans, 25-49 ans, 20-64 ans, 25-64 ans, 30-49 ans et 30-64 ans

Les résultats montrent que les femmes entrent en première union à un âge plus précoce que les hommes. En effet, parmi les femmes âgées de 20-24 ans à l'enquête, 31 % avaient déjà contracté une première union en atteignant 18 ans exacts contre seulement 5 % chez les hommes. Parmi les femmes de 20-49 ans, 14 % avaient déjà contracté une première union avant d'atteindre 15 ans exacts contre pratiquement aucun homme. L'âge médian à la première union est estimé à 19,4 ans pour les femmes de 25-49 ans et à 25,1 ans pour les hommes de 30-49 ans.


On peut souligner que bien que le Code des Personnes et de la Famille du Bénin fixe, en son article 123, l'âge minimal au mariage à 18 ans, 4 % des jeunes femmes de 15-19 ans et 9 % de celles de 20-24 ans avaient déjà contracté une première union avant d'atteindre 15 ans exacts. Cependant, on constate que des générations anciennes âgées de 45-49 ans à l'enquête aux plus récentes âgées de 15-19 ans, le pourcentage en première union avant 15 ans exacts passe de 13 % à 4 % (**Tableau 4.3**). Cependant, ce résultat, plus qu'indiquer une tendance à la baisse, pourrait résulter du fait que ou les femmes les plus jeunes ne déclarent pas bien les enfants qu'elles ont eu avant 15 ans, parce c'est un événement très récent qui nés pas bien vu culturellement, ou les femmes le plus âgées éloignent dans le passé les dates des naissances des enfants plus grands.

Tendances : L'âge médian à la première union chez les femmes de 25-49 ans a varié peu entre 1996 et 2017-2018, passant de 18,4 ans à 19,4 ans.

Variations par caractéristique

- Les femmes de 25-49 ans vivant à Cotonou entrent en union plus tard (âge médian de 22,8 ans) que les femmes vivant dans les autres villes (âge médian de 20,1 ans) et dans les zones rurales (âge médian de 18,8 ans) (**Graphique 4.4** et **Tableau 4.4**).
- Le niveau d'instruction influence l'âge médian à la première union. Plus le niveau d'instruction augmente, plus l'âge médian à la première union est retardé. Parmi les femmes de 25-49 ans, l'âge médian à la première union de celles qui ont un niveau d'instruction « secondaire 1^{er} cycle » est de 21,3 ans contre 20,4 ans pour celles qui ont le niveau d'instruction « primaire » et 18,6 ans pour celles qui n'ont aucun niveau d'instruction.
- L'âge médian à la première union augmente avec le niveau de bien-être économique. Parmi les femmes de 25-49 ans, il varie de 18,0 ans pour les femmes dont le ménage est classé dans le quintile le plus bas à 21,9 ans parmi celles dont le ménage est classé dans le quintile le plus élevé (**Tableau 4.4**).

Graphique 4.4 Âge médian des femmes à la première union par résidence



4.4 ÂGE AUX PREMIERS RAPPORTS SEXUELS

Age médian aux premiers rapports sexuels

Âge auquel la moitié des enquêtés ont eu leurs premiers rapports sexuels.

Échantillon : Femmes de 15-24 ans, 20-49 ans et de 25-49 ans et hommes de 15-24 ans, 20-49 ans, 25-49 ans, 20-64 ans, et 25-64 ans.

Au Bénin, l'âge médian aux premiers rapports sexuels chez les femmes âgées de 25-49 ans est de 17,3 ans, soit légèrement inférieur à celui de l'âge d'entrée en première union (19,4 ans). Parmi les hommes du même groupe d'âges, l'âge médian aux premiers rapports sexuels estimé à 18,7 ans est plus élevé que chez les femmes. Que ce soit chez les femmes ou les hommes, les premiers rapports sexuels n'ont pas toujours lieu dans le cadre de l'union (Graphique 4.5).


Les premiers rapports sexuels sont plus précoces chez les femmes que chez les hommes : 12 % d'adolescentes (15-19 ans) contre 6 % d'adolescents avaient déjà eu leur premier rapport sexuel avant leur 15^{ème} anniversaire. Plus d'un tiers des jeunes hommes âgés de 20-24 ans (38 %), avaient déjà eu leurs premiers rapports sexuels avant l'âge de 18 ans, contre 61 % des jeunes filles (Tableau 4.5).

Tendances : L'âge médian aux premiers rapports sexuels des femmes et des hommes est resté quasiment le même entre 1996 et 2017-2018 (Graphique 4.6).


Variations par caractéristique

- Les femmes (25-49 ans) des départements de l'Atacora (16,4 ans), de l'Alibori (16,5 ans), des Collines (16,5 ans), du Borgou (16,7 ans) et du Zou (16,8 ans) sont celles qui débute le plus tôt leur vie sexuelle. À l'inverse, c'est dans les départements de l'Ouémé (18,5 ans), du Couffo (18,4 ans), du Littoral (18,3 ans) et du Mono (18 ans) que cet âge médian est le plus tardif.
- Chez les femmes de 25-49 ans, l'âge médian aux premiers rapports sexuels augmente légèrement avec le niveau d'instruction, il est de 16,9 ans chez les femmes sans niveau d'instruction contre 18,8 ans chez celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus. Par contre chez les hommes, le niveau d'instruction n'a pratiquement aucune influence sur l'âge médian aux premiers rapports sexuels (Tableau 4.6).

Graphique 4.5 Âge médian aux premiers rapports sexuels et âge médian à la première union



Graphique 4.6 Âge médian aux premiers rapports sexuels : Tendances



4.5 ACTIVITÉ SEXUELLE RÉCENTE

La fréquence des rapports sexuels est un facteur important de l'exposition au risque de grossesse et de transmission des infections et maladies sexuellement transmissibles si des mesures de protections ne sont pas prises. Près de la moitié des femmes (49 %) et plus de six hommes sur dix (61 %) de 15-49 ans ont déclaré avoir eu leurs derniers rapports sexuels dans les quatre dernières semaines avant l'enquête. Pour 29 % des femmes et 14 % des hommes, les derniers rapports sexuels avaient eu lieu au cours de l'année. En outre, pour 10 % de femmes et 5 % des hommes, les derniers rapports sexuels ont eu lieu il y a un an et plus. En outre, 12 % des femmes et 20 % des hommes ont déclaré n'avoir jamais eu de rapports sexuels (**Tableaux 4.7.1 et 4.7.2**).

Variations par caractéristique

- Près de la moitié des adolescentes (48 %) sont sexuellement actives. Dans 22 % des cas, les derniers rapports sexuels avaient eu lieu dans les quatre semaines avant l'enquête et dans 21 % des cas, dans la dernière année. Par contre chez les adolescents, 71 % n'ont jamais eu de rapports sexuels.
- L'activité sexuelle récente des femmes sexuellement actives varie selon l'état matrimonial. Plus de six femmes en union sur dix (62 %) ont eu leurs rapports sexuels les quatre dernières semaines contre 18 % pour les célibataires. Par contre, la tendance est plus prononcée chez les hommes que chez les femmes : plus de neuf hommes en union sur dix (93 %) ont eu leurs rapports sexuels les quatre dernières semaines contre 21 % parmi les célibataires pour la même période (**Tableaux 4.7.1 et 4.7.2**).

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur l'union et l'activité sexuelle, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 4.1** État matrimonial actuel
- **Tableau 4.2.1** Nombre de coépouses des femmes
- **Tableau 4.2.2** Nombre d'épouses des hommes
- **Tableau 4.3** Âge à la première union
- **Tableau 4.4** Âge médian à la première union selon certaines caractéristiques
- **Tableau 4.5** Âge aux premiers rapports sexuels
- **Tableau 4.6** Âge médian aux premiers rapports sexuels selon certaines caractéristiques
- **Tableau 4.7.1** Activité sexuelle récente : Femme
- **Tableau 4.7.2** Activité sexuelle récente : Homme

Tableau 4.1 État matrimonial actuel

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans par état matrimonial actuel, selon l'âge, EDSB-V Bénin 2017-2018

Groupe d'âges	État matrimonial						Total	Pourcentage d'enquêtés actuellement en union	Effectif d'enquêtés
	Célibataire	Marié	Vivant ensemble	Divorcé	Séparé	Veuf			
FEMME									
15-19	81,3	14,5	3,9	0,1	0,2	0,0	100,0	18,5	3 350
20-24	30,0	52,9	14,3	0,3	2,1	0,3	100,0	67,3	2 923
25-29	6,6	68,8	20,2	1,1	2,7	0,6	100,0	89,0	2 986
30-34	1,8	72,9	19,6	1,3	2,5	2,0	100,0	92,4	2 202
35-39	1,1	71,4	19,2	2,0	3,6	2,8	100,0	90,6	1 882
40-44	1,1	70,6	17,7	1,7	4,0	4,8	100,0	88,3	1 320
45-49	1,4	63,4	17,2	1,8	5,2	10,9	100,0	80,6	1 265
Ensemble 15-49	24,4	55,1	15,0	1,0	2,5	2,0	100,0	70,1	15 928
HOMME									
15-19	99,3	0,5	0,1	0,1	0,0	0,0	100,0	0,6	1 548
20-24	73,3	20,2	5,2	0,6	0,8	0,0	100,0	25,4	1 118
25-29	33,1	50,8	12,7	1,0	2,1	0,2	100,0	63,5	1 156
30-34	8,2	70,2	18,1	0,6	2,8	0,3	100,0	88,2	881
35-39	3,2	75,8	17,1	1,0	2,5	0,4	100,0	92,9	812
40-44	2,6	76,6	16,0	1,1	3,3	0,5	100,0	92,6	620
45-49	1,1	78,0	13,7	1,5	3,7	1,9	100,0	91,8	592
Ensemble 15-49	42,5	44,5	10,2	0,7	1,8	0,3	100,0	54,6	6 727
50-64	1,7	72,8	17,3	1,9	3,6	2,7	100,0	90,1	868
Ensemble 15-64	37,9	47,7	11,0	0,8	2,0	0,6	100,0	58,7	7 595

Tableau 4.2.1 Nombre de coépouses des femmes

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans en union par nombre de coépouses et pourcentage de femmes actuellement en union ayant une coépouse ou plus, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Nombre de coépouses				Total	Pourcentage ayant une coépouse ou plus ¹	Effectif de femmes
	0	1	2+	Ne sait pas			
Groupe d'âges							
15-19	80,5	16,9	2,2	0,4	100,0	19,1	618
20-24	72,4	23,1	3,8	0,7	100,0	26,9	1 966
25-29	64,0	27,8	7,2	1,0	100,0	34,9	2 658
30-34	58,4	29,6	11,0	0,9	100,0	40,6	2 035
35-39	53,9	30,6	14,2	1,4	100,0	44,8	1 706
40-44	50,2	31,8	16,7	1,2	100,0	48,6	1 166
45-49	51,9	29,9	17,0	1,2	100,0	46,9	1 020
Résidence							
Cotonou	76,8	16,4	3,3	3,4	100,0	19,8	551
Autres villes	64,5	25,3	8,8	1,4	100,0	34,1	3 881
Ensemble urbain	66,1	24,2	8,1	1,6	100,0	32,3	4 431
Rural	58,1	30,1	11,2	0,6	100,0	41,2	6 737
Département							
Alibori	60,2	29,6	10,2	0,0	100,0	39,8	1 550
Atacora	63,9	27,2	7,2	1,7	100,0	34,4	892
Atlantique	68,1	21,5	8,7	1,7	100,0	30,2	1 311
Borgou	54,9	35,7	9,0	0,4	100,0	44,7	1 381
Collines	62,9	27,2	9,6	0,3	100,0	36,8	738
Couffo	48,3	31,4	19,9	0,3	100,0	51,4	743
Donga	54,9	34,6	9,7	0,7	100,0	44,3	716
Littoral	76,8	16,4	3,3	3,4	100,0	19,8	551
Mono	64,8	23,9	10,9	0,4	100,0	34,8	514
Ouémé	68,5	22,5	6,0	3,1	100,0	28,5	985
Plateau	59,9	30,8	8,8	0,6	100,0	39,5	709
Zou	57,3	26,4	15,6	0,6	100,0	42,0	1 080
Niveau d'instruction							
Aucun	56,5	30,9	11,9	0,7	100,0	42,8	7 409
Primaire	67,3	24,0	7,5	1,2	100,0	31,5	1 984
Secondaire 1 ^{er} cycle	71,1	20,8	5,8	2,3	100,0	26,6	1 294
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	84,1	12,6	1,4	1,8	100,0	14,1	481
Quintiles de bien-être économique							
Le plus bas	60,2	29,9	9,2	0,7	100,0	39,1	2 165
Second	56,8	32,6	10,0	0,6	100,0	42,6	2 220
Moyen	58,4	28,6	12,5	0,4	100,0	41,1	2 233
Quatrième	61,0	27,4	11,1	0,5	100,0	38,5	2 330
Le plus élevé	69,9	20,3	6,9	2,8	100,0	27,2	2 221
Ensemble	61,3	27,7	10,0	1,0	100,0	37,7	11 168

¹ Non compris les femmes qui ont répondu « Ne sait pas » quand on leur a demandé si leur conjoint avait d'autres épouses/partenaires

Tableau 4.2.2 Nombre d'épouses des hommes

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans en union par nombre d'épouses, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Nombre d'épouses		Total	Effectif d'hommes
	1	2+		
Groupe d'âges				
15-19	*	*	100,0	9
20-24	91,9	8,1	100,0	284
25-29	86,1	13,9	100,0	735
30-34	81,6	18,4	100,0	777
35-39	75,5	24,5	100,0	754
40-44	68,7	31,3	100,0	574
45-49	66,6	33,4	100,0	543
Résidence				
Cotonou	92,8	7,2	100,0	182
Autres villes	78,8	21,2	100,0	1 326
Ensemble urbain	80,5	19,5	100,0	1 509
Rural	76,0	24,0	100,0	2 167
Département				
Alibori	76,1	23,9	100,0	494
Atacora	82,5	17,5	100,0	300
Atlantique	78,0	22,0	100,0	446
Borgou	74,2	25,8	100,0	493
Collines	82,4	17,6	100,0	239
Couffo	62,9	37,1	100,0	222
Donga	76,9	23,1	100,0	246
Littoral	92,8	7,2	100,0	182
Mono	78,5	21,5	100,0	158
Ouémé	88,9	11,1	100,0	351
Plateau	70,3	29,7	100,0	219
Zou	73,2	26,8	100,0	325
Niveau d'instruction				
Aucun	72,7	27,3	100,0	1 693
Primaire	77,2	22,8	100,0	926
Secondaire 1 ^{er} cycle	83,9	16,1	100,0	535
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	89,4	10,6	100,0	521
Quintiles de bien-être économique				
Le plus bas	75,6	24,4	100,0	762
Second	76,3	23,7	100,0	715
Moyen	73,0	27,0	100,0	680
Quatrième	77,8	22,2	100,0	718
Le plus élevé	85,4	14,6	100,0	800
Ensemble 15-49	77,8	22,2	100,0	3 675
50-64	65,4	34,6	100,0	782
Ensemble 15-64	75,6	24,4	100,0	4 457

Note : Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 4.3 Âge à la première union

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui étaient en première union avant d'atteindre certains âges exacts et âge médian à la première union, selon l'âge actuel, EDSB-V Bénin 2017-2018

Âge actuel	Pourcentage en première union avant d'atteindre l'âge exact de :					Pourcentage de célibataires	Effectif d'enquêtés	Âge médian à la première union
	15	18	20	22	25			
FEMME								
15-19	4,2	na	na	na	na	81,3	3 350	a
20-24	9,4	30,6	52,2	na	na	30,0	2 923	19,8
25-29	14,1	37,4	55,7	71,9	87,8	6,6	2 986	19,4
30-34	17,4	38,4	56,0	70,3	84,6	1,8	2 202	19,3
35-39	14,0	35,4	54,3	70,1	83,4	1,1	1 882	19,5
40-44	17,6	38,5	54,7	68,5	83,1	1,1	1 320	19,4
45-49	13,4	34,1	52,1	66,4	78,6	1,4	1 265	19,8
20-49	13,9	35,5	54,3	na	na	9,3	12 578	19,5
25-49	15,2	37,0	54,9	70,0	84,4	3,0	9 655	19,4
HOMME								
15-19	0,0	na	na	na	na	99,3	1 548	a
20-24	0,0	4,8	13,0	na	na	73,3	1 118	a
25-29	0,0	6,0	14,6	28,5	51,6	33,1	1 156	24,8
30-34	0,0	10,4	17,7	29,1	52,3	8,2	881	24,7
35-39	0,0	6,9	16,0	27,6	50,0	3,2	812	25,0
40-44	0,0	6,1	11,9	22,5	49,5	2,6	620	25,1
45-49	0,0	5,5	10,9	20,6	41,2	1,1	592	26,1
20-49	0,0	6,6	14,3	na	na	25,5	5 179	a
25-49	0,0	7,1	14,6	26,4	49,6	12,4	4 061	a
20-64	0,0	6,2	13,5	na	na	22,1	6 047	a
25-64	0,0	6,6	13,6	24,6	46,7	10,5	4 929	a
30-49	0,0	7,5	14,6	25,6	48,8	4,1	2 904	25,1
30-64	0,0	6,7	13,3	23,4	45,2	3,6	3 773	25,6

Note : L'âge à la première union est défini comme étant l'âge auquel l'enquêté(e) a commencé à vivre avec son premier époux/épouse/partenaire.

na = Non applicable pour cause de troncature

a = Non calculé parce que moins de 50 % des enquêtés ont commencé à vivre pour la première fois avec leur époux/épouse/partenaire avant d'atteindre le début du groupe d'âges.

Tableau 4.4 Âge médian à la première union selon certaines caractéristiques

Âge médian à la première union parmi les femmes de 20-49 ans et de 25-49 ans et, âge médian à la première union parmi les hommes de 25-64 ans et de 30-64 ans, selon certaines caractéristiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique	Âge des femmes		Âge des hommes	
	20-49	25-49	25-64	30-64
Résidence				
Cotonou	a	22,8	a	28,9
Autres villes	a	20,1	a	26,0
Ensemble urbain	a	20,4	a	26,4
Rural	18,8	18,8	24,7	25,0
Département				
Alibori	17,8	17,7	24,8	25,0
Atacora	18,6	18,3	24,7	25,3
Atlantique	a	20,0	a	25,1
Borgou	18,5	18,4	a	25,8
Collines	19,1	18,9	a	26,5
Couffo	19,6	19,5	a	25,4
Donga	19,6	19,7	a	26,3
Littoral	a	22,8	a	28,9
Mono	a	20,2	a	25,5
Ouémé	a	20,6	a	26,1
Plateau	19,9	19,8	24,4	24,4
Zou	19,5	19,4	24,7	24,8
Niveau d'instruction				
Aucun	18,6	18,6	24,8	25,1
Primaire	a	20,4	a	25,3
Secondaire 1 ^{er} cycle	a	21,3	a	26,3
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	a	a	a	27,9
Quintiles de bien-être économique				
Le plus bas	18,0	18,0	24,4	24,7
Second	18,7	18,6	24,7	25,0
Moyen	19,0	18,9	a	25,3
Quatrième	19,9	19,8	a	25,6
Le plus élevé	a	21,9	a	27,1
Ensemble	19,5	19,4	a	25,6

Note : L'âge à la première union est défini comme étant l'âge auquel l'enquêté(e) a commencé à vivre avec son premier époux/épouse/partenaire.

a = Non calculé parce que moins de 50 % des femmes ou des hommes ont commencé à vivre pour la première fois avec leur époux/épouse/partenaire avant d'atteindre le début du groupe d'âges.

Tableau 4.5 Âge aux premiers rapports sexuels

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans ayant eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre certains âges exacts, pourcentage n'ayant jamais eu de rapports sexuels et âge médian aux premiers rapports sexuels, selon l'âge actuel, EDSB-V Bénin 2017-2018

Âge actuel	Pourcentage ayant déjà eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre l'âge exact de :					Pourcentage n'ayant jamais eu de rapports sexuels	Effectif	Âge médian aux premiers rapports sexuels
	15	18	20	22	25			
FEMME								
15-19	12,0	na	na	na	na	52,1	3 350	a
20-24	12,4	61,0	85,0	na	na	6,5	2 923	17,4
25-29	15,0	60,3	83,7	94,2	98,4	0,7	2 986	17,3
30-34	15,2	60,1	82,6	93,5	97,6	0,1	2 202	17,2
35-39	14,4	57,9	80,8	94,0	98,3	0,1	1 882	17,4
40-44	16,1	59,1	80,8	93,1	97,7	0,1	1 320	17,3
45-49	14,7	56,0	81,1	93,7	97,7	0,0	1 265	17,6
20-49	14,4	59,5	82,8	na	na	1,7	12 578	17,3
25-49	15,0	59,1	82,2	93,8	98,0	0,3	9 655	17,3
15-24	12,2	na	na	na	na	30,8	6 273	a
HOMME								
15-19	6,2	na	na	na	na	70,9	1 548	a
20-24	9,5	38,2	67,2	na	na	17,9	1 118	18,7
25-29	10,6	38,7	68,9	86,2	95,0	2,8	1 156	18,7
30-34	10,5	43,6	65,6	84,5	93,2	0,8	881	18,4
35-39	9,0	41,7	63,0	82,4	92,6	0,2	812	18,7
40-44	8,3	39,0	63,4	79,7	90,2	0,1	620	18,8
45-49	7,0	31,9	55,2	74,4	87,7	0,2	592	19,4
20-49	9,4	39,2	64,8	na	na	4,7	5 179	18,7
25-49	9,4	39,4	64,2	82,4	92,3	1,0	4 061	18,7
15-24	7,6	na	na	na	na	48,7	2 666	a
20-64	9,0	37,7	62,8	na	na	4,0	6 047	18,8
25-64	8,9	37,6	61,8	80,7	91,2	0,9	4 929	18,9

na = Non applicable pour cause de troncature

a = Non calculé parce que moins de 50 % des enquêtés ont eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre le début du groupe d'âges.

Tableau 4.6 Âge médian aux premiers rapports sexuels selon certaines caractéristiques

Âge médian aux premiers rapports sexuels parmi les femmes de 20-49 ans et de 25-49 ans et âge médian aux premiers rapports sexuels parmi les hommes de 20-64 ans et de 25-64 ans, selon certaines caractéristiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique	Âge des femmes		Âge des hommes	
	20-49	25-49	20-64	25-64
Résidence				
Cotonou	18,3	18,3	18,6	18,7
Autres villes	17,7	17,7	18,9	18,9
Ensemble urbain	17,8	17,8	18,8	18,8
Rural	17,0	17,0	18,8	18,9
Département				
Alibori	16,6	16,5	a	20,4
Atacora	16,5	16,4	19,4	19,5
Atlantique	17,7	17,7	18,0	18,0
Borgou	16,7	16,7	19,2	19,3
Collines	16,6	16,5	19,3	19,7
Couffo	18,4	18,4	17,7	17,7
Donga	17,6	17,5	a	20,1
Littoral	18,3	18,3	18,6	18,7
Mono	18,0	18,0	19,4	19,5
Ouémé	18,4	18,5	17,3	16,7
Plateau	17,7	17,7	18,7	18,8
Zou	16,9	16,8	17,0	17,0
Niveau d'instruction				
Aucun	16,9	16,9	19,0	19,0
Primaire	17,7	17,9	18,6	18,6
Secondaire 1 ^{er} cycle	18,0	18,2	18,6	18,7
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	18,7	18,8	18,9	19,0
Quintiles de bien-être économique				
Le plus bas	16,5	16,5	19,0	19,1
Second	16,9	16,9	18,7	18,7
Moyen	17,1	17,0	19,0	19,1
Quatrième	17,6	17,6	18,7	18,8
Le plus élevé	18,3	18,3	18,7	18,7
Ensemble	17,3	17,3	18,8	18,9

a = Non calculé parce que moins de 50 % des enquêtés ont eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre le début du groupe d'âges.

Tableau 4.7.1 Activité sexuelle récente : Femme

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans en fonction du moment auquel ont eu lieu leurs derniers rapports sexuels, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Derniers rapports sexuels ont eu lieu :			N'a jamais eu de rapports sexuels	Total	Effectif de femmes
	Dans les 4 dernières semaines	Dans la dernière année ¹	Il y a un an ou plus			
Groupe d'âges						
15-19	22,4	20,5	5,0	52,1	100,0	3 350
20-24	52,3	32,1	9,1	6,5	100,0	2 923
25-29	58,2	32,2	8,8	0,7	100,0	2 986
30-34	62,4	29,4	8,1	0,1	100,0	2 202
35-39	60,1	28,8	11,0	0,1	100,0	1 882
40-44	57,5	30,5	12,0	0,1	100,0	1 320
45-49	43,3	33,7	23,0	0,0	100,0	1 265
État matrimonial						
Célibataire	18,2	24,0	7,3	50,5	100,0	3 889
En union	62,2	30,0	7,7	0,0	100,0	11 168
En rupture d'union	20,0	36,0	44,0	0,0	100,0	871
Durée de l'union²						
0-4 ans	63,0	30,2	6,8	0,0	100,0	2 379
5-9 ans	63,8	29,7	6,5	0,0	100,0	2 240
10-14 ans	63,5	29,7	6,9	0,0	100,0	1 695
15-19 ans	61,9	28,7	9,4	0,0	100,0	1 502
20-24 ans	63,1	28,3	8,6	0,0	100,0	975
25 ans+	54,3	35,5	10,2	0,0	100,0	992
Marié plus d'une fois	62,1	29,6	8,3	0,0	100,0	1 385
Résidence						
Cotonou	47,6	27,4	10,2	14,8	100,0	958
Autres villes	46,9	30,1	9,5	13,6	100,0	5 803
Ensemble urbain	47,0	29,7	9,6	13,7	100,0	6 761
Rural	50,8	28,3	9,6	11,3	100,0	9 167
Département						
Alibori	68,1	22,0	2,5	7,4	100,0	1 878
Atacora	46,9	28,6	15,5	9,0	100,0	1 302
Atlantique	46,6	28,9	10,1	14,3	100,0	2 037
Borgou	43,4	33,7	13,1	9,8	100,0	1 839
Collines	49,7	31,3	7,8	11,3	100,0	1 151
Couffo	40,5	31,1	10,8	17,6	100,0	1 041
Donga	51,0	26,0	14,3	8,7	100,0	881
Littoral	47,6	27,4	10,2	14,8	100,0	958
Mono	41,2	33,5	10,3	14,9	100,0	759
Ouémé	44,6	30,9	8,8	15,7	100,0	1 507
Plateau	51,0	28,3	7,7	13,0	100,0	970
Zou	50,7	27,4	7,7	14,1	100,0	1 606
Niveau d'instruction						
Aucun	55,0	29,2	10,9	5,0	100,0	8 785
Primaire	46,0	27,7	9,5	16,9	100,0	3 148
Secondaire 1 ^{er} cycle	37,2	28,8	7,0	27,0	100,0	2 847
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	43,1	30,3	6,8	19,8	100,0	1 147
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	50,7	29,1	11,1	9,2	100,0	2 735
Second	48,9	28,8	10,5	11,9	100,0	3 030
Moyen	50,6	29,5	9,2	10,8	100,0	3 104
Quatrième	49,2	28,9	9,2	12,7	100,0	3 405
Le plus élevé	46,9	28,5	8,6	16,0	100,0	3 654
Ensemble	49,2	28,9	9,6	12,3	100,0	15 928

¹ Non compris les femmes qui ont eu des rapports sexuels au cours des quatre dernières semaines.² Non compris les femmes qui ne sont pas actuellement en union.

Tableau 4.7.2 Activité sexuelle récente : Homme

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans en fonction du moment auquel ont eu lieu leurs derniers rapports sexuels, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Derniers rapports sexuels ont eu lieu :			N'a jamais eu de rapports sexuels	Total	Effectif d'hommes
	Dans les 4 dernières semaines	Dans la dernière année ¹	Il y a un an ou plus			
Groupe d'âges						
15-19	9,9	12,0	7,1	70,9	100,0	1 548
20-24	45,4	23,5	13,2	17,9	100,0	1 118
25-29	75,1	16,6	5,5	2,8	100,0	1 156
30-34	87,6	10,5	1,1	0,8	100,0	881
35-39	90,7	8,2	0,9	0,2	100,0	812
40-44	89,9	9,6	0,4	0,1	100,0	620
45-49	89,9	8,5	1,4	0,2	100,0	592
État matrimonial						
Célibataire	21,2	20,4	11,5	46,9	100,0	2 860
En union	92,7	7,0	0,3	0,0	100,0	3 675
En rupture d'union	58,0	35,6	6,3	0,0	100,0	191
Durée de l'union²						
0-4 ans	89,0	10,6	0,4	0,0	100,0	889
5-9 ans	95,3	4,7	0,0	0,0	100,0	824
10-14 ans	93,6	6,0	0,5	0,0	100,0	621
15-19 ans	92,9	6,9	0,2	0,0	100,0	532
20-24 ans	93,4	6,4	0,2	0,0	100,0	293
25 ans+	95,5	4,5	0,0	0,0	100,0	129
Marié plus d'une fois	92,5	7,3	0,3	0,0	100,0	386
Résidence						
Cotonou	60,2	15,0	8,0	16,7	100,0	390
Autres villes	60,9	13,4	5,7	20,0	100,0	2 487
Ensemble urbain	60,8	13,6	6,0	19,5	100,0	2 877
Rural	61,7	13,5	4,6	20,2	100,0	3 849
Département						
Alibori	62,7	9,5	3,0	24,8	100,0	917
Atacora	59,1	17,2	4,0	19,6	100,0	560
Atlantique	64,6	11,0	5,5	18,9	100,0	822
Borgou	64,1	10,4	7,1	18,4	100,0	823
Collines	62,5	15,1	3,4	19,0	100,0	448
Couffo	56,7	15,6	10,1	17,6	100,0	409
Donga	56,1	17,5	2,7	23,7	100,0	445
Littoral	60,2	15,0	8,0	16,7	100,0	390
Mono	52,3	18,3	6,7	22,7	100,0	354
Ouémé	60,5	13,0	3,0	23,5	100,0	618
Plateau	67,2	18,3	2,6	11,8	100,0	340
Zou	62,7	12,6	7,6	17,1	100,0	600
Niveau d'instruction						
Aucun	71,6	11,7	3,0	13,7	100,0	2 426
Primaire	64,6	12,8	4,1	18,5	100,0	1 562
Secondaire 1 ^{er} cycle	45,8	13,1	6,7	34,4	100,0	1 538
Secondaire 2 ^o cycle ou plus	56,3	18,6	9,2	15,9	100,0	1 201
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	64,4	12,9	4,5	18,2	100,0	1 248
Second	58,4	13,1	5,3	23,2	100,0	1 315
Moyen	60,8	13,4	4,6	21,2	100,0	1 282
Quatrième	60,9	14,1	4,9	20,0	100,0	1 317
Le plus élevé	62,2	13,9	6,5	17,4	100,0	1 565
Ensemble 15-49	61,3	13,5	5,2	19,9	100,0	6 727
50-64	77,8	21,0	1,2	0,0	100,0	868
Ensemble 15-64	63,2	14,4	4,8	17,7	100,0	7 595

¹ Non compris les hommes qui ont eu des rapports sexuels au cours des quatre dernières semaines.² Non compris les hommes qui ne sont pas actuellement en union.

Résultats clés

- **Indice synthétique de fécondité** : Au Bénin, l'indice synthétique de fécondité est de 5,7 enfants par femme.
- **Espacement des naissances** : Le nombre médian de mois depuis la naissance précédente est 34,1 mois.
- **Âge médian à la première naissance** : Parmi les femmes de 25-49 ans, l'âge médian à la première naissance est estimé à 20,5 ans.

Le nombre d'enfants qu'a une femme dépend de plusieurs facteurs, comme l'âge auquel elle commence à avoir des enfants, l'intervalle entre les naissances et son aptitude à la reproduction. Le report de la première naissance et l'allongement de l'intervalle intergénéral ont joué un rôle important dans la réduction des niveaux de fécondité dans de nombreux pays. Ces facteurs ont aussi des conséquences positives en termes de santé. À l'opposé, des intervalles intergénéral courts (de moins de 24 mois) peuvent avoir des effets néfastes pour les nouveau-nés et pour leurs mères, comme des naissances avant terme, des faibles poids à la naissance et le décès. La maternité à un âge très jeune est associée à un risque accru de complications durant la grossesse et la naissance de l'enfant et à des niveaux élevés de mortalité néonatale.

Ce chapitre présente les niveaux et tendances de la fécondité au Bénin et certains déterminants proches de la fécondité. Plus précisément, il présente l'Indice Synthétique de Fécondité (ISF), l'intervalle intergénéral, l'insusceptibilité de tomber enceinte (à cause de l'aménorrhée post-partum, de l'abstinence post-partum ou de la ménopause), l'âge à la première naissance et la fécondité des adolescentes.

5.1 FÉCONDITÉ ACTUELLE**Indice synthétique de fécondité**

Nombre moyen d'enfants qu'aurait une femme en fin de vie féconde si elle avait des enfants conformément aux taux de fécondité par âge actuels. Les taux de fécondité par âge sont calculés pour la période des trois années qui précèdent l'enquête, basés sur l'historique détaillé des naissances fourni par les femmes.

Échantillon : Femmes de 15-49 ans

Le niveau de la fécondité au Bénin est estimé à 5,7 enfants par femme. Il varie selon le milieu de résidence, de 5,2 enfants par femme en milieu urbain à 6,1 enfants par femme en milieu rural (**Tableau 5.1**). Les taux de fécondité par groupe d'âges augmentent rapidement pour atteindre un maximum de 285 ‰ chez les femmes de 25-29 ans. Ces données montrent aussi que les taux de fécondité les plus élevés sont observés dans le groupe d'âges 20-29 ans quel que soit le milieu de résidence.


Le taux global de fécondité générale, c'est-à-dire le nombre annuel moyen de naissances vivantes dans la population des femmes en âge de procréer, est estimé à 197 ‰ (**Tableau 5.1**). Il est plus élevé en milieu rural (210 ‰) qu'en milieu urbain (180 ‰). Le pourcentage de femmes enceintes est de 11 % au niveau national, 9 % en milieu urbain et 12 % en milieu rural et le nombre moyen d'enfants nés vivants des femmes de 40-49 ans est de 6,0 (**Tableau 5.2**).

Tendances : Globalement, on ne constate pas de changement important depuis 1996. En effet le nombre moyen d'enfants par femme est passé de 6,0 en 1996 à 5,7 enfants par femmes en 2017-2018 (**Tableau 5.3.1** et **Graphique 5.1**). Les mêmes tendances sont observées quel que soit le milieu de résidence.

En outre, la comparaison des résultats avec les éditions précédentes montre que les courbes des taux de fécondité par âge présentent une allure similaire. En effet, la fécondité augmente très rapidement pour atteindre son maximum à 25-29 ans et diminue ensuite régulièrement avec l'âge (**Tableau 5.3.2** et **Graphique 5.2**).

Graphique 5.1 Tendances de la fécondité par résidence


Indice synthétique de fécondité pour les 3 années avant chaque enquête



EDSB-I 1996 EDSB-II 2001 EDSB-III 2006 EDSB-IV 2011-2012 EDSB-V 2017-2018

Graphique 5.2 Tendances de la fécondité par âge pour les 3 années avant chaque enquête

Naissances pour 1 000 femmes




Variations par caractéristiques

- Le niveau de la fécondité varie selon le département de résidence des femmes. L'indice synthétique de fécondité le plus faible est enregistré dans le département du Littoral (en moyenne, 4,0 enfants par femme). Par contre, les niveaux les plus élevés sont enregistrés dans les départements de la Donga (6,8 enfants par femme) et de l'Atacora (6,7 enfants par femme) (**Tableau 5.2** et **Graphique 5.3**).
- L'indice synthétique de fécondité varie selon le niveau d'instruction de la femme. En effet, plus le niveau d'instruction est faible, plus l'indice synthétique de fécondité est élevé. Il passe de 3,6 enfants chez les femmes de niveau secondaire 2^d cycle ou plus à 6,4 enfants chez celles qui n'ont aucun niveau d'instruction (**Tableau 5.2** et **Graphique 5.4**).
- Les résultats de l'enquête montrent que plus le quintile de bien-être économique est faible plus l'indice synthétique de fécondité est élevé. Il passe de 4,2 enfants chez les femmes des ménages du quintile le plus élevé à 7,0 chez celles des ménages du quintile le plus bas.


Graphique 5.3 Fécondité par département

ISF pour les 3 années avant l'enquête



Graphique 5.4 Fécondité par niveau d'instruction

ISF pour les 3 années avant l'enquête



5.2 ENFANTS DÉJÀ NÉS ET ENFANTS SURVIVANTS

Au cours de l'EDSB-V 2017-2018, des données ont été collectées sur le nombre d'enfants déjà nés des femmes de 15-49 ans et sur ceux qui sont survivants. En moyenne, les femmes de 45-49 ans ont donné naissance à 6,1 enfants au cours de leur vie et, parmi eux, 5,3 étaient en vie au moment de l'enquête. Parmi les femmes en union du même groupe d'âges, ces nombres moyens sont respectivement de 6,4 et 5,5 (Tableau 5.4).

Au Bénin, environ 1 % des femmes âgées de 45-49 ans actuellement en union n'ont pas eu d'enfants. Étant donné que, dans la culture béninoise, il est assez rare que les femmes restent volontairement sans enfants, ce résultat peut être interprété comme une mesure de la stérilité primaire.

5.3 INTERVALLE INTERGÉNÉSIQUE

Intervalle intergénésique médian

Nombre de mois écoulés entre deux naissances successives pour la moitié des naissances.

Échantillon : Naissances autres que les naissances de rang 1 qui ont eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête.


L'intervalle intergénésique médian est de 34,1 mois. En outre, 40 % des naissances ont eu lieu entre 24 et 35 mois après la naissance précédente. Cependant, on constate toujours qu'une proportion élevée de naissances ont eu lieu avant l'intervalle intergénésique recommandé qui est inférieur à 24 mois (16 %) (Tableau 5.5 et Graphique 5.5).

Variations par caractéristiques

- La longueur de l'intervalle intergénésique est influencée par l'état de survie de la naissance précédente. En effet, il est de 28,9 mois quand l'enfant précédent est décédé contre 34,5 mois quand il est en vie.
- L'intervalle intergénésique médian varie entre les départements, d'un minimum de 32,8 mois dans le département de l'Atlantique à un maximum de 37,1 mois pour le département des Collines.

Graphique 5.5 Intervalles intergénésiques

Répartition (en %) des naissances autres que les naissances de rang un par nombre de mois depuis la naissance précédente



Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100 % en raison de l'arrondissement.

5.4 INSUSCEPTIBILITÉ DE TOMBER ENCEINTE

Aménorrhée post-partum

Période entre la naissance de l'enfant et le retour des règles.

Abstinence post-partum

Période entre la naissance de l'enfant et la reprise des rapports sexuels.

Insusceptibilité post-partum

Période pendant laquelle on considère qu'une femme ne court pas de risque de tomber enceinte, soit parce qu'elle est en aménorrhée post-partum et/ou en abstinence post-partum.

Échantillon : Femmes qui ont donné naissance dans les trois années au cours des trois années ayant précédé l'enquête.

Durée médiane de l'aménorrhée post-partum

Nombre de mois écoulés entre la naissance d'un enfant et le retour des règles pour la moitié des femmes.

Échantillon : Femmes qui ont donné naissance au cours des trois années ayant précédé l'enquête.

Durée médiane de l'insusceptibilité post-partum

Nombre de mois suivant une naissance après lesquels la moitié des femmes ne sont plus protégées contre le risque de grossesse, du fait de l'aménorrhée post-partum ou de l'abstinence post-partum.

Échantillon : Femmes qui ont donné naissance dans les trois années ayant précédé l'enquête.

L'insusceptibilité de tomber enceinte dépend, entre autres facteurs, du retour de l'ovulation, qui est influencé par la durée et l'intensité de l'allaitement et de l'abstinence sexuelle post-partum. Pour 38 % des naissances ayant eu lieu au cours des trois années ayant précédé l'enquête, les mères étaient en insusceptibilité de tomber enceinte ; pour 32 % des naissances, les mères étaient en aménorrhée et pour 24 % des naissances, les mères étaient en abstinence post-partum. En moyenne, les femmes restent 14,1 mois sans être susceptibles de tomber enceinte après une naissance. Pour la moitié des naissances, les femmes restent en insusceptibilité de tomber enceinte jusqu'à 12,2 mois (**Tableau 5.6**).

Variations par caractéristiques

- Le nombre de mois médian d'insusceptibilité post-partum varie en fonction des départements de résidence. Avec 6,6 mois, c'est dans le département de l'Alibori que la durée médiane de mois d'insusceptibilité post-partum est la plus faible, suivi du département du Littoral avec 8,3 mois. À l'opposé, avec 18,0 mois, le département de l'Atacora est celui où la moitié des femmes restent le plus longtemps en période d'insusceptibilité de tomber enceinte. C'est dans les départements de l'Atacora (12,4 mois) et du Couffo (11,7 mois) que la durée de de l'aménorrhée post-partum est la plus élevée (**Tableau 5.7**). Concernant la durée médiane de l'abstinence post-partum, on constate qu'elle varie de 11,5 mois dans l'Atacora à 3,2 mois dans l'Atlantique.
- La durée d'insusceptibilité post-partum diminue avec le niveau d'instruction des femmes, passant de 12,8 mois parmi celles sans niveau d'instruction à 8,3 mois parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle.
- La durée médiane de l'aménorrhée post-partum diminue avec l'augmentation du niveau de bien-être économique : 12,3 mois parmi les femmes vivant dans un ménage du quintile le plus bas à 7,1 mois parmi celles dont le ménage est classé dans le quintile le plus élevé.

Ménopause

Les femmes sont considérées comme ayant atteint la ménopause si elles ne sont ni enceintes, ni en aménorrhée post-partum et si elles n'ont pas eu de règles pendant une période de six mois avant l'enquête ou si elles déclarent qu'elles sont en ménopause ou qu'elles ont eu une hystérectomie, ou si elles n'ont jamais eu de règles.

Échantillon : Femmes de 30-49 ans

Au Bénin, 11 % des femmes âgées de 30-49 ans sont considérées comme étant en ménopause. Le pourcentage de femmes en ménopause augmente avec l'âge, passant de 1 % parmi celles âgées de 30-34 ans à 53 % pour les 48-49 ans (**Tableau 5.8**).

5.5 ÂGE À LA PREMIÈRE NAISSANCE

Âge médian à la première naissance

Âge auquel la moitié des femmes ont eu leur premier enfant.

Échantillon : Femmes de 20-49 ans et 25-49 ans


Au Bénin, 25 % des femmes âgées de 25-49 ans ont eu leur première naissance avant l'âge exact de 18 ans et 83 % avant l'âge exact de 25 ans. L'âge médian à la première naissance des femmes âgées de 25-49 ans est de 20,5 ans. Cela signifie que la moitié des femmes âgées de 25-49 ans ont eu leur première naissance avant 20,5 ans (**Tableau 5.9**).

Variations par caractéristiques

- En milieu urbain, les femmes âgées de 25-49 ans ont eu leur première naissance à un âge plus tardif que celles vivant en milieu rural, soit respectivement 21,2 ans et 19,9 ans (**Tableau 5.10** et **Graphique 5.6**).
- L'âge médian à la première naissance varie pour les femmes de 25-49 ans selon le département, de 23,2 ans dans le département du Littoral à 18,9 ans dans le département de l'Atacora.
- L'âge médian à la première naissance augmente avec le niveau d'instruction de la femme, passant de 19,8 ans parmi les femmes sans niveau d'instruction à 22,0 ans parmi celles ayant le niveau secondaire 1^{er} cycle.
- Par ailleurs, l'âge médian à la première naissance des femmes âgées de 25-49 ans tend à augmenter des ménages de quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, variant de 19,4 ans parmi les femmes dont le ménage est classé dans le quintile le plus bas à 22,6 ans parmi celles dont le ménage est classé dans le quintile le plus élevé (**Tableau 5.10**).

Graphique 5.6 Âge médian à la première naissance par résidence

Âge médian à la première naissance parmi les femmes de 25-49 ans



5.6 FÉCONDITÉ DES ADOLESCENTES

Fécondité des adolescentes

Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui ont donné naissance à leur premier enfant ou qui sont enceintes de leur premier enfant

Échantillon : Femmes de 15-19 ans

5.6.1 Fécondité des adolescentes


Au Bénin, 20 % des femmes âgées de 15-19 ans ont déjà commencé leur vie procréative : 15 % ont déjà eu, au moins, une naissance vivante et 5 % sont enceintes de leur premier enfant (**Tableau 5.11**).

Variations par caractéristiques

- Les résultats selon le milieu de résidence révèlent que la fécondité est plus élevée chez les adolescentes qui vivent dans le milieu rural que chez celles vivant dans le milieu urbain. Environ, 24 % des femmes âgées de 15-19 ans, résidant en milieu rural ont déjà commencé leur vie procréative alors qu'en milieu urbain, ce pourcentage n'est que de 15 %.
- La fécondité des adolescentes varie selon le département de résidence. En effet, le pourcentage d'adolescentes qui ont déjà commencé leur vie procréative est de 8 % dans le département du Littoral et Ouémé (dans chaque cas) et atteint 38 % dans le département de l'Alibori (**Graphique 5.7**).
- Plus le niveau d'instruction est élevé, plus la proportion d'adolescentes ayant commencé leur vie procréative est faible. Chez les adolescentes qui n'ont aucun niveau d'instruction, 34 % ont déjà commencé leur vie procréative. Par contre, parmi celles qui ont un niveau secondaire 2^d cycle, le pourcentage est de 7 %.
- Le niveau de fécondité chez les adolescentes est influencé par le niveau de bien-être économique. En effet, 31 % des adolescentes vivant dans un ménage appartenant au quintile de bien-être économique le plus bas, ont déjà commencé leur vie procréative alors que parmi celles des ménages du quintile le plus élevé, ce pourcentage est de seulement 9 % (**Graphique 5.8**).


Graphique 5.7 Grossesse et maternité des adolescentes par département

Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui ont commencé leur vie procréative



Graphique 5.8 Grossesse et maternité des adolescentes par bien-être économique du ménage

Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui ont commencé leur vie procréative




5.6.2 Comportements en matière de santé reproductive avant l'âge de 15 ans

Parmi les adolescents de 15-19 ans, 12 % des femmes et 6 % des hommes ont eu leurs premiers rapports sexuels avant l'âge de 15 ans. Dans ce même groupe d'âges, 4 % des femmes, mais aucun homme, avaient déjà contracté une union avant d'atteindre l'âge de 15 ans. Environ 1 % des femmes et aucun homme n'avait eu d'enfant avant l'âge de 15 ans (**Tableau 5.12** et **Graphique 5.9**).

Graphique 5.9 Comportements en matière de sexualité et de santé de la reproduction avant l'âge de 15 ans

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-19 ans

■ Femme ■ Homme



LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur les niveaux de fécondité et sur certains déterminants proches de la fécondité, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 5.1** Fécondité actuelle
- **Tableau 5.2** Fécondité selon certaines caractéristiques
- **Tableau 5.3.1** Tendances de la fécondité par âge
- **Tableau 5.3.2** Tendances de la fécondité par âge et de l'Indice Synthétique de Fécondité
- **Tableau 5.4** Enfants nés vivants et enfants survivants des femmes
- **Tableau 5.5** Intervalles intergénéraliques
- **Tableau 5.6** Aménorrhée, abstinence et insusceptibilité post-partum
- **Tableau 5.7** Durée médiane de l'aménorrhée, de l'abstinence post-partum et de l'insusceptibilité post-partum
- **Tableau 5.8** Ménopause
- **Tableau 5.9** Âge à la première naissance
- **Tableau 5.10** Âge médian à la première naissance
- **Tableau 5.11** Fécondité des adolescentes
- **Tableau 5.12** Rapports sexuels et comportements en matière de santé reproductive avant l'âge de 15 ans

Tableau 5.1 Fécondité actuelle

Taux de fécondité par âge, Indice Synthétique de Fécondité (ISF), et Taux Global de Fécondité Générale (TGFG) et Taux Brut de Natalité (TBN) pour la période des trois années ayant précédé l'enquête par milieu de résidence, EDSB-V Bénin 2017-2018

Groupe d'âges	Résidence				Ensemble
	Cotonou	Autres villes	Ensemble urbain	Rural	
<15	-	[2]	[2]	[2]	[2]
15-19	57	91	87	124	108
20-24	170	233	225	279	256
25-29	233	287	280	288	285
30-34	180	223	216	247	234
35-39	116	156	149	159	155
40-44	44	62	59	86	75
45-49	-	[22]	[19]	[28]	[24]
ISF (15-49 ans)	4,0	5,4	5,2	6,1	5,7
TGFG (15-44 ans)	140	187	180	210	197
TBN	34,0	39,9	39,1	41,4	40,5

Notes : Les taux sont exprimés pour 1 000 femmes. Les taux entre crochets sont tronqués. Les taux correspondent à la période 1-36 mois précédant l'enquête. Les taux pour le groupe d'âges <15 ans sont basés sur des données rétrospectives provenant des femmes âgées de 15-17 ans. ISF : Indice Synthétique de Fécondité exprimé pour une femme.

TGFG : Taux Global de Fécondité Générale exprimé pour 1 000 femmes âgées de 15-44 ans.

TBN : Taux Brut de natalité exprimé pour 1 000 individus.

Tableau 5.2 Fécondité selon certaines caractéristiques

Indice Synthétique de Fécondité pour les 3 années précédant l'enquête, pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement enceintes et nombre moyen d'enfants nés vivants pour les femmes de 40-49 ans, selon certaines caractéristiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique	Indice Synthétique de Fécondité	Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement enceintes	Nombre moyen d'enfants nés vivants des femmes de 40-49 ans
Résidence			
Cotonou	4,0	6,8	3,9
Autres villes	5,4	9,7	5,4
Ensemble urbain	5,2	9,3	5,1
Rural	6,1	11,7	6,5
Département			
Alibori	6,2	11,3	7,0
Atacora	6,7	10,4	7,1
Atlantique	4,9	9,6	5,5
Borgou	6,2	13,4	6,5
Collines	5,4	11,3	6,2
Couffo	5,9	11,7	6,3
Donga	6,8	13,7	6,2
Littoral	4,0	6,8	3,9
Mono	5,7	9,6	5,8
Ouémé	5,1	7,2	5,1
Plateau	5,7	12,6	5,6
Zou	5,6	10,6	5,9
Niveau d'instruction			
Aucun	6,4	11,7	6,4
Primaire	5,4	10,6	5,1
Secondaire 1 ^{er} cycle	4,5	8,8	3,8
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	3,6	7,8	2,8
Quintiles de bien-être économique			
Le plus bas	7,0	11,5	7,1
Second	6,2	11,2	6,7
Moyen	6,1	11,9	6,3
Quatrième	5,3	10,9	5,7
Le plus élevé	4,2	8,4	4,1
Ensemble	5,7	10,7	6,0

Note : L'Indice Synthétique de Fécondité correspond à la période de 1-36 mois précédant l'enquête.

Tableau 5.3.1 Tendence de la fécondité par âge

Taux de fécondité par âge par période de 5 ans précédant l'enquête selon les groupes d'âges, EDSB-V Bénin 2017-2018

Âge de la mère à la naissance	Nombre d'années précédant l'enquête			
	0-4	5-9	10-14	15-19
<15	[2]	[6]	[10]	[11]
15-19	108	114	124	124
20-24	257	268	259	253
25-29	288	287	286	283
30-34	238	249	255	[263]
35-39	162	198	[204]	-
40-44	83	[116]	-	-
45-49	[25]	-	-	-

Note : Les taux de fécondité par groupe d'âges sont exprimés pour 1 000 femmes. Les taux entre crochets sont tronqués. Les taux excluent le mois de l'interview. Pour la période 0-4 ans, les taux pour le groupe d'âges <15 ans sont basées sur des données retrospectives provenant des femmes âgées de 15-19 ans.

Tableau 5.3.2 Tendence de la fécondité par âge et Indice Synthétique de Fécondité

Taux de fécondité par âge et l'Indice Synthétique de Fécondité (ISF) pour la période des 3 années précédant l'EDSB-I 1996, l'EDSB-II 2001, l'EDSB-III 2006, l'EDSB-IV 2011-2012, et l'EDSB-V 2017-2018, selon les groupes d'âge, EDSB-V Bénin 2017-2018

Âge de la mère à la naissance	EDSB-I 1996	EDSB-II 2001	EDSB-III 2006	EDSB-IV 2011-2012	EDSB-V 2017-2018
15-19	119	109	112	94	108
20-24	266	261	266	230	256
25-29	263	260	278	251	285
30-34	244	233	239	200	234
35-39	195	154	155	126	155
40-44	78	78	65	63	75
45-49	[27]	[27]	[32]	[17]	[24]
ISF (15-49 ans)	6,0	5,6	5,7	4,9	5,7

Note : Les taux par âge sont exprimés pour 1 000 femmes. Les taux pour le groupe d'âges 45-49 ans peuvent être légèrement biaisés pour cause de troncature et, par conséquent, sont présentés entre crochets.

Tableau 5.4 Enfants nés vivants et enfants survivants des femmes

Répartition (en %) de l'ensemble des femmes de 15-49 ans et des femmes de 15-49 ans en union par nombre d'enfants nés vivants, nombre moyen d'enfants nés vivants et nombre moyen d'enfants survivants, par groupe d'âges, EDSB-V Bénin 2017-2018

Groupe d'âges	Nombre moyen d'enfants nés vivants											Total	Effectif de femmes	Nombre moyen d'enfants nés vivants	Nombre moyen d'enfants survivants	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+					
TOUTES LES FEMMES																
15-19	84,8	12,8	2,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	3 350	0,18	0,17	
20-24	32,5	32,5	23,2	9,5	1,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	2 923	1,17	1,07	
25-29	8,0	14,6	23,3	25,0	18,0	7,2	2,7	1,1	0,2	0,0	0,0	100,0	2 986	2,69	2,45	
30-34	2,1	5,7	12,2	17,7	22,7	17,8	12,1	6,6	2,0	0,7	0,5	100,0	2 202	4,09	3,62	
35-39	1,7	3,6	6,7	12,1	17,2	18,6	14,9	13,1	7,8	2,5	1,9	100,0	1 882	5,00	4,43	
40-44	1,1	2,7	4,3	8,9	11,6	17,2	16,8	13,3	11,1	6,8	6,2	100,0	1 320	5,79	4,96	
45-49	1,6	2,2	4,3	6,9	10,9	13,8	15,5	14,6	13,2	8,0	9,1	100,0	1 265	6,13	5,25	
Ensemble	26,0	13,0	12,3	11,6	10,7	8,6	6,6	4,9	3,2	1,6	1,5	100,0	15 928	2,88	2,54	
FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION																
15-19	33,6	55,6	10,3	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	618	0,78	0,74	
20-24	11,9	39,3	32,0	13,6	2,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1 966	1,57	1,44	
25-29	4,0	13,3	24,1	27,0	19,4	8,0	2,9	1,1	0,2	0,0	0,0	100,0	2 658	2,87	2,61	
30-34	1,4	4,5	11,9	18,0	23,3	18,4	12,3	6,9	2,0	0,7	0,5	100,0	2 035	4,18	3,70	
35-39	1,2	2,9	6,0	12,2	17,1	19,1	15,3	13,3	8,2	2,7	2,0	100,0	1 706	5,11	4,53	
40-44	0,9	2,6	4,3	7,9	10,6	17,5	17,1	13,9	11,2	7,4	6,7	100,0	1 166	5,90	5,08	
45-49	0,7	1,5	3,3	5,9	11,2	13,4	16,7	14,9	13,3	8,8	10,3	100,0	1 020	6,38	5,47	
Ensemble	5,5	14,8	15,8	15,4	14,1	11,3	8,6	6,4	4,1	2,1	2,0	100,0	11 168	3,74	3,31	

Tableau 5.5 Intervalles intergénéraliques

Répartition (en %) des naissances, autres que les naissances de rang 1, ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête par nombre de mois écoulés depuis la naissance précédente et nombre médian de mois depuis la naissance précédente, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Mois depuis la naissance précédente						Total	Effectifs de naissances autres que de premier rang	Nombre médian de mois depuis la naissance précédente
	7-17	18-23	24-35	36-47	48-59	60+			
Âge de la mère									
15-19	13,9	20,9	45,0	13,4	5,9	0,8	100,0	79	27,6
20-29	5,2	14,6	44,7	21,7	8,1	5,7	100,0	4 732	31,7
30-39	4,2	10,0	37,2	25,0	11,3	12,4	100,0	4 694	35,6
40-49	3,3	6,8	28,1	26,7	13,5	21,6	100,0	1 133	40,5
Sexe de l'enfant précédent									
Masculin	4,7	12,2	39,9	22,8	9,6	10,7	100,0	5 389	33,8
Féminin	4,5	11,3	39,3	24,4	10,5	9,9	100,0	5 249	34,4
État de survie de la naissance précédente									
Vivante	3,3	11,3	40,4	24,2	10,4	10,4	100,0	9 584	34,5
Décédée	16,2	16,5	32,5	18,2	7,1	9,6	100,0	1 054	28,9
Rang de naissance									
2-3	4,7	13,4	41,4	21,8	9,1	9,6	100,0	4 930	33,1
4-6	4,6	10,6	37,6	24,8	11,0	11,4	100,0	4 212	35,0
7+	4,5	9,8	39,4	26,2	10,5	9,6	100,0	1 496	34,7
Résidence									
Cotonou	5,6	12,7	33,8	17,4	13,0	17,5	100,0	417	35,3
Autres villes	4,3	11,4	38,7	22,8	11,1	11,8	100,0	3 582	34,5
Ensemble urbain	4,4	11,5	38,2	22,2	11,3	12,4	100,0	4 000	34,6
Rural	4,8	11,9	40,5	24,4	9,3	9,1	100,0	6 638	33,9
Département									
Alibori	5,7	11,8	36,9	26,2	10,0	9,4	100,0	1 418	34,6
Atacora	4,0	11,3	40,8	24,7	9,6	9,6	100,0	958	34,2
Atlantique	4,4	11,6	44,0	19,1	10,0	10,9	100,0	1 236	32,8
Borgou	5,1	13,9	39,4	23,8	9,9	8,0	100,0	1 394	33,4
Collines	3,0	8,6	35,4	27,0	12,3	13,7	100,0	668	37,1
Couffo	5,9	10,0	36,2	28,8	9,9	9,2	100,0	716	35,4
Donga	5,1	11,2	40,6	21,8	10,2	11,1	100,0	705	34,2
Littoral	5,6	12,7	33,8	17,4	13,0	17,5	100,0	417	35,3
Mono	5,4	15,8	35,6	22,7	10,3	10,2	100,0	484	33,4
Ouémé	3,4	11,1	43,1	21,2	8,9	12,3	100,0	939	33,1
Plateau	4,0	11,9	41,0	24,0	10,7	8,4	100,0	705	33,4
Zou	3,9	11,6	41,9	24,5	8,7	9,4	100,0	998	33,8
Niveau d'instruction de la mère									
Aucun	4,6	11,5	39,2	24,4	10,2	10,1	100,0	7 596	34,3
Primaire	4,0	11,5	42,1	22,7	9,8	10,0	100,0	1 808	33,3
Secondaire 1 ^{er} cycle	5,5	14,3	39,2	20,6	8,6	11,9	100,0	934	32,5
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	5,1	12,8	37,4	18,6	12,7	13,3	100,0	301	34,8
Quintiles de bien-être économique									
Le plus bas	5,5	13,7	42,0	22,5	8,8	7,5	100,0	2 451	32,5
Second	6,1	11,9	38,3	24,9	10,0	8,9	100,0	2 239	34,2
Moyen	3,4	11,2	40,0	24,1	11,2	10,1	100,0	2 141	34,6
Quatrième	3,4	9,9	41,9	23,5	9,8	11,6	100,0	2 078	34,3
Le plus élevé	4,4	11,9	34,7	23,1	11,0	14,9	100,0	1 728	35,5
Ensemble	4,6	11,8	39,6	23,6	10,1	10,3	100,0	10 638	34,1

Note : Les naissances de rang 1 sont exclues. L'intervalle pour les naissances multiples est le nombre de mois écoulés depuis la grossesse précédente qui a abouti à une naissance vivante.

Tableau 5.6 Aménorrhée, abstinence et insusceptibilité post-partum

Pourcentage de naissances des 3 années ayant précédé l'enquête dont les mères sont en aménorrhée, en abstinence et en insusceptibilité post-partum, selon le nombre de mois depuis la naissance et durées médiane et moyenne, EDSB-V Bénin 2017-2018

Nombre de mois depuis la naissance	Pourcentage de naissances dont les mères sont :			Effectif de naissances
	En aménorrhée	En abstinence	En insusceptibilité ¹	
< 2	89,8	94,7	98,7	511
2-3	82,6	67,3	90,7	482
4-5	70,4	43,2	78,6	439
6-7	60,2	35,4	70,1	535
8-9	53,5	32,0	62,7	550
10-11	44,1	23,2	53,4	471
12-13	36,6	21,0	46,0	427
14-15	28,7	18,3	38,1	364
16-17	21,5	18,7	30,8	458
18-19	17,1	14,1	26,5	414
20-21	9,5	9,1	16,5	460
22-23	8,8	6,9	12,0	478
24-25	3,5	5,6	8,4	438
26-27	1,9	4,3	5,1	400
28-29	1,4	2,6	3,4	391
30-31	1,4	2,6	3,3	402
32-33	2,0	3,0	4,2	407
34-35	3,3	2,2	5,0	470
Ensemble	31,7	23,9	38,3	8 098
Médiane	9,8	4,8	12,2	na
Moyenne	11,7	9,1	14,1	na

Note : Les estimations sont basées sur le statut au moment de l'enquête.

na = Non applicable

¹ Y compris les naissances pour lesquelles les mères sont encore, soit en aménorrhée, soit en abstinence, (ou les deux), à la suite d'une naissance.

Tableau 5.7 Durée médiane de l'aménorrhée, de l'abstinence post-partum et de l'insusceptibilité post-partum

Nombre médian de mois d'aménorrhée post-partum, d'abstinence post-partum et d'insusceptibilité post-partum à la suite d'une naissance ayant eu lieu au cours des 3 années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Aménorrhée post-partum	Abstinence post-partum	Insusceptibilité post-partum ¹
Âge de la mère			
15-29	9,6	4,7	11,8
30-49	10,2	5,2	12,8
Résidence			
Cotonou	6,9	3,5	8,3
Autres villes	8,8	4,6	11,5
Ensemble urbain	8,6	4,5	11,1
Rural	10,7	5,2	12,8
Département			
Alibori	5,4	3,5	6,6
Atacora	12,4	11,5	18,0
Atlantique	7,4	3,2	10,0
Borgou	11,2	9,7	14,1
Collines	11,0	5,8	12,2
Couffo	11,7	5,5	13,7
Donga	11,6	9,6	13,8
Littoral	6,9	3,5	8,3
Mono	6,9	4,5	8,6
Ouémé	11,2	3,9	12,2
Plateau	10,3	4,1	12,4
Zou	10,0	4,3	10,7
Niveau d'instruction de la mère			
Aucun	10,7	5,0	12,8
Primaire	8,7	4,7	11,5
Secondaire 1 ^{er} cycle	9,0	4,6	11,4
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	5,8	4,0	8,3
Quintiles de bien-être économique			
Le plus bas	12,3	7,0	14,2
Second	11,2	4,7	14,0
Moyen	9,9	5,3	12,4
Quatrième	7,9	4,5	10,4
Le plus élevé	7,1	3,9	9,4
Ensemble	9,8	4,8	12,2

Note : Les médianes sont basées sur le statut au moment de l'enquête (statut actuel).

¹ Y compris les naissances pour lesquelles les mères sont encore, soit en aménorrhée, soit en abstinence, (ou les deux), à la suite d'une naissance.

Tableau 5.8 Ménopause

Pourcentage de femmes de 30-49 ans qui sont en ménopause, selon l'âge, EDSB-V Bénin 2017-2018

Groupe d'âges	Pourcentage en ménopause ¹	Effectif de femmes
Âge		
30-34	1,3	2 202
35-39	3,0	1 882
40-41	8,3	587
42-43	15,8	598
44-45	20,9	504
46-47	35,5	431
48-49	52,6	464
Ensemble	11,0	6 670

¹ Le pourcentage de femmes qui 1) ne sont pas enceintes, 2) ont eu une naissance dans les 5 dernières années et ne sont pas en aménorrhée post-partum et 3) celles qui présentent les caractéristiques suivantes : a) les dernières règles ont eu lieu 6 mois ou plus avant l'interview ou b) elles ont déclaré qu'elles étaient en ménopause ou qu'elles avaient eu une hystérectomie ou c) elles n'avaient jamais eu de règles.

Tableau 5.9 Âge à la première naissance

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant donné naissance avant d'atteindre certains âges exacts, pourcentage n'ayant jamais donné naissance et âge médian à la première naissance, selon l'âge actuel, EDSB-V Bénin 2017-18

Âge actuel	Pourcentage ayant donné naissance avant d'atteindre l'âge exact de :					Pourcentage n'ayant jamais donné naissance	Effectif de femmes	Âge médian à la première naissance
	15	18	20	22	25			
15-19	1,2	na	na	na	na	84,8	3 350	a
20-24	2,5	18,7	44,2	na	na	32,5	2 923	a
25-29	5,1	23,7	45,2	66,9	84,9	8,0	2 986	20,4
30-34	5,7	26,3	46,4	64,7	83,4	2,1	2 202	20,4
35-39	5,1	24,1	44,3	62,3	82,1	1,7	1 882	20,6
40-44	4,9	29,4	46,8	62,8	80,9	1,1	1 320	20,3
45-49	4,9	24,6	43,4	62,2	79,5	1,6	1 265	20,7
20-49	4,6	23,7	45,0	na	na	10,4	12 578	a
25-49	5,2	25,3	45,3	64,3	82,7	3,7	9 655	20,5

na = Non applicable

a = Sans objet parce que moins de 50 % des femmes ont donné naissance avant d'atteindre le début du groupe d'âges .

Tableau 5.10 Âge médian à la première naissance

Âge médian à la première naissance parmi les femmes de 20-49 ans et de 25-49 ans selon certaines caractéristiques, EDSB-V Bénin 2017-18

Caractéristique	Femmes de 20-49	Femmes de 25-49
Résidence		
Cotonou	a	23,2
Autres villes	a	20,9
Ensemble urbain	a	21,2
Rural	19,9	19,9
Département		
Alibori	19,1	19,0
Atacora	19,2	18,9
Atlantique	a	20,9
Borgou	19,9	19,9
Collines	19,7	19,6
Couffo	a	20,5
Donga	a	20,6
Littoral	a	23,2
Mono	a	21,2
Ouémé	a	21,5
Plateau	a	20,8
Zou	a	20,5
Niveau d'instruction		
Aucun	19,7	19,8
Primaire	a	21,0
Secondaire 1 ^{er} cycle	a	22,0
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	a	a
Quintiles de bien-être économique		
Le plus bas	19,3	19,4
Second	19,7	19,6
Moyen	a	20,1
Quatrième	a	20,6
Le plus élevé	a	22,6
Ensemble	a	20,5

a = Sans objet parce que moins de 50 % des femmes ont donné naissance avant d'atteindre le début du groupe d'âges.

Tableau 5.11 Fécondité des adolescentes

Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui ont eu une naissance vivante ou qui sont enceintes d'un premier enfant et pourcentage ayant commencé leur vie procréative, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-18

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui :			Effectif de femmes
	ont eu une naissance vivante	sont enceintes d'un premier enfant	Pourcentage ayant commencé leur vie procréative	
Âge				
15-17	6,0	3,0	9,0	2 097
15	1,2	0,9	2,1	799
16	4,3	3,5	7,8	624
17	13,2	5,1	18,3	673
18	25,1	7,5	32,7	727
19	38,0	8,7	46,8	526
Résidence				
Cotonou	5,8	1,7	7,5	191
Autres villes	12,4	3,7	16,0	1 223
Ensemble urbain	11,5	3,4	14,9	1 414
Rural	17,9	6,0	23,9	1 935
Département				
Alibori	28,5	9,4	37,9	379
Atacora	24,1	7,3	31,4	311
Atlantique	10,4	3,3	13,6	413
Borgou	20,9	6,6	27,5	391
Collines	13,2	6,7	19,9	305
Couffo	9,0	2,2	11,2	220
Donga	24,1	4,6	28,7	148
Littoral	5,8	1,7	7,5	191
Mono	11,1	0,6	11,7	160
Ouémé	7,0	1,4	8,3	289
Plateau	6,9	5,6	12,5	173
Zou	11,9	4,5	16,4	368
Niveau d'instruction				
Aucun	25,7	7,8	33,5	957
Primaire	14,3	4,8	19,1	906
Secondaire 1 ^{er} cycle	9,8	3,2	13,1	1 214
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	4,8	2,6	7,4	273
Quintiles de bien-être économique				
Le plus bas	23,4	7,5	30,9	511
Second	19,7	5,2	25,0	680
Moyen	16,6	7,2	23,8	664
Quatrième	13,2	3,6	16,8	711
Le plus élevé	6,5	2,1	8,6	783
Ensemble	15,2	4,9	20,1	3 350

Tableau 5.12 Rapports sexuels et comportements en matière de santé reproductive avant l'âge de 15 ans

Parmi les femmes et les hommes de 15-19 ans, pourcentage qui ont commencé leur vie sexuelle, qui étaient en union et qui avaient donné naissance/engendré un enfant avant l'âge de 15 ans, selon le sexe, EDSB-V Bénin 2017-18

Sexe	A eu des rapports sexuels avant 15 ans	En union avant 15 ans	A donné naissance/engendré un enfant avant 15 ans	Effectif
			15 ans	
Féminin	12,0	4,2	1,2	3 350
Masculin	6,2	0,0	0,0	1 548

Résultats clés

- **Désir d'un autre enfant :** Plus de six femmes sur dix (64 %) désirent avoir un ou un enfant supplémentaire : 24 % le souhaitent dans les deux prochaines années, 34 % le désirent dans deux ans ou plus et 6 % le souhaitent mais elles sont indécises sur le moment. Parmi les hommes, le pourcentage de ceux qui veulent un enfant ou un enfant supplémentaire est de 76 % : 33 % le souhaitent dans les deux prochaines années, 37 % le désirent dans les deux ans ou plus et 7 % le ne savent pas quand.
- **Limitation des naissances :** Parmi les hommes et les femmes de 15-49 ans actuellement en union, près d'un homme sur cinq (19 %) et d'une femme sur quatre (25 %), ne veulent plus d'enfants ou sont stérilisés.
- **Nombre idéal d'enfants :** Le nombre idéal d'enfants est de 5,1 en moyenne pour l'ensemble des femmes de 15-49 ans et de 7,0 pour l'ensemble des hommes du même groupe d'âges.
- **Planification de la fécondité :** Plus de neuf naissances sur dix (94 %) ayant eu lieu au cours des cinq dernières années étaient désirées : 77 % ont eu lieu au moment voulu et dans 17 % des cas, les femmes auraient souhaité qu'elles se produisent plus tard. Par contre, les naissances non désirées représentent 6 %.
- **Fécondité désirée :** Pour les trois années précédant l'enquête, l'Indice Synthétique de Fécondité Désirée (4,9 enfants) est inférieur à l'Indice Synthétique de Fécondité (5,7 enfants).

Les informations sur les préférences en matière de fécondité peuvent aider les responsables des programmes de planification familiale à évaluer le nombre d'enfants désirés, les grossesses qui ne se sont pas produites au moment voulu et celles qui n'étaient pas souhaitées. Ces informations peuvent également permettre d'évaluer la demande contraceptive, qu'elle soit orientée vers l'espacement ou la limitation des naissances et les tendances de la fécondité dans le futur.

Ce chapitre présente les résultats concernant le souhait d'avoir ou non un enfant, le moment où cet enfant était souhaité, le nombre idéal d'enfants. Il présente aussi la situation des dernières naissances (si elles étaient désirées ou non). En outre, dans ce chapitre figure le taux de fécondité théorique, si toutes les naissances non voulues avaient été évitées.

6.1 DÉSIR D'AVOIR UN AUTRE ENFANT

Désir d'avoir un autre enfant

On a demandé aux femmes et aux hommes s'ils souhaitaient plus d'enfants et, si oui, combien de temps ils voulaient attendre avant la naissance du prochain enfant. On considère que les femmes et les hommes qui sont stérilisés ne veulent plus d'enfants.


Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans actuellement en union

Une femme de 15-49 ans actuellement en union sur quatre (25 %) au Bénin, ne veut plus avoir d'enfants ou est stérilisée. A l'opposé, plus de six femmes sur dix (64 %) souhaitent avoir un ou un enfant supplémentaire : 24 % le voudraient dans les deux prochaines années, 34 % souhaitent attendre deux ans ou plus avant la naissance désirée et 6 % ne savent pas quand elles souhaitent cet enfant. La proportion d'hommes de 15-49 ans actuellement en union, désirant avoir un ou un enfant supplémentaire est plus élevée que celle des femmes, tandis que la proportion d'hommes ne voulant plus d'enfants (y compris ceux qui sont stérilisés) est plus faible que celle des femmes. En effet, 19 % des hommes ne désirent plus avoir d'enfants et, à l'opposé, dans 76 % des cas, les hommes veulent avoir un ou un autre enfant : 33 % dans les deux prochaines années, 37 % dans au moins deux ans et 7 % ne savent pas exactement quand ils veulent cet enfant (**Tableau 6.1**).

Tendances : Globalement, la proportion de femmes actuellement en union ne désirant plus d'enfants a augmenté de 2 points de pourcentage entre 1996 et 2017-2018 (passant de 23 % en 1996 à 25 % en 2017-2018). De même, la proportion d'hommes actuellement en union ne désirant plus d'enfants a globalement augmenté dans le temps, passant de 14 % en 1996 à 19 % en 2017-2018. Cette tendance s'observe à toutes les parités : par exemple, à la parité 4, la proportion de femmes actuellement en union qui ne veulent plus d'enfants est passée de 25 % en 1996 à 30 % en 2017-2018 (**Graphique 6.1**).

Graphique 6.1 Désir de limiter les naissances par nombre d'enfants vivants : Tendances

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union qui ne désirent plus d'enfants




Variations par caractéristiques

- Quel que soit le sexe, le désir de ne plus avoir d'enfants augmente avec le nombre d'enfants vivants. La proportion de femmes en union qui ne veulent plus d'enfants passe de moins de 1 % chez les femmes n'ayant aucun enfant à 17 % chez celles ayant déjà trois enfants. Elle atteint 57 % chez les femmes ayant six enfants ou plus (Tableaux 6.2.1 et Graphique 6.2). C'est le même schéma qui est observé chez les hommes de 15-49 ans. En effet, la proportion d'hommes en union qui ne veulent plus d'enfants passe de 1 % chez ceux n'ayant aucun enfant à 16 % chez ceux ayant trois enfants et à 32 % chez ceux en ayant six ou plus (Tableau 6.2.2).

Graphique 6.2 Désir de limiter les naissances par nombre d'enfants vivants

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union qui ne désirent plus d'enfants



- Les proportions d'hommes et de femmes en union qui ne veulent plus d'enfants sont plus élevées en milieu urbain (23 % pour les hommes et 27 % pour les femmes) qu'en milieu rural (15 % pour les hommes et 23 % pour les femmes) (Tableaux 6.2.1 et 6.2.2).
- Les proportions d'hommes et de femmes en union qui ne désirent plus avoir d'enfants varient nettement en fonction du département. Les résultats concernant les femmes montrent que les plus fortes proportions sont observées dans les départements des Collines (37 %), de l'Atlantique (36 %), du Mono (35 %) et du Littoral (35 %), alors que les plus faibles sont enregistrées dans la Donga (13 %) et l'Alibori (7 %). Chez les hommes, c'est dans les départements de l'Ouémé (39 %), du Littoral (35 %) et de l'Atlantique (30 %) que les proportions de ceux qui ne veulent plus d'enfants sont les plus élevées ; à l'opposé, c'est dans la Donga (9 %) et l'Alibori (3 %), comme chez les femmes, que l'on enregistre les plus faibles.
- Le désir de ne plus avoir d'enfants augmente avec l'amélioration du niveau de vie des ménages. En effet, les proportions d'hommes et de femmes en union ne souhaitant plus avoir d'enfants passent de 20 % chez les femmes et 11 % chez les hommes dans le quintile le plus bas à 30 % chez les femmes et 29 % chez les hommes dans le quintile le plus élevé.

6.2 NOMBRE IDEAL D'ENFANTS

Nombre idéal d'enfants

On a demandé aux enquêtés qui n'avaient pas d'enfants, « Si vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien en voudriez-vous ? » Aux enquêtés qui avaient des enfants, on a demandé : « Si vous pouviez revenir à l'époque où vous n'aviez pas d'enfants et choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien auriez-vous voulu en avoir ? »

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans

Le nombre idéal moyen d'enfants varie selon le statut matrimonial des femmes de 15-49 ans. Il est de 5,1 dans l'ensemble des femmes et de 5,4 chez celles actuellement en union. Chez les hommes, le nombre idéal moyen d'enfants est beaucoup plus élevé que chez les femmes : Il est de 7,0 parmi tous les hommes de 15-49 ans et de 7,8 parmi ceux actuellement en union du même groupe d'âges (**Graphique 6.3**).

Dans l'ensemble, un peu plus d'une femme de 15-49 ans sur trois (37 %) désirent avoir 6 enfants ou plus. Cette proportion augmente avec le nombre d'enfants vivants, passant de 24 % chez les femmes n'ayant aucun enfant à 64 % chez celles en ayant six ou plus (**Tableau 6.3**).

Tendances : En comparant les résultats des différentes EDS réalisées au Bénin, on constate que le nombre idéal moyen d'enfants pour l'ensemble des femmes est passé de 5,5 enfants en 1996, à 5,1 en 2017-2018. Pour l'ensemble des hommes de 15-49 ans, cet indicateur n'a pas changé, passant de 7,1 en 1996, à 7,0 en 2017-2018.


Variations par caractéristique

- L'analyse de la distribution des femmes et des hommes en union de 15-49 ans par nombre idéal moyen d'enfants, selon le nombre d'enfants vivants révèle que dans l'ensemble, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, le nombre idéal moyen d'enfants augmente avec le nombre d'enfants vivants. En effet, il passe de 5,1 chez les femmes en union n'ayant pas encore d'enfants à 6,7 chez celles ayant six enfants ou plus. Chez les hommes en union, il varie respectivement de 6,4 à 10,9. En outre, quel que soit le nombre d'enfants vivants, le nombre idéal moyen d'enfants est plus élevé chez les hommes que chez les femmes (**Tableau 6.3 et Graphique 6.4**).

- La demande d'enfants augmente avec l'âge. Les jeunes désirent moins d'enfants que leurs aînés. En effet, le nombre idéal moyen d'enfants pour l'ensemble des femmes de 15-49 ans passe de 4,6 chez les 15-19 ans à 5,9 chez les 45-49 ans (**Tableau 6.3**).
- Le nombre idéal moyen d'enfants pour l'ensemble des femmes de 15-49 ans varie en fonction du département. C'est dans le Littoral que le nombre moyen idéal d'enfants est le plus faible (3,9) et à l'opposé, avec 6,4 enfants, c'est dans l'Atacora qu'il est le plus élevé.
- Les résultats du **Tableau 6.4** montrent également que, le nombre idéal moyen d'enfants pour l'ensemble des femmes de 15-49 ans diminue régulièrement avec l'augmentation du niveau d'instruction. Ce nombre passe de 5,8 enfants chez les femmes n'ayant aucun niveau d'instruction à 3,7 chez celles ayant le niveau d'instruction secondaire 2^d cycle ou plus.


Graphique 6.3 Taille idéale de la famille

Nombre moyen idéal d'enfants parmi les femmes et les hommes de 15-49 ans



Graphique 6.4 Taille idéale de la famille par nombre d'enfants vivants

Nombre moyen idéal d'enfants parmi les femmes et les hommes actuellement en union de 15-49 ans



6.3 PLANIFICATION DE LA FÉCONDITÉ

Planification des naissances/grossesses

Les femmes ont déclaré soit que leurs dernières naissances/grossesses étaient voulues au moment où elles se sont produites (naissance planifiée), ou plus tard (naissance mal planifiée) soit qu'elles n'étaient pas souhaitées (naissance non désirée).

Échantillon : Grossesses actuelles ou dernières naissances des cinq années ayant précédé l'enquête des femmes de 15-49 ans

Plus de neuf naissances sur dix (94 %) ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête étaient désirées : 77 % ont eu lieu au moment voulu et dans 17 % des cas, les femmes auraient souhaité qu'elles se produisent plus tard. Par contre, les naissances non désirées représentent 6 % (**Tableau 6.5** et **Graphique 6.5**).


Tendances : La comparaison des données de toutes les EDS réalisées au Bénin révèle que, la proportion des naissances voulues au moment où elles se sont produites a d'abord augmenté de 8 points de pourcentage sur la période 1996 à 2006, passant de 74 % à 82 % avant de diminuer de 5 points de pourcentage sur la période de 2006 à 2017-2018, passant de 82 % à 77 %. La proportion de naissances que les femmes auraient souhaitées plus tard et la proportion des naissances non désirées ont suivi la même tendance dans le temps que la proportion des naissances voulues au moment où elles se sont produites. Ainsi, la proportion de naissances que les femmes auraient souhaitées plus tard est passée de 19 % en 1996, à 14 % en 2006 et à 17 % en 2017-2018. La proportion des naissances non désirées est passée de 6 % en 1996, à 4 % en 2006 et à 6 % en 2017-2018.

Variations par caractéristique

- Les naissances de rang 2 et 3 sont mieux planifiées (79 % dans chaque cas) que celles de rang 1 et 4 ou plus avec respectivement 77 % et 75 % (**Tableau 6.5**).
- Les naissances voulues plus tard diminuent avec l'âge, tandis que celles non désirées augmentent avec l'âge. En effet, les naissances voulues pour plus tard passent de 26 % chez les femmes âgées de moins de 20 ans à 6 % chez celles âgées de 45-49 ans, alors que les naissances non désirées passent de respectivement 2 % à 20 %.

Graphique 6.5 Planification de la fécondité

Répartition (en %) des naissances de femmes de 15-49 ans ayant eu lieu au cours des cinq années précédant l'enquête (y compris la grossesse actuelle) par planification de la grossesse



6.4 TAUX DE FÉCONDITÉ DÉSIRÉ

Naissances non désirées

Toutes les naissances qui dépassent le nombre idéal d'enfants déclaré par la femme.

Naissances désirées

Toutes les naissances dont le nombre est inférieur ou égal au nombre idéal d'enfants déclaré par la femme.

Taux de fécondité désiré

Nombre moyen d'enfants qu'aurait une femme en fin de vie féconde si elle avait des enfants aux taux de fécondité par âge actuels, en excluant les naissances non désirées.


Échantillon : Femmes de 15-49 ans

Au Bénin, si toutes les naissances non désirées étaient évitées, le nombre moyen d'enfants par femme serait de 4,9 au lieu de 5,7, soit un écart de 0,8 enfant (**Tableau 6.6**).

Tendances : L'Indice Synthétique de Fécondité (ISF) a légèrement baissé dans le temps, passant de 6,0 enfants en 1996 à 5,7 enfants en 2017-2018. L'Indice Synthétique de Fécondité Désirée (ISFD) est passé de 5,0 enfants en 1996, à 4,8 enfants en 2006 et à 4,9 enfants en 2017-2018. L'écart entre l'ISF et l'ISFD est resté stable dans le temps (**Graphique 6.6**).

Graphique 6.6 Fécondité désirée et fécondité actuelle : Tendances

Nombre désiré et nombre actuel d'enfants par femme



Variations par caractéristique

- L'ISFD est plus élevé en milieu rural (5,2 enfants) qu'en milieu urbain (3,5 enfants à Cotonou et 4,7 enfants dans les autres villes). L'écart entre l'ISF et l'ISFD est plus grand en milieu rural (0,9 enfant) qu'en milieu urbain (0,5 enfant à Cotonou et 0,7 enfant dans les autres villes) (**Tableau 6.6**).
- L'ISFD varie en fonction du département. L'ISFD le plus élevé est observé dans l'Atacora (6,1 enfants), tandis que le plus faible est enregistré dans le Littoral (3,5 enfants).
- Le niveau d'instruction influence aussi l'ISFD. En effet, l'ISFD passe de 5,4 chez les femmes n'ayant aucun niveau d'instruction à 3,3 chez celles ayant le niveau d'instruction secondaire 2^d cycle ou plus. L'écart entre l'ISF et l'ISFD est plus grand chez les femmes n'ayant aucun niveau d'instruction (1,0 enfant) que chez celles ayant le niveau d'instruction secondaire 2^d cycle ou plus (0,3 enfant).

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur les préférences en matière de fécondité, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 6.1** Préférences en matière de fécondité par nombre d'enfants vivants
- **Tableau 6.2.1** Désir de limiter les naissances : Femme
- **Tableau 6.2.2** Désir de limiter les naissances : Homme
- **Tableau 6.3** Nombre idéal d'enfants selon le nombre d'enfants vivants
- **Tableau 6.4** Nombre idéal d'enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques
- **Tableau 6.5** Planification de la fécondité
- **Tableau 6.6** Taux de fécondité désirée

Tableau 6.1 Préférences en matière de fécondité par nombre d'enfants vivants

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans actuellement en union et des hommes de 15-49 ans actuellement en union par désir d'enfants, selon le nombre d'enfants vivants, EDSB-V Bénin 2017-2018

Désir d'enfants	Nombre d'enfants vivants							Ensemble 15-49	Ensemble 15-64
	0	1	2	3	4	5	6+		
FEMME¹									
Veut un autre bientôt ²	76,8	29,3	30,1	22,6	20,5	14,7	11,0	23,6	na
Veut un autre plus tard ³	5,2	56,4	47,7	41,5	30,3	18,1	13,6	34,4	na
Veut un autre, ne sait pas quand	8,6	6,2	8,1	8,3	4,6	5,0	3,0	6,0	na
Indécise	3,8	4,8	6,1	8,7	11,6	9,6	10,2	8,3	na
Ne veut plus d'enfant	0,3	1,2	6,3	16,4	29,7	47,2	56,7	24,3	na
Stérilisé ⁴	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4	0,2	0,2	na
S'est déclarée stérile	5,2	2,0	1,6	2,3	3,1	4,9	5,3	3,2	na
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	na
Effectif de femmes	374	1 844	1 990	1 928	1 761	1 332	1 940	11 168	na
HOMME⁵									
Veut un autre bientôt ²	80,6	36,4	36,7	29,5	28,9	25,6	28,2	32,8	30,1
Veut un autre plus tard ³	11,7	49,0	45,8	43,0	33,2	34,1	28,1	36,7	32,1
Veut un autre, ne sait pas quand	4,3	10,8	9,7	6,5	5,9	4,6	4,6	6,7	6,1
Indécis	0,4	1,4	1,6	4,6	5,5	6,6	5,8	4,2	4,0
Ne veut plus d'enfant	0,5	1,7	4,9	15,1	25,8	27,3	31,5	18,2	25,4
Stérilisé ⁴	0,0	0,0	0,9	0,5	0,2	0,6	0,5	0,4	0,7
S'est déclaré stérile	2,6	0,5	0,5	0,7	0,5	1,2	1,4	0,9	1,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif d'hommes	151	533	565	547	464	425	991	3 675	4 457

na = Non applicable

¹ Le nombre d'enfants vivants exclut la grossesse actuelle.² Veut une autre naissance dans les deux ans.³ Veut espacer la prochaine naissance de deux ans ou plus.⁴ Y compris la stérilisation féminine et masculine.⁵ Le nombre d'enfants vivants pour les hommes comprend un enfant supplémentaire si l'épouse de l'enquêté est enceinte (ou si l'une des épouses est enceinte pour les hommes ayant actuellement plus d'une épouse).

Tableau 6.2.1 Désir de limiter les naissances : Femme

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union qui ne veulent plus d'enfants, par nombre d'enfants vivants, selon certaines caractéristiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Nombre d'enfants vivants ¹							Ensemble
	0	1	2	3	4	5	6+	
Résidence								
Cotonou	(0,0)	2,0	16,7	39,3	58,1	79,7	(82,1)	34,9
Autres villes	0,0	0,7	7,3	20,3	35,5	51,3	60,2	25,7
Ensemble urbain	0,0	0,9	8,6	23,3	38,4	54,3	61,1	26,9
Rural	0,4	1,5	4,6	11,1	24,1	43,4	55,2	22,9
Département								
Alibori	0,0	0,5	1,3	2,6	9,0	11,1	18,2	6,7
Atacora	(0,0)	2,4	3,2	3,9	14,7	24,9	49,2	18,3
Atlantique	(0,0)	1,2	10,2	24,2	44,9	75,4	76,9	36,0
Borgou	(2,1)	0,4	2,9	13,5	22,4	31,3	46,6	18,9
Collines	*	1,0	12,3	30,9	46,8	69,2	80,8	37,0
Couffo	*	1,5	4,8	4,5	18,2	38,9	58,0	20,2
Donga	(0,0)	1,9	3,9	4,1	9,0	25,1	41,4	12,7
Littoral	(0,0)	2,0	16,7	39,3	58,1	79,7	(82,1)	34,9
Mono	*	2,4	10,8	26,2	50,3	55,3	73,0	35,1
Ouémé	*	0,0	6,3	23,6	37,8	69,7	76,0	32,5
Plateau	(0,0)	1,3	3,5	13,0	21,8	44,6	78,4	27,4
Zou	(0,0)	2,4	7,8	16,1	41,6	59,8	72,4	31,3
Niveau d'instruction								
Aucun	0,5	1,7	4,9	12,0	25,0	43,4	54,9	26,0
Primaire	0,0	1,3	5,5	24,5	41,7	61,3	74,0	26,0
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,0	0,4	8,4	17,9	42,3	73,4	(63,1)	16,0
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	(0,0)	1,0	15,4	36,5	(57,5)	*	*	17,8
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	0,0	1,0	1,8	8,0	18,7	31,5	46,4	20,3
Second	1,1	0,7	3,9	7,7	19,3	38,2	55,4	22,2
Moyen	0,0	2,3	5,7	12,8	26,3	43,7	63,9	24,6
Quatrième	0,0	1,6	6,3	19,0	30,4	55,7	61,8	25,4
Le plus élevé	0,0	0,6	11,2	30,0	52,8	71,8	73,3	29,9
Ensemble	0,3	1,2	6,4	16,6	29,9	47,6	57,0	24,5

Note : Les femmes stérilisées ou celles dont le partenaire/mari est stérilisé sont considérées comme ne voulant plus d'enfant. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur au moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Le nombre d'enfants vivants inclut la grossesse actuelle

Tableau 6.2.2 Désir de limiter les naissances : Homme

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans actuellement en union qui ne veulent plus d'enfants, par nombre d'enfants vivants, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Nombre d'enfants vivants ¹							Ensemble
	0	1	2	3	4	5	6+	
Résidence								
Cotonou	*	(4,1)	20,1	47,9	(54,3)	*	*	35,3
Autres villes	0,0	2,6	6,1	21,4	33,7	29,7	36,3	21,6
Ensemble urbain	0,0	2,7	8,5	26,4	37,0	32,9	36,7	23,3
Rural	0,8	1,0	3,3	7,4	17,8	24,3	29,3	15,3
Département								
Alibori	*	2,5	0,0	0,9	(1,7)	(9,7)	5,4	3,1
Atacora	*	0,0	(0,0)	(18,4)	(3,9)	(1,1)	33,5	12,2
Atlantique	*	2,5	7,1	21,8	44,7	(53,5)	50,8	30,2
Borgou	*	0,0	1,1	7,5	(22,6)	13,6	22,9	12,4
Collines	*	(0,0)	(12,3)	(12,5)	(20,4)	(31,1)	39,3	21,1
Couffo	*	*	(0,0)	*	(16,7)	(20,5)	27,5	15,2
Donga	*	(0,0)	(2,4)	(2,9)	(3,9)	(14,7)	22,2	9,1
Littoral	*	(4,1)	20,1	47,9	(54,3)	*	*	35,3
Mono	*	(0,0)	(5,7)	(13,8)	*	*	(56,5)	21,8
Ouémé	*	(7,9)	(15,7)	42,8	(53,1)	(47,3)	61,6	38,7
Plateau	*	*	(0,0)	(0,0)	(17,0)	*	27,1	15,7
Zou	*	(2,1)	3,6	(1,4)	(22,3)	(28,9)	38,6	18,4
Niveau d'instruction								
Aucun	1,0	2,0	3,1	7,7	14,1	18,1	22,8	13,7
Primaire	(0,0)	0,4	3,6	13,8	34,2	40,2	44,4	24,5
Secondaire 1 ^{er} cycle	(0,0)	2,2	5,4	23,1	29,4	26,0	50,0	21,1
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	*	0,0	9,0	27,8	(38,1)	*	(42,9)	21,6
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	(0,0)	2,3	0,0	6,5	12,8	7,8	22,5	11,1
Second	(0,0)	0,4	5,6	3,3	18,6	21,1	30,8	15,7
Moyen	*	1,9	2,1	12,7	18,4	23,2	31,9	16,7
Quatrième	*	2,0	5,2	15,9	23,9	34,0	34,1	19,8
Le plus élevé	(0,0)	2,1	11,3	32,8	48,0	51,0	50,7	28,9
Ensemble 15-49	0,5	1,7	5,7	15,6	26,0	27,9	31,9	18,6
50-64	*	*	*	(64,6)	65,0	64,1	60,9	61,0
Ensemble 15-64	1,9	3,1	7,0	19,5	30,2	34,0	42,3	26,0

Note : Les hommes stérilisés ou qui ont déclaré à la question concernant le désir d'enfants que leur épouse/partenaire était stérilisée sont considérés comme ne voulant plus d'enfant. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur au moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Le nombre d'enfants vivants comprend un enfant supplémentaire si l'épouse/partenaire de l'enquêté est enceinte (ou si une des épouses est enceinte, pour les hommes qui ont actuellement plus d'une épouse).

Tableau 6.3 Nombre idéal d'enfants selon le nombre d'enfants vivants

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans par nombre idéal d'enfants et nombre idéal moyen d'enfants pour l'ensemble des enquêtés et pour les enquêtés actuellement en union, selon le nombre d'enfants vivants, EDSB-V Bénin 2017-2018

Nombre idéal d'enfants	Nombre d'enfants vivants							Ensemble
	0	1	2	3	4	5	6+	
FEMME¹								
0	2,6	3,8	3,8	3,3	4,6	4,1	5,0	3,7
1	0,4	0,4	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3
2	7,4	5,6	4,7	3,8	2,4	1,4	1,0	4,3
3	11,4	9,2	4,9	6,0	2,1	3,1	1,4	6,3
4	38,4	37,9	38,9	31,9	26,9	20,5	12,8	31,2
5	10,6	11,5	12,2	14,8	8,8	12,1	7,4	11,0
6+	23,5	26,2	30,5	34,6	48,5	51,8	64,4	37,2
Réponse non numérique	5,8	5,4	4,7	5,6	6,6	6,7	7,9	6,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes	3 839	2 360	2 201	2 083	1 904	1 440	2 101	15 928
Nombre idéal d'enfants pour :²								
Ensemble des femmes	4,5	4,6	4,9	5,0	5,4	5,7	6,7	5,1
Effectif de femmes	3 618	2 232	2 097	1 966	1 779	1 343	1 936	14 971
Femmes actuellement en union								
Effectif de femmes actuellement en union	339	1 740	1 894	1 816	1 648	1 239	1 793	10 469
HOMME³								
0	1,9	0,5	1,6	1,8	1,4	1,9	2,1	1,7
1	0,2	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
2	4,3	3,5	4,1	4,5	3,3	1,2	1,4	3,5
3	9,0	8,3	4,7	7,3	1,9	3,8	1,8	6,5
4	24,3	24,6	28,3	17,6	17,8	14,8	9,6	20,8
5	16,4	16,0	12,3	15,4	10,3	9,5	5,7	13,4
6+	40,5	43,0	43,0	49,0	56,5	58,8	68,3	48,2
Réponse non numérique	3,4	3,6	5,7	4,4	8,8	9,8	11,1	5,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	2 986	621	615	575	480	445	1 005	6 727
Nombre idéal d'enfants pour les hommes de 15-49 ans :²								
Ensemble des hommes	6,1	6,2	6,3	6,6	6,8	7,6	10,8	7,0
Effectif d'hommes	2 886	599	580	550	438	401	894	6 347
Hommes actuellement en union								
Effectif d'hommes actuellement en union	146	514	532	521	422	384	882	3 401
Nombre idéal d'enfants pour les hommes de 15-64 ans :²								
Ensemble des hommes	6,1	6,2	6,3	6,5	6,7	7,4	10,7	7,2
Effectif d'hommes	2 900	623	599	601	499	496	1 398	7 116
Hommes actuellement en union								
Effectif d'hommes actuellement en union	150	531	547	564	475	465	1 367	4 099

¹ Le nombre d'enfants vivants inclut la grossesse actuelle pour les femmes.

² Les moyennes sont calculées en excluant les enquêtés qui ont fourni des réponses non numériques.

³ Pour les hommes, le nombre d'enfants vivants comprend un enfant supplémentaire si l'épouse de l'enquêté est enceinte (ou si l'une des épouses est enceinte si l'homme a actuellement plus d'une épouse).

Tableau 6.4 Nombre idéal d'enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Nombre idéal d'enfants pour l'ensemble des femmes de 15-49 ans, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Nombre moyen	Effectif de femmes ¹
Groupe d'âges		
15-19	4,6	3 151
20-24	4,8	2 778
25-29	5,0	2 826
30-34	5,4	2 070
35-39	5,6	1 741
40-44	5,8	1 232
45-49	5,9	1 172
Résidence		
Cotonou	3,9	915
Autres villes	4,8	5 393
Ensemble urbain	4,7	6 308
Rural	5,5	8 663
Département		
Alibori	5,2	1 761
Atacora	6,4	1 282
Atlantique	4,5	1 904
Borgou	6,3	1 698
Collines	4,7	1 114
Couffo	6,2	992
Donga	6,0	731
Littoral	3,9	915
Mono	4,5	747
Ouémé	4,5	1 350
Plateau	4,7	920
Zou	4,8	1 556
Niveau d'instruction		
Aucun	5,8	8 156
Primaire	4,8	2 951
Secondaire 1 ^{er} cycle	4,3	2 737
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	3,7	1 127
Quintiles de bien-être économique		
Le plus bas	6,2	2 578
Second	5,6	2 821
Moyen	5,4	2 916
Quatrième	4,8	3 197
Le plus élevé	4,1	3 458
Ensemble	5,1	14 971

¹ Effectif de femmes ayant donné une réponse numérique.

Tableau 6.5 Planification de la fécondité

Répartition (en %) des naissances de femmes de 15-49 ans ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête (y compris les grossesses actuelles), par planification de la grossesse, selon le rang de naissance et l'âge de la mère à la naissance de l'enfant, EDSB-V Bénin 2017-2018

Rang de naissance et âge de la mère à la naissance de l'enfant	Planification de la grossesse			Total	Effectif de naissances
	Voulue au moment	Voulue plus tard	Non désirée		
Rang de naissance					
1	76,9	22,0	1,1	100,0	3 377
2	79,1	19,5	1,4	100,0	2 939
3	78,6	18,7	2,7	100,0	2 588
4+	75,0	13,2	11,8	100,0	6 441
Âge de la mère à la naissance de l'enfant					
<20	72,2	26,3	1,5	100,0	1 929
20-24	76,3	21,9	1,8	100,0	4 246
25-29	79,8	16,1	4,2	100,0	4 276
30-34	78,1	12,5	9,4	100,0	2 737
35-39	75,2	9,1	15,7	100,0	1 484
40-44	71,9	7,5	20,6	100,0	582
45-49	74,4	5,8	19,8	100,0	90
Ensemble	76,8	17,3	5,9	100,0	15 345

Tableau 6.6 Taux de fécondité désirée

Indice Synthétique de Fécondité désiré (ISFD) et Indice Synthétique de Fécondité pour les 3 années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Taux de fécondité désiré	Taux de fécondité
Résidence		
Cotonou	3,5	4,0
Autres villes	4,7	5,4
Ensemble urbain	4,5	5,2
Rural	5,2	6,1
Département		
Alibori	4,4	6,2
Atacora	6,1	6,7
Atlantique	4,0	4,9
Borgou	5,9	6,2
Collines	4,4	5,4
Couffo	5,4	5,9
Donga	6,5	6,8
Littoral	3,5	4,0
Mono	4,6	5,7
Ouémé	4,7	5,1
Plateau	4,9	5,7
Zou	4,7	5,6
Niveau d'instruction		
Aucun	5,4	6,4
Primaire	4,7	5,4
Secondaire 1 ^{er} cycle	4,0	4,5
Secondaire 2 ^e cycle ou plus	3,3	3,6
Quintiles de bien-être économique		
Le plus bas	6,0	7,0
Second	5,2	6,2
Moyen	5,3	6,1
Quatrième	4,6	5,3
Le plus élevé	3,6	4,2
Ensemble	4,9	5,7

Note : Les taux sont basés sur les naissances des femmes de 15-49 ans durant la période 1-36 mois précédant l'enquête. L'ISF est le même que celui présenté au Tableau 5.2.

Résultats clés

- **Utilisation de la contraception :** Le pourcentage de femmes de 15-49 ans en union qui utilisaient une méthode de contraception moderne au moment de l'enquête est de 12 %. Par rapport à l'EDSB-IV 2011-2012, on note une augmentation de ce niveau d'utilisation, la prévalence moderne étant passée de 8 % à 12 %.
- **Méthodes utilisées :** Les méthodes modernes sont les méthodes les plus utilisées par les femmes en union, en particulier les implants et les injectables. Le pourcentage d'utilisatrices d'implants a augmenté entre 2011-2012 et 2017-2018, passant de 1 % à 5 %.
- **Choix informé de la méthode de planification familiale :** Seulement 52 % des femmes qui utilisent la contraception moderne ont reçu les informations qui permettent un choix informé.¹
- **Discontinuité contraceptive :** Parmi les épisodes d'utilisation contraceptive ayant eu lieu dans les cinq années précédant l'enquête, 33 % ont été discontinués dans les douze mois. Les injectables constituent la méthode qui connaît le taux de discontinuité le plus élevé (57 %).
- **Besoins non satisfaits en matière de planification familiale :** 32 % des femmes de 15-49 ans en union ont des besoins non satisfaits en matière de planification familiale.

Les couples peuvent utiliser des méthodes contraceptives pour limiter ou espacer le nombre d'enfants. Ce chapitre présente entre autres les résultats sur l'utilisation et les sources d'approvisionnement des méthodes contraceptives, le choix informé des méthodes et les taux et les raisons de discontinuité contraceptive. En outre, il présente l'estimation de la demande potentielle en planification familiale ainsi que les résultats concernant le contact des non utilisatrices de la contraception avec des prestataires de planification familiale.

L'utilisation de la contraception permet d'éviter les grossesses non désirées ou non planifiées. Elle permet également de prévenir les grossesses à risque et améliore aussi la santé de la mère et de l'enfant. Le Plan National de Développement Sanitaire 2009-2018 (PNDS) a inscrit comme priorité la promotion de la Planification Familiale (PF) dans le souci de réduire la mortalité maternelle et néo-natale. Le Bénin a également adopté le Plan d'Action National Budgétisé pour la Planification Familiale (PANBPF) pour la

¹ Y compris les femmes qui ont été informées des effets secondaires ou des problèmes liés à l'utilisation, de ce qu'il fallait faire en cas d'effets secondaires, et celles qui ont été informées par un agent de santé ou un agent en PF d'autres méthodes qui pourraient être utilisées

période 2014-2018. Ce plan a eu pour objectif d'atteindre une prévalence contraceptive de 20 % pour les méthodes modernes chez les femmes de 15-49 ans.

7.1 CONNAISSANCE ET UTILISATION DE LA CONTRACEPTION

La connaissance des méthodes contraceptives est relativement élevée au Bénin. En effet, 94 % des femmes et 95 % des hommes de 15-49 ans ont déclaré avoir entendu parler d'une méthode contraceptive (**Tableau 7.1**).

Parmi les méthodes modernes, pour l'ensemble des femmes et des hommes, on constate que le condom masculin (90 % chez les femmes et 93 % chez les hommes), les injectables (86 % chez les femmes et 72 % chez les hommes), les implants (85 % chez les femmes et 69 % chez les hommes) et les pilules (82 % chez les femmes et 74 % chez les hommes) sont les méthodes les plus connues. À l'opposé, c'est la stérilisation masculine qui est la méthode la moins connue (20 % des femmes et 23 % des hommes).

Ainsi, parmi les 11 méthodes contraceptives (modernes et traditionnelles), les femmes de 15-49 ans actuellement en union en connaissent, en moyenne, 8,0 contre 7,5 chez les hommes en union du même groupe d'âges.

Les résultats par âge montrent que, chez les femmes en union, la connaissance d'au moins une méthode contraceptive moderne est plus faible chez les jeunes de 15-19 ans que chez les autres (88 % contre au moins 96 % dans les autres groupes d'âges). On note aussi des écarts de ce niveau de connaissance entre les départements, le pourcentage de femmes en union ayant entendu parler d'au moins une méthode contraceptive moderne variant de 88 % dans le Borgou à pratiquement 100 % dans le Littoral. Chez les hommes en union, c'est dans l'Ouémé que ce niveau de connaissance est le plus faible (76 %) (**Tableau 7.2**).

Prévalence de la contraception

Pourcentage de femmes qui utilisent une méthode contraceptive

Échantillon : Toutes les femmes de 15-49 ans, actuellement en union, et les femmes de 15-49 ans non en union sexuellement actives

Au Bénin, 16 % des femmes de 15-49 ans en union utilisaient au moment de l'enquête une méthode contraceptive, principalement une méthode moderne (12 %). Seulement 3 % utilisaient une méthode traditionnelle (**Tableau 7.3**). La prévalence de la contraception parmi les femmes non en union sexuellement actives est nettement plus élevée (29 % pour toutes les méthodes et 24 % pour les méthodes modernes).

Méthodes modernes

Comprennent la stérilisation masculine et féminine, les injectables, le dispositif intra-utérin (DIU), les pilules contraceptives, les implants, le condom masculin et le condom féminin, la méthode des jours fixes (MJF), la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA) et la pilule du lendemain

Parmi les méthodes contraceptives modernes, les implants et les injectables sont les méthodes les plus utilisées par les femmes en union (respectivement 5 % et 2 %) (**Tableau 7.4.1** et **Graphique 7.1**).


Tendances : La comparaison avec les résultats des enquêtes précédentes montre que la prévalence contraceptive moderne parmi les femmes en union a augmenté. Elle est passée de 3 % en 1996 à 7 % en 2001 puis à 6 % en 2006 et à 8 % en 2011-2012 pour atteindre 12 % en 2017-2018. En particulier, on note une augmentation du recours aux méthodes modernes au détriment des méthodes traditionnelles (**Tableau 7.4.2** et **Graphique 7.2**).

Variations par caractéristique

- La prévalence contraceptive moderne augmente avec le nombre d'enfants vivants, de 2 % chez les femmes en union sans enfant à 15 % chez celles ayant 5 enfants ou plus (**Tableau 7.4.1**).


Graphique 7.1 Utilisation contraceptive

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui utilisent actuellement une méthode contraceptive



Graphique 7.2 Tendances de l'utilisation contraceptive

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union qui utilisent une méthode de contraception



- L'utilisation de la contraception moderne varie selon les départements. La prévalence contraceptive la plus élevée est enregistrée dans le Littoral (19 %) et la plus faible dans le Couffo (5 %), soit un écart de 14 points de pourcentage (**Tableau 7.4.1** et **Graphique 7.3**).
- Le niveau d'utilisation de la contraception moderne augmente avec le niveau d'instruction, passant pour les méthodes modernes de 11 % chez les femmes en union sans niveau d'instruction à 23 % parmi celles qui ont un niveau secondaire 2^d cycle ou plus.
- L'utilisation actuelle d'une méthode contraceptive moderne varie avec le quintile de bien-être économique, passant de 9 % pour le plus bas niveau à 18 % pour le plus élevé (**Graphique 7.4**).
- La prévalence contraceptive moderne chez les femmes de 15-49 ans non en union et sexuellement actives varie en fonction du milieu de résidence. Elle est de 27 % pour le milieu urbain et de 21 % pour le milieu rural soit un écart de 6 points de pourcentage.


Connaissance de la période féconde

Au cours de l'EDSB-V 2017-2018, des questions sur la connaissance de la période féconde dans le cycle menstruel ont été posées aux femmes de 15-49 ans. Les résultats montrent que 29 % savent situer correctement cette période. Parmi les utilisatrices de la méthode du rythme, cette proportion est de 47 % ; pour celle de la Méthode des Jours Fixes (MJF), cette proportion est de 74 % (**Tableau 7.5**).

La proportion de femmes qui savent situer correctement la période féconde est plus faible chez les moins de 20 ans (21 %) et plus élevée chez les femmes de 25-29 ans et 30-34 ans (32 % dans chaque groupe d'âges) (**Tableau 7.6**).


Graphique 7.3 Utilisation d'une méthode moderne contraceptive par département

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union



Graphique 7.4 Utilisation des méthodes modernes par bien-être économique du ménage

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union



7.2 SOURCE D'APPROVISIONNEMENT DES METHODES MODERNES

Source d'approvisionnement des méthodes modernes

Endroit où la méthode moderne actuellement utilisée a été obtenue la dernière fois.


Échantillon : Femmes de 15-49 ans utilisant actuellement une méthode moderne de contraception

Au Bénin, le secteur public est la plus grande source d'approvisionnement des méthodes contraceptives modernes. Près de deux utilisatrices de méthodes modernes sur trois (62 %) a obtenu récemment sa méthode dans le secteur public dont (47 %) dans les centres de santé du gouvernement. Dans 28 % des cas, les utilisatrices se sont approvisionnées auprès du secteur médical privé, en majorité dans une pharmacie (17 %). Les hôpitaux/cliniques privées interviennent dans 8 % des cas. En outre, 7 % des femmes se sont approvisionnées au niveau d'autres sources comme boutique, ami/parents (exclusivement en condom masculin) (**Tableau 7.7** et **Graphique 7.5**).

Le secteur public est prédominant dans l'approvisionnement en méthodes contraceptives comme les implants (91 %), les injectables (81 %) et le DIU (64 %). Par contre, il pèse moins dans l'approvisionnement en pilules (31 %) et en condoms (8 %). Le secteur médical privé joue un rôle important dans l'approvisionnement en condoms masculins (51 %) mais aussi en pilules (69 %), majoritairement par la pharmacie (64 %) (**Tableau 7.7**).

Graphique 7.5 Source d'approvisionnement des méthodes modernes de contraception

Répartition (en %) des utilisatrices actuelles de méthodes modernes selon la source d'approvisionnement la plus récente



Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100 % en raison de l'arrondissement.

7.3 CHOIX INFORMÉ

Choix informé

Un choix informé signifie qu'au moment où la femme a commencé l'épisode actuel d'utilisation de la méthode, elle a été informée sur les effets secondaires de la méthode, sur ce qu'il fallait faire en cas d'effets secondaires et sur d'autres méthodes qu'elle pourrait utiliser.

Échantillon : Femmes de 15-49 ans qui utilisent actuellement certaines méthodes modernes de contraception et dont le dernier épisode d'utilisation a commencé dans les 5 années avant l'enquête.

Parmi les femmes de 15-49 ans dont la dernière période d'utilisation d'une méthode a commencé dans les cinq années avant l'enquête, 62 % ont été informées de possibles effets secondaires ou de problèmes liés à l'utilisation de leur méthode. Par ailleurs, 55 % ont été informées de ce qu'il fallait faire en cas d'effets secondaires. Trois quarts (75 %) ont reçu des informations d'un agent de santé ou d'un agent en planification familiale concernant l'existence d'autres méthodes qu'elles pourraient utiliser. Dans l'ensemble, 52 % des femmes ont reçu les trois types d'informations (**Tableau 7.8**).

7.4 DISCONTINUITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES

Taux de discontinuité contraceptive

Pourcentage d'épisodes contraceptifs discontinués au cours des 12 mois


Échantillon : Épisodes d'utilisation contraceptive des 5 années avant l'enquête des femmes actuellement âgées de 15-49 ans (une femme a pu avoir plus d'un épisode)

Parmi les épisodes d'utilisation contraceptive commencés par les femmes au cours des cinq dernières années, 33 % ont été discontinués dans les 12 mois. Dans 3 % d'épisodes, les femmes ont changé de méthode. Les taux de discontinuité sont élevés pour les injectables (57 %) et les pilules (48 %) (Tableau 7.9 et Graphique 7.6).

Les raisons principales de discontinuation les plus fréquemment avancées concernent le souhait de tomber enceinte (48 %) et les soucis pour la santé et les effets secondaires (13 %) (Tableau 7.10).

Graphique 7.6 Taux de discontinuation des méthodes contraceptives

Pourcentage d'épisodes contraceptifs discontinués au cours des 12 mois, parmi les femmes de 15-49 ans



7.5 DEMANDE EN PLANIFICATION FAMILIALE

Besoins non satisfaits en matière de planification familiale

Proportion de femmes qui (1) ne sont pas enceintes et ni en aménorrhée post-partum et qui sont considérées comme étant fécondes et qui veulent retarder la venue du prochain enfant de deux années ou plus ou qui ne veulent plus d'enfant mais qui n'utilisent pas de méthode contraceptive, ou (2) dont la grossesse actuelle a été mal planifiée ou est non souhaitée, ou (3) qui sont en aménorrhée post-partum et dont la dernière naissance des deux dernières années était mal planifiée ou non souhaitée.

Échantillon : Toutes les femmes de 15-49 ans, les femmes de 15-49 ans actuellement en union et les femmes de 15-49 ans non en union sexuellement actives

Demande pour la planification familiale :

Besoins non satisfaits pour la planification familiale + utilisation actuelle de la contraception (n'importe quelle méthode)

Proportion de demande satisfaite :

$$\frac{\text{Utilisation actuelle de la contraception (n'importe quelle méthode)}}{\text{Besoins non satisfaits + utilisation actuelle de la contraception (n'importe quelle méthode)}}$$

Proportion de demande satisfaite par les méthodes modernes :

$$\frac{\text{Utilisation actuelle de la contraception (n'importe quelle méthode moderne)}}{\text{Besoins non satisfaits + utilisation actuelle de la contraception (n'importe quelle méthode)}}$$

Les résultats de l'EDSB-V montrent que 32 % des femmes actuellement en union ont des besoins non satisfaits en matière de planification familiale dont 23 % pour espacer les naissances et 10 % pour les limiter (**Graphique 7.7**). Pour 16 % des femmes actuellement en union, les besoins en matière de planification familiale sont satisfaits. Globalement, la demande totale en planification familiale s'élève à 48 % dont 33 % orientés vers l'espacement et 15 % vers la limitation. Cette demande en planification est satisfaite dans 32 % des cas dont 26 % par des méthodes modernes (**Tableau 7.11.1**).


Variations par caractéristique

- La proportion des femmes actuellement en union dont les besoins en PF ne sont pas satisfaits est plus élevée dans le groupe d'âges 20-24 ans (37 %) (**Tableau 7.11.1**).

Tendances : La demande totale en planification parmi les femmes de 15-49 ans actuellement en union est restée stationnaire entre 1996 et 2017-2018. Dans la même période, le pourcentage de besoins non satisfaits a augmenté passant de 28 % en 1996 à 32 % en 2017-2018 et le pourcentage de demande satisfaite par des méthodes modernes est passée de 8 % en 1996 à 26 % en 2017-2018 (**Graphique 7.8**).

Graphique 7.7 Demande en matière de planification familiale


Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans actuellement en union selon les besoins en matière de planification familiale



Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100 % en raison de l'arrondissement.

Graphique 7.8 Tendances de la demande en matière de planification familiale

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union



- Dans les départements, les proportions de femmes actuellement en union dont les besoins en planification familiale ne sont pas satisfaits varient d'un minimum de 22 % dans l'Alibori à un maximum de 38 % dans le Couffo et l'Atlantique (**Graphique 7.9**).
- Les résultats selon les quintiles de bien-être économique montrent que c'est dans le quintile le plus bas que la proportion de femmes en union dont les besoins en planification familiale ne sont pas satisfaits est la plus faible (29 % contre 33-34 % dans les autres quintiles) (**Graphique 7.10**).
- La demande totale en planification familiale des femmes non en union sexuellement actives est supérieure à celles des femmes en union (79 % contre 48 %) (**Tableau 7.11.2**).

7.6 PRISE DE DECISION SUR LA PLANIFICATION FAMILIALE

Au cours de l'EDSB-V 2017-2018, des informations sur la prise de décision concernant l'utilisation de la planification familiale ont été collectées auprès de deux catégories de femmes : les femmes en union qui utilisent la contraception et les femmes en union qui ne l'utilise pas.

Parmi les femmes en union qui utilisent actuellement la contraception, la décision d'utilisation est prise, dans la majorité des cas par la femme (46 %). Dans 43 % des cas, c'est principalement la femme et le mari/partenaire qui a pris la décision et dans 11 % des cas, c'est le mari/partenaire. Au Bénin, la femme est donc pratiquement toujours impliquée dans ce type de décision (89 %).


Parmi les femmes en union qui n'utilisent pas actuellement la contraception, on constate que la décision de ne pas utiliser est prise principalement par la femme (60 %). Dans 20 % des cas, la décision est conjointe et dans 15 % par le mari/partenaire principalement (**Tableau 7.12**).

Utilisation future de la contraception

L'EDSB-V a recueilli des informations auprès des femmes de 15-49 ans actuellement en union non-utilisatrices de la contraception sur leur intention d'utiliser la contraception dans le futur. Parmi ces femmes, un peu plus d'une sur deux (54 %) n'a pas l'intention de utiliser la contraception dans le futur (**Tableau 7.13**).


Graphique 7.9 Besoins non satisfaits par département

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale



Graphique 7.10 Besoins non satisfaits par bien-être économique du ménage

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale



Exposition aux messages sur la planification familiale dans les médias

Plus de la moitié des femmes (45 %) et des hommes (47 %) n'ont ni vu, ni entendu des messages sur la planification familiale par le biais de médias, comme la radio, la télévision, les journaux, le téléphone portable, ou d'autres médias comme une affiche, prospectus/brochure, animation culturelle/éducative, lieu de culte ou à l'école (**Tableau 7.14.1**).

C'est par le canal de la radio que les femmes et les hommes ont été le plus fréquemment informés sur la planification familiale (respectivement 43 % et 41 %), suivie par la télévision (respectivement 19 % et 18 %). Pour le Bénin, d'autres médias mentionnés par les femmes et les hommes comme source d'information sur la planification familiale sont : des affiches, des animations culturelle/éducatives et des écoles. La proportion d'hommes et de femmes exposés aux messages sur la planification familiale par le biais des journaux/magazine est faible, respectivement (9 % contre 8 %).

Au cours de l'enquête, on a demandé aux femmes âgées de 15-49 ans, si elles pensent qu'il est acceptable de passer des messages sur la planification familiale dans les médias. L'opinion des femmes varie selon le type de média : la plupart des femmes pensent qu'il est acceptable de passer des messages sur la planification familiale à la télévision (86 %), dans les journaux/magazines (84 %), sur la radio (83 %), ou par le téléphone portable (81 %). Par contre, les proportions de femmes qui pensent qu'il est acceptable de passer des messages sur la planification familiale dans un lieu de culte (église ou mosquée) est nettement plus faible (7 %) (**Tableau 7.14.2**).

7.7 CONTACT DES NON UTILISATRICES DE LA CONTRACEPTION AVEC DES PRESTATAIRES DE PLANIFICATION FAMILIALE

Contact des non utilisatrices de la contraception avec des prestataires de planification familiale

Les enquêtées ont discuté de planification familiale au cours des 12 mois avant l'enquête avec un agent de terrain ou durant une visite dans un établissement de santé.

Échantillon : Femmes de 15-49 ans qui n'utilisent pas actuellement de méthode contraceptive

La majorité de femmes (82 %) non utilisatrices de la contraception n'ont parlé de planification familiale ni avec un agent de terrain, ni dans un établissement de santé. Seulement 8 % des femmes non utilisatrices de la planification familiale ont reçu la visite d'un agent de terrain et ont parlé de planification familiale et 14 % se sont rendues dans un établissement de santé et ont parlé de planification familiale au cours des 12 derniers mois (**Tableau 7.15**).

Variations par caractéristique

- La proportion de femmes non utilisatrices n'ayant pas discuté de planification familiale dans un établissement sanitaire ou avec un agent de terrain est plus élevée chez les femmes de 15-19 ans (91 % contre 76 % chez les femmes de 25-29 ans et 30-34 ans) (**Tableau 7.15**).
- C'est dans les groupes d'âges 25-29 ans et 30-34 ans, que le pourcentage de femmes qui informées sur la planification familiale est le plus élevé puisque 10 % en ont parlé à un agent de terrain et 20 % dans un établissement de santé.
- Le pourcentage de femmes ayant parlé de la planification avec un agent de terrain varie de moins d'un pour cent dans l'Atacora à 18 % dans le Plateau. En ce qui concerne les femmes qui ont discuté de PF dans un établissement de santé, les pourcentages varient de 8 % dans le Mono et la Donga à 20 % dans l'Alibori.

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'information sur la planification familiale, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 7.1** **Connaissance des méthodes contraceptives**
- **Tableau 7.2** **Connaissance des méthodes contraceptives selon certaines caractéristiques sociodémographiques**
- **Tableau 7.3** **Utilisation actuelle de la contraception selon âge**
- **Tableau 7.4.1** **Utilisation actuelle de la contraception selon certaines caractéristiques sociodémographiques**
- **Tableau 7.4.2** **Tendances de l'utilisation actuelle de la contraception**
- **Tableau 7.5** **Connaissance de la période de fertilité**
- **Tableau 7.6** **Connaissance de la période de fertilité par âge**
- **Tableau 7.7** **Source d'approvisionnement des méthodes modernes de contraception**
- **Tableau 7.8** **Choix informé de la méthode contraceptive**
- **Tableau 7.9** **Taux de discontinuation des méthodes contraceptives sur 12 mois**
- **Tableau 7.10** **Raisons de la discontinuation des méthodes contraceptives**
- **Tableau 7.11.1** **Besoins et demande en matière de planification familiale parmi les femmes actuellement en union**
- **Tableau 7.11.2** **Besoins et demande en matière de planification familiale pour l'ensemble des femmes et pour les femmes non en union sexuellement actives**
- **Tableau 7.12** **Prise de décision concernant la planification familiale**
- **Tableau 7.13** **Utilisation future de la contraception**
- **Tableau 7.14.1** **Exposition aux messages sur la planification familiale**
- **Tableau 7.14.2** **Acceptable de parler de la planification familiale**
- **Tableau 7.15** **Contact des non utilisatrices de la contraception avec des prestataires de planification familiale**

Tableau 7.1 Connaissance des méthodes contraceptives

Pourcentage de tous les enquêtés de 15-49 ans, pourcentage d'enquêtés de 15-49 ans actuellement en union et pourcentage d'enquêtés de 15-49 ans qui ne sont pas en union et qui sont sexuellement actifs qui ont déjà entendu parler d'une méthode contraceptive, selon la méthode, EDSB-V Bénin 2017-2018

Méthode	Femme			Homme		
	Ensemble des femmes	Femme actuellement en union	Femme non en union sexuellement active ¹	Ensemble des hommes	Homme actuellement en union	Homme non en union sexuellement actif ¹
N'importe quelle méthode	94,4	96,5	98,8	94,6	96,9	98,1
Une méthode moderne	94,2	96,3	98,8	94,4	96,8	97,9
Stérilisation féminine	43,3	45,8	42,2	39,2	47,1	39,2
Stérilisation masculine	19,8	21,0	20,7	22,5	27,0	23,8
DIU	57,6	62,7	54,9	33,8	41,7	35,1
Injectables	85,6	90,3	90,4	71,9	82,9	73,9
Implants	84,9	90,8	90,1	68,9	80,4	71,4
Pilule	81,5	86,4	87,4	73,5	83,0	77,4
Condom masculin	89,7	91,6	95,9	92,9	95,6	96,3
Condom féminin	53,4	53,4	66,6	57,4	63,7	65,4
Pilule du lendemain	37,7	39,8	47,2	34,9	41,6	40,9
Méthode des jours fixes	45,0	48,8	48,2	32,0	39,3	34,1
MAMA	38,8	45,8	28,1	15,2	19,5	15,0
Autre méthode moderne	0,4	0,4	1,1	0,5	0,7	1,0
Une méthode traditionnelle	66,2	70,0	71,6	63,0	71,7	68,5
Méthode du rythme	59,8	63,0	65,5	42,8	50,1	45,3
Retrait	49,8	53,3	57,1	60,3	69,1	66,8
Autre méthode traditionnelle	2,2	2,6	1,8	3,2	4,7	3,0
Nombre moyen de méthodes connues par les enquêtés de 15-49 ans	7,5	8,0	8,0	6,5	7,5	6,9
Effectif d'enquêtés	15 928	11 168	893	6 727	3 675	720
Nombre moyen de méthodes connues par les enquêtés de 15-64 ans	na	na	na	6,6	7,5	6,9
Effectif d'enquêtés	na	na	na	7 595	4 457	742

na = Non applicable

MAMA = Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée

¹ Sexuellement actif signifie que la personne a eu ses derniers rapports sexuels dans les 30 jours qui ont précédé l'enquête.

Tableau 7.2 Connaissance des méthodes contraceptives selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans, actuellement en union, qui ont entendu parler d'au moins une méthode contraceptive et pourcentage ayant entendu parler d'au moins une méthode contraceptive moderne, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Femme			Homme		
	A entendu parler d'au moins une méthode	A entendu parler d'au moins une méthode moderne ¹	Effectif de femmes	A entendu parler d'au moins une méthode	A entendu parler d'au moins une méthode moderne ¹	Effectif d'hommes
Groupe d'âges						
15-19	88,4	87,9	618	*	*	9
20-24	95,9	95,8	1 966	97,5	97,5	284
25-29	96,6	96,5	2 658	97,1	96,8	735
30-34	97,5	97,4	2 035	96,8	96,8	777
35-39	97,8	97,6	1 706	97,1	96,8	754
40-44	97,6	97,5	1 166	96,6	96,6	574
45-49	96,5	95,9	1 020	96,8	96,8	543
Résidence						
Cotonou	99,6	99,6	551	98,5	98,4	182
Autres villes	97,0	96,8	3 881	96,0	96,0	1 326
Ensemble urbain	97,3	97,2	4 431	96,3	96,3	1 509
Rural	95,9	95,7	6 737	97,4	97,2	2 167
Département						
Alibori	97,1	97,0	1 550	99,4	99,4	494
Atacora	96,7	96,3	892	99,3	99,3	300
Atlantique	98,8	98,8	1 311	98,9	98,7	446
Borgou	88,4	87,7	1 381	99,6	99,0	493
Collines	97,6	97,1	738	96,7	96,7	239
Couffo	98,3	98,3	743	100,0	100,0	222
Donga	92,7	92,6	716	98,9	98,9	246
Littoral	99,6	99,6	551	98,5	98,4	182
Mono	97,8	97,6	514	100,0	100,0	158
Ouémé	98,1	98,0	985	75,6	75,6	351
Plateau	97,6	97,6	709	100,0	100,0	219
Zou	99,0	98,9	1 080	99,4	99,4	325
Niveau d'instruction						
Aucun	95,2	94,9	7 409	95,5	95,4	1 693
Primaire	98,9	98,8	1 984	97,2	97,0	926
Secondaire 1 ^{er} cycle	99,1	99,0	1 294	98,5	98,5	535
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	99,7	99,7	481	99,5	99,5	521
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	91,6	91,3	2 165	96,1	95,7	762
Second	95,3	94,9	2 220	96,7	96,7	715
Moyen	97,7	97,6	2 233	97,4	97,2	680
Quatrième	98,4	98,3	2 330	97,0	97,0	718
Le plus élevé	99,2	99,1	2 221	97,4	97,4	800
Ensemble 15-49	96,5	96,3	11 168	96,9	96,8	3 675
50-64	na	na	na	96,0	95,7	782
Ensemble 15-64	na	na	na	96,8	96,6	4 457

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

na = Non applicable

¹ Stérilisation féminine, stérilisation masculine, pilule, DIU, injectables, implants, condom masculin, condom féminin, pilule du lendemain, méthode des jours fixes (MJF), méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA) et d'autres méthodes modernes.

Tableau 7.3 Utilisation actuelle de la contraception selon âge

Répartition (en %) de l'ensemble des femmes de 15-49 ans, des femmes de 15-49 ans actuellement en union et des femmes de 15-49 ans non en union et sexuellement actives par méthode actuellement utilisée et selon l'âge, EDSB-V Bénin 2017-2018

Groupe d'âges	Méthode moderne					Méthode traditionnelle					Total	Effectif de femmes		
	Une méthode moderne	DIU	Injections	Implants	Pilule	Condom masculin	MJF	Autre méthode moderne ¹	Une méthode traditionnelle	Rythme			Retrait	Autre
ENSEMBLE DES FEMMES														
15-19	6,7	0,0	0,5	1,3	0,2	3,4	0,1	0,0	1,1	0,7	0,3	0,1	93,3	3 350
20-24	15,4	0,6	2,1	3,9	0,9	4,3	0,2	0,3	3,0	1,9	0,9	0,2	84,6	2 923
25-29	16,6	1,3	3,1	4,9	1,7	1,9	0,2	0,4	3,3	1,7	1,4	0,2	83,4	2 986
30-34	19,3	2,1	2,5	7,1	2,0	1,0	0,8	0,4	3,4	1,6	1,7	0,1	80,7	2 202
35-39	17,5	13,9	2,4	6,6	1,5	0,4	0,4	0,5	3,6	1,8	1,5	0,3	82,5	1 882
40-44	18,2	14,5	2,7	6,2	1,6	0,5	0,5	0,6	3,7	2,0	1,1	0,7	81,8	1 320
45-49	10,4	8,5	1,4	4,4	1,2	0,3	0,1	0,3	1,9	1,1	0,6	0,2	89,6	1 265
Ensemble	14,4	11,7	1,3	4,5	1,2	2,1	0,3	0,3	2,7	1,5	1,0	0,2	85,6	15 928
FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION														
15-19	6,3	0,2	1,1	2,4	0,6	0,9	0,0	0,0	1,1	0,4	0,2	0,5	93,7	618
20-24	12,2	0,7	2,1	3,7	1,1	1,3	0,2	0,4	2,7	1,6	1,0	0,1	87,8	1 966
25-29	15,6	1,2	2,8	4,8	1,6	1,5	0,2	0,3	3,2	1,7	1,4	0,2	84,4	2 658
30-34	19,4	2,2	2,6	7,0	2,1	0,9	0,8	0,4	3,4	1,5	1,8	0,1	80,6	2 035
35-39	18,3	14,6	2,6	6,8	1,5	0,4	0,5	0,6	3,7	1,8	1,6	0,3	81,7	1 706
40-44	18,3	14,5	2,2	6,6	1,7	0,5	0,5	0,7	3,8	1,9	1,1	0,7	81,7	1 166
45-49	11,6	9,3	1,6	5,1	1,2	0,3	0,1	0,3	2,3	1,3	0,8	0,2	88,4	1 020
Ensemble	15,5	12,4	1,6	5,4	1,5	0,9	0,4	0,4	3,1	1,6	1,3	0,3	84,5	11 168
FEMMES NON EN UNION SEXUELLEMENT ACTIVES²														
15-19	22,6	0,0	2,0	4,2	0,4	12,4	0,3	0,3	3,1	2,3	0,8	0,0	77,4	377
20-24	36,5	29,4	3,8	7,5	0,9	16,3	0,4	0,0	7,1	4,3	2,3	0,6	63,5	273
25+	29,5	23,4	2,0	10,2	2,6	3,2	0,9	0,0	6,0	4,1	1,9	0,0	70,5	242
Ensemble	28,8	23,6	0,7	6,8	1,1	11,1	0,5	0,1	5,1	3,4	1,6	0,2	71,2	893

Note : Si plus d'une méthode est utilisée, seule la plus efficace est prise en compte dans ce tableau.

MJF = Méthode des Jours Fixes.

¹ Y compris stérilisation féminine, pilule du lendemain, et méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA)

² Femmes ayant eu des rapports sexuels au cours des 30 jours précédant l'enquête.

Tableau 7.4.1. Utilisation actuelle de la contraception selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans actuellement en union et des femmes de 15-49 ans non en union sexuellement actives par méthode contraceptive actuellement utilisée, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Méthode moderne										Méthode traditionnelle				N'utilise pas actuellement	Effectif de femmes
	Une méthode moderne	DIU	Injectables	Implants	Pilule	Condom masculin	MJF	Autre méthode moderne ¹	Une méthode traditionnelle	Rythme	Retrait	Autre	Total			
FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION																
Nombre d'enfants vivants																
0	2,1	1,5	0,0	0,1	0,0	0,4	0,2	0,1	0,6	0,6	0,1	0,0	0,0	97,9	100,0	689
1-2	13,3	10,2	1,0	3,6	1,4	1,7	0,4	0,2	3,1	1,8	1,0	0,2	0,2	86,7	100,0	3 819
3-4	18,3	14,5	2,1	2,6	2,0	0,8	0,5	0,4	3,8	1,7	1,8	0,3	0,3	81,7	100,0	3 566
5+	18,0	15,1	2,2	2,3	1,4	0,3	0,2	0,6	2,9	1,3	1,3	0,3	0,3	82,0	100,0	3 094
Résidence																
Cotonou	27,2	19,2	4,7	2,9	3,4	1,5	1,0	0,7	8,0	4,1	3,1	0,7	0,7	72,8	100,0	551
Autres villes	16,8	13,9	2,2	2,4	1,6	1,2	0,5	0,5	2,9	1,7	0,9	0,3	0,3	83,2	100,0	3 881
Ensemble urbain	18,1	14,5	2,5	2,4	1,8	1,3	0,6	0,6	3,5	2,0	1,2	0,3	0,3	81,9	100,0	4 431
Rural	13,8	11,0	1,0	2,0	1,3	0,7	0,2	0,3	2,8	1,3	1,3	0,2	0,2	86,2	100,0	6 737
Département																
Alibori	15,7	13,5	1,3	3,3	1,1	0,1	0,0	0,4	2,2	1,9	0,0	0,3	0,3	84,3	100,0	1 550
Atacora	10,8	10,0	0,5	0,9	0,4	1,1	0,0	0,1	0,8	0,2	0,2	0,3	0,3	89,2	100,0	892
Atlantique	21,4	13,7	2,6	2,2	1,6	2,2	0,5	0,5	7,6	3,8	3,6	0,2	0,2	78,6	100,0	1 311
Borgou	12,8	12,0	0,9	2,9	1,1	0,2	0,4	0,0	0,8	0,5	0,0	0,2	0,2	87,2	100,0	1 381
Collines	20,7	18,1	0,7	3,6	2,9	1,6	1,9	0,3	2,6	0,0	2,5	0,1	0,1	79,3	100,0	738
Couffo	6,2	4,5	0,0	1,2	1,0	0,7	0,4	0,2	1,8	1,1	0,6	0,0	0,0	93,8	100,0	743
Donga	6,2	5,9	0,4	1,5	0,6	0,5	0,2	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	93,8	100,0	716
Littoral	27,2	19,2	4,7	2,9	3,4	1,5	1,0	0,7	8,0	4,1	3,1	0,7	0,7	72,8	100,0	551
Mono	23,2	18,0	1,2	2,2	2,7	2,7	0,0	0,4	5,2	2,8	1,8	0,5	0,5	76,8	100,0	514
Ouémé	21,1	15,2	5,6	1,1	1,8	0,9	0,3	0,6	6,0	3,3	2,4	0,2	0,2	78,9	100,0	985
Plateau	6,5	5,7	0,9	0,9	1,2	0,6	0,0	0,0	0,8	0,1	0,7	0,0	0,0	93,5	100,0	709
Zou	15,8	13,3	0,7	2,2	1,8	0,6	0,2	1,2	2,5	0,7	1,4	0,4	0,4	84,2	100,0	1 080
Niveau d'instruction																
Aucun	13,1	10,8	1,1	2,0	1,1	0,4	0,2	0,3	2,4	1,0	1,2	0,3	0,3	86,9	100,0	7 409
Primaire	18,5	14,8	2,6	2,5	1,9	1,6	0,4	0,5	3,6	2,0	1,5	0,2	0,2	81,5	100,0	1 984
Secondaire 1 ^{er} cycle	19,4	14,1	2,3	2,8	2,2	1,8	0,5	0,5	5,3	3,6	1,4	0,3	0,3	80,6	100,0	1 294
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	29,2	23,2	3,8	2,7	4,1	4,1	2,4	0,3	5,9	3,8	1,7	0,4	0,4	70,8	100,0	481
Quantiles de bien-être économique																
Le plus bas	11,3	9,4	0,6	1,6	0,8	0,4	0,0	0,1	1,9	0,9	0,9	0,1	0,1	88,7	100,0	2 165
Second	11,9	9,9	0,7	1,7	1,2	0,5	0,1	0,3	2,0	0,7	1,2	0,1	0,1	88,1	100,0	2 220
Moyen	14,1	11,9	1,0	2,3	1,4	0,7	0,4	0,3	2,2	1,3	0,7	0,2	0,2	85,9	100,0	2 333
Quatrième	16,8	12,9	1,7	2,2	2,0	1,1	0,4	0,6	4,0	1,6	1,8	0,6	0,6	83,2	100,0	2 330
Le plus élevé	23,3	17,9	4,2	3,1	2,0	2,0	1,0	0,5	5,4	3,4	1,7	0,3	0,3	76,7	100,0	2 221
Ensemble	15,5	12,4	1,6	2,2	1,5	0,9	0,4	0,4	3,1	1,6	1,3	0,3	0,3	84,5	100,0	11 168

À suivre...

Tableau 7.4.1—Suite

Caractéristique sociodémographique	Méthode moderne										Méthode traditionnelle			Effectif de femmes	
	Une méthode moderne	Une méthode moderne	DIU	Injectables	Implants	Pilule	Condom masculin	MJF	Autre méthode moderne ¹	Une méthode traditionnelle	Rythme	Retrait	Autre		N utilise actuellement
FEMMES NON EN UNION SEXUELLEMENT ACTIVES²															
Résidence															
Cotonou	38,7	29,8	1,9	6,0	0,7	2,2	17,8	1,2	0,0	8,9	6,1	2,8	0,0	61,3	84
Autres villes	33,8	26,4	0,6	2,6	8,1	1,7	12,7	0,4	0,3	7,4	4,6	2,3	0,5	66,2	336
Ensemble urbain	34,8	27,1	0,9	3,2	6,6	1,8	13,7	0,5	0,3	7,7	4,9	2,4	0,4	65,2	420
Rural	23,4	20,5	0,5	3,2	7,0	0,5	8,8	0,5	0,0	2,9	2,1	0,8	0,0	76,6	472
Ensemble	28,8	23,6	0,7	3,2	6,8	1,1	11,1	0,5	0,1	5,1	3,4	1,6	0,2	71,2	893

Note : Si plus d'une méthode est utilisée, seule la plus efficace est prise en compte dans ce tableau.

MJF = Méthode des Jours Fixes.

¹ Y compris stérilisation féminine, pilule du lendemain, et méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA)

² Femme ayant eu des rapports sexuels dans les 30 jours précédant l'enquête.

Tableau 7.4.2 Tendances de l'utilisation actuelle de la contraception

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans actuellement en union par méthode contraceptive actuellement utilisée, selon les résultats de plusieurs enquêtes, EDSB-V Bénin 2017-2018

Méthode	EDSB-I 1996	EDSB-II 2001	EDSB-III 2006	EDSB-IV 2011-2012	EDSB-V 2017-2018
Une méthode	16,4	18,6	17,0	12,9	15,5
Une méthode moderne	3,4	7,2	6,1	7,9	12,4
DIU	0,5	0,8	0,6	0,5	1,6
Injectable	0,7	2,1	1,8	2,0	2,2
Implants	na	0,3	0,5	1,0	5,4
Pilule	1,0	1,8	1,5	1,3	1,5
Condom masculin	0,7	1,3	1,1	1,8	0,9
Autre méthode moderne	0,5	0,9	0,5	1,2	0,8
Une méthode traditionnelle	11,8	11,4	10,9	5,0	3,1
Rythme	6,6	6,9	6,9	2,9	1,6
Retrait	5,2	4,3	3,6	0,8	1,3
Autre méthode traditionnelle	1,2	0,2	0,3	1,3	0,3
N'utilise pas actuellement	83,6	81,4	83,0	87,1	84,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes	4 198	4 563	13 403	11 680	11 168

na = Non applicable

Tableau 7.5 Connaissance de la période de fertilité

Répartition (en %) des utilisatrices de la méthode du rythme, des utilisatrices de la MJF et de l'ensemble des femmes de 15-49 ans par connaissance de la période de fertilité pendant le cycle menstruel, EDSB-V Bénin 2017-2018

A situé la période fertile :	Utilisatrice de la méthode du rythme	Utilisatrice de la méthode MJF	Ensemble des femmes de 15-49 ans
Juste avant le début des règles	3,0	0,0	3,5
Pendant les règles	1,3	0,0	1,4
Juste après la fin des règles	42,8	9,3	42,3
Au milieu de deux cycles menstruels	47,0	74,1	29,0
Autre	1,4	3,9	0,7
Pas de moment spécifique	0,3	11,3	6,2
Ne sait pas	4,2	1,4	16,9
Total	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes	239	51	15 928

Note : Une connaissance correcte de la période de fertilité est définie ainsi : « Au milieu de deux cycles menstruels »
MJF = Méthode des Jours Fixes.

Tableau 7.6 Connaissance de la période de fertilité par âge

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui savent situer correctement la période de fertilité pendant le cycle ovulatoire, selon l'âge, EDSB-V Bénin 2017-2018

Groupe d'âges	Pourcentage sachant situer correctement la période de fertilité	Effectif de femmes
15-19	20,7	3 350
20-24	30,8	2 923
25-29	32,0	2 986
30-34	32,0	2 202
35-39	31,5	1 882
40-44	30,4	1 320
45-49	29,8	1 265
Ensemble	29,0	15 928

Note : Une connaissance correcte de la période de fertilité est définie ainsi : « Au milieu de deux cycles menstruels »

Tableau 7.7 Source d'approvisionnement des méthodes modernes de contraception

Répartition (en %) des utilisatrices de méthodes modernes de contraception, âgées de 15-49 ans, par source d'approvisionnement la plus récente, selon la méthode, EDSB-V Bénin 2017-2018

Source de la méthode	DIU	Injectables	Implants	Pilule	Condom masculin	Méthode des jours fixes	Autre méthode moderne	Ensemble
Secteur public	63,8	80,8	91,1	31,3	7,7	18,6	(60,1)	62,4
Hôpital du gouvernement	15,4	16,1	19,1	4,9	2,2	6,2	(43,7)	13,8
Centre de santé du gouvernement	45,9	62,2	69,9	25,5	3,3	10,1	(16,4)	46,5
Autre secteur public	2,6	2,6	2,0	0,9	2,1	2,3	(0,0)	2,1
Secteur médical privé	36,2	19,2	8,9	68,7	51,2	18,1	(39,9)	28,4
Hôpital/clinique privé	24,3	14,9	5,7	3,3	0,4	10,7	(0,0)	8,1
Pharmacie	0,0	0,0	0,0	63,7	49,8	4,2	(39,9)	16,6
Autre secteur médical privé/ONG	11,8	4,2	3,3	1,7	1,0	3,2	(0,0)	3,7
Autre secteur non médical	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5	25,4	(0,0)	6,8
Boutique	0,0	0,0	0,0	0,0	31,2	2,2	(0,0)	5,8
Amis/parents	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	23,2	(0,0)	1,0
Autre	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	37,8	(0,0)	2,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	(100,0)	100,0
Effectif de femmes	203	303	722	193	336	51	35	1 842

Note : L'ensemble inclut d'autres méthodes modernes (stérilisation, condom féminin, pilule du lendemain) mais exclut la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA).
ONG = Organisation Non Gouvernementale

Tableau 7.8 Choix informé de la méthode contraceptive

Parmi les utilisatrices actuelles de certaines méthodes modernes, âgées de 15-49 ans, dont la dernière période d'utilisation d'une méthode a commencé dans les 5 années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant été informé de possibles effets secondaires ou de problèmes liés à l'utilisation de cette méthode, pourcentage ayant été informé sur ce qu'il fallait faire en cas d'effets secondaires, pourcentage ayant été informé sur l'existence d'autres méthodes qu'elles pourraient utiliser et pourcentage ayant reçu les 3 types d'information, selon la méthode et la source initiale de la méthode, EDSB-V Bénin 2017-2018

Méthode/source	Parmi les femmes dont la dernière période d'utilisation d'une méthode moderne a commencé dans les 5 années ayant précédé l'enquête :				
	Pourcentage ayant été informé de possibles effets secondaires ou de problèmes liés à l'utilisation de cette méthode	Pourcentage ayant été informé de ce qu'il fallait faire en cas d'effets secondaires	Pourcentage ayant été informé par un agent de santé ou un agent en planification familiale d'autres méthodes qui pourraient être utilisées	Pourcentage ayant reçu les 3 types d'informations (Indice information méthode)	Effectif de femmes
Méthode					
Stérilisation féminine	*	*	*	*	13
Pilule	33,9	25,3	59,8	23,4	178
DIU	70,6	67,1	84,1	63,1	179
Injectables	65,7	58,4	79,8	55,3	290
Implants	64,8	58,9	74,7	54,1	675
Source initiale de la méthode¹					
Secteur public	64,8	58,6	76,3	53,8	1 007
Hôpital du gouvernement	69,5	62,7	83,4	60,9	179
Centre de santé du gouvernement	63,8	57,8	74,6	52,5	802
Autre secteur public	(60,2)	(54,2)	(77,5)	(46,5)	26
Secteur médical privé	59,6	53,7	79,5	51,8	261
Hôpital/clinique privé	67,4	63,5	82,7	60,7	132
Pharmacie	30,8	24,8	63,1	23,1	67
Autre secteur médical privé/ONG	73,8	63,7	90,3	63,7	63
Autre secteur non médical	(20,7)	(10,9)	(40,0)	(10,9)	43
Boutique	(17,7)	(8,5)	(33,3)	(8,5)	35
Institution religieuse	*	*	*	*	2
Amis/parents	*	*	*	*	5
Autre	(35,6)	(22,9)	(39,7)	(22,9)	25
Ensemble	61,8	55,4	75,1	51,5	1 335

Note : Le tableau n'inclut que les méthodes figurant sur la liste. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

ONG = Organisation Non Gouvernementale

¹ Source au moment où a commencé l'épisode d'utilisation de la méthode actuelle.

Tableau 7.9 Taux de discontinuation des méthodes contraceptives sur 12 mois

Parmi les épisodes d'utilisation contraceptive ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête, pourcentage d'épisodes discontinués dans les 12 mois, selon la raison de discontinuation et de la méthode, EDSB-V Bénin 2017-2018

Méthode	Échec de la méthode	Souhaitait tomber enceinte	Autres raisons liées à la fécondité ¹	Effets secondaires/ raisons liées à la santé	Souhaitait une méthode plus efficace	Autres raisons liées à la méthode ²	Autres raisons	N'importe quelle raison ³	A changé pour une autre méthode ⁴	Nombre d'épisodes d'utilisation ⁵
DIU	(0,9)	(2,1)	(0,3)	(3,0)	(0,5)	(0,2)	(2,7)	(9,9)	(0,8)	248
Injectables	0,1	17,6	3,4	15,7	2,8	4,8	12,1	56,5	2,6	671
Implants	0,1	6,1	1,6	5,8	0,9	0,8	3,5	18,7	0,9	1 084
Pilule	2,3	15,7	3,7	10,6	3,1	4,7	8,2	48,3	3,9	561
Condom masculin	2,0	15,2	5,3	0,0	2,1	0,8	4,7	30,2	2,4	466
Rythme	3,6	14,1	2,8	0,0	3,3	1,2	2,1	27,1	1,2	542
Retrait	2,7	12,8	5,3	0,0	8,5	0,6	6,3	36,2	7,4	355
Autre ⁶	(1,0)	(15,7)	(5,0)	(1,9)	(3,3)	(2,5)	(6,0)	(35,3)	(2,6)	239
Toutes les méthodes	1,4	12,2	3,2	5,8	2,7	2,1	5,8	33,1	2,5	4 167

Note : Les valeurs sont basées sur des calculs de table de survie en utilisant les informations sur les épisodes d'utilisation qui ont eu lieu 3-62 mois avant l'enquête. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

¹ Inclut rapports sexuels peu fréquents /mari absent, difficulté à tomber enceinte /ménopause et dissolution de l'union/séparation

² Inclut difficultés d'accès /trop éloigné, coût trop élevé et utilisation peu pratique

³ Les raisons de la discontinuation sont mutuellement exclusives et leur somme correspond au total figurant dans cette colonne.

⁴ On considère qu'une femme a changé de méthode si elle a utilisé une méthode différente dans le mois qui a suivi la discontinuation ou si elle a donné comme raison de discontinuation qu'elle « souhaitait une méthode plus efficace » et qu'elle a commencé à utiliser une autre méthode dans les deux mois qui ont suivi la discontinuation.

⁵ Tous les épisodes d'utilisation qui ont eu lieu dans les 5 ans ayant précédé l'enquête sont inclus. Les épisodes d'utilisation incluent les épisodes qui ont été discontinués pendant la période d'observation ainsi que les épisodes d'utilisation qui n'ont pas été discontinués durant la période d'observation.

⁶ Y compris la Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA) et retrait, diaphragme, stérilisation féminine, stérilisation masculin, condom féminin, pilule de lendemain, Méthode des Jours Fixes (MJF).

Tableau 7.10. Raisons de la discontinuation des méthodes contraceptives

Répartition (en %) des discontinuations de méthodes contraceptives dans les 5 années ayant précédé l'enquête par raison principale de discontinuation, selon la méthode spécifique, EDSB-V Bénin 2017-2018

Raison	DIU	Injectables	Implants	Pilule	Condom masculin	MJF	Autre méthode moderne ¹	Rythme	Retrait	Autre	Ensemble des méthodes
Est tombée enceinte pendant l'utilisation	2,3	0,7	0,7	5,4	5,4	2,5	(0,0)	9,2	7,1	(7,4)	4,1
Voulait tomber enceinte	39,7	38,6	44,7	43,9	53,6	58,3	(43,8)	64,7	50,2	(40,1)	48,0
Mari/partenaire désapprouvait	1,8	5,8	4,9	2,8	6,0	0,0	(5,6)	1,5	6,9	(4,3)	4,2
Souhaitait une méthode plus efficace	4,0	5,6	5,5	7,3	7,1	3,1	(7,2)	7,3	13,7	(13,9)	7,1
Soucis pour la santé/effets secondaires	22,9	23,3	24,3	14,8	0,2	1,9	(8,9)	0,0	0,0	(4,2)	12,7
Manque d'accès/trop loin	0,0	2,1	1,4	0,4	0,4	0,0	(0,0)	0,0	0,0	(0,0)	0,8
Coûte trop cher	0,0	1,3	0,0	2,3	0,0	0,0	(0,0)	0,0	0,0	(0,0)	0,7
Peu pratique à utiliser	8,3	2,6	1,6	5,9	2,1	3,8	(4,3)	3,8	1,2	(0,0)	3,2
Cela dépend de Dieu/fataliste	6,6	2,4	2,0	2,9	2,1	0,7	(0,0)	0,7	0,0	(0,0)	1,9
Difficultés pour tomber enceinte/ménopause	0,6	0,7	0,6	0,7	0,9	2,9	(4,4)	0,7	0,3	(0,0)	0,8
Rapports sexuels peu fréquents/mari éloigné	3,4	4,7	2,9	3,9	14,1	21,2	(17,8)	7,7	14,2	(9,5)	7,2
Dissolution de l'union/séparation	0,0	1,5	0,3	2,7	2,2	0,0	(0,0)	0,0	1,1	(0,0)	1,2
Autre	10,6	10,2	10,8	6,6	4,3	5,7	(3,9)	3,1	3,4	(20,6)	7,2
Ne sait pas	0,0	0,6	0,4	0,4	1,6	0,0	(4,1)	1,3	1,9	(0,0)	0,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nombre de discontinuations	83	482	467	460	228	71	(0,0)	390	255	29	2 514

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

MJF = Méthode des Jours Fixes

¹ Y compris condom féminin, pilule du lendemain, et méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA)

Tableau 7.11.1 Besoins et demande en matière de planification familiale parmi les femmes actuellement en union

Pourcentage de femmes de 15-49 ans, actuellement en union, ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, pourcentage dont les besoins en matière de planification familiale sont satisfaits, demande totale en planification familiale et pourcentage de la demande en planification familiale qui est satisfaite, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Besoins non satisfaits en matière de planification familiale		Besoins satisfaits en matière de planification familiale (utilisation actuelle)		Demande totale en planification familiale ¹		Efficacité de femmes	Pourcentage de demande satisfaite ²	Pourcentage de demande satisfaite par des méthodes modernes ³
	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total			
Groupe d'âges									
15-19	32,5	0,5	33,0	6,3	0,0	6,3	39,3	16,0	13,2
20-24	35,9	1,1	37,0	11,6	0,6	12,2	49,2	24,9	19,3
25-29	29,5	4,1	33,6	13,5	2,1	15,6	49,3	31,7	25,2
30-34	22,5	10,1	32,6	13,4	5,9	19,4	52,0	37,2	30,7
35-39	14,5	18,9	33,4	8,3	10,0	18,3	28,9	35,4	28,2
40-44	9,3	21,4	30,7	4,4	13,8	18,3	13,7	37,4	29,6
45-49	3,5	15,5	19,0	1,8	9,8	11,6	30,6	37,9	30,4
Résidence									
Cotonou	21,8	13,2	35,0	17,3	9,8	27,2	39,2	43,7	30,9
Autres villes	23,4	10,1	33,5	10,7	6,0	16,8	34,2	33,4	27,6
Ensemble urbain	23,2	10,4	33,7	11,6	6,5	18,1	34,8	34,9	28,1
Rural	22,4	9,0	31,4	8,9	4,9	13,8	31,3	30,6	24,3
Département									
Alibori	19,2	3,2	22,4	14,2	1,5	15,7	33,3	41,2	35,5
Atacora	24,7	8,3	33,0	7,7	3,1	10,8	32,4	24,6	22,8
Atlantique	22,8	14,8	37,5	12,1	9,2	21,4	34,9	36,3	23,4
Borgou	22,0	7,2	29,2	8,1	4,7	12,8	30,1	28,7	30,5
Collines	22,2	13,8	36,1	11,1	9,6	20,7	33,4	36,5	32,0
Couffo	29,4	8,3	37,7	4,3	1,9	6,2	33,7	14,1	10,1
Donga	28,3	4,7	33,0	4,5	1,7	6,2	32,8	15,7	15,0
Littoral	21,8	13,2	35,0	17,3	9,8	27,2	39,2	43,7	30,9
Mono	25,0	11,0	36,1	13,2	9,9	23,2	38,3	39,1	30,4
Ouémé	20,8	12,9	33,7	12,9	8,2	21,1	33,7	38,6	27,6
Plateau	23,9	10,4	34,3	2,8	3,7	6,5	26,7	16,0	14,0
Zou	19,6	11,6	31,2	8,9	6,9	15,8	28,5	33,6	28,3
Niveau d'instruction									
Aucun	20,7	10,4	31,1	8,2	5,0	13,1	28,9	29,7	24,3
Primaire	25,5	9,9	35,4	10,7	7,8	18,5	36,2	34,3	27,5
Secondaire 1 ^{er} cycle	29,3	5,4	34,7	14,7	4,7	19,4	44,0	35,9	26,1
Secondaire 2 ^e cycle ou plus	25,0	6,1	31,0	21,5	7,6	29,2	46,5	48,5	38,6
Quintiles de bien-être économique									
Le plus bas	20,7	8,1	28,8	8,1	3,2	11,3	28,8	28,2	23,4
Second	23,4	9,6	32,9	7,8	4,0	11,9	31,2	26,5	22,0
Moyen	24,0	9,7	33,7	9,4	4,7	14,1	33,4	29,5	24,9
Quatrième	23,7	9,4	33,1	10,3	6,6	16,8	34,0	33,7	25,7
Le plus élevé	21,8	11,1	32,9	14,2	9,1	23,3	36,0	41,4	31,9
Ensemble	22,7	9,6	32,3	10,0	5,6	15,5	32,7	32,4	25,9

Note : Les valeurs figurant dans ce tableau sont basées sur la définition révisée des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, décrite dans Bradley et al., 2012.

¹ La demande totale équivaut à la somme des besoins non satisfaits et des besoins satisfaits.

² Le pourcentage de demande satisfaite équivaut aux besoins satisfaits divisés par la demande totale.

³ Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine, la stérilisation masculine, la pilule, le DIU, les injectables, les implants, le condom masculin, le condom féminin, la pilule du lendemain, la Méthode des Jours Fixes (MJF), la Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA) et d'autres méthodes modernes.

Tableau 7.11.2. Besoins et demande en matière de planification familiale pour l'ensemble des femmes et pour les femmes non en union sexuellement actives

Pourcentage de toutes les femmes de 15-49 ans et des femmes de 15-49 ans non en union sexuellement actives, ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, pourcentage dont les besoins en matière de planification familiale sont satisfaits, demande totale en planification familiale et pourcentage de la demande en planification familiale qui est satisfaite, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Besoins non satisfaits en matière de planification familiale				Besoins satisfaits en matière de planification familiale (utilisation actuelle)				Demande totale en planification familiale ¹				Effectif de femmes	Pourcentage de demande satisfaite ²	Pourcentage de demande satisfaite par des méthodes modernes ³
	Pour espacer		Pour limiter		Pour espacer		Pour limiter		Pour espacer		Pour limiter				
	Total	Pour limiter	Total	Pour limiter	Total	Pour limiter	Total	Pour limiter	Total	Pour limiter					
ENSEMBLE DES FEMMES															
Groupe d'âges															
15-19	14,6	0,3	14,9	0,1	6,7	21,2	0,4	21,5	3 350	31,0	25,8				
20-24	28,9	0,8	29,6	0,5	15,4	43,8	1,3	45,0	2 923	34,2	27,6				
25-29	27,4	3,9	31,3	2,3	16,6	41,7	6,2	47,9	2 986	27,8	31,6				
30-34	21,5	9,7	31,1	6,1	19,3	34,7	15,7	50,5	2 202	38,3	28,6				
35-39	13,6	17,6	31,2	9,7	17,5	21,4	27,3	48,7	1 882	35,9	31,6				
40-44	8,7	19,6	28,3	13,6	18,2	13,3	33,2	46,5	1 320	39,1	31,6				
45-49	3,1	13,2	16,3	8,6	10,4	4,9	21,8	26,7	1 265	38,9	31,6				
Résidence															
Colonou	16,3	7,8	24,1	6,8	23,2	32,6	14,7	47,3	958	49,0	36,8				
Autres villes	18,8	7,0	25,8	4,6	15,8	30,0	11,5	41,6	5 803	37,9	31,4				
Ensemble urbain	18,5	7,1	25,6	4,9	16,8	30,4	12,0	42,4	6 761	39,7	32,2				
Rural	19,5	7,0	26,4	3,9	12,6	28,2	10,9	39,1	9 167	32,3	26,1				
Département															
Alibori	19,4	2,8	22,2	1,4	15,2	33,2	4,1	37,4	1 878	40,7	35,7				
Atacora	21,0	6,2	27,3	2,5	12,9	31,4	8,7	40,1	1 302	32,1	30,1				
Atlantique	16,6	10,1	26,7	6,9	18,5	28,2	17,0	45,2	2 037	27,2	30,1				
Borgou	19,8	5,5	25,3	3,8	12,7	28,7	9,3	38,0	1 839	33,5	31,8				
Collines	20,0	9,6	29,5	7,0	17,3	30,3	16,5	46,8	1 151	36,9	32,4				
Couffo	22,1	5,9	28,0	4,0	22,1	26,1	7,2	33,3	1 041	16,1	12,3				
Donga	25,7	3,8	29,5	1,4	5,5	29,8	5,2	35,0	881	15,7	15,1				
Littoral	16,3	7,8	24,1	6,8	23,2	32,6	14,7	47,3	958	49,0	36,8				
Mono	18,9	7,5	26,3	7,5	22,2	33,6	15,0	48,5	759	45,8	35,8				
Ouémé	16,1	8,9	25,0	5,7	17,4	27,8	14,6	42,4	1 507	41,0	28,9				
Plateau	21,0	8,2	29,2	2,7	5,6	23,9	10,9	34,8	970	16,1	13,8				
Zou	16,3	8,0	24,3	5,1	13,9	25,1	13,1	38,2	1 606	36,3	30,1				
Niveau d'instruction															
Aucun	18,9	9,2	28,1	4,6	12,4	26,7	13,8	40,5	8 785	30,7	25,3				
Primaire	20,0	6,5	26,5	5,5	14,6	29,1	12,0	41,1	3 148	35,5	29,1				
Secondaire 1 ^{er} cycle	19,3	2,6	21,9	2,6	15,6	32,3	5,1	37,5	2 847	41,6	31,5				
Secondaire 2 ^e cycle ou plus	17,1	2,7	19,7	3,8	26,3	39,6	6,5	46,1	1 147	57,2	46,8				
Quintiles de bien-être économique															
Le plus bas	18,5	6,6	25,1	2,7	10,3	26,0	9,3	35,3	2 735	29,1	24,6				
Second	19,8	7,4	27,2	3,3	10,9	27,5	10,7	38,1	3 030	28,7	24,2				
Moyen	20,7	7,3	27,9	3,9	13,2	30,0	11,2	41,2	3 104	32,1	27,5				
Quatrième	19,6	6,8	26,4	5,0	15,8	30,4	11,8	42,2	3 405	37,4	29,2				
Le plus élevé	17,0	7,0	24,0	6,2	20,1	30,9	13,2	44,1	3 654	45,6	35,5				
Ensemble	19,1	7,0	26,1	4,3	14,4	29,1	11,4	40,5	15 928	35,6	28,8				

A suivre ...

Tableau 7.11.2—Suite

Caractéristique sociodémographique	Besoins non satisfaits en matière de planification familiale				Besoins satisfaits en matière de planification familiale (utilisation actuelle)				Demande totale en planification familiale ¹				Effectif de femmes	Pourcentage de demande satisfaite par des méthodes modernes ³
	Pour espacer		Pour limiter		Pour espacer		Pour limiter		Pour espacer		Pour limiter			
	Total	Pour limiter	Total	Pour limiter	Total	Pour limiter	Total	Pour limiter	Total	Pour limiter				
FEMMES NON EN UNION SEXUELLEMENT ACTIVÉS ⁴														
Groupe d'âges														
15-19	64,3	1,2	65,5	22,3	0,3	22,6	86,6	1,6	88,2	377	25,7	22,1		
20-24	41,7	0,0	41,7	36,5	0,0	36,5	78,3	0,0	78,3	273	46,7	37,6		
25-29	28,6	3,3	31,9	34,4	2,4	36,8	68,7	5,7	74,4	101	53,5	40,0		
30-34	26,6	8,9	35,5	25,7	10,9	36,6	52,3	19,9	72,2	49	50,8	43,3		
35-39	(24,4)	(19,2)	(43,7)	(7,0)	(8,1)	(15,1)	(31,5)	(27,3)	(58,8)	36	(25,7)	(17,9)		
40-44	(18,8)	(22,5)	(41,3)	(1,3)	(19,9)	(21,2)	(20,0)	(42,4)	(62,4)	32	(33,9)	(33,9)		
45-49	(16,5)	(34,2)	(50,7)	(0,0)	(16,7)	(16,7)	(16,5)	(50,9)	(67,4)	24	(24,8)	(18,8)		
Résidence														
Cotonou	34,4	2,6	37,0	35,4	3,3	38,7	69,9	5,9	75,7	84	51,1	39,4		
Autres villes	46,2	3,3	49,6	30,8	3,1	33,8	77,0	6,4	83,4	336	40,5	31,7		
Ensemble urbain	43,9	3,2	47,1	31,7	3,1	34,8	75,6	6,3	81,9	420	42,5	33,1		
Rural	49,3	4,5	53,8	21,4	2,0	23,4	70,7	6,5	77,2	472	30,3	26,6		
Département														
Alibori	55,7	1,3	57,0	30,4	0,9	31,3	86,1	2,2	88,3	119	35,5	34,3		
Atacora	38,4	5,6	43,9	31,9	3,1	35,1	70,3	8,7	79,0	114	44,4	44,4		
Atlantique	34,2	8,2	42,4	32,1	1,7	33,8	66,3	9,9	76,2	96	44,4	26,2		
Borgou	59,6	0,0	59,6	21,6	3,7	25,3	81,2	3,7	84,9	81	29,7	28,4		
Collines	45,6	6,8	52,4	15,0	2,5	17,5	60,6	9,3	69,9	120	25,1	21,2		
Couffo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	18	*	*		
Donga	(67,3)	(0,0)	(67,3)	(12,2)	(0,0)	(12,2)	(79,6)	(0,0)	(79,6)	30	(15,4)	(15,4)		
Littoral	34,4	2,6	37,0	35,4	3,3	38,7	69,9	5,9	75,7	84	51,1	39,4		
Mono	(39,8)	(0,0)	(39,8)	(57,6)	(0,0)	(57,6)	(97,3)	(0,0)	(97,3)	31	(59,2)	(45,4)		
Ouémé	(50,4)	(1,9)	(52,3)	(24,6)	(4,5)	(29,0)	(75,0)	(6,4)	(81,4)	61	(35,7)	(17,8)		
Plateau	(64,8)	(12,7)	(77,5)	(12,5)	(0,0)	(12,5)	(77,3)	(12,7)	(90,1)	45	(13,9)	(10,0)		
Zou	43,5	2,0	45,5	23,0	4,8	27,8	66,5	6,8	73,3	95	37,9	30,6		
Niveau d'instruction														
Aucun	40,3	9,8	50,1	18,8	5,5	24,4	59,1	15,3	74,5	260	32,7	31,0		
Primaire	47,7	2,1	49,7	18,7	2,0	20,7	66,3	4,1	70,4	210	29,4	23,7		
Secondaire 1 ^{er} cycle	53,8	1,3	55,1	30,1	1,2	31,3	83,9	2,5	86,4	268	36,2	28,8		
Secondaire 2 ^e cycle ou plus	44,0	0,9	45,0	42,5	0,2	42,7	86,5	1,2	87,7	154	48,7	36,3		
Quintiles de bien-être économique														
Le plus bas	46,0	5,2	51,2	23,6	1,9	25,5	69,6	7,1	76,7	97	33,3	31,5		
Second	49,2	4,9	54,1	18,2	1,1	19,4	67,4	6,0	73,4	141	26,4	24,7		
Moyen	47,3	4,0	51,3	20,4	3,6	24,1	67,7	7,7	75,4	179	31,9	29,1		
Quatrième	47,6	4,3	51,9	27,7	4,2	32,0	75,4	8,5	83,9	205	38,1	30,9		
Le plus élevé	44,7	2,5	47,2	34,1	1,3	35,5	78,8	3,9	82,7	271	42,9	31,1		
Ensemble	46,7	3,9	50,6	26,3	2,5	28,8	73,0	6,4	79,4	893	36,2	29,8		

Note : Les valeurs figurant dans ce tableau sont basées sur la définition révisée des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, décrite dans Bradley et al., 2012. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ La demande totale équivaut à la somme des besoins non satisfaits et des besoins satisfaits.

² Le pourcentage de demande satisfaite équivaut aux besoins satisfaits divisés par la demande totale.

³ Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine, la stérilisation masculine, la pilule, le DIU, les injectables, les implants, le condom masculin, le condom féminin, la pilule du lendemain, la Méthode des Jours Fixes (MJF), la Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA) et d'autres méthodes modernes.

⁴ Femmes qui ont eu des rapports sexuels dans les 30 jours qui ont précédé l'enquête.

Tableau 7.12. Prise de décision concernant la planification familiale

Parmi les femmes de 15-49 ans, actuellement en union et utilisatrices actuelles de la planification familiale, répartition (en %) en fonction de la décision d'utiliser la planification familiale ; parmi les femmes actuellement en union qui n'utilisent pas actuellement la planification familiale, répartition (en %) en fonction de la décision de ne pas utiliser la planification familiale, selon certaines caractéristiques sociodémographiques. EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Parmi les femmes actuellement en union qui sont des utilisatrices actuelles de la planification familiale					Parmi les femmes actuellement en union qui ne sont pas des utilisatrices actuelles de la planification familiale						
	Principalement la femme	La femme et le mari/partenaire ensemble	Principalement le mari/partenaire	Autre/ne sait pas/manquant	Total	Effectif de femmes	Principalement la femme	La femme et le mari/partenaire ensemble	Principalement le mari/partenaire	Autre/ne sait pas/manquant	Total	Effectif de femmes
Groupe d'âges												
15-19	(45,3)	(31,5)	(23,3)	(0,0)	100,0	39	57,8	18,3	16,1	7,8	100,0	425
20-24	40,8	45,0	14,2	0,0	100,0	241	56,3	21,9	17,6	4,3	100,0	1 329
25-29	42,9	45,0	11,4	0,7	100,0	415	57,4	19,3	19,2	4,2	100,0	1 750
30-34	50,9	39,2	9,8	0,1	100,0	394	59,4	21,8	14,0	4,8	100,0	1 342
35-39	46,0	42,7	11,0	0,3	100,0	312	62,8	18,4	13,9	5,0	100,0	1 232
40-44	47,6	45,1	7,0	0,4	100,0	213	63,8	14,9	13,8	7,5	100,0	888
45-49	53,4	38,1	8,5	0,0	100,0	118	62,6	19,9	8,6	9,0	100,0	887
Nombre d'enfants vivants												
0	*	*	*	*	100,0	14	55,3	23,3	9,9	11,5	100,0	359
1-2	43,1	44,4	12,5	0,0	100,0	508	58,9	20,7	15,2	5,2	100,0	2 683
3-4	45,9	42,2	11,1	0,8	100,0	651	57,7	20,0	17,4	4,9	100,0	2 480
5+	50,1	40,5	9,3	0,0	100,0	558	63,5	17,0	13,7	5,7	100,0	2 330
Résidence												
Cotonou	46,6	45,6	7,6	0,2	100,0	150	57,2	27,2	11,9	3,8	100,0	341
Autres villes	42,7	49,0	8,1	0,2	100,0	652	61,8	21,2	12,4	4,6	100,0	2 703
Ensemble urbain	43,4	48,3	8,0	0,2	100,0	801	61,3	21,8	12,4	4,5	100,0	3 043
Rural	48,8	37,4	13,4	0,3	100,0	931	58,7	18,1	17,0	6,2	100,0	4 809
Département												
Alibori	59,1	21,1	19,8	0,0	100,0	243	54,7	12,6	32,3	0,4	100,0	1 098
Atacora	44,3	46,0	8,2	1,4	100,0	96	65,8	8,0	14,8	11,5	100,0	682
Atlantique	36,5	52,8	10,1	0,6	100,0	280	62,9	20,8	9,5	6,8	100,0	852
Borgou	57,1	30,3	12,2	0,4	100,0	177	68,4	13,4	11,0	7,2	100,0	970
Collines	31,7	52,9	15,4	0,0	100,0	153	52,6	25,2	20,0	2,2	100,0	480
Couffo	(22,3)	(65,3)	(12,4)	(0,0)	100,0	46	37,2	38,2	14,9	9,7	100,0	577
Donga	61,5	32,4	6,1	0,0	100,0	44	67,9	10,8	15,7	5,6	100,0	557
Littoral	46,6	45,6	7,6	0,2	100,0	150	57,2	27,2	11,9	3,8	100,0	341
Mono	38,1	53,0	8,9	0,0	100,0	119	60,6	26,4	10,4	2,6	100,0	323
Ouémé	57,2	35,0	7,3	0,5	100,0	208	75,7	19,2	3,7	1,4	100,0	672
Plateau	(39,7)	(60,3)	(0,0)	(0,0)	100,0	46	53,2	32,1	7,5	7,1	100,0	547
Zou	44,2	48,0	7,8	0,0	100,0	170	53,9	19,7	18,7	7,7	100,0	755
Niveau d'instruction												
Aucun	48,1	39,0	12,5	0,4	100,0	974	59,9	17,6	16,5	6,0	100,0	5 444
Primaire	45,4	44,9	9,5	0,3	100,0	367	59,5	22,3	13,2	5,0	100,0	1 323
Secondaire 1 ^{er} cycle	44,4	47,2	8,4	0,0	100,0	251	61,0	23,3	11,2	4,5	100,0	818
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	40,0	51,8	8,1	0,0	100,0	140	53,8	32,9	10,5	2,7	100,0	268
Quintiles de bien-être économique												
Le plus bas	58,1	28,8	12,4	0,7	100,0	244	59,4	17,1	16,6	6,9	100,0	1 622
Second	46,9	42,0	10,4	0,6	100,0	263	57,7	16,6	19,7	5,9	100,0	1 638
Moyen	48,0	38,1	13,9	0,1	100,0	315	59,3	19,5	15,7	5,5	100,0	1 587
Quatrième	46,0	42,8	10,8	0,4	100,0	392	61,5	19,5	14,1	4,9	100,0	1 590
Le plus élevé	39,8	51,6	8,7	0,0	100,0	517	60,8	25,7	9,1	4,3	100,0	1 416
Ensemble	46,3	42,5	10,9	0,3	100,0	1 732	59,7	19,5	15,2	5,5	100,0	7 853

Note : Dans ce tableau, les femmes qui sont actuellement enceintes sont exclues. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 7.13 Utilisation future de la contraception

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans, actuellement en union qui n'utilisent pas de méthode contraceptive par intention d'utiliser, selon le nombre d'enfants vivants, EDSB-V Bénin 2017-2018

Intention d'utiliser dans le futur	Nombre d'enfants vivants ¹					Ensemble
	0	1	2	3	4+	
A l'intention d'utiliser	29,4	38,6	36,4	38,8	33,5	35,7
Pas sûre	12,7	13,3	11,8	9,6	8,3	10,2
N'a pas l'intention d'utiliser	57,9	48,1	51,8	51,6	58,2	54,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes	359	1 614	1 712	1 617	4 134	9 436

¹ Y compris la grossesse actuelle

Tableau 7.14.1 Exposition aux messages sur la planification familiale

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui ont entendu ou vu un message sur la planification familiale à la radio, à la télévision, dans un journal ou un magazine, sur un téléphone portable ou d'autres médias au cours des derniers mois, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Homme																				
	Femme							Homme													
	Radio	Télévision	Journal/magazines	Téléphone portable	Affiche	Prospectus/brochure	Animation culturelle/école	Lieu de culte (église/mosquée)	Aucun des neuf médias	Effectif de femmes	Radio	Télévision	Journal/magazines	Téléphone portable	Affiche	Prospectus/brochure	Animation culturelle/école	Lieu de culte (église/mosquée)	Aucun des neuf médias	Effectif d'hommes	
Groupe d'âges																					
15-19	33,1	15,8	9,6	4,9	15,6	11,4	14,7	5,5	19,8	52,3	3 350	24,1	9,6	4,9	9,7	6,2	12,1	6,2	18,9	58,0	1 548
20-24	44,3	20,5	10,4	8,7	21,3	13,2	19,3	6,5	14,7	42,1	2 923	38,8	18,2	9,8	15,9	10,7	12,4	8,6	13,2	48,9	1 118
25-29	44,3	19,9	8,1	6,8	18,1	11,1	18,2	7,0	8,5	42,7	2 986	44,0	19,4	9,7	16,0	9,8	10,3	10,2	7,1	44,8	1 156
30-34	46,5	21,3	9,7	7,5	20,0	11,2	20,3	7,5	8,6	41,8	2 202	51,0	22,2	9,8	17,3	9,2	9,7	10,4	6,1	40,8	881
35-39	48,2	20,6	6,8	6,1	16,9	8,7	18,1	7,5	7,5	42,3	1 882	45,3	20,3	7,7	13,2	7,5	11,4	10,5	5,4	45,6	812
40-44	46,2	16,2	6,3	5,7	13,5	7,7	16,3	7,1	6,2	45,0	1 320	52,2	20,6	6,4	10,9	6,5	11,6	9,8	2,4	39,8	620
45-49	41,6	16,2	6,0	5,2	12,1	7,6	14,7	6,8	6,3	49,9	1 265	55,1	19,4	5,2	10,5	5,7	10,4	11,3	2,2	37,8	592
Résidence																					
Cotonou	54,5	49,4	23,1	18,7	36,0	15,9	22,7	13,1	19,3	30,2	958	53,1	40,5	16,6	37,3	19,8	14,3	9,7	15,7	27,6	390
Autres villes	42,5	24,8	11,6	8,2	21,2	13,4	21,8	7,1	13,1	42,6	5 803	43,2	23,2	9,4	14,4	10,3	11,5	9,4	10,7	44,4	2 487
Ensemble urbain	44,2	28,3	13,2	9,7	23,3	13,8	22,0	8,0	14,0	40,9	6 761	44,6	25,5	10,4	17,5	11,6	11,9	9,4	11,3	42,1	2 877
Rural	41,5	11,8	5,2	4,2	13,1	8,4	14,2	5,8	9,7	48,4	9 167	38,9	11,6	5,6	10,4	5,5	10,8	8,9	8,3	50,7	3 849
Département																					
Alibori	36,8	8,9	3,8	3,1	22,1	19,4	2,9	1,6	6,7	51,4	1 878	19,9	8,4	5,1	5,3	4,4	21,4	20,9	5,0	63,3	917
Atacora	39,5	11,2	4,3	2,6	6,1	2,9	3,6	1,0	6,7	56,0	1 302	18,7	7,3	4,4	6,9	5,3	3,5	1,2	4,3	74,9	560
Atlantique	47,4	23,7	6,8	5,2	19,1	8,7	15,6	7,7	10,3	39,3	2 037	49,8	23,4	14,2	20,0	13,7	8,1	9,0	9,4	35,7	822
Borgou	42,2	20,0	16,6	9,7	25,2	18,9	31,9	6,9	16,6	44,4	1 839	48,2	13,0	4,6	4,8	4,9	5,6	3,2	7,9	42,9	823
Collines	47,5	19,0	11,5	10,6	17,3	11,7	13,8	13,7	16,2	43,4	1 151	49,0	17,0	6,7	20,6	7,5	6,2	3,6	19,1	38,7	448
Couffo	44,6	11,5	1,9	2,7	10,2	8,4	28,5	5,2	8,1	44,8	1 041	67,1	27,1	11,9	35,4	22,4	40,0	12,1	22,2	20,4	409
Donga	21,8	7,9	4,2	2,9	26,9	6,1	21,2	6,8	10,8	52,2	881	44,3	15,5	7,2	8,8	6,1	3,0	3,3	4,6	48,0	445
Littoral	54,5	49,4	23,1	18,7	36,0	15,9	22,7	13,1	19,3	30,2	958	53,1	40,5	16,6	37,3	19,8	14,3	9,7	15,7	27,6	390
Mono	58,4	24,5	10,0	12,8	13,6	11,2	15,5	10,6	13,9	34,6	759	27,5	11,1	8,0	12,3	7,8	9,1	2,9	6,9	66,3	354
Ouémé	26,5	11,1	7,2	2,0	8,9	8,2	16,9	3,6	6,5	60,5	1 507	24,9	12,1	4,2	6,5	4,5	4,1	5,6	6,1	65,1	618
Plateau	41,9	15,8	7,5	5,0	7,4	6,2	18,7	6,1	8,2	47,6	970	68,6	31,4	8,4	7,2	4,2	13,3	17,8	8,5	21,6	340
Zou	54,3	27,8	8,1	8,4	14,5	5,2	23,1	9,3	17,2	33,4	1 606	50,8	21,2	5,2	13,6	3,5	10,9	15,4	14,1	37,9	600
Niveau d'instruction																					
Aucun	39,1	10,4	3,2	3,0	11,5	6,7	13,6	4,7	5,0	51,3	8 785	32,2	7,5	0,9	2,9	0,7	8,6	8,4	0,8	60,4	2 426
Primaire	43,2	21,1	6,5	5,4	14,4	7,0	17,6	6,8	8,0	45,7	3 148	43,5	13,0	2,3	7,2	2,5	6,5	8,2	1,8	48,9	1 562
Secondaire 1 ^{er} cycle	47,9	29,3	16,7	11,3	27,1	18,5	23,6	9,9	25,8	35,0	2 847	38,7	18,5	7,5	13,9	8,0	11,7	8,5	16,2	44,5	1 538
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	55,7	51,2	35,5	25,2	47,3	32,0	31,8	14,1	35,7	22,5	1 147	60,5	42,5	28,6	42,0	30,3	22,4	12,9	29,1	20,9	1 201

À suivre...

Tableau 7.14.1—Suite

Caractéristique sociodémographique	Femme										Homme												
	Radio	Télé- vision	Jour- naux/ maga- zines	Télé- phone port- able	Affiche	Pros- pectus/ bro- chure	Animation cultur- elle/édu- cative	Lieu de culte (église/ mos- quée)	Aucun de ces neuf médias	A l'école	Effectif de femmes	Radio	Télé- vision	Jour- naux/ maga- zines	Télé- phone port- able	Affiche	Pros- pectus/ bro- chure	Animation cultur- elle/édu- cative	Lieu de culte (église/ mos- quée)	Aucun de ces neuf médias	A l'école	Effectif d'hom- mes	
Quintiles de bien-être économique																							
Le plus bas	32,7	4,2	1,9	1,8	10,3	7,5	10,5	3,5	5,7	58,2	2 735	26,1	4,7	2,2	3,0	3,3	2,0	9,9	8,0	3,9	63,0	1 248	
Second	37,2	7,0	3,7	3,4	11,6	7,9	13,6	4,8	7,7	53,2	3 030	36,9	8,9	3,6	2,4	6,7	4,0	10,1	8,5	6,8	54,7	1 315	
Moyen	44,2	10,8	4,9	4,1	13,8	8,1	16,1	6,3	9,8	45,9	3 104	42,3	10,9	5,3	3,7	10,2	4,6	9,9	8,5	7,5	47,1	1 282	
Quatrième	45,8	20,5	9,3	6,8	17,2	9,9	18,5	8,4	13,6	40,5	3 405	47,9	19,7	6,7	5,1	14,2	7,8	10,3	9,1	11,6	40,8	1 317	
Le plus élevé	50,4	44,8	20,2	14,6	30,9	18,4	26,3	9,5	18,7	32,6	3 654	50,9	38,7	18,1	9,5	29,1	19,5	15,3	11,1	16,6	32,9	1 565	
Ensemble 15-49	42,7	18,8	8,6	6,5	17,4	10,7	17,5	6,7	11,5	45,2	15 928	41,4	17,5	7,7	4,9	13,4	8,1	11,3	9,1	9,6	47,0	6 727	
50-64	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	52,1	18,6	7,9	3,6	10,0	7,1	11,4	11,3	2,5	41,3	868	
Ensemble 15-64	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	42,6	17,7	7,7	4,8	13,0	8,0	11,3	9,4	8,8	46,4	7 595	

na = Non applicable

Tableau 7.14.2 Acceptable de parler de la planification familiale

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui pensent que c'est acceptable de parler de la planification familiale par méthode d'annonce, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Femme									Effectif de femmes
	Radio	Télévision	Journaux/magazines	Téléphone portable	Affiche	Prospectus/brochure	Animation culturelle/éducative	Lieu de culte (église/mosquée)	A l'école	
Groupe d'âges										
15-19	78,2	81,4	79,8	76,6	15,6	11,4	14,7	5,5	19,8	3 350
20-24	84,1	87,4	85,1	81,9	21,3	13,2	19,3	6,5	14,7	2 923
25-29	86,1	88,5	86,3	83,4	18,1	11,1	18,2	7,0	8,5	2 986
30-34	85,4	87,9	86,3	82,7	20,0	11,2	20,3	7,5	8,6	2 202
35-39	83,8	86,6	84,8	81,3	16,9	8,7	18,1	7,5	7,5	1 882
40-44	84,0	86,2	84,3	80,4	13,5	7,7	16,3	7,1	6,2	1 320
45-49	81,2	84,7	82,5	79,9	12,1	7,6	14,7	6,8	6,3	1 265
Résidence										
Cotonou	87,0	90,0	88,3	85,7	36,0	15,9	22,7	13,1	19,3	958
Autres villes	83,8	85,9	83,8	81,0	21,2	13,4	21,8	7,1	13,1	5 803
Ensemble urbain	84,2	86,5	84,4	81,7	23,3	13,8	22,0	8,0	14,0	6 761
Rural	82,4	85,6	83,8	80,2	13,1	8,4	14,2	5,8	9,7	9 167
Département										
Alibori	83,7	96,4	97,4	95,0	22,1	19,4	2,9	1,6	6,7	1 878
Atacora	84,5	86,1	84,8	82,3	6,1	2,9	3,6	1,0	6,7	1 302
Atlantique	89,2	89,7	87,7	85,0	19,1	8,7	15,6	7,7	10,3	2 037
Borgou	83,9	85,1	82,3	74,8	25,2	18,9	31,9	6,9	16,6	1 839
Collines	84,9	85,7	82,8	79,2	17,3	11,7	13,8	13,7	16,2	1 151
Couffo	70,3	72,7	71,5	69,9	10,2	8,4	28,5	5,2	8,1	1 041
Donga	61,2	62,8	59,6	57,2	26,9	6,1	21,2	6,8	10,8	881
Littoral	87,0	90,0	88,3	85,7	36,0	15,9	22,7	13,1	19,3	958
Mono	81,2	84,3	83,6	81,0	13,6	11,2	15,5	10,6	13,9	759
Ouémé	89,5	90,3	86,5	81,0	8,9	8,2	16,9	3,6	6,5	1 507
Plateau	89,0	89,2	88,8	88,3	7,4	6,2	18,7	6,1	8,2	970
Zou	81,1	84,2	80,3	78,2	14,5	5,2	23,1	9,3	17,2	1 606
Niveau d'instruction										
Aucun	82,0	85,7	83,6	79,9	11,5	6,7	13,6	4,7	5,0	8 785
Primaire	81,8	83,5	81,3	78,4	14,4	7,0	17,6	6,8	8,0	3 148
Secondaire 1 ^{er} cycle	84,7	86,9	85,1	82,5	27,1	18,5	23,6	9,9	25,8	2 847
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	91,5	92,9	92,4	90,3	47,3	32,0	31,8	14,1	35,7	1 147
Quintiles de bien-être économique										
Le plus bas	81,1	84,5	82,8	78,6	10,3	7,5	10,5	3,5	5,7	2 735
Second	80,2	84,7	82,4	78,8	11,6	7,9	13,6	4,8	7,7	3 030
Moyen	82,0	84,6	82,9	79,9	13,8	8,1	16,1	6,3	9,8	3 104
Quatrième	84,2	86,7	84,3	81,1	17,2	9,9	18,5	8,4	13,6	3 405
Le plus élevé	87,0	88,9	87,2	84,7	30,9	18,4	26,3	9,5	18,7	3 654
Ensemble 15-49	83,2	86,0	84,1	80,8	17,4	10,7	17,5	6,7	11,5	15 928

Tableau 7.15 Contact des non utilisatrices de la contraception avec des prestataires de planification familiale

Parmi les femmes de 15-49 ans non utilisatrices de la contraception, pourcentage qui, au cours des 12 derniers mois, a reçu la visite d'un agent de terrain avec qui elles ont parlé de planification familiale, pourcentage qui s'est rendu dans un établissement de santé et a parlé de planification familiale, pourcentage qui s'est rendu dans un établissement de santé et n'a pas parlé de planification familiale et pourcentage qui n'a pas parlé de planification familiale, que ce soit avec un agent de terrain ou dans un établissement de santé, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes ayant reçu la visite d'un agent de terrain avec qui elles ont parlé de planification familiale	Pourcentage de femmes qui se sont rendues dans un établissement de santé au cours des 12 derniers mois et qui :		Pourcentage de femmes n'ayant pas parlé de planification familiale, ni avec un agent de terrain, ni dans un établissement de santé	Effectif de femmes
		ont parlé de planification familiale	N'ont pas parlé de planification familiale		
Groupe d'âges					
15-19	5,7	6,2	14,4	90,9	3 126
20-24	8,1	16,8	30,0	79,9	2 473
25-29	10,0	19,5	31,8	76,0	2 490
30-34	9,8	19,8	31,2	76,2	1 776
35-39	9,0	17,6	25,6	78,2	1 554
40-44	9,8	11,5	23,4	83,2	1 080
45-49	8,0	7,6	20,3	88,3	1 133
Résidence					
Cotonou	7,6	16,6	24,4	81,0	736
Autres villes	6,6	13,4	25,1	83,1	4 888
Ensemble urbain	6,7	13,8	25,0	82,8	5 624
Rural	9,5	14,4	25,1	81,4	8 009
Département					
Alibori	17,2	20,2	18,3	75,7	1 592
Atacora	0,7	11,0	22,7	88,5	1 134
Atlantique	5,3	11,5	31,9	84,7	1 661
Borgou	7,3	17,2	21,9	81,3	1 605
Collines	12,2	11,3	28,5	79,6	952
Couffo	7,0	12,0	26,5	83,0	985
Donga	4,3	8,2	31,9	89,0	833
Littoral	7,6	16,6	24,4	81,0	736
Mono	9,7	7,5	27,5	85,6	590
Ouémé	1,9	9,4	26,6	89,3	1 245
Plateau	18,2	19,1	21,3	71,9	915
Zou	9,0	19,1	23,1	77,2	1 383
Niveau d'instruction					
Aucun	9,4	14,9	24,8	81,2	7 694
Primaire	7,1	14,0	26,4	82,0	2 690
Secondaire 1 ^{er} cycle	7,4	12,2	22,8	84,0	2 403
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	4,9	13,8	29,6	83,6	845
Quintiles de bien-être économique					
Le plus bas	7,9	12,6	19,0	84,3	2 454
Second	10,4	14,5	24,8	81,0	2 699
Moyen	8,1	13,9	26,1	81,8	2 693
Quatrième	9,5	14,8	27,3	80,4	2 867
Le plus élevé	5,8	14,7	27,2	82,6	2 919
Ensemble	8,3	14,2	25,1	82,0	13 632

Résultats clés

- **Couverture en soins prénatals** : Parmi les femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante dans les cinq années ayant précédé l'enquête, 83 % ont reçu, pour la naissance la plus récente, des soins prénatals dispensés par un prestataire qualifié. En outre, un peu plus de la moitié (52 %) des femmes ont effectué au moins quatre visites prénatales et dans 51 % des cas, la première visite prénatale a eu lieu au premier trimestre de la grossesse.
- **Composants des soins prénatals** : La mesure du poids est l'examen le plus fréquemment effectué pendant les visites prénatales (99 %). Seulement, 49 % des femmes ont effectué une échographique pendant les visites prénatales.
- **Protection contre le tétanos néonatal** : Pour 71 % des femmes de 15-49 ans, la dernière naissance a été protégée contre le tétanos néonatal.
- **Lieu et assistance à l'accouchement** : Parmi les naissances vivantes des cinq années avant l'enquête, plus de quatre sur cinq (84 %) ont eu lieu dans un établissement de santé et 15 % à la maison. En outre, 78 % des naissances se sont déroulées avec l'assistance de personnel qualifié.
- **Soins postnatals de la mère** : Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance au cours des deux années avant l'enquête, un peu plus de six sur dix (62 %) ont reçu des soins postnatals administrés par du personnel qualifié dans les deux jours qui ont suivi la naissance. Par contre, 35 % n'ont reçu aucun soin postnatal au cours des deux jours après l'accouchement.
- **Soins postnatals du nouveau-né** : Parmi les naissances ayant eu lieu au cours des deux années avant l'enquête, 64 % ont bénéficié de soins postnatals dans les deux premiers jours. Un peu moins du tiers (29 %) n'a reçu aucun examen postnatal.

La Santé de la reproduction est un domaine prioritaire pour notre État qui garantit l'accès à des services de qualité. Les soins de santé durant la grossesse, l'accouchement et après l'accouchement sont importants pour la survie et le bien-être de la mère et de l'enfant. Ils constituent de ce fait des services prioritaires dans la lutte pour la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelles et néonatales.

Le Gouvernement du Bénin met tout en œuvre par des interventions-clés et efficaces afin d'améliorer la santé maternelle et celle du nouveau-né par le biais de sa Direction de la Santé et de la Mère (DSME), l'Agence Nationale de gratuité de la Césarienne (ANGC) et autres structures qui ont pour mission de veiller

à l'amélioration de la santé de la Mère et de l'Enfant. En témoignent les programmes de gratuité de la césarienne, les interventions des Soins Obstétricaux et Néonataux d'urgences (SONU), de la Planification Familiale (PF), des Audits de décès maternels et néonataux, la Prise en charge Intégrée des Maladies de l'Enfance (PCIME).

Ce chapitre présente certains indicateurs actuels de santé maternelle et néonatale. En outre, la comparaison avec les résultats des enquêtes précédentes permet de retracer les tendances de ces indicateurs et, par conséquent, d'évaluer aussi l'impact des politiques et programmes mis en œuvre.

8.1 COUVERTURE ET CONTENU DES SOINS PRENATALS

8.1.1 Prestataires qualifiés

Soins prénatals par un prestataire qualifié

Soins reçus durant la grossesse dispensés par des prestataires qualifiés, comme les médecins, les infirmières/sages-femmes.


Échantillon : Femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 5 années ayant précédé l'enquête.

Au Bénin, 83 % des femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des cinq années avant l'enquête ont reçu des soins prénatals, dispensés par du personnel qualifié. Dans 79 % des cas, ce sont les infirmières/sages-femmes qui ont fourni ces soins prénatals et dans une moindre mesure (4 %), ce sont les médecins. Toutefois, on constate que du personnel non qualifié, comme les aides-soignantes (5 %), continue d'offrir des soins prénatals. En outre, 11 % des femmes n'ont reçu aucun soin prénatal (**Tableau 8.1**).

Tendances : La comparaison des résultats avec les enquêtes précédentes ne fait pas apparaître d'augmentation de la couverture en soins prénatals : en effet, le pourcentage de femmes ayant reçu des soins prénatals d'un prestataire qualifié est passé de 87 % en 2001 à 83 % en 2017-2018. En outre, le pourcentage de femmes ayant effectué, au moins, quatre visites prénatales diminue depuis 2001, passant de 62 % en 2001 à 52 % en 2017-2018. Par contre, dans la même période, le pourcentage de femmes qui ont effectué leur première visite à moins de 4 mois de grossesse a augmenté, passant de 37 % à 51 % (**Graphique 8.1**).

Graphique 8.1 Tendances des couvertures en soins prénatals

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 5 années précédant l'enquête (pour la naissance la plus récente)



Variations par caractéristique

- La couverture en soins prénatals varie selon certaines caractéristiques sociodémographiques comme la résidence, le rang de naissance de l'enfant, le niveau d'instruction et le niveau de vie du ménage. Par rapport au rang de naissance, on constate que le pourcentage de femmes ayant reçu des soins prénatals par du personnel qualifié diminue avec le rang de naissance de l'enfant, variant de 86 % pour les naissances de rang 1 à 80 % pour celles de rangs six et plus.

- La couverture en soins prénatals est meilleure en milieu urbain que rural (90 % contre 79 %). C'est à Cotonou que le pourcentage de femmes ayant eu des soins prénatals est le plus élevé (95 %). Par comparaison, en milieu rural, 14 % des femmes n'ont eu aucun suivi prénatal.
- Les résultats par département montrent que le pourcentage de femmes qui ont reçu des soins prénatals varie de 97 % dans le Zou à 57 % dans l'Alibori, qui enregistre la couverture la plus faible.
- Le suivi prénatal varie en fonction du niveau d'instruction des femmes : de 78 % parmi les femmes sans niveau d'instruction, le pourcentage ayant reçu des soins prénatals passe à 92 % parmi celles ayant le niveau primaire et à 94 % parmi celles ayant le niveau secondaire 1^{er} cycle.
- La couverture en soins prénatals augmente du quintile de bien-être le plus bas au plus élevé, variant de 64 % à 96 %.

8.1.2 Stade de la grossesse et nombre de visites prénatales

L'OMS recommande à chaque femme enceinte de faire au moins quatre visites prénatales et d'effectuer la première dans le premier trimestre de la grossesse. Au Bénin, la proportion de femmes enceintes qui ont eu au moins quatre visites prénatales est de 52 %. Cette proportion varie selon le milieu de résidence. Elle est plus élevée en milieu urbain (59 %) qu'en milieu rural (48 %). De même, en milieu rural, le pourcentage de femmes qui n'ont effectué aucun suivi prénatal est plus de deux fois plus élevé qu'en milieu urbain (14 % contre 6 %).

En outre, seulement une femme sur deux (51%) a effectué sa première visite prénatale au cours du premier trimestre de la grossesse. En milieu urbain, ce pourcentage s'établit à 57 % contre 46 % en milieu rural. Dans 10 % des cas, les femmes effectuent tardivement, c'est-à-dire à 6-7 mois de grossesse, leur première visite. Ce pourcentage varie de 9 % en milieu urbain à 11 % en milieu rural (**Tableau 8.2**).

8.2 COMPOSANTES DES VISITES PRENATALES

La prise de certains médicaments et des examens médicaux sont indispensables pour un bon suivi des femmes pendant la grossesse. Au cours de l'EDSB-V de 2017-2018, on a demandé aux femmes si, pendant leur grossesse, elles avaient pris certains médicaments et effectué certains examens.


Parmi les femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête, le pourcentage ayant pris du fer sous forme de comprimés ou de sirop est de 85 %.

Dans 65 % des cas, les femmes ont pris des médicaments contre les parasites intestinaux.

Par ailleurs, plus de 9 femmes sur 10 ont effectué les examens suivants au cours des consultations prénatales: la mesure du poids (99 %), la palpation à l'abdomen et la mesure de la tension artérielle (98 % pour chacun), la mesure de la taille (97 %), le prélèvement d'urine (94 %) et le prélèvement de sang (89). Seulement 1 femme sur 2 a reçu un conseil nutritionnel (53 %) et a effectué une échographie (49 %) (**Tableau 8.3 et Graphique 8.2**).

Graphique 8.2 Composants des soins prénatals

Parmi les femmes ayant reçu des soins prénatals pour la naissance la plus récente, pourcentage ayant effectué certains examens



Tendances : Entre 2001 et 2017-2018, le pourcentage de femmes ayant reçu des suppléments de fer n'a pratiquement pas varié (84 % contre 85 %). Par contre, on note une amélioration en ce qui concerne la réalisation des autres examens médicaux : par exemple, le pourcentage de femmes ayant effectué un prélèvement urinaire est passé de 83 % en 2001 à 92 % en 2006 et à 94 % en 2017-2018 ; de même, le pourcentage de femmes ayant eu un prélèvement sanguin est passé, dans la période, de 29 % à 40 % et à 89 %.

Variations par caractéristique

- La proportion de femmes ayant pris du fer au cours de la grossesse varie de 90 % en milieu urbain à 81 % en milieu rural (**Tableau 8.3**).
- L'administration de fer aux femmes pendant la grossesse est généralisée au Bénin. Avec un pourcentage de 63 %, c'est le département du Borgou qui enregistre la couverture en fer la plus faible ; à l'opposé, c'est dans le département de l'Atlantique que ce pourcentage est le plus élevé (98 %).
- Le pourcentage de femmes ayant pris des médicaments contre les parasites intestinaux varie selon le milieu de résidence, de 73 % en milieu urbain à 59 % en milieu rural.
- La prise des médicaments contre les parasites intestinaux varie aussi en fonction du niveau d'instruction et du quintile de bien-être, passant de 58 % parmi les femmes sans niveau d'instruction à 85 % parmi les femmes qui ont le niveau secondaire 2^d cycle ou plus et de 41 % dans le quintile le plus bas à 88 % dans le plus élevé.

8.3 PROTECTION CONTRE LE TÉTANOS NEONATAL

Protection contre le tétanos néonatal

Le nombre d'injections antitétaniques nécessaires pour éviter que le nouveau-né contracte le tétanos dépend des vaccinations reçues par la mère. Une naissance est protégée contre le tétanos néonatal si la mère a reçu l'une des combinaisons suivantes :

- Deux injections de vaccin antitétanique au cours de la grossesse ou
- Deux injections ou plus, la troisième ayant été effectuée dans les 3 années avant la naissance ou
- Trois injections ou plus, la dernière ayant été effectuée dans les 5 années avant la naissance ou
- Quatre injections ou plus, la dernière ayant été effectuée dans les 10 années avant la naissance ou
- Cinq injections ou plus à n'importe quel moment avant la naissance.

Échantillon : Dernières naissances vivantes des femmes de 15-49 ans ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête.

Le tétanos néonatal est une cause majeure de décès prématuré chez les enfants dans de nombreux pays en développement. Il est souvent la conséquence d'un manque d'asepsie durant l'accouchement. La protection contre le tétanos néonatal est de 71 % pour les naissances les plus récentes des cinq années ayant précédé l'enquête de 2017-2018.

Une femme sur deux (51 %) a reçu deux injections antitétaniques durant la grossesse de la naissance vivante la plus récente (**Tableau 8.4**).

Tendances : Entre 2006 et 2011-2012, la couverture antitétanique s'est améliorée, le pourcentage de femmes dont la dernière naissance vivante est protégée contre le tétanos néonatal a augmenté, passant de 60 % à 70 %. Cette tendance à l'amélioration ne s'est pas poursuivie puisque la couverture se situe toujours autour de 70 % (71 % en 2017-2018).

Variations par caractéristique

- La couverture vaccinale varie avec l'âge des femmes à la naissance : de 61 % parmi celles qui avaient moins de 20 ans à la naissance de l'enfant, elle atteint 72 % dans les groupes d'âges 20-34 ans et 35-49 ans.
- La couverture antitétanique néonatale est nettement plus faible dans les départements de l'Atacora (53 %) et de Alibori (56 %) que dans le département du Mono (90 %) où elle enregistre son niveau le plus élevé.
- La couverture contre le tétanos néonatal augmente avec le niveau d'instruction de la mère, passant de 67 % parmi celles sans aucun niveau d'instruction à 83 % parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus.
- On note aussi des variations en fonction du bien-être économique. Dans le quintile le plus bas, pour 52 % des femmes, la dernière naissance était protégée contre le tétanos néonatal contre 83 % dans le quintile le plus élevé.

8.4 SERVICES D'ACCOUCHEMENT

8.4.1 Accouchement en établissement de santé

Accouchements en établissement de santé

Accouchements qui se déroulent dans un établissement de santé.

Échantillon : Toutes les naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête


L'amélioration de la prestation des services de santé maternelle est importante pour réduire la mortalité maternelle et néonatale. Cependant, l'accès aux établissements de santé dans les zones rurales est plus difficile que dans les zones urbaines en raison de la distance, de l'inaccessibilité et du manque d'installations appropriées. Globalement, pour 15 % des naissances vivantes ayant eu lieu au cours des cinq années précédant l'enquête, les mères ont accouché à la maison. A l'opposé, 84 % des naissances ont eu lieu dans un établissement de santé, en majorité dans les établissements du secteur public (70 % contre 14 % dans le secteur privé) (**Tableau 8.5**).

Bien qu'au Bénin, des efforts aient été faits pour promouvoir l'accouchement dans un établissement de santé, l'accouchement à domicile demeure encore assez fréquent dans certains départements tels que le Borgou (38 %), l'Atacora (27 %), l'Alibori (27 %), la Donga (20 %) et le Couffo (13 %).

Tendances : La comparaison des résultats avec ceux de l'EDSB-II de 2001 montre que la proportion de naissances qui ont eu lieu dans un établissement de santé a augmenté, de 76 % à 84 %, et les accouchements à la maison sont devenus moins fréquents passant de 23 % en 2001 à 15 % en 2017-2018 (**Graphique 8.3**). Cette diminution a concerné les deux milieux de résidence puisque, en milieu urbain, le pourcentage de naissances qui ont eu lieu à la maison est passé de 15 % en 2001 à 9 % en 2017-2018 et, en milieu rural, de 26 % à 18 % dans la même période.

Graphique 8.3 Lieu d'accouchement : tendances

Pourcentage de naissances vivantes des 5 années avant l'enquête




Variations par caractéristique

- La proportion de naissances qui ont eu lieu dans un établissement de santé diminue avec le rang de naissance, de 90 % pour le rang 1 à 76 % pour les rangs 6 ou plus. Parmi les naissances qui n'ont bénéficié d'aucune visite prénatale, seulement 26 % ont eu lieu dans un établissement de santé contre 96 % quand la mère a effectué au moins quatre visites prénatales.
- La proportion de naissances ayant eu lieu à la maison est plus élevée en milieu rural (18 %) qu'en milieu urbain (9 %).
- Dans les départements du Littoral et de l'Ouémé, la quasi-totalité des naissances s'est déroulée dans un établissement de santé (99 % dans les deux cas). Par contre, dans le département du Borgou, cette proportion est nettement plus faible (61 %) (**Graphique 8.4**).
- Le pourcentage de naissances ayant eu lieu dans un établissement de santé varie selon le niveau d'instruction de la mère, de 78 % chez les femmes sans niveau d'instruction à 99 % chez celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus.
- Le pourcentage de naissances ayant eu lieu dans un établissement de santé varie aussi selon le quintile de bien-être économique, passant de 61 % dans le quintile le plus bas à 99 % dans le plus élevé (**Graphique 8.5**).


Graphique 8.4 Naissances dans un établissement de santé par département

Pourcentage de naissances vivantes des 5 années avant l'enquête qui se sont déroulées dans un établissement de santé



Graphique 8.5 Naissances ayant eu lieu dans un établissement de santé par bien-être économique du ménage

Pourcentage de naissances vivantes des 5 années avant l'enquête qui se sont déroulées dans un établissement de santé



8.4.2 Assistance durant l'accouchement par un prestataire de santé qualifié

Assistance durant l'accouchement par un prestataire de santé qualifié

Naissances dont l'accouchement s'est déroulé avec l'assistance de médecins et d'infirmières/sages-femmes.

Échantillon : Toutes les naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête


Au Bénin, 78 % des naissances ont été assistées par un prestataire qualifié et formé. Dans la majorité des cas (72 %), ce sont les infirmières/sages-femmes qui ont assisté les femmes lors de l'accouchement (suivies des médecins (6 %) et des aides-soignantes et des accoucheuses traditionnelles (3 % pour chacun) (Tableau 8.6 et Graphique 8.6).

Variations par caractéristique

- Le pourcentage de naissances des cinq dernières années dont l'accouchement a été assisté par un prestataire qualifié et formé varie entre le milieu rural et le milieu urbain. En milieu urbain, 85 % ont été assistées par un prestataire qualifié contre 74 % en milieu rural.
- Les résultats selon les départements mettent en évidence des disparités importantes. En effet, dans les départements de l'Ouémé (98 %) et l'Atlantique (94 %), les pourcentages de femmes ayant bénéficié d'une assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié sont relativement élevés, tandis que dans les départements de l'Alibori (48 %) et du Borgou (60 %), les pourcentages sont plus bas.
- Considérant le niveau d'instruction des femmes, les résultats montrent que plus le niveau d'instruction augmente, plus la femme a tendance à accoucher avec l'assistance de personnel qualifié. Les proportions de naissances assistées par du personnel qualifié chez les femmes sans niveau d'instruction est de 72 % contre 93 % parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d ou plus.
- La proportion de naissances dont l'accouchement s'est déroulé avec l'assistance de personnel qualifié augmente, du quintile le plus bas au plus élevé, passant de 55 % à 95 % (Graphique 8.7).


Graphique 8.6 Assistance à l'accouchement

Répartition (en %) des naissances des 5 années avant l'enquête



Graphique 8.7 Assistance à l'accouchement par du personnel qualifié par bien-être économique du ménage

Pourcentage de naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 5 années avant l'enquête dont l'accouchement a été assisté par du personnel qualifié



8.4.3 Accouchement par césarienne

Les accouchements par césarienne peuvent réduire la mortalité maternelle et néonatale et éviter des complications telles que la fistule obstétricale. Au Bénin, seulement 5 % des naissances des cinq dernières années ont eu lieu par césarienne : 2 % ont été décidées avant le début du travail et 3 % après le début du travail (Tableau 8.7).

Tendances : Entre 2006 et 2017-2018, le pourcentage de naissances par césarienne a peu changé, variant de 4 % à 5 %.

Variations par caractéristique

- Le pourcentage de femmes ayant eu une césarienne tend à augmenter avec l'âge à la naissance, variant de 4 % parmi celles de moins de 20 ans à 6 % parmi celles de 35-49 ans.
- Le pourcentage des naissances accouchées par césarienne tend à diminuer avec l'augmentation du rang de naissance, passant de 8 % parmi les naissances de rang 1 à 3 % parmi celles de rangs 6 ou plus.
- Le pourcentage de naissances qui ont eu lieu par césarienne ne varie pas parmi les naissances qui se déroulent dans des établissements privés (7 %) que dans le public (6 %).
- Le pourcentage de naissances par césarienne est plus élevé en milieu urbain (8 %) qu'en milieu rural (3 %).
- Avec un pourcentage de 15 %, c'est dans le département du Littoral que ce type d'accouchement est le plus fréquent. À l'opposé, avec 2 %, c'est dans le département de l'Alibori que le pourcentage de femmes accouchées par césarienne est le plus faible.
- Le pourcentage de naissances par césarienne augmente, de manière importante, du quintile le plus bas au plus élevé, passant de 2 % à 12 %.

8.4.4 Durée du séjour dans l'établissement de santé après la naissance

Le **Tableau 8.8** présente les pourcentages de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des cinq années avant l'enquête qui ont accouché dans un établissement de santé par durée de séjour dans l'établissement selon le type d'accouchement. On constate que la durée du séjour dans l'établissement de santé après l'accouchement est nettement plus longue quand l'accouchement a eu lieu par césarienne que par voie normale : 90 % des femmes accouchées par césarienne sont restées au moins trois jours dans l'établissement de santé contre 23 % pour celles ayant accouché par voie normale.

8.5 SOINS POSTNATALS

8.5.1 Examen postnatal de la mère

Une proportion importante de décès maternels et de décès de nouveau-nés qui se produisent dans la période néonatale ont lieu dans les 48 heures qui suivent l'accouchement. Il est donc fortement recommandé que les femmes effectuent une visite postnatale dans les deux jours qui suivent l'accouchement. Au cours de l'enquête, on a demandé aux femmes qui avaient accouché au cours des deux années ayant précédé l'enquête si, après leur dernier accouchement, elles avaient effectué un examen postnatal et combien de temps après l'accouchement cet examen avait eu lieu. Ainsi dans l'ensemble, 66 % des femmes ont reçu des soins postnatals au cours des deux jours après la naissance. Par contre, 27 % n'ont jamais reçu de soins postnatals (**Tableau 8.9**).

Tendances : Entre 2011-2012 et 2017-2018, le pourcentage de femmes ayant reçu des soins postnatals au cours des deux jours après la naissance a augmenté, passant de 51 % à 66 %.

Variations par caractéristique

- Le pourcentage de femmes ayant reçu des soins postnatals dans les deux jours après la naissance de l'enfant varie de manière importante entre les départements. En effet, si dans le Zou (91 %), le Littoral (81 %) ou le Plateau (79 %), la couverture en soins postnatals immédiatement après la naissance est

plutôt élevée, il en va différemment de l'Atacora (30 %), et du Borgou (42 %) où le suivi postnatal des femmes n'est pas une pratique généralisée.

- La couverture en soins postnatals dans les délais recommandés (2 jours après l'accouchement) augmente en fonction du niveau d'instruction de la mère, passant de 60 % pour les femmes qui n'ont aucun niveau d'instruction à 80 % parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus
- Le pourcentage de femmes ayant reçu des soins postnatals dans les délais recommandés augmente avec le niveau de bien-être économique, passant de 45 % dans le quintile le plus bas à 80 % dans le plus quintile le plus élevé (**Tableau 8.9**).

Type de prestataire

Les compétences du prestataire déterminent ses capacités à diagnostiquer des problèmes et à recommander un traitement ou une référence appropriée. Au Bénin, 62 % de femmes ont eu un examen postnatal dispensé par un prestataire de santé qualifié, à savoir un médecin, une infirmière ou une sage-femme. Par contre, dans 4 % des cas en 2017-2018, c'est une matrone, une aide-soignante ou une accoucheuse traditionnelle qui a dispensé les soins postnatals à la mère (**Tableau 8.10**).

8.5.2 Examen postnatal du nouveau-né

Au cours de l'EDSB-V 2017-2018, on a demandé à toutes les femmes, qui avaient eu une naissance vivante au cours des deux dernières années, si quelqu'un avait examiné leur nouveau-né, combien de temps après l'accouchement cet examen avait eu lieu et enfin quel type de prestataire avait effectué l'examen.


Dans l'ensemble, près des deux tiers des dernières naissances des deux dernières années (64 %) ont bénéficié des soins postnatals dans les premières 48 heures (**Tableau 8.11**).

Variations par caractéristique

- L'examen postnatal du nouveau-né dans les premiers deux jours est plus fréquent quand la naissance a eu lieu dans un établissement de santé qu'ailleurs (74 % contre 10 %) (**Graphique 8.8**).
- En milieu urbain, 68 % des nouveau-nés ont eu un examen postnatal dans les deux jours qui ont suivi leur naissance contre 62 % en milieu rural.
- La couverture en soins postnatals du nouveau-né augmente du quintile de bien-être le plus bas (45 %) au quintile de bien-être le plus élevé (78 %).

Graphique 8.8 Soins postnatals selon le lieu de l'accouchement

Pourcentage des dernières naissances des 2 années avant l'enquête pour lesquelles les femmes et les nouveau-nés ont reçu des soins postnatals dans les 2 jours après la naissance



Type de prestataire

En ce qui concerne le type de prestataire, on constate que 60 % des nouveau-nés ont reçu des soins postnatals dans les premières 48 heures dispensés par un prestataire de santé qualifié (médecin/infirmier/sage-femme). Dans seulement 4 % des cas, ce sont les matrones, Aide-soignantes et accoucheuses traditionnelles qui ont donné ces soins (**Tableau 8.12**).

Contenu des examens postnatals

L'enquête a également recueilli des données sur les composantes des soins postnatals. Plus précisément, on a cherché à savoir si certains actes avaient été effectués dans les deux jours suivant la naissance et si des conseils avaient été dispensés à la mère, en particulier ceux concernant les signes de danger chez le nouveau-né.

Dans l'ensemble, les résultats de l'enquête ont montré que pour seulement 58 % des dernières naissances vivantes ayant eu lieu au cours des deux années ayant précédé l'enquête, au moins deux actes/conseils ont été dispensés dans les premières 48 heures (**Tableau 8.13**).

Les examens qui ont été les plus fréquemment effectués sont la pesée (67 %), la prise de la température (48 %), l'examen du cordon et le counseling sur l'allaitement (46 % dans chaque cas).

8.6 PROBLEMES D'ACCES AUX SOINS DE SANTE

Problèmes d'accès aux soins de santé

On a demandé aux femmes si l'un des éléments suivants constituait un problème important quand elles recherchaient un conseil médical ou un traitement quand elles étaient malades :

- Obtenir la permission d'aller chez un médecin.
- Avoir l'argent pour des conseils ou un traitement.
- Distance à l'établissement de santé.
- Ne pas vouloir aller seule.

Échantillon : Femmes de 15-49 ans

De nombreux facteurs peuvent empêcher les femmes d'obtenir un conseil médical ou un traitement pour elles-mêmes lorsqu'elles sont malades. La connaissance de ces facteurs est particulièrement importante pour comprendre et traiter les obstacles auxquels les femmes sont confrontées dans la recherche de soins, y compris pendant la grossesse et l'accouchement.

Trois femmes sur cinq (60 %) ont déclaré avoir eu au moins un problème d'accès aux soins de santé. Parmi ces problèmes, obtenir de l'argent pour se faire soigner (53 %) est le principal problème déclaré par les femmes, suivi de la distance jusqu'à l'établissement de santé (31 %). En outre, le fait d'obtenir la permission d'aller se faire soigner a été citée par 22 % des femmes et la fait de ne pas vouloir s'y rendre seule par 20 % des femmes (**Tableau 8.14**).

Variations par caractéristique

- Le pourcentage de femmes ayant déclaré au moins un problème d'accès aux soins de santé augmente avec le nombre d'enfants vivants, passant de 58 % quand les femmes ont 1-2 enfant à 67 % quand elles en ont cinq ou plus.
- La proportion de femmes ayant cité au moins un problème d'accès aux soins de santé diminue avec le niveau d'instruction, passant de 64 % parmi celles sans niveau d'instruction à 45 % parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus.
- Dans le quintile de bien-être le plus bas, sept femmes sur dix (70 %) ont déclaré au moins un problème d'accès aux soins de santé contre 47 % dans le quintile de bien-être le plus élevé.

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'information sur la santé maternelle, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 8.1** Soins prénatals
- **Tableau 8.2** Nombre de visites prénatales et stade de la grossesse à la première visite
- **Tableau 8.3** Composants des visites prénatales
- **Tableau 8.4** Vaccination antitétanique
- **Tableau 8.5** Lieu de l'accouchement
- **Tableau 8.6** Assistance au cours de l'accouchement
- **Tableau 8.7** Césarienne
- **Tableau 8.8** Durée du séjour dans l'établissement de santé après la naissance
- **Tableau 8.9** Moment où le premier examen postnatal a été dispensé à la mère
- **Tableau 8.10** Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal à la mère
- **Tableau 8.11** Moment où le premier examen postnatal a été dispensé au nouveau-né
- **Tableau 8.12** Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal au nouveau-né
- **Tableau 8.13** Contenu des examens postnatals dispensés aux nouveau-nés
- **Tableau 8.14** Problèmes d'accès aux soins de santé

Tableau 8.1 Soins prénatals

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des 5 années ayant précédé l'enquête par type de prestataire de santé vu durant la grossesse de la naissance la plus récente, et pourcentage ayant reçu, pour la naissance la plus récente, des soins prénatals dispensés par un prestataire de santé qualifié, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Prestataire de soins prénatals							Pas de soins prénatals	Total	Pourcentage ayant reçu des soins prénatals d'un prestataire qualifié ¹	Effectif de femmes
	Médecin	Infirmière/sage-femme	Aide-soignante	Agent de santé communautaire	Accoucheuse traditionnelle	Matrone	Autre				
Âge à la naissance											
<20	3,1	77,6	6,4	0,0	0,2	0,4	0,1	12,2	100,0	80,7	1 087
20-34	4,3	79,4	5,0	0,2	0,0	0,3	0,3	10,5	100,0	83,7	6 426
35-49	4,4	78,8	4,4	0,1	0,1	0,3	0,4	11,5	100,0	83,2	1 517
Rang de naissance											
1	5,1	81,0	5,1	0,0	0,1	0,3	0,7	7,7	100,0	86,1	1 806
2-3	4,8	79,4	4,9	0,1	0,0	0,2	0,3	10,1	100,0	84,3	3 125
4-5	3,7	78,8	5,1	0,4	0,0	0,4	0,2	11,4	100,0	82,6	2 265
6+	2,5	77,0	5,1	0,1	0,0	0,3	0,1	14,8	100,0	79,5	1 835
Résidence											
Cotonou	18,1	77,1	1,2	0,1	0,0	0,0	2,1	1,4	100,0	95,2	408
Autres villes	5,0	83,8	3,5	0,1	0,0	0,2	0,4	7,1	100,0	88,8	3 115
Ensemble urbain	6,5	83,0	3,3	0,1	0,0	0,2	0,6	6,4	100,0	89,5	3 523
Rural	2,7	76,6	6,2	0,2	0,1	0,3	0,1	13,8	100,0	79,3	5 508
Département											
Alibori	0,2	56,7	21,2	0,0	0,1	0,4	0,1	21,5	100,0	56,8	1 226
Atacora	0,6	75,1	4,4	0,1	0,0	1,3	0,1	18,3	100,0	75,8	800
Atlantique	11,9	81,3	4,0	0,6	0,1	0,0	0,9	1,2	100,0	93,2	1 043
Borgou	2,7	65,0	0,9	0,0	0,1	0,0	0,2	31,2	100,0	67,7	1 164
Collines	1,4	94,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,2	2,8	100,0	96,3	604
Couffo	1,7	89,9	2,7	0,3	0,0	0,1	0,3	5,1	100,0	91,6	583
Donga	1,6	84,3	1,7	0,0	0,0	0,6	0,0	11,7	100,0	86,0	599
Littoral	18,1	77,1	1,2	0,1	0,0	0,0	2,1	1,4	100,0	95,2	408
Mono	3,6	79,4	12,6	0,7	0,2	0,0	0,2	3,4	100,0	83,0	393
Ouémé	3,5	92,8	1,5	0,1	0,0	0,4	0,2	1,6	100,0	96,3	798
Plateau	5,1	87,2	0,5	0,1	0,0	0,2	0,0	6,7	100,0	92,4	550
Zou	4,7	92,0	1,3	0,1	0,1	0,0	0,0	1,7	100,0	96,7	863
Niveau d'instruction											
Aucun	2,6	75,6	6,1	0,2	0,1	0,3	0,1	15,1	100,0	78,2	5 807
Primaire	4,7	86,8	3,3	0,2	0,1	0,3	0,2	4,4	100,0	91,5	1 650
Secondaire 1 ^{er} cycle	6,5	87,1	3,2	0,1	0,0	0,2	0,1	2,8	100,0	93,7	1 150
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	17,0	75,1	2,7	0,0	0,0	0,0	4,2	1,0	100,0	92,1	423
Quintiles de bien-être économique											
Le plus bas	0,9	62,7	6,9	0,3	0,0	0,6	0,1	28,5	100,0	63,6	1 827
Second	1,8	78,2	6,7	0,2	0,1	0,4	0,2	12,4	100,0	80,0	1 827
Moyen	3,0	82,5	6,0	0,1	0,1	0,2	0,0	8,1	100,0	85,5	1 837
Quatrième	4,0	88,4	3,5	0,1	0,1	0,2	0,2	3,6	100,0	92,4	1 857
Le plus élevé	11,6	83,9	2,0	0,1	0,0	0,0	1,1	1,3	100,0	95,5	1 683
Ensemble	4,2	79,1	5,1	0,2	0,1	0,3	0,3	10,9	100,0	83,2	9 031

Note : Si plus d'un prestataire de soins prénatals a été déclaré, seul celui possédant les qualifications les plus élevées a été pris en compte dans ce tableau.

¹ Sont considérés, dans le pays, comme des prestataires de soins prénatals qualifiés : médecins, infirmières/sages-femmes

Tableau 8.2 Nombre de visites prénatales et stade de la grossesse à la première visite

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des 5 années ayant précédé l'enquête par nombre de visites prénatales pour la naissance vivante la plus récente et en fonction du stade de la grossesse au moment de la première visite prénatale ; parmi les femmes qui ont eu une visite prénatale, nombre médian de mois de grossesse à la première visite, selon le milieu de résidence, EDSB-V Bénin 2017-2018

Nombre de visites prénatales et stade de la grossesse	Résidence				
	Cotonou	Autre villes	Ensemble urbain	Rural	Ensemble
Nombre de consultations prénatales					
Aucune	1,4	7,1	6,4	13,8	10,9
1	1,5	6,2	5,6	7,0	6,5
2-3	11,2	27,7	25,8	29,4	28,0
4+	81,9	55,9	58,9	47,7	52,1
Ne sait pas/manquant	4,0	3,2	3,3	2,1	2,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nombre de mois de grossesse à la première visite prénatale					
Pas de soins prénatals	1,4	7,1	6,4	13,8	10,9
<4	73,9	54,8	57,0	46,4	50,6
4-5	19,5	26,9	26,0	26,5	26,3
6-7	3,5	9,2	8,5	10,5	9,8
8+	0,4	1,2	1,1	1,8	1,6
Ne sait pas/manquant	1,3	0,8	0,9	0,9	0,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes	408	3 115	3 523	5 508	9 031
Nombre médian de mois de grossesse à la première visite prénatale (pour les femmes ayant reçu des soins prénatals)					
	3,2	3,7	3,6	3,8	3,7
Effectif de femmes ayant effectué des visites prénatales	402	2 895	3 297	4 749	8 046

Tableau 8.3 Composants des visites prénatales

Parmi les femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des 5 années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant pris du fer, sous forme de comprimés ou de sirop, et pourcentages ayant pris des médicaments contre les parasites intestinaux au cours de la grossesse de la naissance vivante la plus récente ; parmi les femmes ayant reçu des soins prénatals pour la naissance vivante la plus récente ayant eu lieu dans les 5 années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant effectué certains examens prénatals, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Parmi les femmes ayant eu une naissance vivante dans les 5 dernières années, pourcentage ayant pris durant la grossesse de la naissance vivante la plus récente :		Parmi les femmes ayant reçu des soins prénatals pour leur naissance vivante la plus récente des 5 dernières années, pourcentage ayant effectué certains examens :										Effectif de femmes ayant reçu des soins prénatals pour la naissance la plus récente	
	Du fer sous forme de comprimés ou de sirop	Des médicaments contre les parasites intestinaux	Effectif de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 5 dernières années	Mesure de la tension artérielle	Prélèvement d'urine	Prélèvement sanguin	Mesure du poids	Mesure de la taille	Palpé à l'abdomen	Échographie	Conseil nutritionnel			
Âge à la naissance														
<20	82,3	56,6	1 087	97,1	90,4	86,8	98,3	96,6	96,7	43,0	52,6	954		
20-34	84,9	65,8	6 426	98,0	94,0	89,7	98,8	96,9	97,8	50,7	53,8	5 749		
35-49	85,2	65,3	1 517	98,5	94,2	87,6	98,9	97,7	98,4	48,1	51,8	1 343		
Rang de naissance														
1	87,9	66,3	1 806	97,9	92,9	89,5	98,9	97,2	97,7	54,3	56,1	1 667		
2-3	85,9	65,9	3 125	97,9	94,0	90,6	98,9	96,9	97,6	51,1	54,3	2 808		
4-5	83,9	67,0	2 265	98,7	93,8	88,8	98,7	97,1	98,1	51,5	54,8	2 007		
6+	80,1	57,5	1 835	97,4	93,3	86,1	98,4	96,7	97,6	38,3	46,8	1 564		
Résidence														
Cotonou	97,1	90,6	408	99,4	97,0	94,8	99,7	96,7	99,1	94,4	67,5	402		
Autres villes	89,5	70,2	3 115	98,6	94,6	90,4	99,0	98,1	98,0	60,1	57,1	2 895		
Ensemble urbain	90,3	72,6	3 523	98,7	94,9	90,9	99,1	97,9	98,1	64,2	58,4	3 297		
Rural	81,0	59,4	5 508	97,5	92,7	87,7	98,5	96,3	97,5	39,0	49,8	4 749		
Département														
Alibori	71,0	50,4	1 226	96,9	95,0	95,7	98,0	97,1	96,1	34,4	65,7	963		
Atacora	75,1	33,8	800	93,9	92,4	84,4	98,3	97,0	96,0	21,8	28,2	654		
Atlantique	97,5	89,2	1 043	98,5	95,1	89,2	98,9	96,8	98,6	67,1	63,2	1 030		
Borgou	63,0	33,8	1 164	98,8	93,8	92,0	99,4	99,0	97,5	29,6	55,0	801		
Collines	92,1	64,4	604	98,7	89,3	85,2	99,2	99,1	98,6	46,6	36,4	587		
Couffo	85,9	57,9	583	97,1	88,9	84,4	97,4	94,1	95,3	42,1	61,8	553		
Donga	88,3	65,3	599	97,9	96,6	97,2	99,8	99,4	98,8	41,4	56,8	529		
Littoral	97,1	90,6	408	99,4	97,0	94,8	99,7	96,7	99,1	94,4	67,5	402		
Mono	90,6	73,2	393	98,2	92,7	80,7	97,5	95,4	98,2	54,1	60,7	380		
Ouémé	96,3	94,0	798	99,6	95,2	86,9	99,5	99,0	98,5	41,2	78,5	785		
Plateau	89,9	76,1	550	97,8	88,6	84,4	98,0	95,6	95,5	42,3	53,2	513		
Zou	94,8	78,2	863	99,1	95,5	88,6	99,2	93,8	98,9	62,1	50,4	847		
Niveau d'instruction														
Aucun	79,6	57,5	5 807	97,6	92,9	88,1	98,5	96,6	97,3	40,5	49,9	4 931		
Primaire	91,6	73,5	1 650	98,9	94,4	89,6	99,1	97,5	98,1	56,1	57,0	1 578		
Secondaire 1 ^{er} cycle	94,8	80,2	1 150	97,9	94,7	90,8	99,2	98,2	99,1	64,8	60,4	1 118		
Secondaire 2 ^e cycle ou plus	98,2	84,9	423	99,4	95,2	92,7	99,5	96,6	98,8	87,7	60,6	419		

À suivre...

Tableau 8.3—Suite

Caractéristique sociodémographique	Parmi les femmes ayant eu une naissance vivante dans les 5 dernières années, pourcentage ayant pris durant la grossesse de la naissance vivante la plus récente :		Parmi les femmes ayant reçu des soins prénatals pour leur naissance vivante la plus récente des 5 dernières années, pourcentage ayant effectué certains examens :										Effectif de femmes ayant reçu des soins prénatals pour la naissance la plus récente	
	Du fer sous forme de comprimés ou de sirop	Des médicaments contre les parasites intestinaux	Effectif de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 5 dernières années	Mesure de la tension artérielle	Prélèvement d'urine	Prélèvement sanguin	Mesure du poids	Mesure de la taille	Palpé à l'abdomen	Échographie	Conseil nutritionnel			
Quintiles de bien-être économique														
Le plus bas	64,1	40,9	1 827	96,7	92,0	88,2	98,6	96,5	95,8	25,2	43,6	1 306		
Second	81,9	57,1	1 827	97,1	91,3	85,8	98,0	95,2	97,7	34,2	49,1	1 600		
Moyen	87,9	64,4	1 837	97,8	92,9	89,0	98,3	97,0	97,2	40,4	50,7	1 688		
Quatrième	92,7	74,4	1 857	98,6	94,7	88,7	99,1	97,7	98,6	56,9	56,9	1 790		
Le plus élevé	97,3	87,7	1 683	99,4	96,6	93,2	99,7	98,3	99,0	83,9	63,8	1 661		
Ensemble	84,6	64,6	9 031	98,0	93,6	89,0	98,8	97,0	97,7	49,4	53,3	8 046		

Tableau 8.4 Vaccination antitétanique

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 5 années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant reçu deux injections antitétaniques ou plus au cours de la grossesse de la naissance vivante la plus récente et pourcentage dont la dernière naissance vivante a été protégée contre le tétanos néonatal, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant reçu deux injections ou plus durant la grossesse de la naissance vivante la plus récente	Pourcentage dont la naissance vivante la plus récente est protégée contre le tétanos néonatal ¹	Effectif de mères
Âge à la naissance			
<20	54,5	60,8	1 087
20-34	51,7	72,0	6 426
35-49	45,1	72,1	1 517
Rang de naissance			
1	64,2	67,2	1 806
2-3	51,7	73,1	3 125
4-5	48,4	73,1	2 265
6+	39,9	66,9	1 835
Résidence			
Cotonou	60,4	80,1	408
Autres villes	54,6	76,6	3 115
Ensemble urbain	55,2	77,0	3 523
Rural	48,2	66,6	5 508
Département			
Alibori	44,8	56,4	1 226
Atacora	37,1	53,4	800
Atlantique	59,0	79,6	1 043
Borgou	34,6	54,9	1 164
Collines	45,0	72,2	604
Couffo	63,6	79,6	583
Donga	54,9	74,1	599
Littoral	60,4	80,1	408
Mono	77,1	89,6	393
Ouémé	55,1	79,3	798
Plateau	53,2	73,5	550
Zou	56,2	85,4	863
Niveau d'instruction			
Aucun	47,0	66,7	5 807
Primaire	54,4	75,3	1 650
Secondaire 1 ^{er} cycle	60,7	79,5	1 150
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	65,7	83,2	423
Quintiles de bien-être économique			
Le plus bas	38,0	52,4	1 827
Second	48,9	68,3	1 827
Moyen	50,8	71,8	1 837
Quatrième	56,3	78,8	1 857
Le plus élevé	61,5	82,9	1 683
Ensemble	51,0	70,7	9 031

¹ Y compris les mères ayant reçu deux injections au cours de la grossesse de la naissance vivante la plus récente ou, au moins, deux injections (la dernière ayant été effectuée au cours des 3 années ayant précédé la dernière naissance vivante), ou, au moins, trois injections (la dernière ayant été effectuée au cours des 5 années ayant précédé la dernière naissance vivante), ou, au moins, quatre injections (la dernière ayant été effectuée au cours des 10 années ayant précédé la dernière naissance vivante), ou, au moins, cinq injections avant la dernière naissance vivante.

Tableau 8.5 Lieu de l'accouchement

Répartition (en %) des naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête par lieu de l'accouchement et pourcentage dont l'accouchement s'est déroulé dans un établissement de santé, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Établissement de santé				Total	Pourcentage dont l'accouchement s'est déroulé dans un établissement de santé	Effectif de naissances
	Secteur public	Secteur privé	Maison	Autre			
Âge de la mère à la naissance							
<20	73,7	10,8	13,4	2,0	100,0	84,5	1 747
20-34	69,6	14,7	14,1	1,6	100,0	84,2	10 007
35-49	68,8	12,5	17,2	1,4	100,0	81,4	1 890
Rang de naissance							
1	73,8	15,8	9,2	1,2	100,0	89,6	3 005
2-3	69,6	15,6	13,2	1,6	100,0	85,3	4 930
4-5	69,6	13,1	15,9	1,4	100,0	82,7	3 206
6+	66,6	9,3	21,3	2,7	100,0	75,9	2 502
Visites prénatales¹							
Aucune	22,4	3,8	67,3	6,5	100,0	26,2	985
1-3	76,3	11,1	11,4	1,2	100,0	87,4	3 112
4+	77,3	18,4	3,5	0,8	100,0	95,7	4 702
Ne sait pas/manquant	75,5	20,8	2,9	0,8	100,0	96,3	232
Résidence							
Cotonou	54,7	44,5	0,4	0,4	100,0	99,2	579
Autres villes	70,1	18,9	10,2	0,8	100,0	89,0	4 677
Ensemble urbain	68,4	21,7	9,1	0,8	100,0	90,1	5 256
Rural	71,0	9,0	17,8	2,2	100,0	80,0	8 387
Département							
Alibori	66,3	0,7	26,5	6,6	100,0	67,0	1 831
Atacora	67,4	2,6	27,1	3,0	100,0	69,9	1 216
Atlantique	65,3	32,4	1,7	0,5	100,0	97,7	1 568
Borgou	54,4	6,6	37,9	1,2	100,0	61,0	1 784
Collines	85,2	9,2	5,0	0,6	100,0	94,3	869
Couffo	73,3	12,8	13,1	0,7	100,0	86,2	902
Donga	77,3	2,6	19,5	0,6	100,0	79,8	926
Littoral	54,7	44,5	0,4	0,4	100,0	99,2	579
Mono	90,8	5,3	3,6	0,3	100,0	96,1	613
Ouémé	69,5	29,2	1,0	0,2	100,0	98,7	1 197
Plateau	75,3	16,7	6,3	1,6	100,0	92,1	860
Zou	81,0	17,1	1,6	0,2	100,0	98,1	1 299
Niveau d'instruction de la mère							
Aucun	67,8	10,1	19,9	2,2	100,0	77,9	8 964
Primaire	74,9	18,6	5,9	0,6	100,0	93,4	2 486
Secondaire 1 ^{er} cycle	77,0	20,1	2,5	0,3	100,0	97,2	1 619
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	62,8	35,9	0,4	0,9	100,0	98,7	574
Quintiles de bien-être économique							
Le plus bas	57,0	4,2	36,0	2,7	100,0	61,3	2 922
Second	71,5	8,1	17,6	2,9	100,0	79,5	2 811
Moyen	77,0	10,5	11,1	1,4	100,0	87,5	2 749
Quatrième	78,2	17,2	3,9	0,8	100,0	95,3	2 738
Le plus élevé	66,7	32,4	0,6	0,3	100,0	99,1	2 423
Ensemble	70,0	13,9	14,5	1,7	100,0	83,9	13 643

¹ Concerne seulement la naissance vivante la plus récente ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête.

Tableau 8.6 Assistance au cours de l'accouchement

Répartition (en %) des naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête par catégorie de personnel ayant assisté l'accouchement, pourcentage de naissances dont l'accouchement a été assisté par un prestataire de santé qualifié, et pourcentage qui ont eu le contact "peau-à-peau" immédiatement après la naissance, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Personnel ayant fourni l'assistance durant l'accouchement							Total	Pourcentage dont l'accouchement a été assisté par un prestataire qualifié ¹	Pourcentage de naissances placées en contact « peau-à-peau » immédiatement après la naissance	Effectif de naissances
	Médecin	Infirmière/sage-femme	Aide-soignante	Accoucheuse traditionnelle	Matrone	Parents/autre	Personne				
Âge de la mère à la naissance											
<20	5,3	72,2	3,6	4,2	0,8	6,2	7,7	100,0	77,5	72,7	1 747
20-34	6,2	72,4	2,6	3,0	0,5	7,0	8,3	100,0	78,6	75,5	10 007
35-49	5,8	70,1	2,6	3,0	0,9	8,3	9,4	100,0	75,8	74,5	1 890
Rang de naissance											
1	8,1	74,6	2,9	2,7	0,7	6,2	4,8	100,0	82,7	75,5	3 005
2-3	6,1	73,6	2,5	2,8	0,5	6,5	8,1	100,0	79,6	76,5	4 930
4-5	5,2	72,3	2,7	3,3	0,6	6,7	9,2	100,0	77,5	75,6	3 206
6+	4,5	65,6	3,1	4,2	1,0	9,7	11,9	100,0	70,1	70,8	2 502
Visites prénatales											
Aucune	0,7	23,2	1,2	17,6	1,3	25,8	30,2	100,0	24,0	35,7	985
1-3	3,4	78,2	3,1	1,8	0,6	6,3	6,5	100,0	81,7	76,9	3 112
4+	9,9	79,1	2,6	0,7	0,5	3,1	4,2	100,0	89,0	82,1	4 702
Ne sait pas/manquant	9,8	80,4	4,2	0,3	0,0	4,2	1,1	100,0	90,2	81,0	232
Lieu de l'accouchement											
Établissement de santé	7,1	85,0	3,1	0,1	0,4	1,8	2,4	100,0	92,1	85,4	11 445
Établissement public	5,6	85,9	3,4	0,1	0,4	1,7	2,8	100,0	91,5	85,1	9 550
Établissement privé	14,9	80,4	1,7	0,0	0,4	2,3	0,3	100,0	95,3	86,8	1 895
Ailleurs	0,4	4,4	0,6	19,1	2,0	34,3	39,2	100,0	4,8	21,3	2 199
Résidence											
Cotonou	16,9	76,3	1,0	0,0	0,1	5,3	0,4	100,0	93,2	83,8	579
Autres villes	7,9	76,1	2,7	1,4	0,5	6,0	5,3	100,0	84,0	78,5	4 677
Ensemble urbain	8,9	76,1	2,5	1,3	0,5	5,9	4,8	100,0	85,0	79,1	5 256
Rural	4,2	69,5	2,8	4,4	0,7	7,8	10,6	100,0	73,7	72,5	8 387
Département											
Alibori	0,3	47,5	3,9	7,1	0,7	3,3	37,4	100,0	47,7	53,4	1 831
Atacora	1,9	62,8	5,0	3,7	1,2	21,0	4,3	100,0	64,8	60,4	1 216
Atlantique	14,7	79,4	4,0	0,1	0,0	1,3	0,5	100,0	94,0	90,4	1 568
Borgou	3,0	56,9	2,1	10,0	1,2	11,3	15,5	100,0	59,9	62,7	1 784
Collines	4,3	89,3	1,1	0,8	0,5	3,2	0,9	100,0	93,5	89,0	869
Couffo	3,0	77,0	2,5	2,0	1,2	8,7	5,7	100,0	80,0	74,9	902
Donga	2,7	75,8	1,1	2,6	0,8	13,2	3,8	100,0	78,5	70,1	926
Littoral	16,9	76,3	1,0	0,0	0,1	5,3	0,4	100,0	93,2	83,8	579
Mono	7,8	76,7	11,1	0,7	0,0	2,3	1,4	100,0	84,5	76,8	613
Ouémé	9,7	88,1	0,7	0,1	0,8	0,5	0,1	100,0	97,8	86,4	1 197
Plateau	5,7	86,5	0,4	1,0	0,5	5,2	0,7	100,0	92,2	83,7	860
Zou	8,4	81,2	0,9	1,2	0,1	8,0	0,3	100,0	89,6	90,8	1 299
Niveau d'instruction de la mère											
Aucun	4,2	67,5	2,7	4,5	0,7	8,4	11,8	100,0	71,7	70,9	8 964
Primaire	7,3	81,1	3,0	0,9	0,6	5,2	1,8	100,0	88,4	82,2	2 486
Secondaire 1 ^{er} cycle	9,5	82,5	2,5	0,3	0,4	3,2	1,7	100,0	92,0	85,3	1 619
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	18,7	74,0	1,5	0,0	0,0	4,9	1,0	100,0	92,6	80,1	574
Quintiles de bien-être économique											
Le plus bas	2,0	53,1	3,2	9,0	1,4	12,9	18,3	100,0	55,2	59,1	2 922
Second	3,3	70,0	3,5	3,8	0,6	8,3	10,6	100,0	73,3	71,2	2 811
Moyen	4,4	75,7	3,0	2,0	0,6	7,3	7,1	100,0	80,1	78,5	2 749
Quatrième	7,4	82,9	2,2	0,3	0,3	3,6	3,3	100,0	90,3	83,7	2 738
Le plus élevé	14,4	80,7	1,5	0,0	0,2	2,3	0,9	100,0	95,1	84,9	2 423
Ensemble	6,0	72,0	2,7	3,2	0,6	7,1	8,3	100,0	78,1	75,0	13 643

Note : Si l'enquêtée déclare que plus d'une personne a assisté l'accouchement, seule celle possédant les qualifications les plus élevées est prise en compte dans ce tableau.

¹ Le personnel qualifié formé comprend les médecins, les infirmières/sages-femmes.

² Concerne seulement la naissance vivante la plus récente ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête.

Tableau 8.7 Césarienne

Pourcentage de naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête accouchées par césarienne, pourcentage accouché par césarienne qui était planifiée avant le début des douleurs de l'accouchement et pourcentage accouché par césarienne décidée après le début des douleurs de l'accouchement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage accouché par césarienne	Moment auquel a été prise la décision de réaliser une césarienne		Effectif de naissances
		Prévu avant le début des douleurs	Décidée après le début des douleurs	
Âge de la mère à la naissance				
<20	4,4	0,8	3,6	1 747
20-34	5,0	2,2	2,8	10 007
35-49	6,1	2,7	3,4	1 890
Rang de naissance				
1	7,7	2,7	5,0	3 005
2-3	4,7	2,3	2,4	4 930
4-5	4,6	2,2	2,4	3 206
6+	3,4	1,1	2,4	2 502
Visites prénatales¹				
Aucune	1,1	0,1	1,0	985
1-3	3,2	1,1	2,1	3 112
4+	8,4	3,6	4,8	4 702
Ne sait pas/manquant	10,4	3,3	7,2	232
Lieu d'accouchement²				
Établissement de santé	6,1	2,5	3,5	11 445
Établissement public	5,9	2,2	3,7	9 550
Établissement privé	7,2	4,3	2,9	1 895
Résidence				
Cotonou	14,6	7,6	7,0	579
Autres villes	7,0	3,3	3,7	4 677
Ensemble urbain	7,8	3,8	4,1	5 256
Rural	3,4	1,1	2,3	8 387
Département				
Alibori	1,7	0,4	1,3	1 831
Atacora	2,7	0,8	1,9	1 216
Atlantique	8,9	4,3	4,6	1 568
Borgou	2,6	1,0	1,6	1 784
Collines	4,0	1,2	2,7	869
Couffo	4,8	1,4	3,4	902
Donga	3,3	1,0	2,3	926
Littoral	14,6	7,6	7,0	579
Mono	7,3	4,8	2,5	613
Ouémé	7,5	2,7	4,8	1 197
Plateau	2,6	1,3	1,2	860
Zou	7,4	2,8	4,6	1 299
Niveau d'instruction de la mère				
Aucun	3,3	1,2	2,2	8 964
Primaire	6,3	2,2	4,1	2 486
Secondaire 1 ^{er} cycle	8,0	3,9	4,1	1 619
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	19,2	11,5	7,7	574
Quintiles de bien-être économique				
Le plus bas	1,6	0,3	1,3	2 922
Second	2,9	1,0	1,9	2 811
Moyen	3,3	1,4	1,9	2 749
Quatrième	6,6	3,0	3,6	2 738
Le plus élevé	12,3	5,6	6,7	2 423
Ensemble	5,1	2,1	3,0	13 643

Note : La question sur la césarienne n'est posée qu'aux femmes qui ont accouché dans un établissement de santé. Dans ce tableau, on suppose que les femmes qui n'ont pas accouché dans un établissement de santé n'ont pas accouché par césarienne.

¹ Concerne seulement la naissance la plus récente ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête.

Tableau 8.8 Durée du séjour dans l'établissement de santé après la naissance

Parmi les femmes ayant eu une naissance dans les 5 années ayant précédé l'enquête dont l'accouchement de la naissance vivante la plus récente s'est déroulé dans un établissement de santé, répartition (en %) par durée de séjour dans l'établissement de santé suivant leur naissance vivante la plus récente, selon le type d'accouchement, EDSB-V Bénin 2017-2018

Type d'accouchement	<6 heures	6-11 heures	12-23 heures	1-2 jours	3 jours ou +	Manquant	Total	Effectif de femmes
Accouchement par voie basse	10,2	7,3	4,5	54,3	23,1	0,6	100,0	7 169
Césarienne	2,2	1,3	0,0	5,8	89,6	1,2	100,0	529

Tableau 8.9 Moment où le premier examen postnatal a été dispensé à la mère

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance dans les 2 années ayant précédé l'enquête, répartition (en %) de la durée écoulée entre l'accouchement et le premier examen postnatal de la mère pour la naissance vivante la plus récente et pourcentage de femmes ayant eu une naissance dans les 2 années ayant précédé l'enquête qui ont reçu un examen postnatal au cours des 2 jours ayant suivi la naissance, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Durée écoulée entre l'accouchement et le premier examen postnatal de la mère ¹					Ne sait pas/manquant	Pas d'examen post-natals ²	Total	Pourcentage de femmes ayant reçu un examen postnatal dans les deux jours après la naissance ¹	Effectif de femmes
	Moins de 4 heures	4-23 heures	1-2 jours	3-6 jours	7-41 jours					
Âge à la naissance										
<20	49,7	8,3	7,9	0,8	0,5	8,2	24,6	100,0	65,9	724
20-34	50,5	8,0	7,0	0,8	0,5	6,2	27,1	100,0	65,5	4 017
35-49	50,7	8,4	6,6	0,5	0,4	5,3	28,3	100,0	65,6	760
Rang de naissance										
1	52,8	9,7	7,8	1,4	0,7	6,5	21,1	100,0	70,3	1 228
2-3	52,4	7,5	6,7	0,5	0,4	6,8	25,7	100,0	66,6	1 971
4-5	51,1	8,7	7,0	0,7	0,1	5,7	26,7	100,0	66,8	1 304
6+	42,8	6,2	6,8	0,5	0,8	6,1	36,8	100,0	55,8	999
Lieu d'accouchement										
Établissement de santé	57,7	8,9	7,7	0,5	0,3	7,1	17,8	100,0	74,3	4 680
Ailleurs	9,3	3,1	3,3	2,2	1,4	2,1	78,6	100,0	15,7	822
Résidence										
Cotonou	65,7	10,1	4,9	1,9	1,4	5,7	10,4	100,0	80,7	242
Autres villes	53,8	8,9	5,7	0,7	0,3	6,3	24,4	100,0	68,4	1 863
Ensemble urbain	55,2	9,0	5,6	0,8	0,5	6,2	22,8	100,0	69,8	2 105
Rural	47,5	7,5	7,9	0,7	0,5	6,4	29,5	100,0	62,9	3 397
Département										
Alibori	45,7	5,8	12,8	0,6	0,5	4,9	29,7	100,0	64,3	766
Atacora	14,9	7,1	7,9	0,3	1,0	2,5	66,2	100,0	29,9	499
Atlantique	55,2	9,3	2,2	0,2	0,7	8,8	23,6	100,0	66,7	595
Borgou	37,2	2,7	1,9	0,6	0,6	10,9	46,2	100,0	41,8	730
Collines	55,7	9,5	12,9	1,3	0,8	6,2	13,6	100,0	78,1	353
Couffo	59,9	3,4	4,6	0,3	0,2	6,3	25,4	100,0	67,8	375
Donga	43,6	15,8	11,0	1,5	0,2	11,0	17,0	100,0	70,4	391
Littoral	65,7	10,1	4,9	1,9	1,4	5,7	10,4	100,0	80,7	242
Mono	48,2	8,2	18,7	0,4	0,0	2,2	22,3	100,0	75,1	225
Ouémé	52,1	16,9	7,0	1,8	0,0	3,6	18,6	100,0	76,0	479
Plateau	60,6	12,0	6,1	0,7	0,4	6,1	14,1	100,0	78,7	340
Zou	86,2	3,2	1,6	0,2	0,0	4,3	4,5	100,0	91,0	508
Niveau d'instruction										
Aucun	45,8	7,3	7,1	0,6	0,4	6,6	32,1	100,0	60,2	3 458
Primaire	57,2	9,3	6,3	0,9	0,3	6,0	20,0	100,0	72,8	1 036
Secondaire 1 ^{er} cycle	58,0	9,4	7,5	1,0	0,5	6,5	17,0	100,0	74,9	731
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	63,1	9,6	6,8	1,1	1,3	4,5	13,6	100,0	79,5	277
Quintiles de bien-être économique										
Le plus bas	32,7	5,0	7,3	0,6	0,7	5,7	48,0	100,0	44,9	1 153
Second	49,7	8,3	7,4	0,5	0,4	5,7	28,0	100,0	65,4	1 139
Moyen	50,8	8,4	8,7	0,5	0,4	6,8	24,5	100,0	67,8	1 134
Quatrième	58,1	8,3	6,1	1,2	0,3	7,4	18,6	100,0	72,5	1 097
Le plus élevé	63,3	10,8	5,4	1,0	0,5	6,1	12,9	100,0	79,5	979
Ensemble	50,5	8,1	7,0	0,7	0,5	6,3	26,9	100,0	65,5	5 502

¹ Sont incluses les femmes qui ont eu un examen postnatal dispensé par un médecin, une infirmière, une sage-femme, un agent de santé communautaire ou une accoucheuse traditionnelle.

² Y compris les femmes qui ont eu un examen postnatal après 41 jours.

Tableau 8.10 Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal à la mère

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance dans les 2 années ayant précédé l'enquête, répartition (en %) par type de prestataire de santé ayant dispensé le premier examen postnatal de la mère au cours des 2 jours ayant suivi la dernière naissance vivante, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Type de prestataire de santé ayant dispensé le premier examen postnatal à la mère					Pas d'examen postnatal au cours des 2 jours après la naissance	Total	Effectif de femmes
	Médecin/ infirmière/ sage-femme	Aide-soignante	Agent de santé communautaire	Accoucheuse traditionnelle	Matrone			
Âge à la naissance								
<20	60,8	3,4	0,0	0,9	0,8	34,1	100,0	724
20-34	61,6	3,0	0,0	0,5	0,4	34,5	100,0	4 017
35-49	61,6	2,8	0,0	0,7	0,5	34,4	100,0	760
Rang de naissance								
1	66,3	3,2	0,1	0,2	0,6	29,7	100,0	1 228
2-3	62,0	3,6	0,0	0,7	0,3	33,4	100,0	1 971
4-5	63,2	2,4	0,0	0,7	0,5	33,2	100,0	1 304
6+	52,2	2,4	0,0	0,6	0,6	44,2	100,0	999
Lieu d'accouchement								
Établissement de santé	70,4	3,5	0,0	0,1	0,4	25,7	100,0	4 680
Ailleurs	11,0	0,5	0,1	3,3	0,8	84,3	100,0	822
Résidence								
Cotonou	75,6	4,6	0,0	0,0	0,5	19,3	100,0	242
Autres villes	64,5	3,3	0,0	0,4	0,1	31,6	100,0	1 863
Ensemble urbain	65,7	3,4	0,0	0,4	0,2	30,2	100,0	2 105
Rural	58,8	2,8	0,0	0,7	0,6	37,1	100,0	3 397
Département								
Alibori	58,2	5,0	0,0	0,8	0,4	35,7	100,0	766
Atacora	27,8	1,1	0,0	0,3	0,7	70,1	100,0	499
Atlantique	62,2	3,4	0,0	0,0	1,0	33,3	100,0	595
Borgou	37,9	2,1	0,0	1,6	0,1	58,2	100,0	730
Collines	74,6	3,2	0,0	0,3	0,0	21,9	100,0	353
Couffo	62,8	2,0	0,2	1,3	1,4	32,2	100,0	375
Donga	69,3	0,7	0,0	0,2	0,3	29,6	100,0	391
Littoral	75,6	4,6	0,0	0,0	0,5	19,3	100,0	242
Mono	62,8	11,8	0,0	0,0	0,5	24,9	100,0	225
Ouémé	72,9	2,4	0,0	0,3	0,4	24,0	100,0	479
Plateau	75,8	2,2	0,0	0,7	0,0	21,3	100,0	340
Zou	88,9	1,8	0,0	0,4	0,0	9,0	100,0	508
Niveau d'instruction								
Aucun	56,4	2,6	0,0	0,8	0,4	39,8	100,0	3 458
Primaire	67,7	3,9	0,0	0,2	1,0	27,2	100,0	1 036
Secondaire 1 ^{er} cycle	70,7	4,0	0,0	0,0	0,2	25,1	100,0	731
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	77,0	2,6	0,0	0,0	0,0	20,5	100,0	277
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	40,6	2,3	0,0	1,4	0,7	55,1	100,0	1 153
Second	60,9	3,1	0,0	0,9	0,5	34,6	100,0	1 139
Moyen	63,5	3,4	0,1	0,2	0,6	32,2	100,0	1 134
Quatrième	69,0	3,1	0,0	0,1	0,3	27,5	100,0	1 097
Le plus élevé	76,0	3,4	0,0	0,0	0,1	20,5	100,0	979
Ensemble	61,5	3,0	0,0	0,6	0,5	34,5	100,0	5 502

Tableau 8.11 Moment où le premier examen postnatal a été dispensé au nouveau-né

Répartition (en %) des naissances vivantes les plus récentes ayant eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête par durée écoulée entre le premier examen postnatal et l'accouchement et pourcentage de naissances ayant eu un examen postnatal dans les 2 premiers jours après la naissance, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Durée écoulée entre l'accouchement et le premier examen postnatal du nouveau-né ¹						Ne sait pas/manquant	Pas d'examen postnatals ²	Total	Pourcentage de naissances ayant eu un examen postnatal dans les 2 premiers jours après la naissance ¹	Effectif de naissances
	Moins d'1 heure	1-3 heures	4-23 heures	1-2 jours	3-6 jours						
Âge de la mère à la naissance											
<20	21,4	26,4	8,2	8,5	1,6	8,3	25,6	100,0	64,5	724	
20-34	22,7	26,5	7,4	7,6	0,9	5,7	29,2	100,0	64,2	4 017	
35-49	20,2	27,0	7,6	8,4	1,2	5,0	30,5	100,0	63,2	760	
Rang de naissance											
1	24,4	26,6	9,1	8,4	1,5	7,0	22,9	100,0	68,6	1 228	
2-3	21,9	28,4	7,6	7,5	1,0	5,6	28,0	100,0	65,4	1 971	
4-5	23,2	26,8	7,7	7,3	0,7	5,4	28,9	100,0	65,0	1 304	
6+	18,8	22,5	5,3	8,5	1,1	5,9	38,0	100,0	55,0	999	
Lieu d'accouchement											
Établissement de santé	25,8	30,6	8,6	8,8	0,7	6,8	18,8	100,0	73,7	4 680	
Ailleurs	1,8	3,8	1,4	2,6	2,8	1,0	86,5	100,0	9,7	822	
Résidence											
Cotonou	35,2	30,4	7,9	7,6	1,0	4,4	13,6	100,0	81,0	242	
Autres villes	22,3	29,1	8,0	7,1	1,1	6,5	25,9	100,0	66,4	1 863	
Ensemble urbain	23,8	29,2	8,0	7,1	1,1	6,3	24,5	100,0	68,1	2 105	
Rural	21,2	24,9	7,3	8,3	1,0	5,7	31,7	100,0	61,6	3 397	
Département											
Alibori	27,6	16,6	5,5	15,6	0,6	4,3	29,8	100,0	65,3	766	
Atacora	0,7	13,4	7,5	11,5	3,0	3,0	60,8	100,0	33,1	499	
Atlantique	37,8	16,4	9,7	2,5	0,4	9,5	23,7	100,0	66,4	595	
Borgou	13,2	20,1	1,7	2,2	0,8	10,5	51,6	100,0	37,1	730	
Collines	22,3	28,2	10,9	11,5	0,4	5,9	20,7	100,0	73,0	353	
Couffo	22,2	34,3	1,9	4,0	1,5	2,8	33,3	100,0	62,4	375	
Donga	8,9	36,7	13,2	11,0	1,3	10,2	18,7	100,0	69,8	391	
Littoral	35,2	30,4	7,9	7,6	1,0	4,4	13,6	100,0	81,0	242	
Mono	12,7	36,0	8,3	13,2	1,6	2,3	25,8	100,0	70,2	225	
Ouémé	22,1	31,0	15,7	6,9	0,9	5,7	17,7	100,0	75,7	479	
Plateau	15,7	44,7	11,4	6,8	1,8	4,6	15,0	100,0	78,7	340	
Zou	42,3	38,7	3,2	4,1	0,2	3,0	8,5	100,0	88,3	508	
Niveau d'instruction de la mère											
Aucun	20,2	24,1	6,9	8,3	1,2	5,6	33,8	100,0	59,4	3 458	
Primaire	23,9	30,6	8,4	7,0	0,9	7,1	22,2	100,0	69,9	1 036	
Secondaire 1 ^{er} cycle	25,5	31,4	9,5	7,7	1,1	6,5	18,2	100,0	74,2	731	
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	31,7	29,4	7,3	6,2	0,0	4,5	21,0	100,0	74,5	277	
Quintiles de bien-être économique											
Le plus bas	14,4	16,8	5,0	8,7	1,2	5,2	48,7	100,0	44,9	1 153	
Second	22,5	26,1	8,0	7,3	1,0	4,4	30,7	100,0	64,0	1 139	
Moyen	20,8	28,4	8,3	9,5	1,2	6,5	25,3	100,0	67,0	1 134	
Quatrième	23,2	31,3	7,7	6,9	0,8	7,8	22,3	100,0	69,0	1 097	
Le plus élevé	31,4	31,2	8,9	6,5	1,0	5,8	15,2	100,0	78,0	979	
Ensemble	22,2	26,6	7,5	7,8	1,0	5,9	28,9	100,0	64,1	5 502	

¹ Sont inclus les nouveau-nés qui ont eu un examen postnatal dispensé par un médecin, une infirmière, une sage-femme, un agent de santé communautaire ou une accoucheuse traditionnelle.

² Y compris les nouveau-nés qui ont eu un examen après la première semaine.

Tableau 8.12 Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal au nouveau-né

Répartition (en %) des naissances vivantes les récentes ayant eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête par type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal au nouveau-né dans les 2 jours après la naissance, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal au nouveau-né				Pas d'examen postnatal au cours des 2 jours après la naissance	Total	Effectif de naissances
	Médecin/ infirmière/ sage-femme	Aide-soignante	Accoucheuse traditionnelle	Matrone			
Âge de la mère à la naissance							
<20	59,4	4,1	0,5	0,5	35,5	100,0	724
20-34	60,6	3,0	0,4	0,3	35,8	100,0	4 017
35-49	60,4	2,3	0,2	0,3	36,8	100,0	760
Rang de naissance							
1	64,6	3,5	0,1	0,4	31,4	100,0	1 228
2-3	61,4	3,2	0,5	0,2	34,6	100,0	1 971
4-5	61,8	2,6	0,3	0,4	35,0	100,0	1 304
6+	51,5	2,6	0,5	0,4	45,0	100,0	999
Lieu d'accouchement							
Établissement de santé	69,9	3,5	0,0	0,3	26,3	100,0	4 680
Ailleurs	6,3	0,4	2,4	0,6	90,3	100,0	822
Résidence							
Cotonou	75,2	5,3	0,0	0,5	19,0	100,0	242
Autres villes	62,9	3,3	0,1	0,1	33,6	100,0	1 863
Ensemble urbain	64,3	3,5	0,1	0,2	31,9	100,0	2 105
Rural	57,9	2,7	0,5	0,4	38,4	100,0	3 397
Département							
Alibori	57,1	6,4	1,5	0,2	34,7	100,0	766
Atacora	31,4	1,1	0,0	0,6	66,9	100,0	499
Atlantique	63,2	2,5	0,0	0,7	33,6	100,0	595
Borgou	32,9	3,4	0,7	0,1	62,9	100,0	730
Collines	70,7	2,0	0,2	0,0	27,0	100,0	353
Couffo	59,9	1,3	0,0	1,1	37,6	100,0	375
Donga	68,7	0,6	0,2	0,3	30,2	100,0	391
Littoral	75,2	5,3	0,0	0,5	19,0	100,0	242
Mono	59,0	11,2	0,0	0,0	29,8	100,0	225
Ouémé	73,9	1,3	0,0	0,4	24,3	100,0	479
Plateau	77,0	1,5	0,1	0,0	21,3	100,0	340
Zou	86,4	1,5	0,4	0,0	11,7	100,0	508
Niveau d'instruction de la mère							
Aucun	55,8	2,8	0,6	0,3	40,6	100,0	3 458
Primaire	65,8	3,3	0,1	0,7	30,1	100,0	1 036
Secondaire 1 ^{er} cycle	70,3	3,7	0,0	0,2	25,8	100,0	731
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	71,7	2,8	0,0	0,0	25,5	100,0	277
Quintiles de bien-être économique							
Le plus bas	40,8	2,5	1,0	0,5	55,1	100,0	1 153
Second	59,9	3,2	0,6	0,4	36,0	100,0	1 139
Moyen	63,0	3,3	0,2	0,5	33,0	100,0	1 134
Quatrième	65,3	3,7	0,0	0,1	31,0	100,0	1 097
Le plus élevé	75,5	2,5	0,0	0,1	22,0	100,0	979
Ensemble	60,4	3,0	0,4	0,3	35,9	100,0	5 502

Tableau 8.13 Contenu des examens postnatals dispensés aux nouveau-nés

Parmi les naissances vivantes les plus récentes ayant eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, pourcentage pour lesquelles on a effectué certains actes/conseils au cours des 2 premiers jours après la naissance et pourcentage pour lesquelles au moins deux actes /conseils ont été effectués dans les 2 premiers jours après la naissance, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Parmi les naissances vivantes les plus récentes ayant eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, pourcentage pour lesquelles on a effectué certains actes/conseils au cours des 2 premiers jours après la naissance :						Pourcentage pour lesquelles on a effectué au moins deux actes/ conseils au cours des 2 premiers jours après la naissance	Effectif de naissances
	Examen du cordon	Prise de la température	Counseling sur les signes de danger	Counseling sur l'allaitement	Observation de l'allaitement	Pesé ¹		
Âge de la mère à la naissance								
<20	44,9	46,1	38,7	46,5	40,4	67,6	58,6	724
20-34	46,6	48,7	39,0	46,5	40,7	66,3	59,0	4 017
35-49	42,4	46,1	36,4	41,8	33,5	66,8	52,4	760
Rang de naissance								
1	48,0	51,6	43,6	52,3	46,1	72,4	63,7	1 228
2-3	47,5	48,5	39,3	46,8	40,9	67,9	59,3	1 971
4-5	46,5	48,4	38,1	45,4	38,4	64,0	57,1	1 304
6+	38,8	42,0	31,9	36,9	31,0	60,1	49,7	999
Lieu d'accouchement								
Établissement de santé	49,7	53,0	42,3	50,7	43,7	76,7	64,0	4 680
Ailleurs	23,3	19,6	17,5	18,5	16,4	8,6	23,8	822
Résidence								
Cotonou	65,3	71,7	56,2	66,3	58,2	90,9	77,3	242
Autres villes	46,2	51,0	41,4	49,5	44,5	71,6	61,0	1 863
Ensemble urbain	48,4	53,4	43,1	51,4	46,1	73,8	62,9	2 105
Rural	44,2	44,7	35,8	42,4	35,7	62,1	55,0	3 397
Département								
Alibori	43,6	34,8	35,9	36,7	29,8	46,4	44,5	766
Atacora	18,8	32,8	17,8	19,5	12,3	55,7	36,9	499
Atlantique	52,8	57,2	43,2	59,1	55,1	84,3	70,7	595
Borgou	35,4	37,0	35,4	32,2	27,9	45,4	40,7	730
Collines	47,0	51,2	44,3	48,7	41,4	84,0	58,8	353
Couffo	45,6	33,8	27,4	40,4	30,0	54,7	53,0	375
Donga	48,6	57,8	50,2	50,9	40,7	70,8	63,3	391
Littoral	65,3	71,7	56,2	66,3	58,2	90,9	77,3	242
Mono	46,8	47,9	40,9	48,1	44,2	76,4	57,5	225
Ouémé	52,0	52,9	28,0	45,3	41,4	81,8	72,6	479
Plateau	58,4	59,0	50,1	67,9	55,9	56,0	74,7	340
Zou	55,4	65,5	51,0	62,9	61,9	87,3	74,4	508
Niveau d'instruction de la mère								
Aucun	42,0	43,8	34,7	40,2	35,0	58,2	52,7	3 458
Primaire	52,2	55,1	44,1	54,3	45,2	75,4	67,0	1 036
Secondaire 1 ^{er} cycle	52,6	54,4	46,6	56,2	49,6	83,4	66,9	731
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	50,7	57,1	45,8	57,9	51,2	93,8	67,9	277
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	32,7	33,7	24,7	28,3	22,2	42,4	41,0	1 153
Second	41,9	44,0	35,8	41,7	34,4	62,6	53,7	1 139
Moyen	48,4	49,6	42,1	48,9	42,0	69,0	60,9	1 134
Quatrième	52,2	54,2	43,4	53,6	49,4	75,1	65,6	1 097
Le plus élevé	55,5	60,7	48,9	59,3	52,7	87,2	71,3	979
Ensemble	45,8	48,0	38,6	45,9	39,7	66,6	58,0	5 502

¹ Concerne les nouveau-nés qui ont été pesés « à la naissance ». Il se peut que certains nouveau-nés pesés au cours des 2 jours après la naissance aient été exclus.

Tableau 8.14 Problèmes d'accès aux soins de santé

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont déclaré qu'elles avaient des problèmes importants d'accès aux soins de santé quand elles étaient malades, par type de problèmes, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Problèmes d'accès aux soins de santé					Effectif de femmes
	Obtenir la permission d'aller se faire soigner	Obtenir l'argent pour se faire soigner	Distance jusqu'à l'établissement de santé	Ne veut pas s'y rendre seule	Au moins un problème d'accès aux soins de santé	
Groupe d'âges						
15-19	25,2	50,4	30,1	25,7	58,6	3 350
20-34	22,2	53,0	31,5	18,6	60,1	8 111
35-49	19,7	55,8	31,3	17,5	62,1	4 467
Nombre d'enfants vivants						
0	22,7	48,8	28,4	23,5	57,0	4 244
1-2	21,1	51,2	29,5	18,0	57,8	4 464
3-4	22,1	54,6	31,1	17,6	61,7	3 863
5+	22,8	60,0	36,8	19,8	66,6	3 357
État matrimonial						
Célibataire	22,3	50,4	27,5	24,2	58,1	3 889
En union	22,6	53,1	32,4	18,2	60,3	11 168
En rupture d'union	15,3	68,0	31,4	20,0	71,6	871
Emploi dans les 12 derniers mois						
Ne travaillait pas	20,7	44,8	28,6	19,7	52,3	3 525
Travaillait et était payée en argent	22,2	56,6	31,5	18,3	63,7	9 676
Travaillait et n'était pas payée en argent	23,8	52,4	33,0	25,0	59,0	2 727
Résidence						
Cotonou	10,6	39,0	12,8	12,7	47,3	958
Autres villes	21,1	51,0	27,1	17,9	57,5	5 803
Ensemble urbain	19,6	49,3	25,1	17,2	56,1	6 761
Rural	24,0	56,2	35,6	21,6	63,5	9 167
Département						
Alibori	43,8	38,7	36,8	22,9	47,6	1 878
Atacora	22,6	59,4	45,5	38,9	71,9	1 302
Atlantique	10,9	57,7	27,6	19,2	66,5	2 037
Borgou	36,4	58,7	48,1	22,0	63,2	1 839
Collines	3,6	50,9	13,2	6,5	54,3	1 151
Couffo	11,2	48,7	24,3	8,5	53,1	1 041
Donga	12,5	39,0	31,4	13,4	49,7	881
Littoral	10,6	39,0	12,8	12,7	47,3	958
Mono	35,9	68,7	35,2	23,1	73,8	759
Ouémé	26,1	61,7	25,9	14,4	64,0	1 507
Plateau	29,0	71,0	48,2	30,3	76,1	970
Zou	12,5	48,5	18,8	20,3	58,4	1 606
Niveau d'instruction						
Aucun	26,2	56,8	37,0	20,9	63,9	8 785
Primaire	18,2	56,1	27,8	19,2	61,7	3 148
Secondaire 1 ^{er} cycle	18,4	46,4	22,8	18,9	54,2	2 847
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	10,5	35,4	16,7	14,6	44,8	1 147
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	33,1	61,4	51,5	28,8	70,1	2 735
Second	25,4	59,1	35,9	20,7	65,1	3 030
Moyen	22,0	55,6	32,6	19,7	63,5	3 104
Quatrième	19,8	53,9	25,7	18,1	59,4	3 405
Le plus élevé	13,5	39,6	15,9	13,8	47,4	3 654
Ensemble	22,1	53,3	31,1	19,8	60,4	15 928

Résultats clés

- **Vaccination** : Plus d'un enfant de 12-23 mois sur 2 (57 %) ont reçu tous les vaccins de base.
- **Symptômes d'IRA** : Au cours des deux semaines ayant précédé l'interview, 3 % des enfants de moins de 5 ans ont présenté des symptômes d'IRA. Pour 46 % de ces enfants, des conseils ou un traitement ont été recherchés.
- **Fièvre** : Au cours des deux semaines ayant précédé l'interview, 19 % des enfants de moins de 5 ans ont eu de la fièvre. Des conseils ou traitement ont été recherchés pour 53 % de ces enfants.
- **Diarrhée** : Au cours des deux semaines ayant précédé l'enquête, 10 % des enfants de moins de 5 ans ont eu la diarrhée. Des conseils ou traitement ont été recherchés pour 43 % de ces enfants. Dans 37 % des cas, les enfants ayant eu la diarrhée ont reçu une TRO mais dans 31 % des cas, les enfants n'ont reçu aucun traitement.
- **Évacuation des selles des enfants** : Les résultats montrent que dans 35 % des cas, on s'est débarrassé de manière hygiénique des dernières selles des enfants les plus jeunes de moins de 2 ans qui vivaient avec leur mère.

Les données sur la santé et la survie des enfants peuvent aider les décideurs et les responsables de programmes à évaluer l'efficacité des stratégies actuelles, à élaborer des interventions appropriées pour prévenir les décès causés par les maladies infantiles et améliorer la santé des enfants au Bénin.

Ce chapitre présente les résultats concernant le poids à la naissance et la couverture vaccinale des jeunes enfants. Les données sur la prévalence et les traitements des trois maladies infantiles les plus courantes comme les symptômes d'infections respiratoires aiguës (IRA), la fièvre et la diarrhée y sont aussi analysées. En outre, étant donné l'importance des pratiques hygiéniques appropriées dans la prévention et la réduction des maladies diarrhéiques, le chapitre présente également les résultats sur l'évacuation des selles des enfants.

9.1 POIDS A LA NAISSANCE

Faible poids à la naissance

Pourcentage de naissances dont le poids déclaré à la naissance est inférieur 2,5 kg sans tenir compte de l'âge gestationnel.

Échantillon : Naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête pour lesquelles on dispose d'un poids à la naissance, soit basée sur un enregistrement écrit, soit basé sur la déclaration de la mère.

D'après les carnets ou les déclarations de la mère, le poids à la naissance des enfants n'est connu que dans 60 % des cas, soit six enfants sur dix. Pour les naissances dont on connaît le poids, 12 % sont de faible poids à la naissance (**Tableau 9.1**).

Tendances : Entre 2006 et 2017-2018, le pourcentage d'enfants pour lesquels on dispose d'un poids à la naissance a peu varié, passant de 59 % à 60 %. Il en est de même du pourcentage de naissances dont le poids est inférieur à 2,5kg qui est passé de 13 % à 12 % dans la même période.

Variations par caractéristique

- Le pourcentage de naissances de faible poids diminue avec l'âge de la mère à la naissance de l'enfant, de 18 % lorsque la mère a moins de 20 ans à 11 % lorsqu'elle a plus de 20 ans.
- Le pourcentage de naissances de faible poids est plus élevé quand la mère fume des cigarettes que quand elle n'en fume pas (18 %, contre 12 %).
- Les résultats selon le département montrent que c'est le Mono qui présente le plus faible pourcentage d'enfants pesant moins de 2,5 kg à la naissance (7 %), et les départements de l'Atacora le niveau le plus élevé (18 %) suivi par l'Alibori (17 %).

9.2 VACCINATION DES ENFANTS

Couverture de tous les vaccins de base

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu des vaccins spécifiques à n'importe quel moment avant l'enquête (selon le carnet de vaccination ou la déclaration de la mère). On considère qu'un enfant a reçu tous les vaccins de base, s'il a reçu au moins :


- Une dose du vaccin BCG qui protège contre la tuberculose
- Trois doses de vaccin DTC qui protège contre la diphtérie, le tétanos la coqueluche
- Trois doses de vaccin contre la polio
- Une dose de vaccin contre la rougeole

Échantillon : Enfants vivants de 12-23 mois

Au Bénin, 57 % des enfants de 12-23 mois ont reçu tous les vaccins de base à n'importe quel moment avant l'enquête et 51 % ont reçu tous les vaccins appropriés pour le groupe d'âge (**Tableau 9.2**); Par contre, 11 % des enfants de 12-23 mois n'ont reçu aucun vaccin à n'importe quel moment avant l'enquête (**Graphique 9.1**).

Graphique 9.1 Vaccinations infantiles

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois vaccinés à n'importe quel moment avant l'enquête




Tendances : Comparativement à l'EDSB-IV, la couverture vaccinale de base chez les enfants de 12-23 mois a augmenté de près de 10 points de pourcentage, passant de 48 % en 2011-2012 à 57 % en 2017-2018 (**Graphique 9.2**).

Variations par caractéristique

- Quel que soit le vaccin et la dose, on constate que le pourcentage d'enfants vaccinés diminue avec le rang de naissance (**Tableau 9.3**).
- La couverture vaccinale de base est plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural (60 % contre 54 %) (**Graphique 9.3**).
- La proportion d'enfants ayant reçu tous les vaccins appropriés est plus élevée dans le groupe d'âges 12-23 mois (51 %) que dans le groupe d'âge 24-35 mois (47 %).


Graphique 9.2 Tendances de la couverture vaccinale

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu tous les vaccins de base à n'importe quel moment avant l'enquête



Graphique 9.3 Couverture vaccinale par résidence

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu tous les vaccins de base à n'importe quel moment avant l'enquête



- On observe des écarts entre les départements : la proportion d'enfants ayant reçu tous les vaccins de base varie de 29 % dans le Plateau à 71 % dans l'Ouémé, l'Atacora et le Mono (**Graphique 9.4**).
- La couverture vaccinale de base des enfants de 12-23 mois varie avec le niveau d'instruction de la mère : quand la mère n'a aucun niveau d'instruction, 15 % des enfants n'ont reçu aucun vaccin contre 5 % quand la mère a le niveau secondaire 2^d cycle ou plus.

9.2.1 Possession et disponibilité d'un carnet de vaccination

Le carnet de vaccination est un document important pour s'assurer que l'enfant a bien reçu tous les vaccins recommandés. Au Bénin, 90 % des enfants de 12-23 mois et 87 % des enfants de 24-35 mois ont déjà eu un carnet de vaccination. Par contre, les pourcentages avec un carnet de vaccination qui a été vu sont respectivement de 72 % et de 64 % (**Tableau 9.4**).

9.3 SYMPTOMES D'INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS

Les infections respiratoires aiguës, et particulièrement la pneumonie, constituent l'une des premières causes de mortalité des enfants dans les pays en développement. Pour évaluer la prévalence de ces infections chez les enfants, on a demandé aux enquêtées si leurs enfants avaient souffert de la toux pendant les deux semaines ayant précédé l'interview.

Dans le cas d'une réponse positive, on a demandé si cette toux avait été accompagnée d'une respiration courte et rapide, et si ces difficultés respiratoires étaient dues à un problème de bronches (symptômes caractéristiques d'IRA). Pour les enfants qui avaient présenté des symptômes d'IRA au cours de cette période, on a demandé s'ils avaient été conduits en consultation ou si des conseils ou un traitement avaient été recherchés.

Traitement des infections respiratoires aiguës (IRA)

Enfants avec des symptômes d'IRA pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement. Les symptômes d'IRA comprennent une respiration courte et rapide associée à des problèmes dans la poitrine, et/ou de difficultés respiratoires associées à des problèmes dans la poitrine.


Échantillon : Enfants de moins de 5 ans ayant présenté des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview.

Parmi les enfants de moins de 5 ans, 3 % ont présenté des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines qui ont précédé l'interview (**Tableau 9.5**).

Pour 46 % des enfants de moins de 5 ans, des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès d'un prestataire de santé. Cependant, dans seulement 16 % des cas, les conseils ou le traitement ont été recherchés le jour même ou le jour suivant l'apparition des symptômes. Des conseils ou un traitement ont été recherchés

Graphique 9.4 Couverture vaccinale par département

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu tous les vaccins de base à n'importe quel moment avant l'enquête



pour un peu moins de la moitié (46 %) des enfants ayant présenté des symptômes d'IRA dans le secteur public de santé (Tableau 9.6).

9.4 FIEVRE

Traitement de la fièvre

Enfants avec de la fièvre pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement.

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview

Pour estimer la prévalence de la fièvre, on a demandé aux mères si leurs enfants de moins de 5 ans avaient eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview. Au Bénin, 19 % des enfants de moins de 5 ans ont eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview (Tableau 9.7).

9.5 MALADIES DIARRHEIQUES

9.5.1 Prévalence de la diarrhée


Au Bénin, 10 % des enfants de moins de 5 ans ont eu, au moins, un épisode de diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview. Pour 43 % de ces enfants, des conseils ou un traitement ont été recherchés (Tableau 9.8).

Variations par caractéristique

- C'est dans les groupes d'âges 6-11 mois et 12-23 mois que la prévalence de la diarrhée demeure la plus élevée (soit respectivement 18 % et 16 %) (Graphique 9.5).
- La prévalence de la diarrhée ne varie pas entre le milieu rural (11 %) et le milieu urbain (10 %).
- Les résultats selon le département montrent que la prévalence de la diarrhée est plus importante dans l'Atacora (20 %), la Donga (14 %) et le Plateau (14 %) que dans le Zou (5 %) et le Borgou (7 %) (Tableau 9.8).

Graphique 9.5 Prévalence de la diarrhée par âge

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines avant l'enquête



9.5.2 Traitement de la diarrhée

Thérapie de réhydratation par voie orale


Enfants avec diarrhée à qui on a augmenté les quantités de liquides ou à qui on a donné des liquides préparés à partir de sachets spéciaux de sels de réhydratation orale (SRO) ou des liquides préparés à partir de solution maison recommandée (SMR) par le gouvernement.

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'enquête.

Le **Tableau 9.9** présente les proportions d'enfants de moins de 5 ans à qui on a donné divers traitements contre la diarrhée. Dans 37 % des cas, on a administré aux enfants malades une TRO, (soit des SRO, des SMR, ou une augmentation des liquides). En outre, seulement 17 % des enfants ayant eu la diarrhée ont reçu du zinc, et 11 % ont reçu une association de SRO et de zinc (**Graphique 9.6**).

Graphique 9.6 Traitement de la diarrhée

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines avant l'interview



9.5.3 Pratiques alimentaires

Pratiques alimentaires appropriées

Enfants avec diarrhée à qui on a donné plus de liquides que d'habitude et la même quantité de nourriture ou plus que d'habitude.


Échantillon : Enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'enquête

Au cours des épisodes diarrhéiques, il est recommandé de donner plus de liquides et d'aliments à l'enfant. Cependant, au Bénin les résultats montrent que seulement 16 % des enfants ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview ont reçu plus de liquides que ce qu'ils ont l'habitude de prendre. Parmi ces enfants ayant souffert de diarrhée, environ un sur deux a reçu moins de liquides qu'à l'accoutumée : 35 % en ont reçu un peu moins mais 15 % en ont reçu beaucoup moins. En outre, dans 6 % des cas, les enfants n'ont pas reçu de liquides (**Tableau 9.10**).

Concernant la prise d'aliments, on constate qu'un peu plus de deux enfants ayant eu la diarrhée sur cinq (42 %) ont été nourris conformément aux recommandations. Ces enfants ont reçu, soit la même quantité de nourriture (33 %), soit davantage (9 %). Par contre, pour près de la moitié des enfants, l'alimentation a été réduite (49 %) : dans 37 % des cas, les enfants en ont reçu un peu moins que la quantité habituelle mais dans 12 % des cas, ils en ont reçu beaucoup moins (**Graphique 9.7**).

Graphique 9.7 Pratiques alimentaires pendant la diarrhée

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines avant l'enquête



Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100 % en raison de l'arrondissement.

Le **Tableau 9.9** présente des informations plus détaillées sur les pratiques alimentaires des enfants pendant la diarrhée.

9.5.4 Sources des conseils ou traitement

Le **Tableau 9.11** présente les pourcentages d'enfants qui ont eu la diarrhée pendant la période de référence selon la source du traitement. Les données sont présentées pour 3 catégories d'enfants : ceux ayant eu la diarrhée, ceux pour lesquels on a recherché un traitement ou des conseils et ceux ayant eu la diarrhée et qui ont été traités avec des SRO.

Quelle que soit la catégorie d'enfants, les résultats montrent que c'est au secteur public, notamment dans les centres de santé du gouvernement (38 %) que se sont principalement adressées les enquêtées pour obtenir des conseils ou un traitement pour soigner les enfants ayant eu la diarrhée.


9.5.5 Connaissance des sachets de SRO

Au Bénin, près de sept femmes de 15-49 ans sur dix (70 %) ayant eu une naissance vivante au cours des 5 années ayant précédé l'enquête connaissent les sachets de SRO ou les liquides SRO préconditionnés (**Tableau 9.12**). Ce pourcentage est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural (77 % contre 66 %). Le niveau de connaissance concernant les sachets SRO préconditionnés varie avec le niveau d'instruction des femmes. En effet, il passe de 65 % parmi celles qui n'ont aucun niveau d'instruction à 94 % parmi celle qui ont un niveau secondaire 2^d cycle ou plus supérieur.

9.6 TRAITEMENT DES MALADIES INFANTILES

Les résultats de l'EDSB-V 2017-2018 montrent que c'est la fièvre qui a le plus affecté les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview (19 % contre 3 % pour les IRA et 10 % pour la diarrhée). C'est pour les enfants qui ont eu de la fièvre que l'on a le plus fréquemment recherché des conseils ou un traitement (53 % contre respectivement 46 % et 43 %) (**Graphique 9.8**).

Graphique 9.8 Prévalence et traitement des maladies infantiles



9.7 ÉVACUATION DES SELLES DES ENFANTS

Évacuation appropriée des selles des enfants

Les selles de l'enfant le plus jeune ont été jetées ou rincées dans les toilettes ou les latrines, ou enterrées, ou l'enfant a utilisé les toilettes ou les latrines.

Échantillon : le plus jeune enfant de moins de 2 ans vivant avec sa mère

Le respect des règles d'hygiène lors de l'évacuation des selles des enfants évite la propagation de certaines maladies comme le choléra, l'amibiase etc. Au Bénin, le pourcentage d'enfants dont on s'est débarrassé des selles de manière hygiénique est de 35 % (**Tableau 9.13**).

Variations par caractéristique

- Le pourcentage d'enfants dont les mères se sont débarrassées des selles de manière hygiénique est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural (48 % contre 27 %).

- Les départements du Littoral (69 %) et du Zou (55 %) enregistrent les proportions les plus élevées d'enfants dont les mères se sont débarrassées des selles de manière hygiénique. Par contre, avec seulement 7 %, c'est dans l'Atacora que l'on observe la proportion la plus faible.
- La proportion d'enfants dont on s'est débarrassé des selles de manière hygiénique est plus élevée dans le quintile de bien-être économique le plus élevé (75 %) que dans le quintile de bien être le plus bas (13 %).

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur le faible poids à la naissance, les vaccinations, les maladies infantiles et l'évacuation des selles des enfants, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 9.1** Taille et poids de l'enfant à la naissance
- **Tableau 9.2** Vaccinations par source d'information
- **Tableau 9.3** Vaccinations par caractéristique sociodémographique
- **Tableau 9.4** Possession et observation des carnets de vaccination, selon certaines caractéristiques sociodémographiques
- **Tableau 9.5** Prévalence et traitement des symptômes d'IRA
- **Tableau 9.6** Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant présenté des symptômes d'IRA
- **Tableau 9.7** Prévalence et traitement de la fièvre
- **Tableau 9.8** Prévalence et traitement de la diarrhée
- **Tableau 9.9** Thérapie de Réhydratation par voie orale, supplémentation en zinc et administration d'autres traitements contre la diarrhée
- **Tableau 9.10** Pratiques alimentaires durant la diarrhée
- **Tableau 9.11** Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant eu la diarrhée
- **Tableau 9.12** Connaissance des sachets SRO ou des liquides SRO préconditionnés
- **Tableau 9.13** Évacuation des selles des enfants

Tableau 9.1 Taille et poids de l'enfant à la naissance

Répartition (en %) des naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête selon l'estimation, par la mère, de la grosseur de l'enfant à la naissance, pourcentage des naissances vivantes des 5 années ayant précédé l'enquête pour lesquelles un poids à la naissance a été déclaré et parmi les naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête dont on connaît le poids à la naissance, pourcentage qui pèse moins de 2,5 kg, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Répartition (en %) des naissances vivantes par grosseur de l'enfant à la naissance				Total	Pourcentage de naissances pour lesquelles un poids à la naissance a été déclaré ¹	Effectif de naissances	Parmi les naissances dont le poids à la naissance a été déclaré ¹	
	Très petit	Plus petit que la moyenne	Moyen ou plus gros que la moyenne	Ne sait pas/manquant				Pourcentage pesant moins de 2,5 kg	Effectif de naissances
Âge de la mère à la naissance									
<20	5,1	13,1	79,5	2,3	100,0	57,7	1 747	18,1	1 007
20-34	3,4	10,8	84,0	1,7	100,0	60,9	10 007	10,7	6 094
35-49	3,3	9,4	85,2	2,1	100,0	60,0	1 890	10,8	1 134
Rang de naissance									
1	3,8	12,5	82,1	1,7	100,0	64,7	3 005	15,6	1 944
2-3	3,3	10,3	84,6	1,8	100,0	62,0	4 930	11,3	3 056
4-5	3,6	10,1	84,5	1,8	100,0	59,7	3 206	8,8	1 914
6+	4,1	11,2	82,3	2,4	100,0	52,8	2 502	10,4	1 321
Statut tabagique de la mère									
Fume cigarettes/tabac	1,7	20,4	74,1	3,8	100,0	47,0	227	17,5	107
Ne fume pas	3,7	10,7	83,8	1,8	100,0	60,6	13 416	11,5	8 129
Résidence									
Cotonou	4,6	9,9	84,6	0,8	100,0	85,4	579	10,7	495
Autres villes	3,5	11,5	83,1	1,9	100,0	65,8	4 677	11,1	3 078
Ensemble urbain	3,6	11,3	83,3	1,8	100,0	68,0	5 256	11,0	3 573
Rural	3,6	10,6	83,8	1,9	100,0	55,6	8 387	12,0	4 662
Département									
Alibori	5,6	5,2	86,2	3,0	100,0	36,4	1 831	17,1	666
Atacora	6,8	9,0	81,5	2,8	100,0	46,7	1 216	18,1	568
Atlantique	3,6	16,7	78,0	1,6	100,0	75,8	1 568	11,3	1 189
Borgou	2,1	18,2	76,5	3,2	100,0	38,6	1 784	12,7	689
Collines	1,3	6,2	92,1	0,4	100,0	83,6	869	10,9	726
Couffo	5,7	7,7	85,0	1,6	100,0	49,4	902	8,0	445
Donga	1,3	4,3	93,3	1,1	100,0	63,0	926	12,6	584
Littoral	4,6	9,9	84,6	0,8	100,0	85,4	579	10,7	495
Mono	3,8	18,2	75,1	2,9	100,0	71,1	613	7,4	436
Ouémé	4,1	15,1	79,1	1,7	100,0	71,6	1 197	9,1	857
Plateau	2,7	10,5	86,0	0,9	100,0	54,5	860	11,6	468
Zou	1,4	7,1	90,9	0,6	100,0	85,7	1 299	10,0	1 112
Niveau d'instruction de la mère									
Aucun	4,0	10,4	83,4	2,2	100,0	52,4	8 964	12,0	4 699
Primaire	2,5	11,9	84,1	1,5	100,0	70,6	2 486	10,1	1 755
Secondaire 1 ^{er} cycle	3,5	11,9	83,9	0,8	100,0	78,0	1 619	12,3	1 262
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	2,6	12,4	84,1	0,9	100,0	90,4	574	11,5	519
Quintiles de bien-être économique									
Le plus bas	4,0	12,1	81,3	2,6	100,0	37,3	2 922	12,0	1 090
Second	4,8	9,9	82,9	2,4	100,0	54,9	2 811	13,4	1 544
Moyen	3,5	9,8	84,8	1,9	100,0	62,8	2 749	11,2	1 727
Quatrième	3,0	11,6	83,8	1,6	100,0	68,9	2 738	11,7	1 887
Le plus élevé	2,6	11,1	85,6	0,6	100,0	82,0	2 423	10,3	1 987
Ensemble	3,6	10,9	83,6	1,9	100,0	60,4	13 643	11,6	8 235

¹ Basé soit sur un enregistrement écrit, soit sur la déclaration de la mère.

Tableau 9.2 Vaccinations par source d'information

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois et d'enfants de 24-35 mois qui ont reçu certains vaccins à n'importe quel moment avant l'enquête, par source d'information (carnet de vaccination ou déclaration de la mère) et pourcentage qui ont reçu certains vaccins à l'âge approprié, EDSB-V Bénin 2017-2018

Vaccin	Enfants de 12-23 mois				Enfants de 24-35 mois			
	Carnet de vaccination ¹	Déclaration de la mère	Les deux sources	Vacciné à l'âge approprié ^{2,3}	Carnet de vaccination ¹	Déclaration de la mère	Les deux sources	Vacciné à l'âge approprié ^{2,3}
BCG	69,2	19,0	88,2	88,1	62,1	23,4	85,5	84,6
DTC-HepB-Hib								
1	66,3	18,0	84,2	84,0	59,9	22,5	82,4	81,1
2	63,7	14,6	78,3	77,9	57,3	18,6	75,9	74,7
3	60,5	12,5	73,0	72,2	54,4	16,7	71,2	69,6
Polio								
0 (dose naissance)	68,6	17,8	86,5	86,3	61,6	21,1	82,7	81,9
1	66,5	15,7	82,2	81,9	60,3	20,1	80,4	79,1
2	63,8	13,3	77,1	76,7	57,3	17,4	74,7	73,7
3	60,4	5,1	65,5	64,8	54,3	7,3	61,6	60,0
Pneumocoque								
1	63,6	17,6	81,2	80,9	57,1	21,8	78,9	77,6
2	61,3	14,6	75,9	75,4	54,5	18,2	72,7	71,7
3	58,3	12,5	70,8	69,9	51,9	16,3	68,1	66,2
Vaccin anti-rougeoleux	53,4	14,6	67,9	64,5	47,9	18,9	66,8	61,0
Fièvre jaune	50,3	13,9	64,2	61,0	45,1	17,8	62,9	57,3
Tous les vaccins de base⁴	52,3	4,3	56,6	53,7	47,1	6,0	53,1	48,3
Tous les vaccins appropriés pour le groupe d'âges⁵	47,6	3,7	51,3	48,8	42,3	5,0	47,3	42,5
Aucun vaccin	2,1	8,8	10,9	na	1,6	11,3	12,9	na
Effectif d'enfants	1 797	718	2 515	2 515	1 517	849	2 365	2 365

na = Non applicable

BCG = Bacille Calmette-Guérin

DTC = Diphtérie-tétanos-coqueluche

HepB = Hépatite B

Hib = Haemophilus influenzae type b

¹ Carnet, carte de vaccination, livret ou autre enregistrement écrit

² Reçu avant l'âge de 12 mois

³ Pour les enfants dont les informations sur la vaccination sont basées sur la déclaration de la mère, la date de la vaccination n'est pas collectée. On considère que les proportions de vaccins données au cours de la première et de la deuxième année sont les mêmes que pour les enfants possédant un enregistrement écrit des vaccins.

⁴ BCG, 3 doses de DTC-HepB-Hib, 3 doses du vaccin oral contre la polio (non compris le vaccin contre la polio donnée à la naissance) et 1 dose de vaccin anti-rougeoleux.

⁵ BCG, 3 doses de DTC-HepB-Hib, 4 doses du vaccin oral contre la polio, 3 doses du vaccin contre le pneumocoque, 1 dose de vaccin anti-rougeoleux et 1 dose de vaccin contre la fièvre jaune.

Tableau 9.3. Vaccinations par caractéristique sociodémographique

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois et de 24-35 mois qui ont reçu certains vaccins à n'importe quel moment avant l'enquête (selon le carnet de vaccination ou la déclaration de la mère) pourcentage ayant reçu tous les vaccins de base et pourcentage ayant reçu tous les vaccins appropriés pour le groupe d'âges, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSD-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Enfants de 12-23 mois											Enfants de 24-35 mois						
	DTC-HepB-Hib					Polio ¹			Pneumocoque			Vaccin anti-rougeoleux		Tous les vaccins appropriés pour le groupe d'âges ²		Tous les vaccins appropriés pour le groupe d'âges ⁴		
	1	2	3	0 (dose manquante)	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Aucun	Effectif d'enfants	Aucun	Effectif d'enfants	
Sexe																		
Masculin	89,0	84,9	78,7	73,5	87,1	82,5	77,1	66,4	82,3	76,3	71,5	70,1	70,1	58,8	1 280	10,0	47,3	1 156
Féminin	87,4	83,6	78,0	72,5	85,8	81,9	77,2	64,7	80,1	75,4	70,1			54,4	1 234	11,8	47,3	1 209
Rang de naissance																		
1	93,1	88,9	82,9	77,1	90,6	87,4	81,3	68,5	84,0	78,8	73,7	71,1	71,1	58,7	579	6,6	48,6	501
2-3	88,0	84,5	78,2	74,5	86,5	81,6	76,7	66,3	82,3	76,5	72,7	68,7	68,7	57,7	903	10,7	48,7	890
4-5	86,7	82,1	76,7	71,5	85,0	80,6	75,9	65,1	80,3	74,9	70,7	67,3	67,3	55,6	605	12,1	48,5	562
6+	84,1	80,5	74,7	66,6	82,8	78,6	74,1	60,6	76,5	71,9	63,1	62,8	62,8	53,0	427	15,3	41,0	413
Carnet de vaccination⁵																		
Vu	96,8	92,7	89,2	84,7	96,1	93,0	89,3	84,6	89,0	85,7	81,5	74,7	74,7	73,2	1 797	2,9	66,0	1 517
Non vu/pas de carnet	66,6	63,0	51,2	43,9	62,4	55,1	46,6	17,9	61,8	51,1	43,9	51,0	51,0	15,0	718	30,8	13,9	849
Résidence																		
Cotonou	97,1	92,5	91,5	87,0	96,0	95,1	91,4	76,3	92,6	91,9	85,9	78,1	78,1	66,7	127	2,4	56,8	103
Autres villes	91,7	87,3	82,3	76,4	90,2	85,5	81,1	68,8	84,1	79,9	74,5	70,6	70,6	59,4	817	8,1	52,5	874
Ensemble urbain	92,4	88,0	83,5	77,8	91,0	86,8	82,5	69,8	85,3	81,5	76,1	71,6	71,6	60,4	944	7,4	53,0	976
Rural	85,7	82,0	75,2	70,2	83,7	79,4	73,9	63,0	78,8	72,5	67,6	65,7	65,7	54,3	1 571	13,0	43,4	1 389
Département																		
Alibori	83,1	77,8	70,4	65,9	82,0	73,4	69,9	57,8	64,9	58,9	55,2	58,4	58,4	47,2	320	16,2	30,4	286
Atacora	83,4	81,8	79,7	78,4	81,3	81,7	79,8	78,4	81,8	79,7	78,4	71,9	71,9	70,5	227	15,7	59,4	206
Atlantique	95,7	92,0	84,9	79,3	95,4	90,1	83,4	68,4	92,0	84,6	79,5	73,7	73,7	59,9	308	4,3	58,4	272
Borgou	73,0	69,4	59,9	54,0	71,8	64,6	59,9	50,1	67,5	59,0	53,5	54,2	54,2	40,7	346	22,8	30,5	314
Collines	98,1	93,7	88,7	86,9	88,7	90,9	88,0	79,6	94,2	88,9	87,6	81,4	81,4	68,2	156	1,9	57,6	149
Couffo	85,7	76,9	68,6	59,2	80,7	76,6	66,9	50,7	69,9	63,2	54,1	56,4	56,4	40,1	171	13,8	22,4	146
Donga	89,6	87,3	83,7	77,5	88,4	87,3	80,7	70,3	87,1	83,7	77,5	70,8	70,8	61,9	160	10,4	52,1	156
Littoral	97,1	92,5	91,5	87,0	96,0	95,1	91,4	76,3	92,6	91,9	85,9	78,1	78,1	66,7	127	2,4	56,8	103
Mono	97,0	95,2	91,4	87,9	97,0	91,4	89,3	74,2	95,2	92,3	88,9	86,5	86,5	70,6	97	3,0	55,6	123
Ouémé	96,6	95,0	90,8	83,4	96,0	93,9	90,0	75,6	94,2	90,6	82,7	80,7	80,7	71,0	221	3,4	65,0	213
Plateau	81,3	70,0	60,6	49,6	81,0	67,2	52,6	45,0	60,4	51,7	42,7	37,0	37,0	29,0	145	18,0	30,5	150
Zou	94,4	93,6	89,7	86,2	94,5	92,3	89,5	74,8	93,2	89,3	85,4	81,1	81,1	68,0	235	4,6	58,5	248
Niveau d'instruction de la mère																		
Aucun	84,3	79,4	73,1	66,9	82,5	77,5	71,9	60,9	76,1	70,6	64,6	62,1	62,1	51,9	1 604	14,5	43,6	1 519
Primaire	93,5	90,9	85,2	82,1	92,2	88,7	84,7	72,7	88,9	83,6	80,3	74,8	74,8	63,2	473	5,9	50,1	445
Secondaire 1 ^{er} cycle	97,4	95,6	91,2	85,0	94,9	93,1	88,5	73,5	91,6	87,1	82,2	80,9	80,9	65,1	312	2,3	57,7	308
Secondaire 2 nd cycle ou plus	94,5	93,0	87,8	87,2	93,9	90,5	87,4	78,5	91,3	86,0	85,5	84,3	84,3	70,7	126	4,9	61,1	92

À suivre...

Tableau 9.3—Suite

Caractéristique sociodémographique	Enfants de 12-23 mois											Enfants de 24-35 mois						
	DTC-HepB-Hib			Polio ¹			Pneumocoque			Vaccin anti- rouge- oleux	Tous les vaccins de base ²	Fièvre jaune	Tous les vaccins appro- priés pour le groupe d'âges ³	Aucun vaccin d'enfants	Effectif d'enfants	Tous les vaccins appro- priés pour le groupe d'âges ⁴	Effectif d'enfants	
	1	2	3	0 (dose nais- sance)	1	2	3	1	2	3								
Quintiles de bien-être économique																		
Le plus bas	72,4	67,6	55,4	70,3	64,6	58,9	49,9	64,1	56,6	52,8	52,9	42,6	48,4	37,3	25,0	51,2	33,7	508
Second	86,0	81,8	68,9	84,4	80,6	75,0	63,1	77,8	71,9	65,2	61,9	52,9	57,6	45,4	13,1	480	43,9	435
Moyen	92,1	88,2	77,7	89,6	86,9	81,2	71,2	85,5	80,9	76,2	73,2	61,8	70,0	57,0	7,5	568	48,8	479
Quatrième	94,3	91,2	84,5	92,5	87,3	82,2	69,9	87,7	82,0	76,4	72,2	60,5	68,7	55,4	5,5	498	51,7	510
Le plus élevé	96,8	93,1	85,8	96,3	92,1	89,3	73,9	91,7	88,8	84,1	79,9	65,7	77,0	61,8	2,7	456	59,9	433
Ensemble	88,2	84,2	73,0	86,5	82,2	77,1	65,5	81,2	75,9	70,8	67,9	56,6	64,2	51,3	10,9	2 515	47,3	2 365

Note : On considère que les enfants ont reçu le vaccin si le carnet de vaccination ou si la mère a déclaré que l'enfant l'avait reçu. Pour les enfants dont les informations sont basées sur la déclaration de la mère, la date de la vaccination n'est pas collectée. On suppose que les proportions de vaccinations données pendant la première et la deuxième année sont les mêmes que pour les enfants possédant un enregistrement écrit des vaccinations.

BCG = Bacille Calmette-Guérin

DTC = Diphtérie-tétanos-coqueluche

HepB = Hépatite B

Hib = Haemophilus influenzae type b

¹ Polio 0 est le vaccin contre la polio donnée à la naissance.

² BCG, 3 doses de DTC-HepB-Hib, 3 doses du vaccin oral contre la polio (non compris le vaccin contre la polio donné à la naissance) et 1 dose de vaccin anti-rougeoleux.

³ BCG, 3 doses de DTC-HepB-Hib, 4 doses du vaccin oral contre la polio, 3 doses du vaccin contre le pneumocoque, 1 dose de vaccin anti-rougeoleux et 1 dose de vaccin contre la fièvre jaune.

⁴ BCG, 3 doses de DTC-HepB-Hib, 4 doses du vaccin oral contre la polio, 3 doses du vaccin contre le pneumocoque, 1 dose de vaccin anti-rougeoleux et 1 dose de vaccin contre la fièvre jaune.

⁵ Carnet, carte de vaccination, livret ou autre enregistrement écrit

Tableau 9.4 Possession et observation des carnets de vaccination, selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois et d'enfants de 24-35 mois qui ont déjà eu un carnet de vaccination et pourcentage avec un carnet de vaccination qui a été vu, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Enfants de 12-23 mois			Enfants de 24-35 mois		
	Pourcentage ayant déjà eu un carnet de vaccination ¹	Pourcentage avec un carnet de vaccination qui a été vu ¹	Effectif d'enfants	Pourcentage ayant déjà eu un carnet de vaccination ¹	Pourcentage avec un carnet de vaccination qui a été vu ¹	Effectif d'enfants
Sexe						
Masculin	90,2	71,2	1 280	87,2	63,1	1 156
Féminin	89,3	71,7	1 234	87,5	65,1	1 209
Rang de naissance						
1	92,2	72,8	579	91,0	67,3	501
2-3	90,0	71,2	903	87,1	65,6	890
4-5	88,5	70,0	605	89,6	64,5	562
6+	88,0	72,3	427	80,3	56,6	413
Résidence						
Cotonou	99,2	75,9	127	97,8	66,9	103
Autres villes	93,5	73,4	817	92,0	66,3	874
Ensemble urbain	94,3	73,7	944	92,6	66,3	976
Rural	87,1	70,1	1 571	83,6	62,6	1 389
Département						
Alibori	85,0	70,6	320	72,0	55,6	286
Atacora	88,1	73,4	227	83,7	54,6	206
Atlantique	96,7	72,0	308	99,2	69,6	272
Borgou	74,0	58,6	346	68,4	48,2	314
Collines	96,6	78,6	156	91,9	70,1	149
Couffo	94,3	66,0	171	89,0	51,4	146
Donga	90,0	68,7	160	90,6	64,5	156
Littoral	99,2	75,9	127	97,8	66,9	103
Mono	97,3	74,8	97	98,4	74,9	123
Ouémé	97,5	82,4	221	98,8	77,6	213
Plateau	86,6	66,3	145	85,4	67,3	150
Zou	90,7	79,2	235	94,6	79,8	248
Niveau d'instruction de la mère						
Aucun	86,3	69,1	1 604	82,7	61,0	1 519
Primaire	95,4	76,0	473	94,0	68,9	445
Secondaire 1 ^{er} cycle	97,0	77,1	312	97,1	70,1	308
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	95,0	70,5	126	99,0	72,8	92
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	76,7	59,7	512	68,1	49,0	508
Second	88,3	71,6	480	88,0	64,9	435
Moyen	93,9	76,0	568	90,9	68,1	479
Quatrième	93,1	75,6	498	93,8	69,8	510
Le plus élevé	97,3	74,4	456	97,7	70,0	433
Ensemble	89,8	71,5	2 515	87,3	64,1	2 365

¹ Carnet, carte de vaccination, livret ou autre enregistrement écrit

Tableau 9.5 Prévalence et traitement des symptômes d'IRA

Parmi les enfants de moins de 5 ans, pourcentage ayant eu des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA) au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview; parmi les enfants ayant présenté des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Parmi les enfants de moins de 5 ans :		Parmi les enfants de moins de 5 ans avec des symptômes d'IRA :		
	Pourcentage avec des symptômes d'IRA ¹	Effectif d'enfants	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés ²	Pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement le même jour ou le jour suivant	Effectif d'enfants
Âge en mois					
<6	3,6	1 423	46,5	12,6	51
6-11	4,2	1 517	44,6	17,3	64
12-23	3,3	2 515	41,9	15,5	83
24-35	2,7	2 365	48,3	16,6	63
36-47	2,2	2 450	53,4	24,5	54
48-59	2,0	2 416	(43,7)	(8,6)	47
Sexe					
Masculin	3,0	6 415	45,8	13,8	194
Féminin	2,7	6 271	46,5	18,6	167
Statut tabagique actuel de la mère					
Fume cigarettes/tabac	7,1	208	*	*	15
Ne fume pas	2,8	12 478	46,8	16,5	346
Combustible pour cuisiner					
Électricité ou gaz	1,9	371	*	*	7
Kérosène	*	6	*	*	1
Charbon/lignite	0,0	124	*	*	0
Charbon de bois	2,4	2 926	53,8	26,5	71
Bois/paille ³	3,1	9 243	43,9	13,1	282
Excrément d'animaux	*	2	*	*	0
Autre combustible	*	10	*	*	1
Pas de repas préparé dans le ménage	*	4	*	*	0
Résidence					
Cotonou	1,5	558	*	*	8
Autres villes	2,4	4 382	60,8	23,3	105
Ensemble urbain	2,3	4 940	59,7	24,2	113
Rural	3,2	7 746	39,8	12,3	248
Département					
Alibori	5,3	1 718	14,1	6,9	92
Aïacora	1,5	1 127	*	*	17
Atlantique	3,9	1 448	(41,6)	(9,3)	57
Borgou	0,8	1 678	*	*	14
Collines	1,8	814	*	*	15
Couffo	4,5	844	(80,0)	(35,9)	38
Donga	0,3	831	*	*	2
Littoral	1,5	558	*	*	8
Mono	6,8	565	(48,7)	(13,8)	39
Ouémé	1,1	1 131	*	*	13
Plateau	5,0	766	(58,5)	(7,2)	38
Zou	2,4	1 206	(73,9)	(26,6)	30
Niveau d'instruction de la mère					
Aucun	3,1	8 301	42,0	15,7	253
Primaire	2,5	2 310	50,3	15,8	58
Secondaire 1 ^{er} cycle	2,6	1 523	(56,4)	(22,5)	39
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	1,9	552	*	*	10
Quintiles de bien-être économique					
Le plus bas	3,2	2 713	30,2	6,5	86
Second	3,8	2 554	49,2	18,8	96
Moyen	3,0	2 559	41,9	14,6	77
Quatrième	2,8	2 549	53,7	18,9	72
Le plus élevé	1,3	2 311	(73,8)	(31,0)	31
Ensemble	2,8	12 686	46,1	16,0	361

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Les symptômes d'IRA incluent une respiration courte et rapide associée à des problèmes de congestion dans la poitrine et/ou des difficultés respiratoires associées à des problèmes de congestion dans la poitrine.

² Sont inclus les conseils ou traitements fournis par le secteur public, secteur médical privé, boutique, marché et vendeurs de médicaments ambulants. Ne sont pas pris en compte ici les conseils ou traitements fournis par un praticien traditionnel.

³ Y compris l'herbe, les arbustes et les résidus agricoles.

Tableau 9.6 Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant présenté des symptômes d'IRA

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant présenté des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques; parmi les enfants de moins de 5 ans ayant présenté des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Source	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de chaque source :	
	Parmi les enfants avec des symptômes d'IRA ¹	Parmi les enfants avec des symptômes d'IRA pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés ¹
Secteur public	21,5	46,2
Hôpital du gouvernement	3,6	7,7
Centre de santé du gouvernement	16,8	36,0
Clinique mobile	0,6	1,3
Agent de terrain/ASC	0,6	1,2
Secteur privé	13,6	29,2
Hôpital privé/clinique	4,9	10,4
Pharmacie	6,1	13,1
Médecin privé	1,0	2,1
Clinique mobile	0,5	1,0
Agent de terrain/ASC	0,9	1,9
Autres secteurs privés	0,3	0,6
Autre secteur privé	10,5	22,6
Boutique	6,5	14,0
Praticien traditionnel	1,0	2,1
Marché	1,8	3,8
Vendeur de médicaments itinérants	1,2	2,6
Autre	1,7	3,6
Effectif d'enfants	361	168

ASC = Agent de santé communautaire

¹ Les symptômes d'IRA incluent une respiration courte et rapide associé à des problèmes de congestion dans la poitrine et/ou des difficultés respiratoires associées des problèmes de congestion dans la poitrine.

Tableau 9.7 Prévalence et traitement de la fièvre

Parmi les enfants de moins de 5 ans, pourcentage ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview ; parmi les enfants ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés et pourcentage ayant reçu des antibiotiques comme traitement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Parmi les enfants de moins de 5 ans :		Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre :			
	Pourcentage ayant eu de la fièvre	Effectif d'enfants	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés ¹	Pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement le même jour ou le jour suivant	Pourcentage qui ont pris des antibiotiques	Effectif d'enfants ayant eu de la fièvre
Âge en mois						
<6	16,9	1 423	49,3	22,9	17,1	240
6-11	24,7	1 517	56,4	31,2	18,4	374
12-23	24,9	2 515	51,2	28,2	15,3	626
24-35	18,9	2 365	53,3	26,0	14,6	448
36-47	17,9	2 450	58,6	32,7	12,7	439
48-59	14,0	2 416	48,3	22,8	14,2	339
Sexe						
Masculin	20,0	6 415	52,0	27,1	15,4	1 282
Féminin	18,9	6 271	54,4	28,5	15,0	1 184
Résidence						
Cotonou	19,1	558	65,8	47,3	20,8	107
Autres villes	17,1	4 382	57,8	33,6	18,1	748
Ensemble urbain	17,3	4 940	58,8	35,3	18,5	855
Rural	20,8	7 746	50,1	23,8	13,5	1 611
Département						
Alibori	22,5	1 718	16,5	10,7	4,6	387
Atacora	16,2	1 127	45,2	20,5	11,3	182
Atlantique	27,4	1 448	61,0	33,1	15,3	397
Borgou	12,8	1 678	47,6	23,5	10,6	214
Collines	16,6	814	80,1	43,1	16,5	135
Couffo	16,7	844	63,9	20,1	21,5	141
Donga	16,3	831	85,8	55,3	14,8	136
Littoral	19,1	558	65,8	47,3	20,8	107
Mono	20,9	565	45,6	19,5	11,4	118
Ouémé	18,9	1 131	59,7	39,8	18,7	213
Plateau	30,8	766	46,9	16,5	21,2	236
Zou	16,6	1 206	71,4	33,2	27,2	200
Niveau d'instruction de la mère						
Aucun	19,5	8 301	49,0	25,0	13,8	1 619
Primaire	20,8	2 310	57,7	29,7	17,0	480
Secondaire 1 ^{er} cycle	18,2	1 523	62,8	33,6	18,8	278
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	16,2	552	72,9	50,3	19,6	90
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	17,9	2 713	38,6	17,3	11,2	485
Second	21,1	2 554	49,2	24,2	10,9	538
Moyen	20,7	2 559	48,0	22,8	13,0	529
Quatrième	20,6	2 549	64,2	32,5	19,9	526
Le plus élevé	16,8	2 311	68,6	46,3	22,7	389
Ensemble	19,4	12 686	53,1	27,8	15,2	2 466

¹ Sont inclus les conseils ou traitement des sources suivantes : secteur médical public, secteur médical privé, boutique, marché et vendeur de médicaments ambulants. Non compris les conseils ou traitements fournis par un praticien traditionnel.

Tableau 9.8 Prévalence et traitement de la diarrhée

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview ; parmi les enfants ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant eu la diarrhée	Effectif d'enfants	Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée :	
			Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés ¹	Effectif d'enfants ayant eu la diarrhée
Âge en mois				
<6	9,8	1 423	34,2	139
6-11	18,4	1 517	42,8	279
12-23	16,4	2 515	47,6	412
24-35	10,6	2 365	40,8	250
36-47	5,7	2 450	43,8	139
48-59	4,2	2 416	37,0	100
Sexe				
Masculin	10,2	6 415	42,1	654
Féminin	10,6	6 271	43,3	665
Source de l'eau de boisson²				
Source améliorée	9,6	8 487	46,4	811
Non améliorée	12,1	4 186	36,8	508
Autre/manquant	*	12	*	0
Type d'installation sanitaire³				
Toilettes améliorées	5,3	1 342	46,9	71
Toilettes non améliorée	11,0	11 344	42,5	1 249
Toilettes partagée ⁴	8,1	2 235	49,8	182
Toilettes non améliorée	10,4	1 623	41,1	169
Défécation en plein air	12,0	7 486	41,2	898
Résidence				
Cotonou	8,6	558	41,9	48
Autres villes	9,6	4 382	48,0	421
Ensemble urbain	9,5	4 940	47,4	469
Rural	11,0	7 746	40,1	850
Département				
Alibori	12,3	1 718	17,3	212
Atacora	20,2	1 127	44,3	227
Atlantique	9,2	1 448	35,5	133
Borgou	6,7	1 678	56,6	113
Collines	8,9	814	62,1	72
Couffo	9,3	844	34,5	78
Donga	14,1	831	68,0	117
Littoral	8,6	558	41,9	48
Mono	11,9	565	22,2	67
Ouémé	7,7	1 131	60,2	87
Plateau	14,1	766	41,4	108
Zou	4,8	1 206	55,5	58
Niveau d'instruction de la mère				
Aucun	10,4	8 301	39,8	860
Primaire	11,7	2 310	47,9	270
Secondaire 1 ^{er} cycle	9,7	1 523	50,3	147
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	7,6	552	(43,6)	42
Quintiles de bien-être économique				
Le plus bas	11,6	2 713	39,0	316
Second	12,0	2 554	44,5	307
Moyen	11,4	2 559	37,5	291
Quatrième	9,5	2 549	42,6	243
Le plus élevé	7,0	2 311	55,9	163
Ensemble	10,4	12 686	42,7	1 320

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Sont inclus les conseils ou traitement des sources suivantes : secteur public, secteur médical privé, boutique, marché et vendeur de médicaments ambulants. Non compris les conseils ou traitements fournis par un praticien traditionnel.

² Se référer au Tableau 2.1 pour la définition des catégories

³ Se référer au Tableau 2.3 pour la définition des catégories

⁴ Toilettes qui seraient considérées comme améliorées si elles n'étaient pas partagées par 2 ménages ou plus.

Tableau 9.9 Thérapie de Réhydratation par voie orale, supplémentation en zinc et administration d'autres traitements contre la diarrhée

Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, pourcentage à qui on a donné une solution d'un sachet SRO ou des liquides SRO préconditionnés, une solution maison (SMR), soit une SRO ou une SMR, du zinc, une SRO et du zinc, une SRO ou l'augmentation des quantités de liquides, une thérapie de réhydratation par voie orale (TRO), la poursuite de réhydratation et une TRO, d'autres traitements et pourcentage à qui on n'a donné aucun traitement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'enfants avec diarrhée à qui on a donné :											Manquant	Pourcentage à qui on n'a donné aucun traitement	Effectif d'enfants ayant eu la diarrhée			
	Une solution d'un sachet SRO ou des liquides SRO préconditionnés	Solution Maison Recommandée (SMR)	Soit SRO ou SMR	Zinc	SRO et zinc	SRO ou augmentation des liquides	TRO (SRO, SMR, ou augmentation des liquides)	Poursuite de l'alimentation et TRO ¹	Antibiotiques	Médicaments antimotilité	Solution intraveineuse				Remède maison/autre		
Âge en mois																	
<6	19,3	7,1	22,0	13,8	8,4	26,8	29,5	16,7	2,8	0,0	0,0	24,5	0,0	52,4	139		
6-11	26,2	8,4	28,5	21,9	14,8	38,1	40,4	27,2	7,0	0,0	0,3	38,7	0,0	25,7	279		
12-23	23,9	9,6	26,6	15,2	10,7	36,1	37,9	29,4	5,8	0,6	0,2	42,5	0,4	28,7	412		
24-35	18,4	8,6	19,8	16,1	8,3	29,9	30,7	26,6	7,9	0,0	0,0	37,0	0,0	33,2	250		
36-47	17,6	12,5	23,6	19,6	8,7	35,8	40,0	32,1	8,3	2,3	0,0	39,5	0,8	22,9	139		
48-59	23,3	11,6	26,2	13,6	8,7	38,1	41,0	38,1	8,9	0,0	0,0	30,4	0,0	35,4	100		
Sexe																	
Masculin	22,7	10,3	25,8	16,8	10,5	34,7	37,0	29,5	5,7	0,8	0,0	39,3	0,3	30,4	654		
Féminin	21,6	8,5	24,0	17,2	10,5	34,3	36,3	26,5	7,5	0,3	0,3	35,8	0,1	32,3	665		
Résidence																	
Cotonou	21,4	3,7	21,4	28,5	14,3	38,6	38,6	26,4	9,9	0,0	0,0	29,5	0,0	29,3	48		
Autres villes	27,6	10,0	29,8	15,6	11,1	38,2	39,9	29,3	6,8	0,4	0,2	42,1	0,2	27,7	421		
Ensemble urbain	27,0	9,4	29,0	16,9	11,5	38,2	39,8	29,0	7,1	0,4	0,2	40,8	0,2	27,8	469		
Rural	19,5	9,4	22,6	17,0	10,0	32,4	34,9	27,5	6,4	0,6	0,1	35,7	0,2	33,3	850		
Département																	
Alibori	18,6	11,9	20,5	15,9	12,3	37,6	39,4	32,5	7,3	1,9	0,4	10,7	0,3	49,1	212		
Atacora	18,2	8,0	21,0	15,2	12,4	20,6	23,4	15,5	5,9	0,0	0,0	44,6	0,5	32,7	227		
Atlantique	20,1	8,9	24,3	7,3	5,3	33,0	36,3	30,0	4,2	0,0	0,7	47,2	0,0	26,4	133		
Borgou	26,3	5,1	28,2	23,6	12,9	33,9	35,9	25,8	8,5	0,0	0,0	35,6	0,0	28,3	113		
Collines	33,3	20,5	38,6	20,7	16,3	44,1	47,6	45,4	7,1	0,0	0,0	45,6	0,0	24,0	72		
Couffo	17,0	9,3	19,0	24,4	7,8	38,3	39,1	33,4	8,8	2,8	0,0	13,3	0,0	37,4	78		
Donga	28,4	7,9	29,3	16,5	14,7	45,1	46,0	30,4	0,0	0,0	0,0	53,8	0,0	24,3	117		
Littoral	21,4	3,7	21,4	28,5	14,3	38,6	38,6	26,4	9,9	0,0	0,0	29,5	0,0	29,3	48		
Mono	25,8	7,5	28,4	8,8	7,1	43,2	44,9	39,5	9,1	0,0	0,0	30,2	0,0	33,7	67		
Ouémé	10,7	3,9	10,7	11,8	2,0	25,3	25,3	17,5	2,6	1,1	0,0	67,9	0,0	20,0	87		
Plateau	21,9	8,6	26,4	18,0	6,1	29,1	32,8	21,1	11,0	0,0	0,0	41,8	0,0	28,3	108		
Zou	41,7	21,1	50,6	29,3	13,4	53,7	58,3	43,3	11,3	0,0	0,0	41,4	0,0	14,8	58		
Niveau d'instruction de la mère																	
Aucun	19,6	8,6	21,9	15,0	9,2	31,8	33,8	26,2	6,2	0,7	0,2	38,0	0,2	33,4	860		
Primaire	25,8	8,6	29,8	17,2	9,8	37,9	40,6	31,4	7,1	0,5	0,0	35,1	0,0	28,7	270		
Secondaire 1 ^{er} cycle	28,9	12,7	32,0	23,5	15,4	41,3	44,1	30,6	9,0	0,0	0,0	41,4	0,7	23,1	147		
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	(27,9)	(17,3)	(29,8)	(33,3)	(25,0)	(44,0)	(44,0)	(34,0)	(5,3)	(0,0)	(0,0)	(31,1)	(0,0)	(35,3)	42		
Quintiles de bien-être économique																	
Le plus bas	20,5	10,9	23,4	14,9	9,7	29,8	31,7	24,8	6,4	0,8	0,0	37,4	0,0	34,7	316		
Second	20,3	10,1	23,3	16,8	11,4	33,4	36,0	27,5	8,4	0,9	0,6	37,8	0,4	30,2	307		
Moyen	19,3	7,7	22,0	15,0	9,2	32,9	35,3	25,4	6,3	0,3	0,0	35,6	0,2	35,3	291		
Quatrième	23,1	9,0	25,0	19,3	10,4	35,6	37,3	28,6	4,3	0,0	0,0	39,8	0,4	29,5	243		
Le plus élevé	32,6	8,8	35,8	21,3	12,9	46,6	48,8	38,9	8,1	0,6	0,0	37,5	0,0	22,6	163		
Ensemble	22,2	9,4	24,9	17,0	10,5	34,5	36,7	28,0	6,6	0,5	0,1	37,5	0,2	31,3	1 320		

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

SRO = Sels de réhydratation par voie orale

¹ Par poursuite de l'alimentation, on entend ici les enfants à qui on a donné davantage de nourriture que d'habitude, la même quantité ou un peu moins que d'habitude pendant les épisodes diarrhéiques.

Tableau 9.10 Pratiques alimentaires durant la diarrhée

Répartition (en%) des enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview par quantité de liquides et d'aliments donnée par rapport aux quantités habituelles, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Quantité de liquides donnée					Quantité d'aliments donnée					Effectif d'enfants ayant eu la diarrhée					
	Davantage	Même que d'habitude	Un peu moins	Beaucoup moins	Aucune	Ne sait pas/ manquant	Total	Davantage	Même que d'habitude	Un peu moins		Beaucoup moins	Aucune	Ne mange pas encore	Ne sait pas/ manquant	Total
Âge en mois																
<6	10,8	30,3	35,1	10,3	12,0	1,5	100,0	10,9	35,5	15,8	9,9	1,7	26,3	0,0	100,0	139
6-11	17,0	22,0	36,7	18,2	5,8	0,3	100,0	10,5	24,6	35,1	18,6	3,4	7,8	0,0	100,0	279
12-23	17,1	27,3	34,9	15,8	4,0	0,9	100,0	8,9	30,8	42,9	11,2	5,1	0,6	0,5	100,0	412
24-35	13,2	30,7	36,9	13,4	4,6	1,2	100,0	4,8	40,7	38,0	12,1	4,4	0,0	0,0	100,0	250
36-47	22,3	27,4	29,5	12,5	6,9	1,3	100,0	10,2	33,0	43,6	9,6	2,1	1,0	0,6	100,0	139
48-59	17,8	36,3	28,7	11,4	5,0	0,9	100,0	8,0	46,4	36,3	8,0	1,3	0,0	0,0	100,0	100
Sexe																
Masculin	15,2	29,0	35,2	14,7	5,2	0,6	100,0	9,6	34,4	36,5	12,4	3,2	3,7	0,2	100,0	654
Féminin	17,3	26,7	34,1	14,5	6,2	1,3	100,0	7,9	32,2	37,6	12,3	4,1	5,7	0,2	100,0	665
Allaitement																
Allaité	15,9	25,5	36,7	15,9	5,6	0,4	100,0	10,1	29,7	34,2	13,9	3,9	8,1	0,2	100,0	731
N'allaité pas	16,7	30,7	32,1	13,0	5,9	1,7	100,0	7,1	37,8	40,6	10,5	3,3	0,5	0,3	100,0	589
Résidence																
Cotonou	26,2	30,2	22,4	16,8	2,1	2,3	100,0	3,7	44,7	33,4	11,9	6,3	0,0	0,0	100,0	48
Autres villes	16,1	28,8	36,5	12,0	5,7	0,9	100,0	5,2	31,1	41,0	10,5	4,6	7,6	0,0	100,0	421
Ensemble urbain	17,1	28,9	35,1	12,5	5,3	1,0	100,0	5,1	32,5	40,2	10,6	4,8	6,9	0,0	100,0	469
Rural	15,8	27,2	34,4	15,8	5,9	0,9	100,0	10,7	33,7	35,3	13,3	3,0	3,5	0,4	100,0	850
Département																
Alibori	21,4	29,1	22,4	19,9	6,8	0,3	100,0	31,6	30,5	22,2	11,9	1,7	1,8	0,3	100,0	212
Atacora	3,0	31,3	40,5	13,4	10,8	1,0	100,0	0,9	38,0	33,1	13,8	4,4	9,6	0,3	100,0	227
Atlantique	17,3	31,1	36,8	12,8	1,3	0,8	100,0	3,6	40,3	42,4	12,8	0,0	0,9	0,0	100,0	133
Borgou	11,7	13,8	45,9	24,8	3,0	0,9	100,0	9,8	21,6	48,4	12,3	4,2	2,9	0,9	100,0	113
Collines	13,4	19,4	50,7	12,7	3,8	0,0	100,0	5,6	34,0	54,6	3,8	1,3	0,7	0,0	100,0	72
Couffo	24,9	25,6	35,6	5,0	2,3	6,6	100,0	5,8	30,1	46,6	5,8	10,3	1,3	0,0	100,0	78
Donga	24,3	29,9	33,8	8,7	2,6	0,6	100,0	6,5	28,3	36,3	18,3	4,5	6,1	0,0	100,0	117
Littoral	26,2	30,2	22,4	16,8	2,1	2,3	100,0	3,7	44,7	33,4	11,9	6,3	0,0	0,0	100,0	48
Mono	21,0	24,1	41,8	13,1	0,0	0,0	100,0	8,0	27,7	51,2	10,5	1,7	0,9	0,0	100,0	67
Ouémé	19,6	37,9	35,2	6,5	0,8	0,0	100,0	0,8	42,1	42,0	10,9	1,9	2,3	0,0	100,0	87
Plateau	8,9	27,4	29,9	16,2	17,2	0,5	100,0	3,3	28,8	27,8	14,4	7,2	18,0	0,5	100,0	108
Zou	27,0	27,3	19,0	20,5	6,2	0,0	100,0	4,5	37,3	35,0	16,5	3,7	3,0	0,0	100,0	58
Niveau d'instruction de la mère																
Aucun	15,4	29,2	34,1	14,3	6,5	0,6	100,0	11,3	33,7	34,8	11,9	3,3	4,7	0,3	100,0	860
Primaire	18,2	23,9	37,7	13,6	5,3	1,3	100,0	2,3	30,6	44,2	13,3	3,6	5,6	0,3	100,0	270
Secondaire 1 ^{er} cycle	16,1	27,0	32,0	19,1	3,4	2,4	100,0	5,9	35,5	34,6	15,2	5,1	3,6	0,0	100,0	147
Secondaire 2 nd cycle ou plus	(22,7)	(28,0)	(34,0)	(12,2)	(1,6)	(1,5)	(100,0)	(6,2)	(34,6)	(43,8)	(5,7)	(6,1)	(3,6)	(0,0)	(100,0)	42
Quintiles de bien-être économique																
Le plus bas	12,4	25,7	34,9	18,7	7,4	0,9	100,0	7,8	31,9	37,9	13,4	4,6	4,3	0,0	100,0	316
Second	16,4	24,0	37,9	14,3	6,2	1,2	100,0	9,0	33,0	37,6	13,9	2,1	3,6	0,7	100,0	307
Moyen	16,6	28,4	32,4	15,0	6,5	1,1	100,0	11,6	33,0	32,4	14,1	4,7	3,0	0,3	100,0	291
Quatrième	15,4	31,7	36,6	10,9	4,6	0,8	100,0	9,1	32,4	38,7	9,4	2,7	7,6	0,0	100,0	243
Le plus élevé	24,1	32,6	28,8	11,9	1,9	0,7	100,0	4,2	38,2	39,9	8,8	4,1	4,8	0,0	100,0	163
Ensemble	16,3	27,8	34,6	14,6	5,7	1,0	100,0	8,7	33,3	37,0	12,4	3,6	4,7	0,2	100,0	1 320

Note : Il est recommandé, pendant les épisodes diarrhéiques, de donner davantage de liquides à l'enfant et de ne pas réduire les rations alimentaires. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Tableau 9.11 Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant eu la diarrhée

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques ; parmi les enfants ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques et parmi les enfants ayant eu la diarrhée qui ont reçu des SRO, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Source	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de chaque source :		
	Parmi les enfants ayant eu la diarrhée	Parmi les enfants ayant eu la diarrhée pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement	Parmi les enfants ayant eu la diarrhée qui ont reçu SRO ¹
Secteur public	19,7	44,2	45,4
Hôpital du gouvernement	2,5	5,6	5,5
Centre de santé du gouvernement	14,9	33,5	37,5
Clinique PF	0,0	0,1	0,2
Agent de terrain	0,6	1,4	1,0
Agent de santé Strat AV	0,2	0,5	0,2
Agent de santé/relai communautaire	1,4	3,2	1,3
Autre secteur public	0,1	0,1	0,0
Secteur privé	9,9	22,3	18,5
Hôpital privé/clinique	3,1	7,0	7,2
Pharmacie	6,2	13,8	12,1
Médecin privé	0,3	0,8	0,0
Hôpital confessionnel	0,1	0,3	0,0
ABPF	0,2	0,5	0,0
Agent de santé - ONG	0,1	0,3	0,0
Autre secteur privé	12,3	27,7	7,8
Boutique	5,1	11,5	3,0
Praticien traditionnel	2,1	4,7	1,9
Marché	2,7	6,0	1,4
Vendeur de médicaments itinérants	2,9	6,4	2,0
Autre	3,2	7,3	0,4
Effectif d'enfants	1 320	588	292

ABPF= Agence Béninoise pour la Promotion de la Famille

ASC = Agent de santé communautaire

ONG = Organisation non-gouvernemental

PF = Planification familiale

SRO = Sels de réhydratation par voie orale

STRAT AV = Stratégie Avancée

¹ Liquides de sachets SRO ou de sachets SRO préconditionnés

Tableau 9.12 Connaissance des sachets SRO ou des liquides SRO préconditionnés

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 5 années ayant précédé l'enquête qui connaissent les sachets de SRO ou les liquides SRO préconditionnés pour le traitement de la diarrhée, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes qui connaissent les sachets de SRO ou les liquides SRO préconditionnés	Effectif des femmes
Groupe d'âges		
15-19	49,4	506
20-24	64,9	1 931
25-34	72,7	4 404
35-49	74,5	2 190
Résidence		
Cotonou	88,3	408
Autres villes	76,0	3 115
Ensemble urbain	77,4	3 523
Rural	65,6	5 508
Département		
Alibori	70,9	1 226
Atacora	58,0	800
Atlantique	76,6	1 043
Borgou	55,1	1 164
Collines	81,5	604
Couffo	59,3	583
Donga	73,6	599
Littoral	88,3	408
Mono	65,7	393
Ouémé	65,7	798
Plateau	66,6	550
Zou	90,2	863
Niveau d'instruction		
Aucun	65,0	5 807
Primaire	74,2	1 650
Secondaire 1 ^{er} cycle	82,1	1 150
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	94,0	423
Quintiles de bien-être économique		
Le plus bas	52,1	1 827
Second	64,0	1 827
Moyen	70,2	1 837
Quatrième	79,0	1 857
Le plus élevé	86,8	1 683
Ensemble	70,2	9 031

SRO = Sels de réhydratation par voie orale.

Tableau 9.13 Évacuation des selles des enfants

Répartition (en %) des enfants les plus jeunes de moins de 2 ans vivant avec leur mère par moyen d'évacuation des dernières matières fécales de l'enfant et pourcentage d'enfants dont les matières fécales ont été évacuées de manière appropriée, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Moyen d'évacuation des matières fécales :							Total	Pourcentage d'enfants dont les matières fécales ont été évacuées de manière appropriée ¹	Effectif d'enfants
	L'enfant a utilisé les toilettes ou latrines	Jetées/ rincées dans toilettes ou latrines	Enterrées	Jetées/ rincées dans égouts ou caniveaux	Jetées aux ordures	Laissées à l'air libre	Autre			
Âge en mois										
0-1	0,2	29,6	1,8	4,9	57,4	1,4	4,8	100,0	31,5	498
2-3	0,3	32,3	3,0	4,0	54,6	3,4	2,4	100,0	35,5	468
4-5	0,6	32,8	2,4	2,0	57,0	4,0	1,1	100,0	35,9	420
6-8	0,6	32,4	3,5	2,2	57,6	2,5	1,3	100,0	36,5	804
9-11	0,3	30,0	3,0	1,8	60,6	3,6	0,7	100,0	33,3	682
12-17	0,8	30,0	3,8	1,1	60,0	3,3	1,0	100,0	34,6	1 177
18-23	1,1	30,1	4,5	0,6	58,8	3,8	1,2	100,0	35,6	1 221
6-23	0,8	30,5	3,8	1,3	59,2	3,3	1,1	100,0	35,1	3 884
Installation sanitaire²										
Toilettes améliorées	0,8	71,2	0,4	2,6	24,1	0,6	0,3	100,0	72,4	536
Toilettes non améliorées	0,6	26,2	3,8	1,9	62,3	3,5	1,7	100,0	30,6	4 735
Toilettes partagées ³	1,3	63,8	0,8	2,5	30,3	0,4	0,9	100,0	65,9	911
Toilettes non améliorées	0,7	53,5	2,8	2,0	35,6	1,5	3,9	100,0	57,0	694
Défécation en plein air	0,4	9,2	4,8	1,6	77,6	4,9	1,4	100,0	14,5	3 130
Résidence										
Cotonou	2,0	66,6	0,6	3,4	25,4	0,6	1,5	100,0	69,2	236
Autres villes	0,9	41,7	2,5	2,6	48,0	3,2	1,1	100,0	45,2	1 789
Ensemble urbain	1,0	44,6	2,3	2,7	45,3	2,9	1,2	100,0	48,0	2 024
Rural	0,4	22,1	4,1	1,5	66,6	3,4	1,8	100,0	26,7	3 246
Département										
Alibori	1,0	30,8	9,5	1,0	50,0	4,4	3,3	100,0	41,3	744
Atacora	0,0	6,5	0,3	0,6	90,4	1,9	0,2	100,0	6,8	475
Atlantique	1,2	41,0	8,3	0,9	43,7	0,9	4,0	100,0	50,5	569
Borgou	0,6	12,2	1,3	5,6	64,7	14,9	0,6	100,0	14,1	707
Collines	0,0	22,8	0,2	2,2	73,2	0,2	1,5	100,0	23,0	337
Couffo	0,0	27,3	2,1	1,2	67,7	0,5	1,2	100,0	29,4	358
Donga	0,7	18,6	0,2	1,5	76,0	1,5	1,4	100,0	19,5	369
Littoral	2,0	66,6	0,6	3,4	25,4	0,6	1,5	100,0	69,2	236
Mono	1,4	33,9	5,4	0,9	55,9	1,7	0,9	100,0	40,7	220
Ouémé	0,5	48,8	2,8	2,4	44,8	0,3	0,4	100,0	52,1	457
Plateau	0,3	26,8	3,2	0,0	68,0	0,4	1,3	100,0	30,3	308
Zou	0,5	53,3	1,5	1,6	42,0	0,4	0,7	100,0	55,3	491
Niveau d'instruction de la mère										
Aucun	0,7	22,7	3,9	1,4	65,4	4,2	1,6	100,0	27,4	3 309
Primaire	0,6	36,8	3,1	2,6	53,4	1,7	1,8	100,0	40,4	987
Secondaire 1 ^{er} cycle	0,3	45,9	2,2	2,8	46,1	1,6	1,1	100,0	48,4	705
Secondaire 2 ^e cycle ou plus	0,6	67,7	1,5	3,0	24,2	0,9	2,0	100,0	69,9	269
Quintiles de bien-être économique										
Le plus bas	0,3	8,5	4,4	2,1	75,9	7,2	1,6	100,0	13,2	1 105
Second	0,4	14,8	5,5	1,1	72,3	3,5	2,4	100,0	20,7	1 080
Moyen	0,4	22,7	3,5	1,4	68,1	2,6	1,3	100,0	26,6	1 095
Quatrième	1,0	41,1	2,4	1,9	50,5	1,5	1,6	100,0	44,5	1 049
Le plus élevé	1,2	73,2	1,1	3,1	19,8	0,8	0,8	100,0	75,4	942
Ensemble	0,6	30,8	3,4	1,9	58,5	3,2	1,6	100,0	34,8	5 271

¹ On considère que les matières fécales des enfants sont évacuées de manière appropriée si l'enfant utilise les toilettes ou les latrines, si les matières fécales sont jetées ou rincées dans des toilettes ou des latrines ou si elles sont enterrées.

² Se référer au Tableau 2.3 pour la définition des catégories.

³ Toilettes qui seraient considérées comme améliorées si elles n'étaient pas partagées par 2 ménages ou plus.

Résultats clés

- **Possession de MII :** 92 % des ménages possèdent au moins une moustiquaire imprégnée d'insecticide et, en moyenne, un ménage possède 2,5 MII.
- **Source d'obtention de moustiquaire :** Environ 9 moustiquaires sur 10 (89 %) ont été obtenues par les ménages lors d'une campagne de distribution de masse.
- **Accès au MII :** 77 % de la population des ménages ont accès à une MII. Ce pourcentage varie considérablement selon le département.
- **Utilisation de MII :** 71 % de la population des ménages avaient dormi sous une MII la nuit avant l'interview. Chez les enfants de moins de 5 ans, ce taux est d'environ 76 % et chez les femmes enceintes de 15-49 ans il est de 79 %.
- **Utilisation de TPIg :** 33 % des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années ayant précédé l'enquête ont déclaré avoir reçu deux doses ou plus de SP/Fansidar au cours d'une visite prénatale et seulement 13 % ont déclaré en avoir reçu trois doses ou plus de SP/Fansidar au cours d'une visite prénatale.
- **Prise en charge du paludisme chez les enfants :** Des conseils ou un traitement ont été recherchés pour 53 % des enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines avant l'interview. Pour 18 % des enfants qui ont eu de la fièvre, on a prélevé du sang au doigt ou au talon pour être testé.
- **Prévalence du paludisme chez l'enfant :** La quasi-totalité des enfants de 6-59 mois (98 %) ont été testés pour le paludisme. Pour 36 % d'entre eux, le test du diagnostic rapide s'est révélé positif et pour 39 %, le test de gouttes épaisses au microscope était positif.

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), en 2017, près de la moitié de la population mondiale était exposée au risque de paludisme. Ce fléau constitue un frein au développement des communautés et des pays les plus touchés par la maladie.

Le Bénin, à l'instar de la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, enregistre le paludisme comme la première cause de mortalité et de morbidité. En 2017, selon l'annuaire des statistiques sanitaires du Ministère de la santé du Bénin, le paludisme constituait la première cause de consultation (44 %) et d'hospitalisation (31 %).

La mission assignée au Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) est d'assurer l'accès universel à la prévention et au traitement correct du paludisme pour réduire les taux de mortalité et de morbidité dus à cette maladie. De ce fait, plusieurs plans stratégiques basés sur la politique de lutte contre le

paludisme ont été élaborés. Le dernier plan vise à atteindre la couverture universelle des interventions de prévention et de prise en charge du paludisme pour la période 2017-2021.

De façon générale, le programme poursuit les trois objectifs suivants : i) Réduire le taux d'incidence du paludisme d'au moins 25 % par rapport à 2015¹ ; ii) Réduire le taux de mortalité liée au paludisme d'au moins 25 % par rapport à 2015² et iii) Renforcer les capacités de gestion du programme à tous les niveaux. Ces objectifs ont été déclinés en trois axes d'intervention : prévention du paludisme, diagnostic et prise en charge et renforcement du programme.

10.1 POSSESSION DE MOUSTIQUAIRES IMPREGNÉES D'INSECTICIDE

Possession de moustiquaires imprégnées d'insecticide

Ménages qui ont, au moins, une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII). Une MII est définie comme suit : (1) une moustiquaire imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire (moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action ou MIILDA) ou (2) une moustiquaire qui a été trempée dans un insecticide au cours des 12 derniers mois.

Échantillon : Ménages

Couverture universelle en MII dans les ménages

Pourcentage de ménages avec au moins une MII pour deux personnes au maximum.

Échantillon : Ménages

Ce chapitre présente les données utiles pour évaluer l'efficacité des stratégies de contrôle du paludisme qui ont été mises en place, stratégies qui comprennent la pulvérisation intradomestique d'insecticide (pulvérisation des murs internes des logements), la disponibilité et l'utilisation de moustiquaires, l'utilisation prophylactique et thérapeutique d'antipaludiques, le test de diagnostic des enfants avec de la fièvre ainsi que la prévalence de l'anémie et du paludisme parmi les enfants de moins de 5 ans.

Les données collectées pendant l'EDSB-V portent, d'une part, sur la distribution de moustiquaires imprégnées à longue durée d'action et de moustiquaires préimprégnées d'insecticide et, d'autre part, sur l'ensemble des moustiquaires traitées ou non traitées sur le terrain. Elles permettent de mesurer le pourcentage de ménages ayant au moins une moustiquaire, le nombre moyen de moustiquaires par ménage et le pourcentage de ménages ayant au moins une moustiquaire pour deux personnes au maximum qui ont passé la nuit avant l'interview dans le ménage.

La mise à l'échelle nationale de MIILDA se fait grâce à des campagnes nationales de distribution gratuite de MIILDA aux ménages à trois ans d'intervalle. Entre deux campagnes, il y a aussi une distribution de routine de MIILDA lors des consultations prénatales et pendant les séances de vaccination des enfants de moins d'un an. Des écoles primaires bénéficient aussi de la distribution de MIILDA dans des classes bien ciblées. Des distributions au niveau de points de cession communautaire existent également pour le reste de la population.


¹ Incidence en 2015 : 15,2 %

² Taux de létalité lié au paludisme en 2015 : 0,90 pour mille

Dans l'ensemble, plus de neuf ménages sur dix (92 %) disposent d'une MII. En moyenne, un ménage dispose d'au moins 2,5 MII et environ près de deux ménages sur trois (61 %) a au moins une MII pour deux personnes au maximum qui ont passé la nuit dans le ménage avant l'interview (**Tableau 10.1** et **Graphique 10.1**).

Tendances : Entre 2006 et 2017-2018, on note une tendance à la hausse de la possession d'une MII par les ménages, le pourcentage étant passé de 25 % à 80 % en 2011-2012 et à 92 % en 2017-2018 (**Graphique 10.2**).


Graphique 10.1 Possession de MII par le ménage



Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100 % en raison de l'arrondissement.

Graphique 10.2 Possession de MII dans les ménages : Tendances

Pourcentage de ménages qui possèdent au moins une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)



EDSB-III 2006	EDSB-IV 2011-2012	EDSB-V 2017-2018
---------------	-------------------	------------------

Variations par caractéristique

- La possession d'une MII varie suivant le département. En effet, le pourcentage de ménages possédant une MII est relativement plus faible dans le département de l'Ouémé (78 %) que dans les autres départements tels que le Zou (97 %), les Collines (96 %), l'Atlantique, le Couffo et la Donga (95 % dans les trois cas) (**Graphique 10.3** et **Tableau 10.1**). Il en est de même pour le pourcentage de ménages disposant d'au moins une MII pour deux personnes au maximum ayant dormi passé la nuit dernière dans les ménages. Il passe de 44 % dans l'Alibori à 73 % dans le Mono.
- Le pourcentage de ménages ayant, au moins, une moustiquaire pour deux personnes au maximum qui ont passé la nuit avant l'interview dans le ménage augmente avec le niveau de bien-être économique du ménage. Il passe de 52 % dans les ménages du quintile de bien-être le plus bas à 66 % dans ceux du plus élevé (**Graphique 10.4**).


Pulvérisation intradomiciliaire d'Insecticide

La pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide résiduel (PID) est une technique de lutte antivectorielle qui consiste à pulvériser une suspension d'insecticide sur les murs intérieurs des logements en utilisant des insecticides à effet rémanent agréés par l'OMS.

Au cours de l'enquête, on a demandé si quelqu'un était venu pour pulvériser d'insecticide les murs intérieurs du logement. Au niveau national, on constate que la PID est une stratégie qui n'est pas utilisée de manière généralisée et importante, seulement, 9 % des ménages en ayant bénéficié au cours des 12 derniers mois (**Tableau 10.2**). Cependant, dans certains départements tels que la Donga, l'Atacora, et l'Alibori, on note que les pourcentages de ménages qui ont bénéficié d'une PID sont nettement plus élevés qu'ailleurs (respectivement 62 %, 36 %, et 31 %). Dans les autres départements, cette proportion est très faible, variant entre moins de 1 % à 3 %. On note également que cette stratégie de prévention est un peu plus utilisée en milieu rural qu'en milieu urbain (10 % contre 7 %).


Graphique 10.3 Possession de MII par département

Pourcentage de ménages possédant au moins une MII



Graphique 10.4 Possession de MII par bien-être économique du ménage

Pourcentage de ménages possédant au moins une MII




Dans 92 % des cas, les ménages possèdent au moins une MII et/ou ont bénéficié d'une PID au cours des 12 derniers mois. Encore une fois, c'est dans les départements de la Donga et du Zou que cette proportion est la plus élevée (respectivement 98 % et 97 %) (**Graphique 10.5**).

Source des moustiquaires

- Environ 9 moustiquaires sur 10 (89 %) ont été obtenues au cours d'une campagne de distribution de masse de moustiquaires. Seulement 3 % ont été obtenues lors des visites prénatales (**Tableau 10.3** et **Graphique 10.6**).


Graphique 10.5 Prévention du paludisme

Pourcentage de ménages avec au moins une MII et/ou ayant bénéficié d'une PID selon le département



Graphique 10.6 Source d'approvisionnement des moustiquaires

Répartition (en %) des moustiquaires dans les ménages interviewés



10.2 ACCÈS AUX MII ET UTILISATION DES MII DANS LES MÉNAGES

Accès à une MII

Pourcentage de la population qui aurait pu dormir sous une MII si chaque MII du ménage était utilisée par deux personnes au maximum.

Échantillon : Population de fait des ménages.

Utilisation des MII

Pourcentage de la population qui a dormi sous une MII la nuit avant l'interview.

Échantillon : Population de fait des ménages.


Pour atteindre la couverture universelle, l'OMS recommande une moustiquaire pour deux personnes par ménage. Ainsi, l'accès aux MII est mesuré par le pourcentage de la population qui aurait pu dormir sous une MII si chaque MII du ménage était utilisée par deux personnes au maximum. Une comparaison de cet indicateur avec ceux liés à l'utilisation peut aider les programmes à identifier les obstacles empêchant l'utilisation correcte des MII, à orienter ou réorienter les stratégies et à mettre en place les actions appropriées.

Il ressort des résultats de l'enquête que 77 % de la population des ménages ont accès à une MII (**Tableaux 10.4 et 10.5**) alors que 71 % de la population des ménages ont dormi sous une MII la nuit précédant l'interview (**Tableau 10.6**). L'écart entre l'accès et l'utilisation est donc d'environ 6 points de pourcentage, ce qui montre que bien que des efforts aient été fournis en matière de sensibilisation, il est nécessaire de poursuivre ces efforts pour une utilisation totale des MII par les ménages qui en ont. Par ailleurs, dans les ménages qui possèdent au moins une MII, 77 % de la population ont dormi sous MII et 73 % des MII existantes ont été utilisées la nuit précédant l'interview (**Tableaux 10.6 et 10.7**).

Tendances : On note une tendance à l'amélioration en termes d'accessibilité et d'utilisation des MII. En effet, le pourcentage de population ayant accès à une MII est passé de 15 % en 2006 à 64 % en 2011-2012 et à 77 % en 2017-2018. Dans la même période, le pourcentage ayant dormi sous une MII la nuit avant l'interview est passé de 15 % à 63 % et à 71 % (**Graphique 10.7**).

Graphique 10.7 Accès et utilisation des MII : Tendances


Pourcentage de la population des ménages ayant accès aux MII et pourcentage de la population ayant dormi sous une MII la nuit avant l'enquête



Variations par caractéristique

- La population des ménages ayant accès aux MII et ayant dormi sous une MII la nuit avant l'interview est relativement plus élevée à Cotonou³ que dans les autres localités et en milieu rural. En effet, le pourcentage d'accès aux MII est de 83 % à Cotonou contre 77 % dans les autres villes et en milieu rural ; de même, le taux d'utilisation varie de 81 % à Cotonou à 71 % dans les autres villes et 70 % en milieu rural (**Graphique 10.8**).
- L'accessibilité des populations aux MII varie d'un département à l'autre. En effet, dans l'Alibori (64 %), le Borgou (69 %) et l'Ouémé (68 %), le pourcentage ayant accès à une MII varie entre 64 % et 69 % contre au moins 80 % dans les autres départements (**Tableau 10.5**).

Graphique 10.8 Accès et utilisation des MII



10.3 UTILISATION DES MII PAR LES ENFANTS ET LES FEMMES ENCEINTES


Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans constituent des cibles prioritaires des interventions en matière de santé en général et de lutte contre le paludisme en particulier du fait de leur état de vulnérabilité en zone endémique comme le Bénin. Ainsi, plusieurs programmes sont mis en œuvre pour prévenir dans ces populations la survenue du paludisme et réduire ainsi les risques de morbidité et de mortalité. Au nombre de ces actions, on peut citer la promotion de l'utilisation universelle de la moustiquaire imprégnée d'insecticide.

Dans l'ensemble, plus de 3 enfants de moins de 5 ans sur 4 (76 %) ont dormi sous une MII la nuit ayant précédé l'interview. Ce pourcentage est de 82 % chez les ménages possédant au moins une MII (**Tableau 10.8**).

Quatre femmes enceintes de 15-49 ans sur cinq (79 %) ont dormi sous une MII la nuit précédant l'enquête. Dans les ménages possédant au moins une MII, ce pourcentage atteint 85 % (**Tableau 10.9** et **Graphique 10.9**).

Graphique 10.9 Utilisation des MII

Pourcentage ayant dormi sous une MII la nuit avant l'enquête



Tendances : On observe depuis 2006 une tendance à l'augmentation du taux d'utilisation des MII, que ce soit par les enfants de moins de 5 ans ou par les femmes enceintes de 15-49 ans. Cependant, on note qu'entre 2006 et 2011-2012, la tendance à l'augmentation a été plus importante et qu'elle s'est ensuite ralentie, le taux d'utilisation par les enfants étant passé de respectivement 20 % à 70 % et à 76 %. Dans la même période, le taux d'utilisation par les femmes enceintes a varié de 20 % à 75 % et à 79 %.

³ Cotonou se rapporte au département du Littoral dont il est l'unique commune

Variations par caractéristique

- Le niveau d'utilisation des MII chez les enfants de moins de 5 ans ainsi que chez les femmes enceintes reste nettement supérieur à Cotonou que dans les autres villes et en milieu rural. En effet, le taux d'utilisation des MII chez les enfants de moins de cinq ans est de 86 % à Cotonou contre 74 % en milieu rural (**Tableau 10.8**). Chez les femmes enceintes de 15-49 ans, il est respectivement de 82 % contre 79 % (**Tableau 10.9**).
- L'utilisation de MII chez les enfants de moins de cinq ans ainsi que chez les femmes enceintes varie selon le département. Les proportions d'enfants de moins de cinq ans et de femmes enceintes ayant dormi sous une MII la nuit avant l'interview sont les plus faibles dans le département de l'Alibori (respectivement 69 % pour les deux cas) et les plus élevées dans le Mono (respectivement 87 % et 91 %) (**Tableau 10.8**).
- L'utilisation des MII chez les femmes enceintes de 15-49 ans augmente avec le niveau d'instruction. Elle passe de 77 % chez les femmes sans aucun niveau d'instruction à 85 % chez celles ayant un niveau d'instruction secondaire 2^d cycle ou plus (**Tableau 10.9**).
- Le niveau d'utilisation des MII chez les enfants de moins de 5 ans augmente avec le quintile de bien-être économique du ménage passant de 69 % dans le plus bas à 83 % dans le plus élevé (**Tableau 10.8**).

10.4 PALUDISME PENDANT LA GROSSESSE

Traitement Préventif Intermittent pendant la grossesse (TPIg)

Pourcentage de femmes qui ont pris au moins trois doses de SP/Fansidar au cours de leur dernière grossesse dont au moins une a été reçue lors d'une visite prénatale.

Échantillon : Femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années ayant précédé l'enquête.

L'infection palustre durant la grossesse est un problème majeur de santé publique au Bénin, comportant des risques importants pour la femme enceinte, le fœtus et le nouveau-né. Le traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse (TPIg) est un protocole thérapeutique complet d'antipaludiques administrés aux femmes enceintes au cours des visites prénatales de routine pour prévenir le paludisme. Le TPIg permet de prévenir les épisodes de paludisme chez la femme enceinte, l'anémie maternelle et fœtale, la parasitémie placentaire, le faible poids à la naissance et la mortalité néonatale.

L'Organisation Mondiale de la Santé recommande une approche à 3 volets pour réduire les conséquences négatives sur la santé, associées au paludisme pendant la grossesse (PPG) : diagnostic et traitement rapide de l'infection confirmée, utilisation de moustiquaire imprégnée d'insecticide et TPIg (OMS 2004).

La sulfadoxine-pyriméthamine (SP), appelée aussi Fansidar, est le médicament recommandé à titre préventif pour le TPIg au Bénin. Depuis plus de 10 ans, le Ministère de la Santé a mis en place le TPIg, consistant en l'administration d'au moins deux doses de SP/Fansidar durant les visites prénatales de routine aux second et troisième trimestres de grossesse (TPIg2+) pour protéger la femme enceinte et le futur enfant du paludisme. En 2016, le programme national de lutte contre le paludisme a adopté la recommandation de l'OMS 2012, consistant à administrer 1 dose de SP/Fansidar lors de chaque visite prénatale après le premier trimestre, en respectant un intervalle d'au moins 1 mois entre les doses (OMS 2012a ; OMS 2012b). L'indicateur utilisé pour mesurer la couverture de cette intervention est le pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années ayant précédé l'enquête qui ont reçu 3 doses ou plus de SP/Fansidar pour prévenir le paludisme au cours de leur grossesse la plus récente (TPIg3+).

Dans l'ensemble, 33 % des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des deux années ayant précédé l'enquête ont déclaré avoir reçu deux doses ou plus de SP/Fansidar dont au moins une a été reçue lors d'une visite prénatale. Seulement 13 % ont déclaré en avoir reçu trois doses dont au moins une a été reçue lors d'une visite prénatale (**Tableau 10.10** et **Graphique 10.10**).


Tendances : Le pourcentage de femmes qui ont suivi un TPIg3⁺ ou qui ont pris 3 doses ou plus de SP/Fansidar dont au moins une a été reçue lors d'une visite prénatale a augmenté entre 2006 et 2017-2018 passant de moins de 1 % à 13 % (**Graphique 10.10**).

Variations par caractéristique

- Les proportions de femmes ayant pris trois doses ou plus de SP/Fansidar et qui en ont reçu au moins une au cours d'une visite prénatale sont plus élevées en milieu urbain (16 %), dans le département du Mono (26 %) et les plus faibles en milieu rural (12 %), dans les départements de l'Alibori et du Borgou (7 % et 8 % respectivement) (**Tableau 10.10**).
- La prise de 3 doses ou plus de SP/Fansidar dont au moins une a été reçue lors d'une visite prénatale augmente avec le niveau d'instruction de la femme. En effet, le pourcentage de femmes ayant pris 3 doses ou plus de SP/Fansidar passe de 10 % chez celles qui n'ont aucun niveau d'instruction à 26 % chez celles qui ont un niveau d'instruction secondaire 2^d cycle ou plus.
- Le pourcentage de femmes ayant pris 3 doses ou plus de SP/Fansidar et qui en ont reçu au moins une au cours d'une visite prénatale augmente avec le niveau de bien-être du ménage, passant de 6 % chez les femmes des ménages du quintile le plus bas à 23 % chez celles du quintile le plus élevé, soit un pourcentage environ 4 fois plus élevé.

Graphique 10.10 Tendances de l'utilisation du TPIg par les femmes enceintes

Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années précédant l'enquête qui ont reçu au moins 1, 2, ou 3 doses de SP/Fansidar dont, au moins, une dose au cours d'une visite prénatale



10.5 PRISE EN CHARGE DU PALUDISME CHEZ LES ENFANTS

Recherche de soins pour les enfants de moins de 5 ans avec de la fièvre

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre dans les 2 semaines ayant précédé l'interview pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement auprès d'un prestataire de santé, d'un établissement de santé ou d'une pharmacie.

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre dans les deux semaines avant l'interview.

Diagnostic du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans avec de la fièvre

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre, au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, à qui on a prélevé du sang au doigt ou au talon pour être testé. C'est une mesure indirecte du test de diagnostic du paludisme.

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview.

Combinaison thérapeutique à base d'Artémisinine (CTA) pour les enfants de moins de 5 ans avec de la fièvre

Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre, au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, qui ont pris des antipaludiques, pourcentage ayant pris une combinaison thérapeutique à base d'Artémisinine (CTA).

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview.

Au Bénin, l'initiative de la gratuité du traitement du paludisme chez la femme enceinte et les enfants de moins de 5 ans a été lancée en octobre 2011 avec la mise en place de la Combinaison thérapeutique à base d'Artémisinine (CTA) au niveau communautaire et dans l'ensemble des 34 zones sanitaires. Avant cette date, toute fièvre était traitée comme un accès palustre avec des antipaludiques de tout genre. Mais en réponse aux cas de résistances accrue de l'agent pathogène du paludisme aux antipaludiques traditionnels, le traitement ne peut plus être mis en œuvre que chez les sujets ayant subi un test de diagnostic biologique du paludisme et dont le résultat s'est révélé positif.


Dans l'ensemble, 19 % des enfants de moins de 5 ans ont eu de la fièvre au cours des deux semaines ayant précédé l'interview. Pour seulement un peu plus d'un enfant malade sur deux (53 %), on a recherché des conseils ou un traitement et, pour 28 %, on a recherché des conseils ou un traitement le jour même ou le jour après. En outre, pour environ un enfant sur cinq (18 %), on a effectué un prélèvement du sang au doigt ou au talon pour être testé (**Tableau 10.11**).

Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview et qui ont eu recours à un antipaludique, 37 % ont utilisé de la CTA, 20 % ont utilisé de la quinine en comprimés, 17 % de la quinine injectable et 19 % ont de la chloroquine dont, notons-le, l'utilisation a été proscrite depuis plus d'une décennie déjà au Bénin (**Tableau 10.13**).

Tendances : Entre 2011-2012 et 2017-2018, le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview et pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement a légèrement diminué, passant de 58 % à 53 %. Par contre, concernant la prise de CTA, on constate la tendance inverse, le pourcentage d'enfants avec de la fièvre et traités avec une CTA étant passé de 1 % en 2006 à 32 % en 2011-2012 et à 37 % en 2017-2018 (**Graphique 10.11**). Concernant le pourcentage d'enfants avec de la fièvre et à qui on a prélevé du sang pour être testé, on ne constate pas de changement dans la période (17 % contre 18 %).

Graphique 10.11 Tendances de l'utilisation des CTA par les enfants ayant eu de la fièvre

Parmi les enfants ayant eu récemment de la fièvre et qui ont pris un antipaludique, pourcentage ayant reçu une CTA



Variations par caractéristique

- C'est surtout dans le secteur public (41 %), essentiellement les centres de santé du gouvernement (31 %), et le secteur privé (34 %), en majorité dans les hôpitaux et cliniques privés (12 %) et les pharmacies (18 %), que l'on recherche les conseils ou les traitements pour les enfants ayant de la fièvre (**Tableau 10.12**).
- Le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview et pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement augmente avec le niveau d'instruction de la mère. Plus la mère est instruite, plus elle a tendance à rechercher des conseils ou un

traitement pour son enfant souffrant de la fièvre. Le pourcentage passe de 49 % parmi les enfants dont la mère n'a aucun niveau d'instruction à 73 % parmi ceux dont elle a le niveau secondaire 2^d cycle ou plus (**Tableau 10.11**).

- Cette tendance est également observée pour le quintile de bien-être du ménage. Le pourcentage d'enfants ayant eu de la fièvre pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement varie de 39 % dans le quintile le plus bas à 69 % dans le plus élevé (**Tableau 10.11**).
- Le recours à l'utilisation de la quinine en comprimé pour le traitement du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans augmente du quintile le plus bas au plus élevé, passant de 11 % à 28 % (**Tableau 10.13**).

10.6 PRÉVALENCE DU FAIBLE NIVEAU D'HÉMOGLOBINE CHEZ LES ENFANTS

Prévalence du faible niveau d'hémoglobine chez les enfants

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont le niveau d'hémoglobine est inférieur à 8,0 grammes par décilitre (g/dl) de sang. Le seuil de 8,0 g/dl est souvent utilisé pour classer l'anémie liée au paludisme. C'est un seuil différent de celui utilisé pour définir l'anémie sévère dans le chapitre nutrition (7,0 g/dl).

Échantillon : Enfants de 6-59 mois

L'anémie, un état pathologique caractérisé par une baisse anormale du taux d'hémoglobine dans le sang, provoque une diminution de la quantité d'oxygène dans les tissus et les organes du corps et réduit leur capacité de fonctionnement. L'anémie est associée à des troubles du développement moteur et cognitif chez l'enfant. Les causes principales de l'anémie chez les enfants sont le paludisme et une carence en fer, folates, vitamine B12, ou d'autres nutriments. D'autres problèmes comme des infections causées par des vers intestinaux, les hémoglobinopathies et la drépanocytose peuvent aussi être responsables de l'anémie. Bien que l'anémie ne soit pas spécifique au paludisme, les tendances de la prévalence de l'anémie peuvent refléter la morbidité causée par le paludisme. Elles varient en fonction des changements de la couverture des interventions dans le domaine du paludisme (Korenromp 2004). Les interventions dans le domaine du paludisme ont été associées à une réduction de 60 % du risque d'anémie en utilisant un seuil de 8,0 g/dl (RBM 2003). Globalement, le taux de couverture des tests d'hémoglobine est élevé puisqu'un échantillon de sang a été prélevé pour 98 % des enfants éligibles (**Tableau 10.14**).

Dans l'ensemble, au Bénin environ 9 % des enfants de 6 à 59 mois ont un taux d'hémoglobine inférieur à 8,0 g/dl (**Tableau 10.15**).

Tendances : Au Bénin, entre 2011-2012 et 2017-2018, le pourcentage d'enfants de 6 à 59 mois ayant un taux d'hémoglobine inférieur à 8,0 g/dl a légèrement augmenté, passant de 7 % à 9 %.


Variations par caractéristique

- La prévalence de l'hémoglobine inférieure à 8,0 g/dl chez les enfants de 6 à 59 mois varie au Bénin selon l'âge de l'enfant. Comprise entre 11 % et 12 % parmi ceux de 6-23 mois, elle tend à diminuer par la suite pour concerner 5 % des enfants de 48-59 mois.
- Les départements les plus touchés par la prévalence du niveau d'hémoglobine inférieure à 8 g/dl chez les enfants de 6 à 59 mois sont l'Atacora (18 %), le Borgou (12 %) et l'Alibori (11 %). Les moins touchés sont le Littoral (2 %) et les Collines (4 %).

- La prévalence de l'hémoglobine inférieure à 8,0 g/dl varie avec le niveau d'instruction de la mère, de 11 % parmi les enfants dont la mère n'a aucun niveau d'instruction à 1 % parmi ceux dont elle a le niveau secondaire 2^d cycle ou plus (**Graphique 10.12**).
- Le pourcentage d'enfants de 6-59 mois ayant un niveau d'hémoglobine inférieure à 8,0 g/dl diminue avec le niveau de bien-être économique du ménage. Plus le ménage est riche moins les enfants ont un niveau d'hémoglobine inférieure à 8,0 g/dl. En effet, la prévalence passe de 14 % dans le quintile le plus bas à 3 % dans le plus élevé.

Graphique 10.12 Prévalence de faible niveau d'hémoglobine chez les enfants par niveau d'instruction de la mère

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont le niveau d'hémoglobine est inférieur à 8,0g/dl



10.7 PREVALENCE DU PALUDISME CHEZ LES ENFANTS

Prévalence du paludisme chez les enfants

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois classés comme étant infectés par le paludisme selon les résultats de la microscopie

Échantillon : Enfants de 6-59 mois

Au Bénin, les enfants reconnus comme étant les plus vulnérables au paludisme sont les moins de 5 ans. De ce fait, les enfants de cette tranche d'âge bénéficient depuis plusieurs années déjà d'une attention particulière des autorités gouvernementales et sanitaires. Parmi les mesures de traitement mises en œuvre, on note un meilleur accès aux tests de diagnostic biologique du paludisme auxquels il faut recourir avant la prise en charge de l'état fébrile de l'enfant.

La quasi-totalité des enfants de 6-59 mois (98 % pour le TDR et 93 % pour la microscopie) ont été testés pour le paludisme (**Tableau 10.14**). Pour 36 % d'entre eux, le test du diagnostic rapide s'est révélé positif et pour 39 %, le test de gouttes épaisses au microscope est positif (**Tableau 10.16**).

Variations par caractéristique


- La prévalence du paludisme selon les résultats de la microscopie augmente avec l'âge de l'enfant. D'un minimum de 27 % à 6-8 mois, elle augmente pour se situer à 35 % à 18-23 mois et à 45 % dans le groupe d'âges 36-47 mois.
- La prévalence du paludisme varie entre les départements. Il faut préciser ici que les kits de tests qui se sont révélés défectueux au début de l'enquête et qui ont été changés expliquent, très certainement, les écarts entre les résultats des TDR et de la microscopie dans les départements du Littoral et de l'Atlantique.

La prévalence du paludisme basée sur la microscopie varie de manière importante en fonction du milieu de résidence et du département : elle est plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain (43 % contre 32 %), dans les autres villes qu'à Cotonou (34 % contre 17 %) et dans les départements, elle varie d'un minimum de 17 % dans le Littoral à 51 % dans le Couffo (**Tableau 10.16** et **Graphique 10.13**).

- La prévalence du paludisme selon les résultats au microscope varie en fonction du niveau d'instruction de la mère. Moins la mère est instruite, plus la prévalence est élevée. Elle varie de 44 % chez les enfants dont la mère n'a aucun niveau d'instruction à 20 % chez ceux dont elle a le niveau secondaire 2^d cycle ou plus.
- La prévalence du paludisme selon les résultats au microscope varie également en fonction du niveau de bien-être économique du ménage. Elle a tendance à diminuer avec l'amélioration du niveau de bien-être économique, passant de 55 % dans le quintile le plus bas à 23 % dans le plus élevé (**Graphique 10.14**).


Graphique 10.13 Prévalence du paludisme chez les enfants par département

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont le résultat au test de parasitémie palustre est positif selon l'examen microscopique



Graphique 10.14 Prévalence du paludisme chez les enfants par bien-être économique du ménage

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont le résultat du test de parasitémie palustre est positif selon l'examen microscopique



LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur le paludisme, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 10.1 Possession de moustiquaires par les ménages**
- **Tableau 10.2 Pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide résiduel (PID) contre les moustiques**
- **Tableau 10.3 Source d'obtention des moustiquaires**
- **Tableau 10.4 Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)**
- **Tableau 10.5 Accès à une MII**
- **Tableau 10.6 Utilisation des moustiquaires par les ménages**
- **Tableau 10.7 Utilisation des MII existantes**
- **Tableau 10.8 Utilisation des moustiquaires par les enfants**
- **Tableau 10.9 Utilisation des moustiquaires par les femmes enceintes**
- **Tableau 10.10 Utilisation du traitement préventif intermittent (TPIg) par les femmes pendant la grossesse**
- **Tableau 10.11 Prévalence, diagnostic et traitement précoce des enfants avec de la fièvre**
- **Tableau 10.12 Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant de la fièvre**
- **Tableau 10.13 Type d'antipaludiques utilisés**
- **Tableau 10.14 Couverture des tests d'anémie et du paludisme auprès des enfants**
- **Tableau 10.15 Niveau d'hémoglobine < 8,0 g/dl chez les enfants**
- **Tableau 10.16 Prévalence du paludisme chez les enfants**

Tableau 10.1 Possession de moustiquaires par les ménages

Pourcentage de ménages qui possèdent, au moins, une moustiquaire (traitée ou non traitée) et une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII); nombre moyen de moustiquaires et de MII par ménage; et pourcentage de ménages qui possèdent, au moins, une moustiquaire et une MII pour deux personnes qui ont passé la nuit avant l'interview dans le ménage, selon certaines caractéristiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de ménages ayant, au moins, une moustiquaire		Nombre moyen de moustiquaires par ménage		Effectif de ménages	Pourcentage de ménages ayant, au moins, une moustiquaire pour deux personnes qui ont passé la nuit avant l'interview dans le ménage		Effectif de ménages avec au moins une personne qui a passé la nuit avant l'interview dans le ménage
	Une mousti- quaire quelconque	Une mousti- quaire imprégnée d'insecticide (MII) ¹	Une mousti- quaire quelconque	Une mousti- quaire imprégnée d'insecti- cide (MII) ¹		Une mousti- quaire quelconque	Une mousti- quaire imprégnée d'insecticide (MII) ¹	
Résidence								
Cotonou	94,6	91,7	2,6	2,5	852	71,8	67,4	851
Autres villes	92,1	90,0	2,5	2,4	5 252	61,9	59,7	5 237
Ensemble urbain	92,5	90,2	2,5	2,4	6 104	63,3	60,8	6 088
Rural	93,0	92,4	2,7	2,6	8 052	61,5	60,3	8 026
Département								
Alibori	87,7	87,1	2,8	2,7	1 192	44,6	44,0	1 183
Atacora	94,2	94,0	3,4	3,4	923	59,4	59,1	922
Atlantique	95,6	94,6	2,7	2,6	1 969	74,3	71,2	1 962
Borgou	88,3	88,0	2,5	2,5	1 498	47,3	47,0	1 491
Collines	96,9	96,3	2,9	2,8	981	69,3	68,4	976
Couffo	95,6	95,4	2,4	2,4	1 108	64,7	64,3	1 108
Donga	95,1	94,9	3,3	3,3	740	66,3	65,7	740
Littoral	94,6	91,7	2,6	2,5	852	71,8	67,4	851
Mono	94,0	93,6	2,4	2,3	879	73,9	72,9	874
Ouémé	84,2	78,0	2,0	1,8	1 633	55,1	49,6	1 627
Plateau	94,7	94,2	2,4	2,4	984	62,2	61,8	983
Zou	97,4	97,0	2,5	2,4	1 399	64,3	63,4	1 397
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	89,3	88,9	2,5	2,5	2 501	52,7	52,2	2 494
Second	93,7	93,5	2,6	2,6	2 675	58,7	57,9	2 668
Moyen	93,5	92,8	2,6	2,6	2 798	62,5	61,6	2 787
Quatrième	93,6	92,1	2,6	2,5	2 951	64,6	62,7	2 942
Le plus élevé	93,3	90,1	2,6	2,5	3 231	70,3	66,2	3 223
Ensemble	92,8	91,5	2,6	2,5	14 156	62,2	60,5	14 114

¹ Une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Correspond à la Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée d'Action (MIILDA) utilisée dans les EDS Bénin 2006 et 2011-2012

Tableau 10.2 Pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide résiduel (PID) contre les moustiques

Pourcentage de ménages ayant reçu la visite de quelqu'un qui a pulvérisé d'insecticide les murs intérieurs du logement contre les moustiques (PID) au cours des 12 derniers mois ; pourcentage de ménages avec au moins, une MII et/ou ayant bénéficié d'une PID au cours des 12 derniers mois, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de ménages ayant bénéficié d'une PID ¹ au cours des 12 derniers mois	Pourcentage de ménages avec au moins une MII ² et/ou ayant bénéficié d'une PID au cours des 12 derniers mois	Effectif de ménages
Résidence			
Cotonou	2,9	91,9	852
Autres villes	7,9	90,3	5 252
Ensemble urbain	7,2	90,5	6 104
Rural	9,7	93,1	8 052
Département			
Alibori	31,0	90,4	1 192
Atacora	36,2	94,7	923
Atlantique	0,7	94,7	1 969
Borgou	0,2	88,0	1 498
Collines	0,4	96,3	981
Couffo	0,2	95,4	1 108
Donga	61,5	97,9	740
Littoral	2,9	91,9	852
Mono	0,2	93,6	879
Ouémé	0,1	78,0	1 633
Plateau	0,5	94,2	984
Zou	0,6	97,0	1 399
Quintiles de bien-être économique			
Le plus bas	9,8	89,6	2 501
Second	9,8	94,2	2 675
Moyen	11,7	93,4	2 798
Quatrième	7,9	92,4	2 951
Le plus élevé	4,8	90,4	3 231
Ensemble	8,7	92,0	14 156

¹ La pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide résiduel (PID) est limitée à la pulvérisation faite par une organisation gouvernementale, privée ou non gouvernementale.

² Une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Correspond à la Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée d'action (MIILDA) utilisée dans les EDS Bénin 2006 et 2011-2012

Tableau 10.3 Source d'obtention des moustiquaires

Répartition (en %) des moustiquaires par source d'obtention, selon certaines caractéristiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Campagne de distribution	Visite prénatale	Visite pour vaccination	Établissement de santé du gouvernement	Pharmacie	Boutique/marché	Autre	Ne sait pas/Manquant	Total	Effectif de moustiquaires
Type de moustiquaire										
MII ¹	91,2	3,2	1,5	0,1	1,2	2,2	0,3	0,2	100,0	35 944
Autre ²	0,0	12,9	2,9	0,4	12,3	43,5	12,8	15,2	100,0	802
Résidence										
Cotonou	75,4	3,6	2,1	0,3	7,4	8,5	2,0	0,8	100,0	2 215
Autres villes	87,0	3,5	1,7	0,1	2,1	3,7	0,9	1,0	100,0	13 078
Ensemble urbain	85,3	3,5	1,8	0,1	2,9	4,4	1,0	1,0	100,0	15 293
Rural	92,0	3,4	1,3	0,1	0,4	2,1	0,3	0,2	100,0	21 453
Département										
Alibori	97,8	0,8	0,4	0,0	0,1	0,9	0,0	0,0	100,0	3 289
Atacora	95,8	2,1	1,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,3	100,0	3 113
Atlantique	81,3	5,2	2,3	0,1	2,7	7,0	1,0	0,4	100,0	5 318
Borgou	93,2	2,6	0,9	0,2	1,4	1,2	0,4	0,2	100,0	3 713
Collines	90,1	4,1	1,4	0,2	0,5	2,9	0,8	0,0	100,0	2 817
Couffo	91,9	3,9	1,7	0,1	0,7	1,2	0,3	0,1	100,0	2 644
Donga	95,8	2,0	1,0	0,0	0,3	0,6	0,2	0,0	100,0	2 471
Littoral	75,4	3,6	2,1	0,3	7,4	8,5	2,0	0,8	100,0	2 215
Mono	92,1	2,8	1,1	0,0	0,7	2,9	0,2	0,2	100,0	2 094
Ouémé	79,7	5,8	1,8	0,0	2,9	4,2	1,7	3,9	100,0	3 256
Plateau	92,6	2,9	1,4	0,3	0,4	1,8	0,5	0,1	100,0	2 349
Zou	89,6	3,7	2,4	0,1	0,4	3,2	0,3	0,3	100,0	3 468
Quintiles de bien-être économique										
Le plus bas	94,9	2,5	1,1	0,0	0,2	0,9	0,3	0,2	100,0	6 301
Second	94,2	2,7	1,1	0,1	0,1	1,3	0,2	0,2	100,0	7 003
Moyen	92,0	4,0	1,3	0,0	0,2	2,0	0,3	0,2	100,0	7 344
Quatrième	88,5	4,0	1,7	0,2	0,6	3,7	0,6	0,7	100,0	7 655
Le plus élevé	79,2	3,6	2,2	0,2	5,4	6,5	1,5	1,3	100,0	8 442
Ensemble	89,2	3,4	1,5	0,1	1,5	3,1	0,6	0,6	100,0	36 746

¹ Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Correspond à la Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée d'action (MIILDA) utilisée dans les EDS Bénin 2006 et 2011-2012.

² N'importe quelle moustiquaire qui n'est pas une MII.

Tableau 10.4 Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)

Répartition (en %) de la population de fait des ménages par nombre de MII que possède le ménage et pourcentage ayant accès à une MII selon le nombre de personnes qui ont passé la nuit avant l'interview dans le ménage, EDSB-V Bénin 2017-2018

Nombre d'MII ¹	Nombre de personnes qui ont passé la nuit dans le ménage avant l'interview								Ensemble
	1	2	3	4	5	6	7	8+	
0	16,6	10,8	8,3	7,0	6,5	5,4	6,3	9,2	7,9
1	54,3	32,9	22,9	12,2	7,0	4,2	3,6	2,1	8,2
2	22,5	40,7	44,8	46,7	40,0	31,3	21,6	9,2	26,3
3	3,7	10,2	16,0	20,8	27,0	31,7	31,2	18,2	22,2
4	1,9	4,0	5,6	10,2	12,7	17,2	21,3	19,7	15,5
5	0,4	0,6	1,7	1,8	4,4	6,1	8,1	12,9	7,4
6	0,3	0,5	0,5	0,8	1,6	2,4	5,6	9,9	5,0
7	0,4	0,4	0,2	0,5	0,9	1,7	2,4	18,8	7,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	1 387	2 871	5 822	8 283	10 024	9 513	8 270	26 928	73 098
Pourcentage ayant accès à une MII ^{1,2}	83,4	89,2	84,1	86,9	81,4	81,3	77,5	68,0	77,2

¹ Une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Correspond à la Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée d'action (MIILDA) utilisée dans les EDS Bénin 2006 et 2011-2012

² Pourcentage de la population de fait des ménages qui aurait pu dormir sous une MII si chaque MII du ménage était utilisée par deux personnes au maximum.

Tableau 10.5 Accès à une MII

Pourcentage de la population de fait des ménages ayant accès à une MII dans le ménage, selon certaines caractéristiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de la population de fait ayant accès à une MII ¹	Effectif de personnes
Résidence		
Cotonou	83,3	3 687
Autres villes	77,1	25 689
Ensemble urbain	77,9	29 376
Rural	76,7	43 722
Département		
Alibori	64,4	9 013
Atacora	81,7	6 371
Atlantique	85,1	8 655
Borgou	68,5	9 195
Collines	83,0	4 758
Couffo	80,4	5 071
Donga	82,7	4 840
Littoral	83,3	3 687
Mono	85,7	3 468
Ouémé	68,4	6 744
Plateau	79,8	4 521
Zou	80,6	6 776
Quintiles de bien-être économique		
Le plus bas	70,6	14 549
Second	76,7	14 617
Moyen	78,3	14 582
Quatrième	79,3	14 676
Le plus élevé	80,9	14 674
Ensemble	77,2	73 098

¹ Pourcentage de la population de fait des ménages qui aurait pu dormir sous une MII si chaque MII du ménage était utilisée par deux personnes au maximum. Une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Correspond à la Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée d'action (MIILDA) utilisée dans les EDS Bénin 2006 et 2011-2012.

Tableau 10.6 Utilisation des moustiquaires par les ménages

Pourcentage de la population de fait des ménages qui, la nuit avant l'interview, a dormi sous une moustiquaire (traitée ou non) et sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) ; et parmi la population de fait des ménages avec, au moins, une MII, pourcentage qui a dormi sous une MII la nuit avant l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Population des ménages			Population de fait des ménages avec, au moins, une MII ¹	
	Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire (traitée ou non) la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit dernière	Effectif	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit dernière	Effectif
Age					
<5	77,7	76,3	13 551	82,2	12 582
5-14	69,2	68,1	21 752	73,6	20 119
15-34	70,9	69,3	21 401	75,9	19 549
35-49	76,4	74,7	8 726	80,7	8 076
50+	73,1	71,5	7 668	78,5	6 994
Sexe					
Masculin	70,3	68,9	35 306	75,2	32 378
Féminin	74,6	73,1	37 793	79,1	34 942
Résidence					
Cotonou	84,4	80,7	3 687	85,5	3 477
Autres villes	73,2	71,4	25 689	77,9	23 518
Ensemble urbain	74,6	72,5	29 376	78,9	26 995
Rural	71,2	70,2	43 722	76,1	40 325
Département					
Alibori	64,1	63,7	9 013	75,9	7 566
Atacora	67,8	67,6	6 371	71,1	6 062
Atlantique	81,5	78,7	8 655	81,8	8 330
Borgou	68,0	67,7	9 195	77,3	8 058
Collines	69,0	68,1	4 758	70,0	4 626
Couffo	71,1	70,8	5 071	73,9	4 858
Donga	64,0	63,3	4 840	66,0	4 637
Littoral	84,4	80,7	3 687	85,5	3 477
Mono	84,6	83,3	3 468	88,4	3 266
Ouémé	69,5	64,4	6 744	78,6	5 529
Plateau	75,0	74,5	4 521	78,1	4 317
Zou	81,2	80,0	6 776	82,3	6 594
Quintiles de bien-être économique					
Le plus bas	65,6	65,3	14 549	74,4	12 774
Second	72,0	71,3	14 617	76,4	13 659
Moyen	72,2	71,4	14 582	76,3	13 637
Quatrième	74,3	72,5	14 676	77,5	13 735
Le plus élevé	78,4	75,0	14 674	81,4	13 517
Ensemble	72,5	71,1	73 098	77,2	67 321

¹ Une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Correspond à la Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée d'action (MIILDA) utilisée dans les EDS Bénin 2006 et 2011-2012

Tableau 10.7 Utilisation des MII existantes

Pourcentage de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MI) qui ont été utilisées par une personne la nuit ayant précédé l'interview, selon certaines caractéristiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique	Pourcentage de MII existantes ¹ utilisées la nuit dernière	Effectif de MII ¹
Résidence		
Cotonou	74,6	2 095
Autres villes	74,4	12 692
Ensemble urbain	74,4	14 787
Rural	72,7	21 157
Département		
Alibori	90,6	3 268
Atacora	70,4	3 106
Atlantique	67,9	5 136
Borgou	86,1	3 685
Collines	59,7	2 784
Couffo	67,8	2 631
Donga	63,9	2 447
Littoral	74,6	2 095
Mono	75,0	2 054
Ouémé	72,2	2 983
Plateau	72,2	2 330
Zou	76,5	3 425
Quintiles de bien-être économique		
Le plus bas	73,1	6 270
Second	74,5	6 937
Moyen	72,6	7 247
Quatrième	72,7	7 481
Le plus élevé	74,0	8 009
Ensemble	73,4	35 944

¹ Une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MI) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Correspond à la Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée d'action (MIILDA) utilisée dans les EDS Bénin 2006 et 2011-2012.

Tableau 10.8 Utilisation des moustiquaires par les enfants

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui, la nuit avant l'interview, ont dormi sous une moustiquaire (traitée ou non) et sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) ; et parmi les enfants de moins de 5 ans des ménages avec, au moins, une MII, pourcentage qui ont dormi sous une MII la nuit avant l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Enfants de moins de 5 ans dans tous les ménages			Enfants de moins de 5 ans dans les ménages ayant au moins une MII ¹		Enfants de 6-59 mois dans les ménages ayant au moins une MII ¹	
	Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire (traitée ou non) la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit dernière	Effectif d'enfants	Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire MII ¹ la nuit dernière	Effectif d'enfants	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit dernière	Effectif d'enfants
Âge en mois							
<12	79,3	77,6	3 000	83,7	2 784	84,6	1 458
12-23	79,7	78,5	2 615	84,6	2 425	84,6	2 425
24-35	77,5	76,0	2 531	81,1	2 373	81,1	2 373
36-47	76,5	75,2	2 722	81,2	2 521	81,2	2 521
48-59	75,3	74,2	2 683	80,3	2 479	80,3	2 479
Sexe							
Masculin	77,8	76,3	6 853	82,3	6 352	82,3	5 703
Féminin	77,6	76,3	6 698	82,1	6 230	82,0	5 553
Résidence							
Cotonou	89,4	86,4	585	89,5	564	89,7	517
Autres villes	80,5	78,8	4 635	84,7	4 312	84,9	3 859
Ensemble urbain	81,5	79,7	5 220	85,3	4 876	85,5	4 376
Rural	75,3	74,2	8 331	80,2	7 706	80,0	6 881
Département							
Alibori	69,5	69,1	1 779	81,5	1 508	81,9	1 327
Atacora	72,4	72,2	1 205	75,8	1 149	75,5	1 026
Atlantique	88,6	85,7	1 500	88,7	1 450	89,1	1 308
Borgou	70,6	70,3	1 831	79,5	1 618	78,8	1 471
Collines	71,3	70,4	859	72,3	836	71,9	742
Couffo	78,8	78,5	960	81,5	926	81,0	820
Donga	71,7	70,1	911	72,6	880	73,1	772
Littoral	89,4	86,4	585	89,5	564	89,7	517
Mono	89,3	87,4	611	91,3	586	91,2	521
Ouémé	78,0	73,4	1 215	86,3	1 033	86,0	937
Plateau	80,5	79,7	799	83,5	762	83,7	684
Zou	86,1	85,2	1 296	86,9	1 271	86,8	1 133
Quintiles de bien-être économique							
Le plus bas	69,1	68,8	2 898	77,9	2 559	77,5	2 282
Second	76,3	75,4	2 792	80,5	2 618	80,2	2 339
Moyen	77,9	77,2	2 750	81,8	2 593	81,7	2 317
Quatrième	80,9	78,9	2 685	83,5	2 538	83,7	2 282
Le plus élevé	85,8	82,5	2 426	88,0	2 275	88,3	2 036
Ensemble	77,7	76,3	13 551	82,2	12 582	82,2	11 257

Note: Le tableau est basé sur les enfants ayant passé la nuit précédant l'interview dans le ménage.

¹ Une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Correspond à la Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée d'action (MIILDA) utilisée dans les EDS Bénin 2006 et 2011-2012.

Tableau 10.9 Utilisation des moustiquaires par les femmes enceintes

Pourcentage de femmes de 15-49 ans enceintes qui, la nuit avant l'interview, ont dormi sous une moustiquaire (traitée ou non) et sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) ; et parmi les femmes de 15-49 ans enceintes des ménages avec, au moins, une MII, pourcentage qui ont dormi sous une MII la nuit avant l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Parmi les femmes enceintes de 15-49 ans dans tous les ménages			Parmi les femmes de 15-49 ans enceintes dans les ménages ayant au moins une MII ¹	
	Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire (traitée ou non) la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit dernière	Effectif de femmes enceintes	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit dernière	Effectif de femmes enceintes
Résidence					
Cotonou	84,9	81,7	63	84,5	61
Autres villes	81,8	80,3	566	85,4	533
Ensemble urbain	82,1	80,5	630	85,3	594
Rural	79,4	78,6	1 080	84,6	1 003
Département					
Alibori	69,1	69,1	211	83,7	175
Atacora	79,1	79,1	138	83,8	131
Atlantique	86,5	83,0	195	88,3	184
Borgou	81,3	81,3	247	88,9	226
Collines	76,4	74,7	133	77,0	129
Couffo	80,7	80,7	122	82,3	119
Donga	75,1	74,6	121	78,4	115
Littoral	84,9	81,7	63	84,5	61
Mono	91,4	91,4	73	95,5	70
Ouémé	86,3	81,7	109	87,1	102
Plateau	77,5	76,3	123	80,4	117
Zou	85,9	85,1	172	86,9	168
Niveau d'instruction					
Aucun	77,4	76,7	959	84,8	867
Primaire	83,2	81,5	379	83,7	369
Secondaire 1 ^{er} cycle	84,9	83,2	286	86,2	276
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	86,4	85,1	86	85,5	85
Quintiles de bien-être économique					
Le plus bas	76,4	76,4	317	86,2	281
Second	78,4	78,3	340	83,3	320
Moyen	79,9	78,9	372	85,1	345
Quatrième	81,4	80,1	374	84,0	357
Le plus élevé	86,2	82,6	307	85,8	296
Ensemble	80,4	79,3	1 709	84,8	1 597

Note : le tableau est basé sur les femmes qui ont passé la nuit avant l'interview dans le ménage

¹ Une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Correspond à la Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée d'action (MIILDA) utilisée dans les EDS Bénin 2006 et 2011-2012.

Tableau 10.10 Utilisation du traitement préventif intermittent (TPIg) par les femmes pendant la grossesse

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des deux années ayant précédé l'enquête qui, pendant la grossesse de la dernière naissance vivante, ont reçu une dose ou plus de SP/Fansidar, ont reçu deux doses ou plus de SP/Fansidar, et qui ont reçu trois doses ou plus de SP/Fansidar, selon certains caractéristiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique	Pourcentage ayant reçu 1 dose ou plus de SP/Fansidar	Pourcentage ayant reçu 1 dose ou plus de SP/Fansidar au cours d'une visite prénatale	Pourcentage ayant reçu 2 doses ou plus de SP/Fansidar qui en ont reçu au moins une au cours d'une visite prénatale	Pourcentage ayant reçu 3 doses ou plus de SP/Fansidar et qui en ont reçu au moins une au cours d'une visite prénatale	Effectif de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 années ayant précédé l'enquête
Résidence					
Cotonou	57,9	56,3	43,9	22,8	242
Autres villes	52,7	52,2	36,8	14,6	1 863
Ensemble urbain	53,3	52,7	37,6	15,5	2 105
Rural	46,5	46,0	30,9	12,0	3 397
Département					
Alibori	39,0	38,2	26,5	7,4	766
Atacora	43,7	43,2	30,3	10,1	499
Atlantique	54,5	54,2	37,2	13,6	595
Borgou	40,2	39,8	21,7	7,6	730
Collines	44,0	43,3	31,5	14,6	353
Couffo	45,6	45,6	30,0	14,0	375
Donga	62,3	61,8	46,1	15,6	391
Littoral	57,9	56,3	43,9	22,8	242
Mono	74,1	74,1	55,6	25,6	225
Ouémé	47,4	45,8	33,5	14,1	479
Plateau	30,7	30,0	21,9	13,0	340
Zou	70,8	70,7	46,3	19,8	508
Niveau d'instruction					
Aucun	44,9	44,3	29,1	9,9	3 458
Primaire	54,6	54,2	38,9	15,6	1 036
Secondaire 1 ^{er} cycle	58,6	58,0	41,7	21,8	731
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	55,8	55,0	45,3	25,6	277
Quintiles de bien-être économique					
Le plus bas	34,3	33,6	20,9	5,6	1 153
Second	46,2	46,0	29,5	8,9	1 139
Moyen	51,5	51,1	34,5	14,4	1 134
Quatrième	55,4	54,8	38,1	16,8	1 097
Le plus élevé	60,0	58,9	46,2	22,6	979
Ensemble	49,1	48,5	33,4	13,3	5 502

Tableau 10.11 Prévalence, diagnostic et traitement précoce des enfants avec de la fièvre

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview ; parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés le jour même ou le jour suivant le début de la fièvre et pourcentage pour lesquels on a effectué un prélèvement de sang au doigt ou au talon pour être testé, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Enfants de moins de 5 ans		Enfants de moins de 5 ans avec de la fièvre				Enfants moins de 5 ans qui ont reçu des médicaments antipaludiques	
	Pourcentage d'enfants avec de la fièvre au cours des 2 semaines précédant l'enquête	Effectif d'enfants	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés ¹	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés le jour même ou le jour suivant ¹	Pourcentage pour lesquels on a effectué de sang au doigt ou au talon pour être testé	Effectif d'enfants	Pourcentage ayant été prise en charge gratuitement	Effectif d'enfants
Âge en mois								
<12	20,9	2 941	53,6	28,0	14,9	614	1,3	69
12-23	24,9	2 515	51,2	28,2	17,7	626	3,3	108
24-35	18,9	2 365	53,3	26,0	19,9	448	2,0	89
36-47	17,9	2 450	58,6	32,7	18,8	439	4,0	95
48-59	14,0	2 416	48,3	22,8	18,6	339	3,2	70
Sexe								
Masculin	20,0	6 415	52,0	27,1	17,3	1 282	3,9	232
Féminin	18,9	6 271	54,4	28,5	18,2	1 184	1,7	198
Résidence								
Cotonou	19,1	558	65,8	47,3	14,0	107	(2,6)	23
Autres villes	17,1	4 382	57,8	33,6	20,0	748	0,6	141
Ensemble urbain	17,3	4 940	58,8	35,3	19,2	855	0,9	163
Rural	20,8	7 746	50,1	23,8	16,9	1 611	4,1	268
Département								
Alibori	22,5	1 718	16,5	10,7	9,8	387	(0,0)	46
Atacora	16,2	1 127	45,2	20,5	21,2	182	(0,0)	26
Atlantique	27,4	1 448	61,0	33,1	11,8	397	2,5	67
Borgou	12,8	1 678	47,6	23,5	23,2	214	(23,1)	34
Collines	16,6	814	80,1	43,1	20,2	135	1,9	47
Couffo	16,7	844	63,9	20,1	18,4	141	*	16
Donga	16,3	831	85,8	55,3	45,6	136	(1,8)	35
Littoral	19,1	558	65,8	47,3	14,0	107	(2,6)	23
Mono	20,9	565	45,6	19,5	18,3	118	*	13
Ouémé	18,9	1 131	59,7	39,8	11,2	213	(0,0)	40
Plateau	30,8	766	46,9	16,5	14,7	236	(1,9)	41
Zou	16,6	1 206	71,4	33,2	27,0	200	(0,0)	44
Niveau d'instruction								
Aucun	19,5	8 301	49,0	25,0	16,8	1 619	3,8	274
Primaire	20,8	2 310	57,7	29,7	18,9	480	1,7	90
Secondaire 1 ^{er} cycle	18,2	1 523	62,8	33,6	19,4	278	(1,1)	50
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	16,2	552	72,9	50,3	23,0	90	*	16
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	17,9	2 713	38,6	17,3	16,0	485	5,6	68
Second	21,1	2 554	49,2	24,2	17,5	538	6,8	85
Moyen	20,7	2 559	48,0	22,8	15,1	529	1,7	95
Quatrième	20,6	2 549	64,2	32,5	18,4	526	1,3	96
Le plus élevé	16,8	2 311	68,6	46,3	22,9	389	0,0	87
Ensemble	19,4	12 686	53,1	27,8	17,7	2 466	2,9	431

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Sont inclus les conseils ou les traitements des sources suivantes : le secteur public, secteur médical privé, boutique, marché et vendeur ambulant de médicaments. Sont exclus les conseils ou traitements d'un praticien traditionnel.

Tableau 10.12 Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant de la fièvre

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques et parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Source	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de chacune des sources :	
	Parmi les enfants avec de la fièvre	Parmi les enfants avec de la fièvre pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés
Secteur public	22,0	40,8
Hôpital gouvernemental	3,6	6,6
Centre de santé du gouvernement	16,9	31,3
Poste de santé du gouvernement	0,4	0,7
Clinique mobile	0,2	0,4
Agent de terrain/ASC	1,1	2,0
Autre	0,1	0,1
Secteur privé	18,5	34,3
Hôpital privé/clinique	6,5	12,0
Pharmacie	9,4	17,5
Médecin privé	0,7	1,3
Clinique mobile	0,4	0,7
Agent de terrain/ASC	1,3	2,5
Autre secteurs privés	0,2	0,4
Autre secteur privé	12,1	22,4
Boutique	6,5	12,0
Praticien traditionnel	0,9	1,7
Marché	1,9	3,6
Vendeur de médicaments itinérants	2,8	5,3
Autre	2,2	4,1
Effectif d'enfants	2 466	1 329

ASC = Agent de Santé Communautaire

Tableau 10.13 Type d'antipaludiques utilisés

Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview qui ont pris n'importe quel antipaludique, pourcentage ayant pris des antipaludiques spécifiques, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'enfants ayant pris :									Effectif d'enfants avec de la fièvre ayant pris n'importe quel antipaludique
	N'importe quelle CTA	SP/ Fansidar	Chloro-quine	Amodi-aquine	Quinine comprimés	Quinine injection	Arte-sunate rectal	Arte-sunate injection	Autre anti-paludique	
Âge en mois										
<6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14
6-11	34,7	2,4	20,3	0,0	18,5	15,9	0,0	9,7	10,7	55
12-23	38,3	3,1	17,1	1,8	15,7	19,4	0,0	2,3	8,8	108
24-35	42,2	3,2	15,4	0,0	24,6	19,2	0,0	3,6	9,0	89
36-47	32,7	1,3	20,2	0,0	24,9	10,8	2,5	2,6	12,3	95
48-59	42,3	0,0	19,4	0,0	15,8	13,3	3,0	4,7	10,0	70
Sexe										
Masculin	41,3	1,6	19,0	0,6	17,9	18,5	1,5	3,8	9,0	232
Féminin	32,0	2,6	18,5	0,3	22,1	14,3	1,2	4,4	10,7	198
Résidence										
Cotonou	(34,7)	(0,0)	(15,5)	(0,0)	(35,6)	(16,3)	(0,0)	(5,2)	(3,6)	23
Autres villes	28,3	1,8	17,4	0,4	25,6	18,0	1,5	6,1	12,0	141
Ensemble urbain	29,2	1,5	17,2	0,4	27,0	17,8	1,3	6,0	10,9	163
Rural	41,8	2,4	19,7	0,5	15,5	15,9	1,4	3,0	9,1	268
Département										
Alibori	(68,0)	(0,0)	(3,4)	(0,0)	(9,9)	(11,4)	(7,7)	(0,0)	(2,2)	46
Atacora	(33,6)	(0,0)	(26,0)	(0,0)	(18,4)	(31,4)	(5,6)	(6,6)	(0,0)	26
Atlantique	25,3	2,8	22,1	0,0	24,2	15,0	0,0	1,7	15,8	67
Borgou	(56,7)	(0,0)	(6,4)	(3,8)	(12,9)	(9,9)	(0,0)	(2,8)	(10,2)	34
Collines	33,7	1,6	29,1	0,0	12,3	19,4	0,0	7,6	5,7	47
Couffo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16
Donga	(49,7)	(3,6)	(12,5)	(0,0)	(20,4)	(15,0)	(0,0)	(0,0)	(2,9)	35
Littoral	(34,7)	(0,0)	(15,5)	(0,0)	(35,6)	(16,3)	(0,0)	(5,2)	(3,6)	23
Mono	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13
Ouémé	(23,2)	(7,2)	(23,1)	(0,0)	(26,2)	(6,2)	(0,0)	(3,0)	(11,1)	40
Plateau	(12,0)	(0,0)	(33,9)	(0,0)	(31,4)	(14,1)	(0,0)	(6,3)	(12,7)	41
Zou	(47,2)	(0,0)	(12,9)	(1,4)	(18,9)	(26,7)	(2,2)	(9,9)	(13,0)	44
Niveau d'instruction de la mère										
Aucun	37,4	0,9	22,1	0,5	18,5	15,5	2,2	4,1	9,9	274
Primaire	33,5	2,9	12,2	0,0	21,3	20,1	0,0	4,1	13,1	90
Secondaire 1 ^{er} cycle	(37,0)	(4,6)	(15,8)	(1,2)	(25,5)	(20,3)	(0,0)	(5,3)	(3,1)	50
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16
Quintiles de bien-être économique										
Le plus bas	47,4	0,0	21,3	1,9	10,6	18,7	0,0	0,0	7,9	68
Second	42,8	1,5	18,9	0,0	16,2	17,7	1,1	1,9	13,9	85
Moyen	34,9	5,0	25,3	0,0	17,5	11,9	0,0	3,9	9,6	95
Quatrième	38,4	0,0	13,6	0,0	25,0	20,6	3,0	6,4	5,9	96
Le plus élevé	24,0	3,3	15,3	0,7	27,6	14,5	2,4	7,1	11,7	87
Ensemble	37,0	2,1	18,8	0,4	19,9	16,6	1,4	4,1	9,8	431

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
CTA = Combinaison Thérapeutique à base d'Artémisinine.

Tableau 10.14 Couverture des tests d'anémie et du paludisme auprès des enfants

Pourcentage d'enfants éligibles de 6-59 mois pour lesquels on a effectué un test d'hémoglobine et de paludisme, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage testé pour :			
	Anémie	Paludisme par TDR	Paludisme avec gouttes épaisses	Effectif d'enfants
Âge en mois				
6-8	97,3	97,0	92,7	439
9-11	97,4	97,4	94,0	381
12-17	98,5	98,1	93,4	669
18-23	97,4	97,1	93,6	698
24-35	98,2	98,2	93,6	1 343
36-47	98,1	97,8	93,7	1 405
48-59	97,1	96,8	92,0	1 413
Sexe				
Masculin	98,3	98,0	93,5	3 191
Féminin	97,3	97,1	92,9	3 157
Interview de la mère				
Interviewée	98,2	97,9	93,5	5 699
Non interviewée mais vivant dans le ménage	78,0	78,7	74,0	127
Non interviewée mais ne vivant pas dans le ménage ¹	97,7	97,7	94,1	522
Résidence				
Cotonou	92,7	92,5	88,4	467
Autres villes	97,8	97,5	93,4	2 070
Ensemble urbain	96,8	96,6	92,5	2 537
Rural	98,4	98,2	93,6	3 811
Département				
Alibori	99,2	98,9	92,4	715
Atacora	99,7	99,7	95,3	598
Atlantique	96,6	96,6	90,6	585
Borgou	98,9	98,6	95,0	812
Collines	98,7	98,1	94,1	478
Couffo	98,0	98,0	93,3	450
Donga	98,5	98,5	93,9	459
Littoral	92,7	92,5	88,4	467
Mono	97,0	96,7	90,1	335
Ouémé	97,3	97,3	94,6	485
Plateau	97,9	97,9	94,7	338
Zou	97,1	96,2	94,1	626
Niveau d'instruction de la mère²				
Aucun	98,4	98,2	93,6	3 851
Primaire	98,0	97,7	93,9	1 230
Secondaire 1 ^{er} cycle	96,8	96,6	93,0	986
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	91,8	91,8	85,8	281
Quintiles de bien-être économique				
Le plus bas	98,8	98,6	93,5	1 316
Second	98,4	98,1	92,9	1 256
Moyen	98,6	98,3	94,1	1 297
Quatrième	98,4	98,2	94,7	1 273
Le plus élevé	94,5	94,4	90,5	1 206
Ensemble	97,8	97,5	93,2	6 348

TDR = Test de Diagnostic Rapide (SD Bioline Malaria Ag Pf Pan).

¹ Y compris les enfants dont la mère est décédée.

² Pour les femmes qui n'ont pas été interviewées, l'information provient du questionnaire Ménage. Non compris les enfants dont la mère n'est pas listée dans le questionnaire Ménage.

Tableau 10.15 Niveau d'hémoglobine < 8,0 g/dl chez les enfants

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont le niveau d'hémoglobine est inférieur à 8,0 g/dl, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Hémoglobine < 8,0 g/dl	Effectif d'enfants
Âge en mois		
6-8	11,5	431
9-11	11,0	363
12-17	12,2	658
18-23	11,0	685
24-35	8,4	1 309
36-47	7,9	1 356
48-59	5,2	1 369
Sexe		
Masculin	9,1	3 136
Féminin	8,2	3 035
Interview de la mère		
Interviewée	8,6	5 571
Non interviewée mais vivant dans le ménage	11,7	95
Non interviewée mais ne vivant pas dans le ménage ¹	8,3	506
Résidence		
Cotonou	1,7	275
Autres villes	7,2	2 050
Ensemble urbain	6,5	2 325
Rural	9,9	3 846
Département		
Alibori	11,2	787
Atacora	18,1	555
Atlantique	5,6	675
Borgou	11,8	818
Collines	3,7	385
Couffo	8,8	445
Donga	7,8	403
Littoral	1,7	275
Mono	6,6	293
Ouémé	6,2	552
Plateau	6,6	338
Zou	6,9	645
Niveau d'instruction de la mère²		
Aucun	10,5	3 765
Primaire	7,3	1 190
Secondaire 1 ^{er} cycle	4,8	975
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	1,2	240
Quintiles de bien-être économique		
Le plus bas	14,1	1 216
Second	10,1	1 249
Moyen	10,2	1 313
Quatrième	5,4	1 289
Le plus élevé	2,8	1 103
Ensemble	8,6	6 171

Note : Le tableau est basé sur les enfants ayant passé la nuit précédant l'interview dans le ménage. Les niveaux d'hémoglobine sont ajustés en fonction de l'altitude en utilisant les formules du CDC (CDC, 1998). L'hémoglobine est mesurée en grammes par décilitre (g/dl).

¹ Y compris les enfants dont la mère est décédée.

² Pour les femmes qui n'ont pas été interviewées, l'information provient du questionnaire Ménage. Non compris les enfants dont la mère n'est pas listée dans le questionnaire Ménage.

Tableau 10.16 Prévalence du paludisme

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont les résultats du test de diagnostic rapide (TDR) et du test de gouttes épaisses (parasitémie palustre) sont classés positifs, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Prévalence du paludisme selon le TDR		Prévalence du paludisme selon le test de gouttes épaisses	
	TDR positif	Effectif d'enfants	Paludisme avec gouttes épaisses	Effectif d'enfants
Âge en mois				
6-8	20,6	431	27,3	412
9-11	23,0	363	30,6	349
12-17	27,5	655	32,4	626
18-23	32,4	682	34,6	657
24-35	38,0	1 309	39,5	1 252
36-47	41,9	1 351	45,4	1 290
48-59	44,3	1 365	43,9	1 293
Sexe				
Masculin	36,4	3 127	39,7	2 980
Féminin	36,4	3 028	38,4	2 899
Interview de la mère				
Interviewée	35,4	5 554	38,2	5 301
Non interviewée mais vivant dans le ménage	35,1	95	41,0	90
Non interviewée mais ne vivant pas dans le ménage ¹	47,6	506	48,1	488
Résidence				
Cotonou	4,2	274	16,7	263
Autres villes	27,4	2 045	34,3	1 958
Ensemble urbain	24,7	2 319	32,2	2 220
Rural	43,5	3 837	43,3	3 659
Département				
Alibori	36,0	785	37,0	737
Atacora	53,9	555	49,7	534
Atlantique	23,7	675	34,2	625
Borgou	51,3	817	44,9	785
Collines	41,6	383	42,3	366
Couffo	54,3	445	51,3	425
Donga	40,2	403	46,9	383
Littoral	4,2	274	16,7	263
Mono	25,9	292	38,0	274
Ouémé	14,5	552	26,2	533
Plateau	33,9	338	37,2	330
Zou	36,8	638	36,9	625
Niveau d'instruction de la mère²				
Aucun	43,2	3 755	43,7	3 578
Primaire	30,6	1 186	35,9	1 136
Secondaire 1 ^{er} cycle	23,4	973	29,7	940
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	11,0	240	20,3	226
Quintiles de bien-être économique				
Le plus bas	58,2	1 213	54,6	1 160
Second	44,1	1 245	43,2	1 181
Moyen	41,5	1 309	40,9	1 246
Quatrième	26,0	1 287	32,5	1 235
Le plus élevé	9,9	1 101	23,2	1 058
Ensemble	36,4	6 155	39,1	5 879

TDR = Test de diagnostic rapide du paludisme (SD Bioline Malaria Ag Pf Pan)

¹ Y compris les enfants dont la mère est décédée.

² Pour les femmes qui n'ont pas été interviewées, l'information provient du questionnaire Ménage. Non compris les enfants dont la mère n'est pas listée dans le questionnaire Ménage.

Résultats clés

- **État nutritionnel des enfants :** Environ un tiers des enfants de moins de 5 ans (32 %) souffrent d'un retard de croissance, 5 % sont émaciés, 17 % présentent une insuffisance pondérale et 2 % un surpoids.
- **Allaitement maternel :** Parmi les enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des 2 dernières années, la quasi-totalité ont été allaités (97 %). En outre, un enfant sur deux (54 %) a été allaité dans l'heure qui a suivi sa naissance. Seulement 42 % des enfants de zéro à six mois sont exclusivement allaités.
- **Apport alimentaire minimum acceptable :** Parmi les enfants de 6-23 mois non allaités, seulement 15 % ont un apport alimentaire minimum acceptable tel que défini par l'OMS.
- **Anémie des enfants et des femmes :** Environ sept enfants de 6-59 mois sur dix (72 %) et 58 % des femmes de 15-49 ans sont anémiés.
- **Disponibilité du sel iodé dans les ménages :** Parmi les ménages dans lesquels le sel a été testé, neuf sur dix (90 %) disposaient de sel iodé.
- **État nutritionnel des femmes :** Parmi les femmes de 15-49 ans, 11 % ont un indice de masse corporelle (IMC) inférieur à 18,5 et présentent donc un état de déficience énergétique chronique. À l'opposé, 26 % présentent une surcharge pondérale ou sont obèses.

Ce chapitre porte sur l'état nutritionnel des enfants et des femmes. Il présente l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et les pratiques alimentaires du nourrisson et du jeune enfant, y compris l'allaitement et l'alimentation avec de la nourriture solide/semi solide. Ce chapitre porte aussi sur la diversité alimentaire et sur la fréquence des repas. En outre, les résultats sur les micronutriments, en particulier la supplémentation et l'enrichissement en certains micronutriments y sont également présentés. Enfin, ce chapitre aborde certains aspects pertinents de l'état nutritionnel des femmes de 15-49 ans.

Le Bénin s'est engagé dans une réforme de politique qui replace la nutrition au cœur du développement avec l'appui de la Banque Mondiale et de l'UNICEF. La volonté politique s'est manifestée par la mise en place du Conseil de l'Alimentation et de la Nutrition (CAN), avec un bras opérationnel, le Secrétariat Permanent. Le CAN a pour missions de (1) de définir la Politique Nationale en matière d'Alimentation et de Nutrition ; (2) d'assurer l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du Plan d'Action National pour l'Alimentation et la Nutrition, (3) d'assurer la coordination des actions liées à l'alimentation et à la nutrition.

Au niveau national, la coordination des différentes parties prenantes de la nutrition est assurée par le CAN ; au niveau départemental, cette fonction est assurée dans le Cadre Départemental de Concertation (CDC) de la Nutrition et au niveau communal, dans le Cadre Communal de Concertation (CCC). Enfin, au niveau

communautaire, cette coordination s'effectue à travers le Comité de Surveillance Alimentaire et Nutritionnelle (CSAN). Ces différents espaces permettent d'afficher une visibilité des intervenants et des interventions en cours sur le territoire national, offrent les bases d'une coordination avec efficacité et efficience de la mise en œuvre du Plan Stratégique de Développement de l'Alimentation et de la Nutrition (PSDAN). Les interventions sont menées à travers des paquets de services qui comprennent : le Suivi et Promotion de la Croissance (SPC) des enfants de 0 à 23 mois ; les conseils nutritionnels aux mères et pères par la communication pour le changement social et de comportement (CCSC) ; le dépistage actif de la malnutrition aiguë, la prise en charge de la malnutrition aiguë modérée au niveau communautaire et la référence des cas sévères au niveau des formations sanitaires. En conséquence, l'installation dans les ménages et écoles de dispositifs pour le lavage des mains et la promotion de toutes autres mesures d'hygiène domestique préservant la santé et fournissant un appui aux ménages d'enfants de 0 à 59 mois pour la production et la transformation d'aliments leur permettant l'accès à des rations alimentaires diversifiées et visites à domicile. Toutefois, l'intégration des activités d'éveil et de stimulation dans ces paquets pour le bon développement de la petite enfance constitue encore un défi.

Les instruments de coordination et de redevabilité pour l'amélioration de l'état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans, les femmes en âge de procréer et la communauté sont mis en place dans les 77 communes que compte le Bénin : les Cadres Communs de Résultats (CCR) et les tableaux de bord Communaux.

Les données anthropométriques et les biomarqueurs collectées au cours de l'EDSB-V 2017-2018 permettent d'évaluer l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et des femmes en âge de procréer. Cette évaluation permet d'apprécier l'évolution du retard de croissance dont la prévalence demeure, depuis une décennie, au-dessus de 30 %.

11.1 ÉTAT NUTRITIONNEL DES ENFANTS

Les données anthropométriques collectées au cours de l'EDSB-V 2017-2018 permettent de mesurer et d'évaluer l'état nutritionnel des nourrissons et des jeunes enfants en utilisant les indices anthropométriques. Cette évaluation permet d'identifier les sous-groupes de la population infantile qui présentent un retard de croissance avec comme conséquence une perturbation du développement mental, une malnutrition aiguë avec un risque de décès important et une insuffisance pondérale qui est le résultat d'une malnutrition aiguë et d'un retard de croissance.

11.1.1 Mesure de l'état nutritionnel des jeunes enfants

L'EDSB-V 2017-2018 a collecté les données concernant l'état nutritionnel en demandant des informations sur l'âge des enfants et ensuite en mesurant le poids et la taille des enfants de moins de 5 ans dans tous les ménages de l'échantillon. Le poids a été mesuré avec une balance électronique à double pesée (type SECA). La taille a été mesurée à l'aide d'une toise graduée (ShorrBoards®). Les enfants de moins de 2 ans ont été mesurés en position couchée sur la toise, tandis que ceux âgés de plus de 2 ans ont été mesurés debout. L'âge des enfants a été recueilli à partir d'un document administratif ou calculé sur la base du calendrier des événements spéciaux.

Les données sur la taille/longueur des enfants, leur poids et l'âge ont été utilisés pour calculer 3 indices : la taille-pour-âge, le poids-pour-taille et le poids-pour-âge. Chacun de ces indices fournit des informations différentes sur la croissance et la composition du corps pour évaluer l'état nutritionnel. Comme indiqué dans l'encadré ci-dessous, le *retard de croissance* ou une taille trop petite par rapport à l'âge est un signe de malnutrition chronique, conséquence d'une alimentation inadéquate pendant une longue période. Le retard de croissance peut aussi être influencé par des maladies récurrentes et chroniques. L'*émaciation* ou un faible poids-pour-taille est une mesure de la malnutrition aiguë et la conséquence d'une alimentation inadéquate pendant la période qui se situe juste avant l'enquête. L'émaciation peut résulter de prises alimentaires inadéquates ou d'un épisode récent de maladie qui a eu pour conséquence une perte de poids. L'opposé de l'émaciation est le surpoids (un poids trop important par rapport à la taille), une mesure de la surnutrition. Le poids-pour-âge est un indice combiné du poids-pour-taille et de la taille-pour-âge. Par conséquent, il englobe la sous-nutrition aiguë (émaciation) et chronique (retard de croissance) et il constitue un indice de la malnutrition globale.

Retard de croissance (évalué au moyen de la taille-pour-âge)

La taille-pour-âge est une mesure du retard de croissance linéaire et des effets cumulés de déficit de la croissance. Les enfants dont le Z-score pour la taille pour âge se situe en dessous de moins 2 écarts type (-2ET) de la médiane de la population de référence sont considérés comme trop petits par rapport à leur âge (retard de croissance) ou atteints de sous-nutrition chronique. Les enfants en dessous de moins 3 écart type (-3ET) sont considérés comme atteints de retard de croissance sévère.

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans

Émaciation (évalué au moyen du poids-pour-taille)

L'indice poids-pour-taille mesure la masse du corps en relation avec la taille ou longueur et décrit l'état nutritionnel actuel. Les enfants dont le Z-score pour le poids-pour-taille se situe en dessous de moins 2 écarts-type (-2ET) de la médiane de la population de référence sont considérés comme maigres (émaciés) ou atteints de sous-nutrition aiguë. Les enfants dont le Z score pour le poids-pour-taille se situe en dessous de moins 3 écarts type (-3ET) de la médiane de la population de référence sont considérés comme sévèrement émaciés.

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans

Insuffisance pondérale (évalué au moyen du poids-pour-âge)

Le poids-pour-âge est un indice combiné de la taille-pour-âge et du poids-pour-taille. Il prend en compte, à la fois, la sous-nutrition aiguë et chronique. Les enfants dont le Z score pour le poids-pour-âge se situe en dessous de moins 2 écarts type (-2ET) de la médiane de la population de référence sont considérés comme présentant une insuffisance pondérale. Les enfants dont le Z score pour le poids-pour-âge se situe en dessous de moins 3 écarts type (-3ET) de la médiane sont considérés comme présentant une insuffisance pondérale sévère.

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans

Enfants présentant un surpoids

Les enfants dont le Z score pour le poids-pour-taille est supérieur à 2 écarts type (+2ET) au-dessus de la médiane de la population de référence sont considérés en surpoids.

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans

Les moyennes des Z-scores pour la taille-pour-âge, le poids-pour taille et le poids-pour-âge sont aussi calculées comme une statistique résumée représentant l'état nutritionnel des enfants dans une population. Ces scores moyens décrivent l'état nutritionnel de toute la population des enfants sans l'utilisation d'un seuil. Un Z-score moyen de moins de 0 (c'est-à-dire, une valeur moyenne négative pour le retard de croissance, l'émaciation ou l'insuffisance pondérale) suggère un décalage vers le bas de l'état nutritionnel de toute la population de l'échantillon par rapport à la population de référence. Plus les scores moyens sont éloignés de 0, plus la prévalence de la malnutrition est élevée.

11.1.2 Collecte des données

Au total, 12 832 enfants de moins de 5 ans étaient éligibles pour la prise des mesures anthropométriques (taille et poids). Des données valides pour chacun des trois indices anthropométriques ont été collectées pour environ 97 % des enfants éligibles.


11.1.3 Niveaux de la malnutrition des enfants

Au Bénin, 32 % des enfants de moins de 5 ans sont atteints d'un retard de croissance ou de malnutrition chronique (ils sont trop petits pour leur âge) et 11 % en sont atteints sous la forme sévère, 5 % sont émaciés ou souffrent de malnutrition aiguë (ils sont trop maigres par rapport à leur taille), 1 % présente une émaciation sévère et 2 % un surpoids (Tableau 11.1).

Tendances : Entre 2006 et 2017-2018 la prévalence du retard de croissance a baissé, passant de 43 % à 32 %. La prévalence de l'émaciation suit la même tendance, passant de 8 % à 5 %. Par contre, l'insuffisance pondérale est demeurée pratiquement au même niveau (18 % en 2006 contre 17 % en 2017-2018). Dans la même période, le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans présentant un surpoids est passé de 9 % à 2 %.

Graphique 11.1 Tendances de l'état nutritionnel des enfants

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans atteints de malnutrition



Variations par caractéristique

- La prévalence de retard de croissance augmente avec l'âge, variant de 17 % parmi les enfants du groupe d'âge 6-8 mois à 41 % parmi ceux de 24-35 mois.
- L'état nutritionnel des enfants est affecté par celui de la mère : quand la mère est maigre, 39 % des enfants présentent un retard de croissance, 13 % sont émaciés et 30 % présentent un retard de croissance. Par comparaison, quand l'état nutritionnel de la mère est normal, ces pourcentages sont respectivement de 34 %, 5 % et 18 %.
- Les résultats selon le milieu de résidence montrent que le niveau du retard de croissance est plus élevé en milieu rural (35 %) qu'en milieu urbain (28 %).

- En ce qui concerne le niveau de la prévalence entre les départements, le pourcentage le plus élevé des enfants atteints de retard de croissance est observé dans le département du Couffo (38 %) et le plus faible dans le Littoral (19 %) (**Graphique 11.2**).
- La prévalence du retard de croissance et de l'insuffisance pondérale diminue quand le niveau d'instruction de la mère augmente, passant, pour le retard de croissance de 35 % quand la mère n'a aucun niveau d'instruction à 14 % quand elle a le niveau secondaire 2^d cycle ou plus et, pour l'insuffisance pondérale de respectivement 18 % à 9 %.
- La prévalence du retard de croissance diminue lorsque le niveau de bien-être économique augmente, passant de 41 % parmi les enfants des ménages classés dans le quintile le plus bas à 19 % parmi ceux des ménages classés dans le quintile le plus élevé (**Graphique 11.3**).

11.2 ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT

Les pratiques alimentaires appropriées du nourrisson et du jeune enfant (PANJE) comprennent l'allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois, l'allaitement prolongé jusqu'à l'âge de 2 ans, l'introduction d'aliments solides et semi-solides à l'âge de 6 mois et l'augmentation graduelle des quantités de nourriture et de la fréquence des repas à mesure que l'enfant grandit. Il est aussi important que l'enfant reçoive une alimentation variée, c'est-à-dire qu'il mange des aliments de différents groupes alimentaires pour satisfaire ses besoins croissants en micronutriments et macronutriments (OMS 2008).


11.2.1 Allaitement

Initiation de l'allaitement

L'initiation précoce de l'allaitement est importante pour la mère et pour l'enfant. Le premier lait contient le colostrum, qui est très riche d'un point de vue nutritionnel et qui contient les anticorps qui protègent le nouveau-né des maladies. L'initiation précoce de l'allaitement renforce aussi le lien affectif entre la mère et son nouveau-né, ce qui facilite la production régulière de lait. Il est donc recommandé que l'enfant soit immédiatement mis au sein dès qu'il naît ou dans l'heure qui suit la naissance ; par contre, la pratique consistant à donner à l'enfant des aliments avant de l'allaiter (c'est-à-dire donner au nouveau-né autre chose que le lait maternel avant qu'il ne soit régulièrement allaité) doit être découragé.


Graphique 11.2 Retard de croissance chez les enfants par département

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui présentent un retard de croissance



Graphique 11.3 Retard de croissance chez les enfants par bien-être économique du ménage

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui présentent un retard de croissance



Allaitement précoce

Initiation de l'allaitement dans l'heure qui suit la naissance

Échantillon : Enfant dernier-né dont la naissance a eu lieu 2 ans avant l'enquête.

Au Bénin, 97 % des enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête ont été allaités, 54 % ont été allaités dans l'heure qui a suivi la naissance et 42 % des enfants de 0-5 mois ont été exclusivement allaités (**Tableaux 11.2 et 11.3**).


Tendances : Entre 2001 et 2017-2018, le pourcentage d'enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des deux années ayant précédé l'enquête qui ont été allaités dans l'heure qui a suivi la naissance a augmenté, passant de 48 % à 54 % (**Graphique 11.4**).

Variations par caractéristiques

- Le pourcentage d'enfants allaités dans l'heure qui a suivi la naissance diminue avec le niveau d'instruction de la mère, passant de 57 % parmi les enfants dont la mère n'a aucun niveau d'instruction à 47 % parmi ceux dont elle a le niveau secondaire 2^d cycle ou plus.

Graphique 11.4 Tendances de l'allaitement initial

Pourcentage d'enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des deux années ayant précédé l'enquête ayant commencé l'allaitement dans l'heure ayant suivi la naissance




11.2.2 Allaitement exclusif

Le lait maternel contient tous les nutriments nécessaires à l'enfant pendant les 6 premiers mois et il constitue une source de nutrition non contaminée. Il est recommandé que les enfants soient exclusivement allaités pendant les 6 premiers mois, c'est-à-dire qu'ils ne doivent recevoir rien d'autre que le lait maternel. Donner des aliments de complément avant l'âge de 6 mois n'est pas nécessaire et cette pratique n'est pas encouragée parce que les risques de contamination et de maladies diarrhéiques qui peuvent en résulter sont élevés. En outre, l'introduction précoce d'aliments de complément réduit aussi la production de lait, celle-ci étant stimulée par la fréquence et l'intensité de la succion.

Les résultats concernant les pratiques d'allaitement des enfants selon l'âge sont présentés au **Tableau 11.3** et au **Graphique 11.5**. Dans l'ensemble, 42 % des enfants de moins de 6 mois sont exclusivement allaités au sein. Cependant, contrairement aux recommandations en la matière, on constate que 28 % des enfants de moins de 6 mois reçoivent, en plus du lait maternel, de l'eau seulement et 12 % des aliments de complément. En outre, 15 % des enfants de 0-23 mois sont nourris au biberon (**Tableau 11.4**).

Graphique 11.5 Pratiques d'allaitement par âge


Pourcentage d'enfants de moins de 2 ans



Tendances : Entre 2001 et 2017-2018, le pourcentage d'enfants derniers-nés de moins de 6 mois exclusivement allaités a augmenté passant de 38 % à 42 %, soit pratiquement le même niveau qu'en 2006 (**Graphique 11.6**).

Graphique 11.6 Tendances de l'allaitement exclusif

Pourcentage d'enfants derniers nés de moins de 6 mois exclusivement allaités



11.2.3 Durée médiane de l'allaitement

Au plan national, la durée médiane de l'allaitement maternel est de 20,4 mois pour les enfants nés au cours des 3 derniers mois. La durée médiane de l'allaitement maternel exclusif, c'est-à-dire le moment auquel la moitié des enfants ont arrêté d'être allaités exclusivement, s'établit à 2,1 mois et la durée médiane de l'allaitement prédominant est de 6,4 mois (**Tableau 11.5**).

Tendances : Entre 2006 et 2017-2018, on ne constate pas de modification importante de la durée médiane de l'allaitement maternel et de celle de l'allaitement exclusif, les médianes étant passées respectivement de 21,4 à 20,4 mois et de 1,8 à 2,1 mois. Par contre, dans la même période, on observe une augmentation importante de la durée médiane de l'allaitement prédominant, celle-ci étant passée de 4,1 à 6,4 mois.

Variations par caractéristiques

- La durée médiane de l'allaitement exclusif est plus longue en milieu rural qu'en milieu urbain (2,4 mois contre 1,3 mois).
- La durée médiane de l'allaitement maternel diminue du quintile de bien-être économique le plus bas (21,6 mois) au quintile le plus élevée (17,9 mois) (**Tableau 11.5**).

11.2.4 Aliments de complément

Après l'âge de 6 mois, le lait maternel n'est plus suffisant pour couvrir les besoins nutritionnels des enfants. Des aliments de complément doivent donc être ajoutés dans l'alimentation de l'enfant. L'alimentation de complément fait référence à la période de transition de l'allaitement exclusif à une alimentation diversifiée familiale. C'est la période la plus critique pour les enfants car, durant cette transition, les enfants sont très exposés à la sous-alimentation. Les aliments de complément doivent être introduits en temps opportun, c'est-à-dire dès l'âge de 6 mois tout en conservant l'allaitement maternel.

Une alimentation de complément appropriée doit être variée pour satisfaire tous les besoins en nutriments de l'enfant. Les fruits et les légumes riches en vitamine A doivent être consommés quotidiennement. Manger des fruits et des légumes, en plus de ceux qui sont riches en vitamine A, est tout aussi important. Des études ont montré qu'une alimentation de complément qui ne comprendrait que des plantes est insuffisante pour couvrir les besoins en certains micronutriments. Par conséquent, il est recommandé que la viande, les volailles, le poisson ou les œufs fassent partie de l'alimentation quotidienne, aussi souvent que possible (OMS 1998).

Le **Tableau 11.6** présente les résultats concernant les divers types d'aliments et de liquides reçus par les enfants de moins de 2 ans vivant avec leur mère le jour ou la nuit ayant précédé l'interview. En outre, ces résultats sont présentés selon l'âge pour les enfants allaités et ceux qui ne le sont pas. Globalement, les aliments les plus fréquemment donnés aux enfants de 0-23 mois sont les préparations solides ou semi-solides (58 % chez les enfants allaités et 89 % chez les enfants non allaités), les autres liquides composés de jus,

boisson à base de jus, bouillon clair, autres liquides non lactés (44 % chez les enfants allaités et 61 % chez les enfants non allaités) et les aliments riches en viande, poissons, volailles (31 % chez les enfants allaités et 60 % chez les enfants non allaités).

Variations par caractéristiques

- La consommation des différents types d'aliments est plus élevée chez les enfants de 6-23 mois non allaités que chez les enfants allaités du même groupe d'âges.
- Un tiers des enfants de 6 à 23 mois allaités (29 %) ont consommé une préparation à base de fruits et légumes riches en vitamine A, le jour ou la nuit ayant précédé l'interview contre quatre sur dix (41 %) chez les enfants non allaités.
- La consommation des aliments préparés à base de viande, poisson et volaille est beaucoup plus faible chez les enfants de 6-23 mois allaités (31 %) que chez ceux qui ne sont pas allaités (60 %).

11.2.5 Minimum alimentaire acceptable

Les nouveau-nés et les jeunes enfants doivent recevoir un apport alimentaire minimum acceptable pour leur garantir une croissance et un développement optimal. Si l'alimentation des enfants n'est pas diversifiée et s'ils ne sont pas nourris à une certaine fréquence, ils sont vulnérables à la malnutrition, en particulier au retard de croissance et aux carences en micronutriments et ils sont exposés à des risques de morbidité et de mortalité plus élevés. La recommandation de l'OMS concernant le minimum alimentaire acceptable, qui est une combinaison de diversité alimentaire minimale et de fréquence minimale des repas, est différent selon que l'enfant est allaité ou non. La définition de cet indicateur combiné du minimum alimentaire acceptable pour les enfants de 6-23 mois figure dans l'encadré ci-dessous.

La diversité alimentaire est un indicateur indirect de la densité adéquate en micronutriments des aliments. La diversité alimentaire minimale signifie que l'enfant est nourri avec des aliments appartenant à, au moins, quatre groupes alimentaires distincts. Le seuil de quatre groupes est associé à un meilleur régime alimentaire, que ce soit pour les enfants allaités ou pour ceux qui ne le sont pas. La consommation d'aliments appartenant à, au moins, quatre groupes signifie que l'enfant a une plus grande probabilité de manger au moins un aliment d'origine animale et au moins un fruit ou légume, en plus d'un aliment de base (céréales, racines ou tubercules (OMS 2008). Les quatre groupes d'aliments doivent provenir d'une liste de sept groupes d'aliments : céréales, racines et tubercules ; légumineuses et noix ; produits laitiers (lait, yaourt, fromage) ; produits carnés (viande, volaille, abats et poisson) ; œufs ; fruits et légumes riches en vitamine A ; autres fruits et légumes.

La fréquence minimale des repas est un indicateur indirect de la consommation énergétique de l'enfant. Pour les nourrissons et les jeunes enfants, l'indicateur est basé sur la quantité d'énergie dont l'enfant a besoin et, si l'enfant est allaité, la quantité d'énergie nécessaire qui n'est pas satisfaite par le lait maternel. On considère que les enfants allaités reçoivent un nombre minimum de repas s'ils reçoivent des aliments solides, semi-solides, ou mous au moins deux fois par jour pour les enfants de 6-8 mois et, au moins, trois fois par jour pour les enfants de 9-23 mois. On considère que les enfants non allaités de 6-23 mois reçoivent un nombre minimum de repas s'ils reçoivent des aliments solides, semi-solides, ou mous, au moins, quatre fois par jour.

Minimum alimentaire acceptable

Proportion d'enfants de 6–23 mois qui ont reçu l'apport alimentaire minimum acceptable. Cet indicateur est un indicateur combiné, calculé à partir des groupes suivants :

Enfants allaités de 6-23 mois qui ont reçu, au moins, la diversification alimentaire minimum, le nombre minimum de repas le jour précédent

Enfants allaités de 6-23 mois

et


Enfants non allaités de 6-23 mois ayant reçu, au moins, deux fois du lait et, au moins, la diversité alimentaire minimum (en dehors des aliments lactés) et le nombre minimum de repas le jour précédent

Enfants non allaités de 6-23 mois

Échantillon : Enfants derniers-nés de 6-23 mois vivant avec leur mère

Au plan national, 15 % des enfants de 6-23 mois sont nourris conformément aux trois pratiques optimales de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant qui incluent l'allaitement, le nombre de groupes d'aliments et la fréquence des repas (Tableau 11.7 et Graphique 11.7). Parmi les enfants de 6-23 mois allaités, environ un sur quatre reçoit une alimentation variée (26 %), et 45 % ont été nourris un nombre minimum de fois de manière appropriée pour leur âge. Parmi les enfants non allaités, on constate que seulement 9 % reçoivent un apport alimentaire minimum acceptable.

Graphique 11.7 Indicateurs ANJE sur l'apport alimentaire minimal acceptable



Variations par caractéristique

- Le pourcentage d'enfants ayant reçu un apport alimentaire minimum acceptable augmente avec l'âge, variant de 11 % parmi ceux de 6-8 mois à 17 % parmi ceux de 18-23 mois.
- Les résultats selon le département montrent que le pourcentage d'enfants de 6-23 mois nourris selon les recommandations varie d'un minimum de 5 % dans l'Ouémé à un maximum de 29 % dans l'Alibori.
- Le pourcentage d'enfants de 6-23 mois ayant reçu un apport alimentaire minimum acceptable est plus élevé parmi ceux dont la mère a un niveau d'instruction secondaire 2^d cycle ou plus que chez les autres (20 % contre 15 % et 11 %).

11.3 PRÉVALENCE DE L'ANÉMIE PARMIS LES ENFANTS

Anémie parmi les enfants

Anémie	Niveau d'hémoglobine en grammes/décilitre*
Anémie	< 11,0
Anémie légère	10,0 - 10,9
Anémie modérée	7,0 - 9,9
Anémie sévère	< 7,0
Pas d'anémie	11,0 ou plus

*Les niveaux d'hémoglobine sont ajustés en fonction de l'altitude dans les zones situées au-dessus de 1 000 mètres.

Échantillon : Enfants de 6-59 mois


L'anémie est un état pathologique caractérisé par un des niveaux d'hémoglobine trop faibles dans le sang. Le fer est un composant important de l'hémoglobine et on considère que la carence en fer est globalement responsable de la moitié des anémies. L'anémie peut aussi être causée par le paludisme, l'ankylostome et d'autres helminthes, des carences nutritionnelles, des infections chroniques et des maladies génétiques. L'anémie est un problème de santé grave chez les enfants car elle peut affecter le développement cognitif, stopper la croissance et augmenter la morbidité due aux maladies infectieuses.

Au plan national, 72 % des enfants de 6-59 mois sont atteints de l'anémie dont 3 % sous sa forme sévère et 41 % sous forme modérée (Tableau 11.8).

Tendances : Entre 2006 et 2017-2018, la prévalence de l'anémie a légèrement baissé, passant de 78 % à 72 %. En particulier, le pourcentage d'enfants de 6-59 mois atteints d'anémie modérée est passé de 46 % à 41 % et le niveau de l'anémie sévère est passé de 8 % à 3 %. Seule la prévalence de l'anémie légère a un peu augmenté, passant de 25 % à 28 % (Graphique 11.8).

Graphique 11.8 Tendances de l'anémie chez les enfants

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois




Variations par caractéristique

- La prévalence de l'anémie chez les enfants varie selon l'âge, de 87 % parmi les enfants de 6- 8 mois à 60 % chez ceux 48-59 mois. Le pic de prévalence est atteint dans le groupe d'âges 9-11 mois (89 %) (Tableau 11.8).
- Selon le milieu de résidence, on constate que la prévalence de l'anémie chez les enfants de 6-59 mois est plus élevée en milieu rural (75 %) qu'en milieu urbain (66 %).

- Les résultats selon le département montrent que l'Atacora enregistre le pourcentage le plus élevé (85 %) d'enfants de 6-59 mois anémiés. À l'opposé, le Zou présente le niveau plus bas (59 %) (**Graphique 11.9**).
- L'anémie chez les enfants varie en fonction du niveau d'instruction de la mère : 58 % des enfants de 6-59 mois dont la mère a un niveau d'instruction secondaire 2^d cycle ou plus présentent un état d'anémie contre 74 % parmi ceux dont la mère n'a aucun niveau d'instruction.
- Le pourcentage d'enfants de 6-23 mois anémiés est plus élevé dans les ménages du quintile le plus bas (79 %) que dans ceux du plus élevé (58 %).

Graphique 11.9 Anémie chez les enfants par département

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois atteints d'anémie



11.4 PRÉSENCE DE SEL IODÉ DANS LES MÉNAGES

L'iode est un micronutriment essentiel, le sel iodé permet d'éviter l'apparition de goitre et d'autres maladies thyroïdiennes parmi les enfants et les adultes. En accord avec les régulations sur l'alimentation et les médicaments, le sel consommé par les ménages doit être enrichi avec de l'iode (au moins 15 parties par million) (ppm).

Au Bénin, parmi les ménages dans lesquels le sel a été testé, 90 % disposent de sel iodé (**Tableau 11.9**).

Tendances : De 2006 à 2017-2018, le pourcentage de ménages disposant de sel iodé a connu une hausse, passant de 85 % à 90 %.

Variations par caractéristique

- La disponibilité de sel iodé est légèrement plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain (91 % contre 88 %).
- Le pourcentage de ménages disposant du sel iodé varie de 78 % dans le département du Mono à 99 % dans l'Atacora.
- Les résultats selon les quintiles de bien-être économique montrent que les ménages du quintile le plus bas disposent davantage de sel iodé que ceux du quintile le plus élevé (91 % contre 87 %).

11.5 CONSOMMATION DE MICRONUTRIMENTS ET SUPPLÉMENTATION PARMIS LES ENFANTS

La carence en micronutriments est un des facteurs de risques importants de la morbidité et de la mortalité infantile. Les micronutriments sont disponibles dans la nourriture et peuvent aussi être fournis directement par la supplémentation. Allaiter les enfants les fait bénéficier des suppléments donnés à la mère.

Les informations collectées sur la consommation d'aliments parmi les plus jeunes enfants de moins de 6-23 mois sont utiles pour savoir dans quelle mesure les enfants consomment des aliments de groupes riches en

deux micronutriments clés - vitamine A et fer- dans leur alimentation quotidienne. La carence en fer est l'une des causes principales de l'anémie qui a des conséquences graves, que ce soit sur l'état de santé des femmes comme sur celui des enfants. La vitamine A est un micronutriment essentiel pour le système immunitaire et elle joue un rôle important sur le maintien du tissu épithélial. Une carence sévère en vitamine A peut causer des lésions oculaires et elle est l'une des causes les plus importantes de cécité pendant l'enfance. La carence en vitamine A a augmenté la gravité des infections comme la rougeole et les maladies diarrhéiques et ralentit la guérison des maladies. La carence en vitamine A est plus répandue dans les environnements secs où les fruits et légumes ne sont pas facilement disponibles.

Parmi les enfants derniers-nés de 6-23 mois vivant avec leur mère, 58 % ont consommé des aliments riches en vitamine A dans les dernières 24 heures et 52 % ont consommé des aliments riches en fer ; parmi les enfants de 6-59 mois, 24 % ont reçu des suppléments de fer au cours des sept jours précédant l'enquête, 52 % ont reçu des suppléments de vitamine A dans les 6 derniers mois et 38 % ont été traités avec des vermifuges dans cette période (**Tableau 11.10**).

Tendances : Dans la période 2011-2012 à 2017-2018, on constate que la consommation d'aliments riches en fer et en vitamine A par les enfants de 6-23 mois a augmenté, passant respectivement de 39 % à 52 % et de 54 % à 58 %. On note également une augmentation du pourcentage d'enfants de 6-23 mois ayant reçu des suppléments de vitamine A au cours des 6 mois précédant l'enquête, passant de 49 % à 52 %. Par contre, on observe une diminution des pourcentages d'enfants de 6-59 mois qui ont reçu des suppléments de fer au cours des 7 derniers jours et de ceux qui ont reçu des vermifuges au cours des 6 derniers mois. En effet ces pourcentages sont passés respectivement de 31 % à 24 % et de 50 % à 38 %.

Variations selon certaines caractéristiques

- Le pourcentage d'enfants de 6-23 mois non allaités ayant consommé des aliments riches en vitamine A est plus élevé que celui des enfants allaités (76 % contre 54 %). Il en est de même pour les aliments riches en fer (69 % contre 48 %).
- Le pourcentage d'enfants de 6-59 mois ayant reçu des suppléments de vitamine A dans les six derniers mois est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural (57 % contre 49 %).
- Il ressort des résultats que c'est dans le département de la Donga que le pourcentage d'enfants de 6-59 mois qui ont reçu des suppléments de Vitamine A au cours des six derniers mois est le plus élevé (75 %) tandis qu'à l'opposé, c'est dans l'Alibori que l'on observe le plus faible (35 %) (**Tableau 11.10**).

11.6 ÉTAT NUTRITIONNEL DES FEMMES

11.6.1 État nutritionnel des femmes

L'état nutritionnel des femmes en âge de procréer est l'un des facteurs déterminants du bon déroulement des grossesses, de leur issue ainsi que de la mortalité maternelle. En outre, il influe sur la morbidité et la mortalité des jeunes enfants. L'évaluation de l'état nutritionnel des femmes en âge de procréer est particulièrement utile dans l'identification des grossesses à risque. Du point de vue anatomique, la taille des mères étant associée à la largeur de leur bassin, les femmes de petite taille sont plus susceptibles d'avoir des complications pendant la grossesse et l'accouchement et d'accoucher des enfants de faible poids. La taille généralement admise en dessous de laquelle une femme peut être considérée à risque est comprise entre 140 et 150 centimètres.

Au cours de l'EDSB-V 2017-2018, en vue d'évaluer l'état nutritionnel des femmes en âge de procréer, on a relevé les données anthropométriques (la taille et le poids) des femmes de 15-49 ans. Ces mesures du poids et de la taille ont permis de déterminer l'indice de masse corporelle (IMC) ou indice de Quételet. L'IMC est calculé en divisant le poids (en kilogrammes) par le carré de la taille en mètre. Il est exprimé en kilogramme par mètre carré (kg/m²). Le déficit énergétique chronique chez la femme en âge de procréer est indiqué par

les valeurs de l'IMC inférieures à la valeur seuil (18,5), tandis que le surpoids est indiqué pour les valeurs supérieures ou égales au seuil (25,0). Il importe de préciser que les femmes enceintes et celles ayant eu une naissance dans les deux mois précédant l'enquête sont exclues du calcul de l'indice.

Indice de masse corporelle (IMC)

L'IMC est calculé en divisant le poids en kilogrammes par le carré de la taille en mètre (kg/m²).

État	IMC
Trop maigre par rapport à la taille	Moins de 18,5
Normal	Entre 18,5 et 24,9
Surpoids	Entre 25,0 et 29,9
Obèse	Supérieur ou égal à 30,0

Échantillon : Femmes de 15-49 ans qui ne sont pas enceintes et qui n'ont pas eu de naissances dans les 2 mois ayant précédé l'enquête.

Au Bénin, l'IMC moyen est estimé à 23. Une femme sur dix (11 %) souffre de maigreur dont 3 % sous sa forme sévère. A l'opposé, 26 % présentent une surcharge pondérale dont 9 % sont obèses (**Tableau 11.11**).

Tendances : De 2006 à 2017-2018, le pourcentage de femmes de 15-49 ans présentant un état de maigreur (IMC inférieur à 18,5) a légèrement augmenté, de 9 % à 11 %. Entre ces deux dates, le pourcentage de femmes en surpoids ou obèse (IMC supérieur ou égale à 25) a aussi augmenté, mais de manière plus importante, passant de 19 % à 26 %.

Variations par caractéristique

- Le pourcentage de femmes de 15-49 ans présentant un état de maigreur est plus élevé chez les jeunes femmes de 15-19 ans (21 %) que chez les plus âgées (8 % à 30-39 ans et 7 % à 40-49 ans). Le pourcentage de femmes de 15-49 ans présentant un surpoids ou un état d'obésité augmente avec l'âge, variant de 7 % à 15-19 ans à 42 % à 40-49 ans (**Tableau 11.11**).
- Le pourcentage de femmes de 15-49 ans maigres est plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain (12 % contre 9 %). A l'opposé, le surpoids ou l'obésité sont plus fréquents en milieu urbain qu'en milieu rural (35 % contre 19 %).
- Le pourcentage de femmes présentant un état de maigreur varie entre départements : il est plus de deux fois plus élevé dans le Plateau (16 %) et l'Atacora (15 %) que dans le Littoral et la Donga (6 % dans les 2 cas). Par contre, dans le Littoral, près d'une femme de 15-49 ans sur deux (48 %) accuse une surcharge pondérale ou est obèse. Avec 12 % c'est dans l'Atacora que ce pourcentage est le plus faible.
- Du quintile le plus bas au plus élevé, le pourcentage de femmes maigres diminue de manière importante, passant de 16 % à 7 %. A l'opposé, le pourcentage de femmes présentant un surpoids ou obèses suit la tendance inverse, passant de 12 % dans le quintile le plus bas à 43 % dans le plus élevé.

11.7 PRÉVALENCE DE L'ANÉMIE CHEZ LES FEMMES

Niveaux d'hémoglobine en dessous desquels une femme est considérée comme étant anémiée.

Enquêtés	Niveau d'hémoglobine en grammes/décilitre*
Femme non enceinte 15-49 ans	Moins de 12,0
Femme enceinte 15-49 ans	Moins de 11,0


*Les niveaux d'hémoglobine sont ajustés en fonction du statut tabagique et de l'altitude dans les zones au-dessus de 1 000 mètres

Au cours de l'EDSB-V 2017-2018, les niveaux d'hémoglobine ont été mesurés pour les femmes de 15-49 ans. Les résultats du **Tableau 11.12** montrent que 58 % des femmes de 15 à 49 ans souffrent d'anémie : 26 % sous sa forme légère, 30 % sous sa forme modérée et 2 % sous sa forme sévère.

Tendances : Entre 2006 et 2017-2018, la prévalence de l'anémie chez les femmes de 15 à 49 ans a légèrement diminué, passant de 61 % à 58 %. C'est surtout sous la forme modérée que la prévalence a baissé, celle-ci étant passée de 34 % à 30 %. Dans la même période, la prévalence de l'anémie légère et sévère n'a pas changé (**Graphique 11.10**).

Graphique 11.10 Tendances de l'anémie chez les femmes

Pourcentage de femmes de 15-49 ans



Variations par caractéristiques

- La prévalence de l'anémie est plus élevée chez les femmes enceintes que chez les autres, en particulier sous la forme modérée (44 % contre 28 % parmi celles qui allaitent et 29 % parmi celles qui n'allaitent pas et qui ne sont pas enceintes).
- La prévalence de l'anémie varie entre départements, d'un minimum de 40 % dans les Collines à un maximum de 71 % dans le Plateau.
- Du quintile le plus bas au plus élevé, la prévalence de l'anémie a tendance à diminuer, passant de 63 % à 55 % (**Tableau 11.12**).

11.8 CONSOMMATION DE MICRONUTRIMENTS PARMIS LES MÈRES

À la question de savoir si les femmes ayant une naissance au cours des cinq dernières années ont pris du fer ou des vermifuges au cours de la grossesse de leur dernier enfant, 47 % des femmes ont déclaré avoir pris du fer pendant plus de quatre-vingt-dix-jours (90 jours) et 65 % des vermifuges (**Tableau 11.13**).

Variations selon certaines caractéristiques

- La supplémentation en fer suivant les recommandations (plus de 90 jours) au cours de la grossesse est plus fréquente en milieu urbain qu'en milieu rural (53 % contre 43 %). La prise de vermifuges durant la grossesse est aussi plus courante en milieu urbain que rural (73 % contre 59 %).

- La prise de fer pendant 90 jours au cours de la grossesse varie selon les départements, de 72 % dans l'Atlantique à 28 % dans le Couffo. Le recours aux vermifuges varie de 94 % dans l'Ouémé et 91 % dans le Littoral à 34 % dans les départements de l'Atacora et du Borgou.
- Le pourcentage de femmes ayant pris du fer pendant 90 jours au cours de la grossesse augmente avec le niveau d'instruction, passant de 43 % parmi celles sans aucun niveau d'instruction à 65 % parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus.
- Le pourcentage de femmes ayant pris des vermifuges pendant la grossesse augmente avec le quintile de bien-être économique, passant de 41 % dans le quintile le plus bas à 88 % dans le quintile le plus élevé. De même, le pourcentage de femmes ayant pris du fer pendant 90 jours au cours de la grossesse passe de 31 % dans le quintile le plus bas à 62 % dans le quintile le plus élevé.

En outre le **Tableau 11.13** montre un pourcentage élevé (91 %) de femmes qui vivent dans un ménage disposant de sel iodé pour la cuisine.

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'information sur la nutrition des enfants et des adultes, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 11.1** État nutritionnel des enfants
- **Tableau 11.2** Allaitement initial
- **Tableau 11.3** Type d'allaitement selon l'âge de l'enfant
- **Tableau 11.4** Indicateurs de l'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) concernant l'allaitement
- **Tableau 11.5** Durée médiane de l'allaitement
- **Tableau 11.6** Aliments et liquides reçus par les enfants le jour ou la nuit ayant précédé l'interview
- **Tableau 11.7** Apport alimentaire minimum acceptable
- **Tableau 11.8** Prévalence de l'anémie chez les enfants
- **Tableau 11.9** Présence de sel iodé dans le ménage
- **Tableau 11.10** Consommation de micronutriments par les enfants
- **Tableau 11.11** État nutritionnel des femmes
- **Tableau 11.12** Prévalence de l'anémie chez les femmes
- **Tableau 11.13** Consommation de micronutriments par les mères

Tableau 11.1 État nutritionnel des enfants

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans considérés comme atteints de malnutrition selon les trois indices anthropométriques de mesure de l'état nutritionnel : la taille-pour-âge, le poids-pour-taille et le poids-pour-âge, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Taille-pour-Âge ¹				Poids-pour-Taille				Poids-pour-Âge			
	Pourcentage en dessous de -3 ET	Pourcentage en dessous de -2 ET ²	Score centré réduit moyen (ET)	Effectif d'enfants	Pourcentage en dessous de -3 ET	Pourcentage en dessous de -2 ET ²	Score centré réduit moyen (ET)	Effectif d'enfants	Pourcentage en dessous de -3 ET	Pourcentage en dessous de -2 ET ²	Score centré réduit moyen (ET)	Effectif d'enfants
Âge en mois												
<6	5,6	16,8	-0,8	1 392	2,0	6,7	6,3	1 386	4,8	13,4	1,3	1 401
6-8	3,5	16,9	-0,9	827	1,6	8,9	2,6	827	3,6	16,3	0,6	831
9-11	7,3	25,5	-1,2	686	2,5	10,3	1,0	700	5,3	20,5	0,4	691
12-17	8,0	27,1	-1,3	1 249	1,8	8,0	1,7	1 258	4,1	17,7	0,5	1 254
18-23	14,0	40,1	-1,7	1 267	1,7	6,4	0,6	1 310	6,0	19,6	0,2	1 271
24-35	15,2	41,1	-1,7	2 394	0,4	3,2	2,1	2 482	3,8	17,5	0,6	2 404
36-47	12,6	36,9	-1,7	2 504	0,4	2,4	1,3	2 669	2,9	15,2	0,1	2 516
48-59	11,3	32,9	-1,5	2 458	0,6	3,5	0,7	2 627	3,7	17,0	0,1	2 465
Sexe												
Masculin	12,4	35,1	-1,5	6 465	1,3	5,6	1,8	6 719	4,8	17,8	0,4	6 494
Féminin	9,4	29,1	-1,4	6 312	0,8	4,3	1,9	6 541	3,2	15,8	0,4	6 338
Intervalle intergénérisique en mois³												
Première naissance ⁴	10,4	31,8	-1,5	2 537	1,1	5,1	2,2	2 576	3,9	17,1	0,3	2 546
<24	14,6	35,6	-1,6	1 331	1,1	5,9	2,0	1 460	5,4	20,3	0,5	1 336
24-47	10,7	32,9	-1,5	5 885	1,2	5,1	1,9	6 039	4,1	16,9	0,4	5 913
48+	6,9	24,3	-1,2	1 929	0,7	4,1	1,8	1 961	2,5	12,7	0,4	1 935
Grosseur à la naissance⁵												
Très petit	21,8	50,0	-2,0	388	3,1	10,8	1,8	402	13,8	36,5	0,0	392
Petit	14,6	41,4	-1,8	1 268	1,5	6,8	1,6	1 320	8,1	27,9	0,3	1 271
Moyen ou plus gros que la moyenne	9,4	29,4	-1,4	9 879	1,0	4,6	2,0	10 149	3,0	14,3	0,4	9 917
Manquant	13,4	39,5	-1,5	144	0,0	5,3	2,6	163	5,6	21,1	0,0	147
Interview de la mère												
Interviewée	10,5	31,5	-1,4	11 683	1,1	5,0	2,0	12 037	3,9	16,6	0,4	11 730
Mère non interviewée mais vivant dans le ménage	8,6	28,3	-1,3	203	1,4	5,5	1,3	239	2,5	10,4	1,1	207
Mère non interviewée et ne vivant pas dans le ménage ⁶	17,0	41,4	-1,7	891	0,6	4,1	0,8	984	5,7	21,1	0,3	895
État nutritionnel de la mère⁶												
Maigre (IMC <18,5)	12,7	38,6	-1,7	429	2,8	13,0	1,2	445	8,3	30,1	0,0	430
Normal (IMC 18,5-24,9)	11,8	33,5	-1,5	3 339	0,8	4,9	1,5	3 443	3,9	18,2	0,3	3 342
En surpoids/obèse (IMC ≥25,0)	6,5	22,9	-1,2	1 238	0,6	3,2	2,3	1 259	2,4	10,4	0,6	1 240

À suivre...

Tableau 11.1—Suite

Caractéristique sociodémographique	Taille-pour-Âge ¹				Poids-pour-Taille				Poids-pour-Âge					
	Pourcentage en dessous de -3 ET	Score centré (ET)	Effectif d'enfants	Effectif d'enfants	Score centré (ET)	Effectif d'enfants	Effectif d'enfants	Score centré (ET)	Effectif d'enfants	Effectif d'enfants	Score centré (ET)	Effectif d'enfants		
	en dessous de -2 ET ²	en dessous de -2 ET ²	en dessous de -3 ET	en dessous de -2 ET ²	en dessous de -3 ET	en dessous de -2 ET ²	en dessous de -3 ET	en dessous de -2 ET ²	en dessous de -3 ET	en dessous de -2 ET ²	en dessous de -3 ET	en dessous de -2 ET ²		
Résidence														
Cotonou	5,3	19,1	-1,0	554	1,2	5,6	2,0	-0,4	558	2,3	12,5	0,7	-0,9	556
Autres villes	8,5	28,5	-1,3	4 436	1,1	5,1	1,8	-0,3	4 537	3,3	15,1	0,3	-1,0	4 455
Ensemble urbain	8,2	27,5	-1,3	4 990	1,1	5,1	1,8	-0,3	5 095	3,2	14,8	0,4	-1,0	5 011
Rural	12,6	35,2	-1,5	7 787	1,0	4,9	1,9	-0,2	8 165	4,6	18,1	0,4	-1,1	7 821
Département														
Alibori	14,5	35,9	-1,5	1 661	1,7	6,9	2,4	-0,3	1 728	5,7	19,4	0,5	-1,1	1 674
Atacora	13,7	36,4	-1,6	1 149	1,0	4,7	1,0	-0,4	1 194	5,2	18,8	0,2	-1,2	1 154
Atlantique	10,0	30,1	-1,4	1 426	0,8	4,1	1,6	-0,3	1 473	3,2	16,8	0,3	-1,0	1 427
Borgou	12,0	34,2	-1,5	1 618	1,5	5,1	2,0	-0,3	1 811	4,1	18,3	0,4	-1,1	1 621
Collines	5,6	23,7	-1,2	835	0,9	3,6	2,1	-0,1	849	1,9	10,0	0,6	-0,8	837
Couffo	13,0	38,0	-1,6	893	0,8	3,4	2,4	-0,1	935	3,4	14,7	0,3	-1,0	901
Donga	9,5	27,2	-1,3	871	1,9	6,4	3,6	-0,2	889	3,8	14,3	1,0	-0,8	875
Littoral	5,3	19,1	-1,0	554	1,2	5,6	2,0	-0,4	558	2,3	12,5	0,7	-0,9	556
Mono	10,0	28,5	-1,4	583	0,4	5,3	1,2	-0,4	592	5,3	18,3	0,1	-1,1	589
Ouémé	9,0	29,7	-1,4	1 155	0,6	4,4	1,0	-0,4	1 184	4,1	17,1	0,2	-1,1	1 161
Plateau	11,6	36,2	-1,6	782	0,7	6,1	1,2	-0,4	792	4,3	19,3	0,2	-1,1	783
Zou	10,3	35,4	-1,5	1 249	0,4	3,8	1,8	-0,2	1 255	3,5	16,9	0,4	-1,0	1 256
Niveau d'instruction de la mère⁷														
Aucun	12,2	34,5	-1,5	7 742	1,2	5,2	1,9	-0,3	8 100	4,5	17,7	0,4	-1,1	7 778
Primaire	9,1	29,1	-1,4	2 184	0,6	4,4	1,8	-0,3	2 205	3,3	16,1	0,2	-1,0	2 192
Secondaire 1 ^{er} cycle	5,9	25,1	-1,2	1 437	1,2	5,0	2,0	-0,3	1 447	2,7	13,2	0,5	-0,9	1 443
Secondaire 2 ^o cycle ou plus	2,8	14,4	-0,8	523	1,2	5,4	3,7	-0,2	523	1,3	9,2	1,0	-0,7	523
Quintiles de bien-être économique														
Le plus bas	15,1	41,2	-1,7	2 600	1,2	5,4	1,4	-0,3	2 833	5,7	21,0	0,4	-1,2	2 619
Second	14,1	38,2	-1,6	2 623	1,0	5,0	1,8	-0,2	2 734	4,8	19,8	0,4	-1,1	2 634
Moyen	11,1	32,9	-1,5	2 629	1,2	4,2	2,4	-0,2	2 701	4,0	16,7	0,4	-1,0	2 633
Quatrième	9,1	28,5	-1,4	2 602	1,0	4,8	1,7	-0,2	2 645	3,5	14,2	0,3	-1,0	2 614
Le plus élevé	4,2	18,6	-1,0	2 323	1,0	5,5	2,0	-0,3	2 347	2,0	12,0	0,6	-0,8	2 333
Ensemble	10,9	32,2	-1,4	12 777	1,1	5,0	1,9	-0,3	13 260	4,0	16,8	0,4	-1,0	12 832

Note : Chaque indice est exprimé en termes d'unités d'écart type (ET) par rapport à la médiane des Normes OMS de la croissance de l'enfant.

¹ Les enfants de moins de 2 ans sont mesurés en position allongée alors que tous les autres enfants sont mesurés en position debout.

² Y compris les enfants qui se situent en-dessous de -3 ET de la médiane des Normes OMS de la croissance de l'enfant.

³ Non compris les enfants dont la mère n'a pas été interviewée.

⁴ Les premières naissances multiples-jumeaux, triplés- etc. sont comptées comme première naissance parce qu'elles n'ont pas d'intervalle avec la naissance précédente.

⁵ Y compris les enfants dont la mère est décédée.

⁶ Non compris les enfants dont la mère n'a pas été pesée et mesurée, les enfants dont la mère n'a pas été interviewée et les enfants dont la mère est enceinte ou a donné naissance à un enfant dans les deux mois précédents. L'état nutritionnel de la mère, basé sur l'IMC (Indice de Masse Corporelle), est présenté au tableau 11.11.

⁷ Pour les femmes qui n'ont pas été interviewées, l'information provient du questionnaire Ménage. Non compris les enfants dont la mère n'est pas listée dans le questionnaire Ménage.

Tableau 11.2 Allaitement initial

Parmi les enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant été allaités, pourcentage qui ont commencé à être allaités dans l'heure qui a suivi la naissance et pourcentage qui ont commencé à être allaités le jour qui a suivi leur naissance et parmi les derniers nés dont la naissance a eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête qui ont été allaités, pourcentage ayant reçu des aliments avant d'être allaités, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Parmi les enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête :				Parmi les enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête et qui ont été allaités :	
	Pourcentage ayant été allaité	Pourcentage ayant commencé à être allaité dans l'heure qui a suivi la naissance	Pourcentage ayant commencé à être allaité le jour qui a suivi la naissance ¹	Effectif d'enfants derniers-nés	Pourcentage ayant reçu des aliments avant d'être allaités ²	Effectif d'enfants derniers-nés ayant été allaités
Sexe						
Masculin	96,0	53,7	83,6	2 773	17,9	2 663
Féminin	97,1	54,4	86,3	2 729	18,1	2 650
Assistance à l'accouchement						
Personnel de santé ³	96,6	52,3	84,9	4 511	18,5	4 358
Sage-femme traditionnelle	93,8	48,3	77,2	173	17,3	163
Autre	97,6	56,8	82,5	396	21,8	387
Personne	96,1	72,9	90,4	421	9,4	404
Lieu de l'accouchement						
Établissement de santé	96,7	53,3	85,3	4 680	17,9	4 525
Maison	96,4	58,4	84,0	738	17,5	712
Autre	90,6	58,3	74,9	84	30,8	76
Résidence						
Cotonou	96,9	51,3	81,1	242	24,6	234
Autres villes	96,6	53,1	83,3	1 863	19,0	1 800
Ensemble urbain	96,6	52,8	83,0	2 105	19,7	2 035
Rural	96,5	54,8	86,1	3 397	17,0	3 278
Département						
Alibori	96,5	72,4	95,6	766	6,8	738
Atacora	98,0	54,4	75,9	499	21,3	490
Atlantique	96,1	58,0	85,6	595	23,9	572
Borgou	96,3	53,7	85,4	730	9,4	704
Collines	96,0	21,2	77,6	353	18,6	339
Couffo	98,0	45,2	78,8	375	10,9	367
Donga	96,6	69,7	90,8	391	14,5	377
Littoral	96,9	51,3	81,1	242	24,6	234
Mono	96,5	58,3	79,3	225	26,2	217
Ouémé	96,8	44,0	84,0	479	32,9	464
Plateau	93,8	36,5	77,8	340	44,8	319
Zou	96,9	60,2	91,5	508	6,3	492
Niveau d'instruction						
Aucun	96,5	57,3	87,0	3 458	16,8	3 338
Primaire	96,2	49,6	82,1	1 036	20,6	997
Secondaire 1 ^{er} cycle	97,2	47,9	82,6	731	18,6	710
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	96,4	47,0	76,1	277	21,8	267
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	96,3	55,9	84,6	1 153	15,9	1 110
Second	96,7	57,1	86,6	1 139	16,2	1 102
Moyen	96,4	53,9	86,3	1 134	16,8	1 093
Quatrième	96,8	51,4	84,9	1 097	19,5	1 062
Le plus élevé	96,5	51,7	81,8	979	22,4	945
Ensemble	96,6	54,1	84,9	5 502	18,0	5 312

Note : Le tableau est basé sur les enfants derniers-nés, dont la naissance a eu lieu au cours des deux années ayant précédé l'enquête, cela qu'ils soient en vie ou décédés au moment de l'enquête.

¹ Y compris les enfants qui ont commencé à être allaités dans l'heure qui a suivi la naissance.

² C'est-à-dire les enfants à qui on a donné autre chose que le lait maternel pendant les trois premiers jours.

³ Médecin, infirmière et sage-femme.

Tableau 11.3. Type d'allaitement selon l'âge de l'enfant

Répartition (en %) des enfants derniers-nés de moins de 2 ans vivant avec leur mère par type d'allaitement, pourcentage actuellement allaité ; pourcentage de tous les enfants de moins de 2 ans utilisant un biberon, selon l'âge en mois, EDSB-V Bénin 2017-2018

Âge en mois	Type d'allaitement										Effectif des derniers-nés de moins de 2 ans vivant avec leur mère			
	Non allaité	Exclusivement allaité	Allaité et eau seulement		Allaité et liquides non lactés ¹		Allaités et autres laits		Allaités et aliments de complément	Total	Pourcentage actuellement allaité	Effectif des derniers-nés de moins de 2 ans	Pourcentage utilisant un biberon	Effectif de tous les enfants de moins de 2 ans
			Allaité et eau seulement	Allaité et liquides non lactés ¹	Allaités et autres laits	Allaités et aliments de complément								
0-1	4,9	63,6	20,3	7,0	1,7	2,6	100,0	95,1	498	5,5	513			
2-3	4,3	37,7	35,4	10,8	2,1	9,7	100,0	95,7	468	10,9	482			
4-5	2,0	19,6	30,1	20,4	3,8	24,1	100,0	98,0	420	16,1	428			
6-8	3,6	5,3	20,2	15,3	1,6	53,9	100,0	96,4	804	24,9	817			
9-11	4,8	2,1	11,8	7,0	1,9	72,4	100,0	95,2	682	20,3	701			
12-17	12,7	0,4	7,3	2,2	0,8	76,7	100,0	87,3	1 177	13,9	1 223			
18-23	49,1	0,3	2,6	0,8	0,5	46,6	100,0	50,9	1 221	11,7	1 292			
0-3	4,6	51,1	27,6	8,9	1,9	6,0	100,0	95,4	966	8,1	996			
0-5	3,8	41,5	28,4	12,4	2,4	11,5	100,0	96,2	1 387	10,5	1 423			
6-9	3,5	4,8	18,2	13,8	1,8	57,8	100,0	96,5	1 049	25,0	1 067			
12-15	8,8	0,4	8,2	1,7	0,6	80,4	100,0	91,2	748	13,4	771			
12-23	31,2	0,3	4,9	1,5	0,6	61,4	100,0	68,8	2 398	12,8	2 515			
20-23	57,6	0,2	2,0	0,7	0,5	38,9	100,0	42,4	828	11,7	882			

Note : Les données sur l'allaitement se rapportent à une période de 24 heures (hier et la nuit dernière). Les enfants classés dans la catégorie « Allaitement et eau seulement » ne reçoivent aucun complément liquide ou solide. Les catégories « Non allaité », « Allaité exclusivement », « Allaité et eau seulement », « Jus/liquides non lactés » et « Aliments de complément » (solides et semi solides) sont hiérarchiques et mutuellement exclusives et la somme des pourcentages égale 100 %. Ainsi, les enfants qui sont allaités et qui reçoivent des liquides non lactés et qui ne reçoivent pas d'autres laits et qui ne reçoivent pas d'aliments de complément sont classés dans la catégorie « Liquides non lactés » même s'ils reçoivent également de l'eau. Tout enfant qui reçoit des aliments de complément est classé dans cette catégorie tant qu'il est toujours allaité.

¹ Les liquides non lactés comprennent les jus, les boissons à base de jus, les bouillons et les autres liquides.

Tableau 11.4 Indicateurs de l'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) concernant l'allaitement

Pourcentage d'enfants nourris selon les différentes pratiques alimentaires de l'ANJE, EDSB-V Bénin 2017-2018

Indicateur	Pourcentage	Effectif
Allaitement exclusif du nourrisson à moins de 6 mois	41,5	1 387
Allaitement exclusif à 4-5 mois	19,6	420
Allaitement prolongé à 1 an	91,2	748
Introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous (6-8 mois)	55,9	804
Allaitement prolongé à 2 ans	42,4	828
Allaitement à l'âge approprié (0-23 mois) ¹	56,4	5 271
Allaitement prédominant (0-5 mois) ²	82,3	1 387
Nourri au biberon (0-23 mois)	15,0	5 456

¹ Pour les enfants de 0-5 mois : exclusivement allaités ; pour les enfants de 6-23 mois : lait maternel et aliments de complément.

² Soit exclusivement allaités ou allaité et eau seulement et/ou liquides non lactés seulement.

Tableau 11.5 Durée médiane de l'allaitement

Durée médiane de l'allaitement, de l'allaitement exclusif et de l'allaitement prédominant des enfants nés au cours des 3 années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Durée médiane (en mois) de l'allaitement des enfants nés au cours des 3 années ayant précédé l'enquête ¹		
	Allaitement	Allaitement exclusif	Allaitement prédominant ²
Sexe			
Masculin	20,5	1,8	6,4
Féminin	20,4	2,3	6,3
Résidence			
Cotonou	19,2	a	4,9
Autres villes	19,3	1,5	6,3
Ensemble urbain	19,3	1,3	6,1
Rural	21,2	2,4	6,5
Département			
Alibori	22,2	2,8	6,1
Atacora	22,2	3,0	7,6
Atlantique	17,6	(1,4)	6,2
Borgou	22,1	1,4	6,5
Collines	19,6	2,8	6,7
Couffo	21,7	(2,1)	6,0
Donga	21,6	(2,7)	7,2
Littoral	19,2	a	4,9
Mono	(21,3)	a	7,2
Ouémé	18,1	(1,2)	6,5
Plateau	19,8	a	6,1
Zou	19,5	3,4	6,1
Niveau d'instruction			
Aucun	21,4	2,1	6,4
Primaire	19,4	2,0	6,8
Secondaire 1 ^{er} cycle	18,2	2,2	6,2
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	17,8	(2,5)	5,3
Quintiles de bien-être économique			
Le plus bas	21,6	2,3	7,0
Second	21,8	2,3	6,3
Moyen	21,0	2,1	6,0
Quatrième	19,7	1,9	6,7
Le plus élevé	17,9	1,4	5,9
Ensemble	20,4	2,1	6,4
Moyenne pour tous les enfants	20,4	3,7	8,2

Note : Les durées médiane et moyenne de l'allaitement sont basées sur le statut d'allaitement de l'enfant au moment de l'enquête (statut actuel). Y compris les enfants vivants et décédés. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

¹ Pour les enfants derniers-nés de moins de 24 mois vivant avec leur mère et qui sont allaités, l'information pour déterminer si l'allaitement est exclusif et prédominant est basée sur le rappel des aliments consommés pendant une période de 24 heures. On suppose que les derniers-nés de 24 mois ou plus qui vivent avec leur mère et qui sont allaités ne reçoivent ni un allaitement exclusif, ni un allaitement prédominant. On suppose que les enfants derniers-nés qui ne vivent pas actuellement avec leur mère et tous les enfants qui ne sont pas des derniers-nés ne sont pas actuellement allaités.

² Soit exclusivement allaités ou qui ont reçu le lait maternel, de l'eau et/ou des liquides non lactés seulement.

a = Non présenté parce que moins de 50 % des enfants de cette catégorie sont exclusivement allaités ou ne reçoivent que de l'eau en plus du lait maternel.

Tableau 11.6. Aliments et liquides reçus par les enfants le jour ou la nuit avant précédé l'interview

Pourcentage d'enfants derniers-nés de 2 ans vivant avec leur mère, par type d'aliments consommés le jour ou la nuit avant précédé l'interview, selon qu'ils sont, ou non, allaités et selon l'âge. EDSB-V Bénin 2017-2018

Âge en mois	Aliments solides ou semi solides											Effectif d'enfants de moins de 2 ans				
	Liquides			Fruits et légumes				Préparations à base de légumes et de noix					Vieillesse, poisson, volaille	Œufs	Fromage, yaourt, autres produits laitiers	Préparations solides ou semi-solides
	Lait en poudre pour enfant	Autres liquides ²	Aliments enrichis pour bébé	Préparations à base de céréales ³	Fruits et légumes riches en vitamine A ⁴	Autres fruits et légumes	Préparations à base de racines et de tubercules	Préparation à base de légumes et de noix	Vieillesse, poisson, volaille	Œufs	Fromage, yaourt, autres produits laitiers					
ENFANTS ALLAITÉS																
0-1	2,1	1,3	9,4	0,5	1,5	1,1	0,8	1,4	0,9	0,6	0,7	2,7	474			
2-3	2,2	2,5	16,6	1,2	4,8	1,2	1,2	1,4	0,6	2,5	1,1	9,9	448			
4-5	5,3	4,9	34,1	4,0	14,5	3,5	2,6	4,2	1,6	4,8	1,6	24,6	412			
6-8	5,0	8,3	49,8	7,1	33,0	16,7	12,9	18,0	11,8	22,7	11,7	55,8	775			
9-11	4,1	10,3	55,8	5,8	36,2	22,2	20,0	26,4	20,2	38,4	18,2	75,7	649			
12-17	4,8	15,4	58,4	7,3	40,8	35,3	30,0	40,2	29,2	53,4	24,4	87,7	1 028			
18-23	5,5	19,7	55,1	5,3	40,5	38,5	31,1	52,5	32,1	58,1	27,1	91,3	621			
6-23	4,8	13,4	55,0	6,5	37,8	28,5	23,8	34,2	23,5	43,4	20,4	77,9	3 072			
Ensemble	4,3	10,2	44,3	5,1	28,3	20,4	17,1	24,5	16,7	31,1	14,6	57,9	4 406			
ENFANTS NON ALLAITÉS																
0-1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	24			
2-3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	20			
4-5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9			
6-8	(19,2)	(12,7)	(54,3)	(12,9)	(39,0)	(26,3)	(16,2)	(27,6)	(14,2)	(25,1)	(23,6)	(54,5)	29			
9-11	(2,4)	(13,8)	(64,2)	(4,3)	(46,5)	(35,1)	(23,2)	(33,5)	(24,2)	(28,7)	(37,1)	(78,3)	33			
12-17	5,7	21,5	64,7	6,7	45,2	37,6	43,1	42,1	28,8	67,9	30,4	95,2	150			
18-23	5,2	14,0	64,0	10,2	45,5	43,5	41,8	47,8	35,8	66,3	29,0	95,4	600			
6-23	5,7	15,3	63,8	9,4	45,3	41,4	40,4	45,4	33,3	63,6	29,4	93,2	812			
Ensemble	6,1	14,9	61,1	9,2	43,3	39,4	38,1	43,0	31,4	60,2	27,7	88,5	864			

Note : Les données sur l'allaitement et sur les aliments consommés se rapportent à la période de « 24 heures » (hier et la nuit dernière). Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Les Autres laits comprennent le lait d'animal, qu'il soit frais, en boîte, ou en poudre.

² N'inclut pas l'eau plate. Inclut les jus, les boissons à base de jus, les bouillons clairs ou d'autres liquides non lactés

³ Inclut les aliments enrichis pour bébés

⁴ Comprend des fruits et légumes comme les citrouilles, les ignames ou les courges rouges ou jaunes, les carottes, les pommes de terre douces jaunes, les légumes à feuilles vert foncé, les mangues mûres, papayes, goyave, et d'autres fruits et légumes produits localement qui sont riches en vitamine A ainsi que l'huile de palme rouge, de noix de palme ou de sauce de pulpe de noix.

Tableau 11.7. Apport alimentaire minimum acceptable

Pourcentage d'enfants derniers-nés de 6-23 mois vivant avec leur mère qui ont reçu un apport alimentaire minimum acceptable basé sur l'allaitement, le nombre de groupes d'aliments et le nombre de fois qu'ils ont été nourris durant le jour ou la nuit ayant précédé l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Parmi les enfants de 6-23 mois allaités, pourcentage nourri selon :					Parmi les enfants de 6-23 mois non allaités, pourcentage ayant reçu :					Parmi tous les enfants de 6-23 mois, pourcentage ayant reçu :				
	Diversité alimentaire minimum ¹	Fréquence minimum des repas ²	Apport alimentaire minimum acceptable ³	Effectif d'enfants de 6-23 mois allaités	Lait ou produits laitiers ⁴	Diversité alimentaire minimum ¹	Fréquence minimum des repas ⁵	Apport alimentaire minimum acceptable ⁶	Effectif d'enfants de 6-23 mois non allaités	Lait maternel, lait ou produits laitiers ⁷	Diversité alimentaire minimum ¹	Fréquence minimum des repas ⁸	Apport alimentaire minimum acceptable ⁹	Effectif de tous les enfants de 6-23 mois	
Âge en mois															
6-8	13,6	42,0	10,8	775	(20,4)	(23,6)	(34,5)	(5,2)	29	97,1	13,9	41,8	10,6	804	
9-11	19,8	33,0	9,6	649	(15,6)	(29,8)	(20,1)	(3,4)	33	95,9	20,3	32,4	9,3	682	
12-17	31,5	49,4	18,7	1 028	23,2	34,2	46,5	10,6	150	90,2	31,8	49,0	17,6	1 177	
18-23	37,8	53,1	24,3	621	17,5	40,2	47,0	9,2	600	59,5	39,0	50,1	16,9	1 221	
Sexe															
Masculin	26,1	44,1	15,5	1 574	19,7	38,1	46,5	9,5	408	83,5	28,6	44,6	14,3	1 983	
Féminin	25,4	45,6	16,4	1 498	17,5	38,0	44,2	8,6	403	82,5	28,1	45,3	14,7	1 901	
Résidence															
Cotonou	30,4	44,0	19,5	136	44,8	52,3	58,7	23,0	54	84,3	36,6	48,2	20,5	190	
Autres villes	22,5	44,0	14,6	993	19,9	38,4	49,3	8,7	326	80,2	26,4	45,3	13,2	1 319	
Ensemble urbain	23,4	44,0	15,2	1 128	23,4	40,4	50,7	10,7	380	80,7	27,7	45,7	14,1	1 508	
Rural	27,1	45,3	16,3	1 944	14,4	36,1	40,7	7,6	432	84,4	28,8	44,5	14,7	2 376	
Département															
Alibori	44,2	53,7	29,6	439	38,3	57,4	48,5	27,1	80	90,5	46,2	52,9	29,2	519	
Atacora	16,9	38,5	12,7	309	(7,8)	(12,8)	(39,4)	(6,3)	45	88,4	16,4	38,6	11,9	353	
Atlantique	18,8	41,0	10,1	285	8,7	29,1	36,6	4,3	142	69,6	22,2	39,5	8,1	427	
Borgou	30,2	42,2	17,9	459	48,4	52,3	60,7	16,1	86	91,9	33,7	45,1	17,6	545	
Collines	31,4	25,7	5,4	189	7,2	32,2	12,0	2,1	49	80,7	31,6	22,9	4,7	238	
Couffo	24,3	52,8	19,3	214	(19,6)	(49,1)	(56,7)	(9,1)	41	87,1	28,3	53,4	17,7	255	
Donga	17,6	47,5	10,9	221	5,3	22,2	35,1	1,6	44	84,1	18,3	45,4	9,4	265	
Littoral	30,4	44,0	19,5	136	44,8	52,3	58,7	23,0	54	84,3	36,6	48,2	20,5	190	
Mono	17,7	30,0	8,8	130	(14,7)	(37,0)	(40,4)	(7,5)	26	85,6	21,0	31,8	8,6	157	
Ouémé	8,3	46,9	6,7	246	8,6	19,0	48,5	0,9	103	73,0	11,5	47,4	5,0	349	
Plateau	18,6	44,4	9,8	174	4,8	39,7	34,9	3,1	53	77,8	23,5	42,2	8,2	227	
Zou	31,7	57,1	22,9	271	11,0	53,4	59,2	7,5	87	78,3	37,0	57,6	19,1	358	
Niveau d'instruction de la mère															
Aucun	26,5	44,4	16,5	2 005	17,7	36,0	44,2	8,6	445	85,0	28,2	44,4	15,1	2 450	
Primaire	20,9	44,6	11,4	560	12,7	39,2	41,1	7,7	163	80,3	25,0	43,8	10,5	723	
Secondaire 1 ^{er} cycle	26,6	45,2	17,1	384	17,3	37,5	46,4	9,2	136	78,4	29,5	45,5	15,0	519	
Secondaire 2 nd cycle ou plus	33,7	51,2	22,6	124	41,7	50,2	61,1	15,1	68	79,5	39,5	54,7	20,0	192	

À suivre...

Tableau 11.7—Suite

Caractéristique sociodémographique	Parmi les enfants de 6-23 mois allaités, pourcentage nourri selon :				Parmi les enfants de 6-23 mois non allaités, pourcentage ayant reçu :				Parmi tous les enfants de 6-23 mois, pourcentage ayant reçu :					
	Diversité alimentaire minimum ¹	Fréquence minimum des repas ²	Apport alimentaire minimum acceptable ³	Effectif d'enfants de 6-23 mois allaités	Lait ou produits laitiers ⁴	Diversité alimentaire minimum ¹	Fréquence minimum des repas ⁵	Apport alimentaire minimum acceptable ⁶	Effectif d'enfants de 6-23 mois non allaités	Lait ou produits laitiers ⁷	Diversité alimentaire minimum ¹	Fréquence minimum des repas ⁸	Apport alimentaire minimum acceptable ⁹	Effectif de tous les enfants de 6-23 mois
Quintiles de bien-être économique														
Le plus bas	24,6	40,9	16,3	672	24,1	30,5	7,7	130	87,7	25,5	42,3	14,9	803	
Second	24,9	44,7	15,2	671	15,0	38,8	9,6	117	87,4	26,9	43,3	14,4	788	
Moyen	27,1	48,8	16,4	651	11,3	45,3	6,9	158	82,7	30,7	46,9	14,5	808	
Quatrième	26,6	43,8	15,6	595	12,7	29,3	7,0	192	78,7	27,2	43,3	13,5	787	
Le plus élevé	25,9	46,3	16,1	483	27,9	44,9	12,9	215	77,8	31,7	49,4	15,2	698	
Ensemble	25,8	44,8	15,9	3 072	18,6	38,1	9,0	812	83,0	28,3	44,9	14,5	3 884	

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

¹ Enfants qui ont reçu des aliments de cinq groupes ou plus des huit groupes alimentaires suivants: a. lait maternel ; b. préparation commerciale pour bébés, lait autre que le lait maternel, fromage ou yaourt ou autres produits laitiers ; c. préparations à base de céréales, de racines ou de tubercules et les préparations enrichies pour bébés à base de céréales ; d. fruits et légumes riches en vitamine A et huile de palme rouge ; e. autres fruits et légumes ; g. œufs viande, poisson et coquillage (et abats) ; h. légumes et noix.

² Pour les enfants allaités, la fréquence minimum des repas consiste à recevoir des aliments solides, semi-solides ou mous au moins deux fois par jour pour les enfants de 6-8 mois et au moins trois fois par jour pour ceux de 9-23 mois.

³ On considère que les enfants allaités de 6-23 mois reçoivent un apport alimentaire minimum acceptable s'ils sont nourris selon la diversité minimum alimentaire telle que décrite dans la note 1 et la fréquence minimum des repas telle que défini dans la note 2.

⁴ Y compris au moins deux repas comptant une préparation commerciale pour bébés, du lait d'animal frais, en boîte en poudre et du yaourt.

⁵ Pour les enfants de 6-23 mois non allaités, on considère que la fréquence minimum des repas est de recevoir des aliments solides, semi-solides, ou mous ou des préparations à base de lait au moins quatre fois par jour. L'un, au moins, des aliments doit être solide, semi-solide ou mou.

⁶ On considère que les enfants non allaités de 6-23 mois ont un apport alimentaire minimum acceptable s'ils reçoivent d'autres laits ou des produits laitiers au moins deux fois par jour, s'ils sont nourris selon la fréquence minimum des repas telle que définie à la note 5 et s'ils reçoivent des aliments solides, semi-solides, ou mous provenant d'au moins quatre groupes d'aliments, non compris le groupe d'aliments comprenant le lait ou les produits laitiers.

⁷ Lait maternel ou pas de lait maternel et recevant au moins deux repas de préparations commerciales pour bébés, de lait d'animal frais, en boîte ou en poudre et de yaourt.

⁸ Les enfants nourris le nombre minimum de fois recommandé par jour selon leur âge et selon qu'ils sont allaités ou non comme décrit aux notes 2 et 5.

⁹ On considère que les enfants de 6-23 mois ont un apport alimentaire minimum acceptable s'ils reçoivent le lait maternel, d'autres laits ou des produits laitiers comme décrit à la note 8, s'ils sont nourris selon la diversité alimentaire minimum comme décrit à la note 1 et selon la fréquence minimum des repas comme décrit aux notes 2 et 5.

Tableau 11.8 Prévalence de l'anémie chez les enfants

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois considérés comme étant anémiés, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Anémie selon le niveau d'hémoglobine				Effectif d'enfants de 6-59 mois
	Anémie (<11,0 g/dl)	Anémie légère (10,0-10,9 g/dl)	Anémie modérée (7,0-9,9 g/dl)	Anémie sévère (<7,0 g/dl)	
Age en mois					
6-8	87,1	26,0	58,2	2,9	431
9-11	88,9	30,6	55,8	2,5	363
12-17	84,3	25,7	53,1	5,5	658
18-23	77,4	26,0	46,6	4,7	685
24-35	70,9	29,6	38,0	3,3	1 309
36-47	65,2	26,7	35,2	3,4	1 356
48-59	59,9	28,3	30,1	1,5	1 369
Sexe					
Masculin	72,0	26,3	42,2	3,5	3 136
Féminin	71,0	29,1	39,0	2,9	3 035
Interview de la mère					
Interviewée	72,1	27,8	41,1	3,3	5 571
Mère non interviewée et vivant dans le ménage	70,4	37,6	28,9	3,9	95
Mère non interviewée et ne vivant pas dans le ménage ¹	66,0	24,7	38,4	3,0	506
Résidence					
Cotonou	61,1	33,6	26,9	0,6	275
Autres villes	66,8	28,1	36,5	2,3	2 050
Ensemble urbain	66,1	28,7	35,3	2,1	2 325
Rural	74,8	27,0	43,9	3,9	3 846
Département					
Alibori	75,0	26,4	44,8	3,8	787
Atacora	84,7	24,9	51,3	8,5	555
Atlantique	67,5	31,0	34,1	2,4	675
Borgou	74,4	22,6	47,9	4,0	818
Collines	66,2	29,8	34,3	2,1	385
Couffo	76,8	25,8	47,6	3,4	445
Donga	75,8	28,8	43,6	3,4	403
Littoral	61,1	33,6	26,9	0,6	275
Mono	67,5	31,5	33,4	2,6	293
Ouémé	72,7	33,7	37,4	1,6	552
Plateau	71,1	23,3	46,1	1,6	338
Zou	59,1	26,7	30,2	2,1	645
Niveau d'instruction de la mère²					
Aucun	74,2	26,6	43,6	4,0	3 822
Primaire	68,9	30,5	36,7	1,8	974
Secondaire 1 ^{er} cycle	68,4	29,6	36,7	2,0	664
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	57,8	34,4	23,4	0,0	205
Quintiles de bien-être économique					
Le plus bas	79,3	24,6	49,2	5,5	1 216
Second	74,5	25,0	45,3	4,3	1 249
Moyen	76,5	28,7	44,1	3,7	1 313
Quatrième	68,0	29,2	36,7	2,0	1 289
Le plus élevé	57,9	31,0	26,4	0,5	1 103
Ensemble	71,5	27,7	40,6	3,2	6 171

Note : Le tableau est basé sur les enfants qui ont passé la nuit dans le ménage ayant précédé l'interview et qui ont été testés pour l'anémie. La prévalence de l'anémie, basée sur le niveau d'hémoglobine est ajustée en fonction de l'altitude en utilisant les formules du CDC, 1998. Hémoglobine en grammes par décilitre (g/dl).

¹ Y compris les enfants dont la mère est décédée.

² Pour les femmes qui n'ont pas été interviewées, l'information provient du questionnaire Ménage. Non compris les enfants dont la mère n'est pas listée dans le questionnaire Ménage.

Tableau 11.9 Présence de sel iodé dans le ménage

Parmi tous les ménages, pourcentage dont le sel a été testé pour la présence d'iode, pourcentage disposant de sel mais dont le sel n'a pas été testé et pourcentage ne disposant pas de sel dans le ménage et, parmi les ménages dont le sel a été testé, pourcentage ayant du sel iodé selon certaines caractéristiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Parmi tous les ménages, pourcentage			Effectif de ménages	Parmi les ménages dans lesquels le sel a été testé :	
	Dont le sel a été testé	disposant de sel mais dont le sel n'a pas été testé ¹	Ne disposant pas de sel dans le ménage		Pourcentage disposant de sel iodé	Effectif de ménages
Résidence						
Cotonou	89,4	1,3	9,3	852	84,6	761
Autres villes	93,7	0,6	5,7	5 252	88,9	4 919
Ensemble urbain	93,1	0,7	6,2	6 104	88,3	5 680
Rural	94,5	0,8	4,8	8 052	90,6	7 608
Département						
Alibori	98,1	0,1	1,7	1 192	96,7	1 169
Atacora	97,0	0,4	2,6	923	98,6	896
Atlantique	90,2	0,9	8,9	1 969	84,3	1 776
Borgou	95,7	1,0	3,3	1 498	92,9	1 433
Collines	94,5	1,7	3,8	981	92,8	927
Couffo	92,4	0,2	7,3	1 108	97,9	1 024
Donga	96,4	0,4	3,2	740	95,2	714
Littoral	89,4	1,3	9,3	852	84,6	761
Mono	92,0	2,2	5,8	879	78,0	808
Ouémé	91,2	0,5	8,3	1 633	85,0	1 489
Plateau	96,1	0,4	3,6	984	90,7	946
Zou	96,1	0,3	3,6	1 399	83,7	1 344
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	95,6	0,5	3,9	2 501	91,1	2 392
Second	94,6	0,6	4,8	2 675	92,0	2 530
Moyen	94,0	1,0	5,1	2 798	90,0	2 630
Quatrième	92,7	0,5	6,7	2 951	88,4	2 737
Le plus élevé	92,8	1,1	6,1	3 231	87,2	3 000
Ensemble	93,9	0,7	5,4	14 156	89,6	13 288

¹ Y compris les ménages dans lesquels le sel n'a pas pu être testé pour des raisons techniques ou logistiques incluant la disponibilité de kits de tests.

Tableau 11.10 Consommation de micronutriments par les enfants

Parmi les enfants derniers-nés de 6-23 mois vivant avec leur mère, pourcentages qui ont consommé des aliments riches en vitamine A et des aliments riches en fer au cours des 24 heures ayant précédé l'interview ; parmi tous les enfants de 6-23 mois, pourcentage à qui on a donné un mélange en poudre de micronutriments multiples dans les 7 jours ayant précédé l'interview; parmi tous les enfants de 6-59 mois, pourcentage à qui on a donné des suppléments de vitamine A dans les 6 mois ayant précédé l'interview, pourcentage à qui on a donné des suppléments de fer dans les 7 jours ayant précédé l'interview et pourcentage à qui on a donné des vermifuges dans les 6 mois ayant précédé l'interview, et parmi tous les enfants de 6-59 mois qui vivent dans un ménage dans lequel le sel a été testé pour la présence d'iode, pourcentage vivant dans un ménage qui disposait de sel iodé, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Parmi les enfants derniers-nés de 6-23 mois vivant avec leur mère :			Parmi tous les enfants de 6-23 mois :			Parmi tous les enfants de 6-59 mois :			Parmi les enfants de 6-59 mois vivant dans un ménage dans lequel le sel a été testé :	
	Pourcentage ayant consommé des aliments riches en vitamine A dans les dernières 24 heures ¹	Pourcentage ayant consommé des aliments riches en fer dans les dernières 24 heures ²	Effectif d'enfants	Pourcentage à qui on a donné un mélange en poudre de micronutriments au cours des sept derniers jours	Effectif d'enfants	Pourcentage à qui on a donné des suppléments de fer dans les 7 derniers jours ³	Pourcentage à qui on a donné des suppléments de vitamine A dans les 6 derniers mois ⁴	Pourcentage à qui on a donné des vermifuges dans les 6 derniers mois ⁵	Effectif d'enfants	Pourcentage vivant dans un ménage disposant de sel iodé ⁶	Effectif de ménages
Âge en mois											
6-8	28,5	25,3	804	1,4	817	21,4	43,9	21,7	817	90,6	795
9-11	49,0	42,9	682	1,2	701	27,0	55,0	32,4	701	90,8	686
12-17	66,8	59,7	1 177	2,0	1 223	27,5	58,4	39,1	1 223	91,7	1 185
18-23	74,4	67,0	1 221	1,4	1 292	27,9	54,8	44,3	1 292	92,6	1 257
24-35	na	na	na	na	na	25,2	52,9	43,0	2 365	90,6	2 319
36-47	na	na	na	na	na	22,2	52,2	37,1	2 450	92,0	2 395
48-59	na	na	na	na	na	20,4	49,2	38,5	2 416	91,2	2 363
Sexe											
Masculin	57,5	51,3	1 983	1,4	2 056	23,5	53,1	38,3	5 722	91,1	5 596
Féminin	58,9	52,6	1 901	1,7	1 976	24,4	51,4	38,3	5 541	91,7	5 404
Allaitement											
Allaité	53,5	47,5	3 072	1,5	3 139	24,1	52,4	31,5	3 360	91,4	3 280
Non allaité	75,7	68,8	812	1,8	893	23,8	52,2	41,1	7 902	91,4	7 720
Âge de la mère											
15-19	49,4	44,4	269	1,5	277	17,8	48,7	29,6	402	90,5	390
20-29	58,6	52,2	2 191	1,5	2 280	23,5	51,3	36,9	5 797	91,1	5 662
30-39	59,5	53,2	1 212	1,9	1 254	25,9	53,3	41,1	4 094	91,3	4 010
40-49	56,9	52,0	213	0,4	220	20,5	54,5	38,1	970	93,7	938
Résidence											
Cotonou	67,0	65,1	190	1,5	199	43,9	61,2	70,2	512	86,3	483
Autres villes	59,3	53,2	1 319	1,4	1 368	26,6	56,6	44,4	3 896	90,1	3 821
Ensemble urbain	60,3	54,7	1 508	1,4	1 568	28,6	57,1	47,4	4 408	89,7	4 304
Rural	56,8	50,2	2 376	1,6	2 465	20,9	49,1	32,4	6 855	92,5	6 695

À suivre...

Tableau 11.10—Suite

Caractéristique sociodémographique	Parmi les enfants derniers-nés de 6-23 mois vivant avec leur mère :		Parmi tous les enfants de 6-23 mois :		Parmi tous les enfants de 6-59 mois :		Parmi les enfants de 6-59 mois vivant dans un ménage dans lequel le sel a été testé :		
	Pourcentage ayant consommé des aliments riches en vitamine A dans les dernières 24 heures ¹	Pourcentage ayant consommé des aliments riches en fer dans les dernières 24 heures ²	Pourcentage à qui on a donné un mélange en poudre de micronutriments au cours des sept derniers jours	Effectif d'enfants	Pourcentage à qui on a donné des suppléments de fer dans les 7 derniers jours ³	Pourcentage à qui on a donné des suppléments de vitamine A dans les 6 derniers mois ^{4,5}	Effectif d'enfants	Pourcentage vivant dans un ménage disposant de sel iodé ⁶	Effectif de ménages
Département									
Alibori	69,4	64,6	3,7	537	5,2	34,9	1 493	97,4	1 481
Atacora	36,3	28,3	0,4	363	21,3	68,4	1 000	99,0	990
Atlantique	58,2	52,7	0,0	446	37,6	71,6	1 301	85,2	1 253
Borgou	55,2	41,9	3,0	545	12,2	44,1	1 514	93,3	1 495
Collines	55,8	52,5	2,2	248	30,5	59,9	712	93,7	691
Couffo	56,4	50,8	0,0	265	12,2	36,6	737	97,6	712
Donga	43,8	39,6	0,0	274	23,9	75,2	720	95,7	718
Littoral	67,0	65,1	1,5	199	43,9	61,2	512	86,3	483
Mono	63,9	56,4	1,1	164	32,2	44,9	499	79,0	480
Ouémé	56,1	52,7	0,4	366	25,0	39,7	1 022	85,5	985
Plateau	53,3	46,9	2,7	236	42,6	49,1	684	90,3	660
Zou	78,9	74,2	1,8	376	29,7	52,9	1 070	86,1	1 052
Niveau d'instruction de la mère									
Aucun	57,9	50,8	1,6	2 542	19,4	49,1	7 418	92,3	7 244
Primaire	53,8	47,9	0,6	747	29,4	57,4	2 040	88,4	1 992
Secondaire 1 ^{er} cycle	60,3	56,9	2,1	543	34,4	57,6	1 332	91,2	1 303
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	71,8	67,9	2,7	200	40,9	64,7	473	91,0	460
Quintiles de bien-être économique									
Le plus bas	50,7	40,8	2,4	829	12,8	43,0	2 402	94,1	2 350
Second	55,4	48,4	1,1	820	18,8	46,9	2 254	93,8	2 205
Moyen	59,6	53,7	1,1	840	22,6	53,0	2 267	90,8	2 211
Quatrième	61,0	56,6	1,5	813	28,2	57,7	2 280	89,9	2 233
Le plus élevé	64,8	61,3	1,7	729	39,1	62,0	2 060	87,9	2 000
Ensemble	58,2	51,9	1,6	4 032	23,9	52,2	11 262	91,4	11 000

na = Non applicable

¹ Y compris la viande (et abats), poisson, volaille, œufs, citrouilles, ignames ou courges rouges ou jaunes, carottes, pommes de terre douces rouges, les légumes à feuilles vert foncé, les mangues mûres, papayes mûres et autres fruits et légumes produits localement qui sont riches en vitamine A, et l'huile de palme rouge

² Y compris la viande (et les abats), le poisson, la volaille et œufs.

³ Basé sur le souvenir de la mère.

⁴ Basé sur le souvenir de la mère et le carnet de vaccination (quand il est disponible).

⁵ Les vermifuges contre les parasites intestinaux sont couramment donnés pour traiter les helminthes et les schistosomiases.

⁶ Sont exclus les enfants vivant dans un ménage dans lesquels le sel n'a pas été testé.

Tableau 11.11 État nutritionnel des femmes

Parmi les femmes de 15-49 ans, pourcentage ayant une taille inférieure à 145 cm, un Indice de Masse Corporelle (IMC) moyen et pourcentage ayant certains niveaux d'IMC, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Taille		Indice de Masse Corporelle (IMC) ¹			En surpoids/ obèse			Effectif de femmes
	Pourcentage en dessous de 145 cm	Effectif de femmes	Normal		≥25,0 (Total en surpoids ou obèse)	En surpoids/ obèse			
			18,5-24,9 (Total normal)	<18,5 (Total maigre)		17,0-18,4 (Maigreur légère)	<17,0 (Maigreur modérée et sévère)		
Groupe d'âges									
15-19	2,8	1 670	20,7	20,5	6,7	6,0	5,9	0,9	1 518
20-29	1,4	2 942	22,5	10,0	19,9	2,1	14,9	5,0	2 343
30-39	0,9	2 088	24,6	7,7	38,2	1,6	22,1	16,1	1 775
40-49	0,9	1 362	25,1	6,5	41,9	1,6	23,6	18,3	1 310
Résidence									
Cotonou	1,1	475	26,0	6,1	47,7	0,9	23,3	24,4	439
Autres villes	1,3	2 889	23,9	10,0	32,6	2,6	20,1	12,6	2 524
Ensemble urbain	1,2	3 364	24,2	9,4	34,9	2,3	20,5	14,3	2 963
Rural	1,6	4 698	22,3	12,3	19,1	3,0	13,3	5,8	3 983
Département									
Alibori	0,6	920	23,1	10,0	25,1	2,7	17,5	7,6	770
Atacora	1,6	680	21,3	15,4	12,3	3,2	9,9	2,5	585
Atlantique	1,9	1 035	23,8	9,8	31,4	2,7	16,7	14,7	910
Borgou	1,2	939	22,3	11,9	19,9	3,4	13,8	6,2	783
Collines	0,8	558	23,1	8,3	24,1	2,5	15,0	9,0	482
Couffo	0,5	519	22,2	9,3	17,8	1,3	13,6	4,2	433
Donga	0,4	463	23,7	5,6	29,9	1,7	22,5	7,4	375
Littoral	1,1	475	26,0	46,2	47,7	0,9	23,3	24,4	439
Mono	3,3	373	23,0	13,5	26,1	3,6	17,0	9,0	326
Ouémé	1,5	755	23,9	13,1	33,8	3,6	21,3	12,5	682
Plateau	2,1	489	22,5	15,5	20,0	4,2	13,0	6,9	416
Zou	2,6	857	22,9	12,4	23,3	2,3	15,3	8,0	745
Niveau d'instruction									
Aucun	1,3	4 464	23,0	10,4	24,6	2,4	16,3	8,3	3 785
Primaire	2,4	1 569	23,6	12,2	29,7	3,2	16,9	12,8	1 349
Secondaire 1 ^{er} cycle	1,6	1 459	22,7	12,4	22,5	2,8	14,5	8,0	1 295
Secondaire 2 ^e cycle ou plus	0,2	569	24,2	10,0	33,3	3,4	20,5	12,9	517
Quintiles de bien-être économique									
Le plus bas	2,2	1 290	21,2	16,3	11,5	4,0	9,4	2,0	1 080
Second	1,7	1 455	22,0	12,2	16,0	2,3	11,7	4,3	1 213
Moyen	1,4	1 664	22,6	10,9	20,9	2,6	15,2	5,7	1 432
Quatrième	1,1	1 788	23,5	10,6	30,0	3,0	19,5	10,6	1 542
Le plus élevé	1,2	1 864	25,3	7,4	42,5	2,1	22,5	20,0	1 678
Ensemble	1,5	8 061	23,1	11,1	25,8	2,7	16,4	9,4	6 946

Note : L'Indice de masse Corporelle (IMC) est le ratio du poids en kilogrammes par rapport au carré de la taille en mètres (kg/m²).

¹ Sont exclues les femmes enceintes et les femmes ayant eu une naissance dans les 2 mois précédents.

Tableau 11.12 Prévalence de l'anémie chez les femmes

Pourcentage de femmes de 15-49 ans atteintes d'anémie, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Anémie selon le niveau d'hémoglobine				Effectif de femmes	
	Anémie		Légère	Modérée		Sévère
	Non-enceinte	<12,0 g/dl	11,0-11,9 g/dl	8,0-10,9 g/dl		<8,0 g/dl
Enceinte	<11,0 g/dl	10,0-10,9 g/dl	7,0-9,9 g/dl	<7,0 g/dl		
Groupe d'âges						
15-19		57,4	25,6	29,5	2,3	1 662
20-29		56,7	25,6	29,5	1,5	2 926
30-39		57,7	25,1	30,5	2,1	2 074
40-49		60,5	26,4	32,3	1,8	1 356
Nombre d'enfants déjà nés						
0		55,8	25,2	28,6	2,1	2 038
1		58,9	27,5	29,3	2,1	1 025
2-3		57,0	24,4	30,8	1,9	1 933
4-5		57,9	25,6	30,3	2,0	1 578
6+		60,3	26,5	32,5	1,3	1 445
Maternité						
Enceinte		68,4	22,5	43,7	2,2	872
Allaite		56,5	27,0	28,1	1,4	2 300
Ni l'un, ni l'autre		56,4	25,5	28,9	2,0	4 847
Utilise un DIU						
Oui		61,6	24,1	37,0	0,5	98
Non		57,7	25,6	30,2	1,9	7 920
Utilisation de cigarettes¹						
Fume des cigarettes		65,1	24,1	35,9	5,0	115
Ne fume pas des cigarettes		57,6	25,6	30,2	1,8	7 903
Résidence						
Cotonou		60,7	30,0	27,3	3,4	463
Autres villes		57,0	25,8	29,8	1,4	2 871
Ensemble urbain		57,5	26,4	29,4	1,7	3 334
Rural		57,9	25,1	30,8	2,0	4 685
Département						
Alibori		57,5	25,2	29,9	2,3	919
Atacora		67,4	28,0	37,3	2,2	681
Atlantique		60,2	27,5	31,3	1,4	1 030
Borgou		51,1	22,0	27,2	2,0	924
Collines		39,5	18,4	20,0	1,1	560
Couffo		61,3	23,9	35,0	2,4	514
Donga		50,0	27,5	21,7	0,9	462
Littoral		60,7	30,0	27,3	3,4	463
Mono		58,9	27,8	30,1	1,0	372
Ouémé		69,5	26,4	40,9	2,2	746
Plateau		70,5	25,6	43,3	1,6	491
Zou		48,7	26,7	20,3	1,7	857
Niveau d'instruction						
Aucun		59,3	25,3	31,7	2,2	4 451
Primaire		58,6	28,1	29,2	1,2	1 558
Secondaire 1 ^{er} cycle		53,8	24,1	28,1	1,6	1 451
Secondaire 2 ^d cycle ou plus		53,4	25,3	26,5	1,6	559
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas		63,1	26,7	34,5	2,0	1 290
Second		58,3	24,0	32,6	1,7	1 449
Moyen		58,4	26,7	29,5	2,2	1 663
Quatrième		55,8	25,1	29,0	1,7	1 782
Le plus élevé		54,8	25,7	27,3	1,9	1 836
Ensemble		57,7	25,6	30,2	1,9	8 018

Note : La prévalence est ajustée en fonction de l'altitude et du statut tabagique, si l'information est disponible, en utilisant les formules du CDC (CDC 1998).

¹ Y compris les cigarettes commerciales et cigarettes roulées.

Tableau 11.13 Consommation de micronutriments par les mères

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu un enfant au cours des 5 années ayant précédé l'enquête, répartition (en %) par nombre de jours pendant lesquels elles ont pris du fer, sous forme de comprimés ou de sirop, pendant la grossesse de leur dernier enfant et pourcentage qui ont pris des vermifuges au cours de la grossesse de leur dernier enfant et parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu un enfant au cours des 5 années ayant précédé l'enquête et qui vivent dans un ménage dans lequel le sel a été testé pour la présence d'iode, pourcentage vivant dans un ménage disposant de sel iodé, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Parmi les femmes ayant eu un enfant dans les 5 dernières années :						Parmi les femmes ayant eu un enfant dans les 5 dernières années qui vivent dans un ménage dans lequel le sel a été testé :			
	Nombre de jours pendant lesquels elles ont pris du fer, en comprimés ou en sirop, au cours de la grossesse de leur dernière naissance						Pourcentage de femmes ayant pris des vermifuges pendant la grossesse de la dernière naissance	Effectif de femmes	Pourcentage vivant dans un ménage disposant de sel iodé ¹	
	Aucun	<60	60-89	90+	Ne sait pas/ manquant	Total				
Groupe d'âges										
15-19	19,0	23,6	5,3	43,4	8,7	100,0	52,6	506	90,1	491
20-29	14,0	20,5	5,8	46,7	13,0	100,0	63,3	4 472	91,3	4 374
30-39	12,9	18,8	5,9	48,2	14,2	100,0	68,4	3 190	91,2	3 118
40-49	16,0	16,5	6,6	47,1	13,7	100,0	63,9	862	93,8	836
Résidence										
Cotonou	2,9	17,1	3,4	60,3	16,4	100,0	90,6	408	85,7	389
Autres villes	9,6	17,8	5,8	52,4	14,4	100,0	70,2	3 115	90,2	3 050
Ensemble urbain	8,8	17,7	5,5	53,3	14,7	100,0	72,6	3 523	89,7	3 439
Rural	17,5	20,9	6,1	43,1	12,4	100,0	59,4	5 508	92,5	5 381
Département										
Alibori	26,7	22,3	3,5	40,7	6,7	100,0	50,4	1 226	97,0	1 219
Atacora	23,2	23,5	9,7	29,9	13,7	100,0	33,8	800	98,8	793
Atlantique	2,0	8,2	5,2	71,6	13,0	100,0	89,2	1 043	85,0	998
Borgou	35,0	12,8	5,9	37,9	8,4	100,0	33,8	1 164	93,2	1 147
Collines	6,0	24,4	9,0	52,6	7,9	100,0	64,4	604	93,7	590
Couffo	10,6	20,5	6,9	27,8	34,2	100,0	57,9	583	98,1	564
Donga	10,9	13,9	10,6	46,7	17,8	100,0	65,3	599	95,2	597
Littoral	2,9	17,1	3,4	60,3	16,4	100,0	90,6	408	85,7	389
Mono	9,0	33,5	3,7	40,5	13,4	100,0	73,2	393	80,8	378
Ouémé	3,5	19,7	3,4	54,7	18,7	100,0	94,0	798	86,0	763
Plateau	9,5	29,5	7,4	38,0	15,6	100,0	76,1	550	90,2	532
Zou	5,1	24,5	3,8	59,3	7,3	100,0	78,2	863	85,6	849
Niveau d'instruction										
Aucun	18,8	19,0	6,3	42,9	13,0	100,0	57,5	5 807	92,3	5 675
Primaire	7,4	22,5	5,6	51,1	13,5	100,0	73,5	1 650	88,3	1 614
Secondaire 1 ^{er} cycle	4,9	21,4	4,6	55,6	13,5	100,0	80,2	1 150	91,6	1 119
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	1,3	13,8	4,1	65,4	15,4	100,0	84,9	423	90,5	412
Quintiles de bien-être économique										
Le plus bas	33,7	17,9	5,8	31,3	11,3	100,0	40,9	1 827	94,0	1 788
Second	16,7	22,8	6,1	41,8	12,7	100,0	57,1	1 827	93,7	1 790
Moyen	11,1	22,0	7,1	47,6	12,3	100,0	64,4	1 837	91,4	1 791
Quatrième	6,1	19,6	6,3	53,8	14,1	100,0	74,4	1 857	89,8	1 817
Le plus élevé	2,3	15,9	3,8	61,9	16,1	100,0	87,7	1 683	87,8	1 634
Ensemble	14,1	19,7	5,9	47,1	13,3	100,0	64,6	9 031	91,4	8 819

¹ Non compris les femmes des ménages dans lesquels le sel n'a pas été testé.

Résultats clés

- **Mortalité infanto-juvénile** : Au Bénin, pour la période des 5 années ayant précédé l'enquête, sur 1 000 naissances vivantes, 96 sont décédées avant leur cinquième anniversaire.
- **Mortalité infantile** : Pour la période des 5 années ayant précédé l'enquête, sur 1 000 naissances vivantes, 55 sont décédées avant leur premier anniversaire.
- **Variation selon l'intervalle avec la naissance précédente** : Le risque de décès des enfants de moins de 5 ans a tendance à diminuer de manière importante avec l'allongement de la durée de l'intervalle intergénéral, passant de 165 ‰ quand la durée est inférieure à 2 ans à 68 ‰ quand elle est d'au moins 4 années.
- **Variation selon quintile de bien-être économique** : Le risque de décès entre la naissance et le cinquième anniversaire a tendance à diminuer du quintile le plus bas au plus élevé, passant de 108 ‰ à 60 ‰.

La mortalité des enfants est non seulement un indicateur du niveau de développement socio-économique d'un pays, mais il permet aussi d'identifier les problèmes et d'évaluer les besoins en matière de santé dans un pays. Les informations sur la mortalité des enfants permettent également d'identifier les enfants à hauts risques de mortalité et de mettre en place des stratégies pour réduire ces risques, comme par exemple, la promotion de l'espacement des naissances.

Ce chapitre présente les niveaux, tendances et différentiels de la mortalité périnatale, néonatale, infantile et infanto-juvénile. Il présente aussi les facteurs biodémographiques et les comportements procréateurs qui contribuent à augmenter les risques de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Les indicateurs de mortalité sont calculés à partir d'informations obtenues à partir de l'historique des naissances, dans lequel les femmes déclarent toutes les naissances qu'elles ont eues. Pour chaque enfant, la date de naissance, l'état de survie, l'âge actuel ou l'âge au décès sont collectés.

La qualité des estimations de la mortalité calculées à partir des informations provenant de l'historique des naissances dépend de la capacité de la mère à se souvenir de tous les enfants à qui elle a donné naissance mais aussi de leur date de naissance et de leur âge au décès. Les problèmes qui peuvent affecter la qualité des données sont :

- L'omission sélective dans l'historique des naissances de celles qui n'ont pas survécu ; ce qui peut induire une sous-estimation de la mortalité des enfants.
- Le déplacement des dates de naissances ; ce qui peut biaiser les tendances de la mortalité. Cela arrive quand un enquêteur enregistre sciemment une naissance à une date différente de celle à laquelle elle s'est produite. Cela peut aussi arriver quand un enquêteur essaye de diminuer sa charge de travail en esquivant toutes les questions supplémentaires qui portent sur les naissances ayant eu lieu au cours des 5 années avant l'enquête.

- La mauvaise déclaration de l'âge au décès : une mauvaise déclaration de l'âge de l'enfant au décès peut biaiser les variations par âge de la mortalité, en particulier si l'effet net de la mauvaise déclaration de l'âge est le transfert des décès d'une tranches d'âges à une autre.
- La corrélation entre les risques de mortalité des mères et des enfants : toute méthode de mesure de la mortalité des enfants qui repose sur les déclarations de la mère, comme l'historique des naissances, suppose que la mortalité adulte féminine n'est pas élevée, ou si c'est le cas, qu'il y a peu ou aucune corrélation entre les risques de mortalité des mères et ceux de leurs enfants.

Les indicateurs de la qualité des données de la mortalité sur lesquels les estimations de ce chapitre sont basées, figurent en Annexe C, **Tableaux C.3 à C.6**.

12.1 MORTALITÉ DES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS

Quotient de mortalité néonatale : probabilité de décéder avant d'atteindre un mois.

Quotient de mortalité post-néonatale : probabilité de décéder entre le premier mois et le premier anniversaire (calculé par différence entre les taux de mortalité infantile et néonatale).

Quotient de mortalité infantile : probabilité de décéder entre la naissance et le premier anniversaire.

Quotient de mortalité juvénile : probabilité de décéder entre le premier et le cinquième anniversaire.

Quotient de mortalité infanto-juvénile : probabilité de décéder entre la naissance et le cinquième anniversaire.

Les résultats du **Tableau 12.1** révèlent qu'au Bénin, le quotient de mortalité infantile pour la période de 5 ans avant l'enquête est estimée à 55 %. Ces résultats montrent qu'environ un enfant sur 20 décède avant d'atteindre son premier anniversaire. Quant à la mortalité juvénile, elle est estimée à 44 %, ce qui signifie qu'environ un enfant sur 25 décède entre le premier et le cinquième anniversaire.

Les deux composantes de la mortalité infantile, c'est-à-dire la mortalité néonatale et la mortalité postnéonatale, sont estimées respectivement à 30 % et à 25 %. Le poids de la mortalité néonatale dans la mortalité infantile est donc plus important que celui de la mortalité post-néonatale (55 % par rapport à 45 %).


Globalement, le quotient de mortalité infanto-juvénile est de 96 %. En d'autres termes, environ un enfant sur dix n'atteint pas son cinquième anniversaire.

Tendances : En excluant les taux calculés avec l'EDSB-IV, comme il a été dit auparavant ont été sous-estimés, le **Graphique 12.1** montre une baisse continue de la mortalité des enfants depuis 2001. La vitesse de cette baisse, cependant, aurait diminué au cours des 10-12 dernières années.

Le risque de décès entre la naissance et le cinquième anniversaire est passé de 160 % en 2001 à 96 % en 2017-2018 : soit une baisse de 64 points de pourcentage en 16 ans. Si l'on veut réaliser l'objectif

Graphique 12.1 Tendances de la mortalité des enfants de moins de 5 ans

Décès pour 1 000 naissances vivantes par période de 5 ans avant l'enquête



* L'évaluation de la qualité des données de l'EDSB-IV de 2011-2012 avait révélé une sous-estimation des indicateurs de mortalité des enfants due à la sous-déclarations des naissances. Pour cela, ces estimations sont inclus dans le graphique mais exclut des lignes de tendances.

de l'ODD3 qui fixe le taux de mortalité infanto-juvénile à atteindre en 2030 à 25 ‰, on réalise l'importance de l'effort à faire dans le cas où la même tendance se maintiendrait.

Sur la même période, le quotient de mortalité infantile est passé de 89 ‰ à 55 ‰ (soit une diminution de 34 points de pourcentage) et celui de la mortalité néonatale est passé de 38 ‰ à 30 ‰ (soit une baisse de 8 points de pourcentage).

Variations par caractéristique

La mortalité des enfants varie selon certaines caractéristiques sociodémographiques. Les niveaux de mortalité par sexe et par milieu de résidence présentés sont calculés pour la période des 5 années ayant précédé l'enquête (**Tableau 12.2**).

- Quel que soit le type de mortalité considéré, le risque de décès est plus élevé en milieu rural. Ainsi, le quotient de mortalité infanto-juvénile est de 81 ‰ pour le milieu urbain et 106 ‰ pour le milieu rural. Pour ce qui est de la mortalité infantile, ce risque est de 49 ‰ pour le milieu urbain contre 59 ‰ pour le milieu rural.
- Quel que soit le type de mortalité, on note une surmortalité masculine. Pour la mortalité infantile, le quotient est de 62 ‰ pour le sexe masculin contre 48 ‰ pour le sexe féminin (**Tableau 12.2**).


Les estimations des niveaux de mortalité selon les autres caractéristiques sociodémographiques telles que le département de résidence, le niveau d'instruction de la mère et le quintile de bien-être économique, sont calculées pour la période des 10 années avant l'enquête (**Tableau 12.3**). Cette période de référence plus longue permet de disposer dans chaque sous-groupe d'un nombre de cas suffisamment important pour permettre le calcul des indicateurs.

- C'est dans la Donga et l'Atacora que le quotient de mortalité infanto-juvénile est le plus élevé avec des niveaux respectifs de 129 ‰ et 122 ‰ (**Graphique 12.2**). A l'opposé, l'Ouémé et le Littoral enregistrent les niveaux les plus faibles (respectivement 74 ‰ et 64 ‰). En ce qui concerne la mortalité infantile, on constate qu'elle est plus élevée dans la Donga et le Plateau avec respectivement 85 ‰ et 78 ‰, tandis que ses niveaux les plus faibles sont observés dans le Littoral (45 ‰) et l'Ouémé (28 ‰). Le quotient de mortalité néonatale varie d'un maximum de 45 ‰ dans la Donga à un minimum de 16 ‰ dans l'Ouémé.

- Plus le niveau d'instruction de la mère est élevé, plus les risques de mortalité des enfants sont faibles. En effet, le quotient de mortalité infantile est plus élevé chez les enfants dont la mère n'a aucun niveau d'instruction (62 ‰) que chez ceux dont elle a le niveau secondaire 2^d cycle ou plus (57 ‰). La mortalité juvénile est estimée à 49 ‰ pour les enfants dont la mère n'a aucun niveau

Graphique 12.2 Mortalité infanto-juvénile par département

Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période des 10 années ayant précédé l'enquête



d'instruction, a 39 % quand la mère a le niveau primaire et a 25 % quand elle a le niveau secondaire 1^{er} cycle.

- Le niveau de vie du ménage est négativement associé aux risques de mortalité aux jeunes âges. Les risques de décès pour les enfants dont les ménages sont classés dans les deux quintiles de bien-être économique les plus pauvres, sont en général plus élevés que ceux du quintile le plus riche. Ainsi, le quotient de mortalité infanto-juvénile varie de 108 ‰ dans le quintile le plus bas et 124 ‰ dans le second quintile, à 60 ‰ dans le quintile le plus élevé (**Graphique 12.3**).

12.2 FACTEURS DE RISQUE BIODÉMOGRAPHIQUES

De nombreuses études ont mis en évidence le rôle déterminant de certains facteurs de risque (en relation avec les caractéristiques de la mère et de l'enfant) sur les différences de mortalité des enfants. Les **Tableaux 12.2** et **12.3** présentent les niveaux de mortalité néonatale, post-néonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile en fonction de ces facteurs de risque.

Les enfants dont la mère était âgée de moins de 20 ans à leur naissance courent un risque plus élevé de décéder avant d'atteindre leur 5^{ème} anniversaire que ceux dont la mère était âgée de 20-29 ans (119 ‰ contre 98 ‰).


Le rang de naissance influence les probabilités de décéder des enfants de moins de 5 ans : globalement, les risques de mortalité augmentent avec le rang de naissance, passant pour la mortalité infantile de 58 ‰ au rang un à 79 ‰ aux rangs 7 et plus et, pour la mortalité infanto-juvénile, de respectivement 96 ‰ à 134 ‰.

Le risque de décès chez les enfants avant le 5^e anniversaire varie en fonction de l'intervalle intergénéral (temps écoulé par rapport à la naissance précédente). En effet, le quotient de mortalité infanto-juvénile a tendance à diminuer avec l'augmentation de l'intervalle entre naissances, passant de 165 ‰ quand l'intervalle est inférieur à 2 ans à 82 ‰ quand il est de 3 ans et à 68 ‰ quand il est d'au moins 4 années (**Graphique 12.4**).

La taille des enfants à la naissance affecte aussi les risques de décéder. Le quotient de mortalité infantile chez les enfants petits/très petits à la naissance est de 75 ‰ contre 46 ‰ pour ceux qui étaient moyens/gros. De même, le quotient de mortalité néonatale parmi les enfants petits/très petits à la naissance est pratiquement le double de celui des enfants de poids moyen/gros (45 ‰ contre 23 ‰).


Graphique 12.3 Mortalité infanto-juvénile par bien-être économique du ménage

Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période des 10 années ayant précédé l'enquête



Graphique 12.4 Mortalité des enfants de moins de 5 ans selon l'intervalle avec la naissance précédente

Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période des 10 années ayant précédé l'enquête



12.3 MORTALITÉ PÉRINATALE

Taux de mortalité périnatale

Les décès périnataux comprennent les mort-nés (décès fœtaux qui se sont produits après 7 mois de grossesse) et les décès néonataux précoces (décès de naissances vivantes qui se sont produits entre 0-6 jours). Le taux de mortalité périnatale est la somme des décès périnataux divisés par le nombre de grossesses de 7 mois ou plus, exprimé pour 1000.

Échantillon : Nombre de grossesses de 7 mois ou plus des femmes de 15-49 ans au cours des 5 années ayant précédé l'enquête.


Pour la période des 5 années ayant précédé l'enquête, 121 mort-nés et 335 décès néonataux précoces ont été enregistrés pour 13 663 grossesses de 7 mois ou plus. Le taux de mortalité périnatale est donc estimé à 33 ‰ (Tableau 12.4).

Variations par caractéristique

- Les maternités précoces (avant 20 ans) et tardives (après 40 ans) sont associées à des risques accrus de mortalité périnatale. En effet, le taux de mortalité périnatale est plus élevé parmi les femmes qui ont eu leur naissance avant l'âge de 20 ans ou après 40 ans (respectivement 40 ‰ et 59 ‰) contre 28 ‰ quand l'âge de la mère était de 20-29 ans (Graphique 12.5).
- Le niveau de la mortalité périnatale est nettement plus faible à Cotonou que dans le reste du pays (19 ‰ contre 33-34 ‰ dans les autres villes ou dans le milieu rural).
- Les départements du Plateau et de l'Atlantique présentent les niveaux les plus élevés (respectivement 64 ‰ et 45 ‰). A l'opposé, le Littoral et l'Atacora enregistrent les niveaux les plus faibles (respectivement 19 ‰ et 21 ‰).

Graphique 12.5 Mortalité périnatale par l'âge de la mère à la naissance de l'enfant

Décès pour 1 000 grossesses de 7 mois ou plus pour les 5 années ayant précédé l'enquête



12.4 COMPORTEMENTS PROCRÉATEURS À HAUTS RISQUES

Certaines caractéristiques démographiques et biologiques comme l'âge de la mère à la naissance de l'enfant, le rang de naissance de l'enfant et l'intervalle intergénésiq ue jouent un rôle déterminant dans la survie des enfants aux jeunes âges. Les résultats de ces études révèlent que la probabilité de décès des enfants est plus élevée parmi ceux qui sont nés des mères adolescentes (moins de 18 ans) ou de mère d'âges avancés (plus de 34 ans). Un intervalle intergénésiq ue court (moins de 24 mois après la naissance précédente) et un rang de naissance élevé (supérieur à trois) augmentent les risques de décès des enfants. Les risques de décès sont plus élevés lorsque ces facteurs sont combinés.

- Plus de la moitié des naissances ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête (54 %) sont classées dans la catégorie à hauts risques évitables : 36 % sont à haut risque unique et 18 % à hauts risques multiples (Tableau 12.5).
- Par ailleurs, 28 % des naissances ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête ne sont situées dans aucune catégorie à haut risque évitable. Par rapport à cette catégorie :

- Les naissances issues de la catégorie à haut risque unique ont un ratio de risque de 1,19 : un âge précoce à la maternité et un intervalle intergénérisique court sont associées à des risques de mortalité élevés (ratio de risque de respectivement 1,36 et 1,67).
- Les naissances issues de la catégorie à haut risque multiple ont un ratio de risque de 1,64 et plus particulièrement celles cumulant les trois risques (âge de la mère supérieur à 34 ans, intervalle intergénérisique inférieur à 24 mois et rang de naissance supérieur à 3) et celles cumulant les deux risques (intervalle intergénérisique inférieur à 24 mois et rang de naissance supérieur à 3) dont les ratios de risques sont de respectivement 2,19 et 2,32.
- Les résultats montrent enfin que 17 % des femmes actuellement en union ne courent aucun risque si elles concevaient un enfant au moment de l'enquête, alors que 5 % sont dans la catégorie à risque inévitable. Plus des trois quarts des femmes en union (79 %) seraient classées dans une catégorie à haut risque évitable si elles concevaient un enfant au moment de l'enquête dont 32 % dans la catégorie à haut risque unique et 47 % dans celle à haut risque multiple (**Tableau 12.5**).

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur la mortalité des enfants, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 12.1** Quotients de mortalité des enfants de moins de 5 ans
- **Tableau 12.2** Quotients de mortalité des enfants sur une période de 5 ans selon certaines caractéristiques démographiques
- **Tableau 12.3** Quotients de mortalité des enfants sur une période de 10 ans selon d'autres caractéristiques
- **Tableau 12.4** Mortalité périnatale
- **Tableau 12.5** Comportement procréateur à hauts risques

Tableau 12.1 Quotients de mortalité des enfants de moins de 5 ans

Quotients de mortalité néonatale, post-néonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile par période de 5 ans ayant précédé l'enquête, EDSB-V Bénin 2017-2018

Nombre d'années avant l'enquête	Mortalité néonatale (NN)	Mortalité postnéonatale (PNN) ¹	Mortalité infantile (1q0)	Mortalité juvénile (4q1)	Mortalité infanto-juvénile (5q0)
0-4	30	25	55	44	96
5-9	35	29	65	47	109
10-14	34	35	69	51	116

¹ Calculé par différence entre les taux de mortalité infantile et néonatale

Tableau 12.2 Quotients de mortalité des enfants sur une période de 5 ans selon certaines caractéristiques démographiques

Quotients de mortalité néonatale, postnéonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile des enfants de moins de 5 ans pour la période des 5 années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques démographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique démographique	Mortalité néonatale (NN)	Mortalité postnéonatale (PNN) ¹	Mortalité infantile (1q0)	Mortalité juvénile (4q1)	Mortalité infanto-juvénile (5q0)
Sexe de l'enfant					
Masculin	36	26	62	44	104
Féminin	24	24	48	43	89
Résidence					
Cotonou	15	15	30	15	44
Autres villes	29	22	51	36	85
Ensemble urbain	28	21	49	33	81
Rural	31	27	59	50	106
Ensemble	30	25	55	44	96

¹ Calculé par différence entre les taux de mortalité infantile et néonatale

Tableau 12.3 Quotients de mortalité des enfants sur une période de 10 ans selon d'autres caractéristiques

Quotients de mortalité néonatale, postnéonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile des enfants de moins de 5 ans pour la période des 10 années ayant précédé l'enquête, selon d'autres caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique démographique	Mortalité néonatale (NN)	Mortalité postnéonatale (PNN) ¹	Mortalité infantile (${}_1q_0$)	Mortalité juvénile (${}_4q_1$)	Mortalité infanto-juvénile (${}_5q_0$)
Âge de la mère à la naissance de l'enfant					
<20	41	29	70	53	119
20-29	28	27	55	45	98
30-39	34	27	61	42	100
40-49	56	21	78	(42)	(117)
Rang de naissance					
1	35	23	58	41	96
2-3	27	26	53	41	92
4-6	32	29	61	49	107
7+	45	33	79	61	134
Intervalle avec la naissance précédente²					
<2 années	58	46	104	68	165
2 années	26	29	55	49	101
3 années	23	21	44	41	82
4 années+	27	16	44	25	68
Taille à la naissance³					
Petit/très petit	45	31	75	na	na
Moyen ou plus gros que la moyenne	23	23	46	na	na
Département					
Alibori	28	26	53	47	98
Atacora	27	36	63	63	122
Atlantique	43	23	66	46	108
Borgou	31	21	52	37	87
Collines	37	28	66	40	103
Couffo	30	32	62	54	112
Donga	45	40	85	48	129
Littoral	24	21	45	20	64
Mono	36	26	62	45	104
Ouémé	16	12	28	47	74
Plateau	43	35	78	45	119
Zou	36	32	67	43	108
Niveau d'instruction de la mère					
Aucun	33	30	62	49	109
Primaire	37	20	57	39	94
Secondaire 1 ^{er} cycle	29	23	52	25	77
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	31	26	57	(51)	(105)
Quintiles de bien-être économique					
Le plus bas	30	33	63	48	108
Second	39	32	70	58	124
Moyen	30	27	56	53	106
Quatrième	39	25	65	41	103
Le plus élevé	24	15	39	22	60

Note : Les valeurs entre parenthèse sont basées sur 250-499 cas non pondérés de personnes-années d'exposition au risque de décéder.
na = Non applicable

¹ Calculé par différence entre les taux de mortalité infantile et néonatale.

² Non compris les naissances de rang 1.

³ Quotients pour la période des 5 années avant l'enquête.

Tableau 12.4 Mortalité périnatale

Effectif de mort-nés, de décès néonataux précoces et taux de mortalité périnatale pour la période des 5 années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Effectifs de mort-nés ¹	Effectif de décès néonataux précoces ²	Taux de mortalité périnatale ³	Effectif de grossesses de 7 mois ou plus
Âge de la mère à la naissance de l'enfant				
<20	19	51	40	1 751
20-29	57	158	28	7 592
30-39	35	101	37	3 730
40-49	10	25	59	590
Intervalle en mois avec la naissance précédente⁴				
Première grossesse	31	74	37	2 827
<15	13	57	43	1 648
15-26	30	92	34	3 631
27-38	23	51	27	2 695
39+	23	62	30	2 861
Résidence				
Cotonou	3	7	19	571
Autres villes	36	120	33	4 678
Ensemble urbain	39	127	32	5 249
Rural	82	208	34	8 414
Département				
Alibori	23	35	31	1 845
Atacora	6	20	21	1 214
Atlantique	18	52	45	1 567
Borgou	6	43	28	1 779
Collines	6	21	31	870
Couffo	13	15	31	909
Donga	7	27	37	930
Littoral	3	7	19	571
Mono	5	15	33	615
Ouémé	14	17	26	1 203
Plateau	10	44	64	863
Zou	10	37	36	1 297
Niveau d'instruction de la mère				
Aucun	84	214	33	8 985
Primaire	19	76	38	2 482
Secondaire 1 ^{er} cycle	11	36	29	1 620
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	7	9	28	575
Quintiles de bien-être économique				
Le plus bas	22	55	26	2 925
Second	23	87	39	2 814
Moyen	24	59	30	2 753
Quatrième	31	89	43	2 756
Le plus élevé	21	45	28	2 414
Ensemble	121	335	33	13 663

¹ Les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits à 7 mois de grossesse ou plus.

² Les décès néonataux précoces sont des décès qui se sont produits à 0-6 jours parmi les enfants nés vivants.

³ Équivaut à la somme du nombre de mort-nés et de décès néonataux précoces divisée par le nombre de grossesse à 7 mois ou plus, exprimé pour 1 000.

⁴ Les catégories correspondent aux intervalles entre naissances de <24 mois, 24-35 mois, 36-47 mois et 48 mois ou+ en supposant une durée de grossesse de 9 mois.

Tableau 12.5 Comportement procréateur à hauts risques

Répartition (en %) des enfants nés dans les 5 années ayant précédé l'enquête par catégorie de haut risque de mortalité, ratio de risque et répartition (en %) des femmes actuellement en union par catégorie de risque si elles concevaient un enfant au moment de l'enquête, EDSB-V Bénin 2017-2018

Catégories de risques	Naissances dans les 5 années avant l'enquête		Pourcentage de femmes actuellement en union ¹
	Pourcentage de naissances	Ratio de risques	
Dans aucune catégorie à haut risque	28,3	1,00	16,5^a
Catégorie à risque inévitable			
Naissance de rang 1, âge entre 18 et 34 ans	18,0	1,07	4,7
Dans une des catégories à hauts risques évitables	53,7	1,34	78,8
Catégorie à haut risque unique			
Âge de la mère <18	4,3	1,36	0,5
Âge de la mère >34	1,1	0,71	2,8
Intervalle inter génésique <24 mois	6,2	1,67	11,3
Rang de naissance >3	24,1	1,06	17,2
Sous total	35,7	1,19	31,8
Catégorie à hauts risques multiples			
Âge <18 et intervalle inter génésique <24 mois ²	0,2	(1,24)	0,3
Âge >34 et intervalle inter génésique <24 mois	0,1	*	0,2
Âge >34 et rang de naissance >3	11,5	1,30	28,1
Âge >34 et intervalle inter génésique <24 mois et rang de naissance >3	1,2	2,19	5,2
Intervalle inter génésique <24 mois et rang de naissance >3	5,0	2,32	13,3
Sous total	18,1	1,64	47,0
Total	100,0	na	100,0
Dans une des catégories de hauts risques évitables			
Âge de la mère <18	4,5	1,36	0,7
Âge de la mère >34	13,9	1,32	36,3
Intervalle intergénésique <24 mois	19,2	1,47	45,0
Rang de naissance >3	41,8	1,31	63,7
Effectif de naissances/femmes	13 643	na	11 168

Note : Le rapport de risque est le rapport de la proportion de naissances décédées parmi les naissances appartenant à chaque catégorie à haut risque spécifique à la proportion de naissances décédées parmi celles n'appartenant à aucune catégorie à hauts risques. Les valeurs entre parenthèse sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

na = non applicable

¹ Les femmes sont classées dans les catégories à risque selon le statut qu'elles auraient à la naissance de l'enfant si elles concevaient un enfant au moment de l'enquête : âge actuel inférieur à 17 ans et 3 mois ou supérieur à 34 ans et 2 mois, la dernière naissance a eu lieu il y a moins de 15 mois ou la dernière naissance était de rang 3 ou plus

² Y compris la catégorie : âge <18 ans et rang de naissance >3

^a Y compris les femmes stérilisées

Résultats clés

- **Connaissance de la transmission et de la prévention :** Parmi les femmes et les hommes de 15-49 ans, respectivement 16 % et 22 % ont une connaissance « approfondie » des moyens de transmission et de prévention du VIH.
- **Connaissance de la transmission de la mère à l'enfant :** 71 % des femmes de 15-49 ans, contre 56 % des hommes de 15-49 ans savent que le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant pendant la grossesse.
- **Stigmatisation envers les personnes vivant avec le VIH :** 76 % des femmes et 70 % des hommes de 15-49 ans ont des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH.
- **Couverture du test du VIH antérieur à l'enquête :** Parmi les enquêtés de 15-49 ans, 62 % des femmes et 80 % des hommes n'ont jamais effectué un test.
- **Connaissance complète du VIH :** Parmi les jeunes de 15-24 ans 15 % des femmes et 19 % des hommes ont une connaissance « approfondie » du VIH.

L'épidémie du VIH/sida constitue encore un problème de santé publique malgré les multiples efforts réalisés dans la lutte contre la maladie. Le Syndrome de l'Immunodéficience Acquis (SIDA) se caractérise par l'apparition d'un ensemble de signes consécutifs à l'effondrement du système immunitaire du corps humain. Le sida est la phase ultime de l'infection par le VIH. Celui-ci se transmet essentiellement par voie sexuelle au contact du sang contaminé ou de la mère à l'enfant. Le premier cas de sida a été découvert au Bénin en 1985. Depuis plusieurs années, le sida est classé comme une maladie prioritaire au Bénin. Dans le cadre de la lutte contre cette maladie, des mesures ont été mises en œuvre par le Programme National de la Lutte contre le sida (PNLS), le Comité National de la Lutte contre le sida (CNLS) ainsi que d'autres ONG.

Au cours de l'EDSB-V, des données concernant le niveau de connaissance du VIH/sida, des moyens de prévention et de transmission, des attitudes et du comportement des hommes et des femmes vis-à-vis de cette maladie ont été collectées. Ces données sont utiles pour renforcer le programme de prévention et pour évaluer les résultats des interventions en cours.

13.1 CONNAISSANCE DU VIH/SIDA, DES MOYENS DE TRANSMISSION ET DE PRÉVENTION

Au Bénin, 92 % des femmes et 91 % d'hommes ont déclaré avoir entendu parler du VIH/sida (**Tableau 13.1**).

Les résultats montrent que 72 % des femmes et 74 % des hommes de 15-49 ans savent que l'utilisation des condoms au cours de chaque rapport sexuel peut réduire le risque de contracter le VIH. En outre, la même proportion de femmes et d'hommes de 15-49 ans (80 %) savent aussi que la limitation des rapports sexuels à un seul partenaire sexuel qui n'est pas infecté peut aussi réduire le risque de contracter le VIH. Globalement, 68 % des femmes et 70 % des hommes connaissent à la fois ces deux moyens de prévention (**Tableau 13.2**).


Tendances : Entre 2001 et 2006, le pourcentage de femmes connaissant les deux méthodes de prévention a augmenté, passant de 42 % à 73 %. Cette tendance à l'augmentation s'est inversée puisque ce pourcentage a diminué pour ne concerner que 65 % des femmes en 2011-2012, puis 68 % en 2017-2018. Chez les hommes la tendance a évolué de la même manière passant de 45 % en 2001 à 83 % en 2006 et de 74 % en 2011-2012 à 70 % en 2017-2018.

Variations par caractéristique

- C'est parmi les femmes et les hommes de 15-19 ans que le niveau de connaissance des deux méthodes de prévention du VIH est le plus faible (respectivement 59 % et 56 %).
- Les résultats montrent des écarts de connaissance entre les départements. C'est dans le département du Borgou que le pourcentage de femmes qui connaissent les deux moyens de prévention du VIH est le plus faible (44 %) et c'est dans les Collines (75 %), l'Atlantique et le Plateau (74 % dans les deux cas) qu'il est le plus élevé. Chez les hommes de 15-49 ans, c'est dans les départements du Zou (48 %) et de l'Alibori (55 %) que les pourcentages sont les plus faibles et dans le Plateau (88 %) et le Mono (87 %) qu'ils sont les plus élevés (**Graphiques 13.1a** et **13.1b**).


Graphique 13.1a Connaissance du VIH/sida par département : Femme

Pourcentage de femmes qui connaissent les deux moyens de prévention du VIH



Graphique 13.1b Connaissance du VIH/sida par département : Homme

Pourcentage d'hommes qui connaissent les deux moyens de prévention du VIH



- En ce qui concerne le niveau d'instruction, on constate que la connaissance des deux méthodes de prévention est plus faible chez les femmes qui n'ont aucun niveau d'instruction (64 %) et plus élevée chez celles qui ont un niveau d'instruction secondaire 2^d cycle ou plus (82 %). On observe la même tendance chez les hommes.

Connaissance « approfondie » du VIH

Savoir que l'utilisation régulière du condom à chaque rapport sexuel et n'avoir qu'un seul partenaire sexuel fidèle et non infecté permettent de réduire les risques de contracter le VIH, savoir qu'une personne paraissant en bonne santé peut cependant avoir le VIH et rejeter les deux idées locales erronées les plus courantes sur la transmission ou la prévention du VIH.

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans et 15-24 ans

Dans l'ensemble, 16 % des femmes et 22 % des hommes de 15-49 ans ont une connaissance considérée comme « approfondie » du sida. Parmi les jeunes de 15-24 ans, ces pourcentages sont respectivement de 15 % et 19 %.

Par ailleurs, 20 % des femmes et 28 % des hommes de 15-49 ans savent qu'une personne paraissant en bonne santé peut avoir le virus du sida et rejettent les deux idées locales erronées les plus courantes selon lesquelles le VIH peut être transmis par les piqûres de moustiques et en partageant le repas d'une personne qui a le sida.

Dans le groupe d'âges 15-24 ans, ces proportions sont de 19 % chez les femmes et de 25 % chez les hommes (**Tableau 13.3**).

Tendances : De 2006 à 2011-2012 le pourcentage de femmes ayant une connaissance approfondie du VIH a augmenté passant de 14 % à 22 %. Cette tendance à la hausse ne s'est pas poursuivie puisqu'en 2017-2018, le pourcentage n'est que de seulement 16 %. Chez les hommes, on note qu'entre 2006 et 2011-2012, le pourcentage de ceux qui avaient une connaissance considérée comme « approfondie » du sida n'avait pratiquement pas changé (31 % contre 30 %). Par contre, depuis 2011-2012, on note une baisse, le pourcentage n'étant plus que de 22 %.

Variations par caractéristique

- C'est dans les groupes d'âges 15-19 ans et 40-49 ans que les pourcentages de femmes ayant une connaissance considérée comme « approfondie » sont les plus faibles. À l'opposé, on note un pourcentage plus élevé parmi celles de 25-29 ans et 30-39 ans (17 % dans les deux cas). Chez les hommes, c'est parmi les plus jeunes de 15-19 ans que le pourcentage de ceux qui possèdent les informations correctes sur la connaissance du VIH est le plus faible (14 % contre 26 % à 25-29 ans) (**Tableau 13.3**).


13.2 CONNAISSANCE DE LA TRANSMISSION MÈRE-ENFANT

Augmenter le niveau de connaissance générale sur la transmission du VIH de la mère à l'enfant et réduire le risque de transmission en utilisant des médicaments antirétroviraux sont essentiel pour parvenir à réduire la transmission du VIH de la mère à l'enfant (TME). Pour évaluer la connaissance de la TME, on a demandé aux enquêtés si le VIH pouvait être transmis de la mère à l'enfant au cours de la grossesse, de l'accouchement ou par l'allaitement et, si une mère ayant le VIH pouvait réduire le risque de transmission à son enfant en prenant certains médicaments pendant la grossesse.

Les résultats du **Tableau 13.4** montrent que 71 % des femmes et 56 % des hommes de 15-49 ans savent que le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant pendant la grossesse, 72 % des femmes et 61 % des hommes savent que le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant pendant l'accouchement et enfin 74 % des femmes et 60 % des hommes interviewés au cours de l'enquête savent que le risque de TME peut être réduit par la prise de médicaments spéciaux par la mère (**Graphique 13.2**).

Graphique 13.2 Connaissance de la Transmission de la Mère à l'Enfant (TME)

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans




Tendances : Entre 2006 et 2017-2018, le pourcentage de femmes connaissant la possibilité de transmission du VIH par l'allaitement a diminué, passant de 78 % à 70 % en 2011-2012 et à 74 % en 2017-2018. Chez les hommes, on note la même tendance, le pourcentage de ceux qui connaissent cette voie de transmission étant passé de 74 % à 60 % dans la même période.

De 2006 à 2017-2018, le pourcentage de ceux qui savent que le risque de la TME peut être réduit par la prise de médicaments spéciaux par la mère a augmenté aussi bien chez les femmes que chez les hommes (**Graphique 13.3**).

Graphique 13.3 Connaissance de la Transmission de la Mère à l'Enfant (TME) : Tendances

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui savent que le risque de TME peut être réduit par la prise de médicaments spéciaux par la mère



Variations par caractéristique

- C'est parmi les femmes et les hommes les plus jeunes (15-19 ans) que les pourcentages de ceux qui connaissent tous les éléments de la transmission maternelle du VIH sont les plus faibles.
- Chez les femmes, la méthode la plus connue est la transmission par l'allaitement (74 %) alors que chez les hommes la méthode la plus connue est la transmission pendant l'accouchement (61 %).

13.3 COMPORTEMENTS DE STIGMATISATION ENVERS LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

Un niveau élevé de stigmatisation et de discrimination dans une population peut avoir un impact négatif sur la volonté des individus d'effectuer des tests et sur l'adhésion à des thérapies antirétrovirales (TAR) dans les programmes TAR. Par conséquent, la diminution de ces comportements de stigmatisation et de discrimination dans une population est un indicateur important de la réussite de tout programme dont l'objectif est le contrôle et la prévention du VIH/sida.

Comportements discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH

Pour évaluer les comportements discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH, on a posé aux femmes et aux hommes deux questions. Les enquêtés ayant des comportements discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH sont ceux qui ont déclaré qu'ils n'achèteraient pas de légumes frais à un commerçant ou un vendeur s'ils savent que cette personne a le VIH, ou ceux qui ont déclaré que les enfants vivant avec le VIH ne devraient pas être autorisés à fréquenter l'école avec les enfants qui n'ont pas le VIH.

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans qui ont entendu parler du VIH ou du sida


Les résultats montrent que les attitudes discriminatoires sont plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes. Ainsi, 54 % des femmes ne pensent pas que les enfants vivant avec le VIH doivent pouvoir fréquenter l'école avec les enfants non infectés contre 42 % chez les hommes. De même, le pourcentage de femmes qui n'achèteraient pas de légumes frais à un commerçant qui a le VIH est de 71 % contre 65 % chez les hommes. Globalement, 76 % des femmes contre 70 % des hommes se comporteraient, dans certaines situations, de façon discriminatoire vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH/sida (**Tableau 13.5**).

Variations par caractéristique

- On note des variations importantes entre milieux de résidence : c'est à Cotonou que les pourcentages de femmes de 15-49 ans qui ont exprimé des opinions discriminatoires sont les plus faibles (57 % contre 79 %).
- Chez les femmes, les comportements discriminatoires sont moins fréquents dans le Littoral que dans le Plateau (57 % contre 92 %). Chez les hommes, on observe un écart de même amplitude entre l'Ouémé et l'Alibori (47 % contre 86 %).
- Chez les femmes comme chez les hommes, on constate que le niveau d'instruction influence les comportements vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH : les pourcentages de femmes et d'hommes qui se comporteraient de façon discriminatoires dans certaines situations ont tendance à diminuer avec le niveau d'instruction, passant chez les femmes de 80 % parmi celles sans niveau d'instruction à 51 % parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus et, chez les hommes, de respectivement 82 % à 50 % (**Graphique 13.4**).

Graphique 13.4 Comportements discriminatoires* à l'égard des personnes vivant avec le VIH par niveau d'instruction

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans ayant entendu parler du VIH



* Pourcentage qui ne pense pas que les enfants vivant avec le VIH devraient fréquenter l'école avec les enfants séronégatifs ou qui n'achèteraient pas des légumes frais à un commerçant ayant le VIH.

13.4 PARTENAIRES SEXUELS MULTIPLES

Étant donné que la transmission du virus du sida s'effectue aussi par voie sexuelle, il est admis que l'infléchissement de la pandémie du sida passe nécessairement par un changement de comportements sexuels. Pour évaluer l'exposition au risque de contracter le virus du sida, au cours de l'EDSB-V, des questions ont été posées sur le nombre de partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois ayant précédé l'enquête.


Parmi les femmes âgées de 15-49 ans, 2 % ont déclaré avoir eu 2 partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois avant l'enquête et 13 % ont déclaré avoir eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient comme si elles étaient mariées. Parmi celles ayant eu deux partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois, 23 % ont déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels (**Tableau 13.6.1**).

Chez les hommes de 15-49 ans, les pourcentages sont plus élevés : 22 % ont déclaré avoir eu 2 partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois avant l'enquête, 31 % ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient comme s'ils étaient mariés et 32 % ont déclaré avoir utilisé un condom au cours de ces derniers rapports sexuels (**Tableau 13.6.2**).

Le nombre moyen de partenaires sexuels sur la durée de vie est de 2,1 chez les femmes de 15-49 ans contre 6,0 chez les hommes du même groupe d'âges (**Graphique 13.5**).

Graphique 13.5 Rapports sexuels et utilisation du condom avec un partenaire non régulier

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans



Variations par caractéristique

- Le pourcentage de femmes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient comme si elles étaient mariées est plus élevé chez les femmes célibataires (42 %) et chez celles en rupture d'union (divorcées, séparées ou veuves) (41 %) que chez les femmes en union (1 %).
- Parmi les femmes de 15-49 ans, c'est dans le Littoral qu'on relève le pourcentage le plus élevé (20 %) de celles qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur mari, ni leur partenaire avec qui elles vivaient comme si elles étaient mariées ; par comparaison, dans le Couffo, ce pourcentage est de 7 %.
- Chez les femmes comme chez les hommes, on constate que l'utilisation du condom au cours des derniers rapports sexuels avec un partenaire non régulier a tendance à augmenter avec le niveau d'instruction, passant, chez les femmes de 12 % parmi celles sans niveau d'instruction à 37 % parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus et, chez les hommes, de respectivement 16 % à 51 % (**Tableaux 13.6.1 et 13.6.2**).

13.5 RAPPORTS SEXUELS PAYANTS

Le fait de payer en échange de rapports sexuels crée une situation d'inégalité entre les partenaires pour négocier des rapports sexuels sans risque. Au cours de l'enquête, on a demandé aux hommes s'il leur était déjà arrivé de payer pour des rapports sexuels et si cela était arrivé au cours des 12 derniers mois.

Parmi les hommes de 15-49 ans, 8 % ont déclaré avoir déjà eu des rapports sexuels payants et 4 % en avaient eu au cours des 12 derniers mois. Parmi ceux ayant eu des rapports sexuels payants au cours des 12 derniers mois, 44 % ont déclaré avoir utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels (**Tableau 13.7**).

Tendances : Entre 2001 et 2017-2018, le pourcentage d'hommes ayant eu des rapports sexuels payants au cours des 12 derniers mois a augmenté, passant de 1 % à 4 %.

Variations par caractéristique

- Le pourcentage d'hommes ayant eu des rapports sexuels payants au cours des 12 derniers mois est plus élevé dans le groupe d'âges 20-24 ans (6 %) que dans les autres.

13.6 COUVERTURE EN SERVICES DE TESTS DU VIH

La connaissance du statut sérologique vis-à-vis du VIH aide les personnes négatives au VIH à prendre des décisions spécifiques et avoir des comportements sexuels à moindre risques pour ne pas contracter la maladie. Parmi les personnes vivant avec le VIH, la connaissance de leur statut sérologique leur permet de prendre des mesures pour protéger leurs partenaires sexuels, d'accéder à des soins et de recevoir un traitement.

13.6.1 Connaissance de services de test du VIH


Les données montrent que le pourcentage des femmes de 15-49 ans qui savent où se rendre pour effectuer un test du VIH est plus élevé (56 %) que celui des hommes (52 %) du même groupe d'âges. Par ailleurs, Le pourcentage d'hommes de 15-49 ans ayant effectué un test et ayant reçu le résultat est environ deux fois plus faible que chez les femmes (18 % contre 35 %). En outre, le pourcentage de femmes ayant reçu le résultat du dernier test effectué au cours des 12 derniers mois est deux fois plus élevé que celui des hommes (14 % contre 7 %). Parmi les femmes de 15-49 ans, 62 % n'ont jamais effectué un test contre 80 % chez les hommes du même groupe d'âges (Tableaux 13.8.1 et 13.8.2 et Graphique 13.6).

Tendances : Entre 2001 et 2017-2018, le pourcentage de femmes et d'hommes qui connaissent un endroit où effectuer un test du VIH a nettement augmenté, passant chez les femmes de 19 % à 56 % et, chez les hommes, de 37 % à 52 %.

Entre 2006 et 2017-2018, le pourcentage de femmes qui ont reçu le résultat du dernier test effectué au cours des 12 derniers mois a doublé, passant de 7 % à 14 %. Par contre, chez les hommes, l'augmentation a été plus faible (de 5 % à 7 % dans la même période) (Graphique 13.7).


Graphique 13.6 Test du VIH

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans



Graphique 13.7 Test du VIH récent : Tendances

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans ayant fait un test du VIH dans l'année précédant l'enquête et ayant reçu le résultat




Variations par caractéristique

- Le pourcentage de femmes et d'hommes ayant effectué un test de dépistage et qui ont eu reçu les résultats du dernier test varie entre département : chez les femmes, il varie d'un minimum de 20 % dans le département du Borgou à un maximum de 61 % dans le Littoral (**Graphique 13.8a**). Chez les hommes, c'est l'Alibori qui enregistre le pourcentage le plus faible (5 %) et le Littoral qui enregistre le plus élevé (44 %) (**Graphique 13.8b**).


Graphique 13.8a Test du VIH par département : Femme

Pourcentage de femmes ayant fait un test du VIH et a reçu le résultat



Graphique 13.8b Test du VIH par département : Homme


Pourcentage d'hommes ayant fait un test du VIH et a reçu le résultat



- Chez les femmes comme chez les hommes, on constate que les pourcentages de ceux qui ont fait un test au cours des 12 derniers et qui en ont reçu le résultat augmentent avec le niveau d’instruction. Chez les femmes, le pourcentage passe de 11 % parmi celles sans niveau d’instruction à 33 % parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus et chez les hommes, de respectivement 2 % à 20 % (**Graphique 13.9**).

Graphique 13.9 Test du VIH récent par niveau d’instruction

Pourcentage de femmes et d’hommes de 15-49 ans ayant fait un test du VIH dans l’année précédant l’enquête et ayant reçu le résultat



- Le pourcentage de femmes et d’hommes ayant une connaissance de leur statut sérologique récent est plus élevé dans les ménages du quintile le plus élevé que dans les autres.

13.6.2 Test du VIH chez les femmes enceintes


Le dépistage précoce du VIH chez les femmes enceintes est primordial pour réduire la transmission Mère-Enfant ; de même, informer les femmes enceintes sur le VIH contribue également à la prévention et à la réduction du risque de transmission.

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance dans les deux dernières années, 36 % ont reçu des conseils sur le VIH avant le test au cours d’une visite prénatale. Globalement, 30 % des femmes ont reçu des conseils sur le VIH avant le test, ont effectué le test lors d’une visite prénatale et ont reçu le résultat. En outre, 40 % des femmes ont effectué un test du VIH avant l’accouchement et ont reçu le résultat (**Tableau 13.9**).

Tendances : Entre 2006 et 2017-2018, le pourcentage de femmes de 15 à 49 ans qui ont reçu des conseils sur le VIH, fait un test du VIH au cours d’une visite prénatale et reçu le résultat a plus que doublé, passant de 12 % à 30 % (**Graphique 13.10**).

Graphique 13.10 Test du VIH pendant la grossesse : Tendances

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance au cours des 2 années précédant l’enquête, qui ont reçu le conseil sur le VIH, qui ont fait un test du VIH au cours d’une visite prénatale et qui ont reçu le résultat



13.7 CIRCONCISION

Parmi les hommes âgés de 15-49 ans, 95 % sont circoncis. Dans 13 % des cas la circoncision a été effectuée par un agent de santé professionnel et dans 79 % des cas elle été réalisée par des praticiens traditionnels, famille ou amis (**Tableau 13.10**).

Tendance : Le pourcentage d'hommes de 15-49 ans circoncis n'a pas varié depuis 2006 : de 97 % à 95 % (**Graphique 13.11**).

Variations par caractéristique

- Le pourcentage d'hommes de 15-49 ans circoncis par un agent de santé professionnel est plus élevé à Cotonou (32 %) qu'en milieu rural (10 %).
- Le pourcentage d'hommes de 15-49 ans circoncis par un agent de santé professionnel varie de 40 % dans le Mono à 1 % dans l'Alibori.
- Le recours à un praticien traditionnel pour effectuer la circoncision a tendance à diminuer des générations anciennes aux plus récentes, passant de 85 % parmi les hommes de 40-49 ans à 74 % parmi ceux de 15-24 ans.

Graphique 13.11 Tendances de la circoncision

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui sont circoncis



EDSB-III 2006	EDSB-IV 2011-2012	EDSB-V 2017-2018
97	93	95

13.8 INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES DÉCLARÉES

Infections sexuellement transmissibles (IST) et symptômes

On a demandé aux enquêtés qui avaient déjà eu des rapports sexuels s'ils avaient eu une IST ou des symptômes d'IST (pertes/écoulements malodorants et anormaux du vagin /pénis ou une plaie/ulcère génital) dans les 12 derniers mois.

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans ayant déjà eu des rapports sexuels

Dans l'ensemble, 17 % des femmes de 15-49 ans ont déclaré avoir eu une IST ou des symptômes associés à une IST contre 5 % chez les hommes de 15-49 ans (**Tableau 13.11**). Parmi ces femmes, 28 % ont recherché des traitements dans un centre de santé (clinique, hôpital, médecin ou autre professionnel de santé) et 61 % n'ont recherché aucun conseil ou traitement. Chez les hommes ces pourcentages sont de respectivement 28 % et 46 % (**Tableau 13.12**).

13.9 CONNAISSANCE DU VIH/SIDA ET COMPORTEMENTS PARMIS LES JEUNES

Cette section porte sur la connaissance du VIH/sida et sur les comportements parmi les jeunes de 15-24 ans ; Les résultats permettent de savoir dans quelle mesure les jeunes ont des comportements qui leur font courir des risques de contracter le VIH.

13.9.1 Connaissance

La connaissance des moyens de transmission du VIH est essentielle pour permettre aux individus d'éviter de contracter le VIH ; cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les jeunes car, à cette période de la vie, les relations sexuelles peuvent être de courte durée avec un nombre de partenaires plus élevé ou des comportements à risques plus fréquents.

Les résultats du **Tableau 13.13** montrent que 15 % des femmes de 15-24 ans et 19 % des hommes de 15-24 ans ont une connaissance considérée comme « approfondie » du VIH.

13.9.2 Premiers rapports sexuels

Les jeunes femmes qui ont leurs premiers rapports sexuels à un âge précoce courent, en général, un risque plus élevé de tomber enceintes ou de contracter une IST que celles qui commencent leur vie sexuelle plus tard. L'utilisation régulière du condom contribue à réduire de tels risques.

Parmi les jeunes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans, 12 % sont des femmes et 8 % sont des hommes. Les femmes qui ont eu leur rapport sexuel avant 18 ans représentent 62 % contre 39 % d'hommes (**Tableau 13.14**).

Tendances : De 1996 à 2017-2018, le pourcentage de jeunes femmes qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans a légèrement diminué, passant de 14 % à 12 %. Chez les hommes, par contre, on note une tendance plus nette à la baisse, le pourcentage ayant eu leurs premiers rapports sexuels à un âge précoce étant passé de 19 % en 1996 à 16 % en 2011-2012 et à 8 % en 2017-2018.

Le pourcentage d'hommes qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans a également diminué passant de 55 % en 1996 à 39 % en 2017-2018. Chez les jeunes femmes, on note aussi une tendance à la baisse, mais plus légère que chez les hommes, le pourcentage étant passé de 64 % à 62 %.

Variations par caractéristique

- Dans l'ensemble urbain, 10 % de jeunes femmes ont eu leurs premiers rapports sexuels avant l'âge de 15 ans contre 14 % en milieu rural.
- Le pourcentage de femmes ayant eu leurs premiers rapports sexuels avant l'âge de 15 ans a tendance à diminuer avec le niveau d'instruction, passant de 17 % parmi celles sans niveau d'instruction à 5 % parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus. Chez les hommes, la tendance est moins nette mais on constate que parmi ceux sans niveau d'instruction, 3 % avaient déjà eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans contre 9 % parmi les autres (**Tableau 13.14**).

13.9.3 Rapports sexuels pré-nuptiaux

Le **Tableau 13.15** montre que parmi les célibataires de 15-24 ans, 54 % des jeunes filles et 55 % des jeunes hommes n'ont jamais eu de rapport sexuel.

13.9.4 Partenaires sexuels multiples

Le **Tableau 13.16.1** présente des informations sur les jeunes femmes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avec des partenaires multiples au cours des 12 derniers mois. Dans l'ensemble, au cours des 12 derniers mois, 3 % ont eu deux partenaires ou plus au cours des 12 derniers mois, 24 % ont eu des rapports sexuels avec une personne qui n'est ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient. Parmi ces dernières, 32 % ont déclaré avoir utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel.

Dans l'ensemble, 10 % des jeunes hommes de 15-24 ans ont eu deux partenaires ou plus au cours des 12 derniers mois avant l'enquête. Un pourcentage élevé (34 %) des jeunes hommes de ce groupe d'âge ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois avec un partenaire non marital ou non cohabitant. Parmi eux, 31 % ont déclaré avoir utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel (**Tableau 13.16.2**).

13.9.5 Couverture en services de tests du VIH

Rechercher un endroit où faire un test du VIH peut être plus difficile pour des jeunes que pour des adultes car de nombreux jeunes n'ont pas l'habitude de fréquenter les services de santé pour eux-mêmes et parce que les jeunes rencontrent souvent des obstacles pour obtenir ces services.

Parmi les jeunes de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, 16 % des femmes ont déclaré avoir effectué un test du VIH au cours des 12 derniers mois et avoir reçu le résultat du dernier test. Chez les hommes, ce pourcentage est nettement plus faible (6 %). Les pourcentages de femmes et d'hommes ayant effectué un test de dépistage du VIH au cours des 12 derniers mois augmente avec l'âge, passant, chez les femmes, de 10 % à 15-19 ans à 19 % à 20-24 ans et, chez les hommes de respectivement 4 % à 6 % (**Tableau 13.17**).

Tendances : Entre 2006 et 2011-2012, le pourcentage de jeunes femmes ayant effectué un test au cours des 12 derniers mois a augmenté, passant de 10 % à 19 % pour diminuer légèrement par la suite et se situer à 16 % en 2017-2018. Chez les hommes, on note la même mais avec des variations beaucoup plus faibles, le pourcentage étant passé de respectivement 6 % à 8 % et à 6 %.

13.10 Connaissance et couverture de l'autotest de dépistage du VIH

Le **Tableau 13.18** présente des informations sur les pourcentages de femmes et des hommes de 15-49 ans qui ont entendu parler des autotests de dépistage du VIH. Dans l'ensemble, 8 % de femmes et 5 % des hommes ont entendu parler de l'autotest du VIH. Seulement 1 % des femmes et moins d'un pour cent des hommes ont utilisé un autotest du VIH.

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur la connaissance, attitudes et comportements vis-à-vis du VIH/sida, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 13.1** Connaissance du VIH ou du sida
- **Tableau 13.2** Connaissance des moyens de prévention du VIH
- **Tableau 13.3** Connaissance « approfondie » du VIH
- **Tableau 13.4** Connaissance de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant
- **Tableau 13.5** Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH
- **Tableau 13.6.1** Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois : Femme
- **Tableau 13.6.2** Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois : Homme
- **Tableau 13.7** Rapports sexuels payants et utilisation du condom au cours des derniers rapports sexuels payants
- **Tableau 13.8.1** Couverture du test du VIH antérieur à l'enquête : Femme
- **Tableau 13.8.2** Couverture du test du VIH antérieur à l'enquête : Homme
- **Tableau 13.9** Femmes enceintes conseillées et ayant effectué un test du VIH
- **Tableau 13.10** Circoncision
- **Tableau 13.11** Prévalence déclarée des infections sexuellement transmissibles (IST) et symptômes déclarés d'IST
- **Tableau 13.12** Femmes et hommes ayant recherché un traitement contre les IST
- **Tableau 13.13** Connaissance « approfondie » du VIH parmi les jeunes
- **Tableau 13.14** Âge aux premiers rapports sexuels parmi les jeunes
- **Tableau 13.15** Rapports sexuels pré-nuptiaux parmi les jeunes
- **Tableau 13.16.1** Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois parmi les jeunes : Femme
- **Tableau 13.16.2** Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois parmi les jeunes : Homme
- **Tableau 13.17** Tests du VIH récents parmi les jeunes
- **Tableau 13.18** Connaissance et couverture de l'autotest de dépistage du VIH

Tableau 13.1 Connaissance du VIH ou du sida

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui ont entendu parler du VIH ou du sida, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Femme		Homme	
	Ont entendu parler du VIH ou du sida	Effectif de femmes	Ont entendu parler du VIH ou du sida	Effectif d'hommes
Groupe d'âges				
15-24	89,2	3 040	87,5	2 666
15-19	86,7	1 617	83,5	1 548
20-24	92,0	1 423	93,0	1 118
25-29	92,4	1 502	92,8	1 156
30-39	92,9	1 961	94,0	1 693
40-49	94,1	1 203	94,2	1 211
État matrimonial				
Célibataire	90,4	1 900	87,9	2 860
A déjà eu des rapports sexuels	95,8	963	95,2	1 519
N'a jamais eu de rapports sexuels	84,8	937	79,6	1 341
En union	91,7	5 409	93,8	3 675
En rupture d'union	94,7	396	93,6	191
Résidence				
Cotonou	98,4	460	98,6	390
Autres villes	92,9	2 843	93,9	2 487
Ensemble urbain	93,7	3 303	94,5	2 877
Rural	89,9	4 403	88,8	3 849
Département				
Alibori	88,8	947	70,8	917
Atacora	94,1	614	98,1	560
Atlantique	95,9	971	94,7	822
Borgou	71,8	890	98,4	823
Collines	98,0	588	89,7	448
Couffo	98,0	515	99,2	409
Donga	90,4	413	95,4	445
Littoral	98,4	460	98,6	390
Mono	95,4	375	98,2	354
Ouémé	88,9	724	77,2	618
Plateau	94,3	474	97,0	340
Zou	96,6	736	96,6	600
Niveau d'instruction				
Aucun	88,7	4 245	84,8	2 426
Primaire	92,3	1 547	92,0	1 562
Secondaire 1 ^{er} cycle	96,3	1 356	94,4	1 538
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	99,6	558	99,3	1 201
Quintiles de bien-être économique				
Le plus bas	85,3	1 424	83,1	1 248
Second	88,5	1 551	88,5	1 315
Moyen	91,9	1 422	93,2	1 282
Quatrième	94,9	1 574	93,1	1 317
Le plus élevé	96,0	1 734	97,0	1 565
Ensemble 15-49	91,5	7 706	91,3	6 727
50-64	na	na	94,9	868
Ensemble 15-64	na	na	91,7	7 595

na = Non applicable

Tableau 13.2 Connaissance des moyens de prévention du VIH

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui, en réponse à une question déterminée, ont déclaré que l'on pouvait réduire les risques de contracter le VIH en utilisant des condoms à chaque rapport sexuel et en limitant les rapports sexuels à un seul partenaire qui n'est pas infecté et qui n'a pas d'autres partenaires sexuels, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Femme				Homme			
	En utilisant des condoms ¹	En limitant les rapports sexuels à un seul partenaire qui n'est pas infecté ²	En utilisant des condoms et en limitant les rapports sexuels à un seul partenaire qui n'est pas infecté ^{1,2}	Effectif de femmes	En utilisant des condoms ¹	En limitant les rapports sexuels à un seul partenaire qui n'est pas infecté ²	En utilisant des condoms et en limitant les rapports sexuels à un seul partenaire qui n'est pas infecté ^{1,2}	Effectif d'hommes
Groupe d'âges								
15-24	67,9	76,0	63,4	3 040	68,0	72,4	63,0	2 666
15-19	63,7	71,8	59,0	1 617	61,5	66,5	56,0	1 548
20-24	72,7	80,8	68,4	1 423	77,1	80,6	72,7	1 118
25-29	74,9	81,9	70,3	1 502	77,8	83,9	74,2	1 156
30-39	74,4	82,4	70,5	1 961	79,2	83,9	75,2	1 693
40-49	73,4	82,5	69,2	1 203	78,1	84,9	74,7	1 211
Résidence								
Cotonou	78,9	84,7	72,9	460	74,3	75,7	69,0	390
Autres villes	74,2	81,7	69,4	2 843	79,1	83,4	75,4	2 487
Ensemble urbain	74,8	82,1	69,9	3 303	78,5	82,3	74,5	2 877
Rural	69,5	78,1	65,6	4 403	71,2	77,4	66,8	3 849
Département								
Alibori	72,5	84,2	71,4	947	57,8	64,1	55,0	917
Atacora	72,8	84,2	68,5	614	78,2	89,2	75,1	560
Atlantique	79,6	85,0	74,4	971	80,7	88,1	77,9	822
Borgou	46,7	60,5	43,5	890	83,4	87,0	78,4	823
Collines	79,1	83,1	74,9	588	70,4	78,3	65,3	448
Couffo	76,4	85,8	71,9	515	84,6	83,2	73,8	409
Donga	72,7	80,1	69,0	413	72,4	87,0	66,4	445
Littoral	78,9	84,7	72,9	460	74,3	75,7	69,0	390
Mono	70,1	77,4	61,7	375	88,7	93,4	87,0	354
Ouémé	69,8	72,2	64,1	724	73,0	75,1	72,4	618
Plateau	79,1	83,3	73,9	474	91,0	91,5	88,3	340
Zou	73,9	83,2	70,2	736	55,6	57,2	48,1	600
Niveau d'instruction								
Aucun	67,8	77,3	64,0	4 245	68,0	73,4	63,5	2 426
Primaire	72,1	78,7	67,2	1 547	72,9	79,2	68,7	1 562
Secondaire 1 ^{er} cycle	78,5	83,7	72,7	1 356	77,3	81,6	72,8	1 538
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	84,7	92,0	81,6	558	85,2	89,6	81,8	1 201
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	62,8	74,5	59,2	1 424	65,4	70,5	60,3	1 248
Second	67,8	75,1	63,1	1 551	71,4	75,8	66,2	1 315
Moyen	72,0	80,1	68,3	1 422	73,8	81,4	70,0	1 282
Quatrième	77,2	83,4	71,8	1 574	74,9	80,6	71,0	1 317
Le plus élevé	77,6	84,7	73,6	1 734	83,8	87,5	80,5	1 565
Ensemble 15-49	71,8	79,8	67,5	7 706	74,3	79,5	70,1	6 727
50-64	na	na	na	na	78,7	87,0	76,0	868
Ensemble 15-64	na	na	na	na	74,8	80,4	70,8	7 595

na = Non applicable

¹ En utilisant des condoms à chaque rapport sexuel.

² Un partenaire qui n'a pas d'autres partenaires.

Tableau 13.3 Connaissance « approfondie » sur le VIH

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui ont déclaré qu'une personne paraissant en bonne santé pouvait néanmoins avoir contracté le VIH et qui, en réponse à des questions déterminées, rejettent de manière correcte, conceptions erronées sur la transmission ou la prévention du VIH et pourcentage ayant une connaissance « approfondie » sur le VIH, selon l'âge, EDSB-V Bénin 2017-2018

Groupe d'âges	Pourcentage de répondants qui déclarent que :				Pourcentage ayant déclaré qu'une personne en bonne santé peut avoir le VIH et qui rejette les deux conceptions erronées locales les plus courantes ¹	Pourcentage avec une connaissance complète du VIH ²	Effectif d'enquêtés
	Une personne paraissant en bonne santé peut avoir le VIH	Le VIH ne peut pas être transmis par des piqûres de moustiques	Le VIH ne peut pas être transmis par des moyens surnaturels	Une personne ne peut pas devenir infectée en partageant les repas avec une personne ayant le VIH			
FEMME							
15-24	65,6	40,8	40,0	40,8	19,4	15,0	3 040
15-19	61,4	40,0	39,3	39,0	19,3	14,1	1 617
20-24	70,3	41,6	40,8	42,8	19,5	16,1	1 423
25-29	71,3	39,6	34,6	41,6	20,7	16,6	1 502
30-39	70,6	39,4	32,3	43,4	21,0	17,0	1 961
40-49	70,5	36,8	31,1	42,0	18,7	13,0	1 203
Ensemble 15-49	68,7	39,6	35,6	41,8	19,9	15,5	7 706
HOMME							
15-24	70,4	41,1	46,0	49,5	24,6	18,6	2 666
15-19	63,4	38,0	42,7	44,5	20,9	14,4	1 548
20-24	80,1	45,3	50,5	56,4	29,8	24,3	1 118
25-29	79,9	47,1	48,5	56,2	30,7	26,1	1 156
30-39	80,9	47,4	49,9	54,7	30,3	25,3	1 693
40-49	79,6	45,6	48,1	55,4	28,6	23,5	1 211
Ensemble 15-49	76,3	44,5	47,8	53,0	27,8	22,4	6 727
50-64	80,6	43,4	41,7	51,4	28,4	24,5	868
Ensemble 15-64	76,8	44,4	47,1	52,8	27,9	22,7	7 595

¹ Les deux conceptions locales erronées les plus courantes : Le sida peut être transmis par des piqûres de moustiques et en partageant les repas d'une personne qui a le sida.

² Sont considérés comme ayant une connaissance « approfondie », les enquêtés qui savent que l'utilisation régulière du condom au cours des rapports sexuels et la limitation des rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et non infecté permettent de réduire les risques de contracter le VIH, ceux qui savent qu'une personne en bonne santé peut néanmoins avoir contracté le VIH et ceux qui rejettent les deux idées locales erronées les plus courantes concernant la transmission ou la prévention du sida.

Tableau 13.4 Connaissance de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui savent que le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant pendant la grossesse, pendant l'accouchement ; par l'allaitement et par les trois moyens ; pourcentage sachant que le risque de transmission maternelle du VIH à l'enfant (TME) peut être réduit par la prise de médicaments spéciaux par la mère durant la grossesse, selon l'âge, EDSB-V Bénin 2017-2018

Groupe d'âges	Pourcentage sachant que le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant :				Pourcentage sachant que le risque de TME peut être réduit par la prise de médicaments spéciaux par la mère	Effectif d'enquêtés
	Pendant la grossesse	Pendant l'accouchement	Par l'allaitement	Par les trois moyens		
FEMME						
15-24	66,6	65,9	69,2	60,3	50,0	3 040
15-19	64,0	62,7	65,9	57,4	44,8	1 617
20-24	69,4	69,6	73,0	63,5	55,9	1 423
25-29	70,7	73,9	75,8	66,7	57,1	1 502
30-39	75,1	77,1	77,3	70,7	56,1	1 961
40-49	74,6	75,8	76,5	68,9	55,6	1 203
Ensemble 15-49	70,8	71,9	73,7	65,5	53,8	7 706
HOMME						
15-24	50,8	54,6	54,6	41,4	39,6	2 666
15-19	46,2	49,7	51,6	38,1	35,0	1 548
20-24	57,0	61,4	58,8	46,0	46,0	1 118
25-29	59,3	65,0	63,9	48,9	50,9	1 156
30-39	60,0	65,8	63,7	49,9	51,0	1 693
40-49	61,2	65,1	62,5	49,8	47,6	1 211
Ensemble 15-49	56,4	61,1	59,9	46,3	45,8	6 727
50-64	64,6	68,4	64,2	53,2	50,1	868
Ensemble 15-64	57,4	61,9	60,4	47,1	46,3	7 595

Tableau 13.5 Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH

Parmi les femmes et les hommes de 15-49 ans qui ont entendu parler du VIH ou du sida, pourcentage qui ne pense pas que les enfants vivant avec le VIH doivent pouvoir fréquenter l'école avec les enfants qui sont VIH négatifs, pourcentage qui n'achèterait pas des légumes frais à un commerçant qui a le VIH et pourcentage ayant des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Femme				Homme			
	Pourcentage qui ne pense pas que les enfants vivant avec le VIH doivent pouvoir fréquenter l'école avec les enfants VIH négatifs	Pourcentage qui n'achèterait pas des légumes frais à un commerçant qui a le VIH	Pourcentage ayant des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH ¹	Effectif de femmes qui ont entendu parler du VIH ou du sida	Pourcentage qui ne pense pas que les enfants vivant avec le VIH doivent pouvoir fréquenter l'école avec des enfants VIH négatifs	Pourcentage qui n'achèterait pas des légumes frais à un commerçant qui a le VIH	Pourcentage ayant des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH ¹	Effectif d'hommes qui ont entendu parler du VIH ou du sida
Groupe d'âges								
15-24	52,7	69,5	74,3	2 712	42,3	67,4	72,1	2 332
15-19	54,7	71,4	76,3	1 402	44,3	68,8	72,9	1 292
20-24	50,6	67,5	72,1	1 309	39,8	65,7	71,1	1 040
25-29	54,7	71,8	75,7	1 388	41,3	64,8	70,8	1 073
30-39	55,8	72,0	75,7	1 823	44,0	64,2	69,7	1 592
40-49	55,9	72,7	77,5	1 131	41,4	61,5	66,4	1 142
État matrimonial								
Célibataire	50,5	67,9	73,3	1 717	41,4	65,2	70,0	2 514
À déjà eu des rapports sexuels	47,7	61,5	67,6	923	39,0	63,2	68,4	1 447
N'a jamais eu de rapports sexuels	53,8	75,4	79,8	794	44,7	67,8	72,1	1 067
En union	56,3	72,7	76,6	4 961	43,4	64,8	70,4	3 447
En rupture d'union	47,3	64,6	70,6	376	35,6	66,6	69,0	179
Résidence								
Cotonou	32,1	51,6	56,8	453	24,6	61,1	64,1	385
Autres villes	50,8	69,7	74,1	2 641	36,5	56,5	62,9	2 335
Ensemble urbain	48,1	67,0	71,5	3 093	34,8	57,1	63,1	2 720
Rural	59,4	74,3	78,5	3 960	48,4	71,3	75,8	3 420
Département								
Alibori	59,3	65,0	66,6	841	70,3	72,9	85,7	649
Atacora	37,5	62,7	66,6	577	37,4	70,9	72,7	550
Atlantique	44,3	70,7	75,2	931	43,6	58,7	65,3	779
Borgou	68,2	82,7	84,5	639	36,1	68,5	74,1	810
Collines	64,2	71,3	80,0	576	49,7	77,6	80,2	402
Couffo	64,5	77,2	84,6	505	51,4	64,9	71,9	406
Donga	37,3	67,6	69,3	374	46,2	61,0	64,4	424
Littoral	32,1	51,6	56,8	453	24,6	61,1	64,1	385
Mono	44,6	72,5	77,1	358	27,9	56,9	60,4	348
Ouémé	60,5	70,9	79,1	644	39,1	44,8	47,0	478
Plateau	69,5	88,6	92,1	446	50,9	76,3	81,8	330
Zou	61,3	73,5	75,7	711	27,2	66,6	70,2	580
Niveau d'instruction								
Aucun	60,3	77,0	80,4	3 764	54,8	75,9	81,9	2 059
Primaire	58,4	73,8	78,9	1 428	45,5	69,6	73,5	1 436
Secondaire 1 ^{er} cycle	45,2	61,9	67,9	1 306	39,7	60,6	66,7	1 452
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	26,2	46,0	50,5	556	20,4	46,3	50,3	1 193
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	59,8	75,3	77,9	1 215	58,5	77,4	84,0	1 037
Second	62,5	76,9	81,3	1 373	49,5	71,4	76,8	1 164
Moyen	57,9	73,7	78,0	1 307	44,9	68,6	74,1	1 194
Quatrième	53,7	71,4	76,0	1 494	40,6	63,5	68,7	1 226
Le plus élevé	41,8	60,9	66,4	1 664	25,4	50,2	53,9	1 518
Ensemble 15-49	54,4	71,1	75,5	7 053	42,4	65,0	70,2	6 140
50-64	na	na	na	na	40,8	61,8	65,4	824
Ensemble 15-64	na	na	na	na	42,2	64,6	69,6	6 964

na = Non applicable

¹ Pourcentage qui ne pense pas que les enfants vivant avec le VIH doivent pouvoir fréquenter l'école avec les enfants VIH négatifs et/ou qui n'achèterait pas des légumes frais à un commerçant qui a le VIH.

Tableau 13.6.1 Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois : Femme

Parmi toutes les femmes de 15-49 ans, pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois et pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient; parmi les femmes ayant eu, au cours des 12 derniers mois, plus d'un partenaire sexuel, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels; parmi les femmes de 15-49 ans qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels avec cette personne; Parmi les femmes ayant déjà eu des rapports sexuels, nombre moyen de partenaires sexuels sur la durée de vie, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Toutes les femmes			Femmes ayant eu 2 partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois		Femmes ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient		Femmes ayant déjà eu des rapports sexuels ¹	
	Pourcentage ayant eu 2 partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient	Effectif de femmes	Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels	Effectif de femmes	Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels avec cette personne	Effectif de femmes	Nombre moyen de partenaires sexuels sur la durée de vie	Effectif de femmes
Groupe d'âges									
15-24	2,6	24,2	6 273	32,1	163	26,1	1 516	1,9	4 329
15-19	2,7	26,1	3 350	38,7	91	25,7	873	1,7	1 602
20-24	2,5	22,0	2 923	23,8	72	26,7	644	2,1	2 728
25-29	0,9	8,0	2 986	(8,8)	25	12,7	239	2,2	2 952
30-39	1,1	5,0	4 085	(1,6)	44	9,2	204	2,2	4 063
40-49	0,8	6,1	2 585	*	21	7,5	159	2,2	2 566
État matrimonial									
Célibataire	4,0	42,0	3 889	34,7	154	25,5	1 635	2,1	1 914
En union	0,5	1,2	11 168	3,6	59	13,8	130	2,1	11 137
En rupture d'union	4,7	40,6	871	(6,2)	41	6,1	354	3,0	859
Résidence									
Cotonou	3,0	20,3	958	(35,3)	28	22,6	195	2,8	804
Autres villes	1,5	14,4	5 803	25,0	86	26,9	835	2,2	4 996
Ensemble urbain	1,7	15,2	6 761	27,6	115	26,1	1 029	2,3	5 800
Rural	1,5	11,9	9 167	19,0	139	17,3	1 089	2,0	8 109
Département									
Alibori	2,4	9,7	1 878	(31,0)	46	31,9	183	1,8	1 738
Atacora	5,3	19,2	1 302	23,3	69	16,5	250	3,1	1 176
Atlantique	1,1	14,5	2 037	*	23	25,4	296	2,3	1 726
Borgou	1,2	12,4	1 839	*	22	20,2	228	1,8	1 659
Collines	1,1	19,1	1 151	*	12	15,3	219	2,0	1 020
Couffo	0,1	6,5	1 041	*	1	30,7	67	1,5	857
Donga	0,5	7,8	881	*	4	22,6	69	2,1	804
Littoral	3,0	20,3	958	(35,3)	28	22,6	195	2,8	804
Mono	1,1	11,7	759	*	8	38,4	89	2,2	644
Ouémé	0,3	12,2	1 507	*	4	15,2	183	1,8	1 269
Plateau	1,7	11,3	970	*	17	12,4	110	1,7	839
Zou	1,2	14,3	1 606	*	19	20,3	229	2,3	1 375
Niveau d'instruction									
Aucun	1,1	6,9	8 785	14,6	92	11,7	609	2,0	8 331
Primaire	1,9	14,8	3 148	13,7	60	13,8	467	2,3	2 602
Secondaire 1 ^{er} cycle	2,4	23,3	2 847	41,4	68	27,6	665	2,2	2 063
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	2,9	32,9	1 147	(24,7)	34	36,5	377	2,5	913
Quintiles de bien-être économique									
Le plus bas	1,6	8,8	2 735	(21,1)	43	16,0	240	1,9	2 483
Second	1,2	10,8	3 030	(6,9)	35	19,1	326	1,9	2 666
Moyen	1,8	13,4	3 104	(21,1)	55	15,8	415	2,1	2 761
Quatrième	1,5	14,4	3 405	(26,4)	52	22,0	491	2,2	2 961
Le plus élevé	1,9	17,7	3 654	31,1	68	28,2	647	2,5	3 040
Ensemble 15-49	1,6	13,3	15 928	22,9	254	21,6	2 118	2,1	13 910

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Les moyennes sont calculées en excluant les enquêtées qui ont donné des réponses non numériques.

Tableau 13.6.2 Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois : Homme

Parmi tous les hommes de 15-49 ans, pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec plus d'une partenaire sexuelle au cours des 12 derniers mois et pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient; parmi les hommes ayant eu, au cours des 12 derniers mois, plus d'une partenaire sexuelle, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels; parmi les hommes de 15-49 ans qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels avec cette personne; Parmi les hommes ayant déjà eu des rapports sexuels, nombre moyen de partenaires sexuelles sur la durée de vie, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Tous les hommes		Hommes ayant eu 2 partenaires sexuelles ou plus au cours des 12 derniers mois		Parmi les hommes ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient		Parmi les hommes ayant déjà eu des rapports sexuels ¹		
	Pourcentage ayant eu 2 partenaires sexuelles ou plus au cours des 12 derniers mois	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient	Effectif d'hommes	Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels	Effectif d'hommes	Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels avec cette personne	Effectif d'hommes	Nombre moyen de partenaires sexuelles sur la durée de vie	Effectif d'hommes
Groupe d'âges									
15-24	9,7	33,5	2 666	30,9	258	31,1	894	3,8	1 352
15-19	3,6	21,5	1 548	26,2	55	27,4	334	2,5	450
20-24	18,1	50,1	1 118	32,2	203	33,2	560	4,4	902
25-29	25,7	44,7	1 156	16,2	297	32,1	517	6,0	1 102
30-39	31,2	26,3	1 693	9,2	528	33,8	446	7,0	1 623
40-49	30,5	17,1	1 211	6,0	369	27,1	207	7,5	1 153
État matrimonial									
Célibataire	9,5	41,2	2 860	35,5	272	32,2	1 179	3,9	1 495
En union	31,3	20,9	3 675	8,0	1 150	32,0	769	6,9	3 553
En rupture d'union	16,3	60,6	191	(31,6)	31	21,4	116	7,4	182
Type d'union									
En union polygame	74,5	14,6	816	2,9	607	28,5	119	8,8	784
En union non polygame	19,0	22,7	2 860	13,8	542	32,6	850	6,3	2 769
Non actuellement en union	9,9	42,4	3 051	35,1	303	31,2	1 295	4,3	1 676
Résidence									
Cotonou	22,9	40,0	390	34,8	89	48,0	156	6,7	288
Autres villes	22,4	33,2	2 487	15,4	558	40,5	825	6,6	1 937
Ensemble urbain	22,5	34,1	2 877	18,1	647	41,7	981	6,6	2 224
Rural	20,9	28,1	3 849	10,1	805	22,3	1 083	5,6	3 005
Département									
Alibori	18,7	25,0	917	4,2	171	24,2	230	4,2	686
Atacora	21,7	39,2	560	5,1	121	10,5	219	4,9	446
Atlantique	28,5	38,0	822	15,9	234	36,6	312	9,2	621
Borgou	13,7	20,8	823	12,8	113	44,1	171	2,9	656
Collines	23,3	35,5	448	14,1	104	25,2	159	6,6	350
Couffo	28,4	27,6	409	13,9	116	32,6	113	6,4	327
Donga	9,1	22,3	445	(15,9)	40	14,6	99	5,0	338
Littoral	22,9	40,0	390	34,8	89	48,0	156	6,7	288
Mono	21,1	30,1	354	20,3	75	41,2	107	4,9	265
Ouémé	16,2	24,5	618	13,5	100	45,0	152	8,9	463
Plateau	21,8	31,9	340	7,7	74	22,7	109	6,4	297
Zou	35,6	39,5	600	14,3	214	33,2	237	7,3	492
Niveau d'instruction									
Aucun	23,3	22,2	2 426	5,8	565	15,8	539	5,4	2 054
Primaire	24,0	31,3	1 562	10,5	374	27,3	488	7,1	1 235
Secondaire 1 ^{er} cycle	16,7	33,4	1 538	18,3	257	32,3	513	5,7	978
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	21,3	43,5	1 201	31,1	256	50,9	523	6,4	962
Quintiles de bien-être économique									
Le plus bas	19,9	23,4	1 248	2,6	248	12,1	291	4,5	1 003
Second	19,2	25,5	1 315	11,4	252	22,6	335	5,8	991
Moyen	20,6	29,6	1 282	13,0	264	25,7	380	5,6	990
Quatrième	23,1	33,7	1 317	11,7	304	32,3	444	6,5	1 027
Le plus élevé	24,5	39,3	1 565	24,3	384	48,6	614	7,5	1 217
Ensemble 15-49	21,6	30,7	6 727	13,7	1 452	31,5	2 064	6,0	5 229
50-64	22,7	10,5	868	2,9	197	19,4	91	8,7	833
Ensemble 15-64	21,7	28,4	7 595	12,4	1 650	31,0	2 155	6,4	6 062

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

¹ Les moyennes sont calculées en excluant les enquêtés qui ont donné des réponses non numériques.

Tableau 13.7 Rapports sexuels payants et utilisation du condom au cours des derniers rapports sexuels payants

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont déjà eu des rapports sexuels payants et pourcentage ayant déclaré avoir eu des rapports sexuels payants au cours des 12 derniers mois et, parmi ces derniers, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels payants, selon l'âge, EDSB-V Bénin 2017-2018

Groupe d'âges	Parmi tous les hommes :			Parmi les hommes ayant eu des rapports sexuels payants au cours des 12 derniers mois :	
	Pourcentage ayant déjà eu des rapports sexuels payants	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels payants au cours des 12 derniers mois	Effectif d'hommes	Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels payants	Effectif d'hommes
15-24	5,3	3,5	2 666	35,9	94
15-19	2,6	2,0	1 548	(23,1)	32
20-24	8,9	5,6	1 118	42,3	62
25-29	9,3	3,4	1 156	(51,4)	39
30-39	10,8	4,3	1 693	47,1	73
40-49	10,3	3,2	1 211	(48,5)	39
Ensemble 15-49	8,3	3,7	6 727	43,7	246
50-64	9,9	1,8	868	*	16
Ensemble 15-64	8,5	3,4	7 595	42,4	261

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 13.8.1 Couverture du test du VIH antérieur à l'enquête : Femme

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui savent où on peut faire un test du VIH ; répartition (en %) des femmes de 15-49 ans selon qu'elles ont fait, ou non, un test du VIH et selon qu'elles ont reçu, ou non, les résultats du dernier test ; pourcentage de femmes ayant déjà fait un test du VIH et pourcentage ayant fait un test du VIH au cours des 12 derniers mois et ayant reçu les résultats du dernier test, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage sachant où on peut faire un test du VIH	Répartition (en %) des femmes selon qu'elles ont fait, ou non, un test du VIH et selon qu'elles ont reçu, ou non, les résultats du dernier test			Total	Pourcentage ayant déjà fait un test du VIH	Pourcentage ayant fait un test du VIH au cours des 12 derniers mois et ayant reçu le résultat du dernier test	Effectif de femmes
		A fait un test et a reçu le résultat	A fait un test mais n'a pas reçu le résultat	N'a jamais fait de test du VIH ¹				
Groupe d'âges								
15-24	45,1	22,2	2,8	75,0	100,0	25,0	12,0	3 040
15-19	34,2	10,8	1,9	87,3	100,0	12,7	6,3	1 617
20-24	57,4	35,2	3,7	61,1	100,0	38,9	18,4	1 423
25-29	65,0	43,2	4,3	52,4	100,0	47,6	18,0	1 502
30-39	66,1	45,7	4,3	50,0	100,0	50,0	17,5	1 961
40-49	58,9	36,8	3,8	59,4	100,0	40,6	9,2	1 203
État matrimonial								
Célibataire	40,0	15,9	1,8	82,3	100,0	17,7	8,3	1 900
A déjà eu des rapports sexuels	52,6	25,8	2,6	71,6	100,0	28,4	13,1	963
N'a jamais eu de rapports sexuels	27,1	5,7	1,0	93,3	100,0	6,7	3,4	937
En union	61,7	40,4	4,2	55,3	100,0	44,7	16,2	5 409
En rupture d'union	63,8	44,5	3,7	51,8	100,0	48,2	14,0	396
Résidence								
Cotonou	74,8	60,7	2,2	37,1	100,0	62,9	25,9	460
Autres villes	61,7	41,1	3,5	55,3	100,0	44,7	16,7	2 843
Ensemble urbain	63,5	43,9	3,3	52,8	100,0	47,2	18,0	3 303
Rural	51,2	27,6	3,8	68,6	100,0	31,4	11,2	4 403
Département								
Alibori	49,8	25,6	1,1	73,3	100,0	26,7	8,2	947
Atacora	55,4	23,9	3,5	72,6	100,0	27,4	10,0	614
Atlantique	67,6	44,5	5,6	50,0	100,0	50,0	19,0	971
Borgou	39,6	19,6	4,4	76,0	100,0	24,0	10,1	890
Collines	60,0	27,8	2,8	69,4	100,0	30,6	15,2	588
Couffo	51,0	34,6	4,3	61,1	100,0	38,9	14,0	515
Donga	55,8	35,7	0,5	63,8	100,0	36,2	20,2	413
Littoral	74,8	60,7	2,2	37,1	100,0	62,9	25,9	460
Mono	59,1	36,5	5,0	58,5	100,0	41,5	15,7	375
Ouémé	55,9	43,3	2,7	53,9	100,0	46,1	11,5	724
Plateau	47,2	29,4	6,3	64,4	100,0	35,6	10,1	474
Zou	66,5	42,3	4,7	52,9	100,0	47,1	16,3	736
Niveau d'instruction								
Aucun	51,4	28,9	3,9	67,2	100,0	32,8	10,9	4 245
Primaire	56,6	36,6	3,6	59,8	100,0	40,2	13,8	1 547
Secondaire 1 ^{er} cycle	61,5	38,9	3,4	57,7	100,0	42,3	17,1	1 356
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	82,5	61,7	2,2	36,1	100,0	63,9	32,6	558
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	40,1	19,1	2,8	78,1	100,0	21,9	7,4	1 424
Second	47,7	24,5	3,3	72,2	100,0	27,8	9,5	1 551
Moyen	54,1	30,1	4,6	65,2	100,0	34,8	12,6	1 422
Quatrième	65,1	41,5	4,8	53,7	100,0	46,3	16,4	1 574
Le plus élevé	71,8	53,7	2,7	43,6	100,0	56,4	22,9	1 734
Ensemble 15-49	56,4	34,6	3,6	61,8	100,0	38,2	14,1	7 706

¹ Y compris : Ne sait pas/manquant.

Tableau 13.8.2 Couverture du test du VIH antérieur à l'enquête : Homme

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui savent où on peut faire un test du VIH ; répartition (en %) des hommes de 15-49 ans selon qu'ils ont fait, ou non, un test du VIH et selon qu'ils ont reçu, ou non, les résultats du dernier test ; pourcentage d'hommes ayant déjà fait un test du VIH et pourcentage ayant fait un test du VIH au cours des 12 derniers mois et ayant reçu les résultats du dernier test, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage sachant où on peut faire un test du VIH	Répartition (en %) des hommes selon qu'ils ont fait, ou non, un test du VIH et selon qu'ils ont reçu, ou non, les résultats du dernier test			Total	Pourcentage ayant déjà fait un test du VIH	Pourcentage ayant fait un test du VIH au cours des 12 derniers mois et ayant reçu le résultat du dernier test	Effectif d'hommes
		A fait un test et a reçu le résultat	A fait un test mais n'a pas reçu le résultat	N'a jamais fait de test du VIH ¹				
Groupe d'âges								
15-24	43,1	11,2	1,4	87,4	100,0	12,6	4,8	2 666
15-19	34,4	7,0	0,9	92,1	100,0	7,9	3,5	1 548
20-24	55,1	17,0	2,1	80,8	100,0	19,2	6,6	1 118
25-29	58,5	23,2	1,4	75,5	100,0	24,5	7,9	1 156
30-39	57,3	24,2	1,9	73,9	100,0	26,1	10,3	1 693
40-49	58,5	21,5	1,8	76,6	100,0	23,4	6,8	1 211
État matrimonial								
Célibataire	45,7	13,3	1,2	85,5	100,0	14,5	5,5	2 860
A déjà eu des rapports sexuels	57,5	18,6	1,6	79,8	100,0	20,2	6,7	1 519
N'a jamais eu de rapports sexuels	32,3	7,3	0,8	91,8	100,0	8,2	4,0	1 341
En union	56,9	22,1	2,0	75,9	100,0	24,1	8,3	3 675
En rupture d'union	55,5	21,4	0,9	77,6	100,0	22,4	7,9	191
Résidence								
Cotonou	77,2	43,5	2,0	54,4	100,0	45,6	16,3	390
Autres villes	54,2	21,9	1,4	76,7	100,0	23,3	9,2	2 487
Ensemble urbain	57,3	24,8	1,5	73,6	100,0	26,4	10,2	2 877
Rural	48,2	13,5	1,7	84,8	100,0	15,2	4,7	3 849
Département								
Alibori	43,4	4,5	0,3	95,2	100,0	4,8	3,5	917
Atacora	62,9	19,5	2,3	78,2	100,0	21,8	8,9	560
Atlantique	56,7	25,7	2,4	71,9	100,0	28,1	7,6	822
Borgou	54,3	11,7	0,7	87,6	100,0	12,4	3,8	823
Collines	41,2	13,4	2,0	84,6	100,0	15,4	3,6	448
Couffo	68,9	28,1	1,7	70,2	100,0	29,8	7,6	409
Donga	45,6	18,5	3,3	78,2	100,0	21,8	12,8	445
Littoral	77,2	43,5	2,0	54,4	100,0	45,6	16,3	390
Mono	73,1	26,2	0,9	72,9	100,0	27,1	5,8	354
Ouémé	23,5	14,3	0,2	85,5	100,0	14,5	8,4	618
Plateau	43,8	17,6	1,3	81,1	100,0	18,9	5,7	340
Zou	52,6	18,4	3,3	78,3	100,0	21,7	6,6	600
Niveau d'instruction								
Aucun	39,7	7,3	1,2	91,5	100,0	8,5	2,2	2 426
Primaire	45,5	12,5	1,7	85,8	100,0	14,2	3,9	1 562
Secondaire 1 ^{er} cycle	56,1	19,8	2,0	78,2	100,0	21,8	7,9	1 538
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	80,5	46,5	1,9	51,6	100,0	48,4	19,9	1 201
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	40,4	7,6	1,6	90,8	100,0	9,2	2,2	1 248
Second	43,8	10,7	1,9	87,4	100,0	12,6	3,7	1 315
Moyen	50,2	15,7	1,7	82,7	100,0	17,3	5,4	1 282
Quatrième	55,0	18,3	1,9	79,8	100,0	20,2	6,8	1 317
Le plus élevé	67,4	35,7	1,1	63,2	100,0	36,8	15,4	1 565
Ensemble 15-49	52,1	18,4	1,6	80,0	100,0	20,0	7,1	6 727
50-64	58,5	21,8	2,2	76,0	100,0	24,0	6,0	868
Ensemble 15-64	52,8	18,8	1,7	79,5	100,0	20,5	6,9	7 595

¹ Y compris : Ne sait pas/manquant.

Tableau 13.9 Femmes enceintes conseillées et ayant effectué un test du VIH

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant reçu des conseils sur le VIH au cours d'une visite prénatale, pourcentage ayant effectué un test du VIH pendant une visite prénatale pour leur naissance la plus récente selon, qu'elles ont reçu ou non le résultat du test et qu'elles ont reçu ou non des conseils après le test; pourcentage ayant effectué un test du VIH pendant une visite prénatale ou l'accouchement pour leur naissance la plus récente, selon qu'elles ont reçu ou non le résultat du test, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant reçu des conseils sur le VIH au cours d'une visite prénatale ¹	Pourcentage ayant fait un test du VIH durant une visite prénatale et qui :			Pourcentage ayant reçu des conseils sur le VIH, ayant fait un test du VIH pendant une visite prénatale et ayant reçu le résultat	Pourcentage ayant fait un test du VIH pendant une visite prénatale ou pendant l'accouchement et qui : ²		Effectif de femmes qui ont eu une naissance dans les 2 dernières années ³
		ont reçu les résultats et :	Ont reçu des conseils après le test	N'ont pas reçu de conseils après le test		N'ont pas reçu les résultats	Ont reçu le résultat	
Groupe d'âges								
15-24	31,6	24,4	9,8	3,9	25,5	35,4	4,2	909
15-19	27,4	22,9	6,8	4,3	22,5	30,6	5,1	204
20-24	32,9	24,8	10,7	3,8	26,4	36,8	3,9	705
25-29	36,3	29,3	10,1	4,0	29,9	41,3	4,0	829
30-39	38,9	29,7	12,3	3,7	33,9	43,8	3,5	798
40-49	38,1	32,9	8,3	4,5	32,8	43,8	4,5	156
État matrimonial								
Célibataire	48,7	36,6	16,5	4,7	41,9	53,1	4,7	101
En union	35,1	27,8	10,2	3,9	29,2	39,6	4,0	2 529
En rupture d'union	32,5	22,1	16,1	2,3	31,6	42,5	2,3	63
Résidence								
Cotonou	65,3	55,5	25,6	4,9	60,8	82,9	4,9	102
Autres villes	41,1	32,6	12,9	3,5	35,6	47,6	3,7	954
Ensemble urbain	43,4	34,8	14,1	3,7	38,0	51,0	3,8	1 056
Rural	30,5	23,5	8,3	4,1	24,4	33,2	4,0	1 637
Département								
Alibori	26,4	24,3	1,7	0,4	21,5	26,2	0,4	390
Atacora	25,2	21,6	3,9	4,5	21,4	25,8	4,5	246
Atlantique	47,9	32,0	20,9	7,1	37,7	53,3	7,7	284
Borgou	19,1	14,6	3,4	3,3	14,1	19,9	2,2	379
Collines	35,9	23,7	13,4	5,0	25,3	38,5	5,6	174
Couffo	47,5	29,6	16,4	5,0	40,5	48,2	5,0	187
Donga	35,1	31,1	11,2	0,4	30,9	43,4	0,4	190
Littoral	65,3	55,5	25,6	4,9	60,8	82,9	4,9	102
Mono	39,4	34,1	11,5	4,3	34,6	46,9	4,3	95
Ouémé	38,6	36,7	13,4	4,0	34,8	50,1	4,0	236
Plateau	27,4	19,7	11,7	5,3	24,7	35,7	6,6	184
Zou	53,6	40,4	13,3	5,8	45,7	60,9	5,9	226
Niveau d'instruction								
Aucun	28,3	21,5	8,0	3,9	22,7	31,4	3,8	1 683
Primaire	42,5	34,3	10,4	4,1	36,1	45,9	4,6	529
Secondaire 1 ^{er} cycle	50,7	38,0	20,7	3,9	44,3	59,4	3,9	332
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	59,4	55,9	17,7	3,4	54,8	77,0	3,4	149
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	18,6	12,3	5,6	3,4	14,1	18,9	3,1	629
Second	27,9	22,8	6,8	3,0	22,1	30,8	3,4	585
Moyen	39,0	29,2	9,4	5,3	31,8	40,2	4,9	507
Quatrième	41,9	34,9	14,5	4,5	35,3	52,3	5,1	511
Le plus élevé	57,8	46,8	18,9	3,6	52,5	67,6	3,4	460
Ensemble 15-49	35,6	28,0	10,6	3,9	29,8	40,2	3,9	2 693

¹ « Conseils » signifie ici que quelqu'un a parlé à l'enquêtée des trois sujets suivants: 1) la transmission du virus du sida de la mère au bébé, 2) la prévention du virus et 3) effectuer un test du VIH.

² La question concernant le test du VIH pendant l'accouchement n'a été posé qu'aux femmes qui ont accouché en établissement de santé.

³ Sont incluses dans le dénominateur les femmes qui n'ont pas reçu de soins prénatals pour leur dernière naissance ayant eu lieu au cours des deux dernières années.

Tableau 13.10 Circoncision

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans selon leur statut vis-à-vis de la circoncision et selon la personne qui a pratiqué la circoncision et pourcentage d'hommes circoncis, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Circoncis par :			Non circoncis	Ne sait pas/ manquant	Total	Pourcentage d'hommes circoncis ¹	Effectif d'hommes
	Personnel de santé/ professionnel	Praticien traditionnel/ famille/amis	Autre/ ne sait pas/ manquant					
Groupe d'âges								
15-24	17,0	74,2	2,3	6,0	0,4	100,0	93,6	2 666
15-19	17,1	74,7	2,0	5,7	0,4	100,0	93,8	1 548
20-24	16,9	73,6	2,7	6,5	0,3	100,0	93,2	1 118
25-29	13,4	77,3	2,9	6,1	0,3	100,0	93,6	1 156
30-39	10,6	83,0	2,3	4,0	0,1	100,0	95,8	1 693
40-49	8,4	85,3	2,1	4,0	0,2	100,0	95,9	1 211
Résidence								
Cotonou	32,3	59,1	5,8	2,5	0,2	100,0	97,3	390
Autres villes	15,3	78,8	2,1	3,5	0,2	100,0	96,2	2 487
Ensemble urbain	17,6	76,1	2,6	3,4	0,2	100,0	96,4	2 877
Rural	9,9	81,1	2,2	6,5	0,3	100,0	93,2	3 849
Département								
Alibori	0,8	98,1	0,3	0,7	0,1	100,0	99,2	917
Atacora	2,9	47,6	6,2	42,0	1,3	100,0	56,7	560
Atlantique	16,4	81,3	1,5	0,7	0,1	100,0	99,2	822
Borgou	6,3	87,1	4,2	2,3	0,2	100,0	97,6	823
Collines	16,9	79,0	2,3	1,8	0,0	100,0	98,2	448
Couffo	33,0	64,8	2,2	0,0	0,0	100,0	100,0	409
Donga	5,2	85,5	0,9	8,1	0,3	100,0	91,7	445
Littoral	32,3	59,1	5,8	2,5	0,2	100,0	97,3	390
Mono	40,0	58,9	0,8	0,3	0,0	100,0	99,7	354
Ouémé	13,7	80,4	2,5	3,2	0,2	100,0	96,5	618
Plateau	12,6	84,1	2,4	0,9	0,0	100,0	99,1	340
Zou	8,3	89,6	0,7	0,6	0,8	100,0	98,6	600
Religion								
Vodoun	19,9	66,9	1,5	11,0	0,7	100,0	88,3	717
Autre traditionnelles	5,2	81,5	4,4	8,9	0,0	100,0	91,1	71
Islam	5,2	90,0	2,7	1,9	0,1	100,0	98,0	2 236
Catholique	19,8	70,9	3,1	5,9	0,2	100,0	93,8	1 739
Protestante Méthodiste	11,9	85,6	1,6	0,9	0,0	100,0	99,1	205
Autre Protestants	15,9	77,9	0,8	5,1	0,3	100,0	94,6	292
Célestes	12,3	84,2	1,4	1,9	0,2	100,0	97,9	409
Autres chrétiens	18,7	75,7	2,0	3,1	0,4	100,0	96,5	586
Autres religions	10,1	85,6	3,0	1,2	0,0	100,0	98,8	76
Aucune	10,5	68,4	1,8	18,3	0,9	100,0	80,8	396
Ensemble 15-49	13,2	79,0	2,4	5,2	0,3	100,0	94,6	6 727
50-64	5,0	88,9	2,1	3,7	0,3	100,0	96,0	868
Ensemble 15-64	12,3	80,1	2,4	5,0	0,3	100,0	94,7	7 595

¹ Y compris tous les hommes ayant déclaré être circoncis, quel que soit le prestataire qui a pratiqué la circoncision.

Tableau 13.11 Prévalence déclarée des infections sexuellement transmissibles (IST) et symptômes déclarés d'IST

Parmi les femmes et les hommes de 15-49 ans ayant déjà eu des rapports sexuels, pourcentage ayant déclaré avoir eu une IST et/ou des symptômes d'IST, au cours des 12 derniers mois, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Femme										Homme				
	Pourcentage de femmes ayant eu au cours des 12 derniers mois :					Pourcentage d'hommes ayant eu au cours des 12 derniers mois :					IST/écoulement anormal du pénis/ plaque ou ulcère				
	IST	Pertes vaginales anormales/ malodorantes	Plaque/ulcère génital	IST/pertes génitales/ plaque ou ulcère	Effectif de femmes ayant déjà eu des rapports sexuels	IST	Écoulement anormal du pénis	Plaque ou ulcère génital	IST/écoulement anormal du pénis/ plaque ou ulcère	Effectif d'hommes ayant déjà eu des rapports sexuels	IST	Écoulement anormal du pénis	Plaque ou ulcère génital	IST/écoulement anormal du pénis/ plaque ou ulcère	Effectif d'hommes ayant déjà eu des rapports sexuels
Groupes d'âges															
15-24	7,5	14,7	7,5	18,9	2 118	2,4	3,0	2,2	5,9	1 368	2,4	3,0	2,2	5,9	1 368
15-19	8,4	15,3	8,3	20,8	785	2,0	4,8	1,8	7,2	450	2,0	4,8	1,8	7,2	450
20-24	7,0	14,3	7,1	17,9	1 333	2,5	2,1	2,5	5,2	918	2,5	2,1	2,5	5,2	918
25-29	7,7	13,2	5,5	17,4	1 490	2,9	3,5	1,5	6,1	1 124	2,9	3,5	1,5	6,1	1 124
30-39	6,6	10,4	5,3	14,9	1 958	3,2	2,4	2,0	4,5	1 684	3,2	2,4	2,0	4,5	1 684
40-49	6,0	9,8	5,4	13,7	1 203	2,0	2,0	1,0	3,6	1 210	2,0	2,0	1,0	3,6	1 210
État matrimonial															
Célibataire	7,5	15,2	7,4	19,9	963	3,0	3,2	2,0	6,2	1 519	3,0	3,2	2,0	6,2	1 519
En union	6,9	11,9	6,1	16,1	5 409	2,5	2,5	1,7	4,5	3 675	2,5	2,5	1,7	4,5	3 675
En rupture d'union	7,3	10,6	2,1	13,6	396	3,8	1,7	1,0	5,0	191	3,8	1,7	1,0	5,0	191
Circoncis															
Oui ¹	na	na	na	na	na	2,6	2,7	1,8	5,0	5 117	2,6	2,7	1,8	5,0	5 117
Non	na	na	na	na	na	3,4	2,4	0,8	4,5	259	3,4	2,4	0,8	4,5	259
Ne sait pas/manquant	na	na	na	na	na	*	*	*	*	10	*	*	*	*	10
Résidence															
Cotonou	9,9	14,1	4,3	18,0	396	2,3	1,8	1,1	3,5	325	2,3	1,8	1,1	3,5	325
Autres villes	7,2	12,2	6,5	16,3	2 459	3,0	2,3	1,9	5,1	1 990	3,0	2,3	1,9	5,1	1 990
Ensemble urbain	7,5	12,5	6,2	16,6	2 855	2,9	2,2	1,8	4,9	2 315	2,9	2,2	1,8	4,9	2 315
Rural	6,6	12,1	5,9	16,5	3 914	2,5	3,0	1,7	5,0	3 071	2,5	3,0	1,7	5,0	3 071
Département															
Alibori	18,1	24,0	10,7	30,0	875	1,9	0,8	0,0	2,5	689	1,9	0,8	0,0	2,5	689
Atacora	2,1	9,9	5,7	14,7	562	5,8	4,8	4,0	8,3	450	5,8	4,8	4,0	8,3	450
Atlantique	6,9	11,5	4,7	15,3	839	6,2	5,5	4,5	11,4	667	6,2	5,5	4,5	11,4	667
Borgou	5,0	15,3	9,0	19,5	821	1,9	2,2	0,9	3,9	671	1,9	2,2	0,9	3,9	671
Collines	5,1	6,8	4,9	11,1	517	2,6	3,4	1,8	5,9	363	2,6	3,4	1,8	5,9	363
Couffo	2,0	7,0	7,0	11,5	410	1,6	4,4	2,1	6,3	337	1,6	4,4	2,1	6,3	337
Donga	1,9	10,9	5,0	13,8	380	1,7	2,0	0,2	2,7	339	1,7	2,0	0,2	2,7	339
Littoral	9,9	14,1	4,3	18,0	396	2,3	1,8	1,1	3,5	325	2,3	1,8	1,1	3,5	325
Mono	8,1	18,9	9,1	22,6	314	2,4	4,3	5,2	7,7	274	2,4	4,3	5,2	7,7	274
Ouémé	3,6	5,5	2,1	7,0	605	0,0	0,0	0,0	0,0	473	0,0	0,0	0,0	0,0	473
Plateau	7,6	8,8	3,0	14,8	416	1,2	1,0	0,8	2,1	300	1,2	1,0	0,8	2,1	300
Zou	7,1	8,3	4,2	12,8	634	2,4	2,2	0,9	4,2	498	2,4	2,2	0,9	4,2	498
Niveau d'instruction															
Aucun	7,1	12,0	6,3	16,3	4 030	2,5	1,9	1,0	3,8	2 094	2,5	1,9	1,0	3,8	2 094
Primaire	5,7	10,5	5,0	14,2	1 283	1,9	3,0	2,6	4,8	1 273	1,9	3,0	2,6	4,8	1 273
Secondaire 1 ^{er} cycle	7,5	13,2	6,5	17,6	1 001	3,0	4,7	2,5	7,3	1 009	3,0	4,7	2,5	7,3	1 009
Secondaire 2 nd cycle ou plus	8,8	17,7	6,0	22,4	455	3,8	1,8	1,4	5,3	1 010	3,8	1,8	1,4	5,3	1 010

A suivre...

Tableau 13.11—Suite

Caractéristique sociodémographique	Femme					Homme				
	Pourcentage de femmes ayant eu au cours des 12 derniers mois :					Pourcentage d'hommes ayant eu au cours des 12 derniers mois :				
	IST	Pertes vaginales anormales/ malodorantes	Plaque/ulcère général	IST/pertes génétales/plaie ou ulcère	Effectif de femmes ayant déjà eu des rapports sexuels	IST	Écoulement anormal du pénis	Plaque ou ulcère général	IST/écoulement anormal du pénis/plaie ou ulcère	Effectif d'hommes ayant déjà eu des rapports sexuels
Quintiles de bien-être économique										
Le plus bas	7,5	13,6	7,4	18,4	1 298	2,5	3,3	2,7	5,7	1 021
Second	7,3	12,6	5,9	16,6	1 348	2,2	2,3	1,1	4,3	1 010
Moyen	5,4	10,3	5,5	14,3	1 279	2,9	2,6	1,4	4,7	1 009
Quatrième	7,4	12,6	6,0	16,6	1 385	2,6	3,9	2,0	5,9	1 053
Le plus élevé	7,3	12,3	5,5	16,6	1 458	3,1	1,5	1,5	4,4	1 292
Ensemble 15-49	7,0	12,3	6,0	16,5	6 769	2,7	2,7	1,7	5,0	5 386
50-64	na	na	na	na	na	1,0	1,0	0,7	2,1	868
Ensemble 15-64	na	na	na	na	na	2,4	2,4	1,6	4,6	6 254

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

na = Non applicable

1 Y compris tous les hommes ayant déclaré être circoncis, sans tenir compte du prestataire.

Tableau 13.12 Femmes et hommes ayant recherché un traitement contre les IST

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans ayant déclaré avoir une IST ou des symptômes d'IST au cours des 12 derniers mois qui ont recherché des conseils ou un traitement, EDSB-V Bénin 2017-2018

Source de conseils ou traitements	Pourcentage de femmes	Pourcentage d'hommes
Clinique/hôpital/médecin privé/autre professionnel de santé	27,7	28,4
Conseils ou médicaments d'une boutique/pharmacie	7,5	4,1
Conseils ou traitements d'une autre source	4,8	19,2
Pas de conseils ou traitements	61,2	46,0
Effectif avec IST ou symptômes d'IST	1 118	268

IST : Infection sexuellement transmissible

Tableau 13.13 Connaissance « approfondie » du VIH parmi les jeunes

Pourcentage de jeunes femmes et de jeunes hommes de 15-24 ans ayant une connaissance « approfondie » du VIH, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Femme de 15-24 ans		Homme de 15-24 ans	
	Pourcentage ayant eu une connaissance « approfondie » sur le VIH ¹	Effectif de femmes	Pourcentage ayant eu une connaissance « approfondie » sur le VIH ¹	Effectif d'hommes
Groupe d'âges				
15-19	14,1	1 617	14,4	1 548
15-17	11,4	999	11,8	1 006
18-19	18,5	618	19,3	542
20-24	16,1	1 423	24,3	1 118
20-22	14,6	922	23,6	723
23-24	18,8	501	25,6	395
État matrimonial				
Célibataire	16,5	1 746	18,8	2 357
A déjà eu des rapports sexuels	20,9	824	22,9	1 059
N'a jamais eu de rapports sexuels	12,6	922	15,4	1 298
En union	13,1	1 294	17,1	309
Résidence				
Cotonou	25,2	170	30,2	149
Autres villes	19,3	1 120	21,2	940
Ensemble urbain	20,1	1 289	22,5	1 089
Rural	11,3	1 751	15,9	1 577
Niveau d'instruction				
Aucun	8,2	1 049	8,8	619
Primaire	8,9	765	8,6	543
Secondaire 1 ^{er} cycle	20,8	917	19,4	970
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	36,4	309	38,6	534
Ensemble	15,0	3 040	18,6	2 666

¹ Sont considérés comme ayant une connaissance « approfondie », les jeunes qui savent que l'utilisation régulière du condom au cours des rapports sexuels et la limitation des rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et non infecté permettent de réduire les risques de contracter le VIH, ceux qui savent qu'une personne en bonne santé peut néanmoins avoir contracté le VIH et ceux qui rejettent les deux idées locales erronées les plus courantes concernant la transmission ou la prévention du sida. Les composantes de la connaissance « approfondie » sont présentées aux Tableaux 13.2 et 13.3.

Tableau 13.14 Âge aux premiers rapports sexuels parmi les jeunes

Pourcentage de jeunes femmes et de jeunes hommes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans et pourcentage de jeunes femmes et de jeunes hommes de 18-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Femme de 15-24 ans		Femme de 18-24 ans		Homme de 15-24 ans		Homme de 18-24 ans	
	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans	Effectif de femmes de 15-24	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	Effectif de femmes de 18-24	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans	Effectif d'hommes de 15-24	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	Effectif d'hommes de 18-24
Groupe d'âges								
15-19	12,0	3 350	na	na	6,2	1 548	na	na
15-17	11,1	2 097	na	na	5,8	1 006	na	na
18-19	13,4	1 253	63,5	1 253	7,0	542	41,5	542
20-24	12,4	2 923	61,0	2 923	9,5	1 118	38,2	1 118
20-22	12,1	1 913	62,4	1 913	9,0	723	38,3	723
23-24	12,9	1 010	58,2	1 010	10,6	395	38,1	395
Résidence								
Cotonou	5,1	351	46,1	225	14,8	149	48,1	104
Autres villes	10,5	2 280	54,9	1 531	5,9	940	36,7	593
Ensemble urbain	9,8	2 631	53,7	1 756	7,2	1 089	38,4	697
Rural	13,9	3 641	67,5	2 420	7,9	1 577	39,9	963
Niveau d'instruction								
Aucun	17,0	2 186	71,1	1 645	2,9	619	31,1	395
Primaire	12,5	1 516	66,0	895	9,0	543	46,0	297
Secondaire 1 ^{er} cycle	8,8	1 928	56,0	1 118	9,2	970	42,4	518
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	4,9	643	37,0	518	8,7	534	38,5	451
Ensemble	12,2	6 273	61,7	4 176	7,6	2 666	39,3	1 660

na = Non applicable

Tableau 13.15 Rapports sexuels pré-nuptiaux parmi les jeunes

Parmi les femmes et les hommes de 15-24 ans célibataires, pourcentage qui n'ont jamais eu de rapports sexuels, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Femmes de 15-24 ans		Hommes de 15-24 ans	
	Pourcentage n'ayant jamais eu de rapports sexuels	Effectif de femmes célibataires	Pourcentage n'ayant jamais eu de rapports sexuels	Effectif d'hommes célibataires
Groupe d'âges				
15-19	64,1	2 722	71,4	1 538
15-17	73,2	1 933	84,3	1 003
18-19	42,0	789	47,1	535
20-24	21,6	876	24,4	819
20-22	24,2	661	29,2	578
23-24	13,5	215	13,0	241
Résidence				
Cotonou	51,5	271	44,2	145
Autres villes	53,3	1 446	56,0	850
Ensemble urbain	53,0	1 717	54,3	996
Rural	54,5	1 881	55,6	1 361
Niveau d'instruction				
Aucun	55,2	770	61,9	509
Primaire	58,7	902	59,0	472
Secondaire 1 ^{er} cycle	54,7	1 392	58,6	893
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	40,8	534	37,5	483
Ensemble 15-24	53,8	3 598	55,1	2 357

Tableau 13.16.1 Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois parmi les jeunes : Femme

Parmi toutes les jeunes femmes de 15-24 ans, pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois et pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient ; parmi les femmes de 15-24 ans ayant eu plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé pendant les derniers rapports sexuels et pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec un partenaire plus âgé qu'elle d'au moins 10 ans, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Femmes de 15-24 ans			Femmes de 15-24 ans ayant eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois		Femmes de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois	
	Pourcentage ayant eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois avec un partenaire non-marital, non-cohabitant	Effectif de femmes	Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels	Effectif de femmes	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec un partenaire plus âgé qu'elle d'au moins dix ans	Effectif de femmes
Groupe d'âges							
15-19	2,7	26,1	3 350	38,7	91	25,7	873
15-17	2,5	22,3	2 097	(28,7)	52	22,9	468
18-19	3,1	32,3	1 253	(52,2)	39	28,9	405
20-24	2,5	22,0	2 923	23,8	72	26,7	644
20-22	2,7	24,0	1 913	22,6	51	25,2	460
23-24	2,1	18,2	1 010	*	21	30,4	184
État matrimonial							
Célibataire	3,8	39,9	3 598	37,0	138	27,1	1 437
En union	0,9	3,0	2 674	(4,5)	25	9,0	80
Résidence							
Cotonou	4,3	31,7	351	*	15	27,9	111
Autres villes	2,5	26,2	2 280	36,8	56	33,5	598
Ensemble urbain	2,7	27,0	2 631	38,4	71	32,6	710
Rural	2,5	22,2	3 641	27,2	92	20,4	807
Niveau d'instruction							
Aucun	1,9	14,8	2 186	(25,7)	41	15,3	324
Primaire	2,5	22,4	1 516	(20,6)	38	16,1	340
Secondaire 1 ^{er} cycle	2,9	29,7	1 928	47,0	56	30,2	572
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	4,2	43,5	643	(26,9)	27	42,4	280
Ensemble 15-24	2,6	24,2	6 273	32,1	163	26,1	1 516

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 13.16.2 Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois parmi les jeunes : Homme

Parmi tous les jeunes hommes de 15-24 ans, pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois et pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse ni la partenaire avec qui ils vivaient ; parmi les hommes ayant eu plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé pendant les derniers rapports sexuels ; parmi les jeunes hommes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse ni la partenaire avec qui ils vivaient, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels avec ce partenaire, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Hommes de 15-24 ans			Hommes de 15-24 ans ayant eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois		Hommes de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse ni la partenaire avec qui ils vivaient	
	Pourcentage ayant eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois avec un partenaire non-marital, non-cohabitant	Effectif d'hommes	Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels	Effectif d'hommes	Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels avec ce partenaire	Effectif d'hommes
Groupe d'âges							
15-19	3,6	21,5	1 548	26,2	55	27,4	334
15-17	1,7	11,3	1 006	*	17	26,1	114
18-19	7,0	40,6	542	(27,8)	38	28,1	220
20-24	18,1	50,1	1 118	32,2	203	33,2	560
20-22	14,2	47,4	723	34,5	103	31,0	343
23-24	25,4	55,2	395	29,8	100	36,8	218
État matrimonial							
Célibataire	7,9	34,1	2 357	35,8	186	31,6	804
En union	23,4	29,2	309	18,2	72	26,1	90
Résidence							
Cotonou	18,6	39,9	149	(58,5)	28	49,1	60
Autres villes	9,2	31,7	940	35,7	86	45,5	298
Ensemble urbain	10,5	32,9	1 089	41,2	114	46,1	358
Rural	9,1	34,0	1 577	22,8	144	21,0	536
Niveau d'instruction							
Aucun	8,2	29,0	619	8,4	51	12,7	179
Primaire	10,4	32,3	543	26,1	57	23,5	176
Secondaire 1 ^{er} cycle	8,3	31,4	970	30,8	80	32,8	305
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	13,2	43,8	534	51,2	70	48,6	234
Ensemble 15-24	9,7	33,5	2 666	30,9	258	31,1	894

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 13.17 Tests du VIH récents parmi les jeunes

Parmi les jeunes femmes et les jeunes hommes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois, pourcentage ayant été testé pour le VIH au cours des 12 derniers mois et qui ont reçu les résultats du dernier test, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Femmes de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois		Hommes de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	
	Pourcentage ayant effectué un test de dépistage du VIH au cours des 12 derniers mois et ayant reçu les résultats du dernier test	Effectif de femmes	Pourcentage ayant effectué un test de dépistage du VIH au cours des 12 derniers mois et ayant reçu les résultats du dernier test	Effectif d'hommes
Groupe d'âges				
15-19	9,9	697	3,8	340
15-17	5,4	297	1,6	115
18-19	13,2	400	4,9	225
20-24	19,0	1 194	6,3	770
20-22	17,5	756	4,1	447
23-24	21,6	438	9,3	323
État matrimonial				
Célibataire	11,9	707	6,0	804
En union	17,9	1 185	4,3	306
Ensemble 15-24	15,6	1 892	5,5	1 110

Tableau 13.18 Connaissance et couverture de l'autotest de dépistage du VIH

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui ont entendu parler des autotests de dépistage du VIH et pourcentage qui ont utilisé un autotest de dépistage du VIH, selon certaines caractéristiques socio-économiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Femme			Homme		
	A entendu parler de l'autotest du VIH	A utilisé un autotest du VIH	Effectif de femmes	A entendu parler de l'autotest du VIH	A utilisé un autotest du VIH	Effectif d'hommes
Groupe d'âges						
15-19	7,1	1,4	1 617	2,3	0,0	1 548
20-24	8,1	1,5	1 423	4,8	0,2	1 118
25-29	8,7	1,1	1 502	5,5	0,5	1 156
30-34	11,5	1,5	1 028	7,3	1,3	881
35-39	7,9	0,8	933	8,0	1,2	812
40-44	9,6	1,6	607	6,2	0,4	620
45-49	6,5	1,0	595	6,6	0,6	592
Résidence						
Cotonou	18,0	3,9	460	14,3	1,0	390
Autres villes	10,1	1,3	2 843	5,6	0,5	2 487
Ensemble urbain	11,2	1,7	3 303	6,8	0,5	2 877
Rural	6,3	1,0	4 403	4,2	0,5	3 849
Département						
Alibori	5,5	1,1	947	5,0	1,0	917
Atacora	3,4	0,8	614	3,6	0,4	560
Atlantique	10,5	1,1	971	7,6	0,3	822
Borgou	4,8	1,3	890	1,9	0,0	823
Collines	4,4	1,0	588	4,1	0,1	448
Couffo	15,9	2,6	515	17,0	0,8	409
Donga	4,9	0,8	413	2,6	0,7	445
Littoral	18,0	3,9	460	14,3	1,0	390
Mono	14,8	2,0	375	4,6	0,6	354
Ouémé	7,9	0,0	724	2,4	0,6	618
Plateau	13,9	0,7	474	3,2	0,4	340
Zou	5,6	1,3	736	2,8	0,6	600
Niveau d'instruction						
Aucun	5,5	0,6	4 245	2,5	0,1	2 426
Primaire	6,8	1,1	1 547	3,8	0,1	1 562
Secondaire 1 ^{er} cycle	11,9	2,1	1 356	4,5	0,6	1 538
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	27,1	4,5	558	14,1	1,9	1 201
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	3,7	0,7	1 424	3,2	0,2	1 248
Second	5,6	1,0	1 551	4,0	0,2	1 315
Moyen	6,7	0,8	1 422	4,1	0,5	1 282
Quatrième	8,3	1,0	1 574	4,2	0,4	1 317
Le plus élevé	16,3	2,6	1 734	10,1	1,2	1 565
Ensemble 15-49	8,4	1,3	7 706	5,3	0,5	6 727
50-64	na	na	na	5,9	0,2	868
Ensemble 15-64	na	na	na	5,4	0,5	7 595

na = Non applicable

Résultats clés

- **Emploi et type de rémunération** : Parmi les femmes et les hommes de 15-49 ans en union, respectivement 84 % et 99 % avaient travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête. Le pourcentage de femmes non rémunérées pour leur travail est plus élevé que celui des hommes (14 % contre 4 %). Par contre, dans une même proportion, les femmes et les hommes ont été rémunérés en argent uniquement (respectivement 70 % et 71 %).
- **Contrôle de l'utilisation des gains de la femme** : Au Bénin, 73 % des femmes en union qui gagnent de l'argent décident elles-mêmes de son utilisation. Dans 19 % des cas, cette décision est prise conjointement dans le couple mais dans 8 % des cas, c'est le conjoint qui décide principalement de l'utilisation de leurs gains.
- **Participation dans la prise de décision** : Globalement, 36 % des femmes en union ont participé à la prise des trois décisions à savoir : les soins de santé de la femme, les achats importants pour le ménage et les visites à la famille ou parents de la femme. Par contre, 27 % n'ont été impliquées dans la prise d'aucune de ces décisions.
- **Opinions concernant le fait qu'un mari batte sa femme/partenaire** : Parmi les femmes de 15-49 ans, 32 % pensent qu'il est justifié qu'un homme batte sa femme pour au moins une des raisons suivantes : brûle la nourriture, argumente avec lui, sort sans le lui dire, néglige les enfants et refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui. Chez les hommes de 15-49 ans, ce pourcentage est de 16 %.

Ce chapitre est consacré à l'analyse des résultats concernant le pouvoir d'action des femmes en termes d'emploi, de revenus, de gestion de leurs gains. Il aborde aussi les écarts de revenus par rapport à ceux de leurs conjoints. En outre, à partir des réponses des femmes à des questions spécifiques, deux indicateurs différents du pouvoir d'action des femmes ont été élaborés : la participation des femmes dans la prise de décision dans le ménage et l'opinion des femmes sur le fait de battre son épouse/partenaire.

14.1 EMPLOI DES FEMMES ET DES HOMMES EN UNION

Emploi

On considère que les enquêtés ont travaillé s'ils ont effectué n'importe quel travail autre que leur travail domestique au cours des 12 derniers mois.

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans actuellement en union

Rémunération en argent pour le travail effectué

On demande aux enquêtés s'ils sont payés en argent ou en nature pour le travail effectué. Seuls ceux qui ont été payés en argent seulement ou en argent et en nature sont considérés comme ayant gagné de l'argent pour leur travail.

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans actuellement en union ayant travaillé au cours des 12 derniers mois

Au Bénin, un peu plus de huit femmes sur dix (84 %) et la quasi-totalité des hommes (99 %) en union, ont travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête. Les résultats par type de rémunération montrent que le pourcentage de femmes non rémunérées pour leur travail est plus élevé que celui des hommes (14 % contre 4 %). Dans une même proportion, les femmes et les hommes en union ont été rémunérés en argent uniquement (respectivement 70 % et 71 %) (Tableau 14.1) et 14 % des femmes contre 24 % des hommes âgés de 15-49 ans ont été rémunérés en argent et en nature.


Tendances : Entre 2011-2012 et 2017-2018, les pourcentages des femmes et d'hommes en union de 15-49 ans ayant travaillé à n'importe quel moment, au cours des 12 derniers mois, ont augmenté, passant chez les femmes de 74 % à 84 % et, chez les hommes, de 95 % à 99 % sur la période.

Variations par caractéristique

Les variations selon l'âge sont plus importantes chez les femmes que chez les hommes. En effet, de 58 % à 15-19 ans, le pourcentage de femmes ayant travaillé passe à 88 % à 30-34 ans et atteint 93 % à 45-49 ans. Chez les hommes, il n'y a pratiquement pas de variations avec l'âge, le pourcentage s'établissant à 99 %, quel que soit le groupe d'âges (Graphique 14.1, Tableau 14.1).

Graphique 14.1 Emploi par âge

Pourcentage de femmes et d'hommes actuellement en union qui ont travaillé à n'importe quel moment au cours des 12 mois avant l'enquête



14.2 CONTRÔLE DES GAINS DE LA FEMME

Contrôle de l'utilisation de l'argent gagné

On considère que les enquêtés contrôlent l'utilisation de l'argent qu'ils/elles ont gagné s'ils/elles décident, soit seul(e)s, soit ensemble avec leur conjoint de l'utilisation de leur argent.

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans actuellement en union qui ont été payés en argent pour leur travail au cours des 12 derniers mois.

Le contrôle de l'utilisation du revenu de la femme est considéré comme l'un des indicateurs du statut de la femme. En effet, il permet de mesurer son niveau d'autonomie financière. Pour en obtenir une évaluation, on a demandé aux femmes de 15-49 ans, en union, ayant travaillé au cours des 12 derniers mois précédant l'enquête et ayant gagné de l'argent, qui décidait principalement de l'utilisation de l'argent qu'elles avaient gagné.

Globalement, les femmes béninoises en union qui travaillent ont une autonomie financière assez élevée, puisque 73 % d'entre elles décident elles-mêmes de l'utilisation de leurs gains et 19 % décident ensemble avec leur conjoint. Dans la grande majorité des cas, les femmes béninoises participent dans la décision concernant l'utilisation de leurs gains (92 %) (**Tableau 14.2.1**). Par contre, 8 % des femmes ont déclaré que c'est le conjoint qui décide principalement de l'utilisation de leurs gains (**Graphique 14.2**).

Au cours de l'enquête, on a également demandé aux femmes si elles pensent qu'elles gagnent plus, moins ou à peu près la même chose que leurs maris/partenaires. Les résultats montrent qu'environ les trois quarts (76 %) des femmes en union ayant travaillé pensent gagner moins que leurs conjoints, 8 % à peu près la même chose et 7 % ont déclaré qu'elles pensaient gagner plus que leurs conjoints.

Tendances : Entre 2011-2012 et 2017-2018, on note une légère augmentation de la proportion de femmes en union qui décident de l'utilisation de leurs revenus, celle-ci étant passée de 70 % à 73 % au cours de la période. À l'opposé, la proportion de femmes ayant déclaré que le conjoint décidait principalement de l'utilisation de leurs revenus a diminué, passant de 12 % à 8 %.

Variations par caractéristique


- Le pourcentage de femmes ayant un contrôle sur la décision d'utilisation de leurs gains a tendance à augmenter avec le nombre d'enfants vivants, passant de 69 % à la parité 0 à 75 % à la parité 5 ou plus.
- Le milieu de résidence influence aussi leur degré d'autonomie financière puisque 76 % des femmes du milieu urbain décident principalement de l'utilisation de leurs gains contre 72 % en milieu rural.
- On note des écarts importants entre départements, le pourcentage de femmes qui décident principalement de l'utilisation de leurs revenus variant de 93 % dans l'Ouémé à 31 % dans le Couffo.

14.3 CONTRÔLE DES GAINS DE L'HOMME

Au cours de l'EDSB-V, on a aussi demandé aux hommes en union qui avaient été rémunérés en argent qui décidait principalement de l'utilisation de leurs gains. Dans plus des trois quarts des cas (76 %), les hommes ont déclaré qu'ils décident eux-mêmes de l'utilisation de leurs revenus. Toutefois, dans 21 % des cas, les épouses/partenaires sont impliquées dans la décision. Seulement 1 % des hommes laissent la gestion de leurs revenus à leur épouse/partenaire (**Tableau 14.2.2**). Le tableau présente également la répartition des femmes dont le mari/partenaire a gagné de l'argent selon la personne qui décide de l'utilisation des gains de l'homme. Il s'agit donc ici de l'opinion des femmes. On ne note pas de différences importantes entre les déclarations des femmes et des hommes : 74 % des femmes contre 76 % des hommes ont déclaré que la décision d'utilisation des gains de l'homme est prise principalement par l'homme et 20 % des femmes contre 21 %

Graphique 14.2 Contrôle des gains de la femme

Répartition (en %) des femmes actuellement en union qui ont gagné de l'argent au cours des 12 mois avant l'enquête



des hommes ont déclaré que la décision est prise conjointement. Par contre, 7 % des femmes contre 1 % des hommes ont déclaré que c'est la femme qui décide seul de l'utilisation de ses propres gains.

14.4 CONTRÔLE PAR LES FEMMES DE L'UTILISATION DE LEURS PROPRES GAINS ET DE CEUX DE LEUR CONJOINT

Les résultats du **Tableau 14.3** montrent que l'importance des gains de la femme n'influence pas de manière importante sa capacité de décision financière : 76 % des femmes qui pensent gagner plus que leur conjoint décident principalement de l'utilisation de leurs gains contre 75 % quand elles pensent gagner moins. Le fait que le conjoint ne travaille pas ou ne gagne pas d'argent semble affecter davantage la capacité de décision des femmes puisque 84 % des femmes dans cette situation décident principalement de l'utilisation de leurs gains. De même, on ne constate pas non plus que l'importance des gains de la femme influence de manière importante la décision d'utilisation des gains de l'homme, ce dernier ayant le dernier mot que la femme pense gagner plus ou moins que lui. On peut cependant mentionner que quand la femme pense gagner à peu près la même chose que son conjoint, il est plus fréquent que la décision d'utilisation des gains de l'homme soit une décision conjointe (55 %).

14.5 POSSESSION DE BIENS PAR LES FEMMES ET LES HOMMES

Possession d'une maison ou de terres

Enquêtés possédant une maison ou des terres, soit seuls ou conjointement avec quelqu'un d'autre

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans

La possession de certains biens (maisons ou terres) peut conférer une certaine autonomie financière, sociale et peut avoir aussi un effet bénéfique pour les ménages. Pour les femmes, être propriétaires de biens peut renforcer leur autonomie, leur niveau de revenu, voire leur pouvoir d'achat, et aussi leur permettre d'accéder aux instances de décision et les protéger en cas de rupture d'union. On a demandé aux hommes et femmes de 15-49 ans s'ils possédaient des maisons ou des terres, seuls ou avec quelqu'un d'autre.

La grande majorité des femmes de 15-49 ans ont déclaré ne pas posséder de maison (85 %), ni de terres (87 %). Un très faible pourcentage de femmes a déclaré posséder seules des maisons (3 %) et/ou des terres (6 %). Par comparaison, on constate que le pourcentage d'hommes ayant déclaré ne pas posséder de maison est plus faible que celui des femmes (66 % contre 85 %). Près d'un quart des hommes de 15-49 ans possèdent seuls une maison contre seulement 3 % des femmes. De même, il est plus fréquent que les hommes possèdent des terres que les femmes (27 % contre 6 %) (**Tableaux 14.4.1 et 14.4.2**).

Variations par caractéristique

- Que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, le pourcentage possédant seul une propriété augmente avec l'âge, passant chez les femmes de 2 % à 20-24 ans à 9 % à 45-49 ans et, chez les hommes, de respectivement 8 % à 59 %. La tendance est identique pour la possession de terres.
- Pour les hommes, il est plus fréquent de posséder seul une maison ou des terres en milieu rural (respectivement 28 % et 32 %) qu'en milieu urbain (respectivement 19 % et 21 %).
- Chez les hommes, la possession de maison comme de terres, seuls ou en commun, devient moins fréquente au fur et à mesure que le niveau d'instruction augmente. On note la même tendance chez les femmes, mais avec des écarts plus faibles.

14.6 POSSESSION D'UN TITRE DE PROPRIÉTÉ POUR LA MAISON ET LES TERRES

Possession d'un titre de propriété pour une maison ou des terres

Un acte ou un titre de propriété pour la maison ou les terres est disponible et le nom de l'enquêté y figure

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans possédant une maison ou des terres

Au Bénin, il est peu fréquent de posséder un titre de propriété pour une maisons ou des terres et que le nom figure sur le document (Tableaux 14.5.1, 14.5.2, 14.6.1, et 14.6.2).

La possession d'un compte bancaire et d'un téléphone portable peut contribuer à renforcer l'autonomie et l'indépendance financière. Au cours de l'EDSB-V 2017-2018, on a demandé aux enquêtés s'ils utilisaient un compte dans une banque ou dans une institution financière et s'ils possédaient un téléphone portable. À


14.7 POSSESSION ET UTILISATION DE COMPTES BANCAIRES ET DE TÉLÉPHONES PORTABLES

ceux qui possédaient un téléphone portable, on a demandé s'ils l'utilisaient pour effectuer des transactions financières.

Les résultats mettent en évidence des disparités importantes entre les femmes et les hommes (Tableaux 14.7.1 et 14.7.2). Le pourcentage d'hommes qui utilisent un compte dans une banque ou dans une institution financière est deux fois plus élevé que chez les femmes (14 % contre 6 %) (Graphique 14.3). De même, 80 % des hommes contre 51 % des femmes possèdent un téléphone portable. Parmi ceux qui possèdent un téléphone portable, 37 % d'hommes contre 27 % de femmes l'utilisent pour leurs transactions financières.

Graphique 14.3 Possession de biens

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans par possession de biens



Variations selon certaines caractéristiques

- L'utilisation d'un compte bancaire et la possession d'un téléphone portable sont plus répandues en milieu urbain qu'en milieu rural. Par exemple, en milieu urbain, 10 % des femmes utilisent un compte bancaire et 64 % possèdent un téléphone portable contre, respectivement, 4 % et 42 % en milieu rural. On retrouve ce même type de variation chez les hommes (Tableau 14.7.1).
- Que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, les pourcentages de ceux qui utilisent un compte bancaire et qui possèdent un téléphone portable augmentent avec le niveau d'instruction : 87 % des femmes ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus possèdent un téléphone portable et 32 % possèdent et utilisent un compte en banque contre respectivement 43 % et 3 % parmi celles sans niveau d'instruction.
- L'utilisation d'un compte bancaire et la possession d'un téléphone portable varient de manière importante en fonction du niveau de bien-être du ménage, tant chez les femmes que chez les hommes : dans le quintile le plus bas, 1 % des femmes et 3 % des hommes utilisent un compte en banque contre respectivement 36 % et 17 % dans le quintile le plus élevé.

14.8 PARTICIPATION DES FEMMES ET DES HOMMES DANS LA PRISE DE DÉCISION

Participation dans les décisions importantes du ménage

On considère que les femmes participent dans les prises de décision du ménage si elles décident seules ou ensemble avec leurs conjoints sur les trois sujets suivants : (1) les propres soins de santé de la femme, (2) les achats importants du ménage et (3) les visites de la femme à sa famille ou à ses parents.

Échantillon : Femmes de 15-49 ans actuellement en union


Dans le but d'évaluer le rôle et le niveau d'implication des femmes dans les prises de décision au niveau du ménage, des questions ont été posées pour savoir si, l'enquêtée ou une autre personne, avait le dernier mot dans certaines décisions. Trois aspects ont été abordés : les décisions concernant les soins de santé de la femme, les achats importants pour le ménage et les visites à la famille ou parents de la femme.

Dans 67 % des cas, les femmes participent à la décision concernant les visites à leur famille ou à leurs parents et ce type de décision est pris principalement par la femme dans 21 % des cas (**Tableau 14.8** et **Graphique 14.4**). Environ cinq femmes sur dix, soit 46 %, sont impliquées dans la prise de décision concernant leurs propres soins de santé et dans 12 % des cas, elles décident seules. Pour les achats importants du ménage, le pourcentage de femmes associées à la prise de décision est de 47 % et seulement une femme sur dix en décide seule. Globalement, 36 % des femmes en union participent à la prise des 3 décisions et 27 % ne sont impliquées dans aucune de ces décisions (**Tableau 14.9.1**).

Au cours de l'enquête, une question a été posée aux hommes en union pour savoir s'ils participaient à la prise de certaines décisions. Dans la quasi-totalité des cas, les hommes ont participé à la prise de décisions, cela quelle que soit la décision. Par exemple, 97 % des hommes participent à la prise de la décision concernant leurs propres soins de santé et 93 % dans la décision concernant les achats importants du ménage. Seulement 2 % des hommes n'ont été impliqués dans la prise d'aucune décision (**Tableau 14.9.2**).

Graphique 14.4 Participation des femmes dans la prise de décision

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union qui ont participé à la prise de certaines décisions



Variations par caractéristique

- Le pourcentage de femmes ayant participé à la prise des trois décisions est plus élevé en milieu urbain (41 %) qu'en milieu rural (33 %).
- Le pourcentage de femmes impliquées dans la prise des trois décisions est plus élevé dans le département du Mono (56 %) et plus faible dans le département de l'Alibori (18 %).
- Le pourcentage de femmes ayant participé aux trois décisions augmente avec le quintile de bien-être économique passant de 27 % dans le quintile le plus bas à 48 % dans le quintile le plus élevé.

14.9 OPINION CONCERNANT LE FAIT DE BATTRE SON ÉPOUSE/PARTENAIRE

Opinion concernant le fait de battre son épouse/partenaire

On a demandé aux enquêtés s'ils pensaient qu'il est justifié qu'un mari/partenaire batte ou frappe son épouse/partenaire pour chacune des cinq raisons suivantes : elle brûle la nourriture, elle argumente avec lui, elle sort sans le lui dire, elle néglige les enfants, et elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui. Si les enquêtés répondent « oui » pour, au moins, une raison, on considère qu'ils justifient le fait de battre une épouse /partenaire.

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans

Pour évaluer le degré de tolérance vis-à-vis de la violence domestique, on a demandé aux femmes et aux hommes s'ils pensaient qu'il est justifié que, pour certaines raisons citées, un homme batte sa femme/partenaire. Un peu moins du tiers des femmes (32 %) pensent que pour, au moins une des raisons citées, il est justifié qu'un homme batte sa femme. Le pourcentage de femmes justifiant la violence conjugale dans le cas où la femme néglige les enfants est le plus élevé (23 %), suivi de celui où la femme sort sans avertir son mari et elle argumente avec lui (21 % dans les deux cas) (**Tableau 14.10.1**).

Le pourcentage d'hommes qui pensent qu'il est justifié qu'un homme batte sa femme pour, au moins, une des raisons est nettement plus faible que celui observé chez les femmes (16 % contre 32 %) (**Tableau 14.10.2** et **Graphique 14.5**).


Tendances : Entre 2011-2012 et 2017-2018, le pourcentage de femmes justifie le recours à la violence conjugale pour au moins une des raisons citées a doublé, passant de 16 % à 32 %. Chez les hommes, ce pourcentage est demeuré pratiquement le même (15 % en 2011-2012 contre 16 % en 2017-2018).

Variations par caractéristique

- L'opinion selon laquelle il est justifié qu'un homme batte sa femme pour au moins une raison est plus répandue parmi les femmes et les hommes du milieu rural (respectivement 37 % et 19 %) que ceux du milieu urbain (respectivement 25 % et 11 %).
- L'opinion selon laquelle il est justifié que pour, au moins une raison, un homme a le droit de battre sa femme/partenaire varie avec le niveau d'instruction chez les femmes comme chez les hommes. Parmi les femmes sans niveau d'instruction, 37 % justifient le recours à la violence conjugale contre 12 % parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus. Chez les hommes, ces pourcentages sont respectivement de 21 % et 6 %.

Graphique 14.5 Opinions concernant le fait de battre sa femme

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui pensent que, pour certaines raisons, il est justifié qu'un homme batte sa femme



- L'opinion selon laquelle un homme a le droit de battre sa femme/partenaire est moins répandue parmi les femmes et les hommes dont le ménage est classé dans le quintile le plus élevé que dans le plus bas (respectivement 19 % et 7 % contre 38 % et 26 %).

14.10 NÉGOCIATION DE RAPPORTS SEXUELS

Opinions concernant la négociation de rapports sexuels sans risque avec le mari/partenaire

La connaissance des moyens de transmission du VIH se révèle moins utile quand les personnes ne peuvent pas négocier des rapports sexuels sans risque avec leurs partenaires. Pour connaître les opinions concernant la négociation de rapports sexuels à moindre risques avec le mari ou partenaire, on a demandé aux femmes et aux hommes s'ils pensent qu'il est justifié qu'une femme refuse d'avoir des rapports sexuels avec son mari/partenaire si elle sait qu'il a des rapports sexuels avec d'autres femmes ou qu'elle demande à utiliser un condom si elle sait qu'il a une IST.

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans

Au cours de l'enquête, on a demandé aux femmes et aux hommes s'ils pensent qu'il est justifié qu'une femme refuse d'avoir des rapports sexuels avec son mari si elle sait qu'il a des rapports sexuels avec d'autres femmes ou qu'elle demande à utiliser un condom si elle sait qu'il a une IST. Environ deux femmes sur dix (39 %) et près d'un homme sur deux (48 %) pensent qu'il est justifié qu'une femme refuse d'avoir des rapports sexuels avec son mari/partenaire si elle sait qu'il a des relations sexuelles avec d'autres femmes (**Tableau 14.11**). Dans des proportions plus élevées, les femmes et les hommes pensent qu'il est justifié qu'une femme demande à utiliser un condom au cours des rapports sexuels si elle sait que son mari/partenaire a une IST (respectivement 56 % et 70 %).

Variations selon certaines caractéristiques

- Le pourcentage de femmes qui pensent qu'il est justifié qu'une femme refuse d'avoir des rapports sexuels avec son mari/partenaire quand elle sait qu'il a des relations sexuelles avec d'autres femmes est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural (43 % contre 36 %). De même, la proportion de femmes qui pensent qu'il est justifié qu'une femme demande à ce qu'un condom soit utilisé au cours des rapports sexuels si elle sait que son mari/partenaire a une IST est légèrement plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural (60 % contre 53 %). Chez les hommes, on observe ce même type de variations.
- Le pourcentage de femmes qui pensent qu'une femme a le droit de refuser des rapports sexuels avec son mari si elle sait qu'il a des relations sexuelles avec d'autres femmes a tendance à augmenter avec le niveau d'instruction, passant de 32 % parmi celles n'ayant aucun niveau d'instruction à 55 % parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus. De même, le pourcentage de femmes qui pensent qu'il est justifié de demander à utiliser un condom quand le conjoint a une IST passe respectivement de 51 % à 77 %. Chez les hommes, on note également ce même type d'influence.
- Les résultats selon le niveau de bien-être économique montrent que du quintile le plus bas au plus élevé, les pourcentages de femmes qui pensent qu'il est justifié de négocier des rapports sexuels sans risque augmentent, passant pour le refus des rapports sexuels de 25 % à 49 % et pour l'utilisation de condom de 46 % à 69 %. De même, chez les hommes, le pourcentage de ceux qui justifient le refus de rapports sexuels augmente de manière importante du quintile le plus bas au plus élevé, passant de 35 % à 59 %. Concernant l'utilisation de condom dans le cas où l'homme a une IST, on note aussi la même tendance, le pourcentage passant respectivement de 57 % à 81 %.

Capacité à négocier des rapports sexuels avec le mari/partenaire

Pourcentage d'enquêtées qui peuvent refuser des rapports sexuels à leur mari/partenaire quand elles ne souhaitent pas en avoir et pourcentage qui peuvent demander à leur mari/partenaire d'utiliser un condom.

Échantillon : Femmes de 15-49 ans

Pour évaluer la capacité des femmes à négocier des rapports sexuels à moindre risques avec leur mari, on a demandé aux femmes si elles peuvent refuser d'avoir des rapports sexuels avec leur mari si elles ne voulaient pas en avoir. On a aussi demandé aux femmes si elles pouvaient demander à leur conjoint d'utiliser un condom. Dans 57 % des cas, les femmes ont déclaré qu'elles pouvaient refuser des rapports sexuels à leurs mari/partenaires quand elles ne souhaitaient pas en avoir et 40 % ont déclaré qu'elles pouvaient demander à leurs maris/partenaires d'utiliser un préservatif (**Tableau 14.12**).

14.11 INDICATEURS DU POUVOIR D'ACTION DES FEMMES

Le **Tableau 14.13** présente le croisement de deux indicateurs de mesure du pouvoir d'action des femmes, à savoir le nombre de décisions (cf. **Tableau 14.9.1** relatif à la liste des décisions) auxquelles la femme a participé, soit seule, soit en commun avec son conjoint, et le nombre de raisons pour lesquelles la femme pense qu'il est justifié qu'un mari/partenaire batte sa femme. Le premier indicateur reflète le pouvoir décisionnel exercé par la femme dans son environnement proche et dans des domaines qui affectent sa propre vie. Plus le nombre de décisions auxquelles la femme est associée est élevé, ici entre 0 et 3, plus on considère que son niveau d'autonomie est élevé. Le deuxième indicateur mesure le degré d'approbation des femmes concernant le recours à la violence conjugale dans certaines situations (cf. **Tableau 14.10.1**). Les valeurs de cette échelle sont comprises entre 0 et 5. On considère qu'un score élevé indique un niveau d'acceptation élevé de la violence conjugale et est associé à un pouvoir d'action plus faible.

Les données du **Tableau 14.13** font apparaître, une relation positive entre les deux indicateurs du pouvoir d'action des femmes, à savoir que le pourcentage de femmes qui ne justifient pour aucune raison le recours à la violence conjugale augmente avec le nombre de décisions auxquelles la femme a participé, passant de 58 % quand la femme n'a participé à aucune décision à 74 % quand elle a participé aux trois décisions. De même, le pourcentage de femmes ayant participé à la prise de toutes les décisions diminue nettement avec le nombre de raisons justifiant qu'un homme batte sa femme/partenaire, passant de 41 % quand le nombre de raisons est de 0 à 26 % quand ce nombre est de 3-4 et à 28 % quand il est de 5.

Le **Tableau 14.14** présente la répartition des femmes de 15-49 ans selon l'utilisation de méthodes contraceptives en fonction des deux indicateurs du pouvoir d'action des femmes, à savoir le nombre de décisions auxquelles la femme a participé, et le nombre de raisons pour lesquelles la femme pense qu'il est justifié qu'un mari/partenaire batte sa femme.

En ce qui concerne l'utilisation contraceptive, on constate que le pourcentage de femmes utilisatrices augmente légèrement avec le nombre de décisions auxquelles la femme a participé. Le pourcentage passe de 12 % à 18 % pour une méthode et de 10 % à 14 % pour une méthode moderne. Par contre, la relation entre l'utilisation d'une méthode de contraception et le deuxième indicateur est moins nette.

Le **Tableau 14.15** ne met pas en évidence d'association très claire entre le nombre idéal d'enfants et le nombre de décisions auxquelles la femme a participé, le nombre idéal d'enfants variant de 5,6 pour aucune décision à 5,2 quand le nombre de décision est de 3. Par contre, il semble que le nombre idéal d'enfants augmente avec le nombre de raisons justifiant le recours à la violence conjugale, passant de 4,9 quand ne justifient pour aucune raison ce comportement à 5,8 quand elles le tolèrent pour 5 raisons. Concernant les pourcentages de femmes ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, on constate qu'ils diminuent légèrement avec le nombre de décisions, passant de 35 % à 31 % ainsi qu'avec le nombre de raisons justifiant la violence conjugale, passant de 33 % à 31 %.

Par ailleurs, les résultats du **Tableau 14.16** mettent en évidence l'influence de la participation des femmes à la prise de décision sur les indicateurs de santé maternelle ; en effet, les pourcentages de femmes ayant reçu des soins prénatals passent de 82 % quand la femme n'a été associée à la prise d'aucune décision à 89 % quand elle a été impliquée à la prise de 1-2 décisions et à 93 % quand ce nombre est de 3. Concernant le pourcentage de femmes ayant bénéficié d'une assistance à l'accouchement, le pourcentage passe respectivement de 71 % à 84 % et à 88 %. Enfin, le pourcentage de femmes ayant reçu des soins postnatals augmente aussi avec le nombre de décisions, variant de 59 % à 67 % et à 72 %.

Les indicateurs de santé maternelle sont aussi influencés par l'opinion des femmes sur la violence conjugale. Globalement, les pourcentages de femmes ayant bénéficié de ces trois services ont tendance à diminuer avec l'augmentation du nombre de raisons justifiant le recours à la violence conjugale.

Pour des informations sur les indicateurs du pouvoir d'action des femmes, voir (**Tableau 14.13**), et pour des informations sur le planning familial, la santé reproductive, et la mortalité des enfants selon le pouvoir d'action des femmes, voir les **Tableaux 14.14, 14.15, 14.16, et 14.17**.

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur le pouvoir d'action des femmes, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 14.1** **Emploi et type de rémunération des femmes et des hommes actuellement en union**
- **Tableau 14.2.1** **Contrôle de l'utilisation de l'argent gagné par les femmes et importance de l'argent gagné par les femmes par rapport à celui gagné par leur conjoint**
- **Tableau 14.2.2** **Contrôle de l'argent gagné par les hommes**
- **Tableau 14.3** **Contrôle par les femmes de l'utilisation de leurs propres gains et contrôle de l'utilisation des gains de leur mari/partenaire**
- **Tableau 14.4.1** **Possession de biens : Femme**
- **Tableau 14.4.2** **Possession de biens : Homme**
- **Tableau 14.5.1** **Possession d'un titre de propriété pour une maison : Femme**
- **Tableau 14.5.2** **Possession d'un titre de propriété pour une maison : Homme**
- **Tableau 14.6.1** **Possession d'un titre de propriété pour des terres : Femme**
- **Tableau 14.6.2** **Possession d'un titre de propriété pour des terres : Homme**
- **Tableau 14.7.1** **Possession et utilisation de comptes bancaires et de téléphones portables : Femme**
- **Tableau 14.7.2** **Possession et utilisation de comptes bancaires et de téléphones portables : Homme**
- **Tableau 14.8** **Participation dans la prise de décision**
- **Tableau 14.9.1** **Participation des femmes dans la prise de décision selon certaines caractéristiques sociodémographiques**
- **Tableau 14.9.2** **Participation des hommes dans la prise de décision selon certaines caractéristiques sociodémographiques**
- **Tableau 14.10.1** **Opinion des femmes concernant le fait qu'un mari batte sa femme**
- **Tableau 14.10.2** **Opinion des hommes concernant le fait qu'un mari batte sa femme**
- **Tableau 14.11** **Opinions concernant la négociation de rapports sexuels sans risque avec le mari/partenaire**
- **Tableau 14.12** **Capacité des femmes à négocier les rapports sexuels avec leur mari/partenaire**
- **Tableau 14.13** **Indicateurs du pouvoir d'action des femmes**
- **Tableau 14.14** **Utilisation actuelle de la contraception selon les indicateurs du pouvoir d'action des femmes**
- **Tableau 14.15** **Nombre idéal d'enfants et besoins non satisfaits en matière de planification familiale selon certains indicateurs du pouvoir d'action des femmes**

- **Tableau 14.16** Soins de santé maternelle, selon les indicateurs du pouvoir d'action des femmes
- **Tableau 14.17** Mortalité des enfants de moins de cinq ans selon certains indicateurs du pouvoir d'action des femmes

Tableau 14.1 Emploi et type de rémunération des femmes et des hommes actuellement en union

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans, actuellement en union, ayant travaillé à n'importe quel moment, au cours des 12 derniers mois et répartition (en %) des femmes et des hommes actuellement en union et ayant travaillé au cours des 12 derniers mois par type de rémunération, selon l'âge, EDSB-V Bénin 2017-2018

Groupe d'âges	Parmi les enquêtés actuellement en union :		Répartition des enquêtés actuellement en union ayant travaillé au cours des 12 derniers mois par type de rémunération					Effectif d'enquêtés
	Pourcentage ayant travaillé au cours des 12 derniers mois	Effectif d'enquêtés	Argent uniquement	Argent et en nature	En nature seulement	Non rémunéré	Total	
FEMME								
15-19	58,4	618	51,2	11,2	3,3	34,3	100,0	361
20-24	73,2	1 966	65,0	12,7	1,7	20,6	100,0	1 440
25-29	84,3	2 658	72,6	13,1	0,8	13,4	100,0	2 240
30-34	88,4	2 035	71,8	14,6	1,2	12,5	100,0	1 798
35-39	90,3	1 706	73,9	14,5	1,3	10,3	100,0	1 540
40-44	93,8	1 166	70,9	17,6	1,4	10,1	100,0	1 094
45-49	93,2	1 020	71,3	16,3	0,9	11,5	100,0	951
Ensemble 15-49	84,4	11 168	70,3	14,3	1,3	14,0	100,0	9 424
HOMME								
15-19	*	9	*	*	*	*	*	9
20-24	99,2	284	66,4	25,5	0,9	7,3	100,0	281
25-29	99,6	735	72,3	23,3	0,3	4,1	100,0	732
30-34	99,3	777	75,5	21,2	0,4	2,9	100,0	772
35-39	99,7	754	68,8	27,3	0,7	3,1	100,0	752
40-44	99,1	574	72,4	23,9	0,1	3,5	100,0	569
45-49	99,2	543	68,9	26,6	0,6	3,9	100,0	539
Ensemble 15-49	99,4	3 675	71,3	24,4	0,5	3,8	100,0	3 653
50-64	93,8	782	61,3	34,1	0,8	3,7	100,0	734
Ensemble 15-64	98,4	4 457	69,6	26,1	0,5	3,8	100,0	4 387

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 14.2.1 Contrôle de l'utilisation de l'argent gagné par les femmes et importance de l'argent gagné par les femmes par rapport à celui gagné par leur conjoint

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans, actuellement en union, qui ont gagné de l'argent pour leur travail au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête en fonction de la personne qui décide comment est utilisé l'argent gagné par la femme et répartition selon que les femmes gagnent plus ou moins que leur conjoint selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Personne qui décide comment est utilisé l'argent gagné par la femme :					Gains de la femme par rapport à ceux du conjoint :						Effectif de femmes
	Principalement la femme	Femme et conjoint ensemble	Principalement le conjoint	Autre	Total	Plus que le conjoint	Moins que le conjoint	A peu près la même chose	Le conjoint ne gagne pas d'argent	Ne sait pas	Total	
Groupe d'âges												
15-19	69,3	17,8	10,6	2,4	100,0	3,4	90,2	2,5	1,1	2,8	100,0	225
20-24	69,4	20,2	9,9	0,5	100,0	6,1	80,0	6,8	0,8	6,2	100,0	1 119
25-29	72,0	20,2	7,6	0,2	100,0	4,3	80,0	6,9	1,3	7,5	100,0	1 921
30-34	73,9	18,3	7,8	0,0	100,0	6,2	77,5	7,6	0,9	7,9	100,0	1 553
35-39	72,6	18,8	8,6	0,0	100,0	8,8	73,6	7,9	1,4	8,3	100,0	1 360
40-44	77,6	15,8	6,6	0,0	100,0	9,8	71,9	8,6	1,6	8,0	100,0	968
45-49	77,9	16,3	5,8	0,0	100,0	12,6	66,8	9,1	1,5	9,9	100,0	833
Nombre d'enfants vivants												
0	69,4	21,7	7,3	1,6	100,0	6,7	81,6	6,6	0,3	4,9	100,0	372
1-2	71,3	20,0	8,4	0,2	100,0	5,8	78,6	7,4	1,3	6,9	100,0	2 506
3-4	74,0	17,9	8,0	0,1	100,0	6,3	76,6	7,4	1,0	8,8	100,0	2 750
5+	75,3	17,3	7,4	0,0	100,0	9,8	72,9	7,9	1,6	7,7	100,0	2 350
Résidence												
Cotonou	78,8	16,3	4,7	0,2	100,0	4,9	77,2	5,1	1,3	11,5	100,0	436
Autres villes	75,5	18,7	5,8	0,0	100,0	6,8	74,6	8,2	1,2	9,2	100,0	2 899
Ensemble urbain	75,9	18,4	5,6	0,1	100,0	6,6	74,9	7,8	1,3	9,5	100,0	3 335
Rural	71,5	18,7	9,5	0,3	100,0	7,7	77,4	7,3	1,2	6,4	100,0	4 643
Département												
Alibori	85,1	1,4	13,4	0,1	100,0	11,0	86,8	1,6	0,0	0,5	100,0	802
Atacora	86,7	7,7	5,7	0,0	100,0	4,5	61,3	15,9	6,8	11,5	100,0	397
Atlantique	76,0	21,3	2,7	0,1	100,0	8,2	75,7	8,3	0,8	6,9	100,0	1 066
Borgou	76,6	10,4	12,7	0,3	100,0	6,6	78,5	5,6	0,4	8,9	100,0	860
Collines	71,0	19,5	9,0	0,5	100,0	7,8	78,9	10,9	0,8	1,6	100,0	601
Couffo	30,9	56,3	12,5	0,4	100,0	10,0	76,0	5,6	0,3	8,1	100,0	640
Donga	87,6	7,1	5,1	0,2	100,0	3,0	77,5	1,8	5,7	12,1	100,0	373
Littoral	78,8	16,3	4,7	0,2	100,0	4,9	77,2	5,1	1,3	11,5	100,0	436
Mono	73,0	22,2	4,7	0,1	100,0	9,0	72,0	11,6	0,3	7,2	100,0	457
Ouémé	92,9	4,3	2,7	0,0	100,0	4,2	72,4	4,0	0,7	18,6	100,0	890
Plateau	70,7	20,6	8,3	0,5	100,0	7,1	74,4	12,7	2,6	3,2	100,0	609
Zou	55,4	33,8	10,8	0,0	100,0	6,9	77,9	10,6	0,0	4,6	100,0	846
Niveau d'instruction												
Aucun	72,9	17,8	9,2	0,2	100,0	7,4	77,2	7,2	1,3	6,9	100,0	5 157
Primaire	75,0	19,2	5,6	0,2	100,0	6,5	75,1	7,9	1,0	9,5	100,0	1 545
Secondaire 1 ^{er} cycle	73,8	19,3	6,5	0,4	100,0	7,3	75,4	7,3	1,1	8,9	100,0	919
Secondaire 2 ^e cycle ou plus	71,5	25,5	2,9	0,0	100,0	6,6	73,2	11,2	0,5	8,5	100,0	357
Quintiles de bien-être économique												
Le plus bas	72,9	15,7	11,0	0,4	100,0	7,4	77,4	7,3	1,3	6,5	100,0	1 231
Second	69,0	19,8	11,0	0,2	100,0	9,6	76,0	7,3	1,1	6,0	100,0	1 447
Moyen	73,1	18,0	8,6	0,2	100,0	6,9	76,0	8,3	1,9	7,0	100,0	1 669
Quatrième	74,7	19,0	6,2	0,2	100,0	7,5	76,3	7,8	0,6	7,8	100,0	1 828
Le plus élevé	75,9	19,7	4,3	0,1	100,0	5,1	76,4	6,9	1,2	10,4	100,0	1 803
Ensemble	73,3	18,6	7,9	0,2	100,0	7,2	76,4	7,5	1,2	7,7	100,0	7 978

Tableau 14.2.2 Contrôle de l'argent gagné par les hommes

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans actuellement en union qui ont été rémunérés en argent et répartition (en %) des femmes de 15-49 ans actuellement en union dont le mari/partenaire a été rémunéré en argent, en fonction de la personne qui décide comment est utilisé l'argent gagné par le mari/partenaire, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Homme						Femme					
	Personne qui décide comment est utilisé l'argent gagné par l'homme :						Personne qui décide comment est utilisé l'argent gagné par l'homme :					
	Principalement la femme	Femme et mari/partenaire ensemble	Principalement l'homme	Autre	Total	Effectif d'hommes	Principalement la femme	Femme et mari/partenaire ensemble	Principalement l'homme	Autre	Total	Effectif de femmes
Groupe d'âges												
15-19	*	*	*	*	100,0	7	4,9	18,2	75,2	1,7	100,0	607
20-24	1,6	19,5	70,2	8,7	100,0	258	6,1	18,8	74,7	0,4	100,0	1 946
25-29	1,1	21,3	72,7	4,8	100,0	699	5,3	19,6	75,0	0,1	100,0	2 626
30-34	0,9	18,3	78,6	2,2	100,0	746	6,2	19,7	74,0	0,2	100,0	2 018
35-39	1,3	19,6	78,7	0,4	100,0	723	7,0	20,4	72,6	0,0	100,0	1 682
40-44	1,6	20,2	77,9	0,3	100,0	548	7,9	19,3	72,6	0,1	100,0	1 148
45-49	1,5	24,8	73,4	0,3	100,0	515	10,3	21,2	68,5	0,0	100,0	1 003
Nombre d'enfants vivants												
0	0,7	20,6	73,3	5,5	100,0	236	6,6	20,2	72,9	0,3	100,0	680
1-2	1,1	20,2	74,4	4,3	100,0	1 035	5,8	20,2	73,5	0,5	100,0	3 771
3-4	1,3	21,2	76,4	1,1	100,0	951	6,8	18,9	74,2	0,1	100,0	3 529
5+	1,5	20,2	77,5	0,9	100,0	1 274	7,2	19,6	73,2	0,1	100,0	3 050
Résidence												
Cotonou	1,6	21,5	76,9	0,0	100,0	178	8,7	22,1	69,1	0,2	100,0	544
Autres villes	1,1	17,3	80,5	1,1	100,0	1 268	6,9	19,0	74,0	0,1	100,0	3 833
Ensemble urbain	1,2	17,8	80,0	1,0	100,0	1 446	7,2	19,4	73,4	0,1	100,0	4 377
Rural	1,4	22,4	73,1	3,2	100,0	2 050	6,2	19,8	73,7	0,3	100,0	6 653
Département												
Alibori	0,4	7,1	79,6	12,8	100,0	486	7,0	10,4	82,6	0,0	100,0	1 548
Atacora	0,2	31,2	68,3	0,3	100,0	282	6,1	25,6	68,1	0,2	100,0	848
Atlantique	2,0	35,3	61,7	0,9	100,0	440	4,7	19,8	75,3	0,2	100,0	1 299
Borgou	1,2	29,5	68,9	0,4	100,0	486	5,7	9,8	84,1	0,4	100,0	1 377
Collines	0,0	25,4	73,9	0,7	100,0	230	6,0	25,7	67,3	0,9	100,0	731
Couffo	0,0	28,6	70,2	1,2	100,0	217	3,2	33,9	62,7	0,1	100,0	737
Donga	1,1	21,4	77,6	0,0	100,0	150	5,2	10,2	84,5	0,2	100,0	690
Littoral	1,6	21,5	76,9	0,0	100,0	178	8,7	22,1	69,1	0,2	100,0	544
Mono	3,7	14,5	81,2	0,5	100,0	154	6,1	23,6	70,2	0,0	100,0	513
Ouémé	2,1	2,1	95,7	0,0	100,0	343	6,0	6,4	87,5	0,0	100,0	975
Plateau	0,6	11,2	87,2	1,0	100,0	216	10,7	24,8	64,5	0,0	100,0	691
Zou	2,7	16,1	80,5	0,7	100,0	314	10,3	38,2	51,1	0,5	100,0	1 078
Niveau d'instruction												
Aucun	0,9	17,8	77,2	4,1	100,0	1 602	6,7	18,6	74,6	0,2	100,0	7 319
Primaire	1,8	24,2	73,4	0,5	100,0	887	6,8	20,7	72,3	0,1	100,0	1 957
Secondaire 1 ^{er} cycle	1,4	21,9	75,4	1,3	100,0	514	6,4	21,1	71,9	0,6	100,0	1 276
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	1,4	21,1	77,2	0,2	100,0	493	4,7	27,3	67,9	0,1	100,0	478
Quintiles de bien-être économique												
Le plus bas	1,2	22,2	72,2	4,5	100,0	725	5,3	14,5	79,9	0,3	100,0	2 135
Second	0,5	23,2	71,6	4,7	100,0	674	7,4	19,0	73,2	0,4	100,0	2 195
Moyen	1,7	22,0	75,3	1,0	100,0	623	6,4	21,5	72,0	0,2	100,0	2 189
Quatrième	1,8	19,8	77,2	1,1	100,0	690	7,8	21,5	70,5	0,2	100,0	2 312
Le plus élevé	1,3	16,0	82,6	0,1	100,0	783	5,8	21,4	72,6	0,1	100,0	2 199
Ensemble 15-49	1,3	20,5	76,0	2,3	100,0	3 496	6,6	19,6	73,6	0,2	100,0	11 030
50-64	0,7	23,3	75,7	0,2	100,0	700	na	na	na	na	na	na
Ensemble 15-64	1,2	21,0	75,9	1,9	100,0	4 196	na	na	na	na	na	na

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
na = Non applicable

Tableau 14.3 Contrôle par les femmes de l'utilisation de leurs propres gains et contrôle de l'utilisation des gains de leur mari/partenaire

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans actuellement en union ayant gagné de l'argent au cours des 12 derniers mois en fonction de la personne qui décide comment est utilisé l'argent gagné par la femme et répartition (en %) des femmes de 15-49 ans actuellement en union dont le mari/partenaire a gagné de l'argent en fonction de la personne qui décide comment est utilisé l'argent gagné par le mari/partenaire, selon l'importance des gains de la femme par rapport à ceux de son mari/partenaire, EDSB-V Bénin 2017-2018

Gains de la femme par rapport à ceux de son mari/partenaire	Personne qui décide comment est utilisé l'argent gagné par la femme :					Effectif de femmes	Personne qui décide comment est utilisé l'argent gagné par le mari-partenaire :					Effectif de femmes
	Principalement la femme	Femme et mari/partenaire ensemble	Principalement le mari/partenaire	Autre	Total		Principalement la femme	Femme et mari/partenaire ensemble	Principalement le mari/partenaire	Autre	Total	
Plus que son mari/partenaire	75,5	17,5	7,0	0,0	100,0	575	19,6	19,2	60,9	0,3	100,0	575
Moins que son mari/partenaire	74,5	16,3	8,9	0,2	100,0	6 093	5,5	18,6	75,8	0,1	100,0	6 093
À peu près la même chose	50,6	46,6	2,8	0,1	100,0	599	4,6	55,1	40,3	0,0	100,0	599
Conjoint n'a pas gagné d'argent ou n'a pas travaillé	83,6	11,2	5,2	0,0	100,0	94	na	na	na	na	na	na
La femme a travaillé mais n'a pas gagné d'argent	na	na	na	na	na	0	8,5	18,4	72,5	0,7	100,0	1 421
La femme n'a pas travaillé	na	na	na	na	na	0	4,2	13,7	81,8	0,3	100,0	1 728
Ensemble ¹	73,3	18,6	7,9	0,2	100,0	7 978	6,6	19,6	73,6	0,2	100,0	11 030

na = Non applicable

¹ Y compris les cas où la femme ne sait pas si elle a gagné plus ou moins que son mari/partenaire.

Tableau 14.4.1 Possession de biens : Femme

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans par possession de maison ou de terres, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage possédant une maison :			Pourcentage ne possédant pas de maison	Total	Pourcentage possédant des terres :			Pourcentage ne possédant pas de terre	Total	Effectif de femmes
	Seule	En commun	Seule et en commun			Seule	En commun	Seule et en commun			
Groupe d'âges											
15-19	0,9	3,2	0,9	95,0	100,0	1,2	1,5	0,3	97,0	100,0	3 350
20-24	1,6	7,2	2,1	89,1	100,0	3,7	4,9	1,0	90,5	100,0	2 923
25-29	2,5	10,3	2,3	84,9	100,0	4,8	7,2	1,2	86,9	100,0	2 986
30-34	3,1	12,0	2,9	82,0	100,0	6,2	9,3	1,1	83,5	100,0	2 202
35-39	5,0	14,4	2,8	77,8	100,0	9,1	9,1	1,2	80,6	100,0	1 882
40-44	6,3	15,8	3,2	74,7	100,0	11,4	9,4	1,4	77,8	100,0	1 320
45-49	9,0	15,5	2,9	72,7	100,0	12,6	8,1	1,2	78,1	100,0	1 265
Résidence											
Cotonou	3,0	8,2	3,9	84,9	100,0	3,6	2,3	0,5	93,6	100,0	958
Autres villes	2,4	7,9	1,9	87,9	100,0	4,6	4,5	0,6	90,3	100,0	5 803
Ensemble urbain	2,5	8,0	2,1	87,4	100,0	4,4	4,2	0,6	90,8	100,0	6 761
Rural	3,7	11,2	2,3	82,7	100,0	6,6	7,9	1,2	84,2	100,0	9 167
Département											
Alibori	1,4	19,5	1,0	78,1	100,0	2,1	8,8	0,1	89,1	100,0	1 878
Atacora	1,7	11,6	1,7	85,0	100,0	2,1	9,7	0,4	87,8	100,0	1 302
Atlantique	2,4	3,4	0,4	93,8	100,0	5,6	2,4	0,1	91,9	100,0	2 037
Borgou	6,3	6,3	0,2	87,3	100,0	16,9	4,6	0,5	78,0	100,0	1 839
Collines	2,9	15,5	0,8	80,8	100,0	5,7	13,7	1,4	79,3	100,0	1 151
Couffo	1,3	1,5	0,0	97,2	100,0	4,6	0,7	0,2	94,5	100,0	1 041
Donga	0,3	22,8	1,9	75,0	100,0	1,3	21,1	0,7	76,8	100,0	881
Littoral	3,0	8,2	3,9	84,9	100,0	3,6	2,3	0,5	93,6	100,0	958
Mono	3,6	10,7	2,2	83,5	100,0	6,5	7,5	0,9	85,0	100,0	759
Ouémé	1,1	2,8	0,1	96,1	100,0	1,6	1,4	0,3	96,7	100,0	1 507
Plateau	2,6	14,6	8,0	74,8	100,0	6,7	8,7	2,5	82,2	100,0	970
Zou	9,1	7,9	9,2	73,8	100,0	7,4	3,0	4,5	85,1	100,0	1 606
Niveau d'instruction											
Aucun	3,9	12,9	2,4	80,8	100,0	7,4	8,7	1,1	82,8	100,0	8 785
Primaire	2,4	7,3	2,2	88,1	100,0	4,2	4,5	0,9	90,4	100,0	3 148
Secondaire 1 ^{er} cycle	2,1	5,6	2,0	90,3	100,0	2,5	3,0	0,9	93,6	100,0	2 847
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	2,3	4,4	1,7	91,6	100,0	4,1	1,9	0,6	93,4	100,0	1 147
Quintiles de bien-être économique											
Le plus bas	3,6	13,9	1,6	80,9	100,0	8,1	10,0	0,8	81,2	100,0	2 735
Second	3,8	12,8	2,4	81,0	100,0	6,6	8,6	1,4	83,5	100,0	3 030
Moyen	2,5	9,7	2,5	85,3	100,0	5,9	6,8	1,0	86,3	100,0	3 104
Quatrième	3,0	7,9	2,5	86,6	100,0	4,5	4,9	1,0	89,6	100,0	3 405
Le plus élevé	3,1	6,3	2,1	88,4	100,0	4,1	2,7	0,7	92,5	100,0	3 654
Ensemble	3,2	9,8	2,2	84,7	100,0	5,7	6,3	1,0	87,0	100,0	15 928

Tableau 14.4.2 Possession de biens : Homme

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans par possession de maison ou de terres, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage possédant une maison :			Pourcentage ne possédant pas de maison	Total	Pourcentage possédant des terres :			Pourcentage ne possédant pas de terres	Total	Effectif d'hommes
	Seul	En commun	Seul et en commun			Seul	En commun	Seul et en commun			
Groupe d'âges											
15-19	1,0	2,9	3,6	92,5	100,0	2,3	3,2	3,5	91,0	100,0	1 548
20-24	7,7	4,2	4,7	83,5	100,0	11,5	4,3	4,7	79,4	100,0	1 118
25-29	19,3	7,5	4,4	68,8	100,0	26,1	7,1	4,0	62,9	100,0	1 156
30-34	31,4	7,0	4,7	57,0	100,0	37,6	5,5	4,8	52,2	100,0	881
35-39	42,1	8,7	3,1	46,2	100,0	44,6	5,7	4,3	45,4	100,0	812
40-44	52,7	7,2	4,8	35,3	100,0	52,6	6,5	4,1	36,8	100,0	620
45-49	58,8	10,5	4,0	26,6	100,0	56,6	5,8	4,0	33,6	100,0	592
Résidence											
Cotonou	7,6	3,9	0,7	87,8	100,0	9,7	2,5	0,3	87,5	100,0	390
Autres villes	20,9	4,8	4,0	70,3	100,0	22,3	3,8	3,7	70,2	100,0	2 487
Ensemble urbain	19,1	4,7	3,5	72,7	100,0	20,6	3,6	3,3	72,5	100,0	2 877
Rural	27,7	7,3	4,6	60,3	100,0	31,9	6,4	4,8	56,9	100,0	3 849
Département											
Alibori	28,9	13,6	2,3	55,2	100,0	26,7	15,7	3,1	54,5	100,0	917
Atacora	31,4	1,4	31,5	35,7	100,0	34,1	1,3	30,6	34,1	100,0	560
Atlantique	14,5	15,1	1,4	69,1	100,0	17,6	6,5	1,9	74,0	100,0	822
Borgou	29,5	7,1	2,9	60,6	100,0	41,0	8,4	2,6	48,0	100,0	823
Collines	32,4	3,3	0,0	64,4	100,0	50,0	1,6	0,0	48,4	100,0	448
Couffo	33,8	9,2	4,1	52,9	100,0	35,0	8,7	5,2	51,1	100,0	409
Donga	31,9	2,0	0,6	65,6	100,0	37,6	0,8	0,2	61,4	100,0	445
Littoral	7,6	3,9	0,7	87,8	100,0	9,7	2,5	0,3	87,5	100,0	390
Mono	15,4	6,1	1,2	77,3	100,0	13,5	2,4	0,7	83,3	100,0	354
Ouémé	15,4	0,5	3,2	80,9	100,0	4,5	1,4	2,2	91,9	100,0	618
Plateau	32,6	0,7	0,0	66,7	100,0	33,1	0,3	0,5	66,1	100,0	340
Zou	16,5	0,2	0,0	83,3	100,0	23,9	0,3	0,0	75,9	100,0	600
Niveau d'instruction											
Aucun	34,5	7,3	5,5	52,7	100,0	37,5	7,2	5,8	49,5	100,0	2 426
Primaire	27,6	7,6	3,1	61,7	100,0	28,9	4,6	3,5	63,0	100,0	1 562
Secondaire 1 ^{er} cycle	13,3	3,8	4,4	78,5	100,0	16,7	3,3	4,0	76,1	100,0	1 538
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	12,0	5,2	2,4	80,3	100,0	16,8	4,5	1,8	76,9	100,0	1 201
Quintiles de bien-être économique											
Le plus bas	35,1	9,3	6,9	48,7	100,0	36,0	8,9	7,5	47,6	100,0	1 248
Second	28,0	6,4	5,8	59,8	100,0	33,8	5,5	5,4	55,3	100,0	1 315
Moyen	26,5	6,2	3,6	63,8	100,0	30,2	5,3	4,4	60,1	100,0	1 282
Quatrième	20,2	6,8	3,5	69,6	100,0	23,9	4,5	2,9	68,8	100,0	1 317
Le plus élevé	13,1	3,2	1,6	82,1	100,0	14,4	2,4	1,2	81,9	100,0	1 565
Ensemble 15-49	24,0	6,2	4,1	65,6	100,0	27,1	5,2	4,1	63,6	100,0	6 727
50-64	65,4	6,7	5,2	22,7	100,0	59,5	6,2	4,3	30,0	100,0	868
Ensemble 15-64	28,8	6,3	4,3	60,7	100,0	30,8	5,3	4,2	59,8	100,0	7 595

Tableau 14.5.1 Possession d'un titre de propriété pour une maison : Femme

Parmi les femmes de 15-49 ans qui possèdent une maison, répartition (en %) selon que la maison possédée a un titre de propriété et selon que le nom de la femme figure, ou non, sur le titre, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	La maison a un titre de propriété et :				Total	Effectif de femmes possédant une maison ²
	Le nom de la femme figure sur le titre	Le nom de la femme ne figure pas sur le titre	N'a pas de titre de propriété	Ne sait pas/ manquant ¹		
Groupe d'âges						
15-19	2,4	14,5	76,9	6,3	100,0	168
20-24	2,6	15,0	74,6	7,8	100,0	320
25-29	7,8	11,5	74,9	5,7	100,0	451
30-34	14,5	13,5	66,6	5,4	100,0	397
35-39	16,1	14,8	64,0	5,1	100,0	418
40-44	16,2	8,8	72,6	2,4	100,0	334
45-49	24,8	7,4	64,4	3,3	100,0	346
Résidence						
Cotonou	9,9	14,6	69,1	6,4	100,0	145
Autres villes	18,8	10,6	65,0	5,5	100,0	705
Ensemble urbain	17,3	11,3	65,7	5,7	100,0	850
Rural	10,5	12,6	72,2	4,7	100,0	1 583
Département						
Alibori	4,5	21,2	73,0	1,4	100,0	412
Atacora	5,2	4,6	89,8	0,4	100,0	195
Atlantique	36,7	18,3	34,7	10,3	100,0	125
Borgou	12,3	11,0	59,5	17,3	100,0	234
Collines	7,7	6,7	84,5	1,1	100,0	221
Couffo	(20,8)	(7,7)	(71,5)	(0,0)	100,0	29
Donga	0,6	14,6	81,7	3,2	100,0	221
Littoral	9,9	14,6	69,1	6,4	100,0	145
Mono	59,7	3,4	36,1	0,8	100,0	126
Ouémé	31,1	9,9	56,7	2,3	100,0	59
Plateau	20,2	10,6	59,7	9,6	100,0	245
Zou	6,6	10,3	78,6	4,5	100,0	421
Niveau d'instruction						
Aucun	10,8	11,7	72,3	5,2	100,0	1 686
Primaire	15,2	10,3	68,8	5,7	100,0	376
Secondaire 1 ^{er} cycle	16,8	15,1	64,7	3,4	100,0	275
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	29,0	18,4	47,6	5,0	100,0	96
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	6,4	8,9	79,2	5,4	100,0	522
Second	7,5	10,7	74,9	7,0	100,0	575
Moyen	9,7	14,7	72,7	2,9	100,0	456
Quatrième	17,0	12,8	65,1	5,2	100,0	455
Le plus élevé	27,0	14,6	54,2	4,2	100,0	424
Ensemble	12,8	12,1	70,0	5,1	100,0	2 433

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

¹ Y compris les femmes qui ont une maison avec un titre/acte de propriété, mais qui ne savent pas si leur nom est sur le titre/acte (ou cette information est manquante) et les femmes qui ne savent pas s'il y a un acte/titre de propriété pour la maison (ou cette information est manquante)

² Y compris les femmes qui possèdent une maison seules, en commun ou seules et en commun.

Tableau 14.5.2 Possession d'un titre de propriété pour une maison : Homme

Parmi les hommes de 15-49 ans qui possèdent une maison, répartition (en %) selon que la maison possédée a un titre de propriété et selon que le nom de l'homme figure, ou non, sur le titre, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	La maison a un titre de propriété et :				Total	Effectif d'hommes possédant une maison ²
	Le nom de l'homme figure sur le titre	Le nom de l'homme ne figure pas sur le titre	N'a pas de titre de propriété	Ne sait pas/ manquant ¹		
Groupe d'âges						
15-19	0,8	2,7	89,1	7,4	100,0	117
20-24	2,8	4,7	91,9	0,6	100,0	185
25-29	8,1	2,3	88,6	1,0	100,0	361
30-34	17,4	3,1	78,6	0,8	100,0	379
35-39	19,6	2,3	77,7	0,4	100,0	437
40-44	27,9	2,7	69,4	0,0	100,0	401
45-49	25,6	4,8	69,3	0,4	100,0	434
Résidence						
Cotonou	37,0	14,2	48,2	0,6	100,0	47
Autres villes	27,8	3,3	67,4	1,5	100,0	739
Ensemble urbain	28,4	4,0	66,2	1,4	100,0	786
Rural	12,2	2,8	84,4	0,6	100,0	1 527
Département						
Alibori	3,9	3,0	92,8	0,3	100,0	410
Atacora	2,5	2,1	93,1	2,3	100,0	360
Atlantique	24,4	3,5	72,0	0,0	100,0	254
Borgou	7,4	2,8	89,0	0,8	100,0	324
Collines	12,9	2,2	84,9	0,0	100,0	160
Couffo	44,2	2,5	52,3	1,1	100,0	193
Donga	9,6	1,8	88,6	0,0	100,0	153
Littoral	37,0	14,2	48,2	0,6	100,0	47
Mono	41,7	9,2	49,0	0,0	100,0	80
Ouémé	43,4	1,0	50,9	4,7	100,0	118
Plateau	22,3	3,6	74,1	0,0	100,0	113
Zou	50,7	5,2	44,1	0,0	100,0	100
Niveau d'instruction						
Aucun	11,7	2,3	85,3	0,7	100,0	1 148
Primaire	21,7	2,9	75,1	0,3	100,0	598
Secondaire 1 ^{er} cycle	21,4	4,0	73,1	1,6	100,0	331
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	31,8	7,2	59,4	1,7	100,0	237
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	4,0	2,3	93,0	0,7	100,0	640
Second	11,8	2,6	85,2	0,4	100,0	528
Moyen	13,4	3,5	82,6	0,5	100,0	464
Quatrième	26,5	4,2	68,1	1,2	100,0	400
Le plus élevé	55,0	4,3	38,6	2,0	100,0	280
Ensemble 15-49	17,7	3,2	78,2	0,8	100,0	2 314
50-64	37,8	3,5	58,2	0,6	100,0	671
Ensemble 15-64	22,2	3,2	73,7	0,8	100,0	2 985

¹ Y compris les hommes qui ont une maison avec un titre/acte de propriété, mais qui ne savent pas si leur nom est sur le titre/acte (ou cette information est manquante), et les hommes qui ne savent pas s'il y a un acte/titre de propriété pour la maison (ou cette information est manquante)

² Y compris les hommes qui possèdent une maison seuls, en commun ou seuls et en commun.

Tableau 14.6.1 Possession d'un titre de propriété pour des terres : Femme

Parmi les femmes de 15-49 ans qui possèdent des terres, répartition (en %) selon que les terres possédées ont un titre de propriété et selon que le nom de la femme figure, ou non, sur le titre, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Les terres ont un titre de propriété et :				Total	Effectif de femmes possédant des terres ²
	Le nom de la femme figure sur le titre	Le nom de la femme ne figure pas sur le titre	N'a pas de titre de propriété	Ne sait pas/ manquant ¹		
Groupe d'âges						
15-19	1,7	19,5	74,7	4,1	100,0	99
20-24	11,1	14,0	70,5	4,3	100,0	279
25-29	11,2	10,0	75,4	3,5	100,0	391
30-34	21,6	14,0	61,2	3,2	100,0	364
35-39	29,7	12,1	55,1	3,1	100,0	366
40-44	28,1	8,0	62,4	1,4	100,0	293
45-49	28,6	6,3	63,9	1,2	100,0	277
Résidence						
Cotonou	54,5	11,1	32,0	2,4	100,0	61
Autres villes	27,2	12,5	57,3	3,0	100,0	562
Ensemble urbain	29,9	12,4	54,9	2,9	100,0	623
Rural	16,6	10,8	69,7	2,9	100,0	1 447
Département						
Alibori	7,5	47,0	42,6	2,9	100,0	205
Atacora	12,6	1,2	86,3	0,0	100,0	159
Atlantique	55,9	11,7	28,5	3,9	100,0	165
Borgou	4,4	6,1	82,5	7,0	100,0	404
Collines	12,4	2,3	84,8	0,5	100,0	239
Couffo	65,8	5,1	29,2	0,0	100,0	58
Donga	6,3	22,9	69,4	1,5	100,0	204
Littoral	54,5	11,1	32,0	2,4	100,0	61
Mono	69,1	4,1	25,4	1,4	100,0	114
Ouémé	(48,2)	(5,8)	(44,1)	(1,9)	100,0	50
Plateau	24,9	3,7	69,0	2,4	100,0	173
Zou	8,8	6,5	81,5	3,1	100,0	238
Niveau d'instruction						
Aucun	16,1	11,6	69,1	3,2	100,0	1 510
Primaire	26,8	9,9	60,7	2,6	100,0	303
Secondaire 1 ^{er} cycle	31,1	10,0	57,0	1,9	100,0	182
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	60,3	13,5	26,2	0,0	100,0	75
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	9,5	8,5	79,0	2,9	100,0	515
Second	16,3	10,0	69,2	4,5	100,0	501
Moyen	16,1	14,4	68,0	1,5	100,0	425
Quatrième	24,3	11,9	60,9	3,0	100,0	354
Le plus élevé	51,2	13,3	33,4	2,2	100,0	275
Ensemble	20,6	11,3	65,2	2,9	100,0	2 069

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

¹ Y compris les femmes qui ont des terres avec un titre/acte de propriété, mais qui ne savent pas si leur nom est sur le titre/acte (ou cette information est manquante) et les femmes qui ne savent pas s'il y a un acte/titre de propriété pour les terres (ou cette information est manquante).

² Y compris les femmes qui possèdent des terres seules, en commun ou seules et en commun.

Tableau 14.6.2 Possession d'un titre de propriété pour des terres : Homme

Parmi les hommes de 15-49 ans qui possèdent des terres, répartition (en %) selon que les terres possédées ont un titre de propriété et selon que le nom de l'homme figure, ou non, sur le titre, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Les terres ont un titre de propriété et :				Total	Effectif d'hommes possédant des terres ²
	Le nom de l'homme figure sur le titre	Le nom de l'homme ne figure pas sur le titre	N'a pas de titre de propriété	Ne sait pas/ manquant ¹		
Groupe d'âges						
15-19	0,7	2,4	86,6	10,2	100,0	139
20-24	7,2	2,5	89,4	0,9	100,0	230
25-29	17,9	1,5	80,6	0,0	100,0	430
30-34	20,3	1,9	77,4	0,4	100,0	421
35-39	21,7	2,3	75,9	0,0	100,0	443
40-44	23,7	1,5	74,7	0,0	100,0	392
45-49	22,3	2,7	75,0	0,0	100,0	393
Résidence						
Cotonou	60,1	4,5	35,4	0,0	100,0	49
Autres villes	28,2	2,3	68,3	1,2	100,0	742
Ensemble urbain	30,1	2,5	66,3	1,1	100,0	791
Rural	13,2	1,9	84,4	0,6	100,0	1 657
Département						
Alibori	1,6	0,8	97,6	0,0	100,0	417
Atacora	0,9	0,0	96,7	2,3	100,0	369
Atlantique	55,1	6,2	38,7	0,0	100,0	214
Borgou	4,1	1,3	92,8	1,8	100,0	428
Collines	2,5	0,8	96,7	0,0	100,0	231
Couffo	66,2	3,9	29,2	0,7	100,0	200
Donga	9,2	0,0	90,8	0,0	100,0	172
Littoral	60,1	4,5	35,4	0,0	100,0	49
Mono	59,6	10,7	29,6	0,0	100,0	59
Ouémé	(54,1)	(0,0)	(44,7)	(1,2)	100,0	50
Plateau	20,0	1,6	78,5	0,0	100,0	115
Zou	29,7	6,0	64,4	0,0	100,0	145
Niveau d'instruction						
Aucun	10,7	0,9	87,8	0,5	100,0	1 226
Primaire	23,2	3,1	72,9	0,8	100,0	577
Secondaire 1 ^{er} cycle	22,7	2,7	73,0	1,7	100,0	368
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	39,0	4,2	56,5	0,2	100,0	277
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	5,4	1,6	92,7	0,3	100,0	655
Second	12,5	1,2	86,0	0,3	100,0	588
Moyen	15,2	1,2	81,9	1,6	100,0	511
Quatrième	25,1	3,7	70,1	1,2	100,0	411
Le plus élevé	59,0	4,2	36,3	0,5	100,0	283
Ensemble 15-49	18,7	2,1	78,5	0,7	100,0	2 448
50-64	32,6	1,1	65,7	0,6	100,0	607
Ensemble 15-64	21,4	1,9	76,0	0,7	100,0	3 056

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés

¹ Y compris les hommes qui ont des terres avec un titre/acte de propriété, mais qui ne savent pas si leur nom est sur le titre/acte (ou cette information est manquante), et les hommes qui ne savent pas s'il y a un acte/titre de propriété pour les terres (ou cette information est manquante).

² Y compris les hommes qui possèdent des terres seuls, en commun ou seuls et en commun.

Tableau 14.7.1 Possession et utilisation de comptes bancaires et de téléphones portables : Femme

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont et utilisent un compte dans une banque ou une autre institution financière et pourcentage qui possède un téléphone portable ; parmi les femmes possédant un téléphone portable, pourcentage qui l'ont utilisé pour effectuer des transactions financières, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	A et utilise un compte bancaire	Possède un téléphone portable	Effectif de femmes	Utilise un téléphone portable pour des transactions financières	Effectif de femmes qui possède un téléphone portable
Groupe d'âges					
15-19	1,0	25,5	3 350	21,3	853
20-24	4,7	55,2	2 923	31,3	1 614
25-29	6,6	57,6	2 986	28,9	1 720
30-34	9,9	58,0	2 202	28,3	1 277
35-39	9,7	60,6	1 882	24,5	1 140
40-44	10,1	59,6	1 320	23,6	787
45-49	9,4	59,3	1 265	24,1	750
Résidence					
Cotonou	21,8	78,6	958	48,6	753
Autres villes	8,0	61,0	5 803	33,3	3 539
Ensemble urbain	10,0	63,5	6 761	36,0	4 292
Rural	3,8	42,0	9 167	16,8	3 850
Département					
Alibori	1,7	34,2	1 878	11,7	642
Atacora	2,5	34,1	1 302	18,0	444
Atlantique	9,3	61,4	2 037	32,3	1 250
Borgou	4,9	47,8	1 839	24,7	878
Collines	6,6	53,4	1 151	23,1	615
Couffo	3,4	36,6	1 041	19,7	381
Donga	2,5	52,0	881	17,9	458
Littoral	21,8	78,6	958	48,6	753
Mono	6,9	51,1	759	29,4	388
Ouémé	7,5	61,0	1 507	30,1	919
Plateau	6,6	55,0	970	11,4	533
Zou	6,6	54,8	1 606	34,1	880
Niveau d'instruction					
Aucun	3,2	42,7	8 785	12,7	3 752
Primaire	6,0	55,8	3 148	26,6	1 755
Secondaire 1 ^{er} cycle	6,7	57,4	2 847	37,3	1 635
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	31,6	87,1	1 147	63,6	1 000
Quintiles de bien-être économique					
Le plus bas	0,9	23,2	2 735	6,9	635
Second	2,1	34,4	3 030	10,5	1 042
Moyen	3,0	47,2	3 104	13,4	1 465
Quatrième	5,9	63,2	3 405	24,2	2 152
Le plus élevé	17,4	77,9	3 654	46,4	2 846
Ensemble	6,4	51,1	15 928	26,9	8 141

Tableau 14.7.2 Possession et utilisation de comptes bancaires et de téléphones portables : Homme

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont et utilisent un compte dans une banque ou une autre institution financière et pourcentage qui possède un téléphone portable ; parmi les hommes possédant un téléphone portable, pourcentage qui l'ont utilisé pour effectuer des transactions financières, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	A et utilise un compte bancaire	Possède un téléphone portable	Effectif d'hommes	Utilise un téléphone portable pour des transactions financières	Effectif d'hommes qui possède un téléphone portable
Groupe d'âges					
15-19	1,9	46,9	1 548	22,1	726
20-24	9,9	86,8	1 118	37,1	970
25-29	17,1	91,8	1 156	42,8	1 061
30-34	24,5	91,5	881	43,4	806
35-39	20,3	88,6	812	38,3	719
40-44	21,4	88,3	620	38,7	547
45-49	18,6	87,5	592	30,9	518
Résidence					
Cotonou	35,8	92,1	390	60,2	360
Autres villes	18,9	82,5	2 487	46,4	2 051
Ensemble urbain	21,2	83,8	2 877	48,4	2 411
Rural	9,1	76,3	3 849	27,4	2 936
Département					
Alibori	6,9	72,0	917	17,5	660
Atacora	6,3	75,1	560	20,6	420
Atlantique	20,9	82,2	822	44,2	676
Borgou	9,7	76,9	823	31,1	632
Collines	19,2	78,9	448	42,0	353
Couffo	17,2	83,1	409	51,7	340
Donga	7,5	82,2	445	42,1	366
Littoral	35,8	92,1	390	60,2	360
Mono	17,6	79,7	354	46,9	282
Ouémé	16,6	80,1	618	46,8	495
Plateau	11,7	82,6	340	16,9	281
Zou	12,7	80,1	600	34,9	481
Niveau d'instruction					
Aucun	5,0	74,9	2 426	16,8	1 818
Primaire	10,8	79,5	1 562	33,8	1 241
Secondaire 1 ^{er} cycle	10,9	75,4	1 538	39,4	1 159
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	41,8	94,0	1 201	70,1	1 129
Quintiles de bien-être économique					
Le plus bas	2,8	66,2	1 248	10,7	826
Second	5,5	73,6	1 315	18,2	968
Moyen	7,8	79,8	1 282	29,4	1 022
Quatrième	14,8	83,9	1 317	43,2	1 105
Le plus élevé	35,7	91,1	1 565	65,1	1 425
Ensemble 15-49	14,3	79,5	6 727	36,9	5 347
50-64	19,9	80,3	868	31,8	697
Ensemble 15-64	14,9	79,6	7 595	36,3	6 044

Tableau 14.8 Participation dans la prise de décision

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans, actuellement en union, en fonction de la personne qui prend, habituellement, les décisions dans certains domaines, EDSB-V Bénin 2017-2018

Décision	Principalement la femme	Femme et mari/partenaire en commun		Principalement l'homme	Quelqu'un d'autre	Autre	Total	Effectif
FEMME								
Soins de santé de la femme	11,5	34,8	53,1	0,4	0,2	100,0	11 168	
Achats importants du ménage	8,8	38,4	52,1	0,5	0,2	100,0	11 168	
Visites à sa famille ou à ses parents	21,4	45,1	33,0	0,3	0,2	100,0	11 168	
HOMME								
Soins de santé du mari/partenaire	1,5	21,7	75,5	0,9	0,4	100,0	3 675	
Achats importants du ménage	4,7	35,2	57,5	1,8	0,7	100,0	3 675	

Tableau 14.9.1 Participation des femmes dans la prise de décision selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Pourcentage de femmes de 15-49 ans, actuellement en union, qui habituellement prennent certaines décisions, soit seules, soit en commun avec leur mari/partenaire, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Décisions					Effectif de femmes
	Propres soins de santé de la femme	Faire les achats importants du ménage	Visites à sa famille ou parents	Les trois décisions	Aucune des trois décisions	
Groupe d'âges						
15-19	27,0	25,6	51,5	18,7	42,1	618
20-24	33,1	34,4	58,3	24,9	36,3	1 966
25-29	43,6	44,7	65,9	33,5	28,1	2 658
30-34	47,7	48,9	67,0	37,5	26,5	2 035
35-39	53,1	54,2	71,4	42,1	21,8	1 706
40-44	58,9	58,9	74,4	47,7	19,3	1 166
45-49	62,5	62,6	74,9	51,1	18,4	1 020
Emploi (dans les 12 derniers mois)						
N'a pas travaillé	22,0	23,0	46,1	16,3	49,9	1 744
A travaillé et a été rémunérée en argent	54,0	54,9	72,8	42,5	20,2	7 978
A travaillé mais n'a pas été rémunérée en argent	33,5	33,9	56,5	26,1	38,5	1 446
Nombre d'enfants vivants						
0	36,6	35,1	58,5	27,3	35,5	689
1-2	41,7	42,7	64,4	32,6	30,0	3 819
3-4	48,8	50,3	66,5	37,6	26,0	3 566
5+	51,5	51,7	70,9	41,4	23,5	3 094
Résidence						
Cotonou	63,7	62,6	77,5	50,2	15,2	551
Autres villes	49,1	50,9	70,3	39,7	24,1	3 881
Ensemble urbain	50,9	52,3	71,2	41,0	23,0	4 431
Rural	43,4	43,8	63,4	33,2	30,0	6 737
Département						
Alibori	22,7	27,3	58,8	18,3	37,3	1 550
Atacora	41,1	39,9	72,9	35,5	24,8	892
Atlantique	63,7	66,7	74,1	52,9	16,5	1 311
Borgou	35,8	30,4	53,6	23,2	42,4	1 381
Collines	41,2	44,2	52,8	24,9	31,8	738
Couffo	52,4	46,7	68,9	35,9	25,5	743
Donga	35,3	37,6	67,3	30,0	30,4	716
Littoral	63,7	62,6	77,5	50,2	15,2	551
Mono	68,0	70,6	82,5	56,1	12,1	514
Ouémé	51,1	55,4	70,8	39,2	20,6	985
Plateau	44,4	43,4	63,6	33,1	28,6	709
Zou	61,7	64,2	71,8	54,5	22,9	1 080
Niveau d'instruction						
Aucun	44,1	44,5	64,9	34,2	29,1	7 409
Primaire	50,1	51,7	67,2	39,9	25,6	1 984
Secondaire 1 ^{er} cycle	47,6	50,2	70,1	36,7	23,3	1 294
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	62,6	61,9	78,5	52,9	16,6	481
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	35,2	35,5	60,5	26,5	34,2	2 165
Second	42,5	42,1	61,7	32,4	32,0	2 220
Moyen	45,8	47,4	66,5	35,7	27,3	2 233
Quatrième	50,0	50,2	67,7	38,6	25,0	2 330
Le plus élevé	57,8	60,2	76,0	48,0	18,0	2 221
Ensemble	46,4	47,2	66,5	36,3	27,2	11 168

Tableau 14.9.2 Participation des hommes dans la prise de décision selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans, actuellement en union, qui habituellement, prennent certaines décisions, soit seuls, soit en commun avec leur épouse/partenaire, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Décisions				Effectif d'hommes
	Propres soins de santé de l'homme	Faire les achats importants du ménage	Les deux décisions	Aucune des deux décisions	
Groupe d'âges					
15-19	*	*	*	*	9
20-24	91,5	84,4	82,5	6,7	284
25-29	96,5	91,6	90,3	2,3	735
30-34	98,2	93,6	93,0	1,2	777
35-39	98,0	92,8	92,3	1,5	754
40-44	97,9	95,2	95,0	2,0	574
45-49	98,2	95,0	94,2	1,0	543
Emploi (dans les 12 derniers mois)					
N'a pas travaillé	*	*	*	*	22
A travaillé et a été rémunéré en argent	97,4	93,0	92,2	1,8	3 496
A travaillé mais n'a pas été rémunéré en argent	94,3	90,6	89,8	4,9	157
Nombre d'enfants vivants					
0	95,0	86,5	86,0	4,5	254
1-2	96,0	91,6	90,4	2,8	1 094
3-4	98,4	93,7	93,2	1,2	993
5+	97,8	94,2	93,6	1,6	1 334
Résidence					
Cotonou	98,7	91,1	91,1	1,3	182
Autres villes	97,3	93,7	93,1	2,1	1 326
Ensemble urbain	97,4	93,4	92,9	2,0	1 509
Rural	97,1	92,3	91,4	2,0	2 167
Département					
Alibori	96,2	88,2	88,0	3,7	494
Atacora	97,5	94,9	94,9	2,5	300
Atlantique	96,3	95,3	93,4	1,8	446
Borgou	98,2	97,2	96,8	1,4	493
Collines	97,9	97,5	97,1	1,7	239
Couffo	97,1	94,8	92,6	0,6	222
Donga	100,0	98,0	98,0	0,0	246
Littoral	98,7	91,1	91,1	1,3	182
Mono	97,0	92,3	92,3	3,0	158
Ouémé	96,7	96,2	95,8	2,9	351
Plateau	97,8	95,8	94,7	1,0	219
Zou	95,3	74,0	72,1	2,8	325
Niveau d'instruction					
Aucun	97,2	92,9	92,2	2,1	1 693
Primaire	96,9	94,0	93,1	2,2	926
Secondaire 1 ^{er} cycle	97,4	93,3	92,6	1,9	535
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	97,6	89,6	88,9	1,7	521
Quintiles de bien-être économique					
Le plus bas	96,9	93,0	92,6	2,7	762
Second	96,5	91,6	90,5	2,4	715
Moyen	97,2	94,7	93,7	1,8	680
Quatrième	97,8	92,4	91,8	1,6	718
Le plus élevé	97,7	92,2	91,6	1,7	800
Ensemble 15-49	97,2	92,8	92,0	2,0	3 675
50-64	98,0	94,1	93,3	1,2	782
Ensemble 15-64	97,4	93,0	92,2	1,9	4 457

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 14.10.1 Opinion des femmes concernant le fait qu'un mari batte sa femme

Pourcentage de toutes les femmes de 15-49 ans qui pensent qu'il est justifié que, pour certaines raisons, un mari batte sa femme, par raison particulière et selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Il est justifié qu'un mari batte sa femme quand elle :					Pourcentage d'accord avec au moins une des raisons citées	Effectif de femmes
	Brûle la nourriture	Argumente avec lui	Sort sans le lui dire	Néglige les enfants	Refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui		
Groupe d'âges							
15-19	13,6	18,4	17,9	19,4	10,4	28,8	3 350
20-24	12,9	19,9	19,7	21,8	12,5	30,9	2 923
25-29	13,1	21,9	21,3	23,2	12,4	32,2	2 986
30-34	13,8	21,4	23,3	23,9	13,5	33,4	2 202
35-39	14,7	21,2	23,1	23,7	13,8	32,3	1 882
40-44	15,1	22,1	23,4	24,8	14,0	32,9	1 320
45-49	17,0	24,3	24,9	25,4	16,3	36,8	1 265
Emploi (dans les 12 derniers mois)							
N'a pas travaillé	11,7	19,9	20,7	20,8	13,5	29,3	3 525
A travaillé et a été rémunérée en argent	14,6	21,5	22,6	23,5	12,9	33,1	9 676
A travaillé mais n'a pas été rémunérée en argent	14,4	19,6	17,1	21,8	11,1	30,6	2 727
Nombre d'enfants vivants							
0	12,0	17,0	16,5	18,2	9,2	26,8	4 244
1-2	13,0	20,8	20,5	22,8	12,8	31,3	4 464
3-4	14,7	22,0	23,6	23,7	13,5	33,5	3 863
5+	16,6	24,5	25,5	26,7	16,3	37,0	3 357
État matrimonial							
Célibataire	11,8	16,1	15,3	17,3	8,4	25,7	3 889
En union	14,6	22,6	23,4	24,7	14,2	34,0	11 168
En rupture d'union	15,1	18,5	20,3	19,7	13,1	31,3	871
Résidence							
Cotonou	6,1	8,4	9,1	9,7	5,4	15,1	958
Autres villes	12,0	17,5	18,2	19,4	11,4	27,1	5 803
Ensemble urbain	11,2	16,2	16,9	18,0	10,6	25,4	6 761
Rural	15,9	24,3	24,5	26,0	14,4	36,6	9 167
Département							
Alibori	23,3	47,8	54,3	45,1	25,8	58,0	1 878
Atacora	14,3	17,4	15,3	19,7	14,9	30,9	1 302
Atlantique	9,5	19,4	18,9	19,9	8,2	26,5	2 037
Borgou	6,6	13,3	12,6	12,1	9,8	19,6	1 839
Collines	23,7	23,2	24,4	30,4	19,1	45,9	1 151
Couffo	12,0	19,1	19,3	18,8	14,1	29,1	1 041
Donga	13,9	11,2	16,3	20,4	10,3	28,4	881
Littoral	6,1	8,4	9,1	9,7	5,4	15,1	958
Mono	14,4	15,4	8,7	12,4	7,8	22,9	759
Quémé	8,7	15,3	15,9	16,9	6,3	24,7	1 507
Plateau	19,6	19,9	22,1	22,9	16,6	26,5	970
Zou	16,7	23,0	19,7	30,0	11,4	40,4	1 606
Niveau d'instruction							
Aucun	16,5	25,9	26,5	27,2	16,5	37,3	8 785
Primaire	13,0	17,2	17,8	19,6	10,6	29,4	3 148
Secondaire 1 ^{er} cycle	10,9	14,7	15,1	17,9	7,6	25,6	2 847
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	3,6	7,2	5,3	7,4	2,4	12,0	1 147
Quintiles de bien-être économique							
Le plus bas	16,7	27,1	26,6	27,4	18,0	38,1	2 735
Second	15,8	23,5	24,0	25,3	15,5	34,7	3 030
Moyen	17,0	24,3	25,6	26,6	14,2	37,6	3 104
Quatrième	14,6	20,5	21,4	23,4	12,4	32,8	3 405
Le plus élevé	7,0	11,3	11,1	12,7	5,7	19,1	3 654
Ensemble	13,9	20,8	21,2	22,6	12,8	31,8	15 928

Tableau 14.10.2 Opinion des hommes concernant le fait qu'un mari batte sa femme

Pourcentage de tous les hommes de 15-49 ans qui pensent qu'il est justifié que, pour certaines raisons, un mari batte sa femme, par raison particulière et selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Il est justifié qu'un mari batte sa femme quand elle :					Pourcentage d'accord avec au moins, une des raisons citées	Effectif d'hommes
	Brûle la nourriture	Argumente avec lui	Sort sans le lui dire	Néglige les enfants	Refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui		
Groupe d'âges							
15-19	8,7	11,1	11,0	11,6	7,9	17,4	1 548
20-24	7,8	11,0	9,8	10,6	7,5	17,2	1 118
25-29	7,4	11,6	8,8	10,7	9,1	17,2	1 156
30-34	5,2	8,4	7,5	8,3	6,4	14,2	881
35-39	5,2	7,9	6,6	7,4	5,3	12,8	812
40-44	4,9	6,4	9,1	7,1	5,5	13,3	620
45-49	6,0	7,8	6,2	5,0	4,5	12,3	592
Emploi (dans les 12 derniers mois)							
N'a pas travaillé	4,4	6,2	5,7	6,2	3,8	10,1	851
A travaillé et a été rémunéré en argent	6,6	9,8	8,7	9,1	7,2	15,2	5 084
A travaillé mais n'a pas été rémunéré en argent	11,0	12,6	13,0	14,3	9,3	23,4	791
Nombre d'enfants vivants							
0	7,9	11,1	10,3	10,8	7,9	16,7	3 089
1-2	5,7	8,4	7,3	8,8	6,9	14,4	1 232
3-4	5,6	9,0	8,4	7,9	5,9	15,5	1 038
5+	6,5	8,3	7,4	7,7	5,9	13,8	1 367
État matrimonial							
Célibataire	8,0	11,0	10,3	11,0	7,8	16,9	2 860
En union	5,9	8,6	7,6	8,1	6,3	14,5	3 675
En rupture d'union	7,0	12,0	10,1	8,8	7,6	15,0	191
Résidence							
Cotonou	2,2	4,7	4,0	4,1	2,1	8,1	390
Autres villes	4,0	5,8	7,2	5,9	4,9	11,2	2 487
Ensemble urbain	3,7	5,7	6,7	5,7	4,6	10,8	2 877
Rural	9,2	12,7	10,4	12,1	8,8	19,0	3 849
Département							
Alibori	22,5	28,7	17,3	26,0	22,2	38,2	917
Atacora	7,3	12,4	12,3	13,6	4,6	22,9	560
Atlantique	1,3	4,1	3,6	3,5	0,5	6,4	822
Borgou	1,3	4,3	3,5	2,6	3,9	7,6	823
Collines	4,2	4,6	13,4	7,8	11,8	19,1	448
Couffo	10,4	14,7	20,5	12,8	9,5	23,9	409
Donga	10,3	8,0	7,9	10,8	4,3	16,7	445
Littoral	2,2	4,7	4,0	4,1	2,1	8,1	390
Mono	0,9	4,2	4,7	3,3	1,7	5,4	354
Quémé	8,9	9,1	9,5	9,3	9,0	9,9	618
Plateau	0,3	2,5	4,6	2,5	0,8	7,0	340
Zou	3,0	6,1	4,1	5,8	3,5	9,6	600
Niveau d'instruction							
Aucun	10,7	14,0	11,6	13,5	11,1	21,1	2 426
Primaire	6,3	9,4	9,3	8,4	6,0	14,8	1 562
Secondaire 1 ^{er} cycle	5,2	8,2	8,2	8,7	5,4	14,6	1 538
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	1,9	3,4	3,5	2,8	2,1	6,4	1 201
Quintiles de bien-être économique							
Le plus bas	12,7	17,9	13,3	16,1	12,8	26,0	1 248
Second	9,5	12,0	11,8	11,8	9,7	19,1	1 315
Moyen	7,1	9,7	9,3	9,6	7,4	16,1	1 282
Quatrième	4,2	6,2	6,5	6,4	3,6	11,4	1 317
Le plus élevé	2,0	4,1	4,5	4,1	2,6	7,1	1 565
Ensemble 15-49	6,9	9,7	8,9	9,3	7,0	15,5	6 727
50-64	3,3	6,9	6,4	5,6	4,0	9,9	868
Ensemble 15-64	6,4	9,4	8,6	8,9	6,7	14,9	7 595

Tableau 14.11 Opinions concernant la négociation de rapports sexuels sans risque avec le mari/partenaire

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui pensent qu'il est justifié qu'une femme refuse d'avoir des relations sexuelles avec son mari/partenaire si elle sait qu'il a des relations sexuelles avec d'autres femmes et pourcentage qui pense qu'il est justifié qu'une femme demande à ce qu'un condom soit utilisé au cours des rapports sexuels si elle sait que son mari/partenaire a une infection sexuellement transmissible (IST), selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Femme			Homme		
	Il est justifié qu'une femme :		Effectif de femmes	Il est justifié qu'une femme :		Effectif d'hommes
	Refuse d'avoir des relations sexuelles avec son mari/partenaire si elle sait qu'il a des relations sexuelles avec d'autres femmes	Demande à ce qu'un condom soit utilisé au cours des rapports sexuels si elle sait que son mari/partenaire a une IST		Refuse d'avoir des relations sexuelles avec son mari/partenaire si elle sait qu'il a des relations sexuelles avec d'autres femmes	Demande à ce qu'un condom soit utilisé au cours des rapports sexuels si elle sait que son mari/partenaire a une IST	
Groupe d'âges						
15-24	39,9	55,0	3 040	45,3	67,3	2 666
15-19	39,5	51,3	1 617	42,4	63,0	1 548
20-24	40,3	59,2	1 423	49,4	73,3	1 118
25-29	37,8	56,9	1 502	48,8	72,0	1 156
30-39	38,4	57,6	1 961	48,7	70,4	1 693
40-49	39,0	57,5	1 203	50,3	71,1	1 211
État matrimonial						
Célibataire	44,2	55,9	1 900	46,0	68,7	2 860
A déjà eu des rapports sexuels	46,9	64,2	963	54,5	75,0	1 519
N'a jamais eu de rapports sexuels	41,4	47,4	937	36,3	61,5	1 341
En union	36,1	55,8	5 409	48,7	70,3	3 675
En rupture d'union	52,0	67,5	396	51,9	69,6	191
Résidence						
Cotonou	48,5	69,6	460	70,1	86,6	390
Autres villes	42,1	58,9	2 843	50,4	73,8	2 487
Ensemble urbain	43,0	60,4	3 303	53,0	75,6	2 877
Rural	35,9	53,4	4 403	43,6	65,1	3 849
Département						
Alibori	6,1	39,9	947	31,2	62,1	917
Atacora	30,1	51,2	614	37,6	65,7	560
Atlantique	59,2	77,1	971	66,6	80,8	822
Borgou	17,5	45,7	890	10,8	57,9	823
Collines	47,4	59,0	588	38,0	65,1	448
Couffo	51,7	52,4	515	79,3	90,8	409
Donga	30,9	59,2	413	51,8	58,9	445
Littoral	48,5	69,6	460	70,1	86,6	390
Mono	46,3	55,5	375	65,9	93,5	354
Ouémé	60,0	70,3	724	39,7	55,4	618
Plateau	48,5	56,5	474	72,2	81,0	340
Zou	40,0	45,2	736	58,2	65,0	600
Niveau d'instruction						
Aucun	31,7	50,6	4 245	36,2	61,2	2 426
Primaire	46,2	60,4	1 547	52,4	70,5	1 562
Secondaire 1 ^{er} cycle	46,8	61,6	1 356	51,7	72,9	1 538
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	55,2	76,9	558	59,4	81,2	1 201
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	25,2	46,2	1 424	34,8	56,5	1 248
Second	33,8	49,2	1 551	42,6	69,1	1 315
Moyen	40,1	56,6	1 422	48,2	66,8	1 282
Quatrième	43,9	59,3	1 574	51,0	71,3	1 317
Le plus élevé	49,4	68,5	1 734	58,9	81,3	1 565
Ensemble 15-49	38,9	56,4	7 706	47,7	69,6	6 727
50-64	na	na	na	53,4	72,5	868
Ensemble 15-64	na	na	na	48,3	69,9	7 595

na = Non applicable

Tableau 14.12 Capacité des femmes à négocier les rapports sexuels avec leur mari/partenaire

Pourcentage de femmes de 15-49 ans, actuellement en union, qui peuvent refuser des rapports sexuels à leur mari/partenaire quand elles ne souhaitent pas en avoir et pourcentage qui peuvent demander à leur mari/partenaire d'utiliser un condom, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage pouvant refuser des rapports sexuels à leur mari/partenaire quand elles ne souhaitent pas en avoir	Pourcentage pouvant demander à leur mari/partenaire d'utiliser un condom	Effectif de femmes
Groupe d'âges			
15-24	55,2	40,5	1 254
15-19	46,5	32,4	279
20-24	57,7	42,8	975
25-29	57,0	41,8	1 331
30-39	58,3	40,3	1 794
40-49	56,4	37,3	1 030
Résidence			
Cotonou	73,4	65,2	251
Autres villes	58,4	41,4	1 926
Ensemble urbain	60,2	44,1	2 177
Rural	54,7	37,5	3 233
Département			
Alibori	39,1	29,4	769
Atacora	44,3	23,2	444
Atlantique	73,3	65,6	633
Borgou	46,5	19,1	687
Collines	58,0	45,2	368
Couffo	70,2	42,4	356
Donga	36,3	34,4	343
Littoral	73,4	65,2	251
Mono	57,9	43,5	239
Ouémé	73,4	49,6	470
Plateau	77,7	37,3	359
Zou	53,6	46,0	490
Niveau d'instruction			
Aucun	52,2	32,8	3 583
Primaire	65,0	50,0	974
Secondaire 1 ^{er} cycle	65,3	54,8	608
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	72,3	71,9	244
Quintiles de bien-être économique			
Le plus bas	48,1	26,1	1 133
Second	52,5	33,6	1 115
Moyen	55,4	39,8	1 034
Quatrième	61,0	45,7	1 087
Le plus élevé	68,4	56,9	1 039
Ensemble	56,9	40,1	5 409

Tableau 14.13 Indicateurs du pouvoir d'action des femmes

Pourcentage de femmes de 15-49 ans, actuellement en union, qui participent à toutes les prises de décision et pourcentage de femmes qui ne sont d'accord avec aucune des raisons justifiant qu'un mari/partenaire batte sa femme, selon les deux indicateurs du pouvoir d'action des femmes, EDSB-V Bénin 2017-2018

Indicateur du pouvoir d'action	Pourcentage participant à la prise de toutes les décisions	Pourcentage n'étant d'accord avec aucune des raisons justifiant qu'un mari batte sa femme	Effectif de femmes
Nombre de décisions auxquelles la femme a participé¹			
0	na	58,4	3 043
1-2	na	64,0	4 072
3	na	73,7	4 053
Nombre de raisons pour lesquelles il est justifié qu'un mari batte sa femme²			
0	40,6	na	7 369
1-2	29,9	na	1 564
3-4	26,2	na	1 445
5	27,7	na	790

na = Non applicable

¹ Se référer au Tableau 14.9.1 pour la liste des décisions.

² Se référer au Tableau 14.10.1 pour la liste des raisons.

Tableau 14.14 Utilisation actuelle de la contraception selon les indicateurs du pouvoir d'action des femmes

Répartition des femmes de 15-49 ans, actuellement en union par méthode contraceptive actuellement utilisée selon certains indicateurs du pouvoir d'action des femmes, EDSB-V Bénin 2017-2018

Indicateur du pouvoir d'action	Méthodes modernes							Total	Effectif de femmes
	Une méthode	Une méthode moderne ¹	Stérilisation féminine	Méthodes modernes temporaires féminines ²	Condom masculin	Une méthode traditionnelle	N'utilise pas actuellement		
Nombre de décisions auxquelles la femme a participé³									
0	12,1	9,6	0,1	8,9	0,6	2,5	87,9	100,0	3 043
1-2	15,3	12,5	0,2	11,2	1,1	2,7	84,7	100,0	4 072
3	18,3	14,4	0,2	13,2	1,0	4,0	81,7	100,0	4 053
Nombre de raisons pour lesquelles il est justifié qu'un mari batte sa femme⁴									
0	15,8	13,1	0,2	11,8	1,1	2,7	84,2	100,0	7 369
1-2	15,8	12,2	0,0	11,4	0,8	3,6	84,2	100,0	1 564
3-4	13,5	9,6	0,2	9,0	0,4	3,9	86,5	100,0	1 445
5	16,2	11,7	0,0	11,0	0,7	4,4	83,8	100,0	790
Ensemble	15,5	12,4	0,2	11,3	0,9	3,1	84,5	100,0	11 168

Note : Si plus d'une méthode est utilisée, seule la plus efficace est prise en compte dans ce tableau.

¹ Stérilisation féminine, stérilisation masculine, pilule, DIU, injectables, implants, condom masculin, condom féminin, pilule du lendemain, méthode des jours fixes (MJF), méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA) et d'autres méthodes modernes.

² Pilule, DIU, injectables, implants, condom féminin, pilule du lendemain, méthode des jours fixes (MJF), méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA) et d'autres méthodes modernes

³ Se référer au Tableau 14.9.1 pour la liste des décisions.

⁴ Se référer au Tableau 14.10.1 pour la liste des raisons.

Tableau 14.15 Nombre idéal d'enfants et besoins non satisfaits en matière de planification familiale selon certains indicateurs du pouvoir d'action des femmes

Nombre moyen idéal d'enfants pour les femmes de 15-49 ans et pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, selon certains indicateurs du pouvoir d'action des femmes, EDSB-V Bénin 2017-2018

Indicateur du pouvoir d'action	Nombre moyen idéal d'enfants ¹	Effectif de femmes	Pourcentage de femmes actuellement en union ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale ²			Effectif de femmes actuellement en union
			Pour espacer	Pour limiter	Total	
Nombre de décisions auxquelles la femme a participé³						
0	5,6	2 839	26,7	7,9	34,7	3 043
1-2	5,5	3 778	22,9	9,3	32,2	4 072
3	5,2	3 852	19,5	11,1	30,6	4 053
Nombre de raisons pour lesquelles il est justifié qu'un mari batte sa femme⁴						
0	4,9	10 258	23,2	9,6	32,8	7 369
1-2	5,4	2 049	24,4	10,1	34,5	1 564
3-4	5,7	1 713	19,2	8,8	28,0	1 445
5	5,8	951	21,5	9,8	31,4	790
Ensemble	5,1	14 971	22,7	9,6	32,3	11 168

¹ Sont exclues dans le calcul de la moyenne, les enquêtées qui ont donné des réponses non numériques.

² L'estimation des besoins non satisfaits est basée sur la définition révisée décrite dans Bradley et al., 2012

³ Limité aux seules femmes actuellement en union. Se référer au Tableau 14.9.1 pour la liste des décisions

⁴ Se référer au Tableau 14.10.1 pour la liste des raisons.

Tableau 14.16 Soins de santé maternelle, selon les indicateurs du pouvoir d'action des femmes

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu un enfant au cours des 5 années ayant précédé l'enquête qui ont reçu des soins prénatals, une assistance à l'accouchement et des soins postnatals par du personnel de santé pour leur naissance la plus récente, selon certains indicateurs du pouvoir d'action des femmes, EDSB-V Bénin 2017-2018

Indicateur du pouvoir d'action	Pourcentage ayant reçu des soins prénatals d'un prestataire qualifié ¹	Pourcentage dont l'accouchement a été assisté par un prestataire qualifié ¹	Pourcentage ayant eu un examen postnatal dans les 2 jours suivant la naissance ²	Effectif de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 5 dernières années
Nombre de décisions auxquelles la femme a participé³				
0	82,0	70,5	59,4	2 423
1-2	89,3	83,9	67,3	3 125
3	92,9	88,3	71,8	2 800
Nombre de raisons pour lesquelles il est justifié qu'un mari batte sa femme⁴				
0	89,1	85,4	66,0	5 963
1-2	88,8	78,5	65,9	1 313
3-4	88,4	79,4	71,0	1 130
5	82,2	62,3	59,8	624
Ensemble	88,5	82,0	66,2	9 031

¹ Les prestataires qualifiés incluent les médecins, les infirmières/sages-femmes

² Y compris les femmes qui ont reçu des soins postnatals d'un médecin, d'une infirmière/sage-femme, d'un agent de santé communautaire ou d'une sage-femme traditionnelle dans les deux jours qui ont suivi la naissance. Y compris les femmes qui ont accouché dans un établissement de santé et celles qui n'ont pas accouché dans un établissement de santé.

³ Limité aux seules femmes actuellement en union. Se référer au Tableau 14.9.1 pour la liste des décisions.

⁴ Se référer au Tableau 14.10.1 pour la liste des raisons.

Tableau 14.17 Mortalité des enfants de moins de cinq ans selon certains indicateurs du pouvoir d'action des femmes

Mortalité infantile, juvénile et infanto-juvénile pour la période des 10 années ayant précédé l'enquête selon certains indicateurs du pouvoir d'action des femmes, EDSB-V Bénin 2017-2018

Indicateur du pouvoir d'action	Mortalité infantile ($1q_0$)	Mortalité juvénile ($4Q_1$)	Mortalité infanto-juvénile ($5q_0$)
Nombre de décisions auxquelles la femme a participé¹			
0	60	50	107
1-2	57	41	96
3	60	45	103
Nombre de raisons pour lesquelles il est justifié qu'un mari batte sa femme²			
0	60	44	101
1-2	55	53	105
3-4	60	40	98
5	68	50	114

¹ Limité aux seules femmes actuellement en union. Se reporter au Tableau 14.9.1 pour la liste des décisions.

² Se référer au Tableau 14.10.1 pour la liste des raisons.

Résultats clés

- **Mortalité adulte** : La probabilité de décéder entre les âges exacts 15 et 50 ans est estimée à 111 ‰ pour les femmes et 153 ‰ pour les hommes.
- **Mortalité maternelle** : Pour la période des 7 années ayant précédé l'EDSB-V 2017-2018, le rapport de mortalité maternelle est estimé à 391 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes.
- **Risque de mortalité maternelle sur la durée de vie (RDV)** : Dans les conditions actuelles de fécondité et de mortalité, environ 1 femme sur 40 (0,023) décèdera des suites de causes maternelles durant sa vie reproductive.
- **Rapport de mortalité liée à la grossesse** : Pour la période des 7 années ayant précédé l'EDSB-V 2017-2018, le rapport de mortalité liée à la grossesse est de 433 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes.

Les indicateurs de mortalité adulte et de mortalité maternelle peuvent être utilisés pour évaluer l'état de santé d'une population, en particulier dans les pays en développement comme le Bénin.

L'estimation des taux de mortalité requiert des données complètes et précises sur les décès adultes et maternels. Au cours de l'EDSB-V 2017-2018, des données ont été recueillies sur la survie des frères et sœurs des femmes interrogées pour obtenir une estimation de la mortalité adulte. Les questions pour déterminer si les décès chez les femmes enceintes étaient liés à la grossesse ont permis d'estimer la mortalité liée à la grossesse. Il s'agit d'un indicateur clé de la santé et du bien-être maternel, ainsi que de la qualité des soins maternels.

Ce chapitre présente les niveaux et les tendances de la mortalité adulte et maternelle au Bénin. Il inclut une mesure résumée de la mortalité adulte ($_{35q15}$) qui correspond à la probabilité de décéder entre les âges exacts 15 et 50.

15.1 DONNÉES

Au cours de l'EDSB-V 2017-2018, pour obtenir l'historique des frères et sœurs, l'enquêtrice a d'abord demandé, à chaque femme interrogée, la liste de tous les enfants nés de sa mère biologique. L'enquêtrice demandait ensuite si chacun des frères et sœurs était toujours vivant. Elle demandait ensuite l'âge actuel de chaque frère et sœur vivant et pour les frères et sœurs décédés, l'âge au décès et le nombre d'années écoulées depuis le décès. Quand une enquêtée ne pouvait pas fournir d'informations précises sur l'âge au moment du décès et/ou sur le nombre d'années écoulées, les enquêtrices étaient autorisées à l'aider pour avoir une réponse approximative.

Pour les sœurs décédées à l'âge de 12 ans ou plus, l'enquêtrice posait la ou les questions supplémentaires afin de déterminer si le décès était lié à la maternité : « Est-ce que [NOM DE SŒUR] était enceinte quand elle est morte? » et, dans le cas d'une réponse négative, « Est-ce qu'elle est morte pendant l'accouchement? » et, dans le cas d'une réponse négative, « Est-elle décédée dans les deux mois qui ont suivi la fin de la

grossesse ou de l'accouchement? » et, dans le cas où elle est décédée dans les deux mois qui ont suivi la fin de la grossesse ou de l'accouchement, « Combien de jours après la fin de la grossesse est-elle décédée ? »

Étant donné que les décès accidentels ne sont pas considérés comme des décès maternels, on a demandé à chaque enquêtée si toutes les sœurs décédées étaient décédées à la suite d'un acte de violence ou d'un accident.

Le **Tableau 15.1** présente le nombre de frères et sœurs survivants et décédés déclarés par les enquêtées et la complétude des données sur l'âge actuel des frères et sœurs survivants, l'âge au décès et le nombre d'années écoulées depuis le décès des frères et sœurs décédés.

Dans l'ensemble, 80 122 frères et sœurs ont été enregistrés dans la section mortalité adulte et maternelle de l'EDSB-V 2017-2018. Des données complètes ont été obtenues pour tous les frères et sœurs, quel que soit leur état de survie, qu'il s'agisse de l'âge pour les survivants, de l'âge au décès et du nombre d'années écoulées depuis le décès pour ceux qui sont décédés.

15.2 ÉSTIMATION DIRECTE DE LA MORTALITÉ ADULTE

Taux de mortalité des adultes

Nombre de décès d'adultes pour 1 000 dans la population de 15-49 ans. Les taux de mortalité adulte par groupe d'âges quinquennal sont calculés comme suit : nombre de décès des frères et sœurs de l'enquêtée dans chaque groupe d'âges divisé par le nombre de personnes années d'exposition au risque de décéder dans le groupe d'âges pendant les 7 années ayant précédé l'enquête. Le nombre de décès est le nombre déclaré de décès de frères et de sœurs qui ont eu lieu pendant les 7 années ayant précédé l'enquête. Les personnes-années d'exposition dans chaque groupe d'âges sont calculées pour les frères et sœurs survivants et décédés, basées sur l'âge actuel (pour les survivants) ou l'âge au décès et les années écoulées depuis le décès (pour les décédés).

Échantillon : Frères et sœurs (survivants et décédés) qui étaient âgés de 15-49 ans au cours des 7 années ayant précédé l'enquête, par sexe et par groupe d'âges quinquennal.

Une façon d'évaluer la qualité des données utilisées pour estimer la mortalité maternelle, est d'évaluer la vraisemblance et la fiabilité des estimations de la mortalité adulte globale. Si les taux estimés de mortalité générale adulte sont peu plausibles, les taux basés sur un sous-ensemble de décès (décès maternels en particulier) le seront aussi.

L'estimation directe de la mortalité adulte utilise les âges déclarés au décès et le nombre d'années écoulées depuis le décès des frères et sœurs des enquêtées. Étant donné que les risques d'expositions au décès varient selon l'âge et le sexe, les taux de mortalité adulte sont présentés par groupe d'âges quinquennal et par sexe. Le **Tableau 15.2** et le **Graphique 15.1** présentent les taux de mortalité par âge pour les femmes et pour les hommes de 15-49 ans pour la période des 7 années ayant précédé l'enquête.


Pour disposer d'un nombre suffisamment important de décès d'adultes pour produire une estimation fiable, les taux sont calculés pour la période de 7 ans précédant l'enquête. Néanmoins, les taux de mortalité spécifiques par âge obtenus de cette manière restent soumis à des variations d'échantillonnage considérables. L'utilisation de cette période de 7 ans est un compromis entre le souhait de disposer des données les plus récentes et la nécessité de minimiser l'erreur d'échantillonnage.

- Dans l'ensemble, le niveau de la mortalité adulte est plus élevé parmi les hommes (4,01 décès pour 1000 individus) que parmi les femmes (3,06 décès pour 1000 individus).
- Les niveaux de mortalité augmentent rapidement avec l'âge, surtout chez les hommes. Quel que soit le groupe d'âges, les taux de mortalité des hommes sont plus élevés que ceux des femmes ; l'écart augmente avec l'âge, particulièrement après l'âge de 30 ans.

15.3 TENDANCES DE LA MORTALITÉ ADULTE

Le **Tableau 15.3** présente la probabilité de décéder entre les âges exacts 15 et 50 (${}_{35}q_{15}$) au cours des 7 années ayant précédé l'EDSB-V 2017-2018 et l'EDSB-III 2006. En supposant que les taux de mortalité par âge se soient maintenus constants au cours des 7 années avant l'enquête, ${}_{35}q_{15}$ est la probabilité pour un homme ou une femme qui vient d'atteindre 15 ans de décéder avant d'atteindre son cinquantième anniversaire. Les résultats montrent que de 2006 à 2017-2018, la probabilité de décéder entre les âges exacts 15 et 50 ans a baissé chez les femmes (passant de 127 % à 111 %) comme chez les hommes, (passant de 162 % à 153 %).

Graphique 15.1 Taux de mortalité adulte par âge



15.4 ÉSTIMATION DIRECTE DE LA MORTALITÉ MATERNELLE

Taux de mortalité maternelle

Nombre de décès maternels pour 1 000 femmes de 15-49 ans. Les taux de mortalité maternelle par groupe d'âges quinquennal sont calculés en divisant le nombre de décès maternels des sœurs de l'enquêtée dans chaque groupe d'âges par le total des personnes-années d'exposition des sœurs au risque de décéder dans le groupe d'âges au cours des 7 années ayant précédé l'enquête. Le nombre de décès est le nombre déclaré de décès de sœurs qui sont décédées au cours des 7 années ayant précédé l'enquête, soit pendant la grossesse ou l'accouchement, soit pendant les 42 jours qui ont suivi l'accouchement ou la fin de la grossesse, par groupe d'âges au moment du décès ; les décès dus à un accident ou à des actes de violence sont exclus. Les personnes-années d'exposition dans chaque groupe d'âges sont calculées pour les sœurs vivantes et décédées, basées sur leur âge actuel déclaré pour les sœurs survivantes ou l'âge au décès et les années écoulées depuis le décès pour les sœurs décédées

Échantillon : Sœurs (vivantes et décédées) de 15-49 ans durant les 7 années ayant précédé l'enquête, par groupe d'âges quinquennal.

Les décès maternels sont un sous-ensemble de tous les décès de femmes ; ils désignent les décès qui se produisent pendant la grossesse ou l'accouchement ou dans les 42 jours qui suivent l'accouchement ou la fin de la grossesse ; les décès maternels n'incluent pas les décès dus à un accident ou un acte de violence. Il faut noter qu'à cette édition, la définition de la mortalité maternelle a connu des améliorations par l'apport de trois questions supplémentaires adressées à l'enquêtée sur ses sœurs décédées. Deux questions relatives aux décès consécutifs à des actes de violence ou à un accident ont été introduites qui permettent d'exclure ces deux causes des décès maternels. En outre, la dernière question permet de déterminer le nombre de jours après la fin de la grossesse ou de l'accouchement pendant lequel le décès s'est produit puisque dans ce rapport, à la différence des enquêtes précédentes, pour être défini comme maternel, le décès doit avoir eu lieu dans une période de référence de 42 jours après l'accouchement ou la fin de la grossesse.

Dans cette enquête, la variante directe de la méthode des sœurs (Rutenberg and Sullivan 1991 ; Stanton et al. 1997) est utilisée pour estimer la mortalité maternelle. Le **Tableau 15.4** présente les estimations par âge de la mortalité maternelle pour la période de 7 ans avant l'EDSB-V 2017-2018.

Les résultats montrent que le taux de mortalité maternelle des femmes de 15-49 ans est de 0,73 décès pour 1 000 femmes-années d'exposition. Les données par groupes d'âges quinquennaux révèlent que c'est dans les groupes d'âges 30-34 ans et 35-39 ans que les taux sont les plus élevés (respectivement 1,30 ‰ et 0,83 ‰). Le pourcentage global de décès de femmes qui sont liés à la maternité est de 25 %. Ce pourcentage de décès varie de 14 % parmi les femmes de 45-49 ans à 32 % parmi celles de 30-34 ans. Cependant, étant donné que le nombre total de décès maternels (138) parmi les femmes en âge de reproduction est relativement peu important (**Tableau 15.4**), il convient d'interpréter avec prudence les variations par âge.

Le rapport de mortalité maternelle (RMM) est estimé à 391 décès pour 100 000 naissances vivantes au cours de la période des 7 années ayant précédé l'EDSB-V 2017-2018 (**Tableau 15.5**). L'intervalle de confiance dans lequel se situe la valeur est grand (299 à 484), ce qui s'explique par le faible nombre de décès maternels (138). En d'autres termes, au Bénin, pour mille naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 7 années avant l'enquête, environ 4 femmes sont décédées durant la grossesse, pendant l'accouchement ou dans les 42 jours qui ont suivi l'accouchement ou la fin de la grossesse, non compris les décès dus à des accidents ou à des actes de violence.

Le risque de décès maternel sur la durée de vie est estimé à 0,023 ; exprimé autrement, cela revient à dire qu'environ une femme sur quarante décèdera de causes maternelles durant sa vie reproductive si les conditions de mortalité et de fécondité demeurent inchangées.

15.5 TENDANCES DE LA MORTALITÉ LIÉE À LA GROSSESSE

Taux de mortalité liée à la grossesse

Nombre de décès liés à la grossesse pour 1 000 femmes de 15-49 ans. Les taux de mortalité liés à la grossesse par groupe d'âges quinquennal sont calculés en divisant le nombre de décès de sœurs de l'enquêtée liés à la grossesse dans chaque groupe d'âges par le total des personnes-années d'exposition des sœurs au risque de décéder dans le groupe d'âges durant les 7 années ayant précédé l'enquête. Le nombre de décès est le nombre déclaré de décès de sœurs qui sont décédées au cours des 7 années ayant précédé l'enquête, soit pendant la grossesse ou l'accouchement, soit pendant les 2 mois qui ont suivi l'accouchement ou la fin de la grossesse, par groupe d'âges au moment du décès. Les personnes-années d'exposition dans chaque groupe d'âges sont calculées pour les sœurs survivantes et décédées, basées sur leur âge actuel déclaré pour les sœurs survivantes ou l'âge au décès et les années écoulées depuis le décès pour les sœurs décédées

Échantillon : Sœurs (vivantes et décédées) de 15-49 ans durant les 7 années ayant précédé l'enquête, par groupe d'âges quinquennal.

Rapport de mortalité liée à la grossesse

Nombre de décès liés à la grossesse pour 100 000 naissances vivantes. Le rapport de mortalité liée à la grossesse est calculé en divisant le taux standardisé par âge de mortalité liée à la grossesse pour les femmes de 15-49 ans durant les 7 années ayant précédé l'enquête par le taux global de fécondité générale (TGFG) pour la même période.


Pour comparer avec les estimations des enquêtes EDS précédentes, l'EDSB-V 2017-2018 définit un décès lié à la grossesse comme le décès d'une femme pendant la grossesse ou l'accouchement ou qui se produit dans les deux mois qui suivent l'accouchement ou la fin de la grossesse, quelle que soit la cause du décès. Les estimations de la mortalité liée à la grossesse sont donc basées seulement sur le moment où s'est produit le décès en relation avec la grossesse. Noter que cette définition est différente de la définition du décès lié à la grossesse de l'OMS qui limite la période de référence à 42 jours. Ce que l'EDS actuelle définit comme des décès liés à la grossesse était considéré comme des décès maternels dans les enquêtes EDS précédentes.

Le **Graphique 15.2** présente les estimations du rapport de mortalité liée à la grossesse avec les intervalles de confiance pour les 7 ans précédant les enquêtes EDS 1996, 2006 et 2017-2018 (**Tableau 15.6**). Le rapport de mortalité liée à la grossesse est passé de 498 décès pour 100 000 naissances vivantes au cours des 7 années ayant précédé l'EDSB-I 1996 à 400 décès pour 100 000 naissances vivantes au cours des 7 années ayant précédé l'EDSB-III 2006, puis à 433 décès pour 100 000 naissances vivantes au cours des 7 années ayant précédé l'EDSB-V 2017-2018.

Le **Graphique 15.2** montre aussi que les intervalles de confiance des deux dernières estimations se chevauchent avec la valeur obtenue dans l'EDSB-I 1996. Il semble donc que la variation apparente du rapport de mortalité liée à la grossesse de 1996 à 2017-2018 n'est pas, en fait, statistiquement significative.

Graphique 15.2 Tendances du Rapport de Mortalité liée à la Grossesse (RMG) avec intervalle de confiance

Décès de femmes dont les causes sont liées à la grossesse pour 100 000 naissances vivantes



LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur la mortalité adulte et sur la mortalité maternelle, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 15.1** Complétude de l'information sur les frères et sœurs
- **Tableau 15.2** Taux de mortalité des adultes
- **Tableau 15.3** Quotient de mortalité adulte
- **Tableau 15.4** Mortalité maternelle
- **Tableau 15.5** Rapport de mortalité maternelle
- **Tableau 15.6** Tendances de la mortalité liée à la grossesse

Tableau 15.1 Complétude de l'information sur les frères et sœurs

Effectif des frères et sœurs déclarés par les enquêtées et complétude des données déclarées concernant l'état de survie, l'âge au décès et le nombre d'années écoulées depuis le décès (sans pondération), EDSB-V Bénin 2017-2018

	Sœurs		Frères		Ensemble	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Ensemble des sœurs et frères	38 833	100,0	41 289	100,0	80 122	100,0
Survivants	35 110	90,4	36 673	88,8	71 783	89,6
Décédés	3 722	9,6	4 605	11,2	8 327	10,4
Non disponible	1	0,0	11	0,0	12	0,0
Ensemble des survivants	35 110	100,0	36 673	100,0	71 783	100,0
Âge déclaré	35 110	100,0	36 673	100,0	71 783	100,0
Ensemble de décédés	3 722	100,0	4 605	100,0	8 327	100,0
Âge et nombre d'années déclarés	3 722	100,0	4 605	100,0	8 327	100,0

Tableau 15.2 Taux de mortalité des adultes

Estimation directe de la mortalité des femmes et des hommes par groupe d'âges pour la période de 7 ans avant l'enquête, EDSB-V Bénin 2017-2018

Groupe d'âges	Décès	Années d'exposition	Taux de mortalité ¹
FEMME			
15-19	86	35 355	2,45
20-24	87	39 226	2,23
25-29	84	36 426	2,32
30-34	121	30 122	4,02
35-39	81	21 197	3,82
40-44	52	13 405	3,90
45-49	37	7 810	4,71
Ensemble 15-49	549	183 543	3,06 ^a
HOMME			
15-19	96	37 734	2,54
20-24	113	41 570	2,71
25-29	104	38 107	2,73
30-34	133	30 846	4,32
35-39	114	22 920	4,96
40-44	117	13 929	8,39
45-49	58	7 804	7,46
Ensemble 15-49	734	192 911	4,01 ^a

¹ Exprimé pour 1 000 personnes

^a Taux ajusté selon l'âge

Tableau 15.3 Quotient de mortalité adulte

Probabilité de décéder des femmes et des hommes entre les âges exacts de 15-50 ans pour la période de 7 ans avant l'enquête, EDSB-V Bénin 2017-2018 et EDSB-III Bénin 2006

Enquête	Femme	Homme
	${}_{35}q_{15}^1$	${}_{35}q_{15}^1$
EDSB-V Bénin 2017-2018	111	153
EDSB-III Bénin 2006	127	162

¹ Probabilité de décéder entre les âges exacts de 15 et 50 ans exprimés pour 1 000 personnes-années d'exposition.

Tableau 15.4 Mortalité maternelle

Estimation directe des taux de mortalité maternelle pour la période de 7 ans avant l'enquête, par groupe d'âges quinquennal, EDSB-V Bénin 2017-2018

Groupe d'âges	Pourcentage de décès de femmes qui sont maternels	Décès maternels ¹	Années d'exposition	Taux de mortalité maternelle ²
15-19	14,7	13	35 355	0,36
20-24	30,9	27	39 226	0,69
25-29	31,0	26	36 426	0,72
30-34	32,3	39	30 122	1,30
35-39	21,8	18	21 197	0,83
40-44	18,7	10	13 405	0,73
45-49	14,1	5	7 810	0,66
Ensemble 15-49	25,0	138	183 543	0,73 ^a

¹ Les décès maternel désignent les décès qui se produisent pendant la grossesse ou l'accouchement ou dans les 42 jours qui suivent l'accouchement ou la fin de la grossesse et n'incluent pas les décès dus à un accident ou à des actes de violence.

² Exprimé pour 1 000 femmes-années d'exposition

^a Taux standardisés par l'âge

Tableau 15.5 Rapport de mortalité maternelle

Indice synthétique de fécondité, taux global de fécondité général, rapport de mortalité maternelle, et risque de mortalité maternelle sur la durée de vie pour la période de 7 ans avant l'enquête, EDSB-V Bénin 2017-2018

Indice synthétique de fécondité (ISF)	5,9
Taux global de fécondité général (TGFG) ¹	186
Rapport de mortalité maternelle (RMM) ²	391 IC : (299, 484)
Risque de mortalité maternelle sur la durée de vie ³	0,023

IC : Intervalle de confiance

¹ Taux standardisés par âge exprimé pour 1 000 femmes de 15-49 ans

² Exprimé pour 100 000 naissances vivante ; calculé comme suit : [Taux de mortalité maternelle standardisé par âge (présenté au Tableau 15.4) x 100/ TGFG standardisé par âge]

³ Calculé à partir de la formule suivante : $1 - (1 - RMM)^{ISF}$ où l'ISF est l'indice synthétique de fécondité pour la période de 7 ans avant l'enquête.

Tableau 15.6 Tendances de la mortalité liée à la grossesse

Estimations directes des taux de mortalité liées à la grossesse pour la période 7 ans avant chaque enquête, par groupe d'âge quinquennal, EDSB-V Bénin 2017-2018

Age	Taux de mortalité liés à la grossesse ^{1,2}		
	1989-1996	1999-2006	2010/11-2017/18
15-19	0,62	0,28	0,44
20-24	0,91	0,48	0,78
25-29	1,05	0,97	0,76
30-34	2,19	1,38	1,42
35-39	0,74	1,20	0,94
40-44	1,09	0,67	0,81
45-49	0,51	0,30	0,66
Ensemble 15-49 ^a	1,02	0,77	0,81
Indice Synthétique de Fécondité (ISF)	6,0	5,7	5,9
Taux Globale de Fécondité Générale (TGFG) ³	202	204	186
Rapport de mortalité liée à la grossesse (RMG) ⁴	498	400	433
Intervalle de Confiance	(372-624)	(327-473)	(339-527)
Risque de mortalité liée à la grossesse sur la durée de vie ⁵	0,032	0,023	0,025

¹ Mortalité liée à la grossesse est définie comme étant le décès d'une femme pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou dans les deux mois suivant la fin de la grossesse, y compris les accidents ou la violence

² Exprimé pour 1 000 femmes-années d'exposition

³ Taux standardisé par âge pour 1 000 femmes âgées de 15-49 ans

⁴ Exprimé pour 100 000 naissances ; calculé comme taux de mortalité liée à la grossesse standardisé par âge x 100/TGFG standardisé par âge

⁵ Calculé à partir de la formule suivante $1 - (1 - RMG)^{ISF}$ où l'ISF est l'indice synthétique de fécondité pour la période 7 ans avant l'enquête

^a Taux standardisé par âge

Résultats clés

- **Violence physique** : Près de trois femmes de 15-49 ans sur dix (27 %) ont subi des actes de violence physique depuis l'âge de 15 ans. Les auteurs de ces actes de violence sont le mari/partenaire actuel dans 49 % des cas, quel que soit le statut matrimonial de la femme et, dans 62 % des cas, parmi les femmes en union.
- **Violence sexuelle** : Une femme sur dix (10 %) a déclaré avoir subi des violences sexuelles à un moment quelconque de sa vie ; au cours des 12 derniers mois, ce pourcentage est de 5 %.
- **Violence conjugale** : Parmi les femmes de 15 à 49 ans en union ou en rupture d'union, 42 % ont déclaré avoir subi, à un moment donné, des actes de violence, que ce soit sous la forme émotionnelle, physique et/ou sexuelle commis par leur mari/partenaire.
- **Blessures dues à la violence conjugale de type physique ou sexuelle** : La proportion de femmes ayant subi, à un moment donné, n'importe quel type de blessures consécutives à des actes de violence physique commis par leur conjoint est de 43 %. Au cours des 12 derniers mois, ce pourcentage est de 49 %.
- **Recherche d'aide** : Plus d'un tiers (35 %) des femmes ayant subi des violences physiques ou sexuelles, ont déclaré avoir recherché de l'aide pour arrêter le cycle de la violence.

La violence basée sur le genre à l'encontre des femmes est reconnue dans le monde entier comme une violation des droits humains fondamentaux. D'importantes recherches ont mis en évidence les conséquences sur la santé, les effets intergénérationnels et les effets démographiques de ce type de violence (United Nations 2006). Ce chapitre porte sur la violence domestique, une forme de violence basée sur le genre. Elle est définie par les Nations Unies comme tout acte de violence pouvant causer aux femmes, aux jeunes filles, aux hommes et aux jeunes garçons un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de libertés.

L'EDSB-V 2017-2018 a inclus un module sur la violence domestique à l'encontre des femmes, une forme de violence basée sur le genre. Dans la moitié des ménages non tirés pour l'enquête homme, le module était administré à une seule femme dans le ménage, même si le ménage comprenait 2 femmes éligibles ou plus. En outre, la confidentialité de l'entretien était essentielle pour assurer la confiance de l'enquêtée et, dans les cas où la confidentialité ne pouvait être garantie, le module n'a pas été administré. Il était aussi important d'établir un climat de confiance pour la validité des données collectées.

16.1 MESURE DE LA VIOLENCE

On a demandé aux femmes célibataires si elles avaient subi des actes de violence commis par n'importe qui et aux femmes non célibataires, si elles avaient subi des actes de violence commis par leur conjoint actuel ou précédent et par d'autres personnes. De manière plus spécifique, la violence commise par le conjoint

actuel pour les femmes actuellement en union et par le conjoint le plus récent pour les femmes précédemment en union a été mesurée en demandant à toutes les femmes non célibataires s'il était déjà arrivé que leur conjoint leur ait fait l'une des choses suivantes :

- La **violence physique conjugale** a été évaluée au moyen des questions suivantes : Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre mari/partenaire vous bouscule, pousse, secoue, ou vous jette quelque chose ; vous gifle ; vous torde le bras ou vous tire les cheveux ; vous frappe à coups de poing ou avec quelque chose qui pouvait vous blesser ; vous donne des coups de pied, vous traîne par terre ou vous batte ; essaye de vous étrangler ou de vous brûler intentionnellement ; menace de vous attaquer avec un couteau, un fusil ou une autre arme ?
- La **violence sexuelle conjugale** a été évaluée à l'aide des questions suivantes : Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre mari/partenaire vous force physiquement à avoir des rapports sexuels avec lui contre votre propre gré ; vous force physiquement à pratiquer des actes sexuels que vous ne vouliez pas ; vous force sous la menace ou d'une autre manière à pratiquer des actes sexuels que vous ne vouliez pas ?
- La **violence émotionnelle conjugale** a été évaluée à l'aide des questions suivantes : Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre mari/partenaire vous dise ou vous fasse quelque chose pour vous humilier devant d'autres personnes ; vous menace de vous blesser ou de vous faire du mal, à vous ou quelqu'un qui vous est proche ; vous insulte ou vous rabaisse ?

En outre, on a collecté des informations auprès de toutes les femmes (en union et non en union) sur des actes de violence physique qu'elles ont subis commis par une personne quelconque (autre que le conjoint actuel ou le conjoint le plus récent) depuis l'âge de 15 ans ; pour cela, on leur a demandé si cette personne les avait frappées, giflées, si elle leur avait donné des coups de pied ou fait quelque chose d'autres pour les blesser physiquement. On a demandé à toutes les femmes si elles avaient subi des actes de violence sexuelle commis par n'importe quelle personne (autre que le conjoint actuel ou le conjoint le plus récent) : on leur a demandé si, quand elles étaient enfant ou à l'âge adulte, il leur était arrivé qu'on les force, de quelque manière que ce soit, à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer des actes sexuels qu'elles ne voulaient pas.

Dans ce chapitre, les femmes en union comprennent les femmes ayant déclaré être mariées et celles ayant déclaré qu'elles vivaient avec un homme comme si elles étaient mariées. De même, les conjoints incluent les maris des femmes mariées et les partenaires des femmes avec qui ils ne sont pas mariés mais avec qu'ils vivent ensemble comme s'ils étaient mariés.

16.2 VIOLENCE PHYSIQUE

Actes de violence physique commis par quelqu'un

Pourcentage de femmes qui ont subi des actes de violence physique (commis par un conjoint ou quelqu'un d'autre) depuis l'âge de 15 ans et dans les 12 derniers mois.

Échantillon : Femmes de 15-49 ans

Au Bénin, près de trois femmes de 15-49 ans sur dix (27 %) ont subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans (**Tableau 16.1**). Au cours des 12 derniers mois, ce pourcentage est de 12 %.


Variations par caractéristique

- Le pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant subi des actes de violence physique depuis l'âge de 15 ans varie en fonction de l'âge, passant de 22 % chez les femmes de 15-19 ans à 30 % chez celles de 25-29 ans.

- Les résultats selon les départements montrent que le pourcentage de femmes de 15-49 ans victimes d'actes de violence physique depuis l'âge de 15 ans varie de 20 % dans la Donga et l'Ouémé à 33 % dans l'Alibori.
- Le pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans est plus élevé chez celles qui ont travaillé et qui ont été rémunérées en argent (30 %) que chez les autres.

Le **Graphique 16.1** montre que le pourcentage des femmes de 15-49 ans qui ont subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans, est plus élevé parmi les divorcées/séparées/veuves (36 %) que chez celles qui sont mariées ou qui vivent avec un partenaire (28 %) et que les célibataires (24 %). Les mêmes variations sont observées au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête.

Graphique 16.1 Violence subie par les femmes selon leur état matrimonial



16.2.1 Auteurs des actes de violence physique

On a demandé aux femmes de 15-49 ans qui avaient déclaré avoir subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans qui était l'auteur de ces actes. Le **Tableau 16.2** montre que parmi les femmes ayant déjà été en union, 62 % ont déclaré que le mari/partenaire actuel était responsable de ces actes et 16 % ont déclaré que l'ancien mari ou le partenaire le plus récent s'était rendu coupable de ces actes de violence. Les femmes célibataires ont déclaré dans 35 % des cas que les actes de violence physique subis depuis l'âge de 15 ans avaient été commis par la mère/belle-mère et dans 23 % des cas par un autre parent. Pratiquement une femme célibataire sur cinq (19 %) a incriminé la sœur ou le frère et 17 % ont accusé le père ou le beau-père. (**Tableau 16.2**).

16.3 VIOLENCE SEXUELLE

Violence sexuelle

Pourcentage de femmes ayant subi des actes de violence sexuelle (commis par un conjoint ou par quelqu'un d'autre) à un certain moment de leur vie ou dans les 12 derniers mois.

Échantillon : Femmes de 15-49 ans

16.3.1 Prévalence de la violence sexuelle

Les résultats de l'EDSB-V révèlent qu'une femme de 15-49 ans sur dix (10 %) a subi des actes de violence sexuelle à un moment quelconque¹ de sa vie. Quand on considère seulement les douze derniers mois, ce pourcentage passe à 5 % (**Tableau 16.3**). Quatre pour cent des femmes ont subi les premiers actes de violence sexuelle avant d'atteindre 18 ans exacts. Dans 2 % des cas, ces actes de violence ont eu lieu avant l'âge de 15 ans exacts (**Tableau 16.4**).

¹ Y compris les violences subies au cours des douze derniers mois.

Variations par caractéristique

- Le pourcentage de femmes ayant subi des actes de violence sexuelle est nettement plus élevé parmi celles qui ont travaillé et qui ont été rémunérées en argent (11 % à un moment donné et 6 % au cours des 12 derniers mois) que chez celles qui ont travaillé sans contrepartie financière (9 % à un moment donné et 5 % au cours des 12 derniers mois) ou que celles qui ne travaillent pas (7 % à un moment donné et 4 % au cours des 12 derniers mois) (**Tableau 16.3**).
- Les résultats montrent que le pourcentage de femmes ayant déclaré avoir subi, à un moment donné, des actes de violence sexuelle a tendance à diminuer avec le niveau d'instruction, passant de 12 % parmi celles sans niveau d'instruction à 8 % parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus. Les résultats concernant les 12 derniers mois suivent la même tendance, passant respectivement de 6 % à 4 %.
- Le pourcentage de femmes ayant subi des actes de violence sexuelle ne varie que très peu entre les quatre premiers quintiles, Il est, par contre, plus faible dans le quintile le plus élevé que dans les autres (8 % par rapport à 11 % à un moment donné et 3 % par rapport à 5-7 % dans les 12 derniers mois).

16.3.2 Auteurs des actes de violence sexuelle

Les données du **Tableau 16.5** montrent que parmi les femmes de 15-49 ans qui ont déclaré avoir subi des violences sexuelles, les auteurs sont, dans la majorité des cas, les maris/partenaires actuels (72 %) ou les anciens maris/partenaires (20 %) pour les femmes en union ou en rupture d'union ; les célibataires ont déclaré dans 34 % des cas que l'auteur des violences sexuelles est un ami ou une rencontre et dans 29 % des cas un petit ami actuel ou ancien.

16.4 DIFFÉRENTES FORMES DE VIOLENCE

La violence à l'égard des femmes peut se manifester sous plusieurs formes. Le **Tableau 16.6** présente les pourcentages de femmes de 15-49 ans qui ont subi diverses formes de violence. Les résultats sont présentés selon l'âge de la femme.

Dans l'ensemble, un cinquième des femmes de 15-49 ans (20 %) ont subi des violences physiques seulement, 3 % des violences sexuelles seulement. Sept pour cent ont subi des actes de violence physique et sexuelle et 31 % des actes de violence physique ou sexuelle.

Au cours de l'enquête, on a demandé aux femmes actuellement enceintes ou qui l'avaient déjà été si elles avaient subi des actes de violence physique pendant une grossesse. Parmi ces femmes, 4 % ont déclaré avoir subi ce genre de comportement alors qu'elles étaient enceintes (**Tableau 16.7**). Le pourcentage de femmes ayant subi des actes de violence physique au cours d'une grossesse est plus élevé parmi celles de Cotonou (5 %), dans l'Atacora (7 %) et parmi celles en rupture d'union (7 %) que parmi les autres.

16.5 CONTRÔLE EXERCÉ PAR LE CONJOINT

Contrôle exercé par le conjoint

Pourcentage de femmes dont le conjoint actuel (si actuellement en union) ou le plus récent (si précédemment en union) a manifesté, au moins, un des comportements suivants : jaloux ou en colère si elle parle à d'autres hommes ; l'accuse fréquemment d'être infidèle ; ne lui permet pas de rencontrer ses amies ; essaye de limiter ses contacts avec sa famille ; insiste pour savoir où elle est à tout moment.

Échantillon : Femmes de 15-49 ans non célibataires

Certains comportements dominateurs du mari/partenaire qui ont pour but de contrôler divers aspects de la vie de la femme peuvent être précurseurs d'actes de violence contre la femme. Dans le but de mesurer le niveau de contrôle des maris/partenaires sur les femmes, on a demandé aux femmes en union ou en rupture d'union si leur mari/partenaire avait eu à leur égard certains comportements à savoir :

- Est jaloux si elles parlent à d'autres hommes ;
- Les accuse souvent d'être infidèles ;
- Ne leur permet pas de rencontrer leurs amies ;
- Essaie de limiter leurs contacts avec leur famille ;
- Insiste pour savoir où elles sont à tout moment ;

Les résultats du **Tableau 16.8** montrent dans l'ensemble que 54 % des femmes ont déclaré que leur mari était jaloux si elles parlaient à d'autres hommes ; plus d'une femme sur cinq ont déclaré que leur mari/partenaire les accusait souvent d'être infidèles (21 %), dans 28 % des cas, les femmes ont déclaré que leur mari/partenaire ne leur permettait pas de rencontrer leurs amies. Enfin, 41 % ont déclaré que leur mari/partenaire insistait à tout moment pour savoir où elle se trouvait. Globalement, 28 % des femmes non célibataires ont rapporté que leur mari/partenaire avait manifesté au moins 3 de ces comportements de contrôle.

Variations par caractéristique

- On constate que le pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ou en rupture d'union dont le mari/partenaire a manifesté au moins 3 types de comportements de contrôle est plus élevé chez les jeunes femmes que chez les plus âgées (39 % chez les 15-19 ans et 31 % à 20-24 ans contre 24 % à 40-49 ans).
- Les résultats montrent des écarts entre milieux de résidence, le pourcentage de femmes ayant déclaré au moins 3 comportements de contrôle variant de 25 % en milieu urbain à 30 % en milieu rural.
- Dans les départements, la proportion des femmes de 15-49 ans actuellement en union ou en rupture d'union ayant déclaré au moins 3 types de contrôle exercés par le mari/partenaire varie de 14 % dans l'Ouémé à 39 % dans l'Atacora.
- Les proportions de femmes de 15-49 ans non célibataires ayant déclaré au moins 3 types de contrôle exercés par le mari/partenaire diminuent avec le quintile de bien-être économique, passant de 32 % dans le plus bas à 23 % dans le plus élevé.
- On note variations selon que l'enquêtée a peur ou pas de son mari/partenaire, les proportions de femmes qui ont déclaré que leurs maris/partenaires avaient manifesté au moins trois comportements de contrôle à leur égard passant de 50 % chez celles qui en ont peur la plupart du temps à 21 % parmi celles qui en n'ont jamais peur.

16.6 FORMES DE VIOLENCE CONJUGALE

Violence conjugale

Pourcentage de femmes ayant subi l'un des actes spécifiés de violence physique, sexuelle ou émotionnelle commis par leur conjoint actuel (si actuellement en union) ou par le plus récent (si précédemment en union), à n'importe quel moment de leur vie et dans les 12 derniers mois.

Échantillon : Femmes de 15-49 ans non célibataires

16.6.1 Prévalence de la violence conjugale


Le **Tableau 16.9** révèle que parmi les femmes de 15-49 ans en union ou en rupture d'union, 42 % ont déclaré avoir subi, à un moment donné, n'importe quelle forme de violences, qu'elle soit physique, émotionnelle ou sexuelle exercées par leur mari/partenaire ; au cours des 12 derniers mois, ce pourcentage est de 32 %. Une femme non célibataire sur cinq (20 %) a déclaré avoir subi, à un moment donné, des actes de violence physique de la part d'un mari/partenaire, actuel pour les femmes actuellement en union ou précédent pour les femmes en rupture d'union. Au cours des 12 derniers mois, ce pourcentage est de 11 %. Dans la majorité des cas, les femmes ont rapporté avoir été giflées (16 % à un moment donné et 8 % au cours des 12 derniers mois) (**Graphique 16.2**).

En outre, 9 % des femmes non célibataires ont rapporté avoir subi, à un moment donné, au moins un acte de violence sexuelle ; au cours des 12 derniers mois, ce pourcentage est de 6 %. L'acte le plus fréquemment

rapporté est le recours à la violence physique pour imposer des rapports sexuels non souhaités (7 % à un moment donné et 5 % au cours des 12 derniers mois). Enfin, 37 % des femmes non célibataires ont déclaré avoir subi de la part de leur mari/partenaire, actuel ou le plus récent, des actes de violence émotionnelle, en grande partie sous forme d'insultes et d'humiliations (31 % à un moment donné et 24 % au cours des 12 derniers mois).

Graphique 16.2 Types d'actes de violence conjugale

Pourcentage de femmes de 15-49 ans non célibataires qui ont déjà subi certains actes de violence commis par leur mari/partenaire



Variations par caractéristique

- C'est dans le département du Plateau que le pourcentage de femmes ayant déclaré avoir subi des actes de violence conjugale, qu'ils soient émotionnels, physiques ou sexuels est le plus élevé (54 %) (**Graphique 16.3**).
- Le pourcentage de femmes ayant subi des actes de violence conjugale, sous différentes formes, a tendance à diminuer avec le niveau d'instruction, passant de 44 % parmi celles sans niveau d'instruction à 25 % parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus (**Tableau 16.10**).


Variations par caractéristique du conjoint et selon les indicateurs du pouvoir d'action des femmes

Le niveau de la violence conjugale contre la femme peut être influencé par certaines caractéristiques du mari/partenaire et il peut aussi varier en fonction des indicateurs du pouvoir d'action des femmes (**Tableau 16.11**).

- Les femmes dont le mari/partenaire n'a atteint que le niveau d'instruction primaire ont plus fréquemment déclaré avoir été victimes de violence conjugale sous une forme quelconque (46 %) que celles dont le mari a atteint le niveau secondaire 2^d cycle ou plus (28 %).
- La prévalence de la violence conjugale, quelle qu'en soit la forme, augmente avec le nombre de contrôles exercés par le mari/partenaire passant de 23 % chez les femmes dont le conjoint n'a exercé aucun contrôle à 67 %, chez celles dont le mari en a exercé 5.
- Le pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ou en rupture d'union ayant déclaré avoir subi des actes de violences émotionnelles, physiques ou sexuelles commis par le mari/partenaire actuel ou le plus récent est plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain (39 % contre 44 %) (**Tableau 16.10**).
- Le niveau de la violence conjugale augmente avec le nombre de raisons pour lesquelles les femmes pensent qu'il est justifié qu'un mari/partenaire batte sa femme, passant de 41 % quand aucune raison ne justifie la violence conjugale à 50 % quand le nombre de raisons est de 5.

Graphique 16.3 Violence conjugale par département


Pourcentage de femmes de 15-49 ans non célibataires qui ont déjà subi des actes de violence physique, sexuelle ou émotionnelle commis par leur mari/partenaire



- La prévalence de violence conjugale, qu'elle soit physique sexuelle ou émotionnelle, augmente avec le niveau de consommation d'alcool du mari/partenaire. Plus d'un tiers des femmes (34 %) dont le mari ne boit pas ont déclaré avoir subi des violences conjugales sous une forme quelconque contre 78 % de celles dont le mari est souvent ivre (**Graphique 16.4**).

Graphique 16.4 Violence conjugale selon la consommation d'alcool du mari/partenaire

Pourcentage de femmes non célibataires qui ont déjà subi des actes de violence conjugale (physique, sexuelle ou émotionnelle)



Le **Tableau 16.12** présente le pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ou en rupture d'union qui ont subi des violences émotionnelles, physiques, ou sexuelles exercées par n'importe conjoint au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête.

16.6.2 Premier épisode de violence conjugale

Le **Tableau 16.13** présente parmi les femmes de 15-49 ans actuellement en union et qui n'ont été en union qu'une seule fois, les pourcentages ayant subi des actes de violence conjugale par nombre exact d'années écoulées depuis l'union. On constate que pour 6 % des femmes, le premier épisode de violence s'est produit 2 ans après le début de l'union ; pour 15 % des femmes, il a eu lieu 5 ans après le début de l'union et pour 19 %, il s'est produit 10 ans après le début de l'union.

16.7 BLESSURES DUES À LA VIOLENCE CONJUGALE

Blessures dues à la violence conjugale

Pourcentage de femmes ayant subi les blessures suivantes à la suite d'actes de violence conjugale : entailles, hématomes, ou meurtrissures ; hématomes aux yeux, foulures, luxations ou brûlures ; blessures profondes, os cassés, dents cassées ou autres blessures sérieuses.

Échantillon : Femmes de 15-49 ans non célibataires qui ont subi des actes de violence physique ou sexuelle commis par leur conjoint actuel (si en union actuellement) ou par le conjoint le plus récent (si précédemment en union).

Dans l'ensemble, 39 % des femmes ayant subi des violences physiques ou sexuelles ont eu, à un moment donné, une blessure quelconque à la suite de ces actes violents perpétrés par leur mari/partenaire. Cette proportion est de 42 % au cours des douze derniers mois. Ces blessures sont sérieuses (par exemple, os ou dents cassés) dans 6 % des cas, à n'importe quel moment et dans 8% des cas récemment (**Tableau 16.14**).

16.8 VIOLENCE INITIÉE PAR LES FEMMES À L'ENCONTRE DE LEUR CONJOINT

Initiation de la violence physique par les épouses/partenaires

Pourcentage de femmes qui ont déjà frappé, giflé, ou donné des coups de pied ou fait autre chose pour blesser physiquement leur conjoint actuel (si actuellement en union) ou le conjoint le plus récent (si précédemment en union) alors que celui-ci ne les avait ni battues, ni blessées physiquement.

Échantillon : Femmes de 15-49 ans non célibataires

Les **Tableaux 16.15** et **16.16** montrent que 3 % des femmes de 15-49 ans ont exercé des violences physiques sur leurs maris/partenaires actuels, à n'importe quel moment, alors que ceux-ci n'avaient manifesté aucun comportement violent à leur égard. Au cours des douze derniers mois, ce pourcentage est d'environ 2 %.

Variations par caractéristique

- Le pourcentage de femmes ayant commis des actes de violence physique contre leur mari/partenaire est plus élevé quand les femmes ont, elles-mêmes, subi des comportements violents de la part de leur conjoint que quand elles n'ont jamais été confrontées à de tels comportements (10 % à un moment donné et 12 % au cours des 12 derniers mois contre 1 %). Le recours à la violence physique contre le mari/partenaire par les femmes semble plus fréquent quand les femmes travaillent que quand elles ne travaillent pas (3 % contre 1 %) (**Tableau 16.15**).
- Les résultats selon le département montrent des écarts, le pourcentage de femmes ayant agressé physiquement leur conjoint variant de 0 % dans la Donga à 4 % dans l'Atlantique et le Littoral (**Tableau 16.15**).
- La consommation d'alcool du mari/partenaire influence le recours à la violence physique par les femmes, le pourcentage de femmes ayant agressé physiquement leur conjoint variant de 1 % quand le conjoint ne boit pas à 10 % quand il souvent soûl. (**Tableau 16.16**).
- Le pourcentage de femmes ayant eu des comportements agressifs envers leur mari/partenaire varie avec le nombre de comportements de contrôle que ce dernier a exercés à leur encontre, passant de 2 % quand ce nombre est de 0 à 6 % quand il est de 5.
- Les enquêtées dont le père battait la mère (7 %) ont plus fréquemment commis des actes de violence contre leur conjoint que celles dont le père ne battait pas la mère (2 %) (**Tableau 16.16**).

16.9 RECHERCHE D'AIDE ET SOURCE DE L'AIDE


16.9.1 Recherche d'aide parmi les femmes qui ont subi des actes de violence

Plus d'un tiers (35 %) des femmes ayant subi des violences physiques ou sexuelles, ont déclaré avoir recherché de l'aide pour arrêter le cycle de la violence. Par contre, plus d'une femme sur deux (54 %) n'en a jamais parlé à quelqu'un ni recherché de l'aide (**Tableau 16.17**).

La recherche d'aide varie en fonction du type de violence subie ; le pourcentage de femmes ayant recherché de l'aide est plus élevé quand la violence s'est manifestée sous la forme physique seulement que sexuelle seulement (31 % contre 24 %). De même, dans le cas de violence sexuelle seulement, 67% des femmes n'ont jamais recherché d'aide ni parlé à quelqu'un de ce qui leur était arrivé contre 59 % dans le cas de violence physique (**Graphique 16.5**).

Graphique 16.5 Recherche d'aide par type de violence subie

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant subi des actes de violence physique ou sexuelle qui ont recherché de l'aide



Variations par caractéristique

- On note des variations entre départements, le pourcentage de femmes ayant recherché de l'aide passant de 26 % dans le Borgou et 27 % dans l'Atacora à 52 % dans l'Alibori.
- La proportion des femmes ayant recherché de l'aide pour arrêter la violence est plus faible chez les femmes célibataires (32 %) que chez celles en union (35 %) et en rupture d'union (43 %).

16.9.2 Sources auprès desquelles l'aide a été recherchée

Les femmes de 15-49 ans victimes de violence à la fois physique et sexuelle ont recherché dans 74 % des cas de l'aide auprès de leur propre famille. Dans 31 % des cas, elles ont sollicité l'aide de la famille du mari/partenaire et dans 19 % des cas, l'aide d'amis. Les services sociaux n'ont été contactés que dans moins d'un pour cent des cas (**Tableau 16.18**).

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur les caractéristiques des enquêtés, consultez les tableaux suivants :

- **Tableau 16.1** **Violence physique**
- **Tableau 16.2** **Auteurs des violences physiques**
- **Tableau 16.3** **Violence sexuelle**
- **Tableau 16.4** **Âge au moment de la première expérience de violence sexuelle**
- **Tableau 16.5** **Auteurs des violences sexuelles**
- **Tableau 16.6** **Expérience de diverses formes de violence**
- **Tableau 16.7** **Violence pendant la grossesse**
- **Tableau 16.8** **Contrôle exercé par les maris selon les déclarations des épouses**
- **Tableau 16.9** **Formes de violence conjugale**
- **Tableau 16.10** **Violence conjugale selon certaines caractéristiques sociodémographiques**
- **Tableau 16.11** **Violence conjugale selon les caractéristiques du mari/partenaire et les indicateurs du pouvoir d'action de la femme**
- **Tableau 16.12** **Violences conjugales au cours des 12 derniers mois**
- **Tableau 16.13** **Premier épisode de violence conjugale selon la durée de l'union**
- **Tableau 16.14** **Blessures dues à la violence conjugale**
- **Tableau 16.15** **Violence des enquêtées contre leurs conjoints selon les caractéristiques des enquêtées**
- **Tableau 16.16** **Violence des enquêtées contre leur conjoint selon les caractéristiques du conjoint et les indicateurs du pouvoir d'action de l'enquêtée**
- **Tableau 16.17** **Recherche de l'aide pour mettre fin à la violence**
- **Tableau 16.18** **Sources/personnes auprès desquelles l'aide pour mettre fin à la violence a été recherché**

Tableau 16.1 Violence physique

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans et pourcentage de femmes qui ont subi des violences physiques au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes qui ont subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans ¹	Pourcentage ayant subi des actes de violence physique au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête			Effectif de femmes
		Souvent	Parfois	Souvent ou parfois ²	
Age					
15-19	22,3	4,0	9,2	13,2	1 064
20-24	25,7	2,6	7,6	10,2	960
25-29	29,9	4,1	9,3	13,4	983
30-39	29,2	5,1	6,9	12,1	1 435
40-49	28,7	5,3	5,7	11,0	966
Religion					
Vodou	30,8	4,7	8,6	13,3	450
Autre traditionnelle	(24,9)	(9,7)	(9,7)	(19,3)	36
Islam	24,8	6,9	6,7	13,6	1 581
Catholique	25,7	2,1	7,5	9,6	1 338
Protestant Méthodiste	21,8	3,7	4,7	8,7	250
Autres Protestants	33,0	3,1	7,4	10,5	208
Célestes	29,3	3,9	8,8	12,7	431
Autres chrétiens	30,5	3,1	8,6	11,7	751
Autres religions	14,4	0,0	2,7	2,7	67
Aucune	34,9	4,8	12,6	17,4	295
Résidence					
Cotonou	30,9	2,9	9,5	12,5	318
Autres villes	25,9	3,7	7,8	11,6	1 962
Ensemble urbain	26,6	3,6	8,1	11,7	2 280
Rural	27,7	4,8	7,4	12,3	3 128
Département					
Alibori	33,2	15,0	6,7	21,7	600
Atacora	29,6	3,4	12,0	15,4	455
Atlantique	30,7	3,1	6,6	9,8	694
Borgou	21,1	1,6	7,0	8,7	631
Collines	29,2	3,4	12,6	15,9	375
Couffo	28,0	3,2	7,4	10,6	349
Donga	19,9	2,8	8,3	11,1	310
Littoral	30,9	2,9	9,5	12,5	318
Mono	24,6	3,7	6,4	10,1	253
Ouémé	20,4	1,8	4,8	6,6	520
Plateau	29,4	5,9	5,5	11,5	329
Zou	28,1	2,6	7,6	10,2	573
État matrimonial					
Célibataire	23,5	3,2	7,9	11,1	1 258
En union	27,8	4,4	7,7	12,1	3 831
En rupture d'union	36,1	7,5	7,6	15,1	318
Emploi					
A travaillé et a été rémunérée en argent	30,0	4,7	7,1	11,8	3 382
A travaillé mais n'a pas été rémunérée en argent	23,7	3,7	9,7	13,4	894
Ne travaille pas	21,8	3,5	8,1	11,6	1 132
Nombre d'enfants vivants					
0	24,1	3,3	7,3	10,6	1 397
1-2	26,4	3,8	8,1	11,9	1 489
3-4	30,5	6,0	9,0	15,1	1 352
5+	28,4	4,1	6,2	10,4	1 170
Niveau d'instruction					
Aucun	28,3	6,0	7,4	13,4	3 022
Primaire	29,3	2,9	9,1	12,0	1 047
Secondaire 1 ^{er} cycle	23,7	1,9	8,4	10,3	951
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	22,5	1,1	4,7	5,8	388
Quintiles de bien-être économique					
Le plus bas	26,3	5,2	8,4	13,6	869
Second	30,3	5,9	9,2	15,1	977
Moyen	27,9	5,5	7,7	13,2	1 110
Quatrième	26,4	3,1	6,9	10,0	1 200
Le plus élevé	25,8	2,5	6,9	9,5	1 252
Ensemble	27,3	4,3	7,7	12,0	5 408

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

¹ Y compris les violences subies au cours des 12 derniers mois. Pour les femmes qui étaient en union avant l'âge de 15 ans et qui ont déclaré avoir subi des violences physiques commises par leurs maris, il est possible que ces actes de violence aient été commis avant l'âge de 15 ans.

² Y compris les femmes pour lesquelles la fréquence des actes de violence au cours des 12 mois n'est pas connue.

Tableau 16.2 Auteurs des violences physiques

Parmi les femmes de 15-49 ans qui ont déclaré avoir subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans, pourcentage ayant mentionné différents types d'auteurs des violences, selon l'état matrimonial actuel de l'enquêtée, EDSB-V Bénin 2017-2018

Auteurs des violences	État matrimonial		Ensemble
	En union ou en rupture d'union	Célibataire	
Mari/partenaire actuel	61,6	na	49,2
Ancien mari/partenaires le plus récent	16,0	na	12,8
Petit ami	0,2	1,1	0,4
Ancien petit ami	3,5	4,9	3,8
Père/Beau-père	8,0	17,2	9,8
Mère/Belle-mère	13,1	35,1	17,5
Sœur/frère	9,4	18,5	11,2
Sœur/Fils	0,0	0,0	0,0
Autre parent	11,0	23,3	13,4
Belle-mère	0,6	na	0,7
Beau-père	0,3	na	0,3
Autre parent par alliance	1,5	na	1,4
Enseignant	1,2	10,6	3,1
Employeur/quelqu'un au travail	1,6	8,2	2,9
Autre	4,3	7,5	5,0
Effectif de femmes qui ont subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	1 178	296	1 474

Note : Une enquêtée pouvait déclarer plus d'un auteur de violence.
na = Non applicable

Tableau 16.3 Violence sexuelle

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont subi des violences sexuelles à n'importe quel moment et pourcentage de femmes qui ont subi des violences sexuelles au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant subi des actes de violence :		Effectif de femmes
	A un moment quelconque ¹	Au cours des 12 derniers mois	
Age			
15-19	6,3	2,9	1 064
20-24	9,5	5,2	960
25-29	12,2	6,8	983
30-39	11,7	6,7	1 435
40-49	10,5	4,0	966
Religion			
Vodoun	11,6	6,7	450
Autre traditionnelle	(12,8)	(4,0)	36
Islam	8,3	3,7	1 581
Catholique	8,9	4,4	1 338
Protestante Méthodiste	9,2	5,6	250
Autres Protestants	10,8	5,5	208
Célestes	11,9	7,4	431
Autres chrétiens	14,0	7,7	751
Autres religions	4,3	4,3	67
Aucune	11,3	5,6	295
Résidence			
Cotonou	10,1	2,8	318
Autres villes	8,4	4,4	1 962
Ensemble urbain	8,6	4,2	2 280
Rural	11,2	6,0	3 128
Département			
Alibori	8,9	4,7	600
Atacora	10,6	4,1	455
Atlantique	11,3	5,7	694
Borgou	11,1	5,1	631
Collines	13,4	7,1	375
Couffo	12,5	7,1	349
Donga	3,9	1,8	310
Littoral	10,1	2,8	318
Mono	8,2	5,0	253
Ouémé	9,0	6,3	520
Plateau	13,1	9,3	329
Zou	8,2	4,0	573
État matrimonial			
Célibataire	6,1	1,7	1 258
En union	11,2	6,3	3 831
En rupture d'union	12,4	6,0	318
Emploi			
A travaillé et a été rémunéré en argent	11,4	5,8	3 382
A travaillé mais n'a pas été rémunéré en argent	9,4	4,8	894
Ne travaille pas	6,8	4,1	1 132
Nombre d'enfants vivants			
0	6,6	2,3	1 397
1-2	10,8	6,0	1 489
3-4	11,8	7,1	1 352
5+	11,5	5,7	1 170
Niveau d'instruction			
Aucun	11,5	6,2	3 022
Primaire	9,6	4,8	1 047
Secondaire 1 ^{er} cycle	7,2	3,3	951
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	8,2	3,6	388
Quintiles de bien-être économique			
Le plus bas	10,5	6,0	869
Second	10,9	6,7	977
Moyen	10,7	5,3	1 110
Quatrième	11,4	5,5	1 200
Le plus élevé	7,5	3,2	1 252
Ensemble	10,1	5,2	5 408

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

¹ Y compris les violences subies au cours des 12 derniers mois.

Tableau 16.4 Âge au moment de la première expérience de violence sexuelle

Pourcentage de femmes 15-49 ans qui ont subi les premiers actes de violences sexuelles avant d'atteindre certains âges exacts, selon l'âge actuel et l'état matrimonial actuel, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage qui ont subi les premiers actes de violences sexuelles avant d'atteindre certains âges exacts :					Pourcentage de femmes qui n'ont jamais suivi de violences sexuelles	Effectif de femmes
	10	12	15	18	22		
Âge							
15-19	0,0	0,8	2,5	na	na	93,7	1 064
20-24	0,4	0,8	1,4	3,9	na	90,5	960
25-29	0,2	0,9	1,5	3,9	7,2	87,8	983
30-39	0,5	0,6	1,2	3,3	5,0	88,3	1 435
40-49	0,2	0,4	1,4	3,5	5,9	89,5	966
État matrimonial							
Célibataire	0,0	0,8	1,8	4,5	5,8	93,9	1 258
En union ou en rupture d'union	0,4	0,7	1,5	3,9	6,5	88,7	4 150
Ensemble	0,3	0,7	1,6	4,0	6,3	89,9	5 408

na = Non applicable

Tableau 16.5 Auteurs des violences sexuelles

Parmi les femmes de 15-49 ans qui ont déclaré avoir subi des violences sexuelles, pourcentage ayant mentionné différents types d'auteurs des violences, selon l'état matrimonial actuel de l'enquêtée, EDSB-V Bénin 2017-2018

Auteurs des violences	État matrimonial		
	En union ou en rupture d'union	Célibataire	Ensemble
Mari/partenaire actuel	71,5	na	61,5
Ancien Mari/partenaire	19,9	na	17,1
Petit ami actuel/ancien	3,4	29,3	7,0
Frère/Beau-Frère	0,1	1,4	0,3
Autre parent	2,3	1,3	2,2
Beaux-parents	0,3	na	0,3
Ami propre/Rencontre	6,9	34,1	10,8
Ami de la famille	1,5	15,8	3,5
Enseignant	0,6	5,5	1,3
Inconnu	3,5	6,0	3,8
Autre	0,8	6,7	1,6
Effectif des femmes ayant subi des actes des violences sexuelles	469	77	546

Note : Les femmes déjà mariées peuvent signaler jusqu'à trois auteurs: un mari actuel, un ancien mari ou une autre personne qui n'est pas un mari actuel ou un ancien. Les femmes célibataires ne peuvent signaler que la personne qui a été la première à commettre des actes de violence.
na = Non applicable

Tableau 16.6 Expérience de diverses formes de violence

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont subi diverses formes de violence, selon l'âge actuel, EDSB-V Bénin 2017-2018

Âge	Violence physique seulement	Violence sexuelle seulement	Violence physique et sexuelle	Violence physique ou sexuelle	Effectif de femmes
15-19	18,8	2,8	3,5	25,0	1 064
15-17	18,8	1,7	3,1	23,7	669
18-19	18,7	4,5	4,1	27,3	395
20-24	19,7	3,5	6,0	29,2	960
25-29	21,9	4,1	8,1	34,0	983
30-39	20,7	3,1	8,5	32,3	1 435
40-49	20,7	2,5	8,0	31,2	966
Ensemble	20,4	3,2	6,9	30,5	5 408

Tableau 16.7 Violence pendant la grossesse

Parmi les femmes de 15-49 ans actuellement enceintes ou qui ont déjà été enceintes, pourcentage de celles qui ont déclaré avoir subi des violences physiques pendant qu'elles étaient enceintes, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes ayant subi des violences pendant leur grossesse	Effectif de femmes actuellement enceintes ou l'ayant déjà été
Age		
15-19	2,4	237
20-24	3,9	687
25-29	4,4	936
30-39	3,7	1 420
40-49	3,7	957
Religion		
Vodoun	3,8	383
Autre traditionnelle	(3,1)	32
Islam	3,5	1 292
Catholique	3,7	965
Protestante Méthodiste	4,2	187
Autres Protestants	5,0	157
Célestes	6,3	344
Autres chrétiens	2,9	575
Autres religions	0,0	56
Aucune	4,5	245
Résidence		
Cotonou	5,3	233
Autres villes	2,6	1 479
Ensemble urbain	3,0	1 712
Rural	4,4	2 525
Département		
Alibori	2,8	514
Atacora	7,1	369
Atlantique	3,4	528
Borgou	3,5	476
Collines	3,4	308
Couffo	2,8	265
Donga	3,2	265
Littoral	5,3	233
Mono	4,2	199
Ouémé	4,7	401
Plateau	3,9	251
Zou	2,3	427
État matrimonial		
Célibataire	5,8	182
En union	3,5	3 742
En rupture d'union	6,6	312
Nombre d'enfants vivants		
0	1,8	225
1-2	3,8	1 489
3-4	4,0	1 352
5+	4,0	1 170
Niveau d'instruction		
Aucun	3,6	2 730
Primaire	4,4	788
Secondaire 1 ^{er} cycle	4,2	533
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	3,3	184
Quintiles de bien-être économique		
Le plus bas	4,4	750
Second	4,0	797
Moyen	4,6	888
Quatrième	2,5	900
Le plus élevé	3,6	902
Ensemble	3,8	4 237

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Tableau 16.8 Contrôle exercé par les maris selon les déclarations des épouses

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ou en rupture d'union ayant déclaré certains types de contrôle exercé par le mari/partenaire, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes dont le mari/partenaire :							Effectif des femmes en union ou en rupture d'union
	Est jaloux si elles parlent à d'autres hommes	Les accuse souvent d'être infidèles	Ne leur permet pas de rencontrer leurs amies	Essaie de limiter leurs contacts avec leur famille	Insiste pour savoir où elles sont à tout moment	A manifesté au moins 3 de ces comportements	N'a manifesté aucun de ces comportements	
Age								
15-19	55,8	30,7	34,6	26,1	51,3	38,7	31,9	218
20-24	57,3	21,5	31,0	24,0	47,0	31,4	32,5	642
25-29	57,3	18,1	29,1	20,9	44,3	28,6	31,8	925
30-39	53,7	21,8	27,6	20,4	37,5	26,5	34,1	1 408
40-49	46,9	21,2	24,8	16,7	35,0	24,2	40,4	956
Religion								
Vodoun	56,3	16,2	30,5	17,9	44,1	28,0	30,7	385
Autre traditionnelle	(56,3)	(21,1)	(25,7)	(25,2)	(35,5)	(28,5)	(40,2)	32
Islam	57,7	24,2	26,8	20,9	42,3	27,9	34,5	1 277
Catholique	51,1	20,9	28,2	19,5	34,7	26,0	36,6	914
Protestante Méthodiste	46,6	27,2	30,0	17,2	39,4	31,0	38,3	190
Autres Protestants	60,2	23,0	35,1	23,9	50,5	30,5	25,4	159
Célestes	51,6	24,2	32,6	25,2	44,7	33,0	31,1	338
Autres chrétiens	51,1	15,3	24,5	18,8	40,9	25,9	36,1	568
Autres religions	37,0	15,9	13,8	6,5	27,8	18,1	51,2	57
Aucune	50,4	20,3	32,2	27,7	41,4	29,8	34,9	232
Résidence								
Cotonou	56,7	16,1	27,6	14,8	36,8	25,4	31,1	223
Autres villes	54,1	18,4	25,6	18,3	39,2	25,2	35,9	1 428
Ensemble urbain	54,4	18,1	25,9	17,8	38,9	25,3	35,3	1 651
Rural	53,0	23,3	29,7	22,3	41,8	29,5	34,3	2 499
Département								
Alibori	63,5	45,8	37,0	32,5	39,5	37,9	32,2	514
Atacora	63,5	25,1	37,1	30,0	51,5	38,5	24,8	346
Atlantique	54,4	22,6	30,7	21,9	43,7	29,0	28,7	517
Borgou	49,3	13,4	23,7	19,9	39,6	23,0	41,5	465
Collines	45,1	25,3	22,5	18,4	37,1	29,5	42,5	289
Couffo	53,6	10,8	26,1	18,0	55,3	24,0	26,4	265
Donga	66,6	10,9	20,3	9,8	54,0	20,6	24,3	262
Littoral	56,7	16,1	27,6	14,8	36,8	25,4	31,1	223
Mono	45,4	11,9	25,8	21,3	31,0	22,3	43,3	199
Ouémé	39,2	10,0	18,7	10,4	24,7	14,0	48,5	393
Plateau	58,8	24,6	26,9	12,5	48,2	31,7	30,7	253
Zou	47,5	20,9	33,1	23,8	32,7	31,0	39,3	425
État matrimonial								
En union	53,7	20,7	27,9	20,3	41,1	27,5	34,3	3 831
En rupture d'union	52,7	27,2	31,6	22,6	35,6	32,5	39,1	318
Nombre d'enfants vivants								
0	57,7	22,9	29,7	21,0	45,4	29,6	29,9	259
1-2	57,3	21,1	29,2	22,1	44,0	29,9	32,6	1 382
3-4	53,5	21,5	27,9	20,5	40,7	28,0	34,0	1 340
5+	48,5	20,7	26,9	18,6	35,7	24,8	38,9	1 169
Emploi								
A travaillé et a été rémunéré en argent	52,5	19,8	26,2	18,5	39,9	26,2	35,3	3 077
A travaillé mais n'a pas été rémunéré en argent	61,9	29,7	35,2	27,3	45,6	33,4	26,5	506
Ne travaille pas	52,2	21,4	33,0	25,3	40,3	31,8	38,5	566
Niveau d'instruction								
Aucun	52,6	23,1	28,1	21,7	40,7	28,3	35,4	2 743
Primaire	55,1	19,2	28,0	18,9	39,2	26,9	33,2	765
Secondaire 1 ^{er} cycle	56,9	17,7	30,2	20,1	43,5	29,1	32,0	480
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	53,9	9,6	24,0	9,0	37,9	21,0	37,2	161
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	55,5	24,7	32,0	23,9	44,5	32,1	33,8	751
Second	52,1	25,7	29,7	25,4	40,4	30,2	35,0	780
Moyen	54,8	24,1	30,2	22,4	41,3	29,3	32,3	852
Quatrième	51,5	17,7	25,0	17,6	41,2	25,6	35,8	891
Le plus élevé	54,2	15,1	24,8	14,5	36,5	22,9	36,3	875
L'enquêtee a peur de son mari/partenaire								
A peur la plupart du temps	75,8	37,6	44,0	35,2	66,7	50,2	13,2	428
A parfois peur	60,3	25,5	30,7	23,6	43,5	30,8	29,4	1 624
N'a jamais peur	43,9	14,6	23,0	15,1	33,1	21,0	43,2	2 098
Ensemble	53,6	21,2	28,2	20,5	40,7	27,8	34,7	4 150

Note : Le mari/partenaire se réfère au mari/partenaire actuel pour les femmes actuellement en union, et au mari/partenaire le plus récent pour les femmes en rupture d'union. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Tableau 16.9 Formes de violence conjugale

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ou en rupture d'union ayant subi diverses formes de violence de la part de leur mari/partenaire à n'importe quel moment ou au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête, EDSB-V Bénin 2017-2018

Formes de violence	A n'importe quel moment	Au cours des 12 derniers mois	Fréquence au cours des 12 mois précédant l'enquête	
			Souvent	Parfois
VIOLENCE CONJUGALE COMMISE PAR LE MARI/PARTENAIRE ACTUEL OU LE PLUS RÉCENT¹				
Violence physique				
N'importe quelle forme	19,5	11,1	4,5	6,7
A été bousculée, secouée, on a jeté quelque chose contre elle	9,8	6,7	2,9	3,8
A été giflée	15,6	8,0	2,4	5,6
A eu le bras tordu ou les cheveux tirés	4,1	2,3	0,8	1,5
A été frappée à coup de poing ou avec quelque chose qui pouvait faire mal	7,7	4,4	1,3	3,1
A reçu des coups de pied, a été traînée à terre ou a été battue	5,3	3,1	1,1	2,0
On a essayé de l'étrangler ou de la brûler	1,4	1,1	0,6	0,5
A été menacée avec un couteau, un fusil ou un autre type d'arme	1,3	0,8	0,3	0,5
Violence sexuelle				
N'importe quelle forme	8,8	6,1	1,6	4,4
A été forcée physiquement à avoir des rapports sexuels avec le mari/partenaire quand elle ne voulait pas	7,4	4,7	1,2	3,5
A été forcée physiquement à pratiquer certains actes sexuels avec le mari/partenaire qu'elle ne voulait pas.	3,2	2,5	0,5	2,0
A été forcée sous la menace ou d'une autre manière à pratiquer des actes sexuels qu'elle ne voulait pas	2,7	2,0	0,8	1,3
Violence émotionnelle				
N'importe quelle forme	36,7	28,7	10,5	18,2
Le mari/partenaire a dit ou fait quelque chose pour l'humilier devant d'autres personnes	25,2	18,7	6,7	12,0
Le mari/partenaire l'a menacée méchamment, elle ou quelqu'un proche d'elle.	10,9	7,9	2,5	5,4
Le mari/partenaire l'a insultée ou rabaissée.	30,7	23,8	7,7	16,1
N'importe quelle forme de violence physique et/ou sexuelle	22,4	13,9	5,1	8,8
N'importe quelle forme de violence émotionnelle, physique et/ou sexuelle	41,8	31,8	12,4	19,5
VIOLENCE CONJUGALE COMMISE PAR N'IMPORTE QUEL MARI/PARTENAIRE				
Violence physique	20,7	11,2	na	na
Violence sexuelle	9,6	6,1	na	na
Violence émotionnelle	37,6	28,7	na	na
N'importe quelle forme de violence physique et/ou sexuelle	23,8	13,9	na	na
N'importe quelle forme de violence émotionnelle ou physique ou sexuelle	42,8	31,9	na	na
Effectif de femmes en union ou en rupture d'union	4 150	4 150	4 150	4 150

na = Non applicable

¹ Le mari/partenaire correspond au mari/partenaire actuel pour les femmes actuellement en union et au mari/partenaire le plus récent pour les femmes en rupture d'union

Tableau 16.10 Violence conjugale selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ou en rupture d'union qui ont subi des violences émotionnelles, physiques, ou sexuelles exercées par leur mari/partenaire actuel ou le plus récent, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Violence émotionnelle	Violence physique	Violence sexuelle	Violence physique et sexuelle	Violence émotionnelle, physique et sexuelle	Violence physique ou sexuelle	Violence émotionnelle physique ou sexuelle	Effectif de femmes en union ou en rupture d'union
Age								
15-19	23,2	12,1	7,4	2,1	1,7	17,3	30,9	218
20-24	31,3	15,0	8,0	4,4	3,9	18,6	37,1	642
25-29	39,3	20,6	10,1	6,6	5,8	24,1	44,2	925
30-39	38,2	20,9	9,6	6,9	6,2	23,7	42,6	1 408
40-49	38,8	21,0	7,1	5,3	4,8	22,8	43,8	956
Religion								
Vodoun	43,7	21,6	11,6	7,7	7,1	25,6	48,1	385
Autre traditionnelle	(29,5)	(22,7)	(7,4)	(6,5)	(4,9)	(23,6)	(33,3)	32
Islam	32,9	21,1	7,5	6,0	5,3	22,6	38,2	1 277
Catholique	34,5	17,0	7,2	3,9	3,7	20,3	40,1	914
Protestante Méthodiste	35,7	18,2	7,9	3,1	2,4	23,0	41,3	190
Autres Protestants	41,4	17,9	7,8	5,1	4,6	20,6	45,3	159
Célestes	41,1	18,1	10,3	7,0	6,1	21,4	44,4	338
Autres chrétiens	38,2	17,5	11,6	6,7	5,6	22,3	43,7	568
Autres religions	20,1	4,5	3,0	0,7	0,7	6,8	22,4	57
Aucune	47,6	29,2	11,1	9,1	8,9	31,2	52,9	232
Résidence								
Cotonou	31,3	16,3	6,1	4,7	3,8	17,6	36,3	223
Autres villes	34,4	18,2	7,6	4,8	4,0	21,1	39,0	1 428
Ensemble urbain	34,0	17,9	7,4	4,8	4,0	20,6	38,6	1 651
Rural	38,6	20,6	9,7	6,5	6,0	23,7	43,9	2 499
Département								
Alibori	31,9	30,6	7,9	7,7	7,7	30,7	37,5	514
Atacora	45,8	23,3	8,2	4,1	4,1	27,3	51,0	346
Atlantique	37,2	20,9	7,8	5,7	4,8	23,1	43,2	517
Borgou	37,1	18,8	11,8	9,7	9,1	20,9	41,5	465
Collines	34,4	20,3	12,4	7,4	5,0	25,3	42,7	289
Couffo	31,3	14,6	11,3	5,5	5,2	20,4	36,3	265
Donga	35,4	19,4	4,1	3,3	1,7	20,1	42,0	262
Littoral	31,3	16,3	6,1	4,7	3,8	17,6	36,3	223
Mono	39,2	20,0	8,3	4,8	4,5	23,5	43,8	199
Ouémé	33,4	15,2	8,7	3,3	2,9	20,7	38,3	393
Plateau	50,9	16,7	12,3	7,4	6,6	21,6	53,8	253
Zou	36,2	11,8	6,5	4,1	3,8	14,2	38,9	425
État matrimonial								
En union	36,6	18,8	8,7	5,7	5,0	21,8	41,6	3 831
En rupture d'union	38,2	27,6	9,8	7,5	7,3	29,9	43,7	318
Nombre d'enfants vivants								
0	28,9	7,7	5,6	2,7	1,8	10,6	31,9	259
1-2	32,9	16,4	8,4	4,7	4,3	20,1	38,2	1 382
3-4	40,8	23,5	9,5	6,8	6,3	26,3	45,8	1 340
5+	38,3	21,2	9,1	6,8	5,8	23,5	43,7	1 169
Emploi								
A travaillé et a été rémunéré en argent	38,2	20,1	9,1	6,1	5,3	23,1	43,2	3 077
A travaillé mais n'a pas été rémunéré en argent	39,4	19,5	9,8	6,0	6,0	23,2	45,3	506
Ne travaille pas	26,2	16,1	6,3	4,1	3,7	18,2	31,1	566
Niveau d'instruction								
Aucun	38,6	21,4	9,7	6,9	6,2	24,2	43,6	2 743
Primaire	38,6	19,7	7,8	4,8	4,6	22,6	43,7	765
Secondaire 1 ^{er} cycle	29,6	12,7	5,3	2,8	1,8	15,2	34,4	480
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	17,6	6,8	7,4	0,8	0,8	13,4	24,6	161
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	38,5	19,8	9,7	7,2	7,0	22,4	42,9	751
Second	38,9	23,9	10,4	8,2	7,2	26,1	45,3	780
Moyen	37,6	21,0	9,4	6,7	6,2	23,8	43,2	852
Quatrième	37,1	17,0	8,8	4,9	4,1	20,9	41,4	891
Le plus élevé	32,0	16,4	5,8	2,7	2,0	19,5	36,7	875
Ensemble	36,7	19,5	8,8	5,8	5,2	22,4	41,8	4 150

Note : Le mari/partenaire correspond au mari/partenaire actuel pour les femmes actuellement en union et au mari/partenaire le plus récent pour les femmes en rupture d'union. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Tableau 16.11 Violence conjugale selon les caractéristiques du mari/partenaire et les indicateurs du pouvoir d'action de la femme

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ou en rupture d'union qui ont subi des violences émotionnelles, physiques, ou sexuelles exercées par leur mari/partenaire actuel ou le plus récent, selon les caractéristiques du mari/partenaire et les indicateurs du pouvoir d'action de la femme, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Violence émotionnelle	Violence physique	Violence sexuelle	Violence physique et sexuelle	Violence émotionnelle physique et sexuelle	Violence physique ou sexuelle	Violence émotionnelle ou physique ou sexuelle	Effectif de femmes en union ou en rupture d'union
Niveau d'instruction du mari/partenaire¹								
Aucun	37,6	20,8	9,5	6,9	6,1	23,3	42,9	1 959
Primaire	40,1	21,0	9,8	6,7	5,9	24,1	45,6	814
Secondaire 1 ^{er} cycle	33,2	13,8	7,7	3,6	3,2	17,9	38,5	462
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	26,3	10,9	3,7	1,2	1,0	13,4	28,3	426
Ne sait pas/manquant	43,5	19,8	9,5	3,7	2,5	25,6	50,0	170
Consommation d'alcool par le mari/partenaire								
Ne boit pas d'alcool	28,9	14,8	6,0	3,4	3,1	17,4	33,9	2 995
Boit mais jamais saoule	55,1	20,1	9,4	5,2	4,6	24,3	58,5	400
Saoule parfois	53,5	30,9	16,7	13,2	11,4	34,4	58,8	535
Saoule souvent	68,9	54,9	25,9	21,8	19,8	59,0	77,5	220
Différence d'instruction entre conjoints¹								
Mari plus instruit	34,9	17,0	8,2	4,9	4,3	20,3	39,3	1 339
Femme plus instruite	34,9	16,1	8,7	5,4	4,6	19,5	40,5	496
Même niveau d'instruction	39,6	11,7	4,0	1,0	1,0	14,7	42,7	118
Les deux sans instruction	37,5	21,4	9,3	6,9	6,2	23,8	42,9	1 708
Ne sait pas/manquant	43,5	19,8	9,5	3,7	2,5	25,6	50,0	170
Différence d'âge entre conjoints¹								
Femme plus âgée	41,0	15,5	11,3	5,5	5,2	21,3	43,1	190
Femme de même âge	26,4	17,0	5,5	3,7	2,5	18,8	31,5	90
Femme plus jeune de 1-4 ans	35,1	18,4	10,6	6,9	6,5	22,0	40,1	1 148
Femme plus jeune de 5-9 ans	36,3	20,7	7,3	5,0	4,1	23,0	42,8	1 321
Femme plus jeune de 10 ou +	38,7	17,8	8,2	5,4	4,8	20,6	42,5	1 083
Nombre de contrôles exercés par le mari/partenaire sur sa femme²								
0	18,8	9,3	3,2	1,9	1,3	10,6	22,6	1 439
1-2	37,9	16,1	6,5	3,2	2,8	19,5	43,2	1 555
3-4	56,8	32,6	16,9	12,3	11,0	37,2	62,6	831
5	59,3	47,2	23,4	19,3	19,3	51,4	67,1	325
Nombre de décisions auxquelles la femme a participé³								
0	39,8	21,4	9,9	7,3	6,5	24,1	45,4	1 002
1-2	36,5	19,3	8,2	5,3	4,5	22,3	41,4	1 382
3	34,5	16,5	8,3	5,0	4,5	19,8	39,2	1 447
Nombre de raisons pour lesquelles il est justifié qu'un mari batte sa femme⁴								
0	36,5	15,7	7,0	4,6	4,1	18,1	40,6	2 785
1-2	37,4	22,1	11,2	6,3	5,3	27,0	43,7	563
3-4	34,6	29,4	12,7	9,3	8,2	32,9	42,0	515
5	41,2	33,2	14,2	10,7	10,6	36,7	49,8	286
Le père de la femme battait sa femme								
Oui	62,3	44,4	20,4	16,4	15,7	48,3	69,0	403
Non	33,2	16,1	7,1	4,2	3,6	18,9	38,1	3 549
Ne sait pas/manquant	47,7	30,6	15,9	12,8	12,0	33,6	53,4	198
La femme a peur du mari/partenaire								
La plupart du temps	66,6	50,8	28,6	24,8	23,9	54,6	72,6	428
De temps en temps à peur	40,2	23,4	8,8	5,8	4,9	26,4	46,4	1 624
Jamais eu peur	27,9	10,1	4,7	2,0	1,6	12,9	32,0	2 098
Ensemble	36,7	19,5	8,8	5,8	5,2	22,4	41,8	4 150

Note : Le mari/partenaire correspond au mari/partenaire actuel pour les femmes actuellement en union et au mari/partenaire le plus récent pour les femmes en rupture d'union.

¹ Comprends seulement les femmes actuellement en union.

² Selon les déclarations de la femme. Voir Tableau 16.8 pour la liste des contrôles.

³ Selon les déclarations de la femme. Comprends seulement les enquêtés qui sont actuellement en union. Voir Tableau 14.9.1 pour la liste des décisions.

⁴ Selon les déclarations de la femme. Voir Tableau 14.10.1 pour la liste des raisons.

Tableau 16.12 Violences conjugales au cours des 12 derniers mois

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ou en rupture d'union qui ont subi des violences émotionnelles, physiques, ou sexuelles exercées par n'importe quel mari/partenaire au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Violence émotionnelle	Violence physique	Violence sexuelle	Violence physique et sexuelle	Violence émotionnelle physique et sexuelle	Violence physique ou sexuelle	Violence émotionnelle ou physique ou sexuelle	Effectif de femmes en union ou en rupture d'union
Age								
15-19	20,6	9,0	6,9	1,7	1,7	14,1	26,0	218
20-24	27,1	9,2	6,3	2,5	2,4	13,0	31,7	642
25-29	32,2	13,0	7,2	4,5	3,8	15,7	35,2	925
30-39	30,6	11,5	6,8	3,5	3,4	14,7	33,2	1 408
40-49	25,5	10,7	3,8	2,8	2,8	11,7	28,2	956
Résidence								
Cotonou	22,8	7,8	3,1	1,8	1,7	9,1	25,8	223
Autres villes	26,0	10,4	5,7	2,8	2,5	13,3	28,6	1 428
Ensemble urbain	25,6	10,1	5,4	2,7	2,4	12,8	28,2	1 651
Rural	30,8	11,9	6,6	3,8	3,6	14,7	34,3	2 499
Département								
Alibori	27,4	21,5	5,4	5,0	5,0	21,9	32,0	514
Atacora	39,9	15,9	5,2	2,8	2,8	18,4	42,8	346
Atlantique	26,9	8,1	6,2	3,4	3,3	11,0	28,8	517
Borgou	26,7	9,8	6,9	4,7	4,3	12,0	29,4	465
Collines	30,4	12,7	7,8	3,2	3,0	17,2	35,7	289
Couffo	29,1	10,4	8,4	3,3	3,1	15,5	32,7	265
Donga	27,0	12,8	2,2	1,8	1,7	13,2	29,4	262
Littoral	22,8	7,8	3,1	1,8	1,7	9,1	25,8	223
Mono	31,6	11,4	6,3	3,6	2,7	14,1	35,0	199
Ouémé	22,5	5,8	8,1	2,4	2,2	11,5	26,4	393
Plateau	39,6	10,9	11,4	4,0	3,2	18,3	44,2	253
Zou	26,1	5,0	3,2	2,2	2,2	6,0	27,0	425
Niveau d'instruction								
Aucun	30,6	12,5	6,7	3,9	3,7	15,3	33,7	2 743
Primaire	28,7	10,6	5,5	2,8	2,6	13,3	31,9	765
Secondaire 1 ^{er} cycle	23,6	6,8	4,1	1,6	1,1	9,3	26,3	480
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	12,7	3,0	6,1	0,4	0,4	8,7	17,9	161
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	33,3	13,1	6,4	4,6	4,5	14,9	35,5	751
Second	30,5	15,1	7,5	4,5	4,0	18,0	35,7	780
Moyen	28,3	12,3	6,7	4,0	3,8	15,0	31,8	852
Quatrième	28,6	8,5	6,2	2,5	2,3	12,2	31,1	891
Le plus élevé	23,6	7,6	4,1	1,4	1,2	10,3	26,2	875
Ensemble	28,7	11,2	6,1	3,3	3,1	13,9	31,9	4 150

Note : N'importe quel mari/partenaire comprend tous les maris/partenaires actuels, les plus récents et les plus anciens maris/partenaires.

Tableau 16.13 Premier épisode de violence conjugale selon la durée de l'union

Parmi les femmes de 15-49 ans actuellement en union et qui n'ont été en union qu'une seule fois, pourcentage ayant subi leur premier acte de violence physique ou sexuelle commis par leur conjoint actuel, par nombre exact d'années écoulées depuis le début de l'union et selon la durée de l'union, EDSB-V Bénin 2017-2018

Durée de l'union	Pourcentage ayant subi leur premier acte de violence conjugale, physique ou sexuelle, par nombre exact d'années écoulées depuis le début de l'union :				N'a subi aucune violence physique ou sexuelle	Effectif de femmes actuellement en union et qui ont été en union qu'une seule fois
	Avant l'union	2 ans	5 ans	10 ans		
Année depuis l'union						
<2	0,9	na	na	na	89,2	289
2-4	0,4	9,0	na	na	84,8	499
5-9	0,3	7,9	20,2	na	75,6	741
10+	0,4	4,5	13,2	18,7	76,7	1 809
Ensemble	0,4	6,4	14,8	18,7	78,8	3 338

na = Non applicable

Tableau 16.14 Blessures dues à la violence conjugale

Parmi les femmes de 15-49 ans actuellement en union ou en rupture d'union qui ont subi certaines formes de violence commise par leur conjoint actuel ou le plus récent, pourcentage de femmes qui ont été blessées suite à ces actes de violence, par type de blessures, et selon le type de violence subie, EDSB-V Bénin 2017-2018

Type de violence	Coupures, hématomes ou douleurs	Hématomes aux yeux, entorses, luxations ou brûlures	Blessures profondes, os cassés, dents cassées ou autres blessures sérieuses	N'importe quel type de blessure	Effectif de femmes ayant subi des violences physiques ou sexuelles
Violence physique¹					
A n'importe quel moment ²	38,8	21,4	7,1	42,6	810
Au cours des 12 derniers mois	44,5	26,5	9,9	48,8	462
Violence sexuelle					
A n'importe quel moment ²	38,0	21,7	9,5	40,4	364
Au cours des 12 derniers mois	39,9	24,8	9,7	42,3	252
Violence physique ou sexuelle¹					
A n'importe quel moment ²	35,1	18,8	6,1	38,5	932
Au cours des 12 derniers mois	37,9	22,8	7,9	42,0	578

Note : Chez les femmes, le conjoint correspond au mari/partenaire actuel pour les femmes actuellement en union et au mari/partenaire le plus récent pour les femmes en rupture d'union.

¹ Ne comprend pas les femmes qui ont déclaré avoir subi des actes de violence uniquement en réponse à une question directe sur la violence pendant la grossesse.

² Y compris dans les 12 derniers mois

Tableau 16.15 Violence des enquêtées contre leurs conjoints selon les caractéristiques des enquêtées

Pourcentage de femmes de 15-49 ans en union ou en rupture d'union qui ont exercé des violences physiques contre leur conjoint actuel ou le plus récent alors qu'il ne les avait ni battues, ni agressées physiquement, à n'importe quel moment ou au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête, selon leur propre expérience de violence conjugale et leurs caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes qui ont exercé des violences physiques contre leur mari/partenaire actuel ou le plus récent :		Effectif de femmes en union ou en rupture d'union
	A n'importe quel moment ¹	Au cours des 12 derniers mois	
Enquêtée a subi des violences physiques conjugales			
A n'importe quel moment ¹	10,1	5,7	810
Au cours des 12 derniers mois	11,8	9,0	462
Jamais	0,7	0,4	3 340
Groupe d'Age			
15-19	1,4	1,1	218
20-24	2,7	1,5	642
25-29	3,6	2,3	925
30-39	2,1	1,1	1 408
40-49	2,4	1,3	956
Religion			
Vodoun	3,2	1,4	385
Autre traditionnelle	(0,0)	(0,0)	32
Islam	2,0	1,5	1 277
Catholique	3,3	1,4	914
Protestante Méthodiste	3,8	2,9	190
Autres Protestants	1,8	0,0	159
Célestes	3,0	1,8	338
Autres chrétiens	1,8	1,2	568
Autres religions	2,4	0,0	57
Aucune	3,0	2,3	232
Résidence			
Cotonou	3,5	1,2	223
Autres villes	2,3	1,2	1 428
Ensemble urbain	2,4	1,2	1 651
Rural	2,7	1,6	2 499
Département			
Alibori	3,1	2,8	514
Atacora	1,7	0,7	346
Atlantique	4,4	2,0	517
Borgou	3,0	2,3	465
Collines	2,6	2,4	289
Couffo	1,8	1,3	265
Donga	0,0	0,0	262
Littoral	3,5	1,2	223
Mono	1,9	1,0	199
Ouémé	1,7	0,9	393
Plateau	1,8	0,7	253
Zou	3,0	0,7	425
État matrimonial			
En union	2,5	1,4	3 831
En rupture d'union	4,0	1,7	318
Emploi			
A travaillé et a été rémunéré en argent	2,9	1,6	3 077
A travaillé mais n'a pas été rémunéré en argent	2,9	2,2	506
Ne travaille pas	0,6	0,4	566
Nombre d'enfants vivants			
0	0,9	0,2	259
1-2	2,7	1,6	1 382
3-4	3,2	1,8	1 340
5+	2,1	1,2	1 169
Niveau d'instruction			
Aucun	2,5	1,6	2 743
Primaire	3,0	2,0	765
Secondaire 1 ^{er} cycle	2,5	0,5	480
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	2,7	0,6	161
Quintiles de bien-être économique			
Le plus bas	2,0	1,3	751
Second	4,2	2,8	780
Moyen	2,4	1,4	852
Quatrième	1,7	1,2	891
Le plus élevé	2,7	0,7	875
Ensemble	2,6	1,5	4 150

Note : Chez les femmes, le conjoint correspond au mari/partenaire actuel pour les femmes actuellement en union et au mari/partenaire le plus récent pour les femmes en rupture d'union. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

na = Non applicable

¹ Y compris dans les 12 derniers mois.

Tableau 16.16 Violence des enquêtées contre leur conjoint selon les caractéristiques du conjoint et les indicateurs du pouvoir d'action de l'enquêtée

Pourcentage de femmes de 15-49 ans en union ou en rupture d'union qui ont exercé des violences physiques contre leur conjoint actuel ou le plus récent alors qu'il ne les avait ni battues, ni agressées physiquement, à n'importe quel moment ou au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête, selon les caractéristiques sociodémographiques du conjoint et les indicateurs du pouvoir d'action de l'enquêtée, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes qui ont exercé des violences physiques contre leur mari/partenaire actuel ou le plus récent :		Effectif de femmes en union ou en rupture d'union
	A n'importe quel moment ¹	Au cours des 12 derniers mois	
Niveau d'instruction du mari/partenaire²			
Aucun	2,5	1,7	1 959
Primaire	2,6	1,4	814
Secondaire 1 ^{er} cycle	1,9	1,2	462
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	2,9	0,7	426
Ne sais pas/manquant	1,5	1,5	170
Consommation d'alcool par le conjoint			
Ne boit pas	1,3	0,7	2 995
Boit mais jamais soûl	3,1	1,5	400
Soûl parfois	6,5	3,5	535
Soûl souvent	9,5	7,1	220
Différence d'instruction entre conjoints²			
Mari plus instruit	2,4	1,2	1 339
Femme plus instruite	2,3	0,7	496
Même niveau d'instruction	2,7	2,1	118
Les deux sans instruction	2,6	1,8	1 708
Ne sait pas/manquant	1,5	1,5	170
Différence d'âge entre conjoints²			
Femme plus âgée	3,4	1,8	190
Femme du même âge	1,5	0,0	90
Femme plus jeune de 1-4 ans	2,7	1,8	1 148
Femme plus jeune de 5-9 ans	2,4	1,5	1 321
Femme plus jeune de 10 ou +	2,2	1,2	1 083
Nombre de contrôles exercés par le mari/partenaire sur sa femme³			
0	2,3	1,5	1 439
1-2	1,6	0,8	1 555
3-4	3,5	1,8	831
5	6,2	3,8	325
Nombre de décisions auxquelles la femme a participé⁴			
0	3,1	2,2	1 002
1-2	2,4	1,5	1 382
3	2,0	0,9	1 447
Nombre de raisons pour lesquelles il est justifié qu'un mari batte sa femme⁵			
0	2,3	1,0	2 785
1-2	3,4	2,6	563
3-4	2,9	2,2	515
5	2,7	2,2	286
Le père de la femme battait sa femme			
Oui	6,6	3,3	403
Non	2,0	1,2	3 549
Ne sait pas/manquant	4,2	2,8	198
Il arrive à la femme d'avoir peur de son mari			
La plupart du temps à peur	6,5	5,2	428
Souvent/de temps en temps	2,4	1,1	1 624
Jamais eu peur	1,9	1,0	2 098
Ensemble	2,6	1,5	4 150

Note : Le conjoint correspond au mari/partenaire actuel pour les femmes actuellement en union et au mari/partenaire le plus récent pour les femmes en rupture d'union.

¹ Y compris dans les 12 derniers mois.

² Comprends seulement les femmes actuellement en union.

³ Selon les déclarations de la femme. Voir Tableau 16.8 pour la liste des contrôles.

⁴ Selon les déclarations de la femme. Comprends seulement les enquêtés qui sont actuellement en union. Voir Tableau 14.9.1 pour la liste des décisions.

⁵ Selon les déclarations de de la femme. Voir Tableau 14.10.1 pour la liste des raisons.

Tableau 16.17 Recherche de l'aide pour mettre fin à la violence

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans qui ont subi des violences physiques ou sexuelles selon qu'elles ont recherché de l'aide pour mettre fin à la violence, selon le type de violence et certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Type de violence/ caractéristique sociodémographique	A recherché de l'aide pour arrêter la violence	N'a jamais recherché mais en a parlé a quelqu'un	N'a jamais recherché et n'en a parlé a quelqu'un	Total	Effectif de femmes ayant subi des violences physiques ou sexuelles
Type de violence					
Physique seulement	30,7	10,0	59,3	100,0	1 101
Sexuelle seulement	23,9	9,4	66,7	100,0	173
Physique et sexuelle	51,4	15,4	33,2	100,0	374
Age					
15-19	30,2	7,3	62,5	100,0	266
20-24	38,9	10,4	50,6	100,0	281
25-29	36,0	10,3	53,7	100,0	334
30-39	33,0	13,6	53,4	100,0	464
40-49	35,9	12,5	51,6	100,0	301
Religion					
Vodoun	41,1	12,2	46,7	100,0	154
Autre traditionnelle	*	*	*	100,0	11
Islam	39,7	9,3	51,0	100,0	419
Catholique	31,7	10,8	57,5	100,0	394
Protestante Méthodiste	34,9	8,8	56,3	100,0	65
Autres Protestants	29,0	6,6	64,4	100,0	76
Célestes	40,4	11,4	48,2	100,0	139
Autres chrétiens	31,6	13,9	54,4	100,0	271
Autres religions	*	*	*	100,0	11
Aucune	24,6	11,0	64,4	100,0	108
Résidence					
Cotonou	31,3	12,1	56,5	100,0	108
Autres villes	35,7	10,0	54,2	100,0	569
Ensemble urbain	35,0	10,4	54,6	100,0	676
Rural	34,5	11,7	53,8	100,0	971
Département					
Alibori	51,7	14,6	33,7	100,0	199
Atacora	27,1	5,6	67,3	100,0	154
Atlantique	30,2	9,5	60,3	100,0	242
Borgou	25,8	7,8	66,4	100,0	149
Collines	33,7	12,1	54,2	100,0	128
Couffo	29,1	12,6	58,3	100,0	117
Donga	45,2	3,0	51,7	100,0	63
Littoral	31,3	12,1	56,5	100,0	108
Mono	40,0	13,7	46,3	100,0	69
Ouémé	32,0	14,9	53,2	100,0	132
Plateau	33,9	15,7	50,4	100,0	108
Zou	39,0	11,4	49,6	100,0	178
État matrimonial					
Célibataire	32,1	10,0	58,0	100,0	326
En union	34,6	11,7	53,7	100,0	1 198
En rupture d'union	42,8	8,6	48,5	100,0	122
Nombre d'enfants vivants					
0	31,1	10,3	58,6	100,0	370
1-2	36,6	9,6	53,7	100,0	457
3-4	35,2	12,9	52,0	100,0	453
5+	35,4	11,9	52,8	100,0	367
Emploi					
A travaillé et a été rémunéré en argent	36,6	12,0	51,4	100,0	1 125
A travaillé mais n'a pas été rémunéré en argent	25,7	9,5	64,7	100,0	249
Ne travaille pas	35,0	9,1	55,8	100,0	273
Niveau d'instruction					
Aucun	35,5	11,9	52,6	100,0	942
Primaire	35,8	11,6	52,6	100,0	341
Secondaire 1 ^{er} cycle	33,2	5,4	61,5	100,0	261
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	27,6	17,8	54,5	100,0	103
Quintiles de bien-être économique					
Le plus bas	38,6	9,7	51,7	100,0	249
Second	33,6	15,1	51,4	100,0	320
Moyen	33,7	12,6	53,7	100,0	346
Quatrième	39,2	9,0	51,8	100,0	366
Le plus élevé	29,6	9,5	60,9	100,0	367
Ensemble	34,7	11,2	54,1	100,0	1 647

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 16.18 Sources/personnes auprès desquelles l'aide pour mettre fin à la violence a été recherché

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont subi des violences physiques ou sexuelles et qui ont recherché de l'aide par type de violence, selon la source/personne auprès de qui l'aide a été recherchée, EDSB-V Bénin 2017-2018

Source/personne auprès de laquelle l'aide a été recherchée	Type de violence :			
	Physique seulement	Sexuelle seulement	A la fois physique et sexuelle	Violence physique ou sexuelle
Propre famille	69,6	(55,0)	73,9	70,0
Famille du mari/partenaire	25,1	(21,0)	31,1	26,8
Mari/partenaire	3,2	(0,7)	1,6	2,5
Petit ami	0,7	(0,0)	0,0	0,4
Ami	10,5	(24,6)	19,0	14,4
Voisin	11,4	(7,7)	7,5	9,8
Chef religieux	2,3	(0,0)	2,4	2,1
Médecin/personnel médical	0,5	(3,5)	1,3	1,0
Police	0,6	(5,9)	3,2	1,9
Homme de loi	2,0	(1,1)	1,6	1,8
Service social	0,9	(0,0)	0,4	0,7
Autre	2,6	(1,2)	1,7	2,2
Effectif de femmes qui ont recherché de l'aide	338	41	192	571

Note : Les enquêtés peuvent déclarer plus d'une source/personne auprès de laquelle ils ont recherché de l'aide. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Résultats clés

- **Prise en charge de l'hypertension** : Le pourcentage d'hommes qui ont appris d'un prestataire de santé qu'ils avaient de l'hypertension et qui prennent des médicaments pour la contrôler est plus de deux fois plus élevé que celui des femmes (36 % contre 15 %).
- **Niveaux de l'hypertension** : La pression artérielle élevée touche plus les hommes (16 %) que les femmes (13 %).
- **Cancer du col de l'utérus** : Seulement 10 % des femmes ont entendu parler du cancer du col de l'utérus, 5 % connaissent l'existence d'un test de dépistage mais seulement 1 % en a déjà effectué un.
- **Mesure et traitement de la glycémie** : Seulement 8 % des femmes et 6 % des hommes ont eu leur niveau de glycémie mesurée par un prestataire de soins de santé.

Les maladies non transmissibles (MNT) constituent une menace importante et grandissante pour la santé des individus et des populations dans le monde. Les MNT se définissent comme toutes maladies non-infectieuses et non-transmissibles entre personnes. Elles peuvent être chroniques et à progression lente, ou conduire à une mort plus rapide comme certains types d'accidents vasculaires cérébraux (AVC). Le dépistage et la prévention sont les outils essentiels de contrôle des MNT.

L'hypertension artérielle (HTA) en particulier augmente le risque d'accident vasculaire cérébral, d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance rénale et de troubles cognitifs. Il n'y a cependant pas de traitement qui permette de la guérir définitivement. Le traitement antihypertenseur, notamment celui obtenu sur ordonnance, n'a pour but que d'en assurer le contrôle adéquat en abaissant la pression sanguine et prévenir ainsi d'éventuels dommages aux organes (cœur, cerveau, reins, yeux).

Ce chapitre présente les résultats concernant le dépistage et le traitement de l'hypertension artérielle, les niveaux d'hypertension artérielle, les types de maladies non transmissibles, la connaissance et le dépistage de l'examen du cancer du col utérin et de l'hyperglycémie (diabète).

17.1 DEPISTAGE ET TRAITEMENT DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE

Prise en charge de l'hypertension artérielle

Femmes et hommes à qui l'on a prescrit des médicaments pour contrôler la tension artérielle ainsi que celles et ceux qui prennent les médicaments prescrits.

Echantillon : Femmes de 15-49 ans et hommes de 30-64 ans ayant appris d'un prestataire de santé qu'ils souffraient d'hypertension artérielle.

Au cours de l'enquête, on a demandé aux femmes de 15-49 ans et aux hommes de 30-64 ans si un médecin ou un autre professionnel de soins de santé avait déjà vérifié leur tension artérielle et si on leur avait dit qu'ils avaient une tension artérielle élevée ou de l'hypertension. On a aussi demandé si des médicaments avaient

été prescrits et si l'enquêté(e) les prenait. Les résultats sont présentés au **Tableau 17.1.1** pour les femmes et au **Tableau 17.1.2** pour les hommes.

Une femme sur trois (62 %) a déjà eu sa tension artérielle contrôlée. Chez les hommes, ce pourcentage tombe à 45 %. Dans cette population, seulement 10 % de femmes et 8 % d'hommes ont été informés qu'ils souffraient d'hypertension.


Parmi les patients ayant appris auprès d'un prestataire de santé qu'ils souffraient d'hypertension, les pourcentages de ceux à qui il a été prescrit des médicaments est relativement élevés et sensiblement identiques pour les deux sexes (68 % dans les deux cas). Cependant, seulement 15 % des femmes 36 % des hommes prennent ces médicaments.

Variations par caractéristique

- Que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, les pourcentages de ceux qui ont eu leur tension mesurée augmentent avec l'âge, passant chez les femmes de 52 % à 15-29 ans à 75 % à 40-49 ans et, chez les hommes, de 41 % à 30-39 ans à 51 % à 50-64 ans.
- Les pourcentages de ceux qui ont été informés qu'ils souffraient d'hypertension artérielle augmentent avec l'âge, passant chez les femmes de 6 % à 15-29 ans à 19 % à 40-49 ans et, chez les hommes, de 5 % à 30-39 ans à 14 % à 50-64 ans.
- En milieu urbain, il est plus fréquent qu'en milieu rural de faire mesurer sa tension artérielle (65 % contre 59 % chez les femmes et 51 % contre 40 % chez les hommes). La proportion de femmes informées par un prestataire qu'elles souffraient d'hypertension artérielle est plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural (12 % contre 9 %). Chez les hommes, l'écart est faible (9 % en urbain contre 8 % en rural) (**Graphique 17.1**).

Graphique 17.1 Mesure de la pression artérielle par un prestataire de soins de santé par résidence

Pourcentage de femmes de 15-49 ans et d'hommes de 30-64 ans pour qui la pression artérielle a été mesurée par un prestataire de soins de santé




- Les pourcentages de femmes et d'hommes ayant fait contrôler leur tension artérielle ont tendance à augmenter avec le quintile de bien-être économique, passant chez les femmes de 45 % dans le quintile le plus bas à 71 % dans le plus élevé et, chez les hommes, de respectivement 28 % à 61 %.

- Les pourcentages de femmes et d'hommes informés par un prestataire de santé qu'ils avaient de l'hypertension artérielle augmentent du quintile le plus bas au plus élevé, de 6 % à 15 % chez les femmes et de 4 % à 11 % chez les hommes (Graphique 17.2).

Graphique 17.2 Informé par un prestataire souffrant d'hypertension artérielle par bien-être économique du ménage

Pourcentage de femmes 30-49 ans et d'hommes 30-64 ans informé par un prestataire de soins de santé qui souffre d'hypertension artérielle



17.2 PRÉVALENCE ET NIVEAUX D'HYPERTENSION ARTÉRIELLE

Hypertension artérielle élevée

Femmes et hommes ayant une pression artérielle légèrement élevée (niveau 1), modérément élevée (niveau 2) et sévèrement élevée (niveau 3).

Échantillon : Femmes de 30-49 ans et hommes de 30-64 ans pour lesquels la pression artérielle a été mesurée.

Niveaux de tension artérielle au-dessus desquels une femme et un homme sont considérés comme hypertendus (OMS)

Catégorie	Pression Artérielle Systolique (PAS)	Pression Artérielle Diastolique (PAD)
HTA niveau 1 (légère)	140-159mmHg et/ou	90-99mmHg
HTA niveau 2 (modérée)	160-179mmHg et/ou	100-109mmHg
HTA niveau 3 (sévère)	≥180mmHg et/ou	≥110mmHg
HTA systolique isolée	≥140mmHg et	< 90mmHg

Échantillon : Femmes de 30-49 ans et hommes de 30-64 ans pour lesquels la tension artérielle a été mesurée.

La tension artérielle correspond à la pression exercée par le flux du sang dans les artères. Elle est exprimée par deux valeurs : la pression systolique et la pression diastolique. Elle est catégorisée, suivant la valeur de chacun de ces deux éléments en hypotension, tension normale et hypertension.

Au cours de l'EDSB-V 2017-2018, la pression artérielle de toutes les femmes de 30-49 ans et de tous les hommes de 30-64 ans a été mesurée dans un sous-échantillon d'un ménage sur deux. Cette mesure était effectuée à trois reprises au cours de l'interview à l'aide d'un tensiomètre électronique *Digital Blood Pressure Monitor, Model UA-767F*. Les **Tableaux 17.2.1** et **17.2.2** présentent les résultats pour les femmes et pour les hommes.


Au Bénin, 13 % des femmes et 16 % des hommes ont une pression artérielle élevée, avec une dominance de la forme légère (8 % chez les femmes et 11 % chez les hommes) (**Graphique 17.3**).

Variations par caractéristique

- La prévalence de l'hypertension a tendance à augmenter avec l'âge, passant chez les femmes de 9 % à 30-39 ans à 19 % à 40-49 ans et, chez les hommes, de 10 % à 30-39 ans à 17 % à 40-49 ans et à 28 % à 50-64 ans.
- La prévalence de l'hypertension artérielle est plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural, que ce soit chez les femmes (16 % contre 11 %) comme chez les hommes (18 % contre 15 %).
- Du quintile le plus bas au plus élevé, la prévalence de l'hypertension a tendance à augmenter, passant chez les femmes de 9 % à 19 % et, chez les hommes de 12 % à 22 %.

Graphique 17.3 Prévalence de l'hypertension et niveaux d'hypertension

Pourcentage de femmes de 30-49 ans et d'hommes de 30-64 ans dont la tension artérielle est élevée et pourcentage ayant différents niveaux de tension artérielle



17.3 PRÉVALENCE DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Pour estimer la prévalence des maladies non transmissibles, on a demandé aux femmes de 15-49 ans et aux hommes de 30-64 ans si selon le diagnostic effectué par du personnel médical, ils souffraient des maladies non transmissibles. Les résultats détaillés par type de maladie sont présentés aux **Tableau 17.3**.

17.4 CONNAISSANCE ET PRATIQUE DE L'EXAMEN POUR LE CANCER DU COL UTERIN

Connaissance du cancer du col de l'utérus (ou col utérin) et de l'existence d'un test de détection

Femmes ayant entendu parler du cancer du col de l'utérus, et celles ayant entendu parler du test pour le cancer du col de l'utérus.

Echantillon : Femmes de 15-49 ans.

Dépistage du cancer du col utérin par un test

Femmes ayant effectué un test pour le cancer du col de l'utérus.

Echantillon : Femmes de 15-49 ans.

Aussi appelé matrice, le col de l'utérus fait partie de l'appareil reproducteur féminin. C'est un passage étroit dans la partie inférieure de l'utérus, reliant ce dernier au vagin. Le cancer du col de l'utérus est une tumeur maligne qui prend naissance dans les cellules du col de l'utérus. Le mot « maligne » signifie que la tumeur peut se propager à d'autres parties du corps (métastases).

Au cours de l'EDSB-V 2017-2018, pour évaluer la connaissance des femmes sur le cancer du col de l'utérus, on leur a non seulement demandé si elles avaient entendu parler du cancer de l'utérus, mais aussi si, elle avait entendu parler d'un test de dépistage pour ce cancer et si elles avaient déjà effectué ce type de test. Les résultats sont présentés au **Tableau 17.4**.

Si 10 % des femmes de 15-49 ans ont entendu parler du cancer du col de l'utérus, seulement 5 % connaissent l'existence d'un test de dépistage de ce cancer, et 1 % en a effectué un. Parmi celles qui ont fait un test,

seules 12 % l'ont effectué il y a moins d'un an. Pour 37 % d'entre elles, le test effectué remonte à une période comprise entre un et trois ans et pour 51 % ce test remonte à plus de 3 ans.


Du fait d'un effectif trop faible de femmes ayant effectué un test de dépistage du cancer du col de l'utérus, les données sur le résultat des tests ne sont pas représentatives et elles ne sont donc pas présentées.

Variations par caractéristique

- La connaissance du cancer du col de l'utérus ainsi que celle du test de dépistage sont plus fréquentes en milieu urbain qu'en milieu rural (respectivement 14 % contre 6 % et 8 % contre 3 %). Le dépistage du cancer de l'utérus est également plus répandu en milieu urbain, en particulier à Cotonou qu'ailleurs (4 % contre moins d'un pour cent ailleurs).
- Les pourcentages de femmes qui ont entendu parler du cancer du col de l'utérus et de celles qui connaissant l'existence d'un test de dépistage augmentent de manière importante avec le niveau d'instruction, passant respectivement de 5 % parmi celles sans niveau d'instruction à 39 % parmi celles ayant le niveau secondaire 2^d cycle ou plus et de 2 % à 25 %. Le pourcentage de femmes ayant effectué un test de dépistage du cancer du col de l'utérus suit la même tendance : moins d'un pour cent à 3 % parmi les plus instruites (**Graphique 17.4**).
- Le niveau de bien-être économique influence également la connaissance des femmes sur le cancer du col de l'utérus, que ce soit la connaissance de la maladie ou de l'existence d'un test de dépistage. De même, dans les quatre premiers quintiles, un pourcentage extrêmement faible de femmes ont déjà effectué un test de dépistage contre 2 % dans le plus élevé.

Graphique 17.4 Femmes ayant entendu parler du cancer du col de l'utérus par niveau d'instruction

Pourcentage de femmes de 15-49 ans



17.5 DÉPISTAGE ET TRAITEMENT DE L'HYPERGLYCÉMIE

Dépistage de la glycémie

Femmes et hommes qui ont eu la glycémie mesurée par un prestataire de santé et ceux qui ont appris d'un prestataire de santé qu'ils souffraient de l'hyperglycémie

Echantillon : Femmes de 15-49 ans et hommes de 30-64 ans

L'hyperglycémie est une concentration en glucose (ou du taux de sucre) dans le sang anormalement élevée. Elle est un symptôme révélateur d'un diabète, entraînant certaines complications, notamment au niveau des yeux, des reins, des nerfs, du cœur et des vaisseaux sanguins.

Au cours de l'EDSB-V, on a demandé aux femmes de 15-49 ans et aux hommes de 30-64 ans si un médecin ou un autre professionnel de santé avait déjà mesuré le niveau de sucre dans leur sang et si un prestataire de soins de santé leur avait dit qu'ils avaient un niveau de sucre élevé dans le sang ou du diabète (hyperglycémie). Les résultats sont présentés au **Tableau 17.5.1** pour les femmes et au **Tableau 17.5.2** pour les hommes.

Moins d'une femme sur 10 (8 %) a effectué un test de la glycémie et 1 % d'entre elles ont été informées par un prestataire qu'elles souffraient d'hyperglycémie. Chez les hommes, ces pourcentages sont plus faibles (respectivement 6 % et 1 %).

Variations par caractéristique

- Les pourcentages de femmes et d'hommes qui ont eu leur niveau de glycémie mesuré sont plus élevés en milieu urbain que rural (respectivement 10 % contre 7 % et 9 % contre 4 %).
- Les pourcentages de femmes et d'hommes informés par un prestataire de santé qu'ils souffraient d'hyperglycémie sont plus élevés en milieu urbain que rural (respectivement 2 % contre moins d'un pour cent et 2 % contre 1 %).
- C'est dans le quintile le plus élevé que les pourcentages de femmes et d'hommes qui ont eu leur glycémie mesurée sont les plus élevés (respectivement 15 % et 14 %). Par comparaison, dans le quintile le plus bas, ces pourcentages sont respectivement de 4 % et de 3 %).

Parmi les femmes qui ont appris d'un prestataire de santé qu'elles souffraient d'hyperglycémie, 57 % ont été informées dans les 12 mois précédant l'enquête, 52 % ont reçu une prescription des médicaments pour contrôler la glycémie et 38 % prennent des médicaments pour contrôler la glycémie (Données non présentées).

Du fait d'un effectif trop faible des hommes qui ont appris d'un prestataire de santé qu'ils souffraient d'hyperglycémie, les données sur le résultat ne sont pas représentatives et elles ne sont donc pas présentées.

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur la santé des adultes et les maladies non transmissibles, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 17.1.1** **Prise en charge de l'hypertension artérielle : Femme**
- **Tableau 17.1.2** **Prise en charge de l'hypertension artérielle : Homme**
- **Tableau 17.2.1** **Niveaux d'hypertension : Femme**
- **Tableau 17.2.2** **Niveaux d'hypertension : Homme**
- **Tableau 17.3** **Type de maladies non transmissibles**
- **Tableau 17.4** **Cancer du col de l'utérus**
- **Tableau 17.5.1** **Glycémie mesurée et traitée : Femme**
- **Tableau 17.5.2** **Glycémie mesurée et traitée : Homme**

Tableau 17.1.1 Prise en charge de l'hypertension artérielle : Femme

Pourcentage de femmes de 15-49 ans pour qui la pression artérielle a été mesurée et qui ont été informées par un prestataire de soins de santé qu'elles souffraient d'hypertension artérielle ; parmi les femmes ayant appris qu'elles souffraient d'hypertension, le pourcentage qui ont reçu cette information dans les 12 mois précédant l'enquête, pourcentage à qui l'on a prescrit des médicaments antihypertenseurs et pourcentage qui prennent des antihypertenseurs, selon les caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018.

Caractéristique sociodémographique	A eu la pression artérielle mesurée par un médecin ou un prestataire de soins de santé		Effectif de femmes	Parmi les femmes qui ont appris d'un prestataire qu'elles souffraient d'hypertension, pourcentage qui :			Effectif de femmes
	Informée par un prestataire qu'elle souffrait d'hypertension artérielle	Ont été informées dans les 12 mois précédant l'enquête		A qui l'on a prescrit des médicaments pour contrôler la pression artérielle	Prennent des médicaments pour contrôler la pression artérielle		
Groupe d'âges							
15-29	52,0	6,2	4 542	53,0	65,5	7,0	279
15-19	28,0	2,7	1 617	(47,2)	(63,4)	(4,1)	44
20-24	59,9	6,8	1 423	49,7	62,5	5,5	97
25-29	70,4	9,3	1 502	57,1	68,3	8,9	139
30-39	75,2	13,1	1 961	54,0	69,5	17,4	257
30-34	74,8	12,0	1 028	49,5	70,1	15,1	124
35-39	75,7	14,3	933	58,2	68,8	19,6	134
40-49	74,7	19,1	1 203	53,6	70,1	21,9	229
40-44	75,5	19,0	607	51,6	73,8	20,6	115
45-49	73,9	19,2	595	55,6	66,4	23,3	114
Résidence							
Cotonou	75,3	16,8	460	47,4	54,1	10,4	77
Autres villes	63,7	10,6	2 843	57,1	74,7	16,9	302
Ensemble urbain	65,3	11,5	3 303	55,1	70,5	15,6	379
Rural	58,6	8,8	4 403	51,9	66,0	14,4	387
Quintiles de bien-être économique							
Le plus bas	45,3	5,9	1 424	54,3	66,8	13,3	84
Second	58,1	7,4	1 551	43,2	66,8	13,7	114
Moyen	65,0	8,7	1 422	52,3	68,1	11,5	124
Quatrième	66,1	12,0	1 574	58,4	70,5	14,9	189
Le plus élevé	70,7	14,7	1 734	54,8	67,7	17,9	254
Ensemble	61,5	9,9	7 706	53,5	68,2	15,0	766

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés

Tableau 17.1.2 Prise en charge de l'hypertension artérielle : Homme

Pourcentage d'hommes de 30-64 ans dont la pression artérielle a été mesurée et qui ont été informés par un prestataire de soins de santé qu'ils souffraient d'hypertension artérielle ; parmi les hommes ayant appris qu'ils souffraient d'hypertension, pourcentage ayant reçu cette information dans les 12 mois précédant l'enquête, pourcentage à qui l'on a prescrit des médicaments antihypertenseurs, et pourcentage qui prennent des antihypertenseurs ; selon les caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018.

Caractéristique sociodémographique	A eu la pression artérielle mesurée par un médecin ou un prestataire de soins de santé		Effectif d'hommes	Parmi les hommes qui ont appris d'un prestataire qu'ils souffraient d'hypertension, pourcentage :			Effectif d'hommes
	Informée par un prestataire qu'il souffrait d'hypertension artérielle	Ayant été informés dans les 12 mois précédant l'enquête		À qui l'on a prescrit des médicaments pour contrôler la pression artérielle	Prenant des médicaments pour contrôler la pression artérielle		
Groupe d'âges							
30-39	40,5	5,3	1 682	48,1	54,3	24,7	90
30-34	40,4	5,0	875	(39,4)	(62,2)	(22,4)	44
35-39	40,7	5,6	807	(56,6)	(46,6)	(27,0)	46
40-49	46,4	7,6	1 203	63,0	71,1	27,8	92
40-44	48,5	6,1	613	(57,3)	(55,3)	(28,5)	37
45-49	44,2	9,2	589	67,0	82,0	27,3	54
50-64	50,6	13,5	864	67,8	74,8	50,4	116
50-55	54,7	14,0	369	69,6	67,6	37,0	52
55-59	48,4	13,0	297	(69,1)	(81,5)	(67,0)	39
60-64	46,2	13,1	198	(62,3)	(79,1)	(52,0)	26
Résidence							
Cotonou	63,0	7,8	214	(82,8)	(67,8)	(12,5)	17
Autres villes	49,5	8,7	1 425	60,7	69,4	34,6	123
Ensemble urbain	51,3	8,5	1 639	63,4	69,2	32,0	140
Rural	39,7	7,5	2 110	57,8	66,0	39,0	157
Quintiles de bien-être économique							
Le plus bas	27,7	4,1	729	(67,2)	(75,6)	(29,3)	30
Second	36,4	6,4	705	(43,9)	(75,5)	(43,3)	45
Moyen	46,3	8,4	717	52,3	63,2	23,8	60
Quatrième	49,1	8,7	718	57,4	61,9	34,6	62
Le plus élevé	60,7	11,4	880	72,7	67,5	42,0	100
Ensemble	44,7	7,9	3 749	60,4	67,5	35,7	297

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés

Tableau 17.2.1 Niveaux d'hypertension : Femme

Prévalence de la tension artérielle élevée parmi les femmes de 30-49 ans et distribution (en %) des femmes d'après le niveau de tension artérielle, selon les caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018.

Caractéristique sociodémographique	Prévalence de la pression artérielle élevée	Classification de la pression artérielle						Tension normale et prend des médicaments	Total	Effectif de femmes
		Optimale <120/<80 mmHg	Normale 120-129/80-84 mmHg	Normale supérieure 130-139/85-89 mmHg	Légèrement élevée 140-159/90-99 mmHg (Niveau 1)	Modérément élevée 160-179/100-109 mmHg (Niveau 2)	Sévèrement élevée 180+ /110+ mmHg (Niveau 3)			
Groupe d'âges										
30-39	8,9	68,7	13,2	8,0	6,4	2,0	0,5	1,2	100,0	1 907
30-34	6,7	72,1	12,9	7,2	5,5	0,9	0,3	1,1	100,0	995
35-39	11,3	64,9	13,5	8,9	7,4	3,2	0,7	1,4	100,0	912
40-49	19,4	55,2	14,3	8,9	11,7	5,2	2,4	2,2	100,0	1 170
40-44	18,8	56,2	14,5	8,4	12,1	5,1	1,6	2,1	100,0	588
45-49	19,9	54,2	14,2	9,5	11,3	5,3	3,2	2,3	100,0	582
Résidence										
Cotonou	18,4	53,6	15,0	10,3	12,7	3,7	2,1	2,7	100,0	192
Autres villes	15,6	59,7	14,1	8,6	10,0	3,8	1,8	2,1	100,0	1 139
Ensemble urbain	16,0	58,8	14,2	8,8	10,4	3,8	1,8	2,2	100,0	1 331
Rural	10,5	67,2	13,1	8,0	7,0	2,8	0,8	1,2	100,0	1 746
Consommation de tabac à fumer										
Oui	(15,4)	(53,5)	(16,6)	(14,5)	(15,4)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(100,0)	37
Non	12,9	63,7	13,6	8,3	8,4	3,3	1,2	1,6	100,0	3 039
Quintiles de bien-être économique										
Le plus bas	9,3	66,6	15,4	8,0	6,2	2,1	1,0	0,7	100,0	597
Second	9,2	68,9	12,4	8,7	5,9	2,9	0,3	0,8	100,0	623
Moyen	11,7	66,0	14,1	7,2	8,0	2,9	0,8	1,0	100,0	553
Quatrième	14,7	63,6	11,3	8,0	9,3	3,8	1,6	2,3	100,0	628
Le plus élevé	18,7	53,9	14,9	9,6	12,3	4,1	2,3	2,9	100,0	676
Ensemble	12,9	63,5	13,6	8,4	8,4	3,2	1,2	1,6	100,0	3 077

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés

Tableau 17.2.2 Niveaux d'hypertension : Homme

Prévalence de la tension artérielle élevée parmi les hommes de 30-64 ans et distribution (en %) des hommes d'après le niveau de tension artérielle, selon les caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018.

Caractéristique sociodémographique	Prévalence de la pression artérielle élevée	Classification de la pression artérielle							Tension normale et prend des médicaments	Total	Effectif d'hommes
		Optimale <120/<80 mmHg	Normale 120-129/80-84 mmHg	Normale supérieure 130-139/85-89 mmHg	Légèrement élevée 140-159/90-99 mmHg (Niveau 1)	Modérément élevée 160-179/100-109 mmHg (Niveau 2)	Sévérement élevée 180+/110+ mmHg (Niveau 3)				
Groupe d'âges											
30-39	9,5	48,5	29,3	11,6	7,1	1,7	0,6	1,1	100,0	1 635	
30-34	8,4	48,5	30,3	11,9	6,9	1,2	0,2	0,9	100,0	848	
35-39	10,7	48,5	28,2	11,4	7,3	2,3	1,1	1,2	100,0	787	
40-49	16,9	40,5	26,6	14,9	11,7	3,4	1,7	1,1	100,0	1 162	
40-44	15,6	40,7	26,6	15,9	11,2	3,1	1,3	1,4	100,0	594	
45-49	18,2	40,4	26,6	13,9	12,1	3,8	2,3	0,9	100,0	568	
50-64	28,4	33,8	20,6	13,5	17,9	6,0	4,6	3,7	100,0	836	
50-54	29,1	35,2	19,0	13,5	17,6	6,5	5,1	3,1	100,0	356	
55-59	26,4	30,6	23,4	14,6	16,4	5,1	4,9	4,9	100,0	288	
60-64	30,3	35,8	19,1	11,9	20,6	6,2	3,4	3,0	100,0	193	
Résidence											
Cotonou	21,0	34,6	25,7	17,9	14,7	5,5	0,7	0,8	100,0	189	
Autres villes	17,6	39,7	27,1	14,1	11,9	3,5	2,2	1,5	100,0	1 372	
Ensemble urbain	18,0	39,1	27,0	14,5	12,2	3,8	2,0	1,4	100,0	1 561	
Rural	14,9	45,2	26,0	12,1	10,2	2,9	1,8	1,9	100,0	2 072	
Consommation de tabac à fumer											
Oui	19,3	41,8	23,6	13,8	12,2	4,3	2,8	1,6	100,0	382	
Non	15,9	42,7	26,7	13,0	10,9	3,1	1,8	1,7	100,0	3 251	
Quintiles de bien-être économique											
Le plus bas	12,0	46,2	28,6	12,4	8,6	2,7	0,7	0,8	100,0	718	
Second	13,8	45,0	26,1	12,9	9,6	2,9	1,3	2,2	100,0	697	
Moyen	14,0	45,8	26,9	11,8	9,9	2,0	2,1	1,5	100,0	704	
Quatrième	19,0	37,4	29,0	12,8	12,6	3,8	2,6	1,8	100,0	692	
Le plus élevé	21,5	39,0	22,1	15,3	14,1	4,7	2,8	2,1	100,0	822	
Ensemble	16,2	42,6	26,4	13,1	11,1	3,3	1,9	1,7	100,0	3 633	

Tableau 17.3 Type de maladies non transmissibles

Prévalence de maladies non transmissibles parmi les femmes de 15-49 ans et les hommes de 30-64 ans, EDSB-V Bénin 2017-2018.

Type de maladies non transmissibles	Femmes 15-49 ans	Hommes 30-64 ans
Maladies cardiovasculaires	1,3	1,4
Maladies pulmonaires	1,5	1,0
Tumeurs	0,2	0,2
Dépression	0,8	0,2
Arthrite	1,4	0,5
Autres maladies chroniques	1,1	0,7
Effectif	7 706	3 749

Tableau 17.4 Cancer du col de l'utérus

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant entendu parler du cancer du col de l'utérus, pourcentage ayant entendu parler d'un test pour le cancer du col de l'utérus et pourcentage qui ont effectué un test pour le cancer du col de l'utérus, distribution (en %) des femmes de 15-49 ans ayant effectué le test selon la date du dernier test, selon les caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018.

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant entendu parler du cancer du col de l'utérus	Pourcentage ayant entendu parler d'un test de dépistage du cancer du col de l'utérus	Pourcentage ayant effectué le test de dépistage du cancer du col de l'utérus	Effectif de femmes	Parmi les femmes ayant effectué le test du col de l'utérus				Effectif des femmes ayant effectué le test
					<1 an	1-3 ans	>3 ans	Total	
Groupe d'âges									
15-29	9,1	4,5	0,2	4 542	19,5	21,5	59,0	100,0	11
15-19	5,9	2,2	0,0	1 618	0,0	0,0	0,0	0,0	0
20-24	10,4	5,0	0,2	1 423	36,2	0,0	63,8	100,0	3
25-29	11,4	6,7	0,5	1 502	13,4	29,4	57,2	100,0	8
30-39	9,7	5,4	1,0	1 961	12,3	52,8	34,9	100,0	19
30-34	9,5	5,5	0,9	1 028	21,4	55,5	23,1	100,0	9
35-39	9,9	5,3	1,1	933	3,9	50,3	45,8	100,0	10
40-49	10,4	5,2	0,7	1 203	0,0	21,9	78,1	100,0	9
40-44	10,9	5,4	0,7	607	0,0	30,1	69,9	100,0	4
45-49	9,8	5,0	0,8	595	0,0	14,1	85,9	100,0	5
Résidence									
Cotonou	31,0	18,2	3,5	460	11,6	44,2	44,1	100,0	16
Autres villes	11,3	6,0	0,4	2 843	22,0	44,8	33,2	100,0	12
Ensemble urbain	14,0	7,7	0,8	3 303	16,0	44,5	39,5	100,0	28
Rural	6,0	2,8	0,2	4 403	0,0	18,9	81,1	100,0	11
Niveau d'instruction									
Aucun	4,8	2,0	0,2	4 245	6,6	33,0	60,4	100,0	9
Primaire	8,5	4,1	0,3	1 547	0,0	45,4	54,6	100,0	5
Secondaire 1 ^{er} cycle	13,2	6,6	0,5	1 356	0,0	8,6	91,4	100,0	7
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	38,7	24,8	3,2	558	21,6	48,6	29,7	100,0	18
Quintiles de bien-être économique									
Le plus bas	3,6	1,5	0,1	1 424	0,0	0,0	100,0	100,0	1
Second	4,3	2,2	0,1	1 551	30,8	0,0	69,2	100,0	2
Moyen	7,1	2,7	0,3	1 422	0,0	23,9	76,1	100,0	4
Quatrième	9,4	4,8	0,1	1 574	0,0	0,0	100,0	100,0	2
Le plus élevé	20,8	11,8	1,7	1 734	12,7	44,4	42,9	100,0	30
Ensemble	9,5	4,9	0,5	7 706	11,5	37,2	51,3	100,0	39

Tableau 17.5.1 Glycémie mesurée et traitée : Femme

Pourcentage de femmes de 15-49 ans dont la glycémie a été mesurée et qui ont été informées par un prestataire de soins de santé qu'elles souffraient d'hyperglycémie ou du diabète selon les caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018.

Caractéristique sociodémographique	A eu la glycémie mesurée par un médecin ou un fournisseur de soins de santé	Informée par un prestataire qu'elle souffrait d'hyperglycémie ou du diabète	Effectif des femmes
Groupe d'âges			
15-29	6,2	0,8	4 542
15-19	2,6	0,3	1 617
20-24	8,0	1,0	1 423
25-29	8,2	1,0	1 502
30-39	10,5	1,4	1 961
30-34	10,8	1,1	1 028
35-39	10,3	1,7	933
40-49	11,3	1,8	1 203
40-44	11,1	1,2	607
45-49	11,6	2,3	595
Résidence			
Cotonou	19,4	2,6	460
Autres villes	8,4	1,3	2 843
Ensemble urbain	9,9	1,5	3 303
Rural	6,7	0,8	4 403
Quintiles de bien-être économique			
Le plus bas	4,2	0,7	1 424
Second	6,9	0,9	1 551
Moyen	6,0	0,6	1 422
Quatrième	7,3	0,9	1 574
Le plus élevé	14,8	2,2	1 734
Ensemble	8,1	1,1	7 706

Tableau 17.5.2 Glycémie mesurée et traitée : Homme

Pourcentage d'hommes de 30-64 ans dont la glycémie a été mesurée et qui ont été informés par un prestataire de soins de santé qu'ils souffraient d'hyperglycémie ou de diabète, selon les caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018.

Caractéristique sociodémographique	A eu la glycémie mesurée par un médecin ou un fournisseur de soins de santé	Informée par un prestataire qu'il souffrait d'hyperglycémie ou du diabète	Effectif d'hommes
Groupe d'âges			
30-39	5,0	0,9	1 682
30-34	4,3	0,7	875
35-39	5,7	1,1	807
40-49	5,5	1,4	1 203
40-44	5,8	1,3	613
45-49	5,3	1,4	589
50-64	10,0	2,1	864
50-54	9,1	1,7	369
55-59	11,8	2,7	297
60-64	9,0	2,1	198
Résidence			
Cotonou	18,3	1,3	214
Autres villes	7,4	1,6	1 425
Ensemble urbain	8,8	1,5	1 639
Rural	4,4	1,2	2 110
Quintiles de bien-être économique			
Le plus bas	2,9	1,2	729
Second	4,3	0,3	705
Moyen	4,0	1,4	717
Quatrième	4,8	0,3	718
Le plus élevé	13,9	3,0	880
Ensemble	6,3	1,3	3 749

Résultats clés

- **Enregistrement des naissances** : Le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été enregistrée est de 86 % : 64 % ont un certificat de naissance et 22 % n'en disposent pas.
- **Enfant orphelin et résidence des enfants avec les parents** : Le pourcentage d'enfant de moins de 18 ans ne vivant avec aucun parent biologique est de 15 % et le pourcentage d'enfant de moins de 18 ans vivant avec un ou les deux parents décédés est de 7 %.
- **Discipline des enfants** : Parmi les enfants de 1-14 ans, 91 % ont subi n'importe quelle forme de discipline violente au cours du mois ayant précédé l'interview.
- **Travail des enfants** : Au cours de la semaine avant l'interview, un tiers des enfants de 5-17 ans ont travaillé, à la limite ou au-dessus du seuil défini pour leur groupe d'âges (33 %), que ce soit en participant à des activités économiques, en accomplissant des tâches domestiques ou en travaillant dans des conditions dangereuses.
- **Encadrement inapproprié des enfants** : Au cours de la semaine avant l'interview, 30 % des enfants de moins de 5 ans ont été laissés sans soins appropriés pendant au moins une heure.

La Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989, relative aux Droits de l'Enfant (CDE) stipule dans l'une de ses dispositions que : « tous les États parties s'engagent à assurer à l'enfant, la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées ». Le Bénin, en ratifiant la CDE, s'est engagé au même titre que d'autres parties prenantes, à veiller à ce que tout enfant ait le droit d'être enregistré à l'état-civil, d'être nourri, soigné et éduqué. La manifestation de la volonté politique du gouvernement a été traduite dans la Loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin qui, dans ses dispositions générales garantit à tout être humain, les droits universellement reconnus et les libertés fondamentales. Particulièrement, les articles 12 à 14 et 26 prévoient des mesures spécifiques de protection des enfants, notamment en matière d'éducation et d'attention due à la mère et à l'enfant. Et, dans le contexte du principe de non-discrimination, l'article 26 établit que « l'État protège la famille et particulièrement la mère et l'enfant ».

Au cours de l'EDSB-V 2017-2018, des informations ont été collectées qui ont permis de calculer différents indicateurs permettant d'évaluer la situation des enfants au Bénin. Ces indicateurs concernent plus précisément : la déclaration à l'état civil des naissances d'enfants de moins de 5 ans, l'état de survie des parents biologiques, le travail des enfants de 5-17 ans, les méthodes de discipline des enfants et le développement du jeune enfant.

18.1 ENREGISTREMENT DES NAISSANCES À L'ÉTAT CIVIL

Enregistrement des naissances à l'état civil

Enfants de moins de 5 ans dont la naissance est enregistrée à l'état civil.

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans (population de droit)

L'État civil est défini comme l'ensemble des dispositions légales et réglementaires dont l'objet est de situer dans le temps et dans l'espace, des événements de la vie d'un individu, que sont entre autres la naissance, le mariage et le décès. L'enregistrement des naissances consiste à faire constater par des autorités administratives compétentes, la naissance des enfants. Il s'agit d'une preuve matérielle, permanente et officielle de l'existence de l'enfant, condition essentielle, garantissant ainsi à chacun un certain nombre de droits (nationalité, éducation, vote, emploi, héritage, etc.).

Au plan national, le code des personnes et de la famille en vigueur au Bénin stipule en son article 60 que « Toute naissance doit être déclarée au centre d'état civil le plus proche du lieu dans un délai de 10 jours, le jour de l'accouchement non compté. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant. Toutefois, ce délai est de 3 mois jusqu'à l'installation effective des organes décentralisés » et l'article 61 complète en ces termes « L'acte énonce le jour et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère ou l'un des deux ne sont pas désignés à l'officier d'état civil, il ne fait sur le registre aucune mention à ce sujet. L'acte est rédigé immédiatement et est signé du déclarant et de l'officier d'état civil conformément aux dispositions de l'article 42 du présent code ».

Les résultats du **Tableau 18.1** montrent que plus de huit enfants de moins de 5 ans sur dix (86 %) ont été enregistrés à l'état civil. Près des deux-tiers (64 %) ont un certificat de naissance mais, 22 % n'en possèdent pas.


Tendances : Entre 2006 et 2017-2018, la proportion d'enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été enregistrée a augmenté passant de 53 % en 2006 à 80 % en 2011-2012 puis à 86 % en 2017-2018 (**Graphique 18.1**).

Variations par caractéristique

- Le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été enregistrée à l'état civil est plus élevé en milieu urbain (91 %) qu'en milieu rural (82 %).

Graphique 18.1 Enregistrement des naissances d'enfants à l'état civil : Tendances


Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans



- Le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans enregistrés à l'état civil varie de 65 % dans le département du Borgou à 96 % dans le Zou (Graphique 18.2).
- Le pourcentage d'enfants dont la naissance a été enregistrée à l'état civil augmente, de manière importante, du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, passant de 69 % à 97 % (Graphique 18.3).


Graphique 18.2 Enregistrement des naissances à l'état civil par département

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans



Graphique 18.3 Enregistrement des naissances à l'état civil par bien-être économique du ménage

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans



18.2 ENFANTS ORPHELINS ET RÉSIDENCE AVEC LES PARENTS

Enfants orphelins d'un ou des deux parents

Comprend les enfants dont le père seul est décédé, ceux dont la mère seule est décédée, ceux dont les deux parents sont décédés et ceux dont un seul parent est décédé et dont l'information sur l'état de survie de l'autre est manquante.

Échantillon : Enfants de moins de cinq ans (population de droit)

Le Comité des Droits de l'Enfant (CDE) reconnaît que « l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension ». La famille constituant le soutien principal des enfants, toute stratégie visant à protéger les enfants doit donc, en priorité, renforcer les capacités des familles à les prendre en charge. Or des millions d'enfants dans le monde grandissent loin de leurs parents biologiques pour plusieurs raisons, dont notamment le décès prématuré de ces derniers ou la migration pour le travail. Dans la plupart des cas, ces enfants sont pris en charge par des membres de leurs familles élargies, alors que dans d'autres cas, les enfants peuvent vivre dans des familles autres que les leurs et travaillent comme domestiques résidents par exemple. Il est donc essentiel d'identifier les enfants qui sont orphelins, et de savoir si les enfants dont l'un ou les deux parents sont en vie vivent ou non avec leurs parents ou avec le parent survivant.

Le **Tableau 18.2** présente ces informations pour les enfants de moins de 18 ans, selon certaines caractéristiques sociodémographiques. Globalement, 15 % des enfants de moins de 18 ans ne vivent pas avec leurs parents biologiques que ceux-ci soient en vie ou décédés et 7 % sont orphelins de père et/ou de mère.

Tendances : Les proportions d'enfants de moins de 18 ans ne vivant avec aucun parent biologique ou les proportions de ceux qui sont orphelins n'ont pratiquement pas varié entre 2011-2012 et 2017-2018.

Variations par caractéristique

- Le pourcentage d'enfants ne vivant avec aucun parent biologique augmente avec l'âge, passant de 5 % chez les 0-4 ans à 29 % chez les 15-17 ans.
- Le pourcentage d'enfants orphelins d'au moins un des parents biologiques au moins augmente avec l'âge, passant de 2 % chez les 0-4 ans à 16 % chez les 15-17 ans.
- Le pourcentage d'enfants ne vivant avec aucun parent biologique varie selon le sexe de l'enfant. IL est plus élevé chez les filles que chez les garçons (17 % contre 13 %)
- Le pourcentage d'enfants orphelins d'un des parents ou des deux varie d'un maximum de 11 % dans le Couffo à un minimum dans le Borgou et les Collines (5 % pour chacun).

18.3 DISCIPLINE DES ENFANTS

L'éducation de l'enfant commence d'abord en famille par l'acquisition de certaines valeurs. Ces valeurs peuvent englober la maîtrise de soi et des règles de bonne conduite, etc. Les pratiques parentales positives consistent à éduquer l'enfant sur la façon de gérer leurs émotions ou les conflits en préservant leur intégrité physique et psychologique, leur dignité et en les encourageant à utiliser leur jugement et à être responsables. Cependant, les enfants sont souvent élevés avec des méthodes punitives qui reposent sur l'usage de la force physique ou l'intimidation verbale pour obtenir les comportements désirés. Des études ont montré que l'exposition des enfants à la discipline violente a des conséquences néfastes, qui ont des répercussions immédiates et à long terme à l'âge adulte.

Méthodes non violentes

Sont considérées comme méthodes de discipline non violentes les mesures suivantes :

- Retirer des privilèges à l'enfant, lui interdire de faire quelque chose qu'il aime ou ne pas permettre à l'enfant de quitter la maison ;
- Expliquer à l'enfant pourquoi son comportement n'est pas acceptable ;
- Lui donner quelque chose d'autre à faire.

Échantillon : Enfants de 1-14 ans (population de droit)

Agression psychologique

Entrent dans cette catégorie, un ou plusieurs comportements suivants :

- Crier ou hurler sur l'enfant ;
- Traiter l'enfant d'idiot, de paresseux ou d'un terme similaire.

Échantillon : Enfants de 1-14 ans (population de droit)

Châtiments corporels

Entrent dans cette catégorie, un ou plusieurs comportements suivants :

- Secouer l'enfant ;
- Frapper l'enfant, le taper sur les fesses à mains nues ;
- Frapper l'enfant sur les fesses ou sur d'autres endroits du corps avec quelque chose comme une ceinture, une brosse à cheveux, un bâton ou un objet similaire dur ;
- Frapper ou gifler l'enfant sur le visage, la tête ou les oreilles ;
- Frapper ou taper sur les mains, les bras ou les jambes ;
- Frapper encore et encore aussi fort que possible.

Échantillon : Enfants de 1-14 ans (population de droit)

Châtiments corporels violents

Entrent dans cette catégorie, l'un ou l'autre des comportements suivants :

- Frapper ou gifler l'enfant sur le visage, la tête ou les oreilles ;
- Battre l'enfant encore et encore aussi fort que possible.

Échantillon : Enfants de 1-14 ans (population de droit)

La violence entrave le développement de l'enfant, sa capacité d'apprentissage et sa performance scolaire. Elle inhibe les relations positives, provoque une faible estime de soi, la détresse et la dépression émotionnelles. Au cours de l'enquête, une série de questions a été posée aux ménages sur les méthodes utilisées par les adultes pour discipliner les enfants de 1-14 ans. Les résultats obtenus sont présentés dans le **Tableau 18.3**.

Les résultats montrent qu'au Bénin neuf enfants de 1-14 ans sur dix (91 %) ont subi n'importe quelle forme de discipline violente. Parmi les enfants de 1-14 ans, environ neuf sur dix (87 %) ont subi une agression psychologique ; huit sur dix (80 %) n'importe quelle forme de châtiment corporel et près du quart (23 %) un châtiment corporel très violent.

Variations par caractéristique

- Le pourcentage d'enfants de 1-14 ans ayant subi n'importe quelle forme de discipline violente augmente globalement avec l'âge, de 83 % à 1-2 ans à 94 % à 5-9 ans.
- L'utilisation de sanctions non violentes à l'égard des enfants de 1 à 14 ans est très élevée dans le département de l'Alibori (17 %) et très faible dans l'Atlantique (1 %), l'Ouémé et le Plateau (2 % pour chacun); dans ces 3 départements, la quasi-totalité des enfants de 1-14 ans ont subi n'importe quelle forme de discipline violente (respectivement 98 %, 94 % et 97 %)

- Une personne adulte sur trois (33 %) ayant répondu au module sur la discipline des enfants pense que l'enfant a besoin de punition physique. On constate que cette opinion est plus fréquemment partagée à Cotonou (38 % contre 33 % en milieu rural) et dans les départements de l'Ouémé et de l'Atlantique (respectivement 46 % et 48 % contre 17 % dans la Donga) qu'ailleurs. De même, le pourcentage d'enquêtés approuvant l'utilisation de méthodes de discipline violentes à l'égard des enfants tend à diminuer légèrement avec le niveau d'instruction, passant de 34 % parmi les enquêtés sans niveau d'instruction à 29 % parmi les plus instruits (**Tableau 18.4**).
- Le recours à des méthodes de discipline violente à l'égard des enfants de 1-14 ans tend à être plus fréquent des ménages du quintile le plus bas au plus élevé, passant de 88 % à 94 %.

18.4 TRAVAIL DES ENFANTS

Selon l'article 32 de la Convention relative aux droits de l'Enfant, « L'enfant a le droit d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social » (Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, 1989). Toutes les dispositions doivent être prises pour que les enfants ne soient pas exposés à des risques, qu'ils ne soient pas exploités et qu'ils ne tombent pas dans un cycle de pauvreté et de privation. En outre, l'alinéa 2 du même article précise les conditions dans lesquelles l'activité de l'enfant est considérée comme du travail en :

- Fixant l'âge minimum ou des âges minimal d'admission à l'emploi ;
- Prévoyant la réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi ;
- Prévoyant des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article.

Or les enfants, dans le monde sont régulièrement engagés dans des formes rémunérées et non rémunérées de travail. Au cours de l'EDSB-V, une série de questions a été posée pour collecter les informations sur l'implication des enfants dans les activités domestiques et économiques. Le module développé par l'UNICEF dans les enquêtes MICS a été intégré dans cette enquête.

Participation à des activités économiques

Pour classer les enfants selon leur implication dans des activités économiques, l'UNICEF définit trois seuils basés sur l'âge des enfants et sur le nombre d'heures pendant lesquelles ils ont travaillé dans la semaine avant l'enquête :

- Pour les enfants de 5-11 ans : 1 heure ou plus
- Pour les enfants de 12-14 ans : 14 heures ou plus
- Pour les enfants de 15-17 ans : 43 heures ou plus

Un enfant qui a participé à des activités économiques durant la semaine ayant précédé l'interview pendant un nombre d'heures égal ou supérieur à celui qui a été défini pour son âge, tel que présenté ci-dessus, est considéré comme « engagé dans le travail des enfants ».

Échantillon : Enfants de 5 -17 ans (population de droit)

Participation à des activités domestiques

Pour classer les enfants selon leur implication dans des travaux domestiques, l'UNICEF définit deux seuils basés sur l'âge des enfants et sur le nombre d'heures pendant lesquelles ils ont travaillé dans la semaine :

- Pour les enfants de 5-11 ans et de 12-14 ans : 28 heures ou plus
- Pour les enfants de 15-17 ans : 43 heures ou plus

Un enfant qui a participé à des travaux domestiques durant la semaine ayant précédé l'interview pendant un nombre d'heures égal ou supérieur à celui qui a été défini pour son âge, tel que présenté ci-dessus, est considéré comme « engagé dans le travail des enfants ».

Échantillon : Enfants de 5-17 ans (population de droit)

Exposition à des travaux dangereux

Selon la définition de l'UNICEF, les enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses sont ceux qui : a) portent des charges lourdes ; b) travaillent avec des outils dangereux ou font fonctionner de grosses machines ; c) sont exposés à la poussière, à la fumée ou au gaz ; d) sont exposés au froid, à la chaleur ou à l'humidité extrême ; e) sont exposés à des bruits intenses ou à des vibrations ; f) sont exposés à un travail en hauteur ; g) sont exposés à des produits chimiques (pesticides, colle) ou à des explosifs ; h) sont exposés à d'autres choses, procédés ou conditions délétères pour leur santé ou leur sécurité.

Échantillon : Enfants de 5-17 ans (population de droit)

Au Bénin, un tiers des enfants de 5 à 17 ans (33 %) ont été impliqués dans le travail des enfants au cours de la semaine ayant précédé l'interview, c'est-à-dire qu'ils ont participé à des activités économiques ou à des travaux domestiques à la limite ou au-dessus du nombre d'heures fixé pour leur groupe d'âges ou les conditions dans lesquelles ils ont travaillé sont considérées comme étant dangereuses pour leur santé ou leur sécurité (**Tableau 18.7**).

Pour des informations plus détaillées sur l'implication des enfants dans des activités économiques et des travaux domestiques, consulter les **Tableaux 18.5 et 18.6**.


Près de deux enfants de 5 à 17 ans sur dix (17 %) ont été impliqués dans des activités économiques pour un nombre total d'heure à la limite ou au-dessus du seuil spécifique pour l'âge et 9 % d'entre eux ont été impliqués dans des tâches domestiques pour un nombre total d'heures à la limite ou au-dessus du seuil spécifique (**Tableau 18.7 et Graphique 18.4**). Pour plus de deux enfants de 5 à 17 ans sur dix (23 %) le travail a été effectué dans des conditions dangereuses.

Variations par caractéristique

- La participation des enfants dans le travail est plus élevée en milieu rural (40 %) qu'en milieu urbain (23 %).
- Les enfants des départements de l'Alibori (55 %) sont plus impliqués dans le travail des enfants que ceux du Littoral (11 %) ou de l'Ouémé (12 %).
- La participation des enfants dans le travail varie en fonction de la fréquentation scolaire : 44 % des enfants qui ne vont pas à l'école travaillent contre 30 % de ceux qui fréquentent l'école.

Graphique 18.4 Travail des enfants


Pourcentage d'enfants de 5-17 ans ayant été impliqués, au cours de la semaine avant l'interview, dans des activités économiques ou des travaux domestiques à la limite ou au dessus du nombre d'heures fixé



- Le niveau de bien-être économique du ménage influence la participation des enfants dans le travail, celle-ci ayant tendance à diminuer avec l'amélioration du niveau de bien-être : dans le quintile le plus bas, pratiquement un enfant sur deux travaille (49 %) contre 13 % dans le quintile le plus élevé (**Graphique 18.5**).

Graphique 18.5 Ensemble du travail des enfants par bien-être économique du ménage

Pourcentage d'enfants de 5-17 ans



18.4.1 Activités économiques des enfants de 5-17 ans

- Deux enfants de 5-11 ans sur dix (21 %) ont été impliqués dans une activité économique pendant au moins une heure au cours de la semaine avant l'interview avec un fort pourcentage en milieu rural (25 %), dans l'Alibori (35 %), et dans les ménages classés dans le quintile le plus bas (31 %) (**Tableau 18.5**).
- Parmi les enfants de 12-14 ans, 12 % ont été impliqués dans une activité économique pendant quatorze heures ou plus. Cependant, en milieu rural (15 %), dans l'Alibori (29 %), parmi les enfants qui ne fréquentent pas l'école (29 %) et parmi ceux des ménages des deux premiers quintiles de bien-être économique (20 % dans chaque quintile), ce pourcentage est plus élevé.
- Parmi les enfants de 15-17 ans, 7 % ont été impliqués dans une activité économique pendant 43 heures ou plus pendant la semaine avant l'interview avec un fort pourcentage parmi les enfants qui ne fréquentent pas l'école (15 %), ceux qui vivent dans les ménages du quintile le plus bas (13 %) et ceux des départements de l'Alibori et du Borgou (15 % dans chaque cas).

18.5 DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT

Certaines questions du module de l'UNICEF concernant le développement du jeune enfant ont été posées dans les ménages qui comprenaient au moins un enfant de 0-4 ans avec sa mère. Précisons que ces questions ont été posées pour l'enfant le plus jeune. En outre, en fonction des indicateurs recherchés, les questions ont été posées pour des enfants de groupe d'âges différents. Certaines questions ont été posées à propos des plus jeunes enfants de 0-4 ans alors que celles concernant la fréquentation d'un programme préscolaire ou le soutien à l'apprentissage s'adressaient aux enfants de 3-4 ans. En outre, à la différence des modules précédents qui ont été posés au cours de l'enquête auprès des ménages, celui concernant le développement du jeune enfant a été posé au cours de l'enquête auprès des femmes.

Compte tenu des indicateurs recherchés, les questions ont été posées sur des enfants de groupes d'âges différents. Certaines questions, telles que celles relatives à la fréquentation d'un programme d'éducation préscolaire ou le soutien à l'apprentissage, ont été posées au sujet des enfants de 36-59 mois alors que celles concernant le matériel d'apprentissage et l'encadrement inapproprié des enfants s'adressaient aux parents d'enfants de moins de 5 ans. En outre, à la différence du module sur le travail et la discipline, celui portant sur le développement du jeune enfant a été posé au cours de l'enquête auprès des femmes.

18.5.1 Éducation de la petite enfance


Au cours de l'enquête, on a demandé si les enfants de 36-59 mois suivaient un programme d'apprentissage éducatif ou s'ils fréquentaient une classe d'éveil, un jardin d'enfants ou une garderie communautaire. Au Bénin, 19 % des enfants de 36-59 mois fréquentent un programme d'éducation préscolaire (**Tableau 18.8**).

Variations par caractéristique

- Le pourcentage d'enfants qui suivent un programme d'éducation préscolaire varie en fonction de l'âge, passant de 12 % parmi ceux de 36-47 mois à 28 % parmi ceux de 48-59 mois.
- La fréquentation d'un programme d'éducation préscolaire est plus courante en milieu urbain (31 %), surtout à Cotonou (55 %), qu'en milieu rural (12 %).
- La fréquentation d'un programme d'éducation préscolaire varie de manière importante entre les départements, d'un minimum de 6 % dans le Couffo à 55 % dans le Littoral.
- La fréquentation d'un programme d'éducation préscolaire augmente avec le niveau d'instruction de la mère, passant de 12 % parmi les enfants dont la mère n'a aucun niveau d'instruction à 77 % parmi ceux dont la mère a atteint le niveau secondaire 2^d cycle ou plus (**Graphique 18.6**).
- La fréquentation d'un programme d'éducation préscolaire est influencée par le niveau de bien-être économique du ménage, seulement 5 % des enfants dont le ménage est classé dans le quintile le plus bas suivent un programme d'apprentissage préscolaire contre 49 % parmi ceux dont le ménage est classé dans le quintile le plus élevé.

Graphique 18.6 Enfants qui fréquentent un programme d'éducation préscolaire par niveau d'instruction de la mère

Pourcentage d'enfants de 36-59 mois



18.5.2 Soutien à l'apprentissage

Soutien à l'apprentissage

Pourcentage d'enfants qui ont participé, au cours des trois derniers jours, avec un membre adulte du ménage (âgé de 15 ans ou +) à l'une des activités suivantes :

- Lire des livres ou regarder des livres illustrés ;
- Raconter des histoires à l'enfant ;
- Chanter des chansons à l'enfant ou avec l'enfant (y compris des berceuses) ;
- Emmener l'enfant en promenade en dehors de la maison, de la cour ou de l'enceinte ;
- Jouer avec l'enfant ;
- Nommer, compter et/ou dessiner des choses pour ou avec l'enfant.

Échantillon : Enfants de 3-4 ans (36-59 mois)

Le **Tableau 18.9** présente les pourcentages d'enfants de 36-59 mois qui ont participé, au cours des trois jours avant l'interview, avec un membre adulte du ménage à des activités qui favorisent l'apprentissage et la préparation à l'école.

Les résultats révèlent que 41 % des enfants avaient participé à, au moins, quatre activités d'apprentissage avec un membre adulte du ménage en 2017-2018.

De plus, ces résultats montrent que la mère biologique prend davantage part à des activités d'éveil et d'apprentissage avec l'enfant que le père biologique (18 % contre 4 %).

Le nombre moyen d'activités avec un membre adulte du ménage est de 3. Quand cet adulte est le père biologique, le nombre moyen d'activités est de 0,6 et de 1,7 quand cet adulte est la mère biologique.

Variations par caractéristique

- Le soutien à l'apprentissage des enfants est plus fréquent dans le Littoral (69 %) que dans le Couffo (21 %).
- Le niveau d'instruction de la mère influence le soutien à l'apprentissage de l'enfant : 36 % des enfants dont la mère n'a aucun niveau d'instruction contre 81 % parmi ceux dont la mère a le niveau secondaire 2^d cycle ou plus. En outre, seulement 15 % des enfants ont effectué au moins 4 activités avec leur mère biologique quand celle-ci n'a aucun niveau d'instruction contre 50 % quand elle a un niveau secondaire 2^d cycle ou plus (**Tableau 18.9**).
- Le soutien à l'apprentissage de l'enfant est plus fréquent dans les ménages du quintile de bien-être le plus élevé (59 %) que dans ceux du quintile le plus bas (37 %) (**Graphique 18.7**).


18.5.3 Matériel d'apprentissage

Au cours de l'EDSB-V 2017-2018, des questions ont été posées sur la disponibilité de livres pour enfants ou de livres d'images ainsi que sur les objets utilisés par l'enfant pour jouer, que ces jouets soient fabriqués à la maison, qu'ils proviennent d'un magasin ou d'un fabricant ou qu'ils soient des objets du ménage. Les résultats sont présentés au **Tableau 18.10** pour les enfants de moins de 5 ans.

Le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans dont le ménage dispose d'au moins trois livres pour enfants est très faible (2 %). S'agissant des jouets, on constate que 69 % des enfants jouent avec des objets du ménage ou trouvés dehors, 43 % s'amuse avec des jouets de magasin et 51 % avec des jouets fabriqués à la maison. Globalement, plus de la moitié des enfants (55 %) jouent avec au moins 2 types de jouets.

Graphique 18.7 Soutien à l'apprentissage par bien-être économique

Pourcentage d'enfants de 36-59 mois ayant participé au cours des 3 derniers jours à 4 ou plus activités d'apprentissage avec un membre adulte du ménage



Variations par caractéristique

- Le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans disposant de deux types de jouets ou plus augmente avec l'âge, de 41 % à 0-23 mois à 61 % à 24-59 mois.
- Le pourcentage d'enfants jouant avec deux types de jouets ou plus varie sensiblement selon la résidence et le département. Il est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural (62 % contre 50 %) et dans le Littoral (69 %) que dans l'Alibori (34 %).
- La disponibilité d'au moins trois livres et de jouets de magasin augmente sensiblement avec le niveau d'instruction de la mère, passant pour les livres, de moins d'un pour cent quand elle n'a aucun niveau d'instruction à 11 % lorsqu'elle a atteint le niveau secondaire 2^d cycle ou plus et, pour les jouets de magasin, de respectivement 36 % à 76 %.

18.6 ENCADREMENT INAPPROPRIÉ DES JEUNES ENFANTS

Encadrement inapproprié des jeunes enfants

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans laissés seuls ou à la garde d'un enfant de moins de 10 ans pendant plus d'une heure une fois au cours de la semaine ayant précédé l'interview.

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans

Un enfant livré à lui-même ou confié à un autre enfant est exposé à un risque accru d'accident, de négligence et de mauvais traitement. Au cours de l'EDSB-V 2017-2018, on a demandé à la mère combien de jours l'enfant avait été laissé seul ou à la garde d'un autre enfant de moins de 10 ans pendant plus d'une heure au cours de la semaine avant l'enquête.

Au Bénin, 24 % des enfants de moins de cinq ans ont été laissés seuls pendant plus d'une heure au cours de la semaine avant l'enquête et 18 % ont été laissés à la garde d'un autre enfant de moins de dix ans pendant plus d'une heure. Globalement, 29 % des enfants sont restés sans encadrement approprié pendant plus d'une heure au cours de la dernière semaine avant l'enquête (**Tableau 18.11**).

Variations par caractéristique

- Il est plus fréquent de laisser les enfants de 24-59 mois sans soins appropriés que ceux de 0-23 mois (34 % contre 18 %).
- Le pourcentage d'enfants laissés sans encadrement approprié pendant plus d'une heure est plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain (31 % contre 26 %).
- Le pourcentage d'enfants laissés sans encadrement approprié pendant plus d'une heure varie selon le département : dans les départements des Collines, la Donga et de l'Ouémé (20 % pour chacun) contre 43 % dans celui du Mono.
- Le pourcentage d'enfants laissés sans encadrement approprié pendant plus d'une heure diminue avec le niveau d'instruction de la mère et le niveau de bien-être économique, passant de 32 % quand elle n'a aucun niveau d'instruction à 21 % quand elle a atteint le niveau secondaire 2^d cycle ou plus et, de 36 % dans le quintile le plus bas à 22 % dans le plus élevé.

18.7 INDICE DE DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT

Indice de développement du jeune enfant

L'indice de développement du jeune enfant correspond au pourcentage d'enfants qui sont en bonne voie de développement dans, au moins, 2 des 4 domaines suivants :

Alphabétisation et calcul

L'enfant est considéré comme étant en bonne voie de développement dans ce domaine s'il réunit au moins 2 des conditions suivantes :

- L'enfant peut citer au moins 10 lettres de l'alphabet ;
- L'enfant peut lire au moins 4 mots simples, courants ;
- L'enfant peut citer et reconnaître tous les chiffres de 1 à 10.

Physique

L'enfant est considéré comme étant en bonne voie de développement dans ce domaine s'il réunit au moins une des conditions suivantes :

- L'enfant peut attraper par terre avec 2 doigts un petit objet comme un bâton ou un caillou ;
- L'enfant n'est pas parfois trop malade pour jouer.

Social/émotionnel

L'enfant est considéré comme étant en bonne voie de développement dans ce domaine s'il réunit au moins deux des conditions suivantes :

- L'enfant s'entend bien avec les autres enfants ;
- L'enfant ne donne pas de coup de pied, ne mord pas ou ne frappe pas les autres enfants ;
- L'enfant n'est pas facilement distrait.

Apprentissage

L'enfant est considéré comme étant en bonne voie de développement dans ce domaine s'il réunit au moins une des conditions suivantes :

- L'enfant est capable de suivre de simples instructions pour faire quelque chose correctement ;
- Quand on donne quelque chose à faire à l'enfant, il est capable de le faire de manière indépendante.

Échantillon : Enfants de 36-59 mois

Au Bénin, 57 % des enfants de 36-59 mois sont considérés comme étant en bonne voie de développement dans au moins trois des quatre domaines suivants : alphabétisation/calcul, développement physique, social-émotionnel et apprentissage (**Tableau 18.12**). Globalement, on note que le pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui sont en bonne voie de développement est plus faible (10 %) dans le domaine de l'alphabétisation/calcul que dans les autres domaines où il est plus élevé (plus de 70 %).

Variations par caractéristique

- Le score de l'indice de développement du jeune enfant est plus élevé chez les enfants de 48-59 mois que chez ceux de 36-47 mois (61 % contre 53 %).
- Le score de l'indice de développement du jeune enfant est légèrement plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural (59 % contre 55 %).
- Le pourcentage d'enfants de 36-59 mois considérés comme en bonne voie de développement augmente avec le niveau d'instruction de la mère, passant de 51 % quand celle-ci n'a aucun niveau d'instruction à 82 % quand elle a atteint le niveau secondaire 2^d cycle ou plus.

- L'indice de développement du jeune enfant varie avec le niveau de bien-être économique du ménage : 48 % des enfants des ménages classés dans le quintile le plus bas sont en bonne voie de développement contre 70 % de ceux dont le ménage est classé dans le quintile le plus élevé.

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'information sur le statut de l'enfant, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 18.1** Enregistrement à l'état civil des naissances d'enfants de moins de 5 ans
- **Tableau 18.2** Enfants orphelins et résidence des enfants avec les parents
- **Tableau 18.3** Discipline des enfants
- **Tableau 18.4** Opinion concernant les châtiments corporels
- **Tableau 18.5** Implication des enfants de 5-17 ans dans l'activité économique
- **Tableau 18.6** Implication des enfants de 5-17 ans dans les travaux domestiques
- **Tableau 18.7** Travail des enfants
- **Tableau 18.8** Éducation de la petite enfance
- **Tableau 18.9** Soutien à l'apprentissage
- **Tableau 18.10** Matériel d'apprentissage
- **Tableau 18.11** Encadrement inapproprié des enfants
- **Tableau 18.12** Index de développement du jeune enfant

Tableau 18.1 Enregistrement à l'état civil des naissances d'enfants de moins de 5 ans

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans (population de droit) enregistré à la naissance à l'état civil, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'enfants enregistré à la naissance à l'état civil et qui :			Effectif d'enfants
	Ont un certificat de naissance	N'ont pas un certificat de naissance	Pourcentage total dont la naissance a été enregistré	
Âge de l'enfant				
<2	60,2	27,6	87,7	5 576
2-4	66,3	17,8	84,1	7 892
Sexe de l'enfant				
Masculin	64,2	21,2	85,4	6 817
Féminin	63,3	22,5	85,9	6 651
Résidence				
Cotonou	82,7	11,7	94,4	575
Autres villes	69,8	21,0	90,7	4 603
Ensemble urbain	71,2	19,9	91,2	5 178
Rural	59,1	23,0	82,1	8 290
Département				
Alibori	52,8	30,6	83,3	1 789
Atacora	65,6	15,5	81,1	1 184
Atlantique	72,8	19,9	92,7	1 479
Borgou	45,2	20,1	65,3	1 823
Collines	68,8	20,9	89,7	857
Couffo	64,2	19,3	83,6	957
Donga	78,3	10,0	88,2	904
Littoral	82,7	11,7	94,4	575
Mono	64,4	30,8	95,3	611
Ouémé	61,6	28,5	90,1	1 216
Plateau	62,6	25,8	88,3	793
Zou	73,4	22,7	96,1	1 279
Quintiles de bien-être économique				
Le plus bas	43,3	25,5	68,8	2 905
Second	57,2	25,8	83,0	2 771
Moyen	68,2	21,2	89,4	2 742
Quatrième	72,0	20,9	92,9	2 650
Le plus élevé	81,9	14,7	96,5	2 399
Ensemble	63,8	21,8	85,6	13 468

Tableau 18.2 Enfants orphelins et résidence des enfants avec les parents

Répartition (en %) des enfants (population de droit) de moins de 18 ans par état de survie des parents et résidence avec les parents, pourcentage d'enfants ne vivant avec aucun parent biologique et pourcentage d'enfants dont l'un ou les deux parents est/sont décédé(s), selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Vit avec les deux parents	Vit avec la mère mais pas avec le père		Vit avec le père mais pas avec la mère		Ne vit avec aucun des deux parents					Total	Pourcentage ne vivant avec aucun parent biologique	Pourcentage avec un ou les deux parent(s) décédé(s) ¹	Effectif d'enfants	
		Père en vie	Père décédé	Mère en vie	Mère décédée	Les deux sont vivants	Seul le père est vivant	Seule la mère est vivante	Les deux décédés	Information manquante sur père/mère					
Âge															
0-4	74,5	16,7	1,5	2,1	0,2	4,5	0,3	0,2	0,1	0,0	100,0	5,1	2,2	13 468	
<2	78,2	19,1	0,9	0,7	0,1	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	100,0	1,1	1,2	5 576	
2-4	71,9	15,0	1,8	3,1	0,3	7,0	0,4	0,3	0,1	0,0	100,0	7,8	3,0	7 892	
5-9	61,7	11,7	2,6	6,1	1,1	13,7	0,9	1,5	0,4	0,1	100,0	16,6	6,5	12 290	
10-14	54,5	9,7	5,1	7,9	1,8	16,2	1,1	2,8	0,8	0,0	100,0	21,0	11,7	9 578	
15-17	45,5	9,2	6,4	7,4	2,0	21,6	2,1	4,0	1,6	0,1	100,0	29,3	16,0	4 189	
Sexe															
Masculin	63,6	12,4	3,4	6,4	1,2	10,0	0,8	1,7	0,5	0,0	100,0	13,0	7,6	20 077	
Féminin	61,6	12,9	3,0	4,2	0,9	14,1	1,0	1,6	0,5	0,1	100,0	17,3	7,1	19 448	
Résidence															
Cotonou	57,2	19,0	3,1	3,5	0,7	12,1	1,6	2,0	0,7	0,2	100,0	16,3	8,1	1 746	
Autres villes	62,4	12,5	3,2	5,0	1,0	12,7	0,8	1,8	0,5	0,1	100,0	15,9	7,3	13 527	
Ensemble urbain	61,8	13,3	3,2	4,8	1,0	12,7	0,9	1,8	0,5	0,1	100,0	15,9	7,4	15 273	
Rural	63,1	12,3	3,3	5,6	1,1	11,6	0,8	1,6	0,5	0,0	100,0	14,5	7,3	24 252	
Département															
Alibori	73,4	7,2	2,7	4,2	1,3	8,5	0,7	1,4	0,5	0,0	100,0	11,1	6,6	5 157	
Atacora	63,9	9,9	3,9	6,1	1,1	12,8	0,5	1,2	0,4	0,0	100,0	14,9	7,2	3 534	
Atlantique	60,4	15,3	4,1	4,0	1,4	11,2	1,3	1,8	0,4	0,1	100,0	14,6	9,0	4 506	
Borgou	70,8	6,5	1,8	5,9	1,1	11,5	0,5	1,4	0,4	0,0	100,0	13,9	5,3	5 236	
Collines	57,5	17,3	2,2	6,5	0,2	14,0	0,7	1,2	0,4	0,0	100,0	16,3	4,8	2 549	
Couffo	52,7	16,4	6,0	6,4	0,9	13,3	0,9	2,5	0,8	0,1	100,0	17,6	11,2	2 880	
Donga	62,4	5,5	2,1	10,3	1,7	14,9	0,8	1,8	0,5	0,1	100,0	17,9	6,9	2 634	
Littoral	57,2	19,0	3,1	3,5	0,7	12,1	1,6	2,0	0,7	0,2	100,0	16,3	8,1	1 746	
Mono	51,2	23,9	2,5	3,4	0,7	14,4	1,1	2,0	0,6	0,1	100,0	18,1	7,0	1 770	
Ouémé	62,9	13,5	4,5	4,4	0,8	10,8	1,4	1,5	0,2	0,1	100,0	13,8	8,3	3 515	
Plateau	62,4	13,3	2,0	5,1	1,6	12,2	0,5	2,2	0,7	0,0	100,0	15,6	7,0	2 395	
Zou	56,4	18,0	3,5	4,4	0,7	13,6	0,9	1,5	0,9	0,0	100,0	17,0	7,5	3 603	
Quintiles de bien-être économique															
Le plus bas	68,9	10,0	3,8	5,2	0,9	8,7	0,9	1,1	0,4	0,0	100,0	11,2	7,2	8 418	
Second	61,7	12,7	3,6	5,7	1,2	12,0	0,8	1,9	0,5	0,0	100,0	15,2	7,9	8 162	
Moyen	60,6	13,2	2,9	5,7	1,5	13,2	0,7	1,7	0,5	0,0	100,0	16,1	7,3	7 990	
Quatrième	60,1	14,3	3,4	5,5	0,8	12,6	0,9	1,7	0,6	0,1	100,0	15,8	7,4	7 810	
Le plus élevé	61,4	13,2	2,3	4,5	0,9	14,0	1,2	1,9	0,5	0,1	100,0	17,6	6,8	7 144	
Ensemble <15	64,6	13,1	2,9	5,1	0,9	10,9	0,7	1,4	0,4	0,0	100,0	13,4	6,3	35 335	
Ensemble <18	62,6	12,7	3,2	5,3	1,1	12,0	0,9	1,6	0,5	0,1	100,0	15,1	7,3	39 524	

Note : Le tableau est basé sur la population de droit des ménages, c'est-à-dire les résidents habituels.

¹ Comprend les enfants dont le père est décédé ou la mère est décédée ou les deux parents sont décédés et ceux dont un seul parent est décédé et dont l'information sur l'état de survie de l'autre parent est manquante.

Tableau 18.3 Discipline des enfants

Pourcentage d'enfants de 1-14 ans (population de droit) qui, au cours du mois ayant précédé l'interview, ont subi des sanctions disciplinaires quelle qu'en soit la forme, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'enfants de 1-14 ans qui ont subi :					Effectif d'enfants de 1-14 ans
	Seulement des sanctions non violentes ¹	Agression psychologique ²	Châtiment corporel : n'importe quelle forme ³	Châtiment corporel : très violent ⁴	N'importe quelle forme de recours à la violence	
Sexe						
Masculin	5,1	86,9	81,0	23,4	91,1	4 863
Féminin	5,5	87,5	78,6	22,0	91,2	4 737
Âge						
1-2	7,0	75,4	73,8	12,7	82,8	1 659
3-4	4,7	86,2	85,4	21,3	91,4	1 580
5-9	4,8	90,4	84,2	25,4	93,7	3 601
10-14	5,4	90,7	74,6	26,0	92,7	2 761
Résidence						
Cotonou	3,7	89,5	84,1	19,4	93,8	514
Autres villes	4,7	87,2	81,0	21,9	91,0	3 471
Ensemble urbain	4,6	87,5	81,4	21,5	91,3	3 985
Rural	5,8	87,0	78,7	23,5	91,0	5 615
Département						
Alibori	17,3	70,8	72,4	24,9	78,5	943
Atacora	4,2	87,6	76,8	35,7	91,8	696
Atlantique	1,3	94,9	88,5	29,8	97,6	1 241
Borgou	7,9	85,2	72,0	15,1	88,6	1 100
Collines	3,4	90,9	83,0	18,5	94,6	624
Couffo	7,8	88,2	73,0	13,0	91,6	759
Donga	4,8	75,0	66,3	22,8	80,7	554
Littoral	3,7	89,5	84,1	19,4	93,8	514
Mono	3,1	91,3	82,4	33,3	93,6	524
Ouémé	1,9	90,5	86,7	21,8	94,3	1 044
Plateau	1,8	94,0	86,8	19,0	97,4	674
Zou	4,5	87,4	82,1	20,6	90,6	928
Niveau d'instruction de la mère						
Aucun	6,1	86,3	80,1	24,8	90,3	4 856
Primaire	3,0	88,9	85,5	24,0	92,9	1 450
Secondaire 1 ^{er} cycle	4,5	86,3	82,5	18,0	90,7	788
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	2,9	85,7	84,5	14,1	93,4	285
Mère ne vit pas dans le ménage	5,9	88,5	74,0	20,0	91,6	2 207
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	8,5	83,2	74,8	24,5	87,5	1 832
Second	6,4	86,4	77,8	24,1	90,6	1 892
Moyen	4,4	87,9	80,1	24,2	91,9	1 906
Quatrième	4,5	88,5	82,0	22,0	91,7	1 970
Le plus élevé	3,2	89,6	83,9	18,9	93,8	2 000
Ensemble ⁵	5,3	87,2	79,8	22,7	91,2	9 600

¹ Les « sanctions non violentes » comprennent seulement une ou plusieurs des catégories suivantes : a) on lui a retiré des privilèges ; b) on a expliqué à l'enfant pourquoi son comportement n'est pas acceptable ; c) on a donné à l'enfant autre chose à faire.

² Les « agressions psychologiques » comprennent seulement une ou plusieurs des catégories suivantes : a) On a crié ou hurlé sur l'enfant, b) on a traité l'enfant d'idiote, de paresseux, ou d'un autre nom.

³ Les « châtements corporels » comprennent une ou plusieurs des catégories suivantes : a) On a secoué l'enfant, b) on l'a frappé ou tapé sur les fesses avec les mains nues, c) on l'a frappé sur les fesses ou ailleurs sur le corps avec quelque chose tel qu'une ceinture, une brosse à cheveux, un bâton ou autre objet dur, d) on l'a frappé ou giflé sur le visage, la tête ou les oreilles, e) on l'a frappé ou tapé sur les mains, les bras ou les jambes, f) on l'a frappé encore et encore aussi fort que possible.

⁴ Les formes très violentes de « châtements corporels » comprennent uniquement l'une ou les deux catégories suivantes : a) on a frappé ou giflé l'enfant sur le visage, la tête ou les oreilles, b) on l'a frappé aussi fort que possible.

⁵ Y compris 14 enfants de 1-14 ans qui travaillent pour lesquelles l'information sur le niveau d'instruction de la mère est manquante.

Tableau 18.4 Opinion concernant les châtiments corporels

Pourcentage d'enquêtés ayant participé au module sur la discipline de l'enfant de 1-14 ans qui pensent que le recours à des châtiments corporels est justifié pour élever, et éduquer correctement un enfant, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'enquêtés qui pensent que l'enfant a besoin de punition physique	Effectif d'enquêtés ayant répondu au module sur la discipline des enfants
Sexe de l'enquêté		
Masculin	32,2	5 031
Féminin	34,6	4 569
Âge de l'enquêté		
<25	30,6	849
25-39	33,6	4 379
40-59	34,2	3 184
60 et plus	31,8	1 188
Résidence		
Cotonou	38,2	514
Autres villes	33,6	3 471
Ensemble urbain	34,2	3 985
Rural	32,7	5 615
Département		
Alibori	38,6	943
Atacora	39,2	696
Atlantique	47,8	1 241
Borgou	28,7	1 100
Collines	33,6	624
Couffo	22,0	759
Donga	16,6	554
Littoral	38,2	514
Mono	22,8	524
Ouémé	46,1	1 044
Plateau	25,3	674
Zou	23,6	928
Niveau d'instruction de l'enquêté		
Aucun	33,5	5 337
Primaire	34,3	2 234
Secondaire 1 ^{er} cycle	31,9	1 207
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	29,4	492
Quintiles de bien-être économique		
Le plus bas	32,8	1 832
Second	33,7	1 892
Moyen	31,7	1 906
Quatrième	32,1	1 970
Le plus élevé	36,1	2 000
Ensemble ¹	33,3	9 600

¹ Y compris 13 enquêtés qui ont répondu au module sur la discipline des enfants pour lesquels l'information sur le niveau d'instruction de l'enquêté est manquant

Tableau 18.5 Implication des enfants de 5-17 ans dans l'activité économique

Pourcentage d'enfants de 5-17 ans impliqués dans l'activité économique au cours de la semaine avant l'interview, en fonction du groupe d'âges, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'enfants de 5-11 ans impliqués dans l'activité économique		Pourcentage d'enfants de 12-14 ans impliqués dans :			Pourcentage d'enfants de 15-17 ans impliqués dans :		
	pour au moins 1 heure	Effectif d'enfants de 5-11 ans	Activité économique pour moins de 14 heures	Activité économique pour 14 heures ou plus	Effectif d'enfants de 12-14 ans	Activité économique pour moins de 43 heures	Activité économique pour 43 heures ou plus	Effectif d'enfants de 15-17 ans
Sexe de l'enfant								
Masculin	21,9	2 370	28,1	11,2	776	34,6	8,9	636
Féminin	20,1	2 395	25,9	12,0	820	36,4	4,9	627
Résidence								
Cotonou	4,0	243	10,3	4,1	97	18,8	2,7	83
Autres villes	16,4	1 691	20,9	7,3	587	29,5	5,0	468
Ensemble urbain	14,8	1 933	19,4	6,8	683	27,9	4,6	552
Rural	25,2	2 832	32,6	15,1	913	41,4	8,7	711
Département								
Alibori	34,8	504	26,4	28,9	126	53,1	14,5	100
Atacora	22,5	358	31,2	22,4	111	36,3	11,0	101
Atlantique	11,6	628	21,8	7,1	211	27,6	1,4	174
Borgou	28,5	543	34,3	14,0	173	47,6	15,0	125
Collines	29,9	308	41,4	14,3	104	49,0	1,5	126
Couffo	34,1	412	34,6	17,4	132	44,8	12,4	104
Donga	16,7	281	30,7	9,1	87	27,1	7,6	50
Littoral	4,0	243	10,3	4,1	97	18,8	2,7	83
Mono	25,5	273	39,3	3,3	80	39,6	4,0	68
Ouémé	6,7	447	12,0	5,4	195	13,7	6,8	125
Plateau	18,2	326	31,2	6,7	112	37,5	6,2	61
Zou	15,3	443	24,6	8,2	167	32,2	3,2	145
Fréquentation scolaire								
Oui	18,9	3 315	26,2	7,7	1 304	33,4	4,9	1 017
Non	25,8	1 450	30,3	28,6	292	44,5	15,2	244
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	31,4	960	39,9	19,5	267	41,6	13,1	210
Second	28,3	974	32,3	20,4	312	49,9	7,9	239
Moyen	22,7	970	35,3	12,9	286	42,7	6,5	257
Quatrième	14,9	920	23,8	4,1	360	30,9	7,0	268
Le plus élevé	7,1	941	9,6	4,6	370	17,2	1,8	290
Ensemble ¹	21,0	4 765	27,0	11,6	1 596	35,5	6,9	1 263

¹ Y compris un enfant de 15-17 ans pour lequel l'information sur la fréquentation scolaire est manquante.

Tableau 18.6 Implication des enfants de 5-17 ans dans les travaux domestiques

Pourcentage d'enfants de 5-17 ans impliqués dans les travaux domestiques au cours de la semaine avant l'interview, en fonction du groupe d'âges, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'enfants de 5-11 ans impliqués dans :			Pourcentage d'enfants de 12-14 ans impliqués dans :			Pourcentage d'enfants de 15-17 ans impliqués dans :		
	Travaux domestiques pour moins de 28 heures	Travaux domestiques pour 28 heures ou plus	Effectif d'enfants de 5-11 ans	Travaux domestiques pour moins de 28 heures	Travaux domestiques pour 28 heures ou plus	Effectif d'enfants de 12-14 ans	Travaux domestiques pour moins de 43 heures	Travaux domestiques pour 43 heures ou plus	Effectif d'enfants de 15-17 ans
Sexe de l'enfant									
Masculin	60,3	7,5	2 370	75,3	11,3	776	79,4	7,2	636
Féminin	68,5	12,6	2 395	76,0	18,5	820	80,2	14,9	627
Résidence									
Cotonou	70,1	2,3	243	86,8	4,9	97	84,2	7,3	83
Autres villes	66,1	7,4	1 691	81,0	9,8	587	80,4	9,5	468
Ensemble urbain	66,6	6,8	1 933	81,9	9,1	683	80,9	9,2	552
Rural	62,9	12,3	2 832	71,1	19,4	913	78,9	12,5	711
Département									
Alibori	42,4	24,2	504	45,4	34,3	126	59,6	20,0	100
Atacora	53,3	16,5	358	57,3	26,7	111	57,3	27,8	101
Atlantique	79,6	2,3	628	89,3	7,5	211	92,8	0,0	174
Borgou	47,3	18,4	543	58,3	24,7	173	61,2	21,1	125
Collines	75,5	5,7	308	83,5	9,9	104	93,3	5,3	126
Couffo	74,3	9,8	412	75,6	18,3	132	88,9	8,6	104
Donga	44,4	14,2	281	67,4	20,2	87	63,6	17,4	50
Littoral	70,1	2,3	243	86,8	4,9	97	84,2	7,3	83
Mono	81,5	1,8	273	91,1	6,7	80	85,8	8,8	68
Ouémé	69,2	1,2	447	86,3	1,9	195	80,2	8,2	125
Plateau	73,2	6,8	326	91,1	5,2	112	86,7	12,3	61
Zou	68,9	10,8	443	74,7	21,6	167	88,8	7,5	145
Fréquentation scolaire									
Oui	70,0	7,9	3 315	79,5	12,3	1 304	81,8	9,7	1 017
Non	51,7	14,9	1 450	58,8	26,9	292	71,3	16,9	244
Quintiles de bien-être économique									
Le plus bas	56,0	17,3	960	64,3	22,6	267	67,9	18,7	210
Second	62,2	13,0	974	68,4	20,7	312	76,5	14,1	239
Moyen	65,4	10,4	970	74,3	17,6	286	80,4	11,8	257
Quatrième	69,4	5,6	920	81,6	9,0	360	84,1	7,5	268
Le plus élevé	69,4	3,6	941	85,4	8,6	370	86,7	5,7	290
Ensemble ¹	64,4	10,1	4 765	75,7	15,0	1 596	79,8	11,1	1 263

¹ Y compris un enfant de 15-17 ans pour lequel l'information sur la fréquentation scolaire est manquante.

Tableau 18.7 Travail des enfants

Pourcentage d'enfants de 5-17 ans (population de droit) impliqués dans l'activité économique ou les travaux domestiques au cours de la semaine avant l'interview, pourcentage d'enfants exposés aux travaux dangereux au cours de la semaine avant l'interview et pourcentage d'enfants de 5-17 ans (population de droit) impliqués dans le travail des enfants au cours de la semaine avant l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'enfants impliqués dans l'activité économique pour un total d'heures :		Pourcentage d'enfants impliqués dans les travaux domestiques pour un total d'heures :		Pourcentage d'enfants exposés à du travail dangereux ³	Ensemble du travail des enfants ⁴	Effectif d'enfants de 5-17 ans
	En dessous du seuil spécifique à l'âge ¹	Au-dessus du seuil d'âge spécifique ¹	En dessous du seuil d'âge spécifique ²	Au-dessus du seuil d'âge spécifique ²			
Sexe							
Masculin	14,8	17,9	70,0	7,0	23,7	32,6	3 782
Féminin	14,5	16,1	75,3	11,8	22,5	33,2	3 842
Résidence							
Cotonou	8,5	4,0	79,8	2,5	7,3	10,9	423
Autres villes	12,0	12,7	75,1	6,7	16,4	24,9	2 746
Ensemble urbain	11,5	11,6	75,7	6,1	15,2	23,1	3 168
Rural	16,8	20,9	70,5	11,8	28,7	39,9	4 456
Département							
Alibori	19,3	31,4	50,8	22,6	32,8	54,9	730
Atacora	14,2	21,6	62,4	15,5	27,5	42,2	570
Atlantique	10,8	9,0	85,1	3,0	14,1	19,2	1 013
Borgou	19,4	24,2	57,4	17,0	32,6	46,3	841
Collines	21,2	20,2	82,8	5,2	34,9	39,0	538
Couffo	14,7	27,7	78,6	10,0	30,7	41,3	648
Donga	10,6	14,2	55,9	13,7	13,6	32,8	418
Littoral	8,5	4,0	79,8	2,5	7,3	10,9	423
Mono	18,5	18,3	86,3	2,4	24,5	31,5	421
Ouémé	7,1	6,5	78,6	1,2	9,5	11,7	768
Plateau	14,2	14,2	80,4	5,6	22,0	29,4	498
Zou	16,9	11,4	76,1	11,1	24,8	33,6	755
Fréquentation scolaire							
Oui	14,5	14,0	77,6	7,5	20,1	28,9	5 636
Non	15,0	25,6	58,7	14,9	31,6	44,4	1 986
Quintiles de bien-être économique							
Le plus bas	17,0	27,2	64,0	15,8	34,1	49,1	1 437
Second	18,1	24,0	69,4	12,5	30,8	43,0	1 525
Moyen	17,6	18,2	73,0	10,0	27,7	37,3	1 512
Quatrième	13,6	11,2	77,5	5,4	17,0	24,2	1 548
Le plus élevé	7,4	5,7	78,6	4,1	7,4	13,1	1 601
Ensemble ⁵	14,6	17,0	72,7	9,4	23,1	32,9	7 624

¹ Selon la définition de l'UNICEF, le seuil se situe à 1 heure d'activité économique pour les enfants de 5-11 ans, 14 heures d'activité économique pour les enfants de 12-14 ans, et 43 heures d'activité économique pour les enfants de 15-17 ans.

² Selon la définition de l'UNICEF, le seuil se situe à 28 heures de tâches domestiques pour les enfants de 5-11 ans et 12-14 ans, et 43 heures de tâches domestiques pour les enfants de 15-17 ans.

³ Selon la définition de l'UNICEF, les enfants travaillant dans des conditions dangereuses sont ceux qui, dans le cadre de leur travail : a) portent des charges lourdes ; ou b) travaillent avec des outils dangereux ou font fonctionner de grosses machines ; ou c) sont exposés à la poussière, à la fumée ou au gaz ; ou d) sont exposés au froid, à la chaleur ou à de l'humidité extrême ; e) sont exposés à des bruits intenses ou des vibrations ; f) sont exposés à un travail en hauteur ; g) sont exposés à des produits chimiques (pesticides, colles, etc.) ou à des explosifs ; h) sont exposés à d'autres choses, procédés ou conditions mauvaises pour sa santé ou sa sécurité.

⁴ Selon la définition de l'UNICEF, sont inclus dans cette catégorie les enfants qui a) participent à des activités économiques à la limite ou au-dessus du seuil défini pour leur groupe d'âges ; ou b) participent à des tâches domestiques à la limite ou au-dessus du seuil défini pour leur groupe d'âges ; ou c) qui travaillent dans des conditions dangereuses.

⁵ Y compris 2 enfants de 15-17 ans qui travaillent pour lesquels l'information sur la fréquentation scolaire est manquante.

Tableau 18.8 Éducation de la petite enfance

Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui fréquentent un programme d'éducation préscolaire, une classe d'éveil, un jardin d'enfants ou une garderie communautaire, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui fréquentent un programme d'éducation préscolaire	Effectif d'enfants de 36-59 mois
Sexe		
Masculin	18,4	1 041
Féminin	20,0	972
Âge en mois		
36-47 mois	11,5	1 081
48-59 mois	28,1	931
Résidence		
Cotonou	54,9	88
Autres villes	28,0	706
Ensemble urbain	31,0	794
Rural	11,5	1 218
Département		
Alibori	6,9	281
Atacora	7,8	193
Atlantique	22,7	240
Borgou	11,5	276
Collines	21,9	139
Couffo	5,7	124
Donga	27,7	119
Littoral	54,9	88
Mono	16,8	87
Ouémé	36,5	185
Plateau	16,6	115
Zou	27,7	166
Niveau d'instruction de la mère		
Aucun	12,0	1 390
Primaire	24,0	345
Secondaire 1 ^{er} cycle	38,4	200
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	77,1	78
Quintiles de bien-être économique		
Le plus bas	5,1	480
Second	6,7	418
Moyen	15,0	384
Quatrième	26,8	372
Le plus élevé	49,4	358
Ensemble	19,2	2 013

Tableau 18.9 Soutien à l'apprentissage

Pourcentage d'enfants de 36-59 mois avec qui un membre adulte du ménage a effectué des activités qui favorisent l'apprentissage et la préparation à l'école au cours des trois derniers jours, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'enfants avec qui un membre adulte du ménage s'est engagé dans 4 ou plus activités ¹			Pourcentage d'enfants avec qui le père biologique s'est engagé dans 4 ou plus activités ²			Pourcentage d'enfants avec qui la mère biologique s'est engagée dans 4 ou plus activités ³		
	Nombre moyen d'activités avec un membre adulte du ménage	Nombre d'enfants de 36-59 mois	Nombre d'activités avec le père biologique	Nombre moyen d'activités avec le père biologique	Nombre d'enfants de 36-59 mois vivant avec leur père biologique	Nombre moyen d'activités avec la mère biologique	Nombre d'enfants de 36-59 mois vivant avec leur mère biologique		
Sexe									
Masculin	41,1	3,0	1 041	4,3	0,6	842	16,8	1,6	1 041
Féminin	41,7	3,0	972	4,2	0,6	788	19,1	1,7	968
Âge en mois									
36-47 mois	40,6	3,0	1 081	4,7	0,6	887	18,8	1,8	1 080
48-59 mois	42,3	3,0	931	3,6	0,6	743	16,9	1,5	928
Résidence									
Cotonou	69,3	4,0	88	18,1	1,4	66	31,0	2,2	88
Autres villes	47,5	3,3	706	6,1	0,8	566	19,6	1,7	706
Ensemble urbain	49,9	3,4	794	7,3	0,8	632	20,9	1,8	794
Rural	35,9	2,7	1 218	2,2	0,5	998	15,9	1,6	1 214
Département									
Alibori	45,2	3,2	281	2,0	0,3	252	37,9	2,4	281
Atacora	27,2	2,0	193	2,0	0,4	157	11,9	1,2	190
Atlantique	37,1	2,9	240	10,5	0,9	177	16,2	1,6	240
Borgou	47,0	3,2	276	3,1	0,5	243	12,7	1,4	276
Collines	44,1	2,7	139	1,5	0,4	110	10,0	1,0	139
Couffo	21,1	1,9	124	0,0	0,2	90	3,6	0,9	124
Donga	44,5	3,6	119	0,0	0,4	113	8,7	1,4	119
Littoral	69,3	4,0	88	18,1	1,4	66	31,0	2,2	88
Mono	46,7	3,6	87	6,5	0,8	57	8,9	1,3	87
Ouémé	40,2	2,9	185	2,9	0,7	142	12,0	1,3	185
Plateau	56,1	3,7	115	5,4	1,1	95	28,3	2,5	115
Zou	32,6	2,9	166	6,2	1,1	127	22,7	2,3	165
Niveau d'instruction de la mère									
Aucun	35,5	2,7	1 390	1,8	0,5	1 178	14,9	1,5	1 388
Primaire	44,9	3,2	345	6,6	0,8	258	16,0	1,6	342
Secondaire 1 ^{er} cycle	61,3	3,8	200	13,4	1,3	138	29,1	2,3	200
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	80,7	4,7	78	21,7	1,9	56	49,7	3,1	78
Quintiles de bien-être économique									
Le plus bas	37,0	2,7	480	1,7	0,4	406	19,4	1,7	480
Second	30,1	2,5	418	2,0	0,4	337	14,4	1,4	416
Moyen	36,2	2,8	384	2,1	0,5	303	13,5	1,4	383
Quatrième	48,1	3,3	372	6,3	0,8	295	15,8	1,6	372
Le plus élevé	59,4	3,8	358	10,4	1,2	291	26,7	2,2	358
Ensemble	41,4	3,0	2 013	4,2	0,6	1 630	17,9	1,7	2 009

¹ Indicateur MICS 6.2 - support à l'apprentissage

² Indicateur MICS 6.3 - support du père à l'apprentissage

³ Indicateur MICS 6.4 - support de la mère à l'apprentissage

Tableau 18.10 Matériel d'apprentissage

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans selon le nombre de livres d'enfants disponibles dans le ménage et selon les objets avec lesquels l'enfant joue, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'enfants vivant dans un ménage qui a :		Pourcentage d'enfants qui jouent avec :				Effectif d'enfants de moins de 5 ans
	3 livres d'enfants ou plus ¹	10 livres d'enfants ou plus	Jouets fabriqués à la maison	Jouets de magasin	Objets du ménage ou trouvés dehors	Deux types de jouets ou plus ²	
Sexe							
Masculin	1,7	0,1	52,6	42,3	69,1	55,1	2 110
Féminin	1,4	0,2	50,2	44,5	68,8	54,2	2 045
Âge							
0-23 mois	0,0	0,0	39,9	35,2	50,9	41,2	1 261
24-59 mois	2,2	0,2	56,4	46,9	76,8	60,6	2 895
Résidence							
Cotonou	8,5	0,8	62,5	73,9	62,8	68,9	176
Autres villes	2,6	0,2	57,1	52,8	67,4	61,3	1 461
Ensemble urbain	3,3	0,3	57,6	55,1	66,9	62,1	1 637
Rural	0,4	0,0	47,3	35,7	70,3	49,8	2 519
Département							
Alibori	0,5	0,0	33,8	26,2	56,5	33,8	583
Atacora	0,0	0,0	47,4	36,9	86,6	52,5	378
Atlantique	3,3	0,7	53,0	55,3	71,6	58,4	478
Borgou	0,7	0,0	59,9	42,3	76,8	62,8	559
Collines	0,9	0,0	70,6	48,0	53,8	64,6	283
Couffo	0,5	0,0	45,0	23,3	64,9	46,5	267
Donga	1,8	0,0	49,2	46,9	78,9	50,3	270
Littoral	8,5	0,8	62,5	73,9	62,8	68,9	176
Mono	0,5	0,0	45,7	39,3	57,4	49,2	176
Ouémé	2,0	0,0	56,4	51,4	73,9	65,7	369
Plateau	2,0	0,0	45,0	33,9	59,4	45,4	256
Zou	1,0	0,0	57,0	57,6	72,7	65,8	362
Niveau d'instruction de la mère							
Aucun	0,4	0,0	48,6	36,0	70,9	50,8	2 656
Primaire	0,9	0,0	55,4	49,9	70,9	60,2	778
Secondaire 1 ^{er} cycle	4,5	0,0	57,7	58,4	63,3	62,4	515
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	10,9	2,2	57,4	76,2	51,3	64,0	206
Quintiles de bien-être économique							
Le plus bas	0,1	0,0	38,7	23,8	69,2	39,0	933
Second	0,1	0,0	50,3	32,2	70,7	51,7	862
Moyen	0,0	0,0	55,5	39,9	73,6	57,4	798
Quatrième	1,3	0,0	55,0	53,4	66,9	58,8	816
Le plus élevé	6,8	0,6	60,2	73,3	63,9	70,2	747
Ensemble	1,5	0,1	51,4	43,4	68,9	54,7	4 156

¹ Indicateur MICS 6.5

² Indicateur MICS 6.6

Tableau 18.11 Encadrement inapproprié des enfants

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans laissés seuls ou laissés à la garde d'un autre enfant de moins de 10 ans pour plus d'une heure au moins une fois au cours de la semaine avant l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans :			Effectif d'enfants de moins de 5 ans
	Laissés seuls au cours de la semaine avant l'interview	Laissés à la garde d'un autre enfant de moins de 10 ans au cours de la semaine avant l'interview	Laissés sans soins appropriés au cours de la semaine avant l'interview ¹	
Sexe				
Masculin	24,2	18,3	28,2	2 110
Féminin	24,4	18,3	29,6	2 045
Âge				
0-23 mois	13,9	11,1	17,5	1 261
24-59 mois	28,8	21,4	33,8	2 895
Résidence				
Cotonou	25,6	14,5	29,9	176
Autres villes	22,9	15,8	25,4	1 461
Ensemble urbain	23,2	15,7	25,9	1 637
Rural	25,0	20,0	30,8	2 519
Département				
Alibori	27,5	28,6	34,7	583
Atacora	17,8	19,0	25,0	378
Atlantique	16,5	11,4	21,9	478
Borgou	32,5	29,1	36,9	559
Collines	16,3	6,8	19,6	283
Couffo	33,4	13,8	35,1	267
Donga	12,1	17,7	20,4	270
Littoral	25,6	14,5	29,9	176
Mono	39,6	23,4	43,4	176
Ouémé	17,5	9,9	19,5	369
Plateau	38,4	20,3	40,4	256
Zou	21,3	12,7	23,1	362
Niveau d'instruction de la mère				
Aucun	26,4	21,1	31,7	2 656
Primaire	21,3	15,4	25,8	778
Secondaire 1 ^{er} cycle	20,1	10,6	22,0	515
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	18,9	12,5	21,2	206
Quintiles de bien-être économique				
Le plus bas	29,2	26,0	36,2	933
Second	27,8	20,9	32,4	862
Moyen	23,4	16,6	27,2	798
Quatrième	20,2	15,1	25,1	816
Le plus élevé	19,7	11,0	21,6	747
Ensemble	24,3	18,3	28,9	4 156

¹ l'encadrement inapproprié des enfants signifie que l'enfant a été laissé seul ou sous la garde d'un autre enfant de moins de 10 ans plus d'une heure au moins une fois la semaine dernière.

Tableau 18.12 Index de développement du jeune enfant

Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui sont en bonne voie de développement dans les domaines de l'alphabétisation/calcul, physique, social/émotionnel, et dans le domaine de l'apprentissage, et score de l'indice de développement des jeunes enfants, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'enfants de 36-59 mois en bonne voie de développement dans les domaines de :				Score de l'indice de développement des jeunes enfants ⁵	Effectif d'enfants de 36-59 mois
	Alphabétisation/calcul ¹	Physique ²	Social-émotionnel ³	Apprentissage ⁴		
Sexe						
Masculin	9,9	91,8	68,8	77,5	55,3	1 041
Féminin	9,5	91,3	74,7	76,2	57,7	972
Âge en mois						
36-47 mois	5,3	90,1	73,6	74,5	52,8	1 081
48-59 mois	14,9	93,2	69,4	79,6	60,7	931
Résidence						
Cotonou	37,6	92,7	59,9	84,1	67,9	88
Autres villes	14,4	91,5	71,2	78,2	57,9	706
Ensemble urbain	17,0	91,6	69,9	78,9	59,0	794
Rural	5,0	91,5	72,8	75,6	54,8	1 218
Département						
Alibori	1,7	92,9	81,6	56,0	48,0	281
Atacora	4,5	91,4	52,0	87,5	42,6	193
Atlantique	13,4	89,9	70,4	87,4	63,9	240
Borgou	4,8	90,1	69,8	63,7	45,1	276
Collines	8,5	88,5	70,5	76,1	52,2	139
Couffo	2,7	83,1	73,0	69,8	45,4	124
Donga	7,9	98,0	74,2	88,3	71,2	119
Littoral	37,6	92,7	59,9	84,1	67,9	88
Mono	10,5	89,2	81,2	73,3	57,7	87
Ouémé	17,1	92,7	77,4	93,9	75,1	185
Plateau	10,0	94,7	80,5	76,8	62,4	115
Zou	16,3	95,4	69,3	83,4	64,8	166
Niveau d'instruction de la mère						
Aucun	4,6	90,9	70,8	73,4	51,3	1 390
Primaire	13,2	90,4	74,1	82,7	61,9	345
Secondaire 1 ^{er} cycle	24,2	95,5	72,9	85,7	72,8	200
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	47,9	97,7	73,3	91,1	82,1	78
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	1,9	90,5	73,2	68,9	48,3	480
Second	1,7	88,5	72,4	76,0	52,2	418
Moyen	5,9	93,2	69,6	74,8	52,5	384
Quatrième	13,2	90,6	73,6	81,2	62,6	372
Le plus élevé	30,2	95,6	68,7	86,4	70,2	358
Ensemble	9,7	91,5	71,6	76,9	56,5	2 013

¹ La bonne voie de développement en alphabétisation/calcul comprend au moins deux de ces conditions : a) l'enfant peut citer au moins dix lettres de l'alphabet ; b) l'enfant peut lire au moins quatre mots simples, courants ; c) l'enfant peut citer et reconnaître tous les chiffres de 1 à 10.

² La bonne voie de développement physique comprend au moins une de ces conditions : a) l'enfant peut attraper par terre avec deux doigts un petit objet, comme un bâton ou un caillou ; et b) l'enfant n'est pas parfois trop malade pour jouer.

³ La bonne voie de développement social/émotionnel comprend au moins deux de ces conditions : a) l'enfant s'entend bien avec les autres enfants ; b) l'enfant ne donne pas de coups de pieds, ne mord pas, et ne frappe pas les autres enfants ; c) l'enfant n'est pas facilement distrait.

⁴ La bonne voie de développement en matière d'apprentissage comprend au moins une de ces conditions : a) l'enfant est capable de suivre de simples instructions pour faire quelque chose correctement ; b) quand on donne quelque chose à faire à l'enfant, il est capable de le faire de manière indépendante.

⁵ l'Indicateur MICS 6.6 (indice de développement des jeunes enfants) est le pourcentage d'enfants qui sont en bonne voie de développement dans au moins trois des quatre domaines (alphabétisation/calcul, physique, social/émotionnel, et apprentissage)

RÉFÉRENCES

Direction de la Santé de la Mère et l'Enfant (DSME), Ministère de la Santé. 2013. *Plan d'Action National Budgetisé pour le Repositionnement de la Planification Familiale 2014-2018*. Cotonou, Bénin

Direction de la Programmation et de la Prospective, Ministère de la Santé. *Plan National de Développement Sanitaire 2009-2018*. Cotonou, Bénin

Graham, W., W. Brass, and R. W. Snow. 1989. *Indirect Estimation of Maternal Mortality: The Sisterhood Method*. *Studies in Family Planning* 20(3):125-135.

Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique (INSAE) et ICF International. 2013. *Enquête Démographique et de Santé du Bénin, 2011-2012*. Calverton, Maryland, USA : INSAE et ICF International.

Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique (INSAE), Bénin et Macro International Inc. 2007 : *Enquête Démographique et de Santé du Bénin (EDSB-III) Benin 2006*. Calverton, Maryland, USA : Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique et Macro International Inc.

Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique (INSAE) et ORC Macro. 2002. *Enquête Démographique et de Santé au Bénin, 2001*. Calverton, Maryland, USA : Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique et ORC Macro.

Kodjogbé, Nicaise, Gora Mboup, Justin Tossou, Léopoldine de Souza, Timothée Gandaho, Alphonse Guédémé, Thomas Houedokoho, Rafatou Houndékon, Thomas Tohouegnon, Suzanne Zomahoun, Virgile Capo-Chichi, et Andrée Cossi. 1997. *Enquête Démographique et de Santé au Bénin, République de Bénin 1996*. Calverton, Maryland USA : Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique et Macro International Inc.

Roll Back Malaria Partnership. 2003. *Monitoring and Evaluation Reference Group Anemia Task Force Meeting Minutes*. Presented at WHO Headquarters. Geneva: 2003 Oct 27-28.

Rutenberg, N., and J. Sullivan. August 5-7, 1991. *Direct and Indirect Estimates of Maternal Mortality from the Sisterhood Method*. Paper presented at the Demographic and Health Surveys World Conference, Washington, DC.

World Health Organization. 2004. *A Strategic Framework for Malaria Prevention and Control during Pregnancy in the African Region*. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization (WHO). 2008. *Indicators for Assessing Infant and Young Child Feeding Practices*. Part I: Definitions. Geneva, Switzerland: World Health Organization.

World Health Organization (WHO). 2011. *Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity*. Vitamin and Mineral Nutrition Information System. Geneva, Switzerland: World Health Organization.

A.1 INTRODUCTION

Cette section présente une description des objectifs de l'enquête, de la taille globale de l'échantillon, des domaines d'études ainsi qu'une description des sous-échantillons utilisés. La cinquième enquête démographique et de santé du Bénin en 2017-2018 (EDSB-V 2017-2018) fait suite à celles réalisées en 1996, 2001, 2006 et 2011-2012. Comme les dernières enquêtes, elle a pour objectif principal de recueillir des informations sur les taux de fécondité, de mortalité infantile et infanto-juvénile, sur la connaissance et l'utilisation des méthodes contraceptives et sur la connaissance et les attitudes vis-à-vis des maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida. Elle visait un échantillon national représentatif d'environ 14 430 ménages sélectionnés avec une procédure de tirage aléatoire à deux degrés. Toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans vivant de façon permanente dans les ménages sélectionnés, ou présentes la nuit précédant l'enquête étaient éligibles pour être enquêtées, avec un nombre attendu d'environ 13 417 femmes enquêtées avec succès. Les résultats de l'enquête sont présentés pour le Bénin, pour la ville de Cotonou, pour les autres villes, pour le milieu urbain et le milieu rural séparément, et pour chacun des 12 départements administratifs.

Une enquête auprès des hommes était également menée au moment de l'enquête auprès des femmes. Parmi les ménages sélectionnés pour l'enquête auprès des femmes, un ménage sur deux était sélectionné pour l'enquête auprès des hommes. Tous les hommes âgés de 15 à 64 ans vivant de façon permanente dans les ménages sélectionnés, ou présents la nuit précédant l'enquête étaient éligibles pour être enquêtés, avec un nombre attendu d'environ 6 227 hommes enquêtés avec succès. Elle a pour objectif principal de recueillir des informations sur leur connaissance et utilisation des méthodes contraceptives, sur leur connaissance et attitudes vis-à-vis des maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida. Dans ce sous échantillon de ménages, un module sur des maladies non transmissibles était appliqué à tous les hommes et toutes les femmes éligibles pour l'enquête individuelle. De plus, dans ce sous échantillon, un module sur la violence domestique contre les femmes était appliqué pour une femme par ménage tirée aléatoirement parmi toutes les femmes éligibles dans les ménages.

Dans tous les ménages tirés, tous les enfants de moins de cinq ans étaient pesés et mesurés de façon à déterminer leur état nutritionnel. Dans le sous échantillon de ménages où il n'y a pas de l'enquête auprès des hommes, après obtention d'un consentement éclairé, tous les enfants de 6-59 mois étaient testés pour l'anémie et pour le paludisme. Nous attendons de tester environ 4 500 enfants 6-59 mois.

A.2 BASE DE SONDAGE

L'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique (INSAE) dispose d'un fichier des Zones de Dénombrement (ZD) qui avaient été créé pour les besoins du Recensement Général de la Population et de l'Habitation effectué au Bénin en 2013 (RGPH4 2013). Ce fichier avait été retenu comme base de sondage pour l'EDSB-V 2017-2018. Au Bénin, il y a 12 départements administratifs, chaque département est subdivisé en communes, et chaque commune est subdivisée en arrondissements et chaque arrondissement en villages. Au total, il y a 77 communes et 546 arrondissements. En général, dans le milieu rural, une ZD est un village ou une partie d'un grand village ; dans le milieu urbain, une ZD est un quartier ou une partie de grand quartier. Le type de résidence d'une ZD est défini en fonction de l'effectif de population par le recensement. Au total, le fichier compte 12 633 ZD dont 4 417 se trouvent dans le milieu urbain et 8 216 dans le milieu rural. Chaque ZD a une carte qui délimite sa location et ses limites. Au Bénin en 2013, 44,6 % de la population habitait dans le milieu urbain, elle représentait 49,4 % de ménages. Le **Tableau A.1** ci-dessous présente la répartition de la population par département et selon milieu de résidence. Le **Tableau A.2** ci-dessous présente la répartition de ménages par département et selon milieu de résidence. Le **Tableau A.3** ci-dessous donne la répartition de ZD et de leur taille moyenne en ménages par département et selon

milieu de résidence. La taille moyenne de ZD est de 201 ménages dans le milieu urbain et de 111 dans le milieu rural, avec une taille moyenne globale de 143 ménages par grappe.

Tableau A.1 Répartition de la population par département et selon milieu de résidence (RGPH 2013)

Département	Population par département et selon milieu			Proportion département	Proportion urbaine
	Urbain	Rural	Total département		
Alibori	210 842	656 621	867 463	8,7	24,3
Atacora	287 152	485 110	772 262	7,7	37,2
Atlantique	621 817	776 412	1 398 229	14,0	44,5
Borgou	528 987	685 262	1 214 249	12,1	43,6
Collines	197 122	520 355	717 477	7,2	27,5
Couffo	206 862	538 466	745 328	7,4	27,8
Donga	228 575	314 555	543 130	5,4	42,1
Littoral	679 012	0	679 012	6,8	100,0
Mono	247 239	250 004	497 243	5,0	49,7
Oueme	690 921	409 483	1 100 404	11,0	62,8
Plateau	281 046	341 326	622 372	6,2	45,2
Zou	280 928	570 652	851 580	8,5	33,0
Bénin	4 460 503	5 548 246	10 008 749	100,0	44,6

Tableau A.2 Répartition de ménages par département et selon milieu de résidence (RGPH 2013)

Département	Ménages par département et selon milieu			Proportion département	Proportion urbaine
	Urbain	Rural	Total département		
Alibori	30 462	77 889	108 351	6,0	28,1
Atacora	42 141	65 458	107 599	6,0	39,2
Atlantique	139 111	159 658	298 769	16,6	46,6
Borgou	80 862	77 237	158 099	8,8	51,1
Collines	39 889	89 270	129 159	7,2	30,9
Couffo	43 054	97 390	140 444	7,8	30,7
Donga	28 477	37 956	66 433	3,7	42,9
Littoral	166 433	0	166 433	9,2	100,0
Mono	55 032	50 954	105 986	5,9	51,9
Oueme	149 958	82 662	232 620	12,9	64,5
Plateau	52 933	57 599	110 532	6,1	47,9
Zou	61 638	117 060	178 698	9,9	34,5
Bénin	889 990	913 133	1 803 123	100,0	49,4

Tableau A.3 Répartition de ZD et de leur taille moyenne en ménages par département et selon milieu de résidence (RGPH 2013)

Département	Nombre de ZD			Taille moyenne de ZD en ménages		
	Urbain	Rural	Ensemble	Urbain	Rural	Ensemble
Alibori	187	912	1 099	163	85	99
Atacora	261	729	990	161	90	109
Atlantique	613	1 045	1 658	227	153	180
Borgou	469	988	1 457	172	78	109
Collines	200	832	1 032	199	107	125
Couffo	208	807	1 015	207	121	138
Donga	225	475	700	127	80	95
Littoral	637	0	637	261	0	261
Mono	324	397	721	170	128	147
Ouémé	728	625	1 353	206	132	172
Plateau	293	527	820	181	109	135
Zou	272	879	1 151	227	133	155
Bénin	4 417	8 216	12 633	201	111	143

A.3 PLAN DE SONDAGE ET MISE EN ŒUVRE

La procédure retenue pour le tirage de l'échantillon de l'EDSB-V 2017-2018 est un tirage aléatoire, stratifié et à deux degrés. L'unité primaire de sondage, appelée aussi Grappe, est la ZD. La partie urbaine et la partie rurale de chaque département correspondent chacune à une strate d'échantillonnage. Au total, 23 strates d'échantillonnage ont été créées comme le département Littoral n'a que de milieu urbain. L'échantillon de premier degré avec 555 grappes avait été tiré indépendamment dans chaque strate selon la répartition donnée dans le **Tableau A.4** suivant. Avant le tirage de unités primaires, la base de sondage avait été triée selon le département, le milieu de résidence et ensuite selon la commune, l'arrondissement, le village et le numéro d'ordre de la ZD. La procédure de tirage de l'unité primaire est un tirage systématique avec probabilité proportionnelle à la taille ; la taille d'une ZD étant le nombre d'habitants résidants dans la ZD. Cette procédure de tirage dans une base triée avait introduit une stratification implicite au niveau de toutes les unités administratives en dessous de département.

Après le tirage au premier degré, une opération de dénombrement et la mise à jour de la carte avait été effectuée dans chacune des 555 ZD tirées dans le premier degré. Elle a pour objectifs d'obtenir le nombre exact de ménages ordinaires résidant dans la ZD ; d'établir un plan de situation et un croquis détaillé de la ZD en marquant ses limites et les localisations de chaque structure trouvée ; et d'enregistrer sur une fiche d'enregistrement la liste complète de ménages à partir de laquelle l'échantillon de ménages avait été tiré au second degré avec un tirage systématique à probabilité égale. En décidant d'enquêter 26 ménages par grappe, le **Tableau A.4** ci-dessous présente la répartition de l'échantillon grappe, les nombres de ménages par département et selon milieu de résidence. Parmi les 555 ZD sélectionnées, 251 sont situées dans le milieu urbain et 304 dans le milieu rural, avec un nombre total de 14 430 ménages à sélectionner dont 6 526 dans le milieu urbain et 7 904 dans le milieu rural.

Tableau A.4 Allocation de l'échantillon grappes et ménages par département et selon milieu de résidence (EDSB-V Bénin 2017-2018)

Département	Allocation des ZD			Nombre de ménages à tirer		
	Urbain	Rural	Région	Urbain	Rural	Région
Alibori	11	31	42	286	806	1 092
Atacora	15	24	39	390	624	1 014
Atlantique	27	38	65	702	988	1 690
Borgou	24	32	56	624	832	1 456
Collines	13	33	46	338	858	1 196
Couffo	12	30	42	312	780	1 092
Donga	13	19	32	338	494	832
Littoral	52	0	52	1 352	0	1 352
Mono	17	20	37	442	520	962
Oueme	34	20	54	884	520	1 404
Plateau	17	21	38	442	546	988
Zou	16	36	52	416	936	1 352
Bénin	251	304	555	6 526	7 904	14 430

Tableau A.5 ci-dessous donne les nombres attendus de femmes de 15-49 ans et hommes 15-64 ans enquêtés avec succès par département et selon milieu de résidence. Au total, le nombre attendu de femmes enquêtées avec succès était 13 417, dont 6 181 dans le milieu urbain et 7 236 dans le milieu rural ; le nombre attendu d'hommes enquêtés avec succès est de 6 227 dont 2 809 dans le milieu urbain et 3 418 dans le milieu rural, tenant compte que l'enquête auprès des hommes était effectué dans un sous échantillon consisté d'un ménage sur deux tirés pour l'enquête auprès des femmes.

Département	Nombre attendu de femmes 15-49 ans enquêtées avec succès			Nombre attendu d'hommes 15-64 ans enquêtés avec succès		
	Urbain	Rural	Région	Urbain	Rural	Région
	Alibori	269	842	1 111	123	348
Atacora	385	658	1 043	168	270	438
Atlantique	640	787	1 427	302	427	729
Borgou	583	758	1 341	269	360	629
Collines	278	731	1 009	145	371	516
Couffo	289	747	1 036	134	338	472
Donga	360	533	893	145	213	358
Littoral	1 354	0	1 354	582	0	582
Mono	413	432	845	191	225	416
Oueme	795	474	1 269	380	225	605
Plateau	436	529	965	191	236	427
Zou	379	745	1 124	179	405	584
Bénin	6 181	7 236	13 417	2 809	3 418	6 227

* Enquête auprès des hommes dans un sous échantillon

Les calculs de l'échantillon étaient basés sur les résultats de l'EDSB-IV en 2011-2012 : le nombre moyen de femmes de 15-49 ans par ménage était 1,05 par ménage dans le milieu urbain et 0,96 par ménage dans le milieu rural ; les taux de réponse des femmes étaient 94,7 % et 96,6 % dans le milieu urbain et le milieu rural, respectivement ; les taux de réponse des ménages étaient 95,6 % et 97,7 % dans le milieu urbain et le milieu rural, respectivement. Pour l'enquête auprès des hommes, le nombre moyen d'hommes 15-64 ans par ménage était 0,99 par ménage dans le milieu urbain, et 0,93 par ménage dans le milieu rural ; les taux de réponse pour les hommes étaient de 92 % et 96,2 % dans le milieu urbain et le milieu rural, respectivement.

A.4 PROBABILITÉS DE SONDAGE ET POIDS DE SONDAGE

À cause de la répartition non proportionnelle de l'échantillon dans les départements et les taux de réponse différentiels, des poids de sondage doivent être utilisés dans toutes les analyses des résultats de l'EDSB-V 2017-2018 pour assurer la représentativité des résultats de l'enquête aussi bien au niveau national qu'au niveau des domaines d'études. Étant donné que l'échantillon de l'EDSB-V 2017-2018 est un échantillon par grappe, stratifié à deux degrés, les poids de sondage sont basés sur les probabilités de sondage calculées séparément pour chaque degré de tirage et pour chaque grappe où :

- P_{1hi} : probabilité de sondage au premier degré de la $i^{ème}$ grappe dans la strate h
 P_{2hi} : probabilité de sondage au deuxième degré dans la $i^{ème}$ grappe (ménages)

Ce qui suit décrit les calculs de ces probabilités.

Soit a_h le nombre de grappes tirées dans la strate h , M_{hi} la taille de mesure (nombre d'habitants) selon la base de sondage dans la $i^{ème}$ grappe et $\sum M_{hi}$ la taille de mesure totale dans la strate. La probabilité de sélectionner la $i^{ème}$ grappe dans la strate h dans l'échantillon de l'EDSB-V 2017-2018 est calculé comme suit :

$$\frac{a_h \times M_{hi}}{\sum M_{hi}}$$

Soit b_{hi} la proportion de ménages dans le segment sélectionné par rapport au nombre total de ménages dans la grappe i de la strate h si la grappe est segmentée, sans quoi $b_{hi} = 1$. Par conséquent, la probabilité de tirer une grappe i dans l'échantillon est :

$$P_{1hi} = \frac{a_h \times M_{hi}}{\sum M_{hi}} \times b_{hi}$$

Soit L_{hi} le nombre de ménages listés lors de l'opération de dénombrement des ménages dans la grappe i de la strate h , et soit g_{hi} le nombre de ménages sélectionnés dans la grappe. La probabilité de tirage au deuxième degré pour chaque ménage dans la grappe est calculée comme suit :

$$P_{2hi} = \frac{g_{hi}}{L_{hi}}$$

La probabilité globale de tirage de chaque ménage dans la grappe i de la strate h dans l'EDSB-V 2017-2018 est donc le produit des probabilités de tirage des deux degrés, soit :

$$P_{hi} = P_{1hi} \times P_{2hi}$$

Le poids de sondage pour chaque ménage dans la grappe i de la strate h est l'inverse de sa probabilité globale de tirage :

$$W_{hi} = 1 / P_{hi}$$

Une feuille de calcul contenant tous les paramètres de sondage et les probabilités de tirage avait été préparée pour faciliter les calculs des poids de sondage. Plusieurs ensembles de poids étaient calculés et cela comme suit :

- Pour l'enquête femmes : un ensemble pour les ménages ; un ensemble pour les femmes enquêtées ;
- Pour l'enquête hommes : un ensemble pour les ménages ; un ensemble pour les hommes enquêtés ;
- Pour le module sur la violence domestique contre les femmes, un ensemble de poids selon le nombre de femmes éligibles dans le ménage ;
- Pour le module de travail et de discipline des enfants, un ensemble de poids selon le nombre d'enfants éligibles dans le ménage.

Les poids de sondage avaient été ajustés pour tenir compte des non réponses au niveau du ménage et au niveau d'individu pour les ménages ainsi que pour les femmes et les hommes. Toutes les corrections de non réponses avaient été réalisées au niveau de la strate d'échantillonnage. Les poids de ménages étaient obtenus à partir des poids de sondage multipliés par l'inverse du taux de réponse du ménage par strate. Les poids pour les femmes étaient obtenus à partir des poids de ménages multipliés par l'inverse du taux de réponse individuel de femmes par strate. Les poids pour les hommes étaient obtenus à partir des poids de ménage pour le sous-échantillon pour l'enquête auprès des hommes multipliés par l'inverse du taux de réponse individuel des hommes par strate. Après ajustement pour les non réponses, les poids étaient normalisés pour obtenir les poids standard qui apparaissent dans les fichiers de données. La procédure de normalisation a pour objectif d'obtenir le nombre total de cas pondérés en utilisant des poids normalisés égal au nombre total de cas non pondérés au niveau national, pour le nombre total de ménages, de femmes et d'hommes respectivement. La normalisation consiste à multiplier les poids par le taux de sondage total estimé à partir de l'enquête, pour les poids des ménages, des femmes, et des hommes, respectivement. Les poids normalisés sont des poids relatifs qui sont valides pour l'estimation des moyennes, des proportions, des ratios et des

taux, mais qui ne sont pas valides pour estimer des totaux ou des tailles de populations cibles, ou pour fusionner des données issues des enquêtes différentes.

Des poids spécifiques avaient été calculés pour les modules « violence domestique » et « travail et discipline des enfants » car les modules n'étaient appliqués qu'à un seul individu tiré au hasard parmi tous les individus éligibles du ménage. Ces poids spécifiques étaient basés sur les poids de ménages en prenant compte le nombre d'individus éligibles par ménages et avec la correction de non réponse, et finalement la normalisation. Les procédures de la correction de la non réponse et celle de la normalisation sont les même comme expliquées ci-dessus.

Les erreurs de sondage étaient calculées pour des indicateurs sélectionnés, et pour chacun des domaines d'étude, comme présentées dans l'annexe B.

A.5 RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

Les **Tableaux A.6** et **A.7** présentent les résultats détaillés des interviews auprès des ménages, des femmes et des hommes. À la suite du classement des ménages selon les différents codes résultat, le taux de réponse pour l'enquête ménage (TRM) est calculé comme suit :

$$\frac{100 * R}{R + MP + D + REF + LNT}$$

Le taux de réponse des femmes et des hommes éligibles est équivalent au pourcentage d'interviews complétées. Le taux de réponse global des femmes est le produit du taux de réponse des ménages et du taux de réponse des femmes. Le taux de réponse global des hommes est le produit du taux de réponse des ménages sélectionnés pour l'enquête auprès des hommes et du taux de réponse des hommes.

Tableau A.6 Résultats de l'enquête : Femme

Répartition (en %) des ménages et des femmes éligibles par résultat de l'enquête ménage et individuelle, taux de réponse des ménages, des femmes éligibles et taux de réponse global des femmes, selon la région et le milieu de résidence, (non pondéré), EDSB-V Bénin 2017-2018

Résultat	Résidence				Département											Ensemble
	Urbain	Rural	Alibori	Atacora	Atlant-ique	Borgou	Col-lines	Couffo	Donga	Littoral	Mono	Ouémé	Plateau	Zou		
Selection des ménages																
Rempli (R)	97,5	98,5	99,7	97,9	96,6	98,6	98,9	98,0	98,1	95,6	99,0	98,3	97,8	99,2	98,1	
Pas d'enquête compétent à la maison, au moment de la visite (MP)	0,2	0,1	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,4	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,1	
Différé (D)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Refusé (REF)	1,0	0,5	0,2	0,0	1,4	0,6	0,1	0,3	0,0	2,6	0,1	0,5	2,0	0,2	0,7	
Logement non trouvé (LNT)	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	
Ménage absent (MA)	0,4	0,2	0,0	0,4	0,2	0,1	0,3	1,0	0,8	0,4	0,3	0,1	0,1	0,4	0,3	
Logement vacant/ adresse non un logement (LV)	0,8	0,4	0,1	1,2	1,1	0,3	0,6	0,3	1,1	1,0	0,3	0,6	0,1	0,1	0,6	
Logement détruit (LD)	0,0	0,1	0,0	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	
Autre (A)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Nombre de ménages échantillonnés	6 528	7 907	1 092	1 014	1 693	1 456	1 196	1 092	832	1 353	962	1 405	988	1 352	14 435	
Taux de réponse des ménages ¹	98,7	99,3	99,8	100,0	98,0	99,0	99,8	99,4	100,0	97,0	99,6	99,2	98,0	99,8	99,0	
Femmes éligibles																
Rempli (FER)	97,7	98,4	98,0	98,9	97,5	98,8	99,2	98,6	98,2	95,7	97,3	97,8	97,7	99,6	98,1	
Pas à la maison (FPM)	0,7	0,5	0,8	0,2	0,9	0,1	0,3	0,5	0,6	1,2	1,4	0,5	0,1	0,2	0,6	
Différé (D)	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	
Refusé (FR)	1,1	0,7	0,9	0,1	1,0	1,1	0,0	0,3	0,2	2,5	0,4	1,0	2,2	0,3	0,9	
Incapacité (FI)	0,4	0,3	0,1	0,6	0,4	0,0	0,6	0,6	1,0	0,5	0,8	0,2	0,0	0,0	0,4	
Autre (FA)	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Effectif de femmes	7 208	9 025	1 732	1 407	1 746	1 787	1 415	1 026	982	1 479	839	1 289	974	1 557	16 233	
Taux de réponse des femmes éligibles (TRFE) ²	97,7	98,4	98,0	98,9	97,5	98,8	99,2	98,6	98,2	95,7	97,3	97,8	97,7	99,6	98,1	
Taux de réponse global des femmes (TRGF) ³	96,5	97,7	97,8	98,9	95,6	97,7	99,0	98,0	98,2	92,8	96,9	97,0	95,8	99,3	97,2	

¹ En utilisant les différents codes résultats utilisés pour classer les ménages selon les catégories de réponse, le taux de réponse pour l'Enquête Ménage (TRM) est calculé comme suit :

$$\frac{100 * R}{R + MP + D + REF + LNT}$$

² Le taux de réponse des femmes éligibles (TRFE) est équivalent au pourcentage d'interviews complétées (FER).

³ Le taux de réponse global des femmes est calculé comme suit (TRGF) :

$$TRGF = TRM * TRFE/100$$

Tableau A.7 Résultats de l'enquête: Homme

Répartition (en %) des ménages et des hommes éligibles par résultat de l'enquête ménage et individuelle, taux de réponse des ménages, des hommes éligibles et taux de réponse global des hommes, selon la région et le milieu de résidence, (non pondéré), EDSB-V Bénin 2017-2018

Résultat des interviews	Résidence					Département										Ensemble
	Urbain	Rural	Alibori	Atacora	Atlant-ique	Borgou	Col-lines	Couffo	Donga	Littoral	Mono	Ouémé	Plateau	Zou		
Sélection des ménages																
Rempli (R)	97,5	98,2	99,8	97,6	95,6	98,1	99,0	98,2	97,6	94,8	98,8	98,9	98,2	99,0	97,9	
Pas d'enquête compétent à la maison, au moment de la visite (MP)	0,2	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,5	0,0	0,1	0,6	0,3	0,0	0,0	0,2	
Refusé (REF)	1,0	0,6	0,0	0,0	1,8	0,7	0,2	0,2	0,0	3,0	0,0	0,4	1,6	0,4	0,8	
Logement non trouvé (LNT)	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	
Ménage absent (MA)	0,3	0,4	0,0	0,4	0,4	0,1	0,3	0,9	1,0	0,4	0,0	0,1	0,0	0,4	0,3	
Logement vacant/ adresse non un logement (LV)	0,9	0,5	0,2	1,4	1,5	0,5	0,3	0,0	1,4	1,5	0,6	0,3	0,2	0,1	0,7	
Logement détruit (LD)	0,0	0,1	0,0	0,6	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Nombre de ménages échantillonnés	3 264	3 954	546	507	847	728	598	546	416	676	481	703	494	676	7 218	
Taux de réponse des ménages (TRM) ¹	98,7	99,1	100,0	100,0	97,6	98,8	99,8	99,3	100,0	96,7	99,4	99,3	98,4	99,6	98,9	
Hommes éligibles																
Rempli (HER)	96,9	98,2	97,1	99,4	96,7	98,4	98,1	98,3	99,1	96,2	98,0	95,3	95,7	98,6	97,6	
Pas à la maison (HPM)	1,5	0,7	0,5	0,0	1,4	0,9	1,5	1,1	0,6	1,6	1,6	2,2	0,5	0,6	1,0	
Différé (HD)	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	
Refusé (HR)	1,3	0,8	2,1	0,0	1,5	0,4	0,0	0,4	0,0	1,5	0,5	2,0	3,3	0,5	1,0	
Incapacité (HI)	0,3	0,3	0,0	0,4	0,4	0,2	0,3	0,2	0,4	0,6	0,0	0,3	0,5	0,3	0,3	
Autre (HA)	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Effectif d'hommes	3 491	4 291	932	686	797	894	647	469	540	685	440	635	395	662	7 782	
Taux de réponse des hommes éligibles (TRHE) ²	96,9	98,2	97,1	99,4	96,7	98,4	98,1	98,3	99,1	96,2	98,0	95,3	95,7	98,6	97,6	
Taux de réponse global des hommes (TRGH) ³	95,7	97,3	97,1	99,4	94,4	97,2	98,0	97,6	99,1	93,0	97,3	94,6	94,1	98,2	96,6	

¹ En utilisant les différents codes résultats utilisés pour classer les ménages selon les catégories de réponse, le taux de réponse pour l'Enquête Ménage (TRM) est calculé comme suit :

$$100 * R$$

$$R + MP + D + REF + LNT$$

² Le taux de réponse des hommes éligibles (TRHE) est équivalent au pourcentage d'interviews complétées(HER).

³ Le taux de réponse global des hommes est calculé comme suit (TRGH) :

$$TRGH = TRM * TRHE/100$$

Les estimations de paramètres à partir d'une enquête par sondage sont sujettes à deux types d'erreurs : les erreurs de mesure et l'erreur d'échantillonnage. Les erreurs de mesure sont celles associées à la mise en oeuvre de la collecte et à l'exploitation des données, telles que l'omission des ménages sélectionnés, la mauvaise interprétation des questions de la part soit de l'enquêteur, soit de l'enquêté et les erreurs de saisie des données. Bien que tout le possible ait été fait durant la réalisation de l'EDS Bénin 2017-2018 (EDSB-V 2017-2018) pour minimiser ce type d'erreur, il est difficile d'éviter et d'évaluer statistiquement les erreurs de mesure.

Par contre, l'erreur d'échantillonnage peut être évaluée statistiquement. L'échantillon sélectionné pour EDSB-V 2017-2018 n'est qu'un parmi un grand nombre d'échantillons qui peuvent être sélectionnés, à partir de la même population, en utilisant le même plan de sondage. Chacun de ces échantillons peut produire des résultats peu différents de ceux obtenus avec l'échantillon actuellement sélectionné. L'erreur d'échantillonnage est une mesure de la variabilité parmi tous les échantillons possibles. Bien que le niveau de variabilité ne puisse pas être connu exactement, il peut être estimé à partir des données collectées.

L'*erreur-type (ET)* est un indice particulièrement utile pour mesurer l'erreur d'échantillonnage d'un paramètre estimé (moyenne, proportion, etc.) ; elle est la racine carrée de la variance du paramètre estimé. L'erreur-type peut être utilisée pour calculer des intervalles de confiance dans lesquels on considère que se trouve la vraie valeur du paramètre avec un certain niveau de confiance. Par exemple, pour un paramètre donné calculé à partir d'un échantillon, la vraie valeur du paramètre se trouvera dans les limites de sa valeur estimée plus ou moins deux fois son erreur-type, avec un niveau de confiance de 95 %.

Si l'échantillon avait été tiré d'après un plan de sondage aléatoire simple, il aurait été possible d'utiliser des formules simples pour calculer l'erreur d'échantillonnage. Cependant, l'échantillon de l'EDSB-V 2017-2018 étant un échantillon stratifié et tiré à deux degrés, il s'est avéré nécessaire d'utiliser des formules plus complexes. Un programme SAS, développé par ICF International, a été utilisé pour calculer les erreurs d'échantillonnage. Ce programme utilise la méthode de linéarisation de Taylor pour les estimations comme des moyennes, proportions ou ratios. La méthode de replication de Jackknife est utilisée pour les estimations des indicateurs plus complexes comme l'indice synthétique de fécondité et les quotients de mortalité.

La méthode de linéarisation de Taylor traite chaque proportion ou moyenne comme étant une estimation de ratio, $r = y/x$, avec y la somme pondérée de la variable d'intérêt et x le nombre total de cas pondérés, calcul basé sur les mêmes unités enquêtées. La variance de r est calculée en utilisant la formule ci-dessous, avec l'erreur-type qui est la racine carrée de la variance :

$$ET^2(r) = var(r) = \frac{1-f}{x^2} \sum_{h=1}^H \left[\frac{m_h}{m_h-1} \left(\sum_{i=1}^{m_h} z_{hi}^2 - \frac{z_h^2}{m_h} \right) \right]$$

Dans laquelle

$$z_{hi} = y_{hi} - rx_{hi}, \text{ et } z_h = y_h - rx_h$$

- où
- h représente la strate variant de 1 à H ,
 - m_h est le nombre total de grappes sélectionnées dans la strate h ,
 - y_{hi} est la somme des valeurs pondérées de la variable y dans la grappe i de la strate h ,
 - x_{hi} est la somme des nombres de cas pondérés dans la grappe i de la strate h , et
 - f est le taux global de sondage, qui est négligeable et donc ignoré.

La méthode de replication de Jackknife dérive les estimations de taux complexes à partir de chacun des sous-échantillons de l'échantillon principal et calcule les erreur-type de ces estimations en utilisant des formules simples. Chaque sous-échantillon exclut *une* grappe dans le calcul des estimations. Des estimations pseudo-indépendantes sont donc créées. Dans EDSB-V 2017-2018, il y a 555 grappes non-vides et par conséquent, 555 sous-échantillons ont été créés. La variance d'un taux r est calculée comme suit :

$$ET^2(r) = var(r) = \frac{1}{k(k-1)} \sum_{i=1}^k (r_i - r)^2$$

Dans laquelle

$$r_i = kr - (k-1)r_{(i)}$$

où r est l'estimation calculée à partir de l'échantillon complet de 555 grappes,
 $r_{(i)}$ est l'estimation calculée à partir de l'échantillon réduit de 554 grappes ($i^{\text{ème}}$ grappe exclue), et
 k est le nombre total de grappes.

En plus de l'erreur-type, on calcule pour chaque estimation l'effet du plan de sondage (DEFT). L'effet du plan de sondage est le rapport de l'erreur-type observée sur l'erreur-type qu'on aurait obtenue si un sondage aléatoire simple avait été utilisé. Une valeur du DEFT de 1,0 indique que le plan de sondage est aussi efficace qu'un plan aléatoire simple, alors qu'une valeur supérieure à 1,0 indique un accroissement de l'erreur d'échantillonnage due à un plan de sondage plus complexe et moins efficace par rapport à un plan aléatoire simple. Pour chaque estimation, l'erreur relative et les intervalles de confiance sont aussi calculés.

Les erreurs d'échantillonnage pour EDSB-V 2017-2018 ont été calculées pour certaines variables considérées comme essentielles. Les résultats sont présentés dans cette annexe pour le pays entier, pour la capitale Cotonou, pour les autres villes urbaines, pour le milieu urbain ensemble et le milieu rural, et pour les 12 départements administratifs. Pour chaque variable, le type de statistique (moyenne, proportion, ou taux) et la population de base sont présentés au **Tableau B.1**. Les **Tableaux B.2 à B.18** présentent la valeur de la statistique (M), l'erreur-type (ET), le nombre de cas non pondérés (N) et pondérés (WN), l'effet de plan de sondage (DEFT), l'erreur relative (ET/M), et l'intervalle de confiance à 95 % ($M \pm 2ET$), pour chaque variable. Les erreurs d'échantillonnage pour les taux de mortalité sont présentées pour la période des 5 années ayant précédé l'enquête pour l'échantillon national et pour la période des 10 années avant l'enquête au niveau des domaines d'étude. Le DEFT est considéré comme non défini quand l'écart type sous l'échantillon aléatoire simple est zéro (quand l'estimation est proche de 0 ou 1).

L'intervalle de confiance (calculé par ex. pour le *Nombre idéal d'enfants*) peut être interprété comme suit : le nombre moyen sur le *nombre idéal d'enfants* calculé pour toutes les femmes de 15-49 ans enquêtées est de 5,150 auquel correspond une erreur-type de 0,045. Par conséquent, pour obtenir un intervalle de confiance de 95 %, on doit ajouter et soustraire deux fois l'erreur-type de l'estimation, c'est-à-dire, $5,150 \pm 2 \times 0,045$. Il y a une probabilité élevée (95 %) que la valeur *réelle* du nombre idéal d'enfants pour toutes les femmes de 15-49 ans se trouve entre 5,059 et 5,240.

Pour l'échantillon total, la moyenne du DEFT, calculée pour l'ensemble des variables issues de l'enquête auprès des femmes est de 1,457. Cela veut dire que, par rapport à un échantillon aléatoire simple, l'erreur d'échantillonnage est multipliée par un facteur de 1,457 parce qu'on utilise un plan de sondage complexe (par grappe et à plusieurs degrés) et moins efficace.

Tableau B.1 Variables utilisées pour le calcul des erreurs de sondage : EDSB-V Bénin 2017-2018

Variable	Estimation	Population de base
MÉNAGE		
Possession d'au moins une MII	Proportion	Toute la population de fait des ménages
Ayant accès à une MII	Proportion	Toute la population de fait des ménages
Dormi sous une MII la nuit précédente l'enquête	Proportion	Toute la population de fait des ménages
FEMME		
Milieu urbain	Proportion	Toutes les femmes 15-49
Alphabétisée	Proportion	Toutes les femmes 15-49
Aucune instruction	Proportion	Toutes les femmes 15-49
Niveau secondaire ou plus	Proportion	Toutes les femmes 15-49
Jamais mariée/jamais en union	Proportion	Toutes les femmes 15-49
Actuellement mariée/en union	Proportion	Toutes les femmes 15-49
Mariée/en union avant l'âge de 18 ans	Proportion	Femmes 20-49
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	Proportion	Femmes 20-49
Actuellement enceinte	Proportion	Toutes les femmes 15-49
Connait une méthode contraceptive	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49
Connait une méthode moderne	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49
Utilise actuellement une méthode	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49
Utilise actuellement une méthode moderne	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49
Utilise actuellement la pilule	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49
Utilise actuellement le DIU	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49
Utilise actuellement des condoms masculins	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49
Utilise actuellement des injectables	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49
Utilise actuellement la stérilisation féminine	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49
Utilise actuellement le retrait	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49
Utilise actuellement la méthode du rythme	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49
A utilisé une source du secteur public	Proportion	Utilisatrices de méthodes modernes
Ne veut plus d'enfant	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49
Nombre idéal d'enfants	Moyenne	Toutes les femmes 15-49
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	Proportion	Dernière naissances dans les 5 dernières années
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	Proportion	Naissances dans les 5 dernières années
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	Proportion	Enfants de moins de 5 ans
Traités avec des SRO	Proportion	Enfants avec diarrhée les 2 dernières semaines
Traitement médical recherché	Proportion	Enfants avec diarrhée les 2 dernières semaines
Carnet de vaccination montré	Proportion	Enfants âgés 12-23 mois
A reçu le vaccin du BCG	Proportion	Enfants âgés 12-23 mois
A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses)	Proportion	Enfants âgés 12-23 mois
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	Proportion	Enfants âgés 12-23 mois
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	Proportion	Enfants âgés 12-23 mois
A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses)	Proportion	Enfants âgés 12-23 mois
A reçu le vaccin anti-rougeoleux	Proportion	Enfants âgés 12-23 mois
A reçu tous les vaccins de base	Proportion	Enfants âgés 12-23 mois
Taille-pour-âge (-2ET)	Proportion	Enfants de moins de 5 ans mesurés
Poids-pour-taille (-2ET)	Proportion	Enfants de moins de 5 ans mesurés
Poids-pour-âge (-2ET)	Proportion	Enfants de moins de 5 ans mesurés
Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois)	Proportion	Enfants de 6-59 mois testés
Prévalence du paludisme (TDR)	Proportion	Enfants de 6-59 mois testés
Prévalence du paludisme (Microscopie)	Proportion	Enfants de 6-59 mois testés
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	Proportion	Toutes les femmes 15-49 mesurées
Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0	Proportion	Toutes les femmes 15-49 mesurées
Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans)	Proportion	Toutes les femmes 15-49 testées
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	Proportion	Toutes les femmes 15-49
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient	Proportion	Toutes les femmes 15-49
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	Proportion	Femmes célibataires de 15-24
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	Proportion	Toutes les femmes 15-49
Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	Proportion	Femmes 15-49 ayant entendu parler du VIH/sida
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	Proportion	Toutes les femmes 15-49
A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment	Proportion	Toutes les femmes 15-49
A subi des violences physiques ou sexuelles exercées par le plus récent mari/partenaire	Proportion	Femmes actuellement en union ou en rupture d'union 15-49
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire	Proportion	Femmes actuellement en union ou en rupture d'union 15-49
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois	Proportion	Femmes actuellement en union ou en rupture d'union 15-49
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	Taux	Femmes-années d'exposition au risque de grossesse
Quotient de mortalité néonatale ¹	Taux	Nombre d'enfants exposés au décès
Quotient de mortalité post-néonatale ¹	Taux	Nombre d'enfants exposés au décès
Quotient de mortalité infantile ¹	Taux	Nombre d'enfants exposés au décès
Quotient de mortalité juvénile ¹	Taux	Nombre d'enfants exposés au décès
Quotient de mortalité infanto-juvénile ¹	Taux	Nombre d'enfants exposés au décès

À suivre...

Tableau B.1—Suite

Variable	Estimation	Population de base
HOMME		
Milieu urbain	Proportion	Tous les hommes 15-49
Alphabétisé	Proportion	Tous les hommes 15-49
Aucune instruction	Proportion	Tous les hommes 15-49
Niveau secondaire ou plus	Proportion	Tous les hommes 15-49
Jamais marié/jamais en union	Proportion	Tous les hommes 15-49
Actuellement marié/en union	Proportion	Tous les hommes 15-49
A eu des rapports sexuels avant 18 ans	Proportion	Hommes 20-49
Connaît une méthode contraceptive	Proportion	Hommes actuellement mariés (en union) 15-49
Connaît une méthode moderne	Proportion	Hommes actuellement mariés (en union) 15-49
Ne veut plus d'enfants	Proportion	Hommes actuellement mariés (en union) 15-49
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	Proportion	Hommes actuellement mariés (en union) 15-49
Nombre idéal d'enfants	Moyenne	Tous les hommes 15-49
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	Proportion	Tous les hommes 15-49
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	Proportion	Tous les hommes 15-49
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	Proportion	Hommes célibataires de 15-24
Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient	Proportion	Tous les hommes 15-49
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	Proportion	Tous les hommes 15-49
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	Proportion	Hommes 15-49 ayant entendu parler du VIH/sida

¹ Les quotients de mortalité sont calculés pour la période de 5 années avant l'enquête au niveau national et pour la période des 10 années avant l'enquête au niveau régional.

Tableau B.2 Erreurs de sondage : Echantillon Total, EDSB-V Bénin 2017-2018

Variable	Valeur (M)	Erreur-type (ET)	Effectif		Effet de plan de sondage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pondéré (N)'			M-2ET	M+2ET
MÉNAGE								
Possession d'au moins une MII	0,915	0,004	14 156	14 156	1,515	0,004	0,908	0,922
Ayant accès à une MII	0,772	0,006	73 336	73 098	1,758	0,007	0,761	0,783
Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête	0,711	0,006	73 336	73 098	1,583	0,008	0,699	0,723
FEMME								
Milieu urbain	0,424	0,010	15 928	15 928	2,493	0,023	0,405	0,444
Alphabétisée	0,341	0,008	15 928	15 928	2,225	0,025	0,324	0,358
Aucune instruction	0,552	0,009	15 928	15 928	2,247	0,016	0,534	0,569
Niveau secondaire ou plus	0,251	0,007	15 928	15 928	2,159	0,030	0,236	0,266
Jamais mariée/jamais en union	0,244	0,006	15 928	15 928	1,625	0,023	0,233	0,255
Actuellement mariée/en union	0,701	0,006	15 928	15 928	1,699	0,009	0,689	0,713
Mariée/en union avant l'âge de 18 ans	0,355	0,006	12 593	12 578	1,522	0,018	0,342	0,368
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,595	0,007	12 593	12 578	1,562	0,011	0,581	0,609
Actuellement enceinte	0,107	0,003	15 928	15 928	1,073	0,025	0,102	0,112
Connait une méthode contraceptive	0,965	0,003	11 170	11 168	1,809	0,003	0,959	0,971
Connait une méthode moderne	0,963	0,003	11 170	11 168	1,817	0,003	0,956	0,969
Utilise actuellement une méthode	0,155	0,005	11 170	11 168	1,428	0,032	0,145	0,165
Utilise actuellement une méthode moderne	0,124	0,004	11 170	11 168	1,402	0,035	0,115	0,133
Utilise actuellement la pilule	0,015	0,001	11 170	11 168	1,134	0,087	0,012	0,018
Utilise actuellement le DIU	0,016	0,001	11 170	11 168	1,226	0,090	0,013	0,019
Utilise actuellement des condoms masculins	0,009	0,001	11 170	11 168	1,222	0,119	0,007	0,012
Utilise actuellement des injectables	0,022	0,002	11 170	11 168	1,137	0,072	0,019	0,025
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,002	0,000	11 170	11 168	1,068	0,244	0,001	0,003
Utilise actuellement le retrait	0,013	0,001	11 170	11 168	1,201	0,100	0,010	0,015
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,016	0,002	11 170	11 168	1,366	0,102	0,013	0,019
A utilisé une source du secteur public	0,624	0,015	1 864	1 842	1,346	0,024	0,593	0,654
Ne veut plus d'enfant	0,245	0,006	11 170	11 168	1,377	0,023	0,234	0,256
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,344	0,007	11 170	11 168	1,518	0,020	0,331	0,358
Nombre idéal d'enfants	5,150	0,045	14 982	14 971	2,254	0,009	5,059	5,240
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,707	0,009	8 994	9 031	1,896	0,013	0,689	0,725
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,781	0,011	13 589	13 643	2,564	0,015	0,758	0,804
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,104	0,004	12 651	12 686	1,345	0,036	0,097	0,111
Traités avec des SRO	0,222	0,014	1 342	1 320	1,174	0,062	0,194	0,249
Traitement médical recherché	0,427	0,018	1 342	1 320	1,277	0,042	0,391	0,463
Carnet de vaccination montré	0,715	0,011	2 522	2 515	1,234	0,016	0,692	0,737
A reçu le vaccin du BCG	0,882	0,009	2 522	2 515	1,440	0,011	0,863	0,901
A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses)	0,730	0,012	2 522	2 515	1,345	0,017	0,706	0,754
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,865	0,009	2 522	2 515	1,372	0,011	0,846	0,883
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,655	0,013	2 522	2 515	1,310	0,019	0,630	0,681
A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses)	0,708	0,013	2 522	2 515	1,400	0,018	0,682	0,734
A reçu le vaccin anti-rougeoleux	0,679	0,013	2 522	2 515	1,338	0,019	0,654	0,705
A reçu tous les vaccins de base	0,566	0,013	2 522	2 515	1,311	0,023	0,540	0,593
Taille-pour-âge (-2ET)	0,322	0,006	12 743	12 777	1,383	0,020	0,309	0,334
Poids-pour-taille (-2ET)	0,050	0,002	13 243	13 260	1,177	0,047	0,045	0,054
Poids-pour-âge (-2ET)	0,168	0,005	12 800	12 832	1,286	0,028	0,159	0,178
Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois)	0,715	0,008	6 207	6 171	1,311	0,011	0,699	0,731
Prévalence du paludisme (TDR)	0,364	0,012	6 192	6 155	1,599	0,032	0,341	0,387
Prévalence du paludisme (Microscopie)	0,391	0,011	5916	5879	1,575	0,029	0,368	0,414
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,111	0,004	6 933	6 946	1,153	0,039	0,102	0,119
Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0	0,258	0,007	6 933	6 946	1,361	0,028	0,244	0,273
Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans)	0,577	0,008	8 011	8 018	1,414	0,014	0,562	0,593
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,016	0,001	15 928	15 928	1,452	0,090	0,013	0,019
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient	0,216	0,010	2 123	2 118	1,149	0,048	0,195	0,236
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,538	0,011	3 592	3 598	1,329	0,021	0,516	0,560
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,141	0,006	7 712	7 706	1,394	0,039	0,130	0,152
Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	0,755	0,009	7 072	7 053	1,686	0,011	0,737	0,772
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	0,273	0,008	5 408	5 408	1,375	0,031	0,256	0,289
A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment	0,101	0,006	5 408	5 408	1,344	0,055	0,090	0,112
A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire	0,224	0,009	4 488	4 150	1,429	0,040	0,207	0,242
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire	0,428	0,010	4 488	4 150	1,366	0,024	0,408	0,448
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois	0,319	0,010	4 488	4 150	1,464	0,032	0,298	0,339
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	5,685	0,083	44 500	44 488	1,541	0,015	5,519	5,852
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-4 ans)	30,030	1,905	13 516	13 571	1,184	0,063	26,221	33,840
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-4 ans)	24,928	1,576	13 487	13 534	1,070	0,063	21,776	28,080
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-4 ans)	54,959	2,536	13 547	13 599	1,155	0,046	49,887	60,030
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-4 ans)	43,661	2,126	13 136	13 171	1,106	0,049	39,408	47,913
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-4 ans)	96,220	3,317	13 766	13 820	1,169	0,034	89,585	102,854

À suivre...

Tableau B.2—Suite

Variable	Valeur (M)	Erreur- type (ET)	Effectif		Effet de plan de son- dage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pon- déré (N)'			M-2ET	M+2ET
HOMME								
Milieu urbain	0,428	0,010	6 731	6 727	1,722	0,024	0,407	0,449
Alphabétisé	0,542	0,011	6 731	6 727	1,854	0,021	0,520	0,565
Aucune instruction	0,361	0,011	6 731	6 727	1,843	0,030	0,339	0,382
Niveau secondaire ou plus	0,407	0,010	6 731	6 727	1,713	0,025	0,387	0,428
Jamais marié/jamais en union	0,425	0,008	6 731	6 727	1,298	0,018	0,410	0,441
Actuellement marié/en union	0,546	0,008	6 731	6 727	1,296	0,014	0,531	0,562
A eu des rapports sexuels avant 18 ans	0,392	0,010	5 172	5 179	1,472	0,026	0,372	0,412
Connaît une méthode contraceptive	0,969	0,005	3 644	3 675	1,841	0,005	0,959	0,980
Connaît une méthode moderne	0,968	0,005	3 644	3 675	1,822	0,005	0,957	0,979
Ne veut plus d'enfants	0,186	0,007	3 644	3 675	1,141	0,040	0,171	0,201
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,367	0,012	3 644	3 675	1,460	0,032	0,344	0,391
Nombre idéal d'enfants	6,982	0,112	6 373	6 347	1,714	0,016	6,757	7,206
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,216	0,007	6 731	6 727	1,401	0,033	0,202	0,230
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,037	0,003	6 731	6 727	1,398	0,087	0,030	0,043
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,551	0,013	2 390	2 357	1,281	0,024	0,525	0,577
Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient	0,315	0,014	2 069	2 064	1,343	0,044	0,288	0,343
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,071	0,005	6 731	6 727	1,478	0,065	0,061	0,080
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,702	0,010	6 190	6 140	1,728	0,014	0,682	0,722

Tableau B.3 Erreurs de sondage : Echantillon Cotonou, EDSB-V Bénin 2017-2018

Variable	Valeur (M)	Erreur-type (ET)	Effectif		Effet de plan de sondage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pondéré (N)'			M-2ET	M+2ET
MÉNAGE								
Possession d'au moins une MII	0,917	0,011	1 294	852	1,377	0,012	0,896	0,938
Ayant accès à une MII	0,833	0,014	5 596	3 687	1,627	0,017	0,805	0,861
Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête	0,807	0,014	5 596	3 687	1,443	0,018	0,778	0,836
FEMME								
Milieu urbain	1,000	0,000	1 415	958	na	0,000	1,000	1,000
Alphabétisée	0,670	0,021	1 415	958	1,643	0,031	0,629	0,711
Aucune instruction	0,228	0,015	1 415	958	1,344	0,066	0,198	0,258
Niveau secondaire ou plus	0,499	0,018	1 415	958	1,374	0,037	0,463	0,536
Jamais mariée/jamais en union	0,338	0,015	1 415	958	1,215	0,045	0,307	0,368
Actuellement mariée/en union	0,575	0,015	1 415	958	1,153	0,026	0,545	0,605
Mariée/en union avant l'âge de 18 ans	0,168	0,013	1 128	766	1,191	0,079	0,142	0,195
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,431	0,025	1 128	766	1,717	0,059	0,380	0,481
Actuellement enceinte	0,068	0,009	1 415	958	1,282	0,126	0,051	0,085
Connait une méthode contraceptive	0,996	0,002	803	551	1,085	0,002	0,991	1,001
Connait une méthode moderne	0,996	0,002	803	551	1,085	0,002	0,991	1,001
Utilise actuellement une méthode	0,272	0,021	803	551	1,361	0,079	0,229	0,314
Utilise actuellement une méthode moderne	0,192	0,016	803	551	1,152	0,083	0,160	0,224
Utilise actuellement la pilule	0,034	0,006	803	551	1,010	0,189	0,021	0,047
Utilise actuellement le DIU	0,047	0,007	803	551	0,973	0,154	0,033	0,062
Utilise actuellement des condoms masculins	0,015	0,004	803	551	0,966	0,277	0,007	0,023
Utilise actuellement des injectables	0,029	0,006	803	551	1,080	0,220	0,016	0,042
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,005	0,003	803	551	1,137	0,571	0,000	0,011
Utilise actuellement le retrait	0,031	0,010	803	551	1,597	0,316	0,011	0,050
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,041	0,009	803	551	1,333	0,227	0,023	0,060
A utilisé une source du secteur public	0,349	0,031	245	166	1,018	0,089	0,287	0,411
Ne veut plus d'enfant	0,349	0,018	803	551	1,046	0,050	0,314	0,384
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,278	0,022	803	551	1,410	0,080	0,233	0,323
Nombre idéal d'enfants	3,926	0,066	1 350	915	1,505	0,017	3,795	4,057
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,802	0,027	605	408	1,655	0,034	0,748	0,856
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,932	0,021	848	579	1,944	0,023	0,889	0,975
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,086	0,011	813	558	1,062	0,124	0,065	0,107
Traités avec des SRO	0,214	0,062	72	48	1,161	0,290	0,090	0,338
Traitement médical recherché	0,419	0,091	72	48	1,490	0,218	0,237	0,602
Carnet de vaccination montré	0,759	0,045	184	127	1,412	0,059	0,670	0,848
A reçu le vaccin du BCG	0,971	0,016	184	127	1,253	0,016	0,940	1,002
A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses)	0,870	0,035	184	127	1,395	0,040	0,801	0,939
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,960	0,017	184	127	1,188	0,018	0,926	0,994
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,763	0,038	184	127	1,211	0,050	0,687	0,839
A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses)	0,859	0,035	184	127	1,366	0,041	0,790	0,929
A reçu le vaccin anti-rougeoleux	0,781	0,046	184	127	1,501	0,059	0,688	0,874
A reçu tous les vaccins de base	0,667	0,047	184	127	1,348	0,071	0,572	0,761
Taille-pour-âge (-2ET)	0,191	0,021	826	554	1,441	0,108	0,150	0,233
Poids-pour-taille (-2ET)	0,056	0,012	831	558	1,421	0,217	0,031	0,080
Poids-pour-âge (-2ET)	0,125	0,013	829	556	1,105	0,107	0,099	0,152
Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois)	0,611	0,036	433	275	1,416	0,060	0,538	0,684
Prévalence du paludisme (TDR)	0,042	0,012	432	274	1,041	0,280	0,019	0,066
Prévalence du paludisme (Microscopie)	0,167	0,025	413	263	1,243	0,149	0,117	0,217
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,061	0,010	658	439	1,095	0,169	0,040	0,082
Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0	0,477	0,022	658	439	1,107	0,046	0,434	0,521
Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans)	0,607	0,021	705	463	1,130	0,035	0,564	0,649
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,030	0,007	1 415	958	1,542	0,235	0,016	0,044
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient	0,226	0,026	286	195	1,055	0,116	0,174	0,278
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,515	0,034	408	271	1,362	0,066	0,447	0,582
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,259	0,022	661	460	1,282	0,084	0,216	0,303
Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	0,568	0,024	648	453	1,239	0,042	0,520	0,617
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	0,309	0,019	494	318	0,914	0,061	0,271	0,347
A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment	0,101	0,015	494	318	1,079	0,145	0,071	0,130
A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire	0,176	0,023	377	223	1,176	0,131	0,130	0,223
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire	0,381	0,027	377	223	1,079	0,071	0,327	0,435
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois	0,258	0,023	377	223	1,041	0,091	0,211	0,305
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	3,997	0,169	3 975	2 690	1,226	0,042	3,659	4,335
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-4 ans)	14,673	4,012	847	580	0,906	0,273	6,649	22,697
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-4 ans)	15,456	3,973	852	584	0,964	0,257	7,510	23,401
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-4 ans)	30,129	5,819	849	582	0,968	0,193	18,492	41,766
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-4 ans)	14,667	4,427	829	565	0,957	0,302	5,813	23,522
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-4 ans)	44,354	8,379	853	583	1,072	0,189	27,596	61,111

À suivre...

Tableau B.3—Suite

Variable	Valeur (M)	Erreur- type (ET)	Effectif		Effet de plan de son- dage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pon- déré (N) ^a			M-2ET	M+2ET
HOMME								
Milieu urbain	1,000	0,000	592	390	na	0,000	1,000	1,000
Alphabétisé	0,883	0,017	592	390	1,282	0,019	0,849	0,917
Aucune instruction	0,067	0,014	592	390	1,324	0,203	0,040	0,094
Niveau secondaire ou plus	0,776	0,025	592	390	1,446	0,032	0,726	0,826
Jamais marié/jamais en union	0,487	0,029	592	390	1,424	0,060	0,429	0,546
Actuellement marié/en union	0,467	0,030	592	390	1,473	0,065	0,407	0,528
A eu des rapports sexuels avant 18 ans	0,436	0,038	473	315	1,668	0,088	0,359	0,512
Connaît une méthode contraceptive	0,985	0,009	264	182	1,143	0,009	0,968	1,002
Connaît une méthode moderne	0,984	0,009	264	182	1,104	0,009	0,966	1,001
Ne veut plus d'enfants	0,353	0,028	264	182	0,966	0,081	0,296	0,410
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,258	0,037	264	182	1,350	0,141	0,185	0,331
Nombre idéal d'enfants	3,942	0,100	576	378	1,275	0,025	3,742	4,142
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,229	0,020	592	390	1,176	0,089	0,189	0,270
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,074	0,016	592	390	1,521	0,221	0,041	0,107
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,442	0,030	227	145	0,916	0,068	0,381	0,502
Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient	0,480	0,040	247	156	1,257	0,083	0,400	0,560
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,163	0,022	592	390	1,424	0,133	0,119	0,206
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,641	0,043	584	385	2,156	0,067	0,555	0,727

Tableau B.4 Erreurs de sondage : Echantillon Autres villes, EDSB-V Bénin 2017-2018

Variable	Valeur (M)	Erreur-type (ET)	Effectif		Effet de plan de sondage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pondéré (N)'			M-2ET	M+2ET
MÉNAGE								
Possession d'au moins une MII	0,900	0,006	5 070	5 252	1,399	0,007	0,888	0,912
Ayant accès à une MII	0,771	0,008	25 132	25 689	1,501	0,010	0,756	0,787
Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête	0,714	0,009	25 132	25 689	1,446	0,012	0,696	0,731
FEMME								
Milieu urbain	1,000	0,000	5 630	5 803	na	0,000	1,000	1,000
Alphabétisée	0,428	0,017	5 630	5 803	2,549	0,039	0,395	0,462
Aucune instruction	0,460	0,018	5 630	5 803	2,645	0,038	0,425	0,495
Niveau secondaire ou plus	0,329	0,015	5 630	5 803	2,437	0,046	0,298	0,359
Jamais mariée/jamais en union	0,271	0,010	5 630	5 803	1,675	0,037	0,251	0,290
Actuellement mariée/en union	0,669	0,011	5 630	5 803	1,751	0,016	0,647	0,691
Mariée/en union avant l'âge de 18 ans	0,306	0,012	4 449	4 581	1,674	0,038	0,283	0,330
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,544	0,013	4 449	4 581	1,727	0,024	0,518	0,569
Actuellement enceinte	0,097	0,004	5 630	5 803	1,069	0,043	0,089	0,106
Connait une méthode contraceptive	0,970	0,004	3 806	3 881	1,633	0,005	0,961	0,979
Connait une méthode moderne	0,968	0,005	3 806	3 881	1,676	0,005	0,959	0,978
Utilise actuellement une méthode	0,168	0,009	3 806	3 881	1,485	0,054	0,150	0,186
Utilise actuellement une méthode moderne	0,139	0,009	3 806	3 881	1,546	0,062	0,121	0,156
Utilise actuellement la pilule	0,016	0,002	3 806	3 881	1,044	0,134	0,011	0,020
Utilise actuellement le DIU	0,022	0,003	3 806	3 881	1,321	0,143	0,016	0,028
Utilise actuellement des condoms masculins	0,012	0,002	3 806	3 881	1,386	0,201	0,007	0,017
Utilise actuellement des injectables	0,024	0,003	3 806	3 881	1,160	0,121	0,018	0,029
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,003	0,001	3 806	3 881	1,115	0,345	0,001	0,005
Utilise actuellement le retrait	0,009	0,002	3 806	3 881	1,000	0,169	0,006	0,012
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,017	0,003	3 806	3 881	1,471	0,179	0,011	0,024
A utilisé une source du secteur public	0,546	0,026	716	748	1,399	0,048	0,494	0,598
Ne veut plus d'enfant	0,257	0,010	3 806	3 881	1,443	0,040	0,237	0,278
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,335	0,012	3 806	3 881	1,512	0,035	0,312	0,358
Nombre idéal d'enfants	4,784	0,081	5 245	5 393	2,642	0,017	4,623	4,946
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,766	0,013	3 031	3 115	1,698	0,017	0,740	0,792
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,840	0,020	4 553	4 677	2,844	0,024	0,800	0,880
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,096	0,006	4 276	4 382	1,324	0,063	0,084	0,108
Traités avec des SRO	0,276	0,026	415	421	1,138	0,094	0,224	0,328
Traitement médical recherché	0,480	0,028	415	421	1,109	0,059	0,424	0,537
Carnet de vaccination montré	0,734	0,018	807	817	1,130	0,024	0,698	0,770
A reçu le vaccin du BCG	0,917	0,014	807	817	1,421	0,015	0,889	0,945
A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses)	0,764	0,021	807	817	1,362	0,027	0,722	0,805
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,902	0,014	807	817	1,319	0,016	0,874	0,930
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,688	0,021	807	817	1,278	0,031	0,645	0,731
A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses)	0,745	0,021	807	817	1,366	0,029	0,703	0,788
A reçu le vaccin anti-rougeoleux	0,706	0,021	807	817	1,250	0,029	0,665	0,747
A reçu tous les vaccins de base	0,594	0,022	807	817	1,239	0,037	0,550	0,638
Taille-pour-âge (-2ET)	0,285	0,011	4 338	4 436	1,428	0,038	0,263	0,307
Poids-pour-taille (-2ET)	0,051	0,005	4 438	4 537	1,289	0,091	0,041	0,060
Poids-pour-âge (-2ET)	0,151	0,009	4 357	4 455	1,420	0,056	0,134	0,168
Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois)	0,668	0,014	2 024	2 050	1,289	0,021	0,640	0,696
Prévalence du paludisme (TDR)	0,274	0,021	2 018	2 045	1,791	0,077	0,232	0,316
Prévalence du paludisme (Microscopie)	0,343	0,019	1 934	1 958	1 526	0,054	0,306	0,38
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,100	0,007	2 433	2 524	1,169	0,071	0,086	0,114
Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0	0,326	0,013	2 433	2 524	1,335	0,039	0,301	0,352
Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans)	0,570	0,012	2 780	2 871	1,315	0,022	0,546	0,595
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,015	0,003	5 630	5 803	1,718	0,187	0,009	0,020
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient	0,269	0,018	803	835	1,159	0,067	0,233	0,306
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,533	0,019	1 384	1 446	1,451	0,037	0,494	0,572
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,167	0,011	2 770	2 843	1,505	0,064	0,145	0,188
Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	0,741	0,015	2 580	2 641	1,701	0,020	0,711	0,770
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	0,259	0,015	1 924	1 962	1,534	0,059	0,229	0,290
A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment	0,084	0,008	1 924	1 962	1,313	0,099	0,067	0,101
A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire	0,211	0,015	1 553	1 428	1,492	0,073	0,180	0,241
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire	0,399	0,017	1 553	1 428	1,342	0,042	0,365	0,432
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois	0,286	0,017	1 553	1 428	1,470	0,059	0,252	0,320
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	5,373	0,155	15 764	16 248	1,709	0,029	5,063	5,682
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-4 ans)	29,444	3,447	4 553	4 679	1,256	0,117	22,549	36,338
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-4 ans)	21,807	2,459	4 542	4 665	1,032	0,113	16,889	26,724
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-4 ans)	51,250	4,117	4 558	4 682	1,176	0,080	43,017	59,484
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-4 ans)	35,820	3,293	4 310	4 424	1,089	0,092	29,234	42,406
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-4 ans)	85,235	5,524	4 623	4 750	1,231	0,065	74,187	96,283

À suivre...

Tableau B.4—Suite

Variable	Valeur (M)	Erreur- type (ET)	Effectif		Effet de plan de son- dage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pon- déré (N)'			M-2ET	M+2ET
HOMME								
Milieu urbain	1,000	0,000	2 413	2 487	na	0,000	1,000	1,000
Alphabétisé	0,615	0,020	2 413	2 487	2,015	0,032	0,575	0,655
Aucune instruction	0,284	0,018	2 413	2 487	1,933	0,063	0,248	0,319
Niveau secondaire ou plus	0,481	0,019	2 413	2 487	1,829	0,039	0,443	0,518
Jamais marié/jamais en union	0,438	0,014	2 413	2 487	1,363	0,031	0,410	0,466
Actuellement marié/en union	0,533	0,014	2 413	2 487	1,332	0,025	0,506	0,560
A eu des rapports sexuels avant 18 ans	0,376	0,016	1 859	1 934	1,400	0,042	0,345	0,408
Connaît une méthode contraceptive	0,960	0,011	1 278	1 326	1,957	0,011	0,939	0,982
Connaît une méthode moderne	0,960	0,011	1 278	1 326	1,957	0,011	0,939	0,982
Ne veut plus d'enfants	0,216	0,013	1 278	1 326	1,143	0,061	0,190	0,243
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,339	0,017	1 278	1 326	1,291	0,050	0,305	0,373
Nombre idéal d'enfants	6,299	0,168	2 269	2 327	1,672	0,027	5,963	6,634
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,224	0,013	2 413	2 487	1,567	0,059	0,198	0,251
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,031	0,005	2 413	2 487	1,432	0,163	0,021	0,041
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,560	0,019	850	850	1,120	0,034	0,522	0,598
Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient	0,405	0,025	794	825	1,427	0,062	0,355	0,454
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,092	0,010	2 413	2 487	1,668	0,107	0,073	0,112
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,629	0,018	2 283	2 335	1,814	0,029	0,593	0,666

Tableau B.5 Erreurs de sondage : Echantillon Ensemble Urbain, EDSB-V Bénin 2017-2018

Variable	Valeur (M)	Erreur-type (ET)	Effectif		Effet de plan de sondage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pon-déré (N)'			M-2ET	M+2ET
MÉNAGE								
Possession d'au moins une MII	0,902	0,005	6 364	6 104	1,423	0,006	0,892	0,913
Ayant accès à une MII	0,779	0,007	30 728	29 376	1,549	0,009	0,765	0,793
Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête	0,725	0,008	30 728	29 376	1,487	0,011	0,709	0,741
FEMME								
Milieu urbain	1,000	0,000	7 045	6 761	na	0,000	1,000	1,000
Alphabétisée	0,463	0,015	7 045	6 761	2,535	0,033	0,433	0,493
Aucune instruction	0,427	0,016	7 045	6 761	2,637	0,036	0,396	0,458
Niveau secondaire ou plus	0,353	0,014	7 045	6 761	2,381	0,038	0,326	0,380
Jamais mariée/jamais en union	0,280	0,009	7 045	6 761	1,650	0,032	0,262	0,298
Actuellement mariée/en union	0,655	0,010	7 045	6 761	1,711	0,015	0,636	0,675
Mariée/en union avant l'âge de 18 ans	0,287	0,010	5 577	5 347	1,705	0,036	0,266	0,307
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,527	0,012	5 577	5 347	1,749	0,022	0,504	0,551
Actuellement enceinte	0,093	0,004	7 045	6 761	1,105	0,041	0,085	0,101
Connait une méthode contraceptive	0,973	0,004	4 609	4 431	1,668	0,004	0,966	0,981
Connait une méthode moderne	0,972	0,004	4 609	4 431	1,714	0,004	0,963	0,980
Utilise actuellement une méthode	0,181	0,008	4 609	4 431	1,467	0,046	0,164	0,197
Utilise actuellement une méthode moderne	0,145	0,008	4 609	4 431	1,508	0,054	0,130	0,161
Utilise actuellement la pilule	0,018	0,002	4 609	4 431	1,047	0,114	0,014	0,022
Utilise actuellement le DIU	0,025	0,003	4 609	4 431	1,260	0,116	0,019	0,031
Utilise actuellement des condoms masculins	0,013	0,002	4 609	4 431	1,354	0,176	0,008	0,017
Utilise actuellement des injectables	0,024	0,003	4 609	4 431	1,156	0,108	0,019	0,030
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,003	0,001	4 609	4 431	1,113	0,299	0,001	0,005
Utilise actuellement le retrait	0,012	0,002	4 609	4 431	1,146	0,154	0,008	0,015
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,020	0,003	4 609	4 431	1,429	0,146	0,014	0,026
A utilisé une source du secteur public	0,510	0,022	961	914	1,384	0,044	0,465	0,555
Ne veut plus d'enfant	0,269	0,009	4 609	4 431	1,427	0,035	0,250	0,287
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,328	0,011	4 609	4 431	1,529	0,032	0,307	0,349
Nombre idéal d'enfants	4,660	0,069	6 595	6 308	2,617	0,015	4,521	4,799
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,770	0,012	3 636	3 523	1,721	0,016	0,746	0,794
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,850	0,018	5 401	5 256	2,893	0,021	0,814	0,886
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,095	0,006	5 089	4 940	1,326	0,058	0,084	0,106
Traités avec des SRO	0,270	0,024	487	469	1,156	0,089	0,221	0,318
Traitement médical recherché	0,474	0,027	487	469	1,153	0,057	0,421	0,528
Carnet de vaccination montré	0,737	0,017	991	944	1,171	0,023	0,704	0,770
A reçu le vaccin du BCG	0,924	0,012	991	944	1,444	0,013	0,899	0,949
A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses)	0,778	0,019	991	944	1,392	0,024	0,740	0,815
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,910	0,012	991	944	1,341	0,014	0,885	0,935
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,698	0,019	991	944	1,290	0,027	0,660	0,736
A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses)	0,761	0,019	991	944	1,396	0,025	0,722	0,799
A reçu le vaccin anti-rougeoleux	0,716	0,019	991	944	1,292	0,026	0,678	0,754
A reçu tous les vaccins de base	0,604	0,020	991	944	1,266	0,033	0,564	0,644
Taille-pour-âge (-2ET)	0,275	0,010	5 164	4 990	1,474	0,037	0,254	0,295
Poids-pour-taille (-2ET)	0,051	0,004	5 269	5 095	1,324	0,084	0,043	0,060
Poids-pour-âge (-2ET)	0,148	0,008	5 186	5 011	1,433	0,052	0,133	0,164
Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois)	0,661	0,013	2 457	2 325	1,321	0,020	0,635	0,688
Prévalence du paludisme (TDR)	0,247	0,019	2 450	2 319	1,815	0,077	0,209	0,284
Prévalence du paludisme (Microscopie)	0,322	0,017	2 347	2 220	1,547	0,052	0,289	0,356
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,094	0,006	3 091	2 963	1,184	0,066	0,082	0,106
Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0	0,349	0,011	3 091	2 963	1,323	0,033	0,326	0,371
Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans)	0,575	0,011	3 485	3 334	1,310	0,019	0,553	0,597
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,017	0,003	7 045	6 761	1,679	0,152	0,012	0,022
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient	0,261	0,016	1 089	1 029	1,173	0,060	0,230	0,292
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,530	0,017	1 792	1 717	1,465	0,033	0,495	0,565
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,180	0,010	3 431	3 303	1,497	0,055	0,160	0,199
Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	0,715	0,013	3 228	3 093	1,683	0,019	0,689	0,742
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	0,266	0,013	2 418	2 280	1,495	0,050	0,239	0,293
A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment	0,086	0,007	2 418	2 280	1,299	0,086	0,071	0,101
A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire	0,206	0,014	1 930	1 651	1,494	0,067	0,178	0,233
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire	0,396	0,015	1 930	1 651	1,338	0,038	0,367	0,426
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois	0,282	0,015	1 930	1 651	1,458	0,053	0,253	0,312
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	5,176	0,138	19 739	18 938	1,715	0,027	4,900	5,451
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-4 ans)	27,810	3,126	5 400	5 259	1,285	0,112	21,558	34,062
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-4 ans)	21,087	2,228	5 394	5 249	1,053	0,106	16,632	25,542
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-4 ans)	48,897	3,757	5 407	5 264	1,203	0,077	41,383	56,411
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-4 ans)	33,423	3,018	5 139	4 988	1,130	0,090	27,387	39,459
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-4 ans)	80,686	5,118	5 476	5 333	1,271	0,063	70,450	90,921

À suivre...

Tableau B.5—Suite

Variable	Valeur (M)	Erreur- type (ET)	Effectif		Effet de plan de son- dage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pon- déré (N)'			M-2ET	M+2ET
HOMME								
Milieu urbain	1,000	0,000	3 005	2 877	na	0,000	1,000	1,000
Alphabétisé	0,651	0,018	3 005	2 877	2,038	0,027	0,616	0,687
Aucune instruction	0,254	0,016	3 005	2 877	1,965	0,061	0,223	0,286
Niveau secondaire ou plus	0,521	0,017	3 005	2 877	1,847	0,032	0,487	0,554
Jamais marié/jamais en union	0,445	0,013	3 005	2 877	1,382	0,028	0,420	0,470
Actuellement marié/en union	0,524	0,012	3 005	2 877	1,359	0,024	0,500	0,549
A eu des rapports sexuels avant 18 ans	0,385	0,015	2 332	2 249	1,443	0,038	0,356	0,414
Connaît une méthode contraceptive	0,963	0,009	1 542	1 509	1,975	0,010	0,944	0,982
Connaît une méthode moderne	0,963	0,009	1 542	1 509	1,971	0,010	0,944	0,982
Ne veut plus d'enfants	0,233	0,012	1 542	1 509	1,153	0,053	0,208	0,258
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,329	0,016	1 542	1 509	1,312	0,048	0,298	0,361
Nombre idéal d'enfants	5,970	0,147	2 845	2 705	1,715	0,025	5,676	6,263
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,225	0,012	3 005	2 877	1,552	0,053	0,201	0,249
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,037	0,005	3 005	2 877	1,444	0,135	0,027	0,047
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,543	0,017	1 077	996	1,115	0,031	0,509	0,577
Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient	0,417	0,022	1 041	981	1,436	0,053	0,373	0,461
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,102	0,009	3 005	2 877	1,628	0,088	0,084	0,120
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,631	0,017	2 867	2 720	1,874	0,027	0,597	0,665

Tableau B.6 Erreurs de sondage : Echantillon Rural, EDSB-V Bénin 2017-2018

Variable	Valeur (M)	Erreur-type (ET)	Effectif		Effet de plan de sondage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pon-déré (N)'			M-2ET	M+2ET
MÉNAGE								
Possession d'au moins une MII	0,924	0,005	7 792	8 052	1,594	0,005	0,915	0,934
Ayant accès à une MII	0,767	0,008	42 608	43 722	1,840	0,011	0,751	0,784
Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête	0,702	0,008	42 608	43 722	1,616	0,012	0,685	0,718
FEMME								
Milieu urbain	0,000	0,000	8 883	9 167	na	na	0,000	0,000
Alphabétisée	0,251	0,009	8 883	9 167	1,947	0,036	0,233	0,269
Aucune instruction	0,643	0,010	8 883	9 167	1,931	0,015	0,624	0,663
Niveau secondaire ou plus	0,175	0,008	8 883	9 167	1,947	0,045	0,160	0,191
Jamais mariée/jamais en union	0,218	0,007	8 883	9 167	1,616	0,033	0,204	0,232
Actuellement mariée/en union	0,735	0,008	8 883	9 167	1,699	0,011	0,719	0,751
Mariée/en union avant l'âge de 18 ans	0,405	0,008	7 016	7 232	1,408	0,020	0,389	0,422
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,645	0,008	7 016	7 232	1,390	0,012	0,629	0,661
Actuellement enceinte	0,117	0,004	8 883	9 167	1,043	0,030	0,110	0,124
Connait une méthode contraceptive	0,959	0,005	6 561	6 737	1,856	0,005	0,950	0,968
Connait une méthode moderne	0,957	0,005	6 561	6 737	1,852	0,005	0,948	0,966
Utilise actuellement une méthode	0,138	0,006	6 561	6 737	1,387	0,043	0,126	0,150
Utilise actuellement une méthode moderne	0,110	0,005	6 561	6 737	1,304	0,046	0,100	0,120
Utilise actuellement la pilule	0,013	0,002	6 561	6 737	1,214	0,130	0,010	0,016
Utilise actuellement le DIU	0,010	0,002	6 561	6 737	1,196	0,144	0,007	0,013
Utilise actuellement des condoms masculins	0,007	0,001	6 561	6 737	1,070	0,155	0,005	0,009
Utilise actuellement des injectables	0,020	0,002	6 561	6 737	1,124	0,096	0,016	0,024
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,001	0,000	6 561	6 737	0,994	0,415	0,000	0,002
Utilise actuellement le retrait	0,013	0,002	6 561	6 737	1,228	0,130	0,010	0,017
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,013	0,002	6 561	6 737	1,313	0,143	0,009	0,016
A utilisé une source du secteur public	0,735	0,019	903	927	1324	0,026	0,696	0,774
Ne veut plus d'enfant	0,229	0,007	6 561	6 737	1,337	0,030	0,216	0,243
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,355	0,009	6 561	6 737	1,523	0,025	0,337	0,373
Nombre idéal d'enfants	5,506	0,059	8 387	8 663	2,078	0,011	5,389	5,624
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,666	0,013	5 358	5 508	1,958	0,019	0,641	0,692
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,737	0,015	8 188	8 387	2,428	0,020	0,707	0,767
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,110	0,005	7 562	7 746	1,351	0,045	0,100	0,120
Traités avec des SRO	0,195	0,016	855	850	1,162	0,083	0,163	0,228
Traitement médical recherché	0,401	0,023	855	850	1,320	0,058	0,355	0,447
Carnet de vaccination montré	0,701	0,015	1 531	1 571	1,259	0,021	0,671	0,731
A reçu le vaccin du BCG	0,857	0,013	1 531	1 571	1,415	0,015	0,831	0,882
A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses)	0,702	0,016	1 531	1 571	1,306	0,022	0,671	0,733
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,837	0,013	1 531	1 571	1,363	0,015	0,811	0,863
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,630	0,016	1 531	1 571	1,299	0,026	0,597	0,663
A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses)	0,676	0,017	1 531	1 571	1,385	0,025	0,643	0,710
A reçu le vaccin anti-rougeoleux	0,657	0,017	1 531	1 571	1,347	0,025	0,624	0,690
A reçu tous les vaccins de base	0,543	0,017	1 531	1 571	1,320	0,032	0,509	0,578
Taille-pour-âge (-2ET)	0,352	0,008	7 579	7 787	1,307	0,022	0,336	0,368
Poids-pour-taille (-2ET)	0,049	0,003	7 974	8 165	1,071	0,056	0,043	0,054
Poids-pour-âge (-2ET)	0,181	0,006	7 614	7 821	1,192	0,032	0,169	0,193
Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois)	0,748	0,010	3 750	3 846	1,300	0,013	0,728	0,768
Prévalence du paludisme (TDR)	0,435	0,014	3 742	3 837	1,511	0,033	0,406	0,464
Prévalence du paludisme (Microscopie)	0,433	0,015	3 569	3 659	1,586	0,035	0,402	0,463
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,123	0,006	3 842	3 983	1,130	0,049	0,111	0,135
Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0	0,191	0,009	3 842	3 983	1,346	0,045	0,174	0,208
Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans)	0,579	0,011	4 526	4 685	1,475	0,019	0,557	0,600
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,015	0,002	8 883	9 167	1,252	0,107	0,012	0,018
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient	0,173	0,013	1 034	1 089	1,095	0,075	0,147	0,198
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,545	0,014	1 800	1 881	1,206	0,026	0,516	0,573
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,112	0,006	4 281	4 403	1,286	0,055	0,100	0,125
Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	0,785	0,011	3 844	3 960	1,719	0,015	0,762	0,808
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	0,277	0,011	2 990	3 128	1,291	0,038	0,256	0,298
A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment	0,112	0,008	2 990	3 128	1,357	0,070	0,096	0,127
A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire	0,237	0,012	2 558	2 499	1,383	0,049	0,213	0,260
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire	0,448	0,014	2 558	2 499	1,377	0,030	0,421	0,475
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois	0,342	0,014	2 558	2 499	1,452	0,040	0,315	0,370
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	6,062	0,098	24 761	25 549	1,415	0,016	5,865	6,259
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-4 ans)	31,438	2,419	8 116	8 313	1,124	0,077	26,600	36,275
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-4 ans)	27,327	2,150	8 093	8 285	1,076	0,079	23,026	31,628
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-4 ans)	58,765	3,412	8 140	8 336	1,133	0,058	51,941	65,588
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-4 ans)	49,969	2,893	7 997	8 183	1,104	0,058	44,182	55,755
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-4 ans)	105,797	4,367	8 290	8 487	1,134	0,041	97,062	114,531

À suivre...

Tableau B.6—Suite

Variable	Valeur (M)	Erreur- type (ET)	Effectif		Effet de plan de son- dage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pon- déré (N)'			M-2ET	M+2ET
HOMME								
Milieu urbain	0,000	0,000	3 726	3 849	na	na	0,000	0,000
Alphabétisé	0,461	0,015	3 726	3 849	1,783	0,032	0,431	0,490
Aucune instruction	0,440	0,014	3 726	3 849	1,764	0,033	0,412	0,469
Niveau secondaire ou plus	0,322	0,013	3 726	3 849	1,637	0,039	0,297	0,347
Jamais marié/jamais en union	0,411	0,010	3 726	3 849	1,243	0,024	0,391	0,431
Actuellement marié/en union	0,563	0,010	3 726	3 849	1,261	0,018	0,542	0,583
A eu des rapports sexuels avant 18 ans	0,397	0,014	2 840	2 930	1,492	0,035	0,370	0,425
Connaît une méthode contraceptive	0,974	0,006	2 102	2 167	1,717	0,006	0,962	0,986
Connaît une méthode moderne	0,972	0,006	2 102	2 167	1,689	0,006	0,959	0,984
Ne veut plus d'enfants	0,153	0,009	2 102	2 167	1,168	0,060	0,135	0,172
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,394	0,017	2 102	2 167	1,553	0,042	0,361	0,427
Nombre idéal d'enfants	7,733	0,161	3 528	3 642	1,711	0,021	7,412	8,054
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,209	0,009	3 726	3 849	1,276	0,041	0,192	0,226
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,036	0,004	3 726	3 849	1,362	0,115	0,028	0,045
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,556	0,019	1 313	1 361	1,375	0,034	0,519	0,594
Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient	0,223	0,017	1 028	1 083	1,289	0,075	0,190	0,257
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,047	0,004	3 726	3 849	1,262	0,093	0,039	0,056
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,758	0,012	3 323	3 420	1,585	0,016	0,735	0,782

Tableau B.7 Erreurs de sondage : Echantillon Alibori, EDSB-V Bénin 2017-2018

Variable	Valeur (M)	Erreur-type (ET)	Effectif		Effet de plan de sondage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pondéré (N)'			M-2ET	M+2ET
MÉNAGE								
Possession d'au moins une MII	0,871	0,017	1 089	1 192	1,676	0,020	0,837	0,905
Ayant accès à une MII	0,644	0,026	8 195	9 013	1,909	0,040	0,592	0,695
Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête	0,637	0,023	8 195	9 013	1,611	0,036	0,592	0,683
FEMME								
Milieu urbain	0,232	0,034	1 697	1 878	3,270	0,145	0,165	0,299
Alphabétisée	0,136	0,021	1 697	1 878	2,558	0,157	0,093	0,178
Aucune instruction	0,849	0,022	1 697	1 878	2,501	0,026	0,806	0,893
Niveau secondaire ou plus	0,097	0,017	1 697	1 878	2,391	0,177	0,063	0,131
Jamais mariée/jamais en union	0,155	0,012	1 697	1 878	1,322	0,075	0,132	0,179
Actuellement mariée/en union	0,825	0,013	1 697	1 878	1,442	0,016	0,799	0,852
Mariée/en union avant l'âge de 18 ans	0,524	0,017	1 353	1 499	1,221	0,032	0,491	0,557
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,718	0,017	1 353	1 499	1,420	0,024	0,684	0,753
Actuellement enceinte	0,113	0,007	1 697	1 878	0,934	0,064	0,099	0,127
Connait une méthode contraceptive	0,971	0,007	1 398	1 550	1,623	0,008	0,956	0,986
Connait une méthode moderne	0,970	0,007	1 398	1 550	1,602	0,008	0,956	0,985
Utilise actuellement une méthode	0,157	0,013	1 398	1 550	1,365	0,085	0,130	0,183
Utilise actuellement une méthode moderne	0,135	0,013	1 398	1 550	1,425	0,096	0,109	0,161
Utilise actuellement la pilule	0,011	0,003	1 398	1 550	1,247	0,317	0,004	0,018
Utilise actuellement le DIU	0,013	0,004	1 398	1 550	1,481	0,347	0,004	0,022
Utilise actuellement des condoms masculins	0,001	0,001	1 398	1 550	0,785	0,732	0,000	0,002
Utilise actuellement des injectables	0,033	0,006	1 398	1 550	1,247	0,180	0,021	0,045
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,000	0,000	1 398	1 550	na	na	0,000	0,000
Utilise actuellement le retrait	0,000	0,000	1 398	1 550	na	na	0,000	0,000
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,019	0,005	1 398	1 550	1,266	0,244	0,010	0,028
A utilisé une source du secteur public	0,841	0,026	225	244	1,069	0,031	0,789	0,893
Ne veut plus d'enfant	0,067	0,010	1 398	1 550	1,428	0,143	0,048	0,086
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,238	0,023	1 398	1 550	1,994	0,096	0,193	0,284
Nombre idéal d'enfants	5,153	0,219	1 597	1 761	2,273	0,043	4,715	5,591
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,564	0,031	1 099	1 226	2,067	0,055	0,502	0,625
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,477	0,036	1 637	1 831	2,364	0,076	0,405	0,550
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,123	0,012	1 534	1 718	1,399	0,097	0,099	0,147
Traités avec des SRO	0,186	0,042	192	212	1,476	0,228	0,101	0,271
Traitement médical recherché	0,173	0,036	192	212	1,329	0,210	0,100	0,246
Carnet de vaccination montré	0,706	0,034	285	320	1,237	0,048	0,638	0,774
A reçu le vaccin du BCG	0,831	0,033	285	320	1,487	0,040	0,765	0,897
A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses)	0,659	0,040	285	320	1,407	0,061	0,579	0,738
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,820	0,034	285	320	1,473	0,041	0,752	0,887
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,578	0,037	285	320	1,251	0,064	0,504	0,653
A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses)	0,552	0,048	285	320	1,612	0,087	0,456	0,649
A reçu le vaccin anti-rougeoleux	0,584	0,047	285	320	1,601	0,081	0,489	0,678
A reçu tous les vaccins de base	0,472	0,044	285	320	1,454	0,093	0,384	0,560
Taille-pour-âge (-2ET)	0,359	0,020	1 488	1 661	1,439	0,055	0,319	0,399
Poids-pour-taille (-2ET)	0,069	0,009	1 551	1 728	1,277	0,132	0,051	0,087
Poids-pour-âge (-2ET)	0,194	0,018	1 499	1 674	1,518	0,092	0,158	0,230
Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois)	0,750	0,025	709	787	1,496	0,034	0,700	0,801
Prévalence du paludisme (TDR)	0,360	0,039	707	785	1,814	0,108	0,282	0,438
Prévalence du paludisme (Microscopie)	0,370	0,036	661	737	1,674	0,097	0,298	0,442
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,100	0,016	686	770	1,386	0,158	0,068	0,131
Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0	0,251	0,030	686	770	1,802	0,118	0,192	0,311
Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans)	0,575	0,033	825	919	1,940	0,058	0,509	0,642
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,024	0,006	1 697	1 878	1,501	0,230	0,013	0,036
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient	0,319	0,034	171	183	0,959	0,107	0,250	0,387
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,503	0,042	251	275	1,330	0,084	0,418	0,587
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,082	0,018	861	947	1,963	0,224	0,046	0,119
Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	0,666	0,037	760	841	2,138	0,055	0,592	0,739
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	0,332	0,036	450	600	1,612	0,108	0,260	0,404
A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment	0,089	0,019	450	600	1,448	0,219	0,050	0,128
A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire	0,307	0,036	411	514	1,583	0,118	0,235	0,380
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire	0,375	0,032	411	514	1,344	0,086	0,311	0,440
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois	0,320	0,034	411	514	1,462	0,105	0,252	0,387
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	6,162	0,204	4 775	5 298	1,456	0,033	5,754	6,570
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-9 ans)	27,569	3,814	3 043	3 375	1,233	0,138	19,942	35,197
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-9 ans)	25,751	3,578	3 041	3 372	1,125	0,139	18,595	32,906
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-9 ans)	53,320	5,741	3 046	3 378	1,355	0,108	41,838	64,802
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-9 ans)	46,784	6,146	2 962	3 274	1,258	0,131	34,491	59,077
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-9 ans)	97,609	9,770	3 070	3 405	1,609	0,100	78,069	117,150

À suivre...

Tableau B.7—Suite

Variable	Valeur (M)	Erreur- type (ET)	Effectif		Effet de plan de son- dage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pon- déré (N) ^a			M-2ET	M+2ET
HOMME								
Milieu urbain	0,221	0,030	826	917	2,086	0,137	0,161	0,282
Alphabétisé	0,390	0,044	826	917	2,597	0,114	0,301	0,478
Aucune instruction	0,694	0,038	826	917	2,353	0,055	0,618	0,769
Niveau secondaire ou plus	0,199	0,031	826	917	2,239	0,157	0,137	0,262
Jamais marié/jamais en union	0,443	0,021	826	917	1,207	0,047	0,401	0,485
Actuellement marié/en union	0,539	0,020	826	917	1,164	0,037	0,498	0,579
A eu des rapports sexuels avant 18 ans	0,163	0,024	613	682	1,579	0,145	0,115	0,210
Connaît une méthode contraceptive	0,994	0,005	441	494	1,227	0,005	0,985	1,003
Connaît une méthode moderne	0,994	0,005	441	494	1,227	0,005	0,985	1,003
Ne veut plus d'enfants	0,031	0,009	441	494	1,074	0,284	0,014	0,049
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,161	0,046	441	494	2,620	0,287	0,068	0,253
Nombre idéal d'enfants	10,676	0,450	803	890	1,841	0,042	9,777	11,575
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,187	0,020	826	917	1,445	0,105	0,147	0,226
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,036	0,011	826	917	1,691	0,307	0,014	0,057
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,649	0,039	310	342	1,415	0,059	0,572	0,726
Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient	0,242	0,050	209	230	1,665	0,205	0,142	0,341
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,035	0,010	826	917	1,598	0,291	0,015	0,056
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,857	0,018	590	649	1,264	0,021	0,821	0,894

Tableau B.8 Erreurs de sondage : Echantillon Atacora, EDSB-V Bénin 2017-2018

Variable	Valeur (M)	Erreur-type (ET)	Effectif		Effet de plan de sondage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pondéré (N)'			M-2ET	M+2ET
MÉNAGE								
Possession d'au moins une MII	0,940	0,016	993	923	2,176	0,018	0,907	0,973
Ayant accès à une MII	0,817	0,019	6 883	6 371	1,998	0,023	0,780	0,854
Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête	0,676	0,027	6 883	6 371	2,050	0,039	0,623	0,730
FEMME								
Milieu urbain	0,338	0,037	1 392	1 302	2,943	0,111	0,263	0,412
Alphabétisée	0,250	0,033	1 392	1 302	2,824	0,132	0,184	0,316
Aucune instruction	0,667	0,035	1 392	1 302	2,730	0,052	0,598	0,736
Niveau secondaire ou plus	0,185	0,027	1 392	1 302	2,543	0,143	0,132	0,238
Jamais mariée/jamais en union	0,240	0,025	1 392	1 302	2,156	0,103	0,190	0,289
Actuellement mariée/en union	0,685	0,025	1 392	1 302	2,027	0,037	0,635	0,736
Mariée/en union avant l'âge de 18 ans	0,436	0,022	1 066	990	1,448	0,050	0,392	0,480
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,754	0,021	1 066	990	1,555	0,027	0,713	0,795
Actuellement enceinte	0,104	0,011	1 392	1 302	1,363	0,108	0,081	0,126
Connait une méthode contraceptive	0,967	0,011	973	892	1,857	0,011	0,946	0,989
Connait une méthode moderne	0,963	0,011	973	892	1,859	0,012	0,941	0,986
Utilise actuellement une méthode	0,108	0,017	973	892	1,694	0,157	0,074	0,141
Utilise actuellement une méthode moderne	0,100	0,016	973	892	1,713	0,165	0,067	0,133
Utilise actuellement la pilule	0,004	0,002	973	892	0,959	0,486	0,000	0,008
Utilise actuellement le DIU	0,005	0,003	973	892	1,192	0,554	0,000	0,010
Utilise actuellement des condoms masculins	0,011	0,004	973	892	1,315	0,404	0,002	0,019
Utilise actuellement des injectables	0,009	0,004	973	892	1,157	0,379	0,002	0,017
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,001	0,001	973	892	0,866	1,011	0,000	0,002
Utilise actuellement le retrait	0,002	0,001	973	892	1,004	0,718	0,000	0,005
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,002	0,002	973	892	1,058	0,719	0,000	0,005
A utilisé une source du secteur public	0,747	0,063	147	157	1,751	0,085	0,621	0,874
Ne veut plus d'enfant	0,183	0,014	973	892	1,167	0,079	0,154	0,212
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,478	0,024	973	892	1,466	0,049	0,431	0,525
Nombre idéal d'enfants	6,429	0,143	1 370	1 282	2,064	0,022	6,144	6,715
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,534	0,030	866	800	1,774	0,056	0,473	0,594
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,648	0,041	1 318	1 216	2,558	0,064	0,565	0,730
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,202	0,015	1 227	1 127	1,273	0,074	0,172	0,231
Traités avec des SRO	0,182	0,026	253	227	1,047	0,144	0,130	0,235
Traitement médical recherché	0,443	0,037	253	227	1,135	0,084	0,369	0,518
Carnet de vaccination montré	0,734	0,033	248	227	1,181	0,045	0,667	0,801
A reçu le vaccin du BCG	0,834	0,036	248	227	1,502	0,043	0,762	0,905
A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses)	0,784	0,042	248	227	1,577	0,053	0,701	0,868
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,813	0,034	248	227	1,356	0,042	0,745	0,881
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,784	0,042	248	227	1,577	0,053	0,701	0,868
A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses)	0,784	0,042	248	227	1,577	0,053	0,701	0,868
A reçu le vaccin anti-rougeoleux	0,719	0,040	248	227	1,375	0,055	0,639	0,798
A reçu tous les vaccins de base	0,705	0,040	248	227	1,377	0,057	0,624	0,786
Taille-pour-âge (-2ET)	0,364	0,023	1 242	1 149	1,495	0,062	0,319	0,409
Poids-pour-taille (-2ET)	0,047	0,008	1 294	1 194	1,209	0,166	0,031	0,062
Poids-pour-âge (-2ET)	0,188	0,017	1 248	1 154	1,358	0,088	0,155	0,222
Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois)	0,847	0,021	596	555	1,330	0,025	0,805	0,889
Prévalence du paludisme (TDR)	0,539	0,044	596	555	1,845	0,081	0,452	0,626
Prévalence du paludisme (Microscopie)	0,497	0,043	570	534	1,786	0,086	0,412	0,582
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,154	0,015	616	585	1,007	0,094	0,125	0,183
Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0	0,123	0,020	616	585	1,534	0,164	0,083	0,164
Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans)	0,674	0,020	718	681	1,127	0,029	0,635	0,714
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,053	0,010	1 392	1 302	1,710	0,194	0,032	0,073
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient	0,165	0,033	247	250	1,394	0,200	0,099	0,231
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,408	0,045	286	287	1,527	0,109	0,319	0,497
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,100	0,018	666	614	1,551	0,181	0,063	0,136
Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	0,666	0,036	621	577	1,896	0,054	0,594	0,738
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	0,296	0,025	419	455	1,142	0,086	0,245	0,347
A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment	0,106	0,022	419	455	1,478	0,210	0,061	0,151
A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire	0,273	0,027	344	346	1,116	0,098	0,219	0,327
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire	0,528	0,041	344	346	1,526	0,078	0,445	0,610
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois	0,428	0,041	344	346	1,547	0,097	0,345	0,511
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	6,711	0,326	3 860	3 602	1,825	0,049	6,058	7,364
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-9 ans)	27,118	3,490	2 451	2 252	1,002	0,129	20,138	34,098
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-9 ans)	36,226	3,926	2 438	2 238	0,966	0,108	28,374	44,079
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-9 ans)	63,344	6,066	2 457	2 258	1,090	0,096	51,212	75,476
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-9 ans)	62,681	5,270	2 394	2 199	0,924	0,084	52,142	73,221
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-9 ans)	122,055	6,962	2 481	2 280	0,898	0,057	108,131	135,979

À suivre...

Tableau B.8—Suite

Variable	Valeur (M)	Erreur- type (ET)	Effectif		Effet de plan de son- dage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pon- déré (N)'			M-2ET	M+2ET
HOMME								
Milieu urbain	0,340	0,038	604	560	1,951	0,111	0,265	0,416
Alphabétisé	0,423	0,045	604	560	2,229	0,106	0,333	0,513
Aucune instruction	0,474	0,048	604	560	2,342	0,101	0,378	0,569
Niveau secondaire ou plus	0,337	0,042	604	560	2,187	0,125	0,253	0,422
Jamais marié/jamais en union	0,430	0,032	604	560	1,593	0,075	0,366	0,495
Actuellement marié/en union	0,536	0,031	604	560	1,538	0,058	0,473	0,598
A eu des rapports sexuels avant 18 ans	0,328	0,036	478	444	1,649	0,108	0,257	0,399
Connaît une méthode contraceptive	0,993	0,005	335	300	1,153	0,005	0,982	1,003
Connaît une méthode moderne	0,993	0,005	335	300	1,153	0,005	0,982	1,003
Ne veut plus d'enfants	0,122	0,018	335	300	1,001	0,147	0,086	0,158
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,491	0,030	335	300	1,103	0,061	0,431	0,552
Nombre idéal d'enfants	7,188	0,320	566	521	1,849	0,045	6,548	7,828
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,217	0,032	604	560	1,925	0,149	0,152	0,282
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,023	0,008	604	560	1,248	0,334	0,007	0,038
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,552	0,051	205	196	1,460	0,092	0,450	0,654
Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient	0,105	0,029	216	219	1,365	0,273	0,048	0,162
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,089	0,023	604	560	1,982	0,259	0,043	0,135
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,727	0,031	592	550	1,708	0,043	0,665	0,790

Tableau B.9 Erreurs de sondage : Echantillon Atlantique, EDSB-V Bénin 2017-2018

Variable	Valeur (M)	Erreur-type (ET)	Effectif		Effet de plan de sondage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pondéré (N)'			M-2ET	M+2ET
MÉNAGE								
Possession d'au moins une MII	0,946	0,007	1 636	1 969	1,247	0,007	0,932	0,960
Ayant accès à une MII	0,851	0,009	7 282	8 655	1,326	0,011	0,833	0,870
Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête	0,787	0,014	7 282	8 655	1,522	0,018	0,758	0,816
FEMME								
Milieu urbain	0,451	0,030	1 702	2 037	2,504	0,067	0,391	0,512
Alphabétisée	0,440	0,026	1 702	2 037	2,135	0,058	0,389	0,492
Aucune instruction	0,407	0,022	1 702	2 037	1,860	0,054	0,363	0,451
Niveau secondaire ou plus	0,315	0,024	1 702	2 037	2,096	0,075	0,268	0,362
Jamais mariée/jamais en union	0,277	0,018	1 702	2 037	1,665	0,065	0,241	0,314
Actuellement mariée/en union	0,644	0,019	1 702	2 037	1,655	0,030	0,605	0,682
Mariée/en union avant l'âge de 18 ans	0,308	0,018	1 349	1 624	1,433	0,058	0,272	0,345
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,539	0,025	1 349	1 624	1,863	0,047	0,488	0,589
Actuellement enceinte	0,096	0,008	1 702	2 037	1,153	0,086	0,080	0,113
Connait une méthode contraceptive	0,988	0,005	1 100	1 311	1,401	0,005	0,979	0,997
Connait une méthode moderne	0,988	0,005	1 100	1 311	1,401	0,005	0,979	0,997
Utilise actuellement une méthode	0,214	0,021	1 100	1 311	1,664	0,096	0,172	0,255
Utilise actuellement une méthode moderne	0,137	0,017	1 100	1 311	1,640	0,124	0,103	0,172
Utilise actuellement la pilule	0,016	0,004	1 100	1 311	1,138	0,266	0,008	0,025
Utilise actuellement le DIU	0,026	0,006	1 100	1 311	1,191	0,219	0,015	0,038
Utilise actuellement des condoms masculins	0,022	0,006	1 100	1 311	1,428	0,290	0,009	0,034
Utilise actuellement des injectables	0,022	0,005	1 100	1 311	1,070	0,215	0,013	0,032
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,004	0,002	1 100	1 311	1,183	0,582	0,000	0,008
Utilise actuellement le retrait	0,036	0,007	1 100	1 311	1,186	0,186	0,022	0,049
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,038	0,008	1 100	1 311	1,432	0,217	0,022	0,055
A utilisé une source du secteur public	0,411	0,038	214	250	1,115	0,091	0,336	0,486
Ne veut plus d'enfant	0,360	0,018	1 100	1 311	1,224	0,049	0,325	0,396
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,303	0,017	1 100	1 311	1,219	0,056	0,269	0,337
Nombre idéal d'enfants	4,465	0,086	1 588	1 904	1,813	0,019	4,292	4,637
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,796	0,021	855	1 043	1,556	0,027	0,753	0,839
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,940	0,012	1 291	1 568	1,416	0,012	0,917	0,964
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,092	0,010	1 198	1 448	1,198	0,108	0,072	0,112
Traités avec des SRO	0,201	0,043	114	133	1,127	0,213	0,115	0,286
Traitement médical recherché	0,355	0,059	114	133	1,286	0,166	0,237	0,473
Carnet de vaccination montré	0,720	0,035	259	308	1,215	0,049	0,649	0,791
A reçu le vaccin du BCG	0,957	0,015	259	308	1,165	0,015	0,928	0,987
A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses)	0,793	0,033	259	308	1,273	0,042	0,726	0,859
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,954	0,016	259	308	1,188	0,016	0,923	0,985
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,684	0,041	259	308	1,375	0,060	0,601	0,766
A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses)	0,795	0,033	259	308	1,285	0,042	0,728	0,862
A reçu le vaccin anti-rougeoleux	0,737	0,032	259	308	1,117	0,043	0,673	0,800
A reçu tous les vaccins de base	0,599	0,041	259	308	1,310	0,069	0,516	0,681
Taille-pour-âge (-2ET)	0,301	0,019	1 187	1 426	1,292	0,062	0,263	0,338
Poids-pour-taille (-2ET)	0,041	0,006	1 227	1 473	1,048	0,150	0,029	0,054
Poids-pour-âge (-2ET)	0,168	0,012	1 188	1 427	1,010	0,070	0,144	0,191
Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois)	0,675	0,025	565	675	1,190	0,037	0,626	0,725
Prévalence du paludisme (TDR)	0,237	0,032	565	675	1,494	0,133	0,174	0,300
Prévalence du paludisme (Microscopie)	0,342	0,033	530	625	1,463	0,097	0,276	0,408
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,098	0,011	763	910	1,011	0,111	0,076	0,120
Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0	0,314	0,021	763	910	1,222	0,066	0,273	0,355
Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans)	0,602	0,022	865	1 030	1,314	0,036	0,558	0,646
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,011	0,003	1 702	2 037	1,117	0,253	0,006	0,017
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient	0,254	0,031	240	296	1,115	0,124	0,191	0,316
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,550	0,031	434	512	1,293	0,056	0,488	0,612
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,190	0,019	808	971	1,396	0,102	0,151	0,229
Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	0,752	0,020	769	931	1,291	0,027	0,711	0,792
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	0,307	0,023	627	694	1,259	0,076	0,260	0,353
A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment	0,113	0,014	627	694	1,133	0,127	0,084	0,142
A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire	0,231	0,023	514	517	1,244	0,100	0,185	0,277
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire	0,442	0,026	514	517	1,182	0,059	0,390	0,494
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois	0,288	0,025	514	517	1,256	0,087	0,238	0,338
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	4,919	0,227	4 766	5 710	1,419	0,046	4,465	5,373
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-9 ans)	42,529	5,859	2 493	3 021	1,309	0,138	30,811	54,248
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-9 ans)	23,223	3,082	2 486	3 018	0,945	0,133	17,059	29,386
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-9 ans)	65,752	6,429	2 495	3 026	1,183	0,098	52,894	78,610
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-9 ans)	45,565	4,386	2 455	2 975	0,926	0,096	36,793	54,337
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-9 ans)	108,321	7,609	2 510	3 046	1,105	0,070	93,102	123,540

À suivre...

Tableau B.9—Suite

Variable	Valeur (M)	Erreur- type (ET)	Effectif		Effet de plan de son- dage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pon- déré (N) ^a			M-2ET	M+2ET
HOMME								
Milieu urbain	0,477	0,033	681	822	1,742	0,070	0,410	0,544
Alphabétisé	0,655	0,034	681	822	1,847	0,052	0,587	0,722
Aucune instruction	0,157	0,019	681	822	1,350	0,120	0,119	0,195
Niveau secondaire ou plus	0,522	0,031	681	822	1,596	0,059	0,460	0,583
Jamais marié/jamais en union	0,429	0,024	681	822	1,273	0,056	0,380	0,477
Actuellement marié/en union	0,543	0,024	681	822	1,239	0,044	0,495	0,590
A eu des rapports sexuels avant 18 ans	0,526	0,025	523	638	1,126	0,047	0,477	0,575
Connaît une méthode contraceptive	0,989	0,006	363	446	1,149	0,006	0,977	1,002
Connaît une méthode moderne	0,987	0,007	363	446	1,098	0,007	0,973	1,000
Ne veut plus d'enfants	0,302	0,028	363	446	1,180	0,094	0,245	0,359
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,294	0,029	363	446	1,225	0,100	0,235	0,353
Nombre idéal d'enfants	5,624	0,217	663	803	1,265	0,039	5,190	6,059
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,285	0,023	681	822	1,330	0,081	0,239	0,331
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,017	0,005	681	822	1,040	0,302	0,007	0,028
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,550	0,033	244	280	1,036	0,060	0,484	0,616
Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient	0,366	0,035	257	312	1,167	0,096	0,296	0,437
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,076	0,012	681	822	1,140	0,153	0,053	0,099
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,653	0,030	642	779	1,575	0,045	0,594	0,712

Tableau B.10 Erreurs de sondage : Echantillon Borgou, EDSB-V Bénin 2017-2018

Variable	Valeur (M)	Erreur-type (ET)	Effectif		Effet de plan de sondage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pon-déré (N)'			M-2ET	M+2ET
MÉNAGE								
Possession d'au moins une MII	0,880	0,012	1 435	1 498	1,393	0,014	0,856	0,904
Ayant accès à une MII	0,685	0,016	8 862	9 195	1,604	0,023	0,654	0,717
Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête	0,677	0,015	8 862	9 195	1,380	0,022	0,647	0,707
FEMME								
Milieu urbain	0,450	0,025	1 765	1 839	2,125	0,056	0,400	0,500
Alphabétisée	0,308	0,030	1 765	1 839	2,687	0,096	0,248	0,367
Aucune instruction	0,654	0,032	1 765	1 839	2,816	0,049	0,590	0,718
Niveau secondaire ou plus	0,217	0,026	1 765	1 839	2,678	0,121	0,164	0,270
Jamais mariée/jamais en union	0,219	0,018	1 765	1 839	1,860	0,084	0,182	0,255
Actuellement mariée/en union	0,751	0,021	1 765	1 839	2,022	0,028	0,709	0,793
Mariée/en union avant l'âge de 18 ans	0,457	0,024	1 400	1 448	1,814	0,053	0,408	0,505
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,705	0,017	1 400	1 448	1,376	0,024	0,671	0,738
Actuellement enceinte	0,134	0,008	1 765	1 839	0,928	0,056	0,119	0,149
Connait une méthode contraceptive	0,884	0,018	1 348	1 381	2,013	0,020	0,849	0,919
Connait une méthode moderne	0,877	0,018	1 348	1 381	2,037	0,021	0,841	0,913
Utilise actuellement une méthode	0,128	0,011	1 348	1 381	1,181	0,084	0,107	0,150
Utilise actuellement une méthode moderne	0,120	0,010	1 348	1 381	1,096	0,081	0,101	0,140
Utilise actuellement la pilule	0,011	0,003	1 348	1 381	1,213	0,317	0,004	0,018
Utilise actuellement le DIU	0,009	0,003	1 348	1 381	1,164	0,329	0,003	0,015
Utilise actuellement des condoms masculins	0,002	0,001	1 348	1 381	1,010	0,571	0,000	0,005
Utilise actuellement des injectables	0,029	0,005	1 348	1 381	1,119	0,176	0,019	0,040
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,000	0,000	1 348	1 381	na	na	0,000	0,000
Utilise actuellement le retrait	0,000	0,000	1 348	1 381	na	na	0,000	0,000
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,005	0,002	1 348	1 381	1,007	0,380	0,001	0,009
A utilisé une source du secteur public	0,732	0,048	201	222	1514	0,065	0,637	0,827
Ne veut plus d'enfant	0,189	0,014	1 348	1 381	1,271	0,072	0,162	0,216
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,368	0,021	1 348	1 381	1,623	0,058	0,325	0,410
Nombre idéal d'enfants	6,266	0,212	1 627	1 698	3,213	0,034	5,842	6,689
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,549	0,033	1 133	1 164	2,223	0,060	0,483	0,615
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,599	0,040	1 752	1 784	2,701	0,066	0,519	0,679
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,067	0,008	1 643	1 678	1,225	0,115	0,052	0,083
Traités avec des SRO	0,263	0,040	110	113	0,916	0,151	0,183	0,342
Traitement médical recherché	0,566	0,056	110	113	1,162	0,099	0,454	0,678
Carnet de vaccination montré	0,586	0,040	348	346	1,481	0,069	0,506	0,667
A reçu le vaccin du BCG	0,730	0,038	348	346	1,572	0,052	0,654	0,807
A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses)	0,540	0,036	348	346	1,309	0,067	0,468	0,612
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,718	0,036	348	346	1,451	0,050	0,647	0,790
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,501	0,036	348	346	1,293	0,071	0,429	0,572
A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses)	0,535	0,036	348	346	1,302	0,067	0,463	0,607
A reçu le vaccin anti-rougeoleux	0,542	0,038	348	346	1,372	0,070	0,467	0,618
A reçu tous les vaccins de base	0,407	0,033	348	346	1,229	0,082	0,340	0,474
Taille-pour-âge (-2ET)	0,342	0,019	1 558	1 618	1,432	0,055	0,304	0,379
Poids-pour-taille (-2ET)	0,051	0,006	1 765	1 811	1,224	0,125	0,038	0,064
Poids-pour-âge (-2ET)	0,183	0,017	1 562	1 621	1,558	0,091	0,150	0,217
Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois)	0,744	0,022	803	818	1,357	0,029	0,700	0,788
Prévalence du paludisme (TDR)	0,513	0,037	801	817	1,712	0,072	0,440	0,587
Prévalence du paludisme (Microscopie)	0,449	0,039	771	785	1,815	0,088	0,371	0,528
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,119	0,015	740	783	1,273	0,126	0,089	0,149
Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0	0,199	0,023	740	783	1,607	0,118	0,153	0,246
Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans)	0,511	0,023	882	924	1,378	0,045	0,465	0,558
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,012	0,003	1 765	1 839	1,042	0,226	0,007	0,017
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient	0,202	0,033	209	228	1,191	0,164	0,135	0,268
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,474	0,035	344	374	1,288	0,073	0,404	0,543
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,101	0,014	858	890	1,397	0,143	0,072	0,130
Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	0,845	0,022	618	639	1,526	0,026	0,801	0,890
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	0,211	0,024	538	631	1,341	0,112	0,164	0,259
A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment	0,111	0,019	538	631	1,378	0,168	0,074	0,149
A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire	0,209	0,025	441	465	1,310	0,121	0,158	0,260
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire	0,419	0,034	441	465	1,427	0,080	0,352	0,486
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois	0,294	0,030	441	465	1,359	0,100	0,235	0,353
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	6,232	0,305	4 946	5 144	1,892	0,049	5,623	6,842
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-9 ans)	30,624	3,497	3 226	3 255	0,975	0,114	23,629	37,619
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-9 ans)	20,886	3,201	3 219	3 246	1,046	0,153	14,484	27,287
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-9 ans)	51,510	3,921	3 231	3 260	0,841	0,076	43,667	59,352
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-9 ans)	37,113	4,740	3 127	3 145	1,087	0,128	27,634	46,592
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-9 ans)	86,711	7,185	3 249	3 280	1,132	0,083	72,341	101,081

À suivre...

Tableau B.10—Suite

Variable	Valeur (M)	Erreur- type (ET)	Effectif		Effet de plan de son- dage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pon- déré (N)'			M-2ET	M+2ET
HOMME								
Milieu urbain	0,465	0,025	798	823	1,419	0,054	0,415	0,515
Alphabétisé	0,418	0,035	798	823	2,025	0,085	0,347	0,489
Aucune instruction	0,489	0,039	798	823	2,182	0,079	0,411	0,566
Niveau secondaire ou plus	0,333	0,032	798	823	1,940	0,097	0,268	0,398
Jamais marié/jamais en union	0,382	0,023	798	823	1,342	0,060	0,336	0,429
Actuellement marié/en union	0,599	0,024	798	823	1,390	0,040	0,550	0,647
A eu des rapports sexuels avant 18 ans	0,299	0,032	642	659	1,759	0,107	0,235	0,362
Connaît une méthode contraceptive	0,996	0,003	483	493	0,917	0,003	0,991	1,001
Connaît une méthode moderne	0,990	0,005	483	493	1,212	0,005	0,979	1,001
Ne veut plus d'enfants	0,124	0,018	483	493	1,201	0,146	0,088	0,160
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,518	0,027	483	493	1,202	0,053	0,463	0,573
Nombre idéal d'enfants	8,487	0,458	745	770	1,985	0,054	7,571	9,402
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,137	0,017	798	823	1,395	0,124	0,103	0,171
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,048	0,012	798	823	1,560	0,247	0,024	0,071
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,559	0,038	244	253	1,203	0,069	0,483	0,636
Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient	0,441	0,066	162	171	1,679	0,150	0,309	0,574
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,038	0,008	798	823	1,171	0,208	0,022	0,054
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,741	0,028	782	810	1,755	0,037	0,686	0,796

Tableau B.11 Erreurs de sondage : Echantillon Collines, EDSB-V Bénin 2017-2018

Variable	Valeur (M)	Erreur-type (ET)	Effectif		Effet de plan de sondage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pondéré (N)'			M-2ET	M+2ET
MÉNAGE								
Possession d'au moins une MII	0,963	0,005	1 183	981	0,941	0,005	0,953	0,973
Ayant accès à une MII	0,830	0,011	5 793	4 758	1,211	0,014	0,807	0,853
Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête	0,681	0,020	5 793	4 758	1,579	0,030	0,641	0,721
FEMME								
Milieu urbain	0,228	0,023	1 403	1 151	2,039	0,100	0,182	0,274
Alphabétisée	0,375	0,025	1 403	1 151	1,931	0,067	0,325	0,425
Aucune instruction	0,489	0,027	1 403	1 151	2,034	0,056	0,434	0,543
Niveau secondaire ou plus	0,279	0,022	1 403	1 151	1,829	0,079	0,235	0,322
Jamais mariée/jamais en union	0,289	0,023	1 403	1 151	1,897	0,080	0,243	0,335
Actuellement mariée/en union	0,641	0,026	1 403	1 151	2,025	0,041	0,589	0,693
Mariée/en union avant l'âge de 18 ans	0,397	0,024	1 034	846	1,558	0,060	0,349	0,444
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,730	0,016	1 034	846	1,122	0,021	0,699	0,761
Actuellement enceinte	0,113	0,010	1 403	1 151	1,153	0,086	0,094	0,133
Connait une méthode contraceptive	0,976	0,008	900	738	1,571	0,008	0,960	0,992
Connait une méthode moderne	0,971	0,008	900	738	1,429	0,008	0,955	0,987
Utilise actuellement une méthode	0,207	0,021	900	738	1,574	0,103	0,164	0,250
Utilise actuellement une méthode moderne	0,181	0,021	900	738	1,604	0,114	0,140	0,223
Utilise actuellement la pilule	0,029	0,008	900	738	1,432	0,276	0,013	0,045
Utilise actuellement le DIU	0,007	0,004	900	738	1,295	0,527	0,000	0,014
Utilise actuellement des condoms masculins	0,016	0,005	900	738	1,106	0,291	0,007	0,025
Utilise actuellement des injectables	0,036	0,007	900	738	1,166	0,202	0,021	0,050
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,002	0,001	900	738	0,812	0,542	0,000	0,005
Utilise actuellement le retrait	0,025	0,006	900	738	1,141	0,238	0,013	0,037
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,000	0,000	900	738	na	na	0,000	0,000
A utilisé une source du secteur public	0,656	0,044	221	174	1,384	0,068	0,568	0,745
Ne veut plus d'enfant	0,370	0,021	900	738	1,276	0,056	0,329	0,411
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,393	0,024	900	738	1,454	0,060	0,345	0,440
Nombre idéal d'enfants	4,750	0,070	1 358	1 114	1,471	0,015	4,610	4,889
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,722	0,028	731	604	1,698	0,039	0,666	0,778
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,935	0,021	1 059	869	2,258	0,022	0,894	0,977
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,089	0,010	993	814	1,070	0,111	0,069	0,109
Traités avec des SRO	0,333	0,053	85	72	1,025	0,159	0,227	0,439
Traitement médical recherché	0,621	0,058	85	72	1,087	0,094	0,504	0,738
Carnet de vaccination montré	0,786	0,032	186	156	1,070	0,041	0,721	0,851
A reçu le vaccin du BCG	0,981	0,015	186	156	1,501	0,015	0,951	1,011
A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses)	0,869	0,041	186	156	1,700	0,048	0,786	0,952
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,887	0,029	186	156	1,260	0,033	0,829	0,945
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,796	0,039	186	156	1,353	0,050	0,717	0,875
A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses)	0,876	0,038	186	156	1,592	0,043	0,800	0,952
A reçu le vaccin anti-rougeoleux	0,814	0,036	186	156	1,284	0,044	0,742	0,886
A reçu tous les vaccins de base	0,682	0,047	186	156	1,399	0,069	0,587	0,776
Taille-pour-âge (-2ET)	0,237	0,018	1 012	835	1,235	0,076	0,201	0,273
Poids-pour-taille (-2ET)	0,036	0,008	1 030	849	1,230	0,225	0,020	0,053
Poids-pour-âge (-2ET)	0,100	0,011	1 015	837	1,040	0,107	0,079	0,122
Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois)	0,662	0,029	472	385	1,218	0,044	0,603	0,720
Prévalence du paludisme (TDR)	0,416	0,033	469	383	1,382	0,080	0,349	0,483
Prévalence du paludisme (Microscopie)	0,423	0,037	450	366	1,417	0,088	0,349	0,498
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,083	0,015	589	482	1,332	0,183	0,053	0,114
Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0	0,241	0,025	589	482	1,416	0,104	0,191	0,291
Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans)	0,395	0,025	683	560	1,353	0,064	0,345	0,446
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,011	0,004	1 403	1 151	1,513	0,388	0,002	0,019
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient	0,153	0,021	272	219	0,937	0,134	0,112	0,194
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,410	0,027	388	317	1,095	0,067	0,356	0,465
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,152	0,018	716	588	1,326	0,117	0,116	0,187
Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	0,800	0,024	701	576	1,590	0,030	0,751	0,848
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	0,292	0,029	452	375	1,369	0,100	0,233	0,351
A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment	0,134	0,020	452	375	1,266	0,152	0,093	0,174
A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire	0,253	0,025	370	289	1,105	0,099	0,203	0,303
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire	0,435	0,035	370	289	1,371	0,081	0,364	0,505
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois	0,357	0,036	370	289	1,446	0,101	0,285	0,429
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	5,355	0,283	3 792	3 104	1,508	0,053	4,788	5,922
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-9 ans)	37,269	6,434	1 968	1 599	1,361	0,173	24,400	50,137
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-9 ans)	28,313	4,566	1 965	1 593	1,067	0,161	19,180	37,446
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-9 ans)	65,582	7,874	1 970	1 601	1,192	0,120	49,834	81,329
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-9 ans)	40,366	5,191	1 903	1 539	0,970	0,129	29,985	50,747
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-9 ans)	103,300	7,970	1 991	1 616	0,996	0,077	87,359	119,241

À suivre...

Tableau B.11—Suite

Variable	Valeur (M)	Erreur- type (ET)	Effectif		Effet de plan de son- dage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pon- déré (N) ^a			M-2ET	M+2ET
HOMME								
Milieu urbain	0,224	0,017	554	448	0,932	0,074	0,191	0,257
Alphabétisé	0,555	0,032	554	448	1,506	0,057	0,491	0,619
Aucune instruction	0,297	0,029	554	448	1,465	0,096	0,240	0,354
Niveau secondaire ou plus	0,452	0,030	554	448	1,419	0,066	0,392	0,512
Jamais marié/jamais en union	0,437	0,028	554	448	1,309	0,063	0,382	0,492
Actuellement marié/en union	0,534	0,026	554	448	1,247	0,050	0,481	0,587
A eu des rapports sexuels avant 18 ans	0,337	0,030	403	332	1,289	0,090	0,276	0,398
Connaît une méthode contraceptive	0,967	0,013	288	239	1,268	0,014	0,940	0,994
Connaît une méthode moderne	0,967	0,013	288	239	1,268	0,014	0,940	0,994
Ne veut plus d'enfants	0,211	0,027	288	239	1,140	0,130	0,156	0,266
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,650	0,029	288	239	1,017	0,044	0,593	0,708
Nombre idéal d'enfants	5,956	0,218	554	448	1,399	0,037	5,520	6,392
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,233	0,028	554	448	1,560	0,121	0,177	0,289
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,040	0,014	554	448	1,707	0,357	0,011	0,068
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,509	0,036	213	164	1,047	0,071	0,437	0,581
Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient	0,252	0,035	198	159	1,140	0,140	0,181	0,322
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,036	0,010	554	448	1,308	0,289	0,015	0,056
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,802	0,029	499	402	1,621	0,036	0,744	0,860

Tableau B.12 Erreurs de sondage : Echantillon Couffo, EDSB-V Bénin 2017-2018

Variable	Valeur (M)	Erreur-type (ET)	Effectif		Effet de plan de sondage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pon-déré (N)'			M-2ET	M+2ET
MÉNAGE								
Possession d'au moins une MII	0,954	0,009	1 070	1 108	1,432	0,010	0,936	0,973
Ayant accès à une MII	0,804	0,014	4 970	5 071	1,339	0,017	0,777	0,831
Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête	0,708	0,017	4 970	5 071	1,337	0,024	0,674	0,743
FEMME								
Milieu urbain	0,290	0,025	1 012	1 041	1,746	0,086	0,240	0,340
Alphabétisée	0,301	0,028	1 012	1 041	1,921	0,092	0,245	0,356
Aucune instruction	0,538	0,028	1 012	1 041	1,810	0,053	0,481	0,595
Niveau secondaire ou plus	0,222	0,028	1 012	1 041	2,124	0,125	0,167	0,278
Jamais mariée/jamais en union	0,249	0,022	1 012	1 041	1,613	0,088	0,205	0,293
Actuellement mariée/en union	0,713	0,022	1 012	1 041	1,529	0,030	0,670	0,757
Mariée/en union avant l'âge de 18 ans	0,290	0,020	802	821	1,277	0,071	0,249	0,331
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,406	0,022	802	821	1,286	0,055	0,362	0,451
Actuellement enceinte	0,117	0,010	1 012	1 041	1,032	0,089	0,096	0,138
Connait une méthode contraceptive	0,983	0,006	728	743	1,230	0,006	0,972	0,995
Connait une méthode moderne	0,983	0,006	728	743	1,230	0,006	0,972	0,995
Utilise actuellement une méthode	0,062	0,011	728	743	1,278	0,184	0,039	0,085
Utilise actuellement une méthode moderne	0,045	0,009	728	743	1,190	0,205	0,026	0,063
Utilise actuellement la pilule	0,010	0,004	728	743	1,215	0,459	0,001	0,018
Utilise actuellement le DIU	0,000	0,000	728	743	na	na	0,000	0,000
Utilise actuellement des condoms masculins	0,007	0,003	728	743	1,043	0,449	0,001	0,014
Utilise actuellement des injectables	0,012	0,004	728	743	0,991	0,331	0,004	0,020
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,002	0,002	728	743	1,135	0,998	0,000	0,005
Utilise actuellement le retrait	0,006	0,003	728	743	0,969	0,447	0,001	0,012
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,011	0,004	728	743	0,960	0,336	0,004	0,019
A utilisé une source du secteur public	0,583	0,075	40	43	0,949	0,128	0,433	0,733
Ne veut plus d'enfant	0,202	0,017	728	743	1,124	0,083	0,168	0,235
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,452	0,020	728	743	1,069	0,044	0,412	0,491
Nombre idéal d'enfants	6,164	0,123	964	992	1,732	0,020	5,919	6,410
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,796	0,023	572	583	1,383	0,029	0,749	0,843
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,800	0,027	888	902	1,707	0,034	0,746	0,854
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,093	0,012	831	844	1,184	0,129	0,069	0,116
Traités avec des SRO	0,170	0,035	77	78	0,823	0,208	0,099	0,241
Traitement médical recherché	0,345	0,068	77	78	1,242	0,197	0,209	0,481
Carnet de vaccination montré	0,660	0,039	162	171	1,059	0,059	0,582	0,738
A reçu le vaccin du BCG	0,857	0,035	162	171	1,281	0,040	0,788	0,927
A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses)	0,592	0,052	162	171	1,350	0,088	0,488	0,696
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,807	0,037	162	171	1,204	0,046	0,733	0,881
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,507	0,040	162	171	1,020	0,079	0,427	0,587
A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses)	0,541	0,051	162	171	1,313	0,095	0,439	0,644
A reçu le vaccin anti-rougeoleux	0,564	0,050	162	171	1,299	0,089	0,464	0,665
A reçu tous les vaccins de base	0,401	0,039	162	171	1,013	0,098	0,322	0,479
Taille-pour-âge (-2ET)	0,380	0,020	876	893	1,135	0,054	0,339	0,420
Poids-pour-taille (-2ET)	0,034	0,007	916	935	1,105	0,207	0,020	0,048
Poids-pour-âge (-2ET)	0,147	0,014	884	901	1,063	0,092	0,120	0,174
Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois)	0,768	0,023	441	445	1,110	0,030	0,721	0,814
Prévalence du paludisme (TDR)	0,543	0,037	441	445	1,378	0,067	0,470	0,617
Prévalence du paludisme (Microscopie)	0,513	0,039	420	425	1,357	0,077	0,435	0,592
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,093	0,014	431	433	1,002	0,153	0,064	0,121
Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0	0,178	0,025	431	433	1,344	0,141	0,128	0,228
Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans)	0,613	0,024	507	514	1,087	0,039	0,566	0,661
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,001	0,001	1 012	1 041	0,875	1,002	0,000	0,002
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient	0,307	0,053	62	67	0,893	0,171	0,202	0,413
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,722	0,035	237	250	1,200	0,048	0,652	0,792
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,140	0,021	493	515	1,335	0,149	0,098	0,181
Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	0,846	0,024	483	505	1,436	0,028	0,799	0,894
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	0,280	0,028	398	349	1,253	0,101	0,224	0,337
A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment	0,125	0,021	398	349	1,280	0,170	0,082	0,167
A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire	0,204	0,027	332	265	1,205	0,131	0,151	0,258
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire	0,370	0,025	332	265	0,938	0,067	0,320	0,419
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois	0,327	0,027	332	265	1,046	0,082	0,273	0,381
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	5,871	0,232	2 802	2 883	1,203	0,040	5,407	6,335
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-9 ans)	30,075	4,205	1 685	1 706	0,832	0,140	21,665	38,485
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-9 ans)	32,009	3,612	1 687	1 708	0,770	0,113	24,785	39,233
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-9 ans)	62,084	6,302	1 688	1 709	0,947	0,102	49,481	74,688
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-9 ans)	53,660	6,744	1 633	1 650	1,043	0,126	40,173	67,148
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-9 ans)	112,413	9,096	1 710	1 732	1,044	0,081	94,221	130,605

À suivre...

Tableau B.12—Suite

Variable	Valeur (M)	Erreur- type (ET)	Effectif		Effet de plan de son- dage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pon- déré (N)*			M-2ET	M+2ET
HOMME								
Milieu urbain	0,327	0,038	398	409	1,606	0,116	0,251	0,403
Alphabétisé	0,627	0,029	398	409	1,195	0,046	0,569	0,685
Aucune instruction	0,268	0,022	398	409	0,997	0,083	0,224	0,312
Niveau secondaire ou plus	0,415	0,028	398	409	1,115	0,066	0,360	0,471
Jamais marié/jamais en union	0,440	0,028	398	409	1,134	0,064	0,383	0,497
Actuellement marié/en union	0,543	0,031	398	409	1,232	0,057	0,482	0,605
A eu des rapports sexuels avant 18 ans	0,560	0,032	286	301	1,089	0,057	0,496	0,624
Connaît une méthode contraceptive	1,000	0,000	213	222	na	0,000	1,000	1,000
Connaît une méthode moderne	1,000	0,000	213	222	na	0,000	1,000	1,000
Ne veut plus d'enfants	0,152	0,025	213	222	1,024	0,166	0,102	0,203
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,426	0,041	213	222	1,197	0,096	0,345	0,507
Nombre idéal d'enfants	8,780	0,478	377	385	1,411	0,054	7,823	9,736
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,284	0,021	398	409	0,921	0,073	0,242	0,326
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,034	0,011	398	409	1,171	0,312	0,013	0,056
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,445	0,044	159	159	1,107	0,098	0,358	0,533
Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient	0,326	0,043	106	113	0,944	0,132	0,240	0,412
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,076	0,017	398	409	1,239	0,217	0,043	0,109
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,719	0,033	395	406	1,459	0,046	0,653	0,785

Tableau B.13 Erreurs de sondage : Echantillon Donga, EDSB-V Bénin 2017-2018

Variable	Valeur (M)	Erreur-type (ET)	Effectif		Effet de plan de sondage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pondéré (N)'			M-2ET	M+2ET
MÉNAGE								
Possession d'au moins une MII	0,949	0,009	816	740	1,185	0,010	0,930	0,967
Ayant accès à une MII	0,827	0,017	5 314	4 840	1,509	0,020	0,794	0,860
Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête	0,633	0,026	5 314	4 840	1,597	0,041	0,581	0,685
FEMME								
Milieu urbain	0,440	0,037	964	881	2,322	0,085	0,366	0,514
Alphabétisée	0,267	0,029	964	881	2,019	0,108	0,209	0,325
Aucune instruction	0,605	0,035	964	881	2,199	0,057	0,536	0,674
Niveau secondaire ou plus	0,186	0,028	964	881	2,232	0,151	0,130	0,242
Jamais mariée/jamais en union	0,171	0,019	964	881	1,566	0,111	0,133	0,209
Actuellement mariée/en union	0,813	0,020	964	881	1,556	0,024	0,773	0,852
Mariée/en union avant l'âge de 18 ans	0,309	0,024	807	733	1,501	0,079	0,260	0,358
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,567	0,027	807	733	1,544	0,048	0,513	0,621
Actuellement enceinte	0,137	0,010	964	881	0,878	0,071	0,117	0,156
Connait une méthode contraceptive	0,927	0,015	792	716	1,628	0,016	0,897	0,957
Connait une méthode moderne	0,926	0,015	792	716	1,634	0,016	0,895	0,956
Utilise actuellement une méthode	0,062	0,014	792	716	1,613	0,224	0,034	0,089
Utilise actuellement une méthode moderne	0,059	0,013	792	716	1,574	0,224	0,033	0,085
Utilise actuellement la pilule	0,006	0,002	792	716	0,878	0,416	0,001	0,010
Utilise actuellement le DIU	0,004	0,002	792	716	0,939	0,498	0,000	0,009
Utilise actuellement des condoms masculins	0,005	0,003	792	716	1,143	0,583	0,000	0,010
Utilise actuellement des injectables	0,015	0,006	792	716	1,347	0,385	0,003	0,027
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,000	0,000	792	716	na	na	0,000	0,000
Utilise actuellement le retrait	0,001	0,001	792	716	0,699	1,020	0,000	0,002
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,001	0,001	792	716	0,920	1,015	0,000	0,003
A utilisé une source du secteur public	0,844	0,065	59	46	1,359	0,077	0,714	0,975
Ne veut plus d'enfant	0,127	0,015	792	716	1,294	0,121	0,096	0,157
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,412	0,017	792	716	0,956	0,041	0,379	0,445
Nombre idéal d'enfants	5,955	0,142	795	731	1,701	0,024	5,672	6,238
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,741	0,034	660	599	2,017	0,046	0,672	0,810
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,785	0,045	1 021	926	2,823	0,058	0,695	0,876
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,141	0,018	917	831	1,562	0,127	0,105	0,176
Traités avec des SRO	0,284	0,053	122	117	1,248	0,185	0,179	0,389
Traitement médical recherché	0,680	0,055	122	117	1,324	0,081	0,570	0,789
Carnet de vaccination montré	0,687	0,042	184	160	1,185	0,061	0,604	0,771
A reçu le vaccin du BCG	0,896	0,040	184	160	1,675	0,045	0,816	0,976
A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses)	0,775	0,049	184	160	1,527	0,063	0,678	0,873
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,884	0,040	184	160	1,590	0,045	0,805	0,964
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,703	0,050	184	160	1,433	0,071	0,603	0,803
A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses)	0,775	0,049	184	160	1,527	0,063	0,678	0,873
A reçu le vaccin anti-rougeoleux	0,708	0,055	184	160	1,598	0,078	0,597	0,819
A reçu tous les vaccins de base	0,619	0,055	184	160	1,486	0,089	0,509	0,729
Taille-pour-âge (-2ET)	0,272	0,026	963	871	1,541	0,094	0,221	0,323
Poids-pour-taille (-2ET)	0,064	0,010	986	889	1,230	0,153	0,045	0,084
Poids-pour-âge (-2ET)	0,143	0,015	967	875	1,111	0,102	0,114	0,172
Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois)	0,758	0,026	452	403	1,273	0,034	0,707	0,809
Prévalence du paludisme (TDR)	0,402	0,052	452	403	1,824	0,128	0,299	0,505
Prévalence du paludisme (Microscopie)	0,469	0,047	431	383	1,703	0,101	0,375	0,564
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,056	0,011	411	375	0,947	0,192	0,035	0,078
Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0	0,299	0,026	411	375	1,154	0,087	0,247	0,352
Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans)	0,500	0,027	507	462	1,232	0,055	0,445	0,555
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,005	0,002	964	881	1,049	0,486	0,000	0,010
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient	0,226	0,070	73	69	1,415	0,311	0,086	0,367
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,533	0,059	147	143	1,416	0,110	0,415	0,650
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,202	0,027	451	413	1,400	0,131	0,149	0,255
Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	0,693	0,044	408	374	1,912	0,063	0,606	0,781
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	0,199	0,025	312	310	1,124	0,128	0,148	0,249
A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment	0,039	0,012	312	310	1,115	0,315	0,014	0,063
A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire	0,201	0,033	280	262	1,363	0,163	0,136	0,267
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire	0,424	0,048	280	262	1,630	0,114	0,328	0,521
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois	0,294	0,046	280	262	1,689	0,157	0,202	0,387
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	6,806	0,292	2 758	2 514	1,333	0,043	6,222	7,391
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-9 ans)	44,714	7,646	1 788	1 609	1,313	0,171	29,421	60,007
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-9 ans)	40,297	6,847	1 778	1 596	1,305	0,170	26,602	53,991
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-9 ans)	85,010	12,357	1 789	1 610	1,581	0,145	60,296	109,725
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-9 ans)	48,304	6,674	1 678	1 496	0,968	0,138	34,956	61,653
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-9 ans)	129,208	13,520	1 803	1 622	1,377	0,105	102,168	156,248

À suivre...

Tableau B.13—Suite

Variable	Valeur (M)	Erreur- type (ET)	Effectif		Effet de plan de son- dage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pon- déré (N) ^a			M-2ET	M+2ET
HOMME								
Milieu urbain	0,443	0,046	480	445	2,027	0,104	0,350	0,535
Alphabétisé	0,472	0,042	480	445	1,857	0,090	0,387	0,557
Aucune instruction	0,391	0,033	480	445	1,467	0,084	0,326	0,457
Niveau secondaire ou plus	0,322	0,040	480	445	1,874	0,125	0,242	0,402
Jamais marié/jamais en union	0,434	0,036	480	445	1,577	0,082	0,363	0,506
Actuellement marié/en union	0,552	0,034	480	445	1,515	0,062	0,484	0,621
A eu des rapports sexuels avant 18 ans	0,167	0,028	360	331	1,404	0,166	0,112	0,223
Connaît une méthode contraceptive	0,989	0,006	271	246	0,966	0,006	0,977	1,001
Connaît une méthode moderne	0,989	0,006	271	246	0,966	0,006	0,977	1,001
Ne veut plus d'enfants	0,091	0,018	271	246	1,030	0,198	0,055	0,127
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,406	0,053	271	246	1,754	0,130	0,300	0,511
Nombre idéal d'enfants	7,042	0,244	468	434	1,377	0,035	6,553	7,531
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,091	0,016	480	445	1,206	0,175	0,059	0,122
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,023	0,007	480	445	1,042	0,314	0,008	0,037
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,666	0,031	165	158	0,837	0,046	0,604	0,727
Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient	0,146	0,038	104	99	1,085	0,258	0,071	0,222
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,128	0,029	480	445	1,898	0,227	0,070	0,186
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,644	0,031	457	424	1,360	0,047	0,583	0,705

Tableau B.14 Erreurs de sondage : Echantillon Littoral, EDSB-V Bénin 2017-2018

Variable	Valeur (M)	Erreur-type (ET)	Effectif		Effet de plan de sondage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pondéré (N)'			M-2ET	M+2ET
MÉNAGE								
Possession d'au moins une MII	0,917	0,011	1 294	852	1,377	0,012	0,896	0,938
Ayant accès à une MII	0,833	0,014	5 596	3 687	1,627	0,017	0,805	0,861
Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête	0,807	0,014	5 596	3 687	1,443	0,018	0,778	0,836
FEMME								
Milieu urbain	1,000	0,000	1 415	958	na	0,000	1,000	1,000
Alphabétisée	0,670	0,021	1 415	958	1,643	0,031	0,629	0,711
Aucune instruction	0,228	0,015	1 415	958	1,344	0,066	0,198	0,258
Niveau secondaire ou plus	0,499	0,018	1 415	958	1,374	0,037	0,463	0,536
Jamais mariée/jamais en union	0,338	0,015	1 415	958	1,215	0,045	0,307	0,368
Actuellement mariée/en union	0,575	0,015	1 415	958	1,153	0,026	0,545	0,605
Mariée/en union avant l'âge de 18 ans	0,168	0,013	1 128	766	1,191	0,079	0,142	0,195
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,431	0,025	1 128	766	1,717	0,059	0,380	0,481
Actuellement enceinte	0,068	0,009	1 415	958	1,282	0,126	0,051	0,085
Connaît une méthode contraceptive	0,996	0,002	803	551	1,085	0,002	0,991	1,001
Connaît une méthode moderne	0,996	0,002	803	551	1,085	0,002	0,991	1,001
Utilise actuellement une méthode	0,272	0,021	803	551	1,361	0,079	0,229	0,314
Utilise actuellement une méthode moderne	0,192	0,016	803	551	1,152	0,083	0,160	0,224
Utilise actuellement la pilule	0,034	0,006	803	551	1,010	0,189	0,021	0,047
Utilise actuellement le DIU	0,047	0,007	803	551	0,973	0,154	0,033	0,062
Utilise actuellement des condoms masculins	0,015	0,004	803	551	0,966	0,277	0,007	0,023
Utilise actuellement des injectables	0,029	0,006	803	551	1,080	0,220	0,016	0,042
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,005	0,003	803	551	1,137	0,571	0,000	0,011
Utilise actuellement le retrait	0,031	0,010	803	551	1,597	0,316	0,011	0,050
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,041	0,009	803	551	1,333	0,227	0,023	0,060
A utilisé une source du secteur public	0,349	0,031	245	166	1018	0,089	0,287	0,411
Ne veut plus d'enfant	0,349	0,018	803	551	1,046	0,050	0,314	0,384
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,278	0,022	803	551	1,410	0,080	0,233	0,323
Nombre idéal d'enfants	3,926	0,066	1 350	915	1,505	0,017	3,795	4,057
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,802	0,027	605	408	1,655	0,034	0,748	0,856
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,932	0,021	848	579	1,944	0,023	0,889	0,975
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,086	0,011	813	558	1,062	0,124	0,065	0,107
Traités avec des SRO	0,214	0,062	72	48	1,161	0,290	0,090	0,338
Traitement médical recherché	0,419	0,091	72	48	1,490	0,218	0,237	0,602
Carnet de vaccination montré	0,759	0,045	184	127	1,412	0,059	0,670	0,848
A reçu le vaccin du BCG	0,971	0,016	184	127	1,253	0,016	0,940	1,002
A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses)	0,870	0,035	184	127	1,395	0,040	0,801	0,939
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,960	0,017	184	127	1,188	0,018	0,926	0,994
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,763	0,038	184	127	1,211	0,050	0,687	0,839
A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses)	0,859	0,035	184	127	1,366	0,041	0,790	0,929
A reçu le vaccin anti-rougeoleux	0,781	0,046	184	127	1,501	0,059	0,688	0,874
A reçu tous les vaccins de base	0,667	0,047	184	127	1,348	0,071	0,572	0,761
Taille-pour-âge (-2ET)	0,191	0,021	826	554	1,441	0,108	0,150	0,233
Poids-pour-taille (-2ET)	0,056	0,012	831	558	1,421	0,217	0,031	0,080
Poids-pour-âge (-2ET)	0,125	0,013	829	556	1,105	0,107	0,099	0,152
Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois)	0,611	0,036	433	275	1,416	0,060	0,538	0,684
Prévalence du paludisme (TDR)	0,042	0,012	432	274	1,041	0,280	0,019	0,066
Prévalence du paludisme (Microscopie)	0,167	0,025	413	263	1,243	0,149	0,117	0,217
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,061	0,010	658	439	1,095	0,169	0,040	0,082
Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0	0,477	0,022	658	439	1,107	0,046	0,434	0,521
Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans)	0,607	0,021	705	463	1,130	0,035	0,564	0,649
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,030	0,007	1 415	958	1,542	0,235	0,016	0,044
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient	0,226	0,026	286	195	1,055	0,116	0,174	0,278
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,515	0,034	408	271	1,362	0,066	0,447	0,582
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,259	0,022	661	460	1,282	0,084	0,216	0,303
Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	0,568	0,024	648	453	1,239	0,042	0,520	0,617
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	0,309	0,019	494	318	0,914	0,061	0,271	0,347
A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment	0,101	0,015	494	318	1,079	0,145	0,071	0,130
A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire	0,176	0,023	377	223	1,176	0,131	0,130	0,223
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire	0,381	0,027	377	223	1,079	0,071	0,327	0,435
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois	0,258	0,023	377	223	1,041	0,091	0,211	0,305
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	3,997	0,169	3 975	2 690	1,226	0,042	3,659	4,335
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-9 ans)	23,605	4,618	1 598	1 095	1,062	0,196	14,368	32,841
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-9 ans)	20,935	4,418	1 596	1 094	1,151	0,211	12,098	29,771
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-9 ans)	44,539	6,353	1 598	1 095	1,102	0,143	31,834	57,244
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-9 ans)	20,096	3,816	1 547	1 064	0,973	0,190	12,463	27,728
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-9 ans)	63,740	7,659	1 606	1 100	1,107	0,120	48,422	79,058

À suivre...

Tableau B.14—Suite

Variable	Valeur (M)	Erreur- type (ET)	Effectif		Effet de plan de son- dage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pon- déré (N) ^a			M-2ET	M+2ET
HOMME								
Milieu urbain	1,000	0,000	592	390	na	0,000	1,000	1,000
Alphabétisé	0,883	0,017	592	390	1,282	0,019	0,849	0,917
Aucune instruction	0,067	0,014	592	390	1,324	0,203	0,040	0,094
Niveau secondaire ou plus	0,776	0,025	592	390	1,446	0,032	0,726	0,826
Jamais marié/jamais en union	0,487	0,029	592	390	1,424	0,060	0,429	0,546
Actuellement marié/en union	0,467	0,030	592	390	1,473	0,065	0,407	0,528
A eu des rapports sexuels avant 18 ans	0,436	0,038	473	315	1,668	0,088	0,359	0,512
Connaît une méthode contraceptive	0,985	0,009	264	182	1,143	0,009	0,968	1,002
Connaît une méthode moderne	0,984	0,009	264	182	1,104	0,009	0,966	1,001
Ne veut plus d'enfants	0,353	0,028	264	182	0,966	0,081	0,296	0,410
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,258	0,037	264	182	1,350	0,141	0,185	0,331
Nombre idéal d'enfants	3,942	0,100	576	378	1,275	0,025	3,742	4,142
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,229	0,020	592	390	1,176	0,089	0,189	0,270
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,074	0,016	592	390	1,521	0,221	0,041	0,107
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,442	0,030	227	145	0,916	0,068	0,381	0,502
Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient	0,480	0,040	247	156	1,257	0,083	0,400	0,560
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,163	0,022	592	390	1,424	0,133	0,119	0,206
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,641	0,043	584	385	2,156	0,067	0,555	0,727

Tableau B.15 Erreurs de sondage : Echantillon Mono, EDSB-V Bénin 2017-2018

Variable	Valeur (M)	Erreur-type (ET)	Effectif		Effet de plan de sondage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pon-déré (N)'			M-2ET	M+2ET
MÉNAGE								
Possession d'au moins une MII	0,936	0,011	952	879	1,375	0,012	0,915	0,958
Ayant accès à une MII	0,857	0,013	3 792	3 468	1,296	0,015	0,831	0,883
Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête	0,833	0,013	3 792	3 468	1,094	0,016	0,806	0,860
FEMME								
Milieu urbain	0,485	0,035	816	759	1,972	0,071	0,416	0,554
Alphabétisée	0,423	0,030	816	759	1,710	0,070	0,363	0,482
Aucune instruction	0,442	0,025	816	759	1,448	0,057	0,392	0,492
Niveau secondaire ou plus	0,303	0,032	816	759	1,957	0,104	0,240	0,366
Jamais mariée/jamais en union	0,272	0,019	816	759	1,240	0,071	0,233	0,310
Actuellement mariée/en union	0,677	0,021	816	759	1,266	0,031	0,635	0,718
Mariée/en union avant l'âge de 18 ans	0,288	0,023	649	599	1,288	0,080	0,242	0,333
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,500	0,028	649	599	1,445	0,057	0,444	0,557
Actuellement enceinte	0,096	0,011	816	759	1,032	0,111	0,075	0,118
Connait une méthode contraceptive	0,978	0,006	561	514	1,028	0,007	0,965	0,991
Connait une méthode moderne	0,976	0,007	561	514	1,041	0,007	0,963	0,990
Utilise actuellement une méthode	0,232	0,028	561	514	1,585	0,122	0,175	0,288
Utilise actuellement une méthode moderne	0,180	0,024	561	514	1,488	0,134	0,132	0,228
Utilise actuellement la pilule	0,027	0,006	561	514	0,928	0,233	0,015	0,040
Utilise actuellement le DIU	0,012	0,005	561	514	1,010	0,383	0,003	0,022
Utilise actuellement des condoms masculins	0,027	0,007	561	514	1,013	0,256	0,013	0,041
Utilise actuellement des injectables	0,022	0,007	561	514	1,194	0,333	0,007	0,037
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,000	0,000	561	514	na	na	0,000	0,000
Utilise actuellement le retrait	0,018	0,006	561	514	1,141	0,352	0,005	0,031
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,028	0,010	561	514	1,381	0,342	0,009	0,048
A utilisé une source du secteur public	0,552	0,064	140	131	1518	0,117	0,423	0,681
Ne veut plus d'enfant	0,351	0,025	561	514	1,248	0,072	0,301	0,401
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,325	0,023	561	514	1,138	0,069	0,280	0,370
Nombre idéal d'enfants	4,499	0,109	803	747	1,865	0,024	4,282	4,716
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,896	0,016	436	393	1,074	0,018	0,864	0,928
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,845	0,035	672	613	1,988	0,041	0,776	0,914
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,119	0,012	622	565	0,898	0,104	0,094	0,144
Traités avec des SRO	0,258	0,065	76	67	1,232	0,250	0,129	0,388
Traitement médical recherché	0,222	0,042	76	67	0,859	0,190	0,138	0,306
Carnet de vaccination montré	0,748	0,039	106	97	0,888	0,052	0,671	0,826
A reçu le vaccin du BCG	0,970	0,017	106	97	1,028	0,017	0,936	1,004
A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses)	0,879	0,036	106	97	1,118	0,040	0,808	0,950
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,950	0,021	106	97	0,981	0,022	0,908	0,991
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,742	0,052	106	97	1,174	0,070	0,639	0,845
A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses)	0,889	0,035	106	97	1,151	0,040	0,818	0,960
A reçu le vaccin anti-rougeoleux	0,865	0,039	106	97	1,172	0,045	0,787	0,944
A reçu tous les vaccins de base	0,706	0,051	106	97	1,122	0,073	0,604	0,809
Taille-pour-âge (-2ET)	0,285	0,025	650	583	1,232	0,088	0,234	0,335
Poids-pour-taille (-2ET)	0,053	0,010	658	592	1,066	0,191	0,033	0,073
Poids-pour-âge (-2ET)	0,183	0,017	656	589	1,025	0,094	0,148	0,217
Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois)	0,675	0,021	325	293	0,750	0,031	0,633	0,717
Prévalence du paludisme (TDR)	0,259	0,032	324	292	1,211	0,125	0,194	0,324
Prévalence du paludisme (Microscopie)	0,380	0,042	302	274	1,438	0,111	0,296	0,464
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,135	0,022	355	326	1,192	0,161	0,092	0,179
Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0	0,261	0,028	355	326	1,184	0,107	0,205	0,316
Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans)	0,589	0,030	405	372	1,204	0,050	0,529	0,648
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,011	0,003	816	759	0,898	0,296	0,005	0,018
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient	0,384	0,054	92	89	1,052	0,140	0,276	0,491
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,583	0,044	201	192	1,266	0,076	0,494	0,671
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,157	0,018	398	375	1,012	0,117	0,120	0,194
Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	0,771	0,022	379	358	1,010	0,028	0,728	0,815
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	0,246	0,034	333	253	1,431	0,138	0,178	0,314
A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment	0,082	0,019	333	253	1,290	0,238	0,043	0,120
A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire	0,235	0,040	281	199	1,558	0,168	0,156	0,315
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire	0,459	0,046	281	199	1,552	0,101	0,367	0,552
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois	0,347	0,041	281	199	1,442	0,119	0,264	0,429
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	5,746	0,396	2 268	2 107	1,395	0,069	4,954	6,538
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-9 ans)	36,481	6,583	1 260	1 148	1,003	0,180	23,315	49,646
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-9 ans)	25,581	6,687	1 262	1 148	1,370	0,261	12,208	38,955
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-9 ans)	62,062	10,267	1 262	1 149	1,270	0,165	41,527	82,597
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-9 ans)	44,902	10,125	1 237	1 129	1,353	0,225	24,652	65,152
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-9 ans)	104,177	16,530	1 269	1 155	1,420	0,159	71,118	137,236

À suivre...

Tableau B.15—Suite

Variable	Valeur (M)	Erreur- type (ET)	Effectif		Effet de plan de son- dage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pon- déré (N) ^a			M-2ET	M+2ET
HOMME								
Milieu urbain	0,473	0,046	372	354	1,762	0,097	0,381	0,565
Alphabétisé	0,726	0,032	372	354	1,387	0,044	0,662	0,791
Aucune instruction	0,179	0,031	372	354	1,572	0,175	0,116	0,241
Niveau secondaire ou plus	0,549	0,039	372	354	1,501	0,071	0,471	0,627
Jamais marié/jamais en union	0,504	0,026	372	354	1,002	0,052	0,452	0,556
Actuellement marié/en union	0,444	0,027	372	354	1,028	0,060	0,391	0,497
A eu des rapports sexuels avant 18 ans	0,344	0,035	282	265	1,237	0,102	0,274	0,415
Connaît une méthode contraceptive	1,000	0,000	170	158	na	0,000	1,000	1,000
Connaît une méthode moderne	1,000	0,000	170	158	na	0,000	1,000	1,000
Ne veut plus d'enfants	0,218	0,032	170	158	0,996	0,145	0,155	0,281
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,376	0,039	170	158	1,036	0,103	0,299	0,453
Nombre idéal d'enfants	4,903	0,163	362	346	1,192	0,033	4,577	5,229
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,211	0,026	372	354	1,212	0,122	0,159	0,262
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,013	0,006	372	354	0,966	0,440	0,002	0,024
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,558	0,041	142	140	0,989	0,074	0,475	0,641
Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient	0,412	0,039	108	107	0,828	0,095	0,334	0,491
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,058	0,012	372	354	0,952	0,200	0,035	0,081
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,604	0,045	367	348	1,773	0,075	0,513	0,695

Tableau B.16 Erreurs de sondage : Echantillon Ouémé, EDSB-V Bénin 2017-2018

Variable	Valeur (M)	Erreur-type (ET)	Effectif		Effet de plan de sondage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pondéré (N)'			M-2ET	M+2ET
MÉNAGE								
Possession d'au moins une MII	0,780	0,015	1 381	1 633	1,337	0,019	0,750	0,810
Ayant accès à une MII	0,684	0,012	5 702	6 744	1,092	0,018	0,660	0,708
Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête	0,644	0,010	5 702	6 744	0,815	0,016	0,624	0,665
FEMME								
Milieu urbain	0,647	0,030	1 260	1 507	2,211	0,046	0,588	0,707
Alphabétisée	0,419	0,025	1 260	1 507	1,766	0,059	0,370	0,468
Aucune instruction	0,433	0,025	1 260	1 507	1,789	0,058	0,383	0,483
Niveau secondaire ou plus	0,315	0,025	1 260	1 507	1,900	0,079	0,265	0,365
Jamais mariée/jamais en union	0,265	0,011	1 260	1 507	0,915	0,043	0,242	0,288
Actuellement mariée/en union	0,653	0,017	1 260	1 507	1,244	0,026	0,620	0,687
Mariée/en union avant l'âge de 18 ans	0,275	0,023	1 019	1 218	1,636	0,083	0,230	0,321
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,418	0,019	1 019	1 218	1,200	0,044	0,381	0,455
Actuellement enceinte	0,072	0,007	1 260	1 507	0,981	0,099	0,058	0,087
Connait une méthode contraceptive	0,981	0,005	830	985	1,030	0,005	0,972	0,991
Connait une méthode moderne	0,980	0,006	830	985	1,140	0,006	0,968	0,991
Utilise actuellement une méthode	0,211	0,016	830	985	1,109	0,074	0,180	0,243
Utilise actuellement une méthode moderne	0,152	0,015	830	985	1,199	0,099	0,122	0,181
Utilise actuellement la pilule	0,018	0,005	830	985	0,975	0,249	0,009	0,027
Utilise actuellement le DIU	0,056	0,010	830	985	1,189	0,169	0,037	0,075
Utilise actuellement des condoms masculins	0,009	0,003	830	985	0,985	0,360	0,003	0,015
Utilise actuellement des injectables	0,011	0,003	830	985	0,961	0,324	0,004	0,017
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,004	0,002	830	985	1,014	0,578	0,000	0,008
Utilise actuellement le retrait	0,024	0,006	830	985	1,034	0,228	0,013	0,035
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,033	0,008	830	985	1,269	0,237	0,018	0,049
A utilisé une source du secteur public	0,543	0,044	155	185	1,097	0,081	0,455	0,631
Ne veut plus d'enfant	0,325	0,021	830	985	1,315	0,066	0,282	0,368
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,297	0,017	830	985	1,086	0,058	0,263	0,332
Nombre idéal d'enfants	4,497	0,084	1 132	1 350	1,909	0,019	4,329	4,665
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,793	0,032	671	798	2,014	0,040	0,730	0,857
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,978	0,005	1 028	1 197	0,961	0,005	0,967	0,988
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,077	0,012	968	1 131	1,310	0,153	0,053	0,100
Traités avec des SRO	0,107	0,045	79	87	1,229	0,421	0,017	0,197
Traitement médical recherché	0,602	0,066	79	87	1,128	0,110	0,469	0,734
Carnet de vaccination montré	0,824	0,032	186	221	1,152	0,039	0,759	0,889
A reçu le vaccin du BCG	0,966	0,016	186	221	1,171	0,016	0,935	0,997
A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses)	0,834	0,031	186	221	1,091	0,037	0,772	0,896
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,960	0,016	186	221	1,131	0,017	0,927	0,992
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,756	0,037	186	221	1,133	0,049	0,683	0,830
A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses)	0,827	0,032	186	221	1,101	0,038	0,764	0,891
A reçu le vaccin anti-rougeoleux	0,807	0,028	186	221	0,932	0,035	0,751	0,863
A reçu tous les vaccins de base	0,710	0,036	186	221	1,057	0,051	0,638	0,782
Taille-pour-âge (-2ET)	0,297	0,018	992	1 155	1,138	0,061	0,261	0,333
Poids-pour-taille (-2ET)	0,044	0,006	1 018	1 184	0,840	0,138	0,032	0,056
Poids-pour-âge (-2ET)	0,171	0,014	997	1 161	1,111	0,083	0,143	0,199
Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois)	0,727	0,024	472	552	1,149	0,033	0,679	0,776
Prévalence du paludisme (TDR)	0,145	0,024	472	552	1,383	0,168	0,097	0,194
Prévalence du paludisme (Microscopie)	0,262	0,033	459	533	1,423	0,127	0,195	0,329
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,131	0,014	560	682	0,999	0,108	0,103	0,160
Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0	0,338	0,021	560	682	1,059	0,062	0,296	0,380
Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans)	0,695	0,018	614	746	0,984	0,026	0,659	0,731
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,003	0,001	1 260	1 507	1,037	0,580	0,000	0,005
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient	0,152	0,034	146	183	1,130	0,222	0,085	0,220
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,644	0,035	305	366	1,264	0,054	0,575	0,714
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,115	0,016	616	724	1,231	0,138	0,083	0,147
Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	0,791	0,025	554	644	1,445	0,032	0,741	0,841
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	0,204	0,025	498	520	1,405	0,124	0,154	0,255
A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment	0,090	0,017	498	520	1,301	0,186	0,057	0,123
A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire	0,207	0,026	412	393	1,323	0,128	0,154	0,260
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire	0,389	0,032	412	393	1,323	0,082	0,325	0,453
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois	0,264	0,036	412	393	1,633	0,135	0,193	0,336
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	5,116	0,249	3 538	4 226	1,381	0,049	4,618	5,614
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-9 ans)	16,133	2,962	1 891	2 238	0,929	0,184	10,208	22,058
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-9 ans)	11,971	3,198	1 884	2 232	1,276	0,267	5,576	18,367
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-9 ans)	28,104	4,606	1 891	2 238	1,111	0,164	18,892	37,317
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-9 ans)	46,932	5,493	1 805	2 149	0,968	0,117	35,945	57,918
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-9 ans)	73,717	7,072	1 901	2 253	1,060	0,096	59,573	87,861

À suivre...

Tableau B.16—Suite

Variable	Valeur (M)	Erreur- type (ET)	Effectif		Effet de plan de son- dage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pon- déré (N) ^a			M-2ET	M+2ET
HOMME								
Milieu urbain	0,640	0,033	519	618	1,545	0,051	0,575	0,705
Alphabétisé	0,594	0,035	519	618	1,617	0,059	0,524	0,664
Aucune instruction	0,309	0,033	519	618	1,645	0,108	0,242	0,375
Niveau secondaire ou plus	0,439	0,031	519	618	1,442	0,072	0,376	0,502
Jamais marié/jamais en union	0,401	0,024	519	618	1,107	0,059	0,353	0,449
Actuellement marié/en union	0,568	0,022	519	618	1,014	0,039	0,524	0,612
A eu des rapports sexuels avant 18 ans	0,571	0,032	416	495	1,297	0,055	0,508	0,634
Connaît une méthode contraceptive	0,756	0,048	291	351	1,876	0,063	0,661	0,851
Connaît une méthode moderne	0,756	0,048	291	351	1,876	0,063	0,661	0,851
Ne veut plus d'enfants	0,387	0,030	291	351	1,040	0,077	0,327	0,446
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,067	0,020	291	351	1,398	0,308	0,026	0,108
Nombre idéal d'enfants	4,319	0,195	412	494	1,411	0,045	3,930	4,709
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,162	0,023	519	618	1,436	0,144	0,115	0,208
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,012	0,005	519	618	1,089	0,440	0,001	0,022
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,691	0,058	168	196	1,620	0,084	0,574	0,807
Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient	0,450	0,046	131	152	1,046	0,102	0,358	0,541
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,084	0,017	519	618	1,408	0,204	0,050	0,119
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,470	0,049	403	478	1,945	0,103	0,373	0,567

Tableau B.17 Erreurs de sondage : Echantillon Plateau, EDSB-V Bénin 2017-2018

Variable	Valeur (M)	Erreur-type (ET)	Effectif		Effet de plan de sondage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pon-déré (N)'			M-2ET	M+2ET
MÉNAGE								
Possession d'au moins une MII	0,942	0,014	966	984	1,789	0,014	0,915	0,969
Ayant accès à une MII	0,798	0,016	4 475	4 521	1,558	0,020	0,767	0,830
Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête	0,745	0,019	4 475	4 521	1,588	0,026	0,707	0,784
FEMME								
Milieu urbain	0,435	0,042	952	970	2,621	0,097	0,350	0,519
Alphabétisée	0,242	0,025	952	970	1,829	0,105	0,191	0,293
Aucune instruction	0,622	0,029	952	970	1,852	0,047	0,563	0,680
Niveau secondaire ou plus	0,186	0,023	952	970	1,854	0,126	0,140	0,233
Jamais mariée/jamais en union	0,225	0,018	952	970	1,363	0,082	0,188	0,262
Actuellement mariée/en union	0,731	0,019	952	970	1,344	0,026	0,692	0,770
Mariée/en union avant l'âge de 18 ans	0,307	0,020	788	797	1,205	0,065	0,267	0,346
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,532	0,024	788	797	1,369	0,046	0,483	0,581
Actuellement enceinte	0,126	0,012	952	970	1,136	0,097	0,102	0,151
Connait une méthode contraceptive	0,976	0,007	697	709	1,277	0,008	0,961	0,991
Connait une méthode moderne	0,976	0,007	697	709	1,276	0,008	0,961	0,990
Utilise actuellement une méthode	0,065	0,010	697	709	1,089	0,157	0,045	0,085
Utilise actuellement une méthode moderne	0,057	0,010	697	709	1,114	0,172	0,037	0,077
Utilise actuellement la pilule	0,012	0,004	697	709	1,047	0,366	0,003	0,020
Utilise actuellement le DIU	0,009	0,004	697	709	1,083	0,422	0,001	0,017
Utilise actuellement des condoms masculins	0,006	0,004	697	709	1,227	0,604	0,000	0,013
Utilise actuellement des injectables	0,009	0,004	697	709	1,042	0,409	0,002	0,017
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,000	0,000	697	709	na	na	0,000	0,000
Utilise actuellement le retrait	0,007	0,003	697	709	1,027	0,449	0,001	0,014
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,001	0,001	697	709	0,612	1,023	0,000	0,002
A utilisé une source du secteur public	0,635	0,076	48	47	1,085	0,120	0,483	0,788
Ne veut plus d'enfant	0,274	0,019	697	709	1,142	0,071	0,235	0,312
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,336	0,025	697	709	1,406	0,075	0,286	0,387
Nombre idéal d'enfants	4,714	0,081	891	920	1,397	0,017	4,552	4,875
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,735	0,025	537	550	1,330	0,034	0,684	0,785
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,922	0,018	832	860	1,492	0,019	0,886	0,958
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,141	0,019	746	766	1,552	0,138	0,102	0,180
Traités avec des SRO	0,219	0,047	106	108	1,137	0,214	0,125	0,313
Traitement médical recherché	0,414	0,057	106	108	1,164	0,138	0,300	0,527
Carnet de vaccination montré	0,663	0,034	146	145	0,843	0,051	0,595	0,731
A reçu le vaccin du BCG	0,813	0,037	146	145	1,084	0,045	0,740	0,886
A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses)	0,496	0,043	146	145	0,999	0,086	0,411	0,582
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,810	0,040	146	145	1,181	0,049	0,730	0,891
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,450	0,043	146	145	1,004	0,095	0,365	0,535
A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses)	0,427	0,051	146	145	1,203	0,119	0,326	0,528
A reçu le vaccin anti-rougeoleux	0,370	0,052	146	145	1,272	0,142	0,265	0,475
A reçu tous les vaccins de base	0,290	0,051	146	145	1,333	0,176	0,188	0,393
Taille-pour-âge (-2ET)	0,362	0,027	766	782	1,444	0,074	0,309	0,415
Poids-pour-taille (-2ET)	0,061	0,010	778	792	1,181	0,169	0,040	0,082
Poids-pour-âge (-2ET)	0,193	0,017	767	783	1,132	0,088	0,159	0,227
Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois)	0,711	0,032	331	338	1,278	0,045	0,646	0,775
Prévalence du paludisme (TDR)	0,339	0,053	331	338	1,732	0,155	0,234	0,445
Prévalence du paludisme (Microscopie)	0,372	0,041	320	330	1,388	0,110	0,290	0,453
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,155	0,019	409	416	1,056	0,122	0,117	0,193
Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0	0,200	0,023	409	416	1,138	0,113	0,155	0,245
Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans)	0,705	0,031	481	491	1,502	0,044	0,642	0,767
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,017	0,004	952	970	1,011	0,247	0,009	0,026
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient	0,124	0,029	102	110	0,898	0,237	0,065	0,183
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,590	0,040	204	211	1,164	0,068	0,510	0,671
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,101	0,015	465	474	1,064	0,147	0,071	0,131
Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	0,921	0,018	437	446	1,372	0,019	0,885	0,956
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	0,294	0,038	350	329	1,538	0,128	0,219	0,369
A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment	0,131	0,027	350	329	1,505	0,207	0,077	0,186
A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire	0,216	0,041	292	253	1,681	0,188	0,135	0,298
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire	0,574	0,032	292	253	1,113	0,056	0,510	0,639
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois	0,442	0,040	292	253	1,365	0,090	0,362	0,521
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	5,688	0,296	2 695	2 742	1,553	0,052	5,096	6,280
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-9 ans)	42,995	5,707	1 581	1 604	1,083	0,133	31,581	54,409
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-9 ans)	34,984	6,024	1 584	1 605	1,089	0,172	22,936	47,032
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-9 ans)	77,979	7,847	1 583	1 605	1,023	0,101	62,285	93,674
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-9 ans)	44,912	7,227	1 537	1 549	1,234	0,161	30,458	59,365
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-9 ans)	119,389	10,601	1 594	1 617	1,077	0,089	98,187	140,591

À suivre...

Tableau B.17—Suite

Variable	Valeur (M)	Erreur- type (ET)	Effectif		Effet de plan de son- dage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pon- déré (N)'			M-2ET	M+2ET
HOMME								
Milieu urbain	0,421	0,045	329	340	1,636	0,106	0,331	0,510
Alphabétisé	0,361	0,042	329	340	1,581	0,116	0,277	0,445
Aucune instruction	0,433	0,035	329	340	1,278	0,081	0,363	0,503
Niveau secondaire ou plus	0,260	0,036	329	340	1,480	0,138	0,188	0,332
Jamais marié/jamais en union	0,320	0,032	329	340	1,230	0,099	0,256	0,383
Actuellement marié/en union	0,644	0,033	329	340	1,233	0,051	0,579	0,710
A eu des rapports sexuels avant 18 ans	0,412	0,036	277	285	1,208	0,087	0,341	0,484
Connaît une méthode contraceptive	1,000	0,000	210	219	na	0,000	1,000	1,000
Connaît une méthode moderne	1,000	0,000	210	219	na	0,000	1,000	1,000
Ne veut plus d'enfants	0,157	0,026	210	219	1,052	0,169	0,104	0,210
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,483	0,037	210	219	1,061	0,076	0,409	0,556
Nombre idéal d'enfants	6,746	0,311	271	280	1,155	0,046	6,125	7,368
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,218	0,029	329	340	1,274	0,133	0,160	0,277
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,028	0,010	329	340	1,152	0,377	0,007	0,049
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,394	0,063	91	90	1,216	0,159	0,269	0,520
Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient	0,227	0,053	103	109	1,282	0,235	0,120	0,333
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,057	0,024	329	340	1,834	0,412	0,010	0,105
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,818	0,034	320	330	1,552	0,041	0,751	0,885

Tableau B.18 Erreurs de sondage : Echantillon Zou, EDSB-V Bénin 2017-2018

Variable	Valeur (M)	Erreur-type (ET)	Effectif		Effet de plan de sondage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pondéré (N)'			M-2ET	M+2ET
MÉNAGE								
Possession d'au moins une MII	0,970	0,005	1 341	1 399	1,110	0,005	0,959	0,980
Ayant accès à une MII	0,806	0,011	6 472	6 776	1,303	0,014	0,784	0,828
Dormi sous une MII la nuit précédent l'enquête	0,800	0,011	6 472	6 776	1,252	0,014	0,778	0,823
FEMME								
Milieu urbain	0,289	0,025	1 550	1 606	2,162	0,086	0,239	0,339
Alphabétisée	0,359	0,022	1 550	1 606	1,831	0,062	0,315	0,404
Aucune instruction	0,514	0,023	1 550	1 606	1,807	0,045	0,468	0,560
Niveau secondaire ou plus	0,282	0,021	1 550	1 606	1,817	0,074	0,240	0,323
Jamais mariée/jamais en union	0,267	0,018	1 550	1 606	1,579	0,066	0,232	0,303
Actuellement mariée/en union	0,673	0,019	1 550	1 606	1,612	0,029	0,634	0,711
Mariée/en union avant l'âge de 18 ans	0,325	0,020	1 198	1 237	1,455	0,061	0,285	0,364
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,677	0,016	1 198	1 237	1,184	0,024	0,645	0,709
Actuellement enceinte	0,106	0,007	1 550	1 606	0,911	0,067	0,092	0,120
Connait une méthode contraceptive	0,990	0,004	1 040	1 080	1,245	0,004	0,982	0,998
Connait une méthode moderne	0,989	0,004	1 040	1 080	1,217	0,004	0,981	0,997
Utilise actuellement une méthode	0,158	0,012	1 040	1 080	1,086	0,078	0,133	0,182
Utilise actuellement une méthode moderne	0,133	0,011	1 040	1 080	1,091	0,086	0,110	0,156
Utilise actuellement la pilule	0,018	0,004	1 040	1 080	0,965	0,224	0,010	0,025
Utilise actuellement le DIU	0,007	0,003	1 040	1 080	1,002	0,365	0,002	0,012
Utilise actuellement des condoms masculins	0,006	0,002	1 040	1 080	1,000	0,403	0,001	0,011
Utilise actuellement des injectables	0,022	0,004	1 040	1 080	0,925	0,189	0,014	0,031
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,004	0,002	1 040	1 080	0,909	0,457	0,000	0,007
Utilise actuellement le retrait	0,014	0,004	1 040	1 080	1,079	0,280	0,006	0,022
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,007	0,003	1 040	1 080	1,177	0,439	0,001	0,013
A utilisé une source du secteur public	0,689	0,045	169	175	1,264	0,066	0,599	0,780
Ne veut plus d'enfant	0,313	0,016	1 040	1 080	1,083	0,050	0,282	0,344
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,347	0,016	1 040	1 080	1,075	0,046	0,315	0,379
Nombre idéal d'enfants	4,829	0,085	1 507	1 556	1,818	0,018	4,659	5,000
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,854	0,015	829	863	1,232	0,018	0,823	0,884
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,896	0,023	1 243	1 299	2,126	0,025	0,850	0,941
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,048	0,010	1 159	1 206	1,626	0,218	0,027	0,069
Traités avec des SRO	0,417	0,067	56	58	1,017	0,160	0,283	0,550
Traitement médical recherché	0,555	0,073	56	58	1,085	0,131	0,410	0,700
Carnet de vaccination montré	0,792	0,032	228	235	1,168	0,041	0,728	0,857
A reçu le vaccin du BCG	0,944	0,018	228	235	1,195	0,019	0,907	0,981
A reçu le vaccin du DTC-HepB-Hib (3 doses)	0,862	0,021	228	235	0,919	0,025	0,819	0,904
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,945	0,018	228	235	1,194	0,019	0,909	0,981
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,748	0,041	228	235	1,397	0,055	0,665	0,830
A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses)	0,854	0,021	228	235	0,900	0,025	0,812	0,897
A reçu le vaccin anti-rougeoleux	0,811	0,026	228	235	0,989	0,032	0,760	0,863
A reçu tous les vaccins de base	0,680	0,041	228	235	1,285	0,060	0,599	0,762
Taille-pour-âge (-2ET)	0,354	0,019	1 183	1 249	1,341	0,055	0,316	0,393
Poids-pour-taille (-2ET)	0,038	0,005	1 189	1 255	0,962	0,139	0,028	0,049
Poids-pour-âge (-2ET)	0,169	0,013	1 188	1 256	1,146	0,080	0,142	0,196
Prévalence de l'anémie (enfants 6-59 mois)	0,591	0,029	608	645	1,354	0,050	0,532	0,650
Prévalence du paludisme (TDR)	0,368	0,030	602	638	1,403	0,081	0,309	0,428
Prévalence du paludisme (Microscopie)	0,369	0,033	589	625	1,469	0,089	0,303	0,435
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0,124	0,014	715	745	1,125	0,112	0,096	0,152
Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥25,0	0,233	0,016	715	745	1,022	0,069	0,201	0,266
Prévalence de l'anémie (femmes 15-49 ans)	0,487	0,023	819	857	1,319	0,047	0,441	0,532
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,012	0,003	1 550	1 606	1,227	0,282	0,005	0,019
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient	0,203	0,030	223	229	1,113	0,148	0,143	0,263
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,554	0,027	387	400	1,074	0,049	0,500	0,609
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,163	0,017	719	736	1,206	0,102	0,130	0,196
Comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	0,757	0,026	694	711	1,611	0,035	0,705	0,810
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	0,281	0,021	537	573	1,092	0,075	0,239	0,324
A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment	0,082	0,015	537	573	1,265	0,183	0,052	0,112
A subi des violences physiques/sexuelles par le plus récent mari/partenaire	0,142	0,024	434	425	1,452	0,172	0,093	0,191
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire	0,393	0,027	434	425	1,142	0,068	0,340	0,447
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par n'importe quel mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois	0,270	0,028	434	425	1,298	0,103	0,214	0,325
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	5,635	0,196	4 326	4 468	1,274	0,035	5,244	6,027
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-9 ans)	35,664	5,571	2 291	2 393	1,240	0,156	24,523	46,806
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-9 ans)	31,791	4,597	2 286	2 389	1,131	0,145	22,598	40,984
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-9 ans)	67,455	6,595	2 294	2 396	1,070	0,098	54,266	80,645
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-9 ans)	43,127	5,101	2 210	2 311	1,111	0,118	32,926	53,329
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-9 ans)	107,673	7,699	2 309	2 412	1,112	0,072	92,275	123,071

À suivre...

Tableau B.18—Suite

Variable	Valeur (M)	Erreur- type (ET)	Effectif		Effet de plan de son- dage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondéré (N)	Pon- déré (N)'			M-2ET	M+2ET
HOMME								
Milieu urbain	0,301	0,023	578	600	1,215	0,077	0,255	0,347
Alphabétisé	0,607	0,030	578	600	1,475	0,049	0,547	0,667
Aucune instruction	0,249	0,024	578	600	1,320	0,095	0,202	0,297
Niveau secondaire ou plus	0,485	0,028	578	600	1,349	0,058	0,429	0,541
Jamais marié/jamais en union	0,419	0,022	578	600	1,075	0,053	0,375	0,463
Actuellement marié/en union	0,541	0,027	578	600	1,283	0,049	0,488	0,595
A eu des rapports sexuels avant 18 ans	0,638	0,040	419	431	1,698	0,063	0,558	0,718
Connaît une méthode contraceptive	0,994	0,004	315	325	1,019	0,005	0,985	1,003
Connaît une méthode moderne	0,994	0,004	315	325	1,019	0,005	0,985	1,003
Ne veut plus d'enfants	0,184	0,023	315	325	1,042	0,124	0,139	0,230
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,466	0,032	315	325	1,133	0,068	0,402	0,530
Nombre idéal d'enfants	6,184	0,265	576	598	1,648	0,043	5,654	6,714
A eu 2+ partenaires sexuels dans les 12 derniers mois	0,356	0,024	578	600	1,180	0,066	0,309	0,403
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0,092	0,015	578	600	1,232	0,161	0,062	0,122
Abstinence parmi les jeunes (jamais eu de rapports sexuels)	0,427	0,044	222	233	1,325	0,103	0,339	0,515
Utilisation du condom au dernier rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient	0,332	0,038	228	237	1,200	0,113	0,257	0,407
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0,066	0,011	578	600	1,072	0,169	0,043	0,088
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,702	0,037	559	580	1,886	0,052	0,628	0,775

TABLEAUX POUR L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES

Tableau C.1 Répartition par âge de la population des ménages

Répartition de la population (de fait) des ménages par année d'âge selon le sexe (pondéré), EDSB-V Bénin 2017-2018

Âge	Femme		Homme		Âge	Femme		Homme	
	Effectif	Pourcentage	Effectif	Pourcentage		Effectif	Pourcentage	Effectif	Pourcentage
0	1 500	4,0	1 497	4,2	36	288	0,8	226	0,6
1	1 302	3,4	1 325	3,8	37	415	1,1	340	1,0
2	1 281	3,4	1 242	3,5	38	363	1,0	322	0,9
3	1 325	3,5	1 401	4,0	39	280	0,7	216	0,6
4	1 290	3,4	1 383	3,9	40	443	1,2	459	1,3
5	1 218	3,2	1 323	3,7	41	162	0,4	201	0,6
6	1 158	3,1	1 181	3,3	42	352	0,9	315	0,9
7	1 402	3,7	1 373	3,9	43	252	0,7	208	0,6
8	1 251	3,3	1 227	3,5	44	117	0,3	124	0,4
9	1 041	2,8	1 078	3,1	45	385	1,0	411	1,2
10	1 125	3,0	1 213	3,4	46	145	0,4	157	0,4
11	865	2,3	969	2,7	47	266	0,7	268	0,8
12	1 062	2,8	1 090	3,1	48	207	0,5	193	0,5
13	867	2,3	936	2,7	49	222	0,6	129	0,4
14	643	1,7	731	2,1	50	204	0,5	283	0,8
15	841	2,2	856	2,4	51	176	0,5	110	0,3
16	614	1,6	594	1,7	52	372	1,0	189	0,5
17	688	1,8	630	1,8	53	235	0,6	137	0,4
18	744	2,0	649	1,8	54	158	0,4	115	0,3
19	542	1,4	462	1,3	55	307	0,8	194	0,5
20	807	2,1	585	1,7	56	175	0,5	110	0,3
21	485	1,3	389	1,1	57	236	0,6	142	0,4
22	679	1,8	529	1,5	58	151	0,4	137	0,4
23	515	1,4	447	1,3	59	84	0,2	64	0,2
24	488	1,3	335	0,9	60	262	0,7	198	0,6
25	876	2,3	678	1,9	61	78	0,2	74	0,2
26	485	1,3	387	1,1	62	166	0,4	101	0,3
27	595	1,6	445	1,3	63	113	0,3	79	0,2
28	661	1,8	486	1,4	64	61	0,2	63	0,2
29	423	1,1	316	0,9	65	220	0,6	137	0,4
30	755	2,0	639	1,8	66	38	0,1	104	0,3
31	277	0,7	294	0,8	67	116	0,3	148	0,4
32	535	1,4	432	1,2	68	106	0,3	123	0,3
33	424	1,1	314	0,9	69	45	0,1	66	0,2
34	288	0,8	286	0,8	70+	958	2,5	839	2,4
35	582	1,5	606	1,7					
					Total	37 793	100,0	35 306	100,0

Note : La population de fait comprend tous les résidents et les non-résidents qui ont dormi dans le ménage la nuit ayant précédé l'interview.

Tableau C.2.1 Répartition par âge des femmes éligibles et interviewées

Population (de fait) des femmes de 10-54 ans, effectif et répartition (en %) par groupe d'âges des femmes interviewées de 15-49 ans et pourcentage des femmes éligibles qui ont été interviewées (pondéré), EDSB-V Bénin 2017-2018

Groupe d'âges	Population de ménage des femmes d'âge 10-54 ans	Femmes enquêtées âge 15-49		Pourcentage de femmes éligibles interviewées
		Effectif	Pourcentage	
10-14	4 562	na	na	na
15-19	3 429	3 377	21,2	98,5
20-24	2 974	2 908	18,3	97,8
25-29	3 039	2 987	18,8	98,3
30-34	2 279	2 233	14,0	98,0
35-39	1 929	1 896	11,9	98,3
40-44	1 327	1 303	8,2	98,2
45-49	1 223	1 200	7,5	98,1
50-54	1 145	na	na	na
15-49	16 200	15 905	100,0	98,2

Note : La population de fait comprend tous les résidents et les non-résidents qui ont dormi dans le ménage la nuit ayant précédé l'enquête. Les pondérations utilisées sont celles de l'enquête ménage. L'âge est basé sur le Tableau de Ménage.
na = Non applicable.

Tableau C.2.2 Répartition par âge des hommes éligibles et interviewés

Population (de fait) des hommes de 10-64 ans, effectif et répartition (en %) par groupe d'âges des hommes interviewés de 15-64 ans et pourcentage d'hommes éligibles qui ont été interviewés (pondéré), EDSB-V Bénin 2017-2018

Groupe d'âges	Population des ménage d'âge 10-64 ans	Hommes enquêtés âge 15-64		Pourcentage d'hommes éligibles interviewés
		Effectif	Pourcentage	
10-14	2 549	na	na	na
15-19	1 561	1 537	20,4	98,4
20-24	1 143	1 119	14,8	97,9
25-29	1 155	1 129	15,0	97,7
30-34	933	900	11,9	96,5
35-39	820	800	10,6	97,6
40-44	659	639	8,5	97,0
45-49	576	555	7,4	96,3
50-54	386	375	5,0	97,1
55-59	297	291	3,9	98,0
60-64	207	200	2,7	96,6
15-64	7 738	7 546	100,0	97,5

Note : La population de fait comprend tous les résidents et les non-résidents qui ont dormi dans le ménage la nuit ayant précédé l'enquête. Les pondérations utilisées sont celles de l'enquête ménage. L'âge est basé sur le Tableau de Ménage
na = Non applicable

Tableau C.3 Complétude de l'enregistrement

Pourcentage d'observations manquantes pour certaines questions démographiques et de santé (pondéré), EDSB-V Bénin 2017-2018

Type d'information	Population de référence	Pourcentage avec information manquante	Nombre de cas
Date de naissance	Naissances dans les 15 années avant l'enquête		
Jour seulement		7,42	34 203
Mois seulement		11,16	34 203
Mois et année		0,23	34 203
Âge au décès	Décès d'enfants nés dans les 15 années avant l'enquête	0,00	3 413
Âge/date à la première union¹	Femmes 15-49 actuellement en union ou en rupture d'union	0,00	12 039
	Hommes 15-64 actuellement en union ou en rupture d'union	0,00	4 720
Niveau d'instruction de l'enquêté	Toutes les femmes de 15-49 ans	0,00	15 928
	Tous les hommes de 15-64 ans	0,00	7 595
Diarrhée dans les 2 dernières semaines	Enfants vivants de 0-59 mois	1,13	12 686
Anthropométrie des enfants	Enfants vivants de 0-59 mois (du questionnaire biomarqueur)		
Taille		1,72	13 551
Poids		1,58	13 551
Taille ou poids		1,72	13 551
Anthropométrie des femmes	Femmes de 15-49 ans (du questionnaire biomarqueur)		
Taille		2,72	8 339
Poids		2,67	8 339
Taille ou poids		2,72	8 339
Anémie			
Enfants	Enfants vivants de 6-59 mois du questionnaire biomarqueur	2,81	6 348
Femmes	Femmes de 15-49 ans du questionnaire biomarqueur	3,32	8 339

¹ L'année et l'âge sont manquants**Tableau C.4 Naissances par année de naissance**

Nombre de naissances, pourcentage de naissances avec une date de naissance complète, rapport de masculinité à la naissance et rapport de naissances annuelles pour les enfants survivants, les enfants décédés et le total des enfants (pondéré), EDSB-V Bénin 2017-2018

Années	Effectif de naissances			Pourcentage avec une année et mois de naissance			Rapport de masculinité à la naissance ¹			Rapport de naissances annuelles ²		
	Survivants	Décédés	Total	Survivants	Décédés	Total	Survivants	Décédés	Total	Survivants	Décédés	Total
2018	125	3	128	100,0	100,0	100,0	101,6	29,4	99,1	na	na	na
2017	2 830	127	2 957	99,5	93,0	99,3	98,9	131,7	100,1	na	na	na
2016	2 525	155	2 680	98,3	85,1	97,6	104,3	123,2	105,3	97,2	88,3	96,7
2015	2 364	223	2 587	96,3	76,4	94,6	97,3	144,6	100,6	94,9	119,5	96,7
2014	2 455	219	2 674	95,3	84,3	94,4	105,3	141,0	107,8	103,1	97,5	102,6
2013	2 397	226	2 623	93,7	81,3	92,6	107,0	114,8	107,7	102,3	100,0	102,1
2012	2 233	234	2 467	93,1	76,4	91,5	105,3	105,4	105,3	98,9	88,8	97,9
2011	2 118	300	2 418	87,8	72,2	85,9	97,0	126,6	100,3	95,0	119,9	97,5
2010	2 226	266	2 493	85,6	72,9	84,3	99,5	114,5	101,0	107,7	93,1	105,9
2009	2 017	273	2 289	84,1	67,7	82,2	92,4	112,5	94,6	100,1	101,8	100,3
2014 - 2018	10 299	727	11 026	97,5	83,6	96,6	101,3	135,6	103,3	na	na	na
2009 - 2013	10 991	1 299	12 290	89,0	73,7	87,4	100,4	115,0	101,9	na	na	na
2004 - 2008	8 346	1 181	9 527	84,1	70,5	82,4	105,6	107,9	105,9	na	na	na
1999 - 2004	5 586	956	6 542	82,6	72,3	81,1	99,3	135,1	103,8	na	na	na
<1999	5 280	1 191	6 471	80,5	69,9	78,5	106,8	104,0	106,3	na	na	na
Ensemble	40 502	5 354	45 856	88,2	73,2	86,4	102,4	116,7	103,9	na	na	na

na = Non applicable

¹ $(N_m/N_f) \times 100$, où N_m est le nombre de naissances masculines et N_f le nombre de naissances féminines² $[2N_x/(N_{x-1}+N_{x+1})] \times 100$, où N_x est le nombre de naissance de l'année x

Tableau C.5 Enregistrement de l'âge au décès en jours

Répartition des décès survenus, d'après les déclarations, à moins de 1 mois selon l'âge au décès en jours et pourcentage de décès néonataux survenus, d'après les déclarations, aux âges de 0-6 jours, par période de 5 ans précédant l'enquête, EDSB-V Bénin 2017-2018

Âge au décès en jours	Nombre d'années ayant précédé l'enquête				Total 0-19
	0-4	5-9	10-14	15-19	
<1	147	149	106	78	479
1	91	90	63	42	286
2	32	36	18	22	108
3	45	36	24	22	128
4	7	10	7	8	33
5	12	14	11	9	47
6	8	13	4	7	32
7	22	16	11	15	63
8	6	18	7	3	35
9	4	7	4	6	22
10	6	6	9	1	21
11	4	3	0	3	9
12	4	2	2	2	10
13	1	1	3	3	8
14	2	2	6	6	16
15	2	5	5	1	14
16	1	0	0	1	2
17	1	1	0	1	3
18	0	1	1	0	2
19	1	1	0	1	4
20	1	2	1	1	5
21	0	2	7	0	9
22	0	1	2	1	3
23	1	1	1	0	3
24	0	1	0	1	2
25	0	0	1	1	2
26	0	1	0	0	1
27	1	0	1	0	2
28	1	0	0	0	1
29	3	0	0	0	3
30	1	1	1	1	5
Total 0-30	406	418	296	236	1,355
Pourcentage néonatal précoce ¹	84,3	83,0	78,9	80,1	82,0

¹ 0-6 jours / 0-30 jours

Tableau C.6 Enregistrement de l'âge au décès en mois

Répartition des décès survenus, d'après les déclarations, à moins de 2 ans, selon l'âge au décès en mois, et pourcentage de décès survenus, d'après les déclarations, à moins de 1 mois, par période de 5 ans précédant l'enquête (pondéré), EDSB-V Bénin 2017-2018

Age au décès en mois	Nombre d'années ayant précédé l'enquête				Total 0-19
	0-4	5-9	10-14	15-19	
<1	406	418	296	236	1 355
1	40	42	41	12	135
2	34	42	26	29	131
3	29	34	28	22	113
4	18	15	14	7	54
5	24	28	21	14	87
6	24	32	28	20	104
7	28	26	31	13	99
8	24	22	22	17	85
9	33	41	39	22	136
10	24	29	24	16	92
11	18	26	30	16	89
12	32	40	34	27	133
13	12	23	18	18	72
14	15	21	14	18	68
15	9	21	15	13	58
16	4	9	7	5	25
17	7	6	3	2	18
18	31	30	22	30	113
19	1	4	2	3	10
20	2	7	7	4	20
21	0	6	1	0	7
22	4	4	3	0	11
23	3	6	4	4	17
Total 0-11	702	756	600	423	2 480
Pourcentage néonatal ¹	57,8	55,4	49,2	55,8	54,6

^a Y compris les décès survenus à mois d'un mois, déclarés en jours

¹ Moins d'un mois / moins d'un an

Tableau C.7 Complétude et données de qualité concernant le poids et la taille des enfants

Parmi les enfants de moins de 5 ans (0-59 mois) éligibles pour l'anthropométrie, pourcentage avec des mesures de la taille et/ou du poids et/ou des dates de naissances incomplètes ou manquantes; pourcentage avec des données hors limites pour la taille-pour-âge et/ou le poids-pour-taille et/ou le poids-pour-âge; et pourcentage avec des données valides, selon certaines caractéristiques sociodémographiques (non pondéré), EDSB-V Bénin 2017-2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage avec données manquantes ou incomplètes			Pourcentage avec données hors-porté pour : ⁴			Pourcentage avec données valides pour : ⁸			Effectif d'enfants
	Taille ¹	Poids ²	Age en mois ³	Taille-pour-âge ⁵	Poids-pour-taille ⁶	Poids-pour-âge ⁷	Taille-pour-poids	Poids-pour-taille	Poids-pour-âge	
Âge en mois										
<6	2,3	2,2	0,1	0,8	1,5	0,2	96,8	96,2	97,5	1 430
6-8	1,9	1,8	0,0	0,6	0,5	0,2	97,5	97,6	98,0	831
9-11	2,1	2,1	1,8	0,8	0,5	0,3	95,5	97,4	96,0	731
12-17	1,3	1,2	0,8	0,5	0,2	0,2	97,5	98,4	98,0	1 288
18-23	1,6	1,4	3,6	0,2	0,5	0,1	94,6	97,8	95,0	1 339
24-35	2,0	1,5	3,9	0,1	0,2	0,0	94,2	97,9	94,7	2 517
36-47	1,5	1,4	6,5	0,4	0,4	0,1	91,9	98,1	92,2	2 724
48-59	1,9	1,9	6,8	0,3	0,3	0,1	91,2	97,8	91,5	2 690
Sexe										
Masculin	1,6	1,4	4,1	0,5	0,5	0,1	94,1	97,9	94,5	6 835
Féminin	2,1	1,9	3,8	0,3	0,4	0,1	94,0	97,6	94,4	6 715
Interview de la mère										
Interviewée	1,3	1,2	3,1	0,4	0,5	0,1	95,2	98,2	95,6	12 230
Mère non interviewée mais vivant dans le ménage	20,2	19,9	17,3	1,0	0,6	0,0	66,7	79,2	67,9	312
Mère non interviewée et ne vivant pas dans le ménage ⁹	2,0	1,8	9,8	0,3	0,4	0,1	88,0	97,6	88,4	1 008
Département										
Alibori	1,5	1,5	4,1	0,8	0,6	0,0	93,6	97,8	94,4	1 555
Atacora	1,0	0,7	3,9	0,1	0,1	0,0	95,1	98,9	95,5	1 305
Atlantique	2,1	2,1	3,8	0,1	0,1	0,0	94,1	97,9	94,2	1 258
Borgou	0,6	0,6	11,4	0,4	0,4	0,2	87,9	99,0	88,1	1 796
Collines	0,7	0,6	1,9	0,3	0,5	0,1	97,1	98,8	97,4	1 040
Couffo	2,6	1,6	5,0	0,2	0,3	0,1	92,8	97,1	93,6	926
Donga	0,8	0,8	3,0	0,9	1,6	0,5	95,4	97,6	95,8	1 012
Littoral	4,5	4,3	1,4	0,2	0,5	0,0	94,5	95,1	94,9	874
Mono	2,5	1,9	1,9	0,4	0,6	0,1	95,8	96,9	96,7	687
Ouémé	2,1	2,1	2,4	0,6	0,3	0,1	95,1	97,6	95,6	1 035
Plateau	0,9	0,9	1,4	0,3	0,1	0,1	97,4	99,0	97,6	784
Zou	2,8	2,6	0,6	0,4	0,5	0,2	96,2	96,7	96,6	1 215
Niveau d'instruction de la mère										
Aucun	1,7	1,5	4,8	0,5	0,6	0,1	93,2	97,7	93,7	8 277
Primaire	1,4	1,2	1,2	0,3	0,3	0,1	97,4	98,3	97,8	2 217
Secondaire 1 ^{er} cycle	2,2	2,0	0,5	0,4	0,3	0,1	96,9	97,5	97,5	1 468
Secondaire 2 ^d cycle ou plus	4,0	3,8	0,7	0,0	0,0	0,0	95,9	96,0	96,0	579
Manquant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	1
Ensemble	1,8	1,7	3,9	0,4	0,5	0,1	94,0	97,7	94,5	13 550

¹ La taille de l'enfant en centimètres est manquante, l'enfant n'était pas présent, l'enfant a refusé et code résultat "autre"

² Le poids de l'enfant en kilogrammes est manquant, l'enfant n'était pas présent, l'enfant a refusé et code résultat "autre"

³ Date de naissance incomplète ; une date de naissance complète comprend le jour/mois/année ou le mois/année

⁴ Les cas avec des données manquantes ou incomplètes ne sont pas considérés comme des cas hors limite.

⁵ Les cas hors limite pour la taille-pour-âge sont définis comme plus de 6 écarts type (ET) au-dessus ou en-dessous de la médiane de la population de référence (Z-scores) basé sur les Normes OMS de la croissance de l'enfant.

⁶ Les cas hors limite pour le poids-pour-taille sont définis comme plus de 5 écarts type (ET) au-dessus ou en-dessous de la médiane de la population de référence (Z-scores) basé sur les Normes OMS de la croissance de l'enfant.

⁷ Les cas hors limite pour le poids-pour-âge sont définis comme plus de 6 ET en-dessous ou 5 ET au-dessus de la médiane de la population de référence (Z-scores) basé sur les Normes OMS de la croissance de l'enfant.

⁸ Pas de données manquantes, incomplètes ou hors limite

⁹ Y compris les enfants dont la mère est décédée.

Tableau C.8 Taille de la fratrie et rapport de masculinité des frères et sœurs

Taille moyenne de la fratrie et rapport de masculinité à la naissance des frères et sœurs, EDSB-V Bénin 2017-2018

Âge des enquêtées	Taille moyenne de la fratrie ¹	Rapport de masculinité à la naissance ²
15-19	5,8	106,5
20-24	6,1	105,4
25-29	6,1	106,9
30-34	6,0	108,2
35-39	6,1	106,7
40-44	6,2	103,9
45-49	6,1	104,9
Ensemble	6,0	106,3

¹ Y compris l'enquêtée

² Non compris l'enquêtée

Tableau C.9 Mortalité liée à la grossesse

Estimations directes des taux de mortalité liée à la grossesse pour la période 7 ans avant l'enquête, par groupes d'âge quinquennaux, EDSB-V Bénin 2017-2018

Âge	Pourcentage de décès de femmes liés à la grossesse	Décès liés à la grossesse ¹	Années d'exposition	Taux de mortalité liée à la grossesse ²
15-19	18,1	16	35 355	0,44
20-24	35,0	31	39 226	0,78
25-29	32,9	28	36 426	0,76
30-34	35,2	43	30 122	1,42
35-39	24,7	20	21 197	0,94
40-44	20,9	11	13 405	0,81
45-49	14,1	5	7 810	0,66
Ensemble 15-49	27,8	153	183 543	0,81 ^a

¹ La mortalité liée à la grossesse est définie comme le décès d'une femme enceinte ou dans les deux mois suivant l'interruption de grossesse, de toute cause, y compris un accident ou la violence

² Exprimé par 1 000 années-femmes d'exposition

^a Taux ajusté selon l'âge

Tableau C.10 Nombre de grappes complétées par mois d'interview et selon la région

Nombre de grappes complétées par mois d'interview, selon la région, EDSB-V Bénin 2017-2018

	Mois				Ensemble
	Janvier 2018	Février 2018	Novembre 2017	Décembre 2017	
Département					
Alibori	13	17	2	10	42
Atacora	9	8	4	18	39
Atlantique	24	6	10	25	65
Borgou	15	14	8	19	56
Collines	25	13	1	7	46
Couffo	13	10	4	15	42
Donga	12	11	2	7	32
Littoral	7	31	10	4	52
Mono	9	18	4	6	37
Ouémé	15	19	5	15	54
Plateau	13	5	5	15	38
Zou	18	6	8	20	52
Pourcentage	31,2	28,5	11,4	29,0	100,0
Total	173	158	63	161	555

Note : Les grappes sont classées par mois en fonction de la date à laquelle le dernier questionnaire sur les biomarqueurs a été rempli dans la grappe

Tableau C.11 Pourcentage d'enfants de 6 à 59 mois dont les résultats du test de diagnostic rapide (TDR) pour le paludisme sont classés positifs, par mois et par département, EDSB-V Bénin 2017-2018

	Mois				Ensemble
	Janvier 2018	Février 2018	Novembre 2017	Décembre 2017	
Département					
Alibori	27,2	29,2	56,0	47,0	36,0
Atacora	46,3	29,3	65,3	64,5	53,9
Atlantique	11,7	*	41,2	23,7	23,7
Borgou	58,9	4,6	57,8	52,9	51,3
Collines	41,4	38,8	37,7	47,7	41,6
Couffo	57,7	47,3	41,0	62,2	54,3
Donga	45,1	14,5	69,4	54,8	40,2
Littoral	6,5	4,3	3,4	*	4,2
Mono	30,7	15,2	35,6	26,8	25,9
Ouémé	12,6	9,2	31,0	11,5	14,5
Plateau	35,1	(14,9)	54,7	28,3	33,9
Zou	31,2	19,6	55,5	39,7	36,8
Total	34,8	20,2	45,8	42,3	36,4

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés
Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau C.12 Nombre d'enfant de 6 à 59 ans ayant effectué le test de diagnostic rapide (TDR) pour le paludisme par mois et par département (non-pondéré), EDSB-V Bénin 2017-2018

	Mois				Ensemble
	Janvier 2018	Février 2018	Novembre 2017	Décembre 2017	
Département					
Alibori	219	228	70	190	707
Atacora	180	77	122	217	596
Atlantique	220	10	124	211	565
Borgou	210	66	230	295	801
Collines	173	93	88	115	469
Couffo	137	61	89	154	441
Donga	166	128	69	89	452
Littoral	87	183	141	21	432
Mono	71	108	82	63	324
Ouémé	123	121	91	137	472
Plateau	116	39	69	107	331
Zou	212	69	102	219	602
Total	1 914	1 183	1 277	1 818	6 192

Tableau C.13 Pourcentage d'enfants de 6 à 59 mois dont les résultats du test de gouttes épaisses (Parasitémie palustre) sont classés positifs, par mois et par département, EDSB-V Bénin 2017-2018

	Mois				Ensemble
	Janvier 2018	Février 2018	Novembre 2017	Décembre 2017	
Département					
Alibori	34,2	36,2	37,2	41,2	37,0
Atacora	52,4	36,0	60,9	47,9	49,7
Atlantique	37,1	*	30,7	34,0	34,2
Borgou	55,0	9,8	58,7	37,3	44,9
Collines	48,2	45,3	33,4	38,7	42,3
Couffo	57,9	40,2	32,6	61,6	51,3
Donga	47,5	38,0	58,0	53,9	47,1
Littoral	20,1	19,1	13,8	*	16,7
Mono	54,7	29,3	32,5	44,9	38,0
Ouémé	29,6	21,7	28,1	26,9	26,4
Plateau	36,4	(43,1)	38,0	34,0	37,2
Zou	38,4	27,4	38,8	38,2	36,9
Total	42,8	31,1	39,7	40,3	39,1

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés
Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau C.14 Nombre d'enfant de 6 à 59 ans ayant effectué le test de gouttes épaisses (Parasitémie palustre) par mois et par département (non-pondéré), EDSB-V Bénin 2017-2018

	Mois				Ensemble
	Janvier 2018	Février 2018	Novembre 2017	Décembre 2017	
Département					
Alibori	206	210	63	181	660
Atacora	173	76	111	210	570
Atlantique	202	10	122	196	530
Borgou	198	64	229	280	771
Collines	168	86	88	108	450
Couffo	128	59	85	148	420
Donga	158	119	67	86	430
Littoral	83	176	133	21	413
Mono	61	101	78	62	302
Ouémé	116	120	89	131	456
Plateau	113	39	65	103	320
Zou	206	67	106	210	589
Total	1 812	1 127	1 236	1 736	5 911

PERSONNEL NATIONAL

Coordination nationale

Mahounou Laurent Hounsa (Directeur Général de l'INSAE)
Armelle C. H. Ahamide Meangoua (Directrice Générale Adjointe de l'INSAE)
S. Alexandre Biaou (Directeur Général de l'INSAE au moment de la Collecte)

Coordination technique

Rémy Hounguevou (Directeur des Etudes Démographiques par Intérim de l'INSAE)
D. Dine Adechian (Directeur des Etudes Démographiques de l'INSAE au moment de l'enquête)

Coordination administrative et financière

Lisette Assemien (Directrice Administrative et Financière de l'INSAE)
Pascal W. Donou (Chef Comptable de l'INSAE au moment de l'enquête)

Comité de pilotage

Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (Direction Générale)
Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (Direction des Etudes Démographiques)
Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (Direction Administrative et Financière)
Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF)
United States Agency for International Cooperation (USAID)
Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP)
Secrétariat Permanent du Conseil de l'Alimentation et de la Nutrition (SP-CAN)

Équipe technique, INSAE

Djabar Dine Adechian	Renaud Yovoga
Mémounath Bissiriou Zounon	Sévérin Agbangla
Rémy Hounguevou	Oscar Houndonougbo
Bruno Djangba	Joëlle Domigo Folly
Jeannine Houeha	Charlotte Quenum
Gisèle Houessou Assaba	Gilles Kiki
Kocou Missihoun	

Équipe d'analyse thématique

INSAE, partenaires et personnes ressources

Mahounou Laurent Hounsa	Mouchitaba Lawani Lawani
Armelle C. H. Ahamide Meangoua	Charlotte Quenum
Mémounath Bissiriou Zounon	Gilles Kiki
Rémy Hounguevou	Narcisse Kouton
Jeannine Houeha	Bertille Agueh Onambele
Gisèle Houessou Assaba	Roger Attemba
Kocou Missihoun	Odette Amlan Semevo
Renaud Yovoga	Etienne Somakou
Sévérin Agbangla	Justin Dansou
Elise Ahovery	Candide Atodjinou
Bruno Djagba	Georges Kouchoro
Oscar Houndonougbo	Paterne Kougblenou
Fèmi Christian Dossou	Yédodé Ahokossi
Eudes Hounkpodote	Antoinette Gbokli

Sectoriels

Virgile Dodoo (ANV-SSP/MS)	Mireille Houensou (SP-CAN)
Aminatou Baco Mama Chabi (DSME/MS)	Salimatou Assani (CNHU-HKM/Cardiologie)
Augustin Koukpoliyi (CNHU-HKM/Parasitologie)	Abou Bakary Pio (PNLP/MS)
Bernadin Adanhoume (DNSP/MS)	Gaétan Cyriaque Goudjo (PNLMNT/MS)
Andréa Houindote (SP-CAN)	José Ahyi (DSME/MS)
Georges Ogoudedji (SP-CAN)	H. Cyrillia Yebe (DPFG/MASM)
Fiacre Affédjou (SP-CAN)	Ibrahim Moussa (ABPF)

Équipe de lecture des chapitres

Kokou Zounon	Victor Valère O. Bankole
Bruno Magloire Nouatin	Nicaise Kodjogbe
sourou Koubadje Djaton	Victorine Mensah
J. Thomas Tohouegnon	Bruno Djagba
Maurice Dossou Bankole	

Comité de relecture

Andrée Cossi	Djaoudath Alidou Dramane
Fatahi Chitou	Yves Dangnivo
Françoise Allodjogbe	

Gestionnaires

Lisette Assemien	Bricette Adjovi
Pascal Donou Wadayi	Cécile Ahouangbo
Hermine Vigan	Magloire Djika
	Claude Soton

Logistique

Alain Satcha	Hilarion Awo	Séidou Seko Baka
--------------	--------------	------------------

Secrétariat

Eléonore Ablefonlin	Ruth Akplogan
Solange Badjagou	Souliatou Chitou

Chauffeurs

Serge Gbedan
Bruno Hounou
Natacha Hounwoui
Alain Ahoyo

Vincent da Matha
Jean Jonhson
Magloire Atcho

Charge de courrier

Émile Aigbonoussi

Lina Agbotome

Personnel du Laboratoire de Parasitologie du CNHU (Test microscopique)

Coordonnateur principal

Professeur Achille Massougbodji

Chef du Laboratoire

Professeur Dorothée Kinde Gazard

Assistants

M. C. A. Aurore Ogouyemi Hounto

Dr. Yolande Sissinto Savi De Tove

Superviseur des activités, surveillant du laboratoire

Augustin L. Koukpoliyi

Microscopistes

Victoire Adinsi de Souza
Mireille Aguegue Soglo
David Biaou
Nicaise Gninou
Romaric Tchebe

Claude Kokoun
Serge Awolokou
Sidonie Koudebi
Andréa Dandjesso
Parthénos Ahouannou

Cartographie

Cartographes et énumérateurs

Zoumarou Safianou Djimba
B. K. Clovis Borkou
Abdoul-Wassihou Ouake Baoua
Abdel Aziz Boukari
Winrebassé Yintopa
Afiavi Cathérine Gandebagni
Koffi Adokou
Lucesse Annaïk Agblo
Cokou James Dansou
Giono Ahouignan
Aboudou Kafarou Sibrim
Franscica Houndonougbo
Rosel Sotinkon
Rosaline Assiba Hounguevou
Al-Faraj Y. N. Adam Soule
Odjo Olaitan Elegbe
Eugène Koussouma

Narcisse Tchibozo
Adéyèmi Eric Teka
Bertin Tchihoukpo
Kossi Glwladys Totehoue
Dominique Bonou
Jules Agbessi
Barnabé Egoudjobi
E. Honoré Agbodeji-Kpatinvo
Sarafadine Sambo
Fritzy Anianou
Bouraïma A. Nachirou
Jean-Baptiste Tindedjrohoun
Fawaz A. Adechy
Anne A. Akplogan
Saturnin Alavo
T. Franck Marius Heleme
F. S. Géraldo Houeha

John Bah Sato
Bachirou Tidjani Salami
Kassimou Mama
Abdel Sidikou Zime
Abiloyé Médard Akpo
Comlan Salomon Ahovery

Tédessi Igor Roger Hounzangli
Nassirou Issa
K. Gildas Martin Zankpo
O Moufalilou Alassani
A. Pierre Odo Adekoun

Enquête pilote

Superviseurs

Djabar Dine Adechian
Gisèle Houessou Assaba
Joëlle Domigo Folly
Rémy Hounguevou

Jeannine Houeha
Kocou Missihoun
Charlotte Quenum

Chefs d'équipes

Zolassi Albertine Hlihe
Fifonsi Brigitte Dako

Jonas Gbetie
Mounifa Karim Tidjani

Enquêteurs

B. Mariano Totin
K. Nicaise
S. Hountondji

Yao Robert Djogbenou
Mohamed Aminou Bagri Issa
Josué U. D. Lokossou Kpewege

Enquêtrices

Jacqueline Hermione M. Toviessi
Pauline Félicité Zounon
Danielle Renée M. Bankole
E. Murielle Ahouassou
Christelle Espérance Atchade
M. Octavie Estelle Kpoton
Carine Huguette Agbo

Agossi Perpétue Hermione Goukodadja
Odjo Eulalie Biao
Amlan Odette Semevo
Vidéhoun Solange Hounsa
Afiwa Clémence Flora Fagnon
S. Odette Dossou

Techniciens de santé

Adéba Odile Guegni
Taïdatou Issadou

Janine Salmath Avaligbe
Gb. Diane Djidonou

Appui des sectoriels aux différentes phases préparatoires

Virgile Dodoo (ANV-SSP/MS)
Armand Gandigbe (DRFMT/MS)
Georges Ogoudedji (SP-CAN)
G. Jeannine Agbo Monlemey Lawani (DSME/MS)
Mabou Ahokossi (DSME/MS)

Mouniratou Idrissou Mama Sanni (CNLS/MS)
Bella Hounkpe do Santos (PNLP/MS)
Philippe Tognisou (ANV-SSP/MS)
Augustin Koukpoliyi (Laboratoire CNHU)
Mireille Aguegue (Laboratoire CNHU)

Enquête principale

Chefs d'équipe

Mohamed Aminou Bagri Issa
Souradjou Salifou
Abdou Fataou Issifou
André Pierre Odo Adekoun
Ouorou Phales Assignitou
O. Eulalie Biao
Traoré Kabirou Bio Comada
Sewedo Christine Aidonougbo
Dalé Sylvain Awo
Abla Dahoeto
Charbel L. Edgard Pedanou

Emile Laurent Amakoué Mensah
Gildas Akadji
Bignon Mariano Totin
S. Odette Dossou
Jonas Gbetie
A. P. Hermione Goukodadja
Zolassi Albertine Hlihe
Alexis Hounsou
Biaou Félix Balogoun
K. Josué U. D. Lokossou
Fifonsi Brigitte Dako

Enquêtrices

Raïmatou Orou Seko
Chamsia Gado
Aya Assana
Salmata Tairou Moumouni
Roukiatou Adam
Rachidatou Amedowokpo
Augustine Owa M'po
K. Justine Kouagou Kroupe
Yépoudoua Patricia Kouagou
Clémence Daroukoua
Diawêyiah Prudencia Tablieni
Raïmatou Atchado Atta Gomina
Mouïna Issifou
Djoumai Kadidjatou Issouman
Taïdatou Issadou
Djamilath Tony
Rahimatou Zakari
Zoubérath Bio Tahirou
Gérôde Fifamè Nanhinde
Sylbine Bona Boni
Eunice-Landra Nansounon
Kadjogbé Hortense Abaya
V. J. Tatiana Amagnide
Sènan Anasthasie Tchakpa
Geneviève Tollegbe
Vidéhoun Solange Hounsa
Rouchidath A. Akinocho
F. I. Véronique Sandrine Ahouangannon
Armandine Félicité Sogadji
Thérèse Donou
A. C. Flora Fagnon
A. Sonia Degbe
Agathe Houetognon

Calilatou Allassane
Y. Euphrasie H. Boco
Thywill Gakpetor
Wanyinto Sidonie Agossou
Christelle Dossou
Satingo Marlène Danielle Sourou
M. Bénédicte Moide
Bossédé Elvire Senougbe
Jacqueline Hermione M. Toviessi
E. Blandine Degbeko
A. S. Nelly Gnancadja
Charlotte Hounkpe
Francine Houndonougbo
Ruth Gloria Zinsou
Kafilatou Aremou
Yasmine Carolle F. Koukpresso
G. Déborah Espérance Zohoun
Eve Josèthe Tossou
S. K. Rolande Koukouï
Clotilde Daga
Octavie Estelle Kpoton
Abran Christiane Winsavi
Yandibossi Ella Tawema
Pauline F. Zounon
Réanatou Adjiboye
Saba Tchari Kassa Delphine
Olouwatayo Georgette Olouyomi
Angèle Ahotondji
Huguette A. Kakpo
Gisèle Léonie Kanlinsou
H. M. Lidwine Sithon
Christelle Atchade
M. Geneviève Datondji

Agents de prélèvement

Anani Benoit Tohouenou
Nabilath Adenike Abike Mora
Iliassou Orou Gado
Zoubérou Naïmatou Adambi Bouhary
Akimou Aliou Banka
Abdou Sabour Alasane Ibrahim
Iradath Babio
N. Angélique Agossadou
Freddy Eudoxe Edikou
Adonis A. Hountondji
Axelle G. M. A. Dickinson

Adrien C. Hessavi Hodonou
Mireille Flenon
Achille Sessou
O. H. Laurel Ouidoh
Adéba Odile Guegni
Gb. Diane Djidonou
Salmath Janine Avaligbe
D. Christine Bossou
Faridath Adjokè Adechoubou
Yolande E. Ahodo-Ounsou
Adéyèmi Eric Tecka

Enquêteurs

A. Kankou Warissou Sanni
Souradjou Mama Yacoubou
N’Kouei André Fenonkperife
Raïssanou Abdoulaye
Mouzaminou Zakari Abdoulaye
Kabirou Aboubakari
Ayodélé Romuald Seriki
Dossa Florent Houefonde
Moufid Biao
Tchégnon Charlmelo Aho
Samuel D. M. Amoussou Adeble

Gilles Constantin Codjovi
Affolabi Boris Fayomi
Soumanou Moukaïla Soumanou
Sèlobo Dèfodji Emile Houssou
Ferdinand Dagba
Ulrich Peace Migan Gandonou
Yannick Lionel A. Sotomey
Adéyèmi Elie Chabi
Kabirou Ayodele
Jesugo Venceslas Andronicus Ahouangbo
Mègnonnan Nicolas Ahovey

Editeurs

Boni Soubo Bio Soubo
Djigbodi Rose Sodegadji
Salifou Essessinou
Chabi Olaoumi Georges Kouchoro

Aurel Cephas Ogoudjobi Attere
Amlan Odette Semevo
Djamal Dine Djaboutouboutou

Supervision technique

Rémy Hounguevou (INSAE)
Jeannine Houeha (INSAE)
Gisèle Houessou Assaba (INSAE)
Kocou Missihoun (INSAE)
Renaud Yovoga (INSAE)
Sévérin Agbangla (INSAE)
Bruno Djagba (INSAE)
Oscar Houndonougbo (INSAE)
Eudes Hounkpodote
Fèmi Christian Dossou (INSAE)
Mouchitaba Lawani Lawani (INSAE)
Charlotte Quenum (INSAE)
Gilles Kiki (INSAE)
Joelle Domingo (INSAE)
Emmanuel Goussanou (INSAE)
Didier Ganzo (INSAE)
Zulficar Sacko (INSAE)
Brice Tomavo (INSAE)

Serge Awolokou (Labo CNHU)
Claude Kokoun (Labo CNHU)
Sidonie Koudebi (Labo CNHU)
Andréa Dandjesso (Labo CNHU)
Parthénos Ahouannou (Labo CNHU)
MCA Aurore Ogouyemi-Hounto (CNERS/MS)
Dr Assomption Hounsa (CNERS/MS)
Gbodja Zomonto (CNERS/MS)
Idrissou Mama Sanni Mouniratou (CNLS/MS)
Mabou Ahokpossé (DSME/MS)
Jeannine Agbo Monlemey Lawani (DSME/MS)
Virgile Dodoo (ANV-SSP/MS)
Antoine Sianou (PNLP/MS)
Christian Godjo (PNLP/MS)
Georges Ogoudedji (SP-CAN)
Marcellin Zohoun (DDPD-Atlantique-Littoral)
T. Bienvenu Alohan (DDPD-Mono-Couffo)
Abdourassidou Zibrila (DDPD-Atacora-Donga)

Emile Aigbonoussi (INSAE)
Augustin L. Koukpoliyi (Labo CNHU)
Victoire Adinsi-de Souza (Labo CNHU)
Mireille Aguegue-Soglo (Labo CNHU)
David Biaou (Labo CNHU)
Nicaise Gninou (Labo CNHU)
Romaric Tchebe (Labo CNHU)

Jacques Tonon (DDPD-Atacora-Donga)
Boni Sounon Bouko (DDPD-Borgou-Alibori)
Franck Gohoungbe (DDPD-Borgou-Alibori)
Euloge Gaston Facounde (DDPD-Ouémé-Plateau)
Sabirou Aliou (DDPD-Ouémé-Plateau)
Yaovi Francis Kpohonsito (DDPD-Zou-Collines)

Coordination technique

Djabar Dine Adechian

Mémounath Bissiriou Zounon

Édition secondaire et finale

S. L. Gloria Solome
I. B. Nourou Dine Baparape Yallou
Alexandre Yessoufou
A. Jean-Baptiste Akonde
Abdouramane Idrissou
Etienne Somakou

Paterne Kougblenou
Jeannine Houeha
Renaud Yovoga
Rémy Hounguevou
Kocou Missihoun
Charlotte Quenum

Personnel d'ICF

Yodit Bekele
Bernard Barrère
Fidele Mutima
Ruilin Ren
Jose Miguel Guzman
Amadou Sow
Michel Toukam
Keith Purvis
Han Raggars
Sarah Balian
Monique Barrère
Rachel Orłowski

Metahan Traore
Jehan Ahmed
Tom Fish
Trinadh Dontamsetti
Natalie Shattuck
Chris Gramer
Nancy Johnson
Christian Reed
Jeremy Taglieri
Bridgette Wellington
Sarah Yang

**ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ (EDSB-V 2017)
QUESTIONNAIRE MÉNAGE**

RÉPUBLIQUE DU BENIN
MINISTÈRE DU PLAN ET DU DÉVELOPPEMENT

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ET DE L'ANALYSE ÉCONOMIQUE (INSAE)

IDENTIFICATION												
DÉPARTEMENT												
COMMUNE												
URBAIN/RURAL (URBAIN=1, RURAL=2)												
NOM DU CHEF DE MÉNAGE _____												
NUMÉRO DE GRAPPE												
NUMÉRO DU MÉNAGE												
MÉNAGE SÉLECTIONNÉ POUR L'ENQUÊTE HOMME ? (1=OUI, 2=NON)												
VISITES D'ENQUÊTEURS												
	1	2	3	VISITE FINALE								
DATE	_____	_____	_____	JOUR <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>								
NOM DE L'ENQUÊTEUR/ ENQUÊTRICE	_____	_____	_____	MOIS <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>								
RÉSULTAT*	_____	_____	_____	ANNÉE <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>	2	0	1					
2	0	1										
PROCHAINE DATE VISITE	_____	_____		No ENQUÊT <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>								
HEURE	_____	_____		ENQUÊT <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>								
CODES RÉSULTAT :				RÉSULTAT <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>								
1 REMPLI				TOTAL DE PERSONNES DANS LE MÉNAGE <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>								
2 PAS DE MEMBRE DU MÉNAGE À LA MAISON OU PAS D'ENQUÊTÉ COMPÉTENT À LA MAISON, AU MOMENT DE LA VISITE				TOTAL DE FEMMES ÉLIGIBLES <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>								
3 MÉNAGE TOTALEMENT ABSENT POUR UNE LONGUE PÉRIODE				TOTAL D'HOMMES ÉLIGIBLES <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>								
4 DIFFÉRÉ				No DE LIGNE DE L'ENQUÊTÉ POUR LE QUESTION- NAIRE MÉNAGE <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>								
5 REFUSÉ												
6 LOGEMENT VACANT OU PAS DE LOGEMENT À L'ADRESSE												
7 LOGEMENT DÉTRUIT												
8 LOGEMENT NON TROUVÉ												
9 AUTRE _____ (PRÉCISEZ)												
LANGUE DU QUESTIONNAIRE** <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>0</td><td>1</td></tr></table>	0	1	LANGUE DE L'INTERVIEW** <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>			LANGUE MATERNELLE DE L'ENQUÊTÉ** <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>			TRADUCTEUR (OUI = 1, NON = 2) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>			
0	1											
LANGUE DU QUESTIONNAIRE** FRANÇAIS	**CODES LANGUES :											
	01 FRANÇAIS	03 Bariba	05 Dendi	07 Autre								
	02 Adja	04 Fon	06 Yoruba									
SUPERVISEUR	ÉDITEUR											
_____	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>			_____	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>							
NOM	NUMÉRO	NOM	NUMÉRO									

CETTE PAGE EST LAISSÉE BLANCHE INTENTIONNELLEMENT

PRÉSENTATION ET DEMANDE DE CONSENTEMENT

Bonjour. Je m'appelle _____. Je travaille pour l'INSTITUT NATIONAL de la STATISTIQUE et de L'ANALYSE ECONOMIQUE (INSAE). Nous effectuons une enquête nationale sur la santé et sur d'autres sujets au Benin. Les informations que nous collectons aideront le gouvernement à améliorer les services de santé. Votre ménage a été sélectionné pour cette enquête. Nous voudrions vous poser quelques questions sur votre ménage. Les questions prennent habituellement entre 30-45 minutes. Toutes les informations que vous nous donnez sont strictement confidentielles et elles ne seront transmises à personne d'autres que les membres de l'équipe d'enquête. Vous n'êtes pas obligé de participer à cette enquête, mais nous espérons que vous accepterez de répondre à nos questions car votre opinion est très importante. S'il arrivait que je pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, dites-le moi et je passerai à la question suivante. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'enquête, vous pouvez contacter les personnes figurant sur cette carte.

DONNEZ LA CARTE AVEC LES INFORMATIONS POUR CONTACTER CES PERSONNES

Avez-vous des questions à me poser ?
Puis-je commencer l'interview maintenant ?

SIGNATURE DE L'ENQUÊTEUR _____ DATE _____

L'ENQUÊTÉ ACCEPTE
D'ÊTRE INTERVIEWÉ . . . 1

L'ENQUÊTÉ REFUSE
D'ÊTRE INTERVIEWÉ . . . 2 → FIN



100	NOTEZ L'HEURE.	HEURES	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>				
		MINUTES	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>				

TABLEAU MÉNAGE

No LIGNE	RÉSIDENTS HABITUELS ET VISITEURS	LIEN AVEC LE CHEF DE MÉNAGE	SEXE	RÉSIDENCE		ÂGE	SI 10 ANS OU PLUS	ÉLIGIBILITÉ				
				ÉTAT MATRIMONIAL	9		10	11	11A	11B		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	SI MÉNAGE SÉLECTIONNÉ POUR ENQUÊTE HOMME	
	S'il vous plaît, donnez-moi les noms des personnes qui vivent habituellement dans votre ménage et des visiteurs qui ont passé la nuit dernière ici, en commençant par le chef de ménage. APRÈS AVOIR LISTÉ LES NOMS ET ENREGISTRÉ LE LIEN DE PARENTÉ ET LE SEXE POUR CHAQUE PERSONNE, POSEZ LES QUESTIONS 2A-2C POUR VOUS ASSURER QUE LA LISTE EST COMPLÈTE. POSEZ ENSUITE LES QUESTIONS APPROPRIÉES DES COLONNES 5-20A POUR CHAQUE PERSONNE.	Quel est le lien de parenté de (NOM) avec le chef de ménage ? VOIR CODES CI-DESSOUS.	(NOM) est-il de sexe masculin ou féminin ?	(NOM) vit-il/elle ici habituellement ?	(NOM) a-t-il/elle passé la nuit dernière ici ?	Quel âge a (NOM) ? SI 95 OU PLUS, NOTEZ '95'.	Quel est l'état matrimonial actuel de (NOM) ? 1 = MARIÉ OU VIVANT ENSEMBLE 2 = DIVORCÉ/ SÉPARÉ 3 = VEUF 4 = JAMAIS MARIÉ ET N'A JAMAIS VÉCU AVEC QUELQU'UN	ENCER-CLEZ LE No DE LIGNE DE TOUTES LES FEMMES DE 15-49 ANS	ENCER-CLEZ LE No DE LIGNE DE TOUTES LES HOMMES DE 15-64 ANS	ENCER-CLEZ LE No DE LIGNE DE TOUS LES ENFANTS DE 0-5 ANS	ENCER-CLEZ LE No DE LIGNE DE TOUS LES FEMMES DE 30-49 ANS	ENCER-CLEZ LE No DE LIGNE DE TOUS LES HOMMES DE 30-64 ANS
01		<input type="text"/>	M F 1 2	O N 1 2	O N 1 2	EN ANNÉES <input type="text"/>	<input type="text"/>	01	01	01	01	01
02		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	02	02	02	02	02
03		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	03	03	03	03	03
04		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	04	04	04	04	04
05		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	05	05	05	05	05
06		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	06	06	06	06	06
07	75	<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	07	07	07	07	07
08		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	08	08	08	08	08
09		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	09	09	09	09	09
10		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	10	10	10	10	10

2A) Juste pour être sûre que j'ai une liste complète : y a-t-il d'autres personnes comme des petits enfants ou des nourrissons que nous n'avons pas listés ? OUI → AJOUTEZ AU TABLEAU NON

2B) Y a-t-il d'autres personnes qui ne sont peut-être pas membres de votre famille, comme des domestiques, locataires ou amis qui vivent habituellement ici ? OUI → AJOUTEZ AU TABLEAU NON

2C) Avez-vous des invités ou des visiteurs temporaires qui sont chez vous, ou d'autres personnes qui ont dormi ici la nuit dernière et qui n'ont pas été listés ? OUI → AJOUTEZ AU TABLEAU NON

- CODES POUR Q. 3: LIEN DE PARENTÉ AVEC CHEF DE MÉNAGE**
- 01 = CHEF DE MÉNAGE
 - 02 = FEMME OU MARI
 - 03 = FILS OU FILLE
 - 04 = GENDRE OU BELLE-FILLE
 - 05 = PETIT FILS/FILLE
 - 06 = PÈRE/MÈRE
 - 07 = BEAU-PARENT
 - 08 = FRÈRE OU SOEUR
 - 09 = AUTRE PARENT
 - 10 = ADOPTÉ /EN GARDE/ ENFANT DE LA FEMME/MARI
 - 11 = AUTRE FEMME DU CM (SI CM=HOMME)
 - 12 = COÉPOUSE (SI CM=FEMME)
 - 13 = SANS PARENTÉ
 - 98 = NE SAIT PAS

TABLEAU MÉNAGE

No LIGNE	MIGRATION DURÉE DE VIE POUR LES RESIDENTS					SI 0-17 ANS			
	LIEU DE NAISSANCE	RÉSIDENCE ANTERIEURE	DURÉE DANS LA RÉSIDENCE ACTUELLE	MIGRANT RETOUR	STATUT MIGRATOIRE	ÉTAT DE SURVIE ET RÉSIDENCE DES PARENTS BIOLOGIQUES			
	11C	11D	11E	11F	11G	12	13	14	15
	Dans quelle commune est né(e) (NOM) ? INSCRIRE DEP/COM OU PAYS POUR ETRANGER	Dans quelle commune residait (NOM) avant de s'installer ici ? INSCRIRE DEP/COM OU PAYS POUR ETRANGER	Quelle est la durée de séjour de (NOM) dans cette commune ? NOTER : 1 ET LE NOMBRE DE MOIS POUR DUREE < 1 AN OU 2 ET NOMBRE D'ANNEE POUR DUREE >= 1 AN ET 998 DEPUIS LA NAISSANCE → 11G	(NOM) est-elle de retour dans cette commune après y avoir séjourné pendant 6 mois au moins? O N 1 2	DEDUIRE LE STATUT MIGRATOIRE. INSCRIRE 1=NON MIGRANT SI Q.11E=9 ET 98 2=MIGRANT RETOUR SI Q.11E=9 ET 98 ET Q.11F=1 3= AUTRE MIGRANT RETOUR SI Q.11E=9 ET 98 ET Q.11F=2	La mère biologique de (NOM) est-elle en vie ? O N NSP 1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	La mère biologique de (NOM) vit-elle habituellement dans ce ménage ou était-elle en visite ici la nuit dernière ? SI OUI : Quel est son nom ? NOTEZ LE No DE LIGNE DE LA MÈRE. SI NON, NOTEZ '00'.	Le père biologique de (NOM) est-il en vie ? O N NSP 1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	Le père biologique de (NOM) vit-il habituellement dans ce ménage ou était-il en visite ici la nuit dernière ? SI OUI : Quel est son nom ? NOTEZ LE No DE LIGNE DU PERE. SI NON, NOTEZ '00'.
01	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
04	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
06	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
07	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
08	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
09	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CODES POUR Qs. 17 ET 19: NIVEAU D'INSTRUCTION

NIVEAU

1 = PRIMAIRE
2 = SECONDAIRE 1
3 = SECONDAIRE 2
4 = SUPÉRIEUR
5 = PRE-PRIMAIRE/
MATERNELLE
8 = NE SAIT PAS

CLASSE

00 = MOINS D'1 ANNÉE ACHEVÉE
(UTILISEZ '00' POUR Q. 17 SEULEMENT.
CE CODE N'EST PAS AUTORISÉ
POUR Q. 19.)
98 = NE SAIT PAS

	SI 5 ANS OU PLUS		SI 5-24 ANS		SI 0-4 ANS	SI AGE 6 ANS OU PLUS
No LIGNE	A FRÉQUENTÉ L'ÉCOLE		FRÉQUENTATION SCOLAIRE ACTUELLE/RÉCENTE		ENREGISTREMENT DES NAISSANCES	ALPHABÉTISATION
	16	17	18	19	20	20A
	(NOM) a-t-il/elle déjà fréquenté l'école ?	Quel est le plus haut niveau d'études que (NOM) a atteint ? Quelle est la dernière classe que (NOM) a achevée à ce niveau ? VOIR CODES CI-DESSOUS.	(Nom) a-t-il/elle fréquenté l'école à n'importe quel moment durant l'année scolaire 2016-2017 ?	Au cours de cette année scolaire, à quel niveau et en quelle classe était (NOM) ? VOIR CODES CI-DESSOUS.	(NOM) a-t-il/elle un certificat de naissance ? SI NON, INSISTEZ : La naissance de (NOM) a-t-elle été enregistrée à l'état civil ? 1 = A UN CERTIFICAT 2 = ENREGISTRÉE 3 = NI L'UN, NI L'AUTRE 8 = NE SAIT PAS	SI NIVEAU À COL.17 = 2, 3 OU 4 ; DEMANDEZ : (NOM) sait-il lire, écrire et comprendre au moins une langue nationale ? AUTRE ; DEMANDEZ (NOM) sait-il lire, écrire et comprendre au moins une langue ? SI OUI, lesquelles? 1 = AF 2 = ALN 3 = AFLN 4=NLE 8 = NE SAIT PAS
01	O N 1 2 ↓ 20A	NIVEAU CLASSE <input type="text"/> <input type="text"/>	O N 1 2 ↓ 20A	NIVEAU CLASSE <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
04	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
06	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
07	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
08	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
09	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CODES POUR Qs. 17 ET 19: NIVEAU D'INSTRUCTION / CLASSE

NIVEAU ATTEINT	1 = PRIMAIRE	2 = SECONDAIRE 1 ^{ER} CYCLE	3 = SECONDAIRE 2 ND CYCLE	4 = SUPÉRIEUR	5 = PRE-PRIMAIRE / MATERNELLE
< D'1 ANNÉE A-CHEVÉE EN CI = 0	< D'1 ANNÉE A-CHEVÉE EN 6 ^{EME} = 0	< D'1 ANNÉE A-CHEVÉE EN 2 ^{NDE} = 0	< D'1 ANNÉE A-CHEVÉE EN 1 ^{ERE} AN. = 0		
CI = 1	6 ^{EME} = 1	2 ^{NDE} = 1	1 ^{ERE} ANNÉE = 1		
ACHEVÉE CP = 2	5 ^{EME} = 2	1 ^{ERE} = 2	2 ^{EME} ANNÉE = 2		
AVEC CE1 = 3	4 ^{EME} = 3	TERMINALE = 3	3 ^{EME} ANNÉE = 3		
SUCCÈS CE2 = 4	3 ^{EME} = 4		4 ^{EME} AN. OU + = 4		
CM1 = 5					
CM2 = 6					
NSP = 8	NSP = 8	NSP = 8	NSP = 8		

CODES POUR Q.20A : ALPHABÉTISATION

AF = Alphabétisé en français
 ALN = Alphabétisé en langues nationales
 AFLN = Alphabétisé français et en langues nationales
 NLE = Ne sait ni lire, ni écrire
 NSP = Ne sait pas

TABLEAU MÉNAGE

No LIGNE	RÉSIDENTS HABITUELS ET VISITEURS	LIEN AVEC LE CHEF DE MÉNAGE	SEXE	RÉSIDENCE		ÂGE	SI 10 ANS OU PLUS	ÉLIGIBILITÉ					
				ÉTAT MATRIMONIAL	9		10	11	11A	11B			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11A	11B	
	S'il vous plaît, donnez-moi les noms des personnes qui vivent habituellement dans votre ménage et des visiteurs qui ont passé la nuit dernière ici, en commençant par le chef de ménage. APRÈS AVOIR LISTÉ LES NOMS ET ENREGISTRÉ LE LIEN DE PARENTÉ ET LE SEXE POUR CHAQUE PERSONNE, POSEZ LES QUESTIONS 2A-2C POUR VOUS ASSURER QUE LA LISTE EST COMPLÈTE. POSEZ ENSUITE LES QUESTIONS APPROPRIÉES DES COLONNES 5-20A POUR CHAQUE PERSONNE.	Quel est le lien de parenté de (NOM) avec le chef de ménage ? VOIR CODES CI-DESSOUS.	(NOM) est-il de sexe masculin ou féminin ? M F 1 2	(NOM) vit-il/elle ici habituellement ? O N 1 2	(NOM) a-t-il/elle passé la nuit dernière ici ? O N 1 2	Quel âge a (NOM) ? EN ANNÉES [][]	Quel est l'état matrimonial actuel de (NOM) ? 1 = MARIÉ OU VIVANT ENSEMBLE 2 = DIVORCÉ/ SÉPARÉ 3 = VEUF 4 = JAMAIS MARIÉ ET N'A JAMAIS VÉCU AVEC QUELQU'UN	ENCER-CLEZ LE No DE LIGNE DE TOUTES LES FEMMES DE 15-49 ANS	SI MÉNAGE SÉLECTIONNÉ POUR ENQUÊTE HOMME	ENCER-CLEZ LE No DE LIGNE DE TOUS LES ENFANTS DE 0-5 ANS	ENCER-CLEZ LE No DE LIGNE DE TOUS LES HOMMES DE 15-64 ANS	ENCER-CLEZ LE No DE LIGNE DE TOUS LES HOMMES DE 30-64 ANS	ENCER-CLEZ LE No DE LIGNE DE TOUS LES HOMMES DE 30-64 ANS
11		[][]	1 2	1 2	1 2	[][]	[]	11	11	11	11	11	
12		[][]	1 2	1 2	1 2	[][]	[]	12	12	12	12	12	
13		[][]	1 2	1 2	1 2	[][]	[]	13	13	13	13	13	
14		[][]	1 2	1 2	1 2	[][]	[]	14	14	14	14	14	
15		[][]	1 2	1 2	1 2	[][]	[]	15	15	15	15	15	
16		[][]	1 2	1 2	1 2	[][]	[]	16	16	16	16	16	
17		[][]	1 2	1 2	1 2	[][]	[]	17	17	17	17	17	
18		[][]	1 2	1 2	1 2	[][]	[]	18	18	18	18	18	
19		[][]	1 2	1 2	1 2	[][]	[]	19	19	19	19	19	
20		[][]	1 2	1 2	1 2	[][]	[]	20	20	20	20	20	

COCHEZ ICI SI UNE AUTRE FEUILLE EST UTILISÉE

CODES POUR Q. 3: LIEN DE PARENTÉ AVEC CHEF DE MÉNAGE

- | | |
|----------------------------|--|
| 01 = CHEF DE MÉNAGE | 09 = AUTRE PARENT |
| 02 = FEMME OU MARI | 10 = ADOPTÉ /EN GARDE/ ENFANT DE LA FEMME/MARI |
| 03 = FILS OU FILLE | 11 = AUTRE FEMME DU CM (SI CM=HOMME) |
| 04 = GENDRE OU BELLE-FILLE | 12 = COÉPOUSE (SI CM=FEMME) |
| 05 = PETIT FILS/FILLE | 13 = SANS PARENTÉ |
| 06 = PÈRE/MÈRE | 98 = NE SAIT PAS |
| 07 = BEAU-PARENT | |
| 08 = FRÈRE OU SOEUR | |

TABLEAU MÉNAGE

No LIGNE	MIGRATION DURÉE DE VIE POUR LES RESIDENTS					SI 0-17 ANS			
	LIEU DE NAISSANCE	RÉSIDENCE ANTÉRIEURE	DURÉE DANS LA RÉSIDENCE ACTUELLE	MIGRANT RETOUR	STATUT MIGRATOIRE	ÉTAT DE SURVIE ET RÉSIDENCE DES PARENTS BIOLOGIQUES			
	11C	11D	11E	11F	11G	12	13	14	15
	Dans quelle commune est né(é) (NOM) ? INSCRIRE DEP/COM OU PAYS POUR ETRANGER	Dans quelle commune residait (NOM) avant de s'installer ici ? INSCRIRE DEP/COM OU PAYS POUR ETRANGER	Quelle est la durée de séjour de (NOM) dans cette commune ? NOTER : 1 ET LE NOMBRE DE MOIS POUR DUREE < 1 AN OU 2 ET NOMBRE D'ANNEE POUR DUREE >= 1 AN ET 998 DEPUIS LA NAISSANCE → 11G	(NOM) est-elle de retour dans cette commune après y avoir séjourné pendant 6 mois au moins?	DEDUIRE LE STATUT MIGRATOIRE. INSCRIRE 1=NON MIGRANT SI Q.11E=9 ET 98 2=MIGRANT RETOUR SI Q.11E#9 ET 98 ET Q.11F=1 3= AUTRE MIGRANT RETOUR SI Q.11E#9 ET 98 ET Q.11F=2	La mère biologique de (NOM) est-elle en vie ?	La mère biologique de (NOM) vit-elle habituellement dans ce ménage ou était-elle en visite ici la nuit dernière ? SI OUI : Quel est son nom ? NOTEZ LE No DE LIGNE DE LA MÈRE. SI NON, NOTEZ '00'.	Le père biologique de (NOM) est-il en vie ?	Le père biologique de (NOM) vit-il habituellement dans ce ménage ou était-il en visite ici la nuit dernière ? SI OUI : Quel est son nom ? NOTEZ LE No DE LIGNE DU PÈRE. SI NON, NOTEZ '00'.
11	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	O N 1 2	<input type="text"/>	O N NSP 1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	O N NSP 1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>
12	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 2	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>
13	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 2	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>
14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 2	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>
15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 2	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>
16	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 2	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>
17	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 2	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>
18	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 2	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>
19	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 2	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>
20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 2	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>

	SI 5 ANS OU PLUS		SI 5-24 ANS		SI 0-4 ANS	SI AGE 6 ANS OU PLUS
No LIGNE	A FRÉQUENTÉ L'ÉCOLE		FRÉQUENTATION SCOLAIRE ACTUELLE/RÉCENTE		ENREGISTREMENT DES NAISSANCES	ALPHABÉTISATION
	16	17	18	19	20	20A
	(NOM) a-t-il/elle déjà fréquenté l'école ?	Quel est le plus haut niveau d'études que (NOM) a atteint ? Quelle est la dernière classe que (NOM) a achevée à ce niveau ? VOIR CODES CI-DESSOUS.	(Nom) a-t-il/elle fréquenté l'école à n'importe quel moment durant l'année scolaire 2016-2017 ?	Au cours de cette année scolaire, à quel niveau et en quelle classe était (NOM) ? VOIR CODES CI-DESSOUS.	(NOM) a-t-il/elle un certificat de naissance ? SI NON, INSISTEZ : La naissance de (NOM) a-t-elle été enregistrée à l'état civil ? 1 = A UN CERTIFICAT 2 = ENREGISTRÉE 3 = NI L'UN, NI L'AUTRE 8 = NE SAIT PAS	SI NIVEAU À COL.17 = 2, 3 OU 4 ; DEMANDEZ : (NOM) sait-il lire, écrire et comprendre au moins une langue nationale ? AUTRE ; DEMANDEZ (NOM) sait-il lire, écrire et comprendre au moins une langue ? SI OUI, lesquelles? 1 = AF 2 = ALN 3 = AFLN 4=NLE 8 = NE SAIT PAS
11	O N 1 2 ↓ 20A	NIVEAU CLASSE <input type="text"/> <input type="text"/>	O N 1 2 ↓ 20A	NIVEAU CLASSE <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
12	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
14	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
15	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
16	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
17	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
18	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
19	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
20	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	1 2 ↓ 20A	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CODES POUR Qs. 17 ET 19: NIVEAU D'INSTRUCTION / CLASSE

NIVEAU ATTEINT	1 = PRIMAIRE	2 = SECONDAIRE 1 ^{ER} CYCLE	3 = SECONDAIRE 2 ND CYCLE	4 = SUPÉRIEUR	5 = PRÉ-PRIMAIRE / MATERNELLE
CLASSE	< D'1 ANNÉE A-CHEVÉE EN CI = 0	< D'1 ANNÉE A-CHEVÉE EN 6 ^{EME} = 0	< D'1 ANNÉE A-CHEVÉE EN 2 ^{NDE} = 0	< D'1 ANNÉE A-CHEVÉE EN 1 ^{ERE} AN. = 0	
CLASSE	CI = 1	6 ^{EME} = 1	2 ^{NDE} = 1	1 ^{ERE} ANNÉE = 1	
ACHEVÉE	CP = 2	5 ^{EME} = 2	1 ^{ERE} = 2	2 ^{EME} ANNÉE = 2	
AVEC SUCCÈS	CE1 = 3	4 ^{EME} = 3	TERMINALE = 3	3 ^{EME} ANNÉE = 3	
	CE2 = 4	3 ^{EME} = 4		4 ^{EME} AN. OU + = 4	
	CM1 = 5				
	CM2 = 6				
	NSP = 8	NSP = 8	NSP = 8	NSP = 8	

CODES POUR Q.20A : ALPHABÉTISATION

AF = Alphabétisé en français
 ALN = Alphabétisé en langues nationales
 AFLN = Alphabétisé français et en langues nationales
 NLE = Ne sait ni lire, ni écrire
 NSP = Ne sait pas

CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
101	D'où provient principalement l'eau que boivent les membres de votre ménage ?	<p>EAU DU ROBINET</p> <p>ROBINET DANS LOGEMENT 11</p> <p>ROBINET DANS COUR/PARCELLE 12</p> <p>ROBINET CHEZ UN VOISIN 13</p> <p>ROBINET PUBLIC/BORNE FONTAINE 14</p> <p>PUITS À POMPE OU FORAGE 21</p> <p>PUITS CREUSÉ</p> <p>PUITS PROTÉGÉ 31</p> <p>PUITS NON PROTÉGÉ 32</p> <p>EAU DE SOURCE</p> <p>SOURCE PROTÉGÉE 41</p> <p>SOURCE NON PROTÉGÉE 42</p> <p>EAU DE PLUIE 51</p> <p>CAMION CITERNE 61</p> <p>CHARRETTE AVEC PETITE CITERNE/ TONNEAU 71</p> <p>EAU DE SURFACE (RIVIÈRE/BARRAGE/LAC/ MARE/FLEUVE/CANAL/ CANAL D'IRRIGATION) 81</p> <p>EAU EN BOUTEILLE 91</p> <p>EAU EN SACHET 92</p> <p>AUTRE _____ 96</p> <p align="center">(PRÉCISEZ)</p>	<p>→ 106</p> <p>→ 103</p> <p>→ 103</p>
102	D'où provient principalement l'eau utilisée par votre ménage à d'autres fins comme pour faire la cuisine et se laver les mains ?	<p>EAU DU ROBINET</p> <p>ROBINET DANS LOGEMENT 11</p> <p>ROBINET DANS COUR/PARCELLE 12</p> <p>ROBINET CHEZ UN VOISIN 13</p> <p>ROBINET PUBLIC/BORNE FONTAINE 14</p> <p>PUITS À POMPE OU FORAGE 21</p> <p>PUITS CREUSÉ</p> <p>PUITS PROTÉGÉ 31</p> <p>PUITS NON PROTÉGÉ 32</p> <p>EAU DE SOURCE</p> <p>SOURCE PROTÉGÉE 41</p> <p>SOURCE NON PROTÉGÉE 42</p> <p>EAU DE PLUIE 51</p> <p>CAMION CITERNE 61</p> <p>CHARRETTE AVEC PETITE CITERNE/ TONNEAU 71</p> <p>EAU DE SURFACE (RIVIÈRE/BARRAGE/LAC/ MARE/FLEUVE/CANAL/ CANAL D'IRRIGATION) 81</p> <p>AUTRE _____ 96</p> <p align="center">(PRÉCISEZ)</p>	<p>→ 106</p>
103	Où est située cette source d'approvisionnement de l'eau ?	<p>DANS VOTRE LOGEMENT 1</p> <p>DANS VOTRE COUR/PARCELLE 2</p> <p>AILLEURS 3</p>	<p>→ 105</p>
104	Combien de temps faut-il pour s'y rendre, prendre l'eau et revenir ?	<p>MINUTES <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NE SAIT PAS 998</p>	
105	<p>VÉRIFIEZ 101 ET 102 : CODE '14' OU '21' ENGERCLÉ</p> <p>OUI <input type="checkbox"/></p> <p>NON <input type="checkbox"/></p>		<p>→ 107</p>

CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À		
106	Est-ce qu'au cours des deux dernières semaines, il est arrivé qu'à cet endroit, l'eau n'ait pas été disponible pendant au moins toute une journée ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8			
107	Faites-vous quelque chose pour rendre l'eau plus saine à boire ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 109		
108	Habituellement, que faites-vous pour rendre l'eau que vous buvez plus saine ? Quelque chose d'autre ? ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	LA FAIRE BOUILLIR A AJOUTER EAU DE JAVEL/CHLORE B AJOUTER AQUATAB C LA FILTRER À TRAVERS UN LINGE D UTILISER UN FILTRE (CÉRAMIQUE/ SABLE/COMPOSITE/ETC.) E DÉSINFECTION SOLAIRE F LA LAISSER REPOSER G AUTRE X (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS Z			
109	Quel type de toilettes les membres de votre ménage utilisent-ils habituellement ? S'IL N'EST PAS POSSIBLE DE DÉTERMINER LE TYPE DE TOILETTES, DEMANDEZ LA PERMISSION DE VOIR L'INSTALLATION.	CHASSE D'EAU/CHASSE MANUELLE CHASSE D'EAU CONNECTÉE À UN SYSTÈME D'ÉGOUT 11 À UNE FOSSE SEPTIQUE 12 À UNE FOSSE D'AISANCES 13 À QUELQUE CHOSE D'AUTRE 14 À NE SAIT PAS OÙ 15 FOSSE D'AISANCES FOSSES/LATRINES VENTILÉES AMÉLIORÉES 21 FOSSES D'AISANCES AVEC DALLE 22 FOSSES D'AISANCES SANS DALLE TROU OUVERT 23 TOILETTES À COMPOSTAGE 31 SEAU/TINETTE 41 TOILETTES/LATRINES SUSPENDUES 51 PAS DE TOILETTES/NATURE 61 AUTRE 96 (PRÉCISEZ)	→ 113		
110	Partagez-vous ces toilettes avec d'autres ménages ?	OUI 1 NON 2	→ 112		
111	En comptant votre propre ménage, combien de ménages utilisent ces toilettes ?	NOMBRE DE MÉNAGES SI MOINS DE 10 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px;"></td></tr></table> 10 MÉNAGES OU PLUS 95 NE SAIT PAS 98	0		
0					
112	Où se trouvent ces toilettes ?	DANS VOTRE LOGEMENT 1 DANS VOTRE COUR/PARCELLE 2 AILLEURS 3			

CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
113	Quel type de combustible votre ménage utilise-t-il principalement pour cuisiner ?	ÉLECTRICITÉ 01 GAZ PROPANE LIQUÉFIÉ (GPL) 02 GAZ NATUREL 03 BIOGAZ 04 KÉROSÉNE 05 CHARBON, LIGNITE 06 CHARBON DE BOIS 07 BOIS 08 PAILLE/BRANCHAGES/HERBES 09 RÉSIDUS AGRICOLES 10 BOUSE 11 PAS DE REPAS PRÉPARÉ DANS LE MÉNAGE 95 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	→ 116
114	Est-ce que la cuisine est faite habituellement dans la maison, dans un bâtiment séparé ou à l'extérieur ?	DANS LA MAISON 1 DANS UN BÂTIMENT SÉPARÉ 2 À L'EXTÉRIEUR 3 AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ)	→ 116
115	Avez-vous une pièce séparée que vous utilisez comme cuisine ?	OUI 1 NON 2	
116	Dans ce ménage, combien de pièces utilisez-vous pour dormir ?	NOMBRE DE PIÈCES <input type="text"/> <input type="text"/>	
117	Est-ce que votre ménage possède du bétail, des troupeaux, d'autres animaux de ferme ou de la volaille ?	OUI 1 NON 2	→ 119
118	Parmi les animaux suivants, combien votre ménage en possède-t-il ? SI AUCUN, NOTEZ '00'. SI 95 OU PLUS, NOTEZ '95'. SI NE SAIT PAS, NOTEZ '98'. a) Vaches laitières ou taureaux ? b) Autre bétail ? c) Chevaux, ânes ou mules ? d) Chèvres ? e) Moutons ? f) Poulets ou autre volaille ? g) Porcs/cochons h) Lapins	a) VACHES/TAUREAUX <input type="text"/> <input type="text"/> b) AUTRE BÉTAIL <input type="text"/> <input type="text"/> c) CHEVAUX/ÂNES/MULES <input type="text"/> <input type="text"/> d) CHÈVRES <input type="text"/> <input type="text"/> e) MOUTONS <input type="text"/> <input type="text"/> f) POULETS/AUTRE VOLAILLE <input type="text"/> <input type="text"/> g) PORCS/COCHONS <input type="text"/> <input type="text"/> h) LAPINS <input type="text"/> <input type="text"/>	
119	Est-ce qu'un membre de votre ménage possède des terres cultivables ?	OUI 1 NON 2	→ 121
120	Combien d'hectares de terres cultivables les membres du ménage possèdent-ils ? SI 95 OU PLUS, ENCERCLEZ '950'.	HECTARES <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> 95 HECTARES OU PLUS 950 NE SAIT PAS 998	

CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES		ALLEZ À
121	Dans ce ménage, avez-vous :	OUI	NON	
	a) L'électricité ?	a) ÉLECTRICITÉ 1	2	
	b) Un poste radio ?	b) RADIO 1	2	
	c) Une télévision ?	c) TÉLÉVISION 1	2	
	d) Un téléphone fixe ?	d) TÉLÉPHONE FIXE 1	2	
	e) Un ordinateur ?	e) ORDINATEUR 1	2	
	f) Un réfrigérateur ?	f) RÉFRIGÉRATEUR 1	2	
	g) Groupe électrogène	g) GROUPE ELECTROG 1	2	
	h) Chaîne HI-FI	h) CHAÎNE HI-FI 1	2	
	i) Une cuisinière ?	i) CUISINIÈRE .. 1	2	
	j) Lecteur VCD/DVD	j) LECTEUR DVD 1	2	
	k) Magnétoscope	k) MAGNETOSCOPE .. 1	2	
	l) Une connexion internet ?	l) CONNEXION INTERNET 1	2	
	m) Une machine à laver	m) MACHINE A LAVER 1	2	
122	Est-ce qu'un membre de votre ménage possède :	OUI	NON	
	a) Une montre ?	a) MONTRE 1	2	
	b) Un téléphone portable ?	b) TÉLÉPHONE PORTABLE .. 1	2	
	c) Une bicyclette ?	c) BICYCLETTE..... 1	2	
	d) Une motocyclette ou un scooter ?	d) MOTOCYCLETTE/SCOOTER 1	2	
	e) Une charrette tirée par un animal ?	e) CHARRETTE AVEC ANIMAL .. 1	2	
	f) Une voiture ou une camionnette ?	f) VOITURE/CAMIONNETTE 1	2	
	g) Un bateau à moteur ?	g) BATEAU À MOTEUR 1	2	
	h) Une pirogue	h) PIROGUE 1	2	
123	Est-ce qu'un membre de votre ménage a un compte en banque ?	OUI 1	NON 2	
123A	Est-ce qu'un membre de votre ménage a un compte dans une autre structure de micro-finance ?	OUI 1	NON 2	
124	Est-ce qu'il arrive que quelqu'un fume dans votre maison ? Diriez-vous que cela arrive tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois, moins d'une fois par mois ou jamais ?	TOUS LES JOURS 1	UNE FOIS PAR SEMAINE 2	
		UNE FOIS PAR MOIS 3	MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS 4	
		JAMAIS 5		
125	Est-ce qu'à n'importe quel moment au cours des 12 derniers mois, quelqu'un est venu dans votre logement pour pulvériser les murs intérieurs contre les moustiques ?	OUI 1	NON 2	→ 127
		NE SAIT PAS 8		
126	Qui a pulvérisé les murs du logement ?	EMPLOYÉ/PROGRAMME GOUVERNEMENT .. A	SOCIÉTÉ PRIVÉE B	
		ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE (ONG) C	AUTRE X	
		(PRÉCISEZ)	NE SAIT PAS Z	
127	Est-ce que votre ménage a des moustiquaires ?	OUI 1	NON 2	→ 139
128	Combien de moustiquaires votre ménage a-t-il ?	NOMBRE DE MOUSTIQUAIRES <input type="text"/>		
	SI 7 MOUSTIQUAIRES OU PLUS, NOTEZ '7'.			

MOUSTIQUAIRES

		MOUSTIQUAIRE #1	MOUSTIQUAIRE #2	MOUSTIQUAIRE #3
129	DEMANDEZ À L'ENQUÊTÉ DE VOUS MONTRER TOUTES LES MOUSTIQUAIRES DU MÉNAGE. SI PLUS DE 3 MOUSTIQUAIRES, UTILISEZ UN/DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES.	OBSERVÉE 1 NON OBSERVÉE 2	OBSERVÉE 1 NON OBSERVÉE 2	OBSERVÉE 1 NON OBSERVÉE 2
130	Cela fait combien de mois que votre ménage a la moustiquaire ? SI MOINS D'UN MOIS, NOTEZ '00'.	IL Y A <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS PLUS DE 36 MOIS 95 PAS SÛR 98	IL Y A <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS PLUS DE 36 MOIS 95 PAS SÛR 98	IL Y A <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS PLUS DE 36 MOIS 95 PAS SÛR 98
131	OBSERVEZ OU DEMANDEZ LA MARQUE/TYPE DE LA MOUSTIQUAIRE. SI LA MARQUE N'EST PAS CONNUE ET SI VOUS NE POUVEZ PAS VOIR LA MOUSTIQUAIRE, MONTREZ À L'ENQUÊTÉ DES PHOTOS DE MARQUES ET DE TYPES COURANTS DE MOUSTIQUAIRE.	MOUSTIQUAIRE IMPRÉGNÉE D'INSECTICIDE À LONGUE DURÉE D'ACTION (MIILDA) PERMANET 11 OLYSET 12 DURANET 13 NETPROTECT 14 INTERCEPTOR 15 AUTRE/NE CONNAÎT PAS LA MARQUE ... 16 (ALLEZ À 134) AUTRE TYPE 96 NE CONNAÎT PAS TYPE 98	MOUSTIQUAIRE IMPRÉGNÉE D'INSECTICIDE À LONGUE DURÉE D'ACTION (MIILDA) PERMANET 11 OLYSET 12 DURANET 13 NETPROTECT 14 INTERCEPTOR 15 AUTRE/NE CONNAÎT PAS LA MARQUE ... 16 (ALLEZ À 134) AUTRE TYPE 96 NE CONNAÎT PAS TYPE 98	MOUSTIQUAIRE IMPRÉGNÉE D'INSECTICIDE À LONGUE DURÉE D'ACTION (MIILDA) PERMANET 11 OLYSET 12 DURANET 13 NETPROTECT 14 INTERCEPTOR 15 AUTRE/NE CONNAÎT PAS LA MARQUE ... 16 (ALLEZ À 134) AUTRE TYPE 96 NE CONNAÎT PAS TYPE 98
132	Depuis que vous avez la moustiquaire, a-t-elle été trempée ou plongée dans un liquide pour tuer ou éloigner les moustiques ?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 134) PAS SÛR 8	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 134) PAS SÛR 8	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 134) PAS SÛR 8
133	Cela fait combien de mois que la moustiquaire a été trempée ou plongée pour la dernière fois ? S'IL Y A MOINS D'UN MOIS, INSCRIVEZ '00'.	IL Y A <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS IL Y A PLUS DE 24 MOIS 95 PAS SÛR 98	IL Y A <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS IL Y A PLUS DE 24 MOIS 95 PAS SÛR 98	IL Y A <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS IL Y A PLUS DE 24 MOIS 95 PAS SÛR 98
134	Avez-vous obtenu la moustiquaire à l'occasion d'une campagne de distribution de masse, durant une visite prénatale, au cours d'une visite pour une vaccination, ou dans une école primaire ?	OUI, CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DE MASSE 1 OUI, PRÉNATALE 2 OUI, VISITE POUR VACCINATION 3 OUI, ÉCOLE PRIMAIRE 4 (ALLEZ À 136) NON 5	OUI, CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DE MASSE 1 OUI, PRÉNATALE 2 OUI, VISITE POUR VACCINATION 3 OUI, ÉCOLE PRIMAIRE 4 (ALLEZ À 136) NON 5	OUI, CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DE MASSE 1 OUI, PRÉNATALE 2 OUI, VISITE POUR VACCINATION 3 OUI, ÉCOLE PRIMAIRE 4 (ALLEZ À 136) NON 5
135	Où avez-vous obtenu la moustiquaire ?	ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DU GOV. .. 01 ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ PRIVÉ 02 PHARMACIE 03 BOUTIQUE/MARCHÉ .. 04 AGENT SANTÉ COMMUN. 05 INSTITUTION RELIGIEUSE 06 ÉCOLE 07 AUTRE 96 NE SAIT PAS 98	ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DU GOV. .. 01 ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ PRIVÉ 02 PHARMACIE 03 BOUTIQUE/MARCHÉ .. 04 AGENT SANTÉ COMMUN. 05 INSTITUTION RELIGIEUSE 06 ÉCOLE 07 AUTRE 96 NE SAIT PAS 98	ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DU GOV. .. 01 ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ PRIVÉ 02 PHARMACIE 03 BOUTIQUE/MARCHÉ .. 04 AGENT SANTÉ COMMUN. 05 INSTITUTION RELIGIEUSE 06 ÉCOLE 07 AUTRE 96 NE SAIT PAS 98

MOUSTIQUAIRES

		MOUSTIQUAIRE #1	MOUSTIQUAIRE #2	MOUSTIQUAIRE #3
135A	Comment cette moustiquaire a-t-elle été acquise ?	ACHAT SANS COUPON 01 ACHAT AVEC COUPON 02 GRATUITEMENT 03 AUTRE _____ .. 06 (PRÉCISER) NE SAIT PAS 08	ACHAT SANS COUPON 01 ACHAT AVEC COUPON 02 GRATUITEMENT 03 AUTRE _____ 06 (PRÉCISER) NE SAIT PAS 08	ACHAT SANS COUPON 01 ACHAT AVEC COUPON 02 GRATUITEMENT 03 AUTRE _____ .. 06 (PRÉCISER) NE SAIT PAS 08
136	Est-ce que, la nuit dernière, quelqu'un a dormi sous cette moustiquaire ?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 138) ← PAS SÛR 8	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 138) ← PAS SÛR 8	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 138) ← PAS SÛR 8
137	Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière ? INSCRIVEZ LE NOM DE LA PERSONNE ET SON NUMÉRO DE LIGNE DU TABLEAU MÉNAGE.	NOM _____ No DE LIGNE. .. <input type="text"/> <input type="text"/> ----- NOM _____ No DE LIGNE. .. <input type="text"/> <input type="text"/> ----- NOM _____ No DE LIGNE .. <input type="text"/> <input type="text"/> ----- NOM _____ No DE LIGNE. .. <input type="text"/> <input type="text"/>	NOM _____ No DE LIGNE. .. <input type="text"/> <input type="text"/> ----- NOM _____ No DE LIGNE. .. <input type="text"/> <input type="text"/> ----- NOM _____ No DE LIGNE .. <input type="text"/> <input type="text"/> ----- NOM _____ No DE LIGNE. .. <input type="text"/> <input type="text"/>	NOM _____ No DE LIGNE. .. <input type="text"/> <input type="text"/> ----- NOM _____ No DE LIGNE. .. <input type="text"/> <input type="text"/> ----- NOM _____ No DE LIGNE. .. <input type="text"/> <input type="text"/> ----- NOM _____ No DE LIGNE. .. <input type="text"/> <input type="text"/>
138		RETOURNEZ À 129 POUR LA MOUSTIQUAIRE SUIVANTE; S'IL N'Y A PLUS DE MOUSTIQUAIRE, ALLEZ À Q.139.	RETOURNEZ À 129 POUR LA MOUSTIQUAIRE SUIVANTE; S'IL N'Y A PLUS DE MOUSTIQUAIRE, ALLEZ À Q.139.	ALLEZ À 129, PREMIÈRE COL. D'UN NOUVEAU QUESTIONNAIRE ; SI PLUS DE MOUSTIQUAIRE, ALLEZ À Q.139.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES DU LOGEMENT

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
139	Nous voudrions connaître l'endroit utilisé par les membres du ménage pour se laver les mains. Pouvez-vous me montrer, s'il vous plait, où les membres du ménage se lavent les mains ?	OBSERVÉ, ENDROIT FIXE 1 OBSERVÉ, NON FIXE 2 NON OBSERVÉ, PAS DANS LOGEMENT /COUR/PARCELLE ... 3 NON OBSERVÉ, PERMISSION DE VOIR NON OBTENUE 4 NON OBSERVÉ, AUTRE RAISON 5	→ 142
140	OBSERVEZ LA PRÉSENCE D'EAU À L'ENDROIT UTILISÉ POUR SE LAVER LES MAINS. NOTEZ L'OBSERVATION.	EAU DISPONIBLE 1 EAU NON DISPONIBLE 2	
141	OBSERVEZ LA PRÉSENCE DE SAVON, DE DÉTERGENT OU D'AUTRES PRODUITS NETTOYANTS À L'ENDROIT UTILISÉ POUR SE LAVER LES MAINS NOTEZ L'OBSERVATION.	SAVON OU DÉTERGENT (EN MORCEAU, LIQUIDE, POUDRE, PÂTE) A CENDRE, BOUE, SABLE B AUCUN Y	
142	OBSERVEZ LE MATÉRIAU PRINCIPAL DU SOL DU LOGEMENT. NOTEZ L'OBSERVATION	MATÉRIAU NATUREL TERRE/SABLE 11 BOUSE 12 MATÉRIAU RUDIMENTAIRE PLANCHES EN BOIS 21 PALMES/BAMBOU 22 MATÉRIAU ÉLABORÉ PARQUET OU BOIS CIRÉ 31 BANDES DE VINYLE/ASPHALTE 32 CARRELAGE 33 CIMENT 34 MOQUETTE 35 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
143	OBSERVEZ LE MATÉRIAU PRINCIPAL DU TOIT DU LOGEMENT. NOTEZ L'OBSERVATION.	MATÉRIAU NATUREL PAS DE TOIT 11 CHAUME/PALMES/FEUILLES 12 MOTTES DE TERRE 13 MATÉRIAU RUDIMENTAIRE NATTE 21 PALMES/BAMBOU 22 PLANCHES EN BOIS 23 CARTON 24 MATÉRIAU ÉLABORÉ TÔLE 31 BOIS 32 ZINC/FIBRE DE CIMENT 33 TUILES 34 CIMENT 35 SHINGLES 36 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	

AUTRES CARACTÉRISTIQUES DU LOGEMENT

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
144	OBSERVEZ LE MATÉRIAU PRINCIPAL DES MURS EXTÉRIEURS DU LOGEMENT. NOTEZ L'OBSERVATION.	MATÉRIAU NATUREL PAS DE MUR 11 BAMBOU/CANE/PALME/TRONC 12 TERRE 13 MATÉRIAU RUDIMENTAIRE BAMBOU AVEC BOUE 21 PIERRES AVEC BOUE 22 ADOBE NON RECOUVERT 23 CONTRE-PLAQUÉ 24 CARTON 25 BOIS DE RÉCUPÉRATION 26 MATÉRIAU ÉLABORÉ CIMENT 31 PIERRES AVEC CHAUX/CIMENT 32 BRIQUES 33 BLOCS DE CIMENT 34 ADOBE RECOUVERT 35 PLANCHE EN BOIS/SHINGLES 36 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
144A	Où jetez-vous habituellement vos ordures ménagères?	VOIRIE PUBLIQUE 01 VOIRIE PRIVÉE/ONG 02 ENTERRÉES 03 BRULÉES 04 DANS LA COUR 05 DANS LA NATURE/DEHORS 06 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
144B	Où jetez-vous habituellement vos eaux usées ?	CANIVEAU FERME 01 CANIVEAU A CIEL OUVERT 02 FOSSE SEPTIQUE 03 PUIITS PERDUS 04 EGOUTS 05 DANS LA COUR 06 DANS LA NATURE/DEHORS 7 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
145	Je voudrais vérifier si le sel utilisé dans votre ménage est iodé. Puis-je avoir un peu de sel qui est utilisé pour cuisiner dans votre ménage ? TEST DU SEL POUR L'IODE	PRÉSENCE D'IODE 1 PAS D'IODE 2 PAS DE SEL DANS LE MÉNAGE 3 SEL NON TESTÉ _____ 6 (PRÉCISEZ LA RAISON)	

SELECTION D'UN ENFANT POUR LE TRAVAIL ET DISCIPLINE DES ENFANTS

NO.	QUESTIONS ET FILTRES	CODES																																																																		
151	VÉRIFIER COL. 7 DANS LA LISTE DES MEMBRES DU MÉNAGE ET ÉCRIRE LE NOMBRE TOTAL D'ENFANTS DE 1-17 ANS.	NOMBRE TOTAL <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>																																																																		
152	<p>VÉRIFIER LE NOMBRE D'ENFANTS DE 1-17 ANS DANS Q.151:</p> <p style="text-align:center;">ZÉRO <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> → ALLER À Q. 185</p> <p style="text-align:center;">DEUX OU PLUS <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> ↓</p> <p style="text-align:center;">UN <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> →</p>	<p>ALLER À Q.159 ET ENREGISTRER LE NUMÉRO DE RANG COMME '1', ENTRER LE NUMÉRO DE LIGNE, LE NOM DE L'ENFANT ET SON ÂGE</p>																																																																		
152A	<p>LISTER CHAQUE ENFANT ÂGÉ DE 1-17 ANS CI-DESSOUS DANS L'ORDRE DANS LEQUEL ILS APPARAISSENT DANS LA LISTE DES MEMBRES DU MÉNAGE. N'INCLUEZ PAS D'AUTRES MEMBRES DU MÉNAGE EN DEHORS DU GROUPE D'ÂGE 1-17 ANS. ENREGISTRER LE NUMÉRO DE LIGNE, LE NOM, LE SEXE ET L'ÂGE DE CHAQUE ENFANT.</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">153. NUMÉRO DE RANG</th> <th style="width:15%;">154. NUMÉRO DE LIGNE DE COL.1</th> <th style="width:35%;">155. NOM DE COL. 2</th> <th colspan="2" style="width:15%;">156. SEXE DE COL. 4</th> <th style="width:15%;">157. ÂGE DE COL. 7</th> </tr> <tr> <th>RANG</th> <th>LIGNE</th> <th>NOM</th> <th>M</th> <th>F</th> <th>ÂGE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align:center;">1</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td><td>_____</td><td style="text-align:center;">1</td><td style="text-align:center;">2</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td></tr> <tr><td style="text-align:center;">2</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td><td>_____</td><td style="text-align:center;">1</td><td style="text-align:center;">2</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td></tr> <tr><td style="text-align:center;">3</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td><td>_____</td><td style="text-align:center;">1</td><td style="text-align:center;">2</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td></tr> <tr><td style="text-align:center;">4</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td><td>_____</td><td style="text-align:center;">1</td><td style="text-align:center;">2</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td></tr> <tr><td style="text-align:center;">5</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td><td>_____</td><td style="text-align:center;">1</td><td style="text-align:center;">2</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td></tr> <tr><td style="text-align:center;">6</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td><td>_____</td><td style="text-align:center;">1</td><td style="text-align:center;">2</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td></tr> <tr><td style="text-align:center;">7</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td><td>_____</td><td style="text-align:center;">1</td><td style="text-align:center;">2</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td></tr> <tr><td style="text-align:center;">8</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td><td>_____</td><td style="text-align:center;">1</td><td style="text-align:center;">2</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td></tr> <tr><td style="text-align:center;">9</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td><td>_____</td><td style="text-align:center;">1</td><td style="text-align:center;">2</td><td><input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/></td></tr> </tbody> </table>	153. NUMÉRO DE RANG	154. NUMÉRO DE LIGNE DE COL.1	155. NOM DE COL. 2	156. SEXE DE COL. 4		157. ÂGE DE COL. 7	RANG	LIGNE	NOM	M	F	ÂGE	1	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	_____	1	2	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	2	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	_____	1	2	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	3	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	_____	1	2	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	4	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	_____	1	2	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	5	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	_____	1	2	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	6	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	_____	1	2	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	7	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	_____	1	2	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	8	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	_____	1	2	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	9	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	_____	1	2	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	
153. NUMÉRO DE RANG	154. NUMÉRO DE LIGNE DE COL.1	155. NOM DE COL. 2	156. SEXE DE COL. 4		157. ÂGE DE COL. 7																																																															
RANG	LIGNE	NOM	M	F	ÂGE																																																															
1	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	_____	1	2	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>																																																															
2	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	_____	1	2	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>																																																															
3	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	_____	1	2	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>																																																															
4	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	_____	1	2	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>																																																															
5	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	_____	1	2	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>																																																															
6	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	_____	1	2	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>																																																															
7	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	_____	1	2	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>																																																															
8	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	_____	1	2	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>																																																															
9	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	_____	1	2	<input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>																																																															

SELECTION D'UN ENFANT POUR LE TRAVAIL ET DISCIPLINE DES ENFANTS

158 VÉRIFIEZ LE DERNIER CHIFFRE DU NUMÉRO DU MÉNAGE SUR LA PAGE DE COUVERTURE. C'EST LE NUMÉRO DE LA LIGNE DU TABLEAU CI-DESSOUS SUR LAQUELLE VOUS DEVEZ ALLER. VÉRIFIEZ LE NOMBRE TOTAL D'ENFANTS Q. 151 SUR LA PAGE PRECEDENTE. C'EST LE NUMÉRO DE COLONNE DU TABLEAU CI-DESSOUS SUR LEQUEL VOUS DEVEZ ALLER.
 TROUVEZ LA CASE OÙ LA LIGNE ET LA COLONNE SE CROISENT ET ENERCLEZ LE NUMÉRO QUI APPARAÎT DANS LA CASE. C'EST LE NUMÉRO DU RANG DE L'ENFANT SÉLECTIONNÉ POUR TRAVAIL DES ENFANTS/DISCIPLINE DES ENFANTS DE LA BOÎTE DES ENFANTS ÉLIGIBLES DANS Q. 153. ENREGISTREZ LE NUMÉRO DU RANG, LE NUMÉRO DE LA LIGNE, L'ÂGE, ET LE NOM DE L'ENFANT SÉLECTIONNÉ DANS L'ESPACE CI-DESSOUS.
 EXEMPLE : LE NUMÉRO DU MÉNAGE EST '716' ET Q. 151 MONTRE QU'IL Y A TROIS ENFANTS ÉLIGIBLES DE 1-17 ANS DANS LE MÉNAGE. PUISQUE LE DERNIER CHIFFRE DU NUMÉRO DU MÉNAGE EST '6' ALLEZ À LA LIGNE '6' ET PUISQU'IL Y A TROIS ENFANTS ÉLIGIBLES, ALLEZ À LA COLONNE '3'. TROUVEZ LA CASE OU LA LIGNE ET LA COLONNE SE CROISENT ('2') ET ENERCLEZ LE NUMÉRO. MAINTENANT, ALLEZ À Q. 153 ET TROUVEZ LE DEUXIÈME ENFANT. ÉCRIVEZ LE NOM, L'ÂGE, LE NUMÉRO DE LA LIGNE, ET LE RANG DE L'ENFANT DANS L'ESPACE CI-DESSOUS.

DERNIER CHIFFRE DU NUMÉRO DE MÉNAGE	NOMBRE TOTAL D'ENFANTS ÉLIGIBLES DE 1-17 ANS DANS LE MÉNAGE DE 716							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0	1	2	2	4	3	6	5	4
1	1	1	3	1	4	1	6	5
2	1	2	1	2	5	2	7	6
3	1	1	2	3	1	3	1	7
4	1	2	3	4	2	4	2	8
5	1	1	1	1	3	5	3	1
6	1	2	2	2	4	6	4	2
7	1	1	3	3	5	1	5	3
8	1	2	1	4	1	2	6	4
9	1	1	2	1	2	3	7	5

159 NOM DE L'ENFANT SÉLECTIONNÉ _____

NUMÉRO DE LA LIGNE DE L'ENFANT SÉLECTIONNÉ ..

ÂGE DE L'ENFANT SÉLECTIONNÉ

NUMÉRO DU RANG DE L'ENFANT SÉLECTIONNÉ ..

TRAVAIL DES ENFANTS

NO.	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSER À															
161	VÉRIFIEZ L'ÂGE DE L'ENFANT SELECTIONNÉ À Q. 159 : 5-17 ANS <input type="checkbox"/>	1-4 ANS <input type="checkbox"/>	→ 181															
162	Maintenant je voudrais vous parler de tout travail que les enfants de ce ménage peuvent faire. Depuis (JOUR DE LA SEMAINE) dernier, (NOM) a-t-il/elle fait une des activités suivantes, même si c'est pendant une heure seulement ? a) Est-ce que (NOM) a travaillé sur propre terrain/ferme/ potager ou aidé sur celui du ménage ou s'est occupé des animaux. Par exemple : faire pousser des produits de la ferme, les récolter, nourrir les animaux, les emmener au pâturage ou les traire ? b) Est-ce que (NOM) a aidé dans l'entreprise familiale, celle d'autres parents avec ou sans paiement ou a travaillé dans sa propre entreprise ? c) Est-ce que (NOM) a produit, vendu des articles, des produits artisanaux, des vêtements, de la nourriture ou des produits agricoles ? d) Depuis (JOUR DE LA SEMAINE) dernier, (NOM) a-t-il/elle été engage(e) dans n'importe quelle autre activité en échange de paiement en espèces ou en nature, même pour une seule heure ? SI 'NON', INSISTEZ: Svp, inclure n'importe quelle activité que (NOM) a pu faire comme employé régulier ou occasionnel, pour sa propre entreprise ou comme employeur, ou comme travailleur familial non payé pour aider dans les affaires du ménage ou à la ferme.	<table border="0"> <tr> <td></td> <td align="right">O</td> <td align="right">N</td> </tr> <tr> <td>a) A TRAVAILLÉ SUR TERRAIN/FERME/POTAGER OU S'EST OCCUPE DES ANIMAUX</td> <td align="right">1</td> <td align="right">2</td> </tr> <tr> <td>b) A AIDÉ DANS ENTREPRISE FAMILIALE/D'UN AUTRE PARENT/ DANS SA PROPRE AFFAIRE</td> <td align="right">1</td> <td align="right">2</td> </tr> <tr> <td>c) A PRODUIT/VENDU DES ARTICLES/DE L'ARTISANAT/ DES VÊTEMENTS/NOURRITURE OU DES PRODUITS AGRICOLES</td> <td align="right">1</td> <td align="right">2</td> </tr> <tr> <td>d) TOUTE AUTRE ACTIVITÉ</td> <td align="right">1</td> <td align="right">2</td> </tr> </table>		O	N	a) A TRAVAILLÉ SUR TERRAIN/FERME/POTAGER OU S'EST OCCUPE DES ANIMAUX	1	2	b) A AIDÉ DANS ENTREPRISE FAMILIALE/D'UN AUTRE PARENT/ DANS SA PROPRE AFFAIRE	1	2	c) A PRODUIT/VENDU DES ARTICLES/DE L'ARTISANAT/ DES VÊTEMENTS/NOURRITURE OU DES PRODUITS AGRICOLES	1	2	d) TOUTE AUTRE ACTIVITÉ	1	2	
	O	N																
a) A TRAVAILLÉ SUR TERRAIN/FERME/POTAGER OU S'EST OCCUPE DES ANIMAUX	1	2																
b) A AIDÉ DANS ENTREPRISE FAMILIALE/D'UN AUTRE PARENT/ DANS SA PROPRE AFFAIRE	1	2																
c) A PRODUIT/VENDU DES ARTICLES/DE L'ARTISANAT/ DES VÊTEMENTS/NOURRITURE OU DES PRODUITS AGRICOLES	1	2																
d) TOUTE AUTRE ACTIVITÉ	1	2																
163	VÉRIFIEZ 162, a) À d) IL Y A AU MOINS UN 'OUI' <input type="checkbox"/>	TOUTES LES RÉPONSES SONT 'NON' <input type="checkbox"/>	→ 168															
164	Depuis (JOUR DE LA SEMAINE) dernier, a peu près combien d'heures au total est-ce que (NOM) a travaillé sur cette activité/ces activités ? SI MOINS D'1 HEURE, NOTER '00'	NOMBRE D'HEURES <input type="text"/> <input type="text"/>																
165	Est-ce que cette activité/ces activités nécessite(nt) de porter des charges lourdes ?	OUI 1 NON 2	→ 168															
166	Est-ce que cette activité/ces activités nécessite(nt) de travailler avec des outils dangereux (couteaux, etc.) ou de faire fonctionner des grosses machines ?	OUI 1 NON 2	→ 168															

167	Comment décririez-vous l'environnement de travail de (NOM) ? a) Est-ce que (NOM) est exposé à la poussière/fumées ou gaz ? b) Est-ce que (NOM) est exposé au froid, à la chaleur ou à de l'humidité extrême ? c) Est-ce que (NOM) est exposé à des bruits intenses ou des vibrations ? d) Est-ce que (NOM) est exposé à un travail en hauteur ? e) Est-ce que (NOM) est exposé à des produits chimiques, tels que des pesticides, des colles ou similaires ou des explosifs ? f) Est-ce que (NOM) est exposé à d'autres choses, ou soumis à des processus ou des conditions défavorables à sa santé ou sa sécurité ?	OUI 1 NON 2 OUI 1 NON 2 OUI 1 NON 2 OUI 1 NON 2 OUI 1 NON 2 OUI 1 NON 2	→ 168 → 168 → 168 → 168 → 168
168	Depuis (JOUR DE LA SEMAINE) dernier, (NOM) est-il /elle allé chercher de l'eau pour le ménage ?	OUI 1 NON 2	→ 170
169	Au total, depuis (JOUR DE LA SEMAINE) dernier, combien d'heures (NOM) a-t-il/elle passe à chercher de l'eau pour le ménage ? SI MOINS D'1 HEURE, NOTER '00'	NOMBRE D'HEURES <input type="text"/> <input type="text"/>	
170	Depuis (JOUR DE LA SEMAINE) dernier, est-ce que (NOM) est allé chercher du bois pour le ménage ?	OUI 1 NON 2	→ 172
171	Au total, depuis (JOUR DE LA SEMAINE) dernier combien d'heures (NOM) a-t-il/elle passé à chercher du bois pour le ménage ? SI MOINS D'1 HEURE, NOTER '00'	NOMBRE D'HEURES <input type="text"/> <input type="text"/>	
172	Depuis (JOUR DE LA SEMAINE) dernier, est-ce que (NOM) a fait une des tâches suivantes pour le ménage a) Des courses pour le ménage ? b) Cuisiner ? c) Laver la vaisselle ou nettoyer la maison ? d) Laver des vêtements ? e) Prendre soin des enfants ? f) Prendre soin des personnes âgées ou malades ? g) Autres tâches pour le ménage ?	OUI NON a) COURSES POUR LE MÉNAGE .. 1 2 b) CUISINER 1 2 c) LAVER USTENSILES / MAISON 1 2 d) LAVER LES VÊTEMENTS 1 2 e) PRENDRE SOIN DES ENFANTS .. 1 2 f) PRENDRE SOINS DES ÂGÉS/ DES MALADES 1 2 g) AUTRES TÂCHES 1 2	
173	VÉRIFIEZ 172 a) À g): IL Y A AU MOINS <input type="checkbox"/> UN 'OUI' ↓	TOUTES LES RÉPONSES <input type="checkbox"/> SONT 'NON' →	→ 181
174	Depuis (JOUR DE LA SEMAINE) dernier, combien d'heures à peu près, (NOM) a-t-il/elle travaillé sur (cette/ces activité(s)) ? SI MOINS D'1 HEURE, NOTEZ '00'	NOMBRE D'HEURES <input type="text"/> <input type="text"/>	

OBSERVATIONS DE L'ENQUÊTEUR/ENQUÊTRICE
À REMPLIR, UNE FOIS L'INTERVIEW TERMINÉE

COMMENTAIRES CONCERNANT L'INTERVIEW :

COMMENTAIRES SUR DES QUESTIONS PARTICULIÈRES :

AUTRES COMMENTAIRES :

OBSERVATIONS DU CHEF D'ÉQUIPE

OBSERVATIONS DE LA CONTRÔLEUSE

**ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ (EDSB-V 2017)
QUESTIONNAIRE FEMME**

RÉPUBLIQUE DU BENIN
MINISTÈRE DU PLAN ET DU DÉVELOPPEMENT

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ET DE L'ANALYSE ÉCONOMIQUE (INSAE)

IDENTIFICATION				
DÉPARTEMENT _____				
COMMUNE _____				
URBAIN/RURAL (URBAIN=1, RURAL=2)				
NOM DU CHEF DE MÉNAGE _____				
NUMÉRO DE GRAPPE				
NUMÉRO DE MÉNAGE				
NOM ET NUMÉRO DE LIGNE DE LA FEMME _____				
MÉNAGE SÉLECTIONNÉ POUR L'ENQUÊTE HOMME ? (1=OUI, 2=NON)				
MÉNAGE SÉLECTIONNÉ POUR LA SECTION VIOLENCE DOMESTIQUE ? (1=OUI, 2=NON)				
VISITES D'ENQUÊTRICES				
	1	2	3	VISITE FINALE
DATE				JOUR
				MOIS
NOM DE L'ENQUÊTRICE				ANNÉE
RÉSULTAT*				No ENQUÊT
				RÉSULTAT*
PROCHAINE DATE VISITE				NOMBRE TOTAL DE VISITES
HEURE				
*CODES RÉSULTAT : 1 COMPLÉTÉ 4 REFUSÉ				
2 PAS À LA MAISON 5 PARTIELLEMENT COMPLÉTÉ 7 AUTRE _____				
3 DIFFÉRÉ 6 INCAPACITÉ PRÉCISEZ _____				
LANGUE DU QUESTIONNAIRE**	0 1	LANGUE DE L'INTERVIEW**		LANGUE MATERNELLE DE L'ENQUÊTÉE**
				TRADUCTEUR (OUI = 1, NON = 2)
LANGUE DU QUESTIONNAIRE**	FRANÇAIS		**CODES LANGUES :	
			01 FRANÇAIS	03 Bariba 05 Dendi 07 Yoruba
			02 Adja	04 Fon 06 Ditamari 08 Autre
SUPERVISEUR		ÉDITEUR		
_____			_____	
NOM	NUMÉRO		NOM	NUMÉRO

PRÉSENTATION ET DEMANDE DE CONSENTEMENT

Bonjour. Je m'appelle _____ . Je travaille pour l'INSTITUT NATIONAL de la STATISTIQUE et de L'ANALYSE ECONOMIQUE (INSAE). Nous effectuons une enquête nationale sur la santé et sur d'autres sujets au Benin. Les informations que nous collectons aideront votre gouvernement à améliorer les services de santé. Votre ménage a été sélectionné pour cette enquête. Les questions prennent habituellement entre 60 et 90 minutes. Toutes les informations que vous nous donnerez sont strictement confidentielles et elles ne seront transmises à personne d'autre que les membres de l'équipe d'enquête. Vous n'êtes pas obligée de participer à cette enquête mais nous espérons que vous accepterez de répondre à questions car votre opinion est très importante. S'il arrivait que je pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, dites-le moi et je passerai à la question suivante ; vous pouvez également interrompre l'interview à n'importe quel moment.

Si vous souhaitez plus d'informations sur l'enquête, vous pouvez contacter la personne dont le nom figure sur la carte qui a déjà été donnée à votre ménage.

Avez-vous des questions à me poser ?

SIGNATURE DE L'ENQUÊTRICE : _____ DATE _____

L'ENQUÊTÉE ACCEPTE
D'ÊTRE INTERVIEWÉE . . . 1

L'ENQUÊTÉE REFUSE D'ÊTRE
INTERVIEWÉE . . . 2 → FIN

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTÉE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
101	INSCRIVEZ L'HEURE.	HEURES <input type="text"/> <input type="text"/> MINUTES <input type="text"/> <input type="text"/>	
102	Depuis combien de temps vivez-vous de manière continue à (NOM DE LA VILLE, PETITE VILLE OU VILLAGE ACTUEL DE RÉSIDENCE) ? SI MOINS D'UNE ANNÉE, INSCRIVEZ '00' ANNÉE.	ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/> DEPUIS TOUJOURS 95 VISITEUR 96	→ 105
103	Juste avant d'habiter ici, est-ce que vous viviez dans une ville à statut particulier, une aute ville ou dans une ville secondaire ?	VILLE À STATUT PARTICULIER 1 AUTRE VILLE 2 VILLE SECONDAIRE 3 EN DEHORS DU BÉNIN 4	
104	Juste avant d'habiter ici, dans quel département est-ce que vous viviez ?	ALIBORI 01 ATACORA 02 ATLANTIQUE 03 BORGOU 04 COLLINES 05 COUFFO 06 DONGA 07 LITTORAL 08 MONO 09 OUÉMÉ 10 PLATEAU 11 ZOU 12 EN DEHORS DU BENIN 96	
105	En quel mois et en quelle année êtes-vous née ?	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> NE CONNAIT PAS LE MOIS 98 ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NE CONNAIT PAS L'ANNÉE 9998	
106	Quel âge aviez-vous à votre dernier anniversaire ? COMPAREZ ET CORRIGEZ 105 ET/OU106 SI INCOHÉRENT.	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES <input type="text"/> <input type="text"/>	

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTÉE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
106A	VÉRIFIEZ COUVERTURE DU QUESTIONNAIRE: MÉNAGE <input type="checkbox"/> SÉLECTIONNÉ POUR ENQUÊTE HOMME ↓	MÉNAGE NON <input type="checkbox"/> SÉLECTIONNÉ POUR ENQUÊTE HOMME	→ 107
106B	VÉRIFIEZ 106:	15-29 ANS 1 30-49 ANS 2	→ 107
106C	Au cours de l'interview, je voudrais mesurer votre tension artérielle. Je le ferai trois fois au cours de l'interview. C'est une procédure qui ne comporte aucun danger. On l'effectue pour savoir si une personne a une tension artérielle élevée. Si elle n'est pas traitée, une tension élevée peut endommager sérieusement le cœur. Je vous donnerai les résultats de la mesure de la tension artérielle après l'interview en vous expliquant ce que signifient les chiffres de votre tension artérielle. Si votre tension artérielle est élevée, nous vous conseillerons de consulter dans un établissement de santé ou de voir un médecin car nous ne pouvons pas effectuer d'autre contrôle ou fournir un traitement au cours de l'enquête. Avez-vous des questions à me poser sur les mesures de la tension artérielle ? Vous pouvez dire oui ou non ou vous pouvez aussi décider à n'importe quel moment de ne pas participer à la prise des mesures de la tension artérielle . _____ SIGNATURE ENQUÊTRICE _____ DATE	OUI, L'ENQUÊTÉE ACCEPTE 1 NON, L'ENQUÊTÉE N'ACCEPTE PAS 2	→ 107
106D	Avant de commencer à mesurer votre tension artérielle, je voudrais vous poser quelques questions sur des choses qui peuvent affecter ces mesures. Avez-vous fait l'une des choses suivantes dans les 30 dernières minutes :	OUI NON a) MANGER 1 2 b) CAFEINE 1 2 c) FUMER 1 2 d) PHYSIQUE 1 2	
106E	REGARDEZ LE BRAS DE L'ENQUÊTÉE ET PRENEZ LE BRASSARD APPROPRIÉ POUR PRENDRE LA TENSION		
106F	PRENEZ LA PRESSION ARTÉRIELLE. ENREGISTREZ LA PRESSION SYSTOLIQUE ET DIASTOLIQUE. SI VOUS NE POUVEZ PAS MESURER LA PRESSION DE L'ENQUÊTÉE, ENREGISTREZ LA RAISON.	SYSTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> DIASTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> REFUSÉ 994 PROBLÈMES TECHNIQUES 995 AUTRE 996	
107	Êtes-vous allée à l'école ?	OUI 1 NON 2	→ 111
108	Quel est le plus haut niveau d'études que vous avez atteint : primaire, secondaire 1er cycle, secondaire 2nd cycle ou supérieur ?	PRIMAIRE 1 SECONDAIRE 1 ^{er} CYCLE 2 SECONDAIRE 2 ^{ème} CYCLE 3 SUPÉRIEUR 4	

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTÉE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
109	Quelle est LA CLASSE la plus élevée que vous avez achevée à ce niveau ? SI MOINS D'UNE ANNÉE A ÉTÉ ACHEVÉE À CE NIVEAU, INSCRIVEZ '00'.	CLASSE <input type="text"/> <input type="text"/>	
110	VÉRIFIEZ 108: PRIMAIRE OU <input type="checkbox"/> SECONDAIRE (1er ou 2eme CYCLE) ↓	SUPÉRIEUR <input type="checkbox"/>	→ 113
111	Je voudrais maintenant que vous me lisiez cette phrase. MONTREZ LA CARTE À L'ENQUÊTÉE. SI L'ENQUÊTÉE NE PEUT LIRE TOUTE LA PHRASE, INSISTEZ : Pouvez-vous lire une partie de la phrase ?	NE PEUT PAS LIRE DU TOUT 1 PEUT SEULEMENT LIRE UNE PARTIE DE LA PHRASE 2 PEUT LIRE TOUTE LA PHRASE 3 PAS DE CARTE DANS LA LANGUE DEMANDÉE 4 (PRÉCISEZ LA LANGUE) AVEUGLE/PROBLÈMES DE VUE 5	
112	VÉRIFIEZ 111: CODE '2', '3' <input type="checkbox"/> OU '4' ↓ ENCERCLÉ	CODE '1' OU '5' <input type="checkbox"/> ENCERCLÉ	→ 114
113	Lisez-vous un journal ou un magazine au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?	AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE 1 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE 2 PAS DU TOUT 3	
114	Écoutez-vous la radio au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?	AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE 1 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE 2 PAS DU TOUT 3	
115	Regardez-vous la télévision au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?	AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE 1 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE 2 PAS DU TOUT 3	
116	Est-ce que vous possédez un téléphone portable ?	OUI 1 NON 2	→ 118
117	Est-ce que vous utilisez votre téléphone portable pour faire des opérations financières ?	OUI 1 NON 2	
118	Avez-vous un compte dans une banque ou dans une autre institution financière que vous pouvez utiliser vous-même ?	OUI 1 NON 2	
119	Avez-vous déjà utilisé internet ?	OUI 1 NON 2	→ 122
120	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé internet ? SI NÉCESSAIRE, INSISTEZ POUR L'UTILISATION À PARTIR DE N'IMPORTE QUEL ENDROIT AVEC N'IMPORTE QUEL APPAREIL.	OUI 1 NON 2	→ 122
121	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous utilisé internet: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?	PRESQUE CHAQUE JOUR 1 AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE 2 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE 3 PAS DU TOUT 4	

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTÉE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À												
122	Quelle religion pratiquez-vous ?	VODOUN 1 AUTRES TRADITIONNELLES 2 ISLAM 3 CATHOLIQUE 4 PROTESTANT METHODISTE 5 AUTRES PROTESTANTS 6 CELESTES 7 AUTRES CHRETIENS 8 AUTRES RELIGIONS 9 AUCUNE 10													
123	Quelle est votre ethnie ?	ADJA ET APPARENTÉS 1 BARIBA ET APPARENTÉS 2 DENDI ET APPARENTÉS 3 FON ET APPARENTÉS 4 YOA ET LOKPA ET APPARENTÉS 5 BETAMARIBE ET APPARENTÉS 6 PEULH ET APPARENTÉS 7 YORUBA ET APPARENTÉS 8 AUTRE BÉNINOIS _____ 96 (PRÉCISEZ) AUTRE NATIONALITÉS _____ 97 (PRÉCISEZ)													
123A	VÉRIFIEZ COUVERTURE DU QUESTIONNAIRE: MÉNAGE SÉLECTIONNÉ <input type="checkbox"/> MÉNAGE NON SÉLECTIONNÉ <input type="checkbox"/> POUR ENQUÊTE HOMME ↓ POUR ENQUÊTE HOMME →		→ 124												
123B	VÉRIFIEZ 106 :	15-29 ANS 1 30-49 ANS 2	→ 124												
123C	Est-ce que je peux mesurer votre pression artérielle maintenant ? _____ SIGNATURE ENQUÊTRICE _____ DATE	OUI, L'ENQUÊTÉE ACCEPTE 1 NON, L'ENQUÊTÉE N'ACCEPTE PAS 2	→ 124												
123D	PRENEZ LA PRESSON ARTÉRIELLE. ENREGISTREZ LA PRESSON SYSTOLIQUE ET DIASTOLIQUE. SI VOUS NE POUVEZ PAS MESURER LA PRESSON DE L'ENQUÊTÉE, ENREGISTREZ LA RAISON.	SYSTOLIQUE <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> DIASTOLIQUE <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> REFUSÉ 994 PROBLÈMES TECHNIQUES 995 AUTRE 996													
124	À combien de kilomètres se trouve le premier centre de santé public ?	KILOMÈTRES <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> NE SAIT PAS 998													
125	Combien de temps faut-il pour atteindre le centre de santé public le plus proche?	MINUTES <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> NE SAIT PAS 998													

CODES POUR Qs. 108 ET 109: NIVEAU D'INSTRUCTION / CLASSE

NIVEAU ATTEINT	1 = PRIMAIRE	2 = SECONDAIRE 1 ^{ER} CYCLE	3 = SECONDAIRE 2 ND CYCLE	4 = SUPÉRIEUR
	< D'1 ANNÉE A-CHEVÉE EN CI = 0	< D'1 ANNÉE A-CHEVÉE EN 6 ^{ÈME} = 0	< D'1 ANNÉE A-CHEVÉE EN 2 ^{NDE} = 0	< D'1 ANNÉE A-CHEVÉE EN 1 ^{ÈRE} AN. = 0
CLASSE	CI = 1	6 ^{ÈME} = 1	2 ^{NDE} = 1	1 ^{ÈRE} ANNÉE = 1
ACHEVÉE	CP = 2	5 ^{ÈME} = 2	1 ^{ÈRE} = 2	2 ^{ÈME} ANNÉE = 2
AVEC	CE1 = 3	4 ^{ÈME} = 3	TERMINALE = 3	3 ^{ÈME} ANNÉE = 3
SUCCÈS	CE2 = 4	3 ^{ÈME} = 4		4 ^{ÈME} AN. OU + = 4
	CM1 = 5			
	CM2 = 6			
	NSP = 8	NSP = 8	NSP = 8	NSP = 8

SECTION 2. REPRODUCTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À								
201	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur toutes les naissances que vous avez eues durant votre vie. Avez-vous déjà donné naissance à des enfants ?	OUI 1 NON 2	→ 206								
202	Avez-vous des fils ou des filles à qui vous avez donné naissance et qui vivent actuellement avec vous ?	OUI 1 NON 2	→ 204								
203	a) Combien de fils vivent avec vous ? b) Et combien de filles vivent avec vous ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'.	a) FILS À LA MAISON <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> b) FILLES À LA MAISON <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>									
204	Avez-vous des fils ou filles à qui vous avez donné naissance qui sont toujours en vie mais qui ne vivent pas avec vous ?	OUI 1 NON 2	→ 206								
205	a) Combien de fils sont vivants mais qui ne vivent pas avec vous ? b) Et combien de filles sont vivantes mais qui ne vivent pas avec vous ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'.	a) FILS AILLEURS <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> b) FILLES AILLEURS <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>									
206	Avez-vous déjà donné naissance à un garçon ou à une fille qui est né vivant mais qui est décédé par la suite ? SI NON, INSISTEZ : Aucun bébé qui a crié ou fait un mouvement, qui a émis un son ou essayé de respirer ou qui a montré d'autres signes de vie pendant un très court moment ?	OUI 1 NON 2	→ 208								
207	a) Combien de garçons sont décédés ? b) Et combien de filles sont décédés ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'.	a) GARÇONS DÉCÉDÉS <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> b) FILLES DÉCÉDÉES <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>									
208	FAITES LA SOMME DES RÉPONSES À 203, 205, ET 207, ET INSCRIVEZ LE TOTAL. SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'.	TOTAL NAISSANCES <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>									
209	VÉRIFIEZ 208: Je voudrais être sûre d'avoir bien compris: vous avez eu au TOTAL _____ naissances durant votre vie. Est-ce bien exact ? OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> INSISTEZ ET CORRIGEZ 201-208 COMME IL SE DOIT.										
210	VÉRIFIEZ 208: UNE NAISSANCE <input type="checkbox"/> OU PLUS ↓ AUCUNE <input type="checkbox"/>		→ 226								

SECTION 2. REPRODUCTION

211 Je voudrais maintenant faire la liste de toutes vos naissances, qu'elles soient encore en vie ou non, en commençant par la première.
INSCRIVEZ LE NOM DE TOUTES LES NAISSANCES À 212. INSCRIVEZ LES JUMEAUX/TRIPLÉS SUR DES LIGNES SÉPARÉES. S'IL Y A PLUS DE 10 NAISSANCES, UTILISEZ UN QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE, EN COMMENÇANT À LA SECONDE LIGNE .

212	213	214	215	216	217 SI EN VIE:	218 SI EN VIE:	219 SI EN VIE:	220 SI DÉCÉDÉ:	221
<p>Quel nom a été donné à votre (premier enfant/ enfant suivant) ?</p> <p>INSCRIVEZ LE NOM.</p> <p>NO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES.</p>	<p>(NOM) est-il un garçon ou une fille ?</p>	<p>Parmi ces naissances, y avait-il des jumeaux ?</p>	<p>Quel jour, quel mois et quelle année (NOM) est-il/elle né(e) ?</p>	<p>(NOM) est-il/elle encore en vie ?</p>	<p>Quel âge avait (NOM) à son dernier anniversaire ?</p> <p>INSCRIVEZ L'ÂGE EN ANNÉE RÉVOLUE .</p>	<p>(NOM) vit-il/elle avec vous ?</p>	<p>INSCRIVEZ LE No DE LIGNE DE L'ENFANT DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ '00' SI L'ENFANT N'EST PAS LISTÉ DANS LE MÉNAGE.</p>	<p>Quel âge avait (NOM) quand (il/elle) est décédé ?</p> <p>SI '12 MOIS' OU '1 AN', DEMANDEZ: Est-ce que (NOM) avait eu son premier anniversaire ?</p> <p>PUIS DEMANDEZ: Exactement combien de mois avait (NOM) quand (il/elle) est décédé ? INSCRIVEZ EN JOURS SI L'ENFANT A MOINS D'1 MOIS; EN MOIS, SI L'ENFANT A MOINS DE 2 ANS; OU EN ANNÉES.</p>	<p>Y a-t-il eu d'autres naissances vivantes entre (NOM DE LA NAISSANCE PRÉCÉDENTE) et (NOM), y compris des enfants qui sont décédés après la naissance ?</p>
01	GAR. 1 FILLE 2	SIMP. 1 MULT 2	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 220)	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2	NO LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> (NAISSANCE SUIVANTE)	JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/>	
02	GAR. 1 FILLE 2	SIMP. 1 MULT 2	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 220)	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2	NO LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 221)	JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 (AJOUT NAIS.) NON 2 (NAIS SUIV.)
03	GAR. 1 FILLE 2	SIMP. 1 MULT 2	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 220)	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2	NO LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 221)	JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 (AJOUT NAIS.) NON 2 (NAIS SUIV.)
04	GAR. 1 FILLE 2	SIMP. 1 MULT 2	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	YES 1 NON 2 (ALLEZ À 220)	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2	NO LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 221)	JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 (AJOUT NAIS.) NON 2 (NAIS SUIV.)
05	GAR. 1 FILLE 2	SIMP. 1 MULT 2	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 220)	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2	NO LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 221)	JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 (AJOUT NAIS.) NON 2 (NAIS SUIV.)

SECTION 2. REPRODUCTION

211 Je voudrais maintenant faire la liste de toutes vos naissances, qu'elles soient encore en vie ou non, en commençant par la première.
INSCRIVEZ LE NOM DE TOUTES LES NAISSANCES À 212. INSCRIVEZ LES JUMEAUX/TRIPLÉS SUR DES LIGNES SÉPARÉES. S'IL Y A PLUS DE 10 NAISSANCES, UTILISEZ UN QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE, EN COMMENÇANT À LA SECONDE LIGNE .

212	213	214	215	216	217 SI EN VIE:	218 SI EN VIE:	219 SI EN VIE:	220 SI DÉCÉDÉ:	221
<p>Quel nom a été donné à votre (premier enfant/ enfant suivant) ?</p> <p>INSCRIVEZ LE NOM.</p> <p>N0 DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES.</p>	<p>(NOM) est-il un garçon ou une fille ?</p>	<p>Parmi ces naissances, y avait-il des jumeaux ?</p>	<p>Quel jour, quel mois et quelle année (NOM) est-il/elle né(e) ?</p>	<p>(NOM) est-il/elle encore en vie ?</p>	<p>Quel âge avait (NOM) à son dernier anniversaire ?</p> <p>INSCRIVEZ L'ÂGE EN ANNÉE RÉVOLUE .</p>	<p>(NOM) vit-il/elle avec vous ?</p>	<p>INSCRIVEZ LE N0 DE LIGNE DE L'ENFANT DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ '00' SI L'ENFANT N'EST PAS LISTÉ DANS LE MÉNAGE.</p>	<p>Quel âge avait (NOM) quand (il/elle) est décédé ?</p> <p>SI '12 MOIS' OU '1 AN', DEMANDEZ: Est-ce que (NOM) avait eu son premier anniversaire ?</p> <p>PUIS DEMANDEZ: Exactement combien de mois avait (NOM) quand (il/elle) est décédé ? INSCRIVEZ EN JOURS SI L'ENFANT A MOINS D'1 MOIS; EN MOIS, SI L'ENFANT A MOINS DE 2 ANS; OU EN ANNÉES.</p>	<p>Y a-t-il eu d'autres naissances vivantes entre (NOM DE LA NAISSANCE PRÉCÉDENTE) et (NOM), y compris des enfants qui sont décédés après la naissance ?</p>
06	GAR. 1 FILLE 2	SIMP. 1 MULT 2	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 220)	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2	NO LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 221)	JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 (AJOUT . NAIS.) NON 2 (NAIS SUIV.)
07	GAR. 1 FILLE 2	SIMP. 1 MULT 2	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 220)	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2	NO LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 221)	JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 (AJOUT . NAIS.) NON 2 (NAIS SUIV.)
08	GAR. 1 FILLE 2	SIMP. 1 MULT 2	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 220)	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2	NO LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 221)	JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 (AJOUT . NAIS.) NON 2 (NAIS SUIV.)
09	GAR. 1 FILLE 2	SIMP. 1 MULT 2	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 220)	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2	NO LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 221)	JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 (AJOUT . NAIS.) NON 2 (NAIS SUIV.)
10	GAR. 1 FILLE 2	SIMP. 1 MULT 2	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 220)	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2	NO LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 221)	JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 (AJOUT . NAIS.) NON 2 (NAIS SUIV.)

SECTION 2. REPRODUCTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
222	Avez-vous eu d'autres naissances vivantes depuis la naissance de (NOM DE LA DERNIÈRE NAISSANCE) ?	OUI 1 (INSCRIVEZ LA/LES NAISS. DANS LE TABLEAU) NON 2	
223	COMPAREZ 208 AVEC LE NOMBRE DE NAISSANCES DANS LE TABLEAU DES NAISSANCES NOMBRES SONT ÉGAUX <input type="checkbox"/> NOMBRES SONT DIFFÉRENTS <input type="checkbox"/> (INSISTEZ ET CORRIGEZ)		
224	VÉRIFIEZ 215: INSCRIVEZ LE NOMBRE DE NAISSANCES EN 2012-2017	NOMBRE DE NAISSANCES! <input type="text"/> AUCUNE 0	→ 226
225	C POUR CHAQUE NAISSANCE EN 2012-2017, INSCRIVEZ 'N' AU MOIS DE NAISSANCE DANS LE CALENDRIER. INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENFANT À GAUCHE DU CODE 'N'. POUR CHAQUE NAISSANCE, DEMANDEZ LE NOMBRE DE MOIS RÉVOLUS QUE LA GROSSESSE A DURÉ ET INSCRIVEZ 'G' À CHACUN DES MOIS PRÉCÉDENTS SELON LA DURÉE DE LA GROSSESSE. (NOTE: LE NOMBRE DE 'G' DOIT ÊTRE INFÉRIEUR DE 1 AU NOMBRE DE MOIS QUE LA GROSSESSE A DURÉ.)		
226	Êtes-vous actuellement enceinte ?	OUI 1 NON 2 PAS SÛRE 8	→ 230
227	Depuis combien de mois êtes-vous enceinte ? ENREGISTREZ LE NOMBRE DE MOIS RÉVOLUS. C INSCRIVEZ 'G' DANS LE CALENDRIER, EN COMMENÇANT PAR LE MOIS DE L'ENQUÊTE ET POUR LE NOMBRE TOTAL DE MOIS RÉVOLUS.	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/>	
228	Quand vous êtes tombée enceinte, vouliez-vous être enceinte à ce moment-là ?	OUI 1 NON 2	→ 230
229	VÉRIFIEZ 208: NOMBRE TOTAL DE NAISSANCES UNE OU PLUS <input type="checkbox"/> AUCUNE <input type="checkbox"/> a) Est-ce que vous vouliez avoir un enfant plus tard ou est-ce que vous ne vouliez plus d'enfant ? b) Est-ce que vous vouliez avoir un enfant plus tard ou est-ce que vous ne vouliez pas avoir d'enfant ?	PLUS TARD 1 PLUS/AUCUN 2	
230	Avez-vous déjà eu une grossesse qui s'est terminée par une fausse-couche, un avortement ou un mort-né ?	OUI 1 NON 2	→ 239
231	Quand la dernière grossesse de ce genre s'est-elle terminée ?	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

SECTION 2. REPRODUCTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
232 (1)	VÉRIFIEZ 231: DERNIÈRE GROSSESSE <input type="checkbox"/> TERMINÉE EN 2012- DERNIÈRE GROSSESSE <input type="checkbox"/> TERMINÉE AVANT JANVIER 2012		→ 234 → 239
LINE NO.	233 En quel mois et en quelle année la dernière grossesse de ce genre s'est-elle terminée ?	234 De combien de mois étiez-vous enceinte quand la dernière grossesse de ce genre s'est terminée ?	235 (1) Depuis janvier 2012, avez-vous eu d'autres grossesses qui n'ont pas abouti à une naissance vivante ?
01		<input type="text"/> <input type="text"/> NOMBRE DE MOIS	OUI 1 → LIG SUIV. NON 2 → 236
02	<input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE	<input type="text"/> <input type="text"/> NOMBRE DE MOIS	OUI 1 → LIG SUIV. NON 2 → 236
03	<input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE	<input type="text"/> <input type="text"/> NOMBRE DE MOIS	OUI 1 → LIG SUIV. NON 2 → 236
04	<input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE	<input type="text"/> <input type="text"/> NOMBRE DE MOIS	OUI 1 NON 2 → 236
236	<p>C POUR CHAQUE GROSSESSE QUI NE S'EST PAS TERMINÉE PAR UNE NAISSANCE VIVANTE EN 2012-2017 OU PLUS TARD, INSCRIVEZ 'F' DANS LE CALENDRIER AU MOIS OÙ LA GROSSESSE S'EST TERMINÉE ET 'G' POUR LE NOMBRE RESTANT DE MOIS RÉVOLUS.</p> <p>S'IL Y A PLUS DE QUATRE GROSSESSES QUI NE SE SONT PAS TERMINÉES PAR UNE NAISSANCE VIVANTE, UTILISEZ DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES EN COMMENCANT À LA SECONDE LIGNE.</p>		
237	Avez-vous eu une grossesse qui a pris fin avant 2012 et qui s'est terminée par une fausse-couche, un avortement ou un mort-né ?	OUI 1 NON 2	→ 239
238	Quand la dernière grossesse de ce genre s'est-elle terminée avant 2012 ?	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

SECTION 2. REPRODUCTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À								
239	Quand vos dernières règles ont-elles commencé ? _____ (DATE, SI DONNÉE)	IL Y A JOURS 1 IL Y A SEMAINES 2 IL Y A MOIS 3 IL Y A ANNÉES 4 EN MÉNOPAUSE/ A EU UNE HYSTÉRECTOMIE 994 AVANT LA DERNIÈRE NAISSANCE 995 JAMAIS EU DE RÈGLES 996	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>								
240	Entre la période des règles et les règles suivantes, est-ce qu'il y a une période où les femmes ont plus de chances de tomber enceintes ?	OUI 1 NON 2 PAS SÛRE 8	→ 242								
241	Est-ce que cette période se situe juste avant que les règles ne commencent, pendant la période des règles, juste après que les règles soient terminées ou bien au milieu de deux périodes de règles ?	JUSTE AVANT QUE LES RÉGLES COMMENCENT 1 PENDANT LES RÉGLES 2 JUSTE APRÈS LA FIN DES RÉGLES 3 AU MILIEU, ENTRE DEUX PÉRIODES DE RÈGLES 4 AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 8									
242	Après la naissance d'un enfant, est-ce qu'une femme peut tomber enceinte avant que ses règles soient revenues ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8									

SECTION 3. CONTRACEPTION

301	Je voudrais maintenant que nous parlions de planification familiale, c'est-à-dire les différents moyens ou méthodes qu'un couple peut utiliser pour retarder ou éviter une grossesse. Avez-vous déjà entendu parler de (MÉTHODE) ?		
01	Stérilisation féminine. INSISTEZ : Les femmes peuvent avoir une opération pour ne plus avoir d'enfants.	OUI	1
		NON	2
02	Stérilisation masculine. INSISTEZ : Les hommes peuvent avoir une opération pour ne plus avoir d'enfants.	OUI	1
		NON	2
03	DIU. INSISTEZ : Les femmes peuvent avoir un stérilet qu'un médecin ou une infirmière leur place dans l'utérus pour leur éviter une grossesse pendant un ou plusieurs mois.	OUI	1
		NON	2
04	Injectables. INSISTEZ : Les femmes peuvent avoir une injection faite par un agent de santé ou un relais communautaire pour leur éviter une grossesse pendant un mois ou plus.	OUI	1
		NON	2
05	Implants. INSISTEZ : Les femmes peuvent se faire insérer par un agent de santé un bâtonnet ou plus sous la peau du haut du bras pour leur éviter une grossesse, pendant une année ou plus.	OUI	1
		NON	2
06	Pilule. INSISTEZ : Les femmes peuvent prendre une pilule chaque jour pour éviter une grossesse.	OUI	1
		NON	2
07	Condom Masculin. INSISTEZ : Les hommes peuvent mettre une capote en caoutchouc sur leur pénis avant les rapports sexuels.	OUI	1
		NON	2
08	Condom féminin. INSISTEZ : Les femmes peuvent placer un fourreau dans leur vagin avant les rapports sexuels.	OUI	1
		NON	2
09	Pilule du lendemain. INSISTEZ : Les femmes peuvent prendre dans les trois jours qui suivent des rapports sexuels non protégés des pilules spéciales qui les empêchent de tomber enceintes.	OUI	1
		NON	2

SECTION 3. CONTRACEPTION

10	<p>Méthode des jours fixes. INSISTEZ : Les femmes utilisent un collier de perles de couleur différente pour connaître les jours où elles peuvent tomber enceintes. Durant ces jours où elles peuvent tomber enceintes, elles utilisent un condom ou elles s'abstiennent de rapports sexuels.</p>	<p>OUI 1 NON 2</p>
11	<p>Méthode de l'aménorrhée et de l'allaitement maternel (MAMA). INSISTEZ : Pendant six mois après la naissance d'un enfant, avant que les règles ne soient revenues, les femmes utilisent une méthode qui nécessite d'allaiter fréquemment le jour et la nuit.</p>	<p>OUI 1 NON 2</p>
12	<p>Méthode du rythme. INSISTEZ : Pour éviter une grossesse, les femmes n'ont pas de rapports sexuels les jours où elles pensent qu'elles peuvent tomber enceintes.</p>	<p>OUI 1 NON 2</p>
13	<p>Retrait. INSISTEZ : Les hommes peuvent faire attention et se retirer avant l'éjaculation.</p>	<p>OUI 1 NON 2</p>
14	<p>Avez-vous entendu parler d'autres moyens ou méthodes qu'une femme ou un homme peut utiliser pour éviter une grossesse ?</p>	<p>OUI, MÉTHODE MODERNE _____ A (PRÉCISEZ) OUI, MÉTHODE TRADITIONNELLE _____ B (PRÉCISEZ) NON Y</p>

SECTION 3. CONTRACEPTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
302	VÉRIFIEZ 226: PAS ENCEINTE <input type="checkbox"/> OU PAS SÛRE ↓	ENCEINTE <input type="checkbox"/>	→ 312
303	Est-ce que vous, ou votre partenaire, faites actuellement quelque chose ou est-ce que vous utilisez actuellement une méthode pour retarder ou éviter une grossesse ?	OUI 1 NON 2	→ 312
304	Quelle méthode utilisez-vous ? ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ. SI PLUS D'UNE MÉTHODE EST MENTIONNÉE, SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE PASSAGE DE LA PREMIÈRE MÉTHODE DE LA LISTE.	STÉRILISATION FÉMININE A STÉRILISATION MASCULINE B DIU C INJECTABLES D IMPLANTS E PILULE F CONDOM MASCULIN G CONDOM FÉMININ H PILULE DU LENDEMAIN I MÉTHODE DES JOURS FIXES J MAMA K MÉTHODE DU RYTHME L RETRAIT M AUTRE MÉTHODE MODERNE X AUTRE MÉTHODE TRADITIONNELLE Y	→ 307 → 309 → 306 → 309
305	Quelle est la marque de pilule que vous utilisez actuellement ? SI LA MARQUE N'EST PAS CONNUE, DEMANDEZ À VOIR LA BOITE.	HARMONIE 01 DUOFEM 02 MICROGYNON 03 EUGYNON 04 LO-FEMENAL 05 CONFIANCE 06 MINIDRIL 07 STEDIRIL 08 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 98	→ 309
306	Quelle est la marque de condom que vous utilisez actuellement ? SI LA MARQUE N'EST PAS CONNUE, DEMANDEZ À VOIR LA BOITE.	PRUDENCE 01 COOL 02 NO LOGO 03 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 98	→ 309

SECTION 3. CONTRACEPTION (OPTION CAPI) (6)

311	<p>VÉRIFIEZ 308 ET 309:</p> <p>ANNÉE EST 2012-2017 <input type="checkbox"/></p> <p>C INSCRIVEZ DANS LE CALENDRIER LE CODE POUR LA MÉTHODE UTILISÉE LE MOIS DE L'INTERVIEW ET POUR CHAQUE MOIS JUSQU'À LA DATE DE DÉBUT D'UTILISATION .</p> <p>ENSUITE CONTINUEZ</p> <p>↓</p>	<p>ANNÉE EST 2011 OU PLUS TÔT <input type="checkbox"/></p> <p>C INSCRIVEZ DANS LE CALENDRIER LE CODE POUR LA MÉTHODE UTILISÉE LE MOIS DE L'INTERVIEW ET POUR CHAQUE MOIS JUSQU'À JANVIER 2012 .</p> <p>ENSUITE</p> <p>(ALLEZ À 324) ←</p>		
312	<p>Je voudrais maintenant vous poser des questions sur les périodes où, durant ces dernières années, vous ou votre partenaire, avez utilisé une méthode pour éviter une grossesse.</p> <p>C UTILISEZ LE CALENDRIER POUR VÉRIFIER LES PÉRIODES ANTÉRIEURES D'UTILISATION ET DE NON UTILISATION, EN COMMENÇANT PAR L'UTILISATION LA PLUS RÉCENTE, EN PARTANT DE JANVIER 2012. UTILISEZ LES NOMS DES ENFANTS, DATES DE NAISSANCE ET PÉRIODES DE GROSSESSE COMME DES POINTS DE RÉFÉRENCE.</p>			
		COLONNE 1	COLONNE 2	COLONNE 3
312A	MOIS ET ANNÉE DU DÉBUT DE L'INTERVALLE D'UTILISATION OU DE NON UTILISATION.	<p>MOIS <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>ANNÉE</p>	<p>MOIS <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>ANNÉE</p>	<p>MOIS <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>ANNÉE</p>
312B	Entre (ÉVÈNEMENT) en (MOIS/ANNÉE) et (ÉVÈNEMENT) en (MOIS/ANNÉE), avez-vous ou votre partenaire utilisé une méthode de contraception ?	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>(ALLEZ À 312I) ←</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>(ALLEZ À 312I) ←</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>(ALLEZ À 312I) ←</p>
312C	Quelle était cette méthode ?	CODE MÉTHODE .. <input type="text"/>	CODE MÉTHODE .. <input type="text"/>	CODE MÉTHODE .. <input type="text"/>
312D	Combien de mois après (ÉVÈNEMENT) en (MOIS/ANNÉE) avez-vous commencé à utiliser (MÉTHODE) ? ENCERCLEZ '95' SI L'ENQUÊTÉE DONNE LA DATE DE DÉBUT D'UTILISATION DE LA	<p>IMMÉDIATEMENT 00</p> <p>MOIS <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>(ALLEZ À 312F) ←</p> <p>DATE DONNÉE 95</p>	<p>IMMÉDIATEMENT 00</p> <p>MOIS <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>(ALLEZ À 312F) ←</p> <p>DATE DONNÉE 95</p>	<p>IMMÉDIATEMENT 00</p> <p>MOIS <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>(ALLEZ À 312F) ←</p> <p>DATE DONNÉE 95</p>

		COLONNE 1	COLONNE 2	COLONNE 3
312E	INSCRIVEZ LE MOIS ET L'ANNÉE OÙ L'ENQUÊTÉE A COMMENCÉ À UTILISER LA MÉTHODE.	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE
312F	Pendant combien de mois avez-vous utilisé (MÉTHODE) ? ENCERCLEZ '95' SI L'ENQUÊTÉE DONNE LA DATE DE FIN	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 312H) ← DATE DONNÉE 95	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 312H) ← DATE DONNÉE 95	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 312H) ← DATE DONNÉE 95
312G	INSCRIVEZ LE MOIS ET L'ANNÉE OÙ L'ENQUÊTÉE A ARRÊTÉ D'UTILISER LA MÉTHODE.	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE
312H	Pourquoi avez-vous arrêté d'utiliser (MÉTHODE) ?	RAISON POUR AVOIR ARRÊTÉ <input type="text"/>	RAISON POUR AVOIR ARRÊTÉ <input type="text"/>	RAISON POUR AVOIR ARRÊTÉ <input type="text"/>
312I		RETOURNEZ À 312A À LA COLONNE SUIVANTE; OU, SI PLUS D'INTERRUPTIONS, ALLEZ À 313.	RETOURNEZ À 312A À LA COLONNE SUIVANTE; OU, SI PLUS D'INTERRUPTIONS, ALLEZ À 313.	RETOURNEZ À 312A DANS LE NOUVEAU QUESTIONNAIRE; OU, SI PLUS D'INTERRUPTIONS, ALLEZ À 313.

SECTION 3. CONTRACEPTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
313	VÉRIFIEZ LE CALENDRIER POUR L'UTILISATION D'UNE MÉTHODE CONTRACEPTIVE À N'IMPORTE QUEL AUCUNE MÉTHODE UTILISÉE <input type="checkbox"/> UNE MÉTHODE UTILISÉE <input type="checkbox"/>		→ 315
314	Avez-vous déjà utilisé quelque chose ou essayé par divers moyens de retarder ou d'éviter une grossesse ?	OUI 1 NON 2	→ 326
315	VÉRIFIEZ 304: ENCERCLEZ LE CODE DE LA MÉTHODE: SI PLUS D'UN CODE MÉTHODE ENCERCLE À 304, ENCERCLEZ LE CODE DE LA PREMIÈRE MÉTHODE DE LA LISTE.	PAS DE CODE ENCERCLÉ 00 STÉRILISATION FÉMININE 01 STÉRILISATION MASCULINE 02 DIU 03 INJECTABLES 04 IMPLANTS 05 PILULE 06 CONDOM 07 CONDOM FÉMININ 08 PILULE DU LENDEMAIN 09 MÉTHODE DES JOURS FIXES 10 MAMA 11 MÉTHODE DU RYTHME 12 RETRAIT 13 AUTRE MÉTHODE MODERNE 95 AUTRE MÉTHODE TRADITIONNELLE 96	→ 326 → 319 → 327 → 323
316	Vous avez commencé à utiliser (MÉTHODE ACTUELLE) en (DATE À 309). Où l'avez-vous obtenue à ce moment-là ? INSISTEZ POUR IDENTIFIER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT. _____ (NOM DE L'ENDROIT)	SECTEUR PUBLIC HÔPITAL DU GOUVERNEMENT 11 CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT 12 CLINIQUE MOBILE 13 AGENT DE SANTÉ/ RELAIS COMMUNAUTAIRE 14 AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ 16 (PRÉCISEZ) SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ 21 PHARMACIE 22 SOIN MÉDICAL/CABINET CLINIQUE 23 CLINIQUE MOBILE 24 CENTRE/HÔPITAL CONFESIONNELLE 25 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ 26 (PRÉCISEZ) ONG CLINIQUE PLANIFICATION FAMILIALE 31 AUTRE SOURCE BOUTIQUE 41 INSTITUTION RELIGIEUSE 42 AMIS/PARENTS 43 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
317	VÉRIFIEZ 304: ENCERCLEZ LE CODE DE LA MÉTHODE: SI PLUS D'UN CODE MÉTHODE ENCERCLE À 304, ENCERCLEZ LE CODE DE LA PREMIÈRE MÉTHODE DE LA LISTE.	DIU 03 INJECTABLES 04 IMPLANTS 05 PILULE 06 CONDOM 07 CONDOM FÉMININ 08 PILULE DU LENDEMAIN 09 MÉTHODE DES JOURS FIXES 10 AUTRE MÉTHODE MODERNE 95 AUTRE MÉTHODE TRADITIONNELLE 96	→ 323 → 322 → 323

SECTION 3. CONTRACEPTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
318	À ce moment-là, vous a-t-on parlé d'effets secondaires que vous pourriez avoir en utilisant cette méthode ?	OUI 1 NON 2	→ 321 → 320
319	Quand vous avez été stérilisée, vous a-t-on parlé d'effets secondaires ou de problèmes que vous pourriez avoir à cause de la méthode ?	OUI 1 NON 2	→ 321
320	Est-ce qu'un agent de santé ou de planification familiale vous a parlé des effets secondaires ou des problèmes que vous pourriez avoir à cause de l'utilisation de la méthode ?	OUI 1 NON 2	→ 322
321	Vous a-t-on dit ce qu'il fallait faire si vous aviez ces effets secondaires ou ces problèmes ?	OUI 1 NON 2	
322	VÉRIFIEZ 318 ET 319: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> UN <input type="checkbox"/> OUI! ↓ </div> <div style="border-left: 1px dashed black; width: 1px; height: 100px;"></div> <div style="text-align: center;"> AUTRE <input type="checkbox"/> ↓ </div> </div> <p>a) À ce moment-là, vous a-t-on parlé d'autres méthodes de planification familiale que vous pourriez utiliser ?</p> <p>b) Quand vous avez obtenu (MÉTHODE ACTUELLE DE 315) de (ENDROIT DE 307 OU 316), vous a-t-on parlé d'autres méthodes de PF que vous pouviez utiliser ?</p>	OUI 1 NON 2	→ 324
323	Est-ce qu'un agent de santé ou de planification familiale vous a parlé d'autres méthodes de planification familiale que vous pouviez utiliser ?	OUI 1 NON 2	
324	VÉRIFIEZ 304: ENCERCLEZ LE CODE DE LA MÉTHODE: SI PLUS D'UN CODE MÉTHODE ENCERCLÉ À 304, ENCERCLEZ LE CODE DE LA PREMIÈRE MÉTHODE DE LA LISTE.	STÉRILISATION FÉMININE 01 STÉRILISATION MASCULINE 02 DIU 03 INJECTABLES 04 IMPLANTS 05 PILULE 06 CONDOM 07 CONDOM FÉMININ 08 PILULE DU LENDEMAIN 09 MÉTHODE DES JOURS FIXES 10 MAMA 11 MÉTHODE DU RYTHMI 12 RETRAIT 13 AUTRE MÉTHODE MODERNE 95 AUTRE MÉTHODE TRADITIONNELLE 96	→ 327 → 327 → 327

SECTION 3. CONTRACEPTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
325	<p>Où avez-vous obtenu (MÉTHODE ACTUELLE) la dernière fois ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ</p> <p>_____</p> <p>(NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL DU GOUVERNEMENT 11</p> <p>CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT 12</p> <p>CLINIQUE MOBILE 13</p> <p>AGENT DE SANTÉ/ RELAIS COMMUNAUTAIRE 14</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC</p> <p>_____ 16</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ 21</p> <p>PHARMACIE 22</p> <p>SOIN MÉDICAL/CABINET CLINIQUE 23</p> <p>CLINIQUE MOBILE 24</p> <p>CENTRE/HÔPITAL CONFESIONNELLE 25</p> <p>AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>_____ 26</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>ONG</p> <p>CLINIQUE PLANIFICATION FAMILIALE 31</p> <p>AUTRE SOURCE</p> <p>BOUTIQUE 41</p> <p>INSTITUTION RELIGIEUSE 42</p> <p>AMIS/PARENTS 43</p> <p>AUTRE _____ 96</p> <p>(PRÉCISEZ)</p>	<p>→ 327</p>
326	Connaissez-vous un endroit où vous pouvez vous procurer une méthode de planification familiale ?	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p>	
327	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez reçu la visite d'un relais communautaire ?	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p>	→ 329
328	Est-ce que le relais communautaire vous a parlé de planification familiale ?	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p>	
329	<p>VÉRIFIEZ 202: ENFANT VIVANT</p> <p>OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/></p> <p>a) Au cours des 12 derniers mois, êtes-vous allée dans un établissement de santé pour recevoir des soins pour vous-même ou pour vos enfants ?</p> <p>b) Au cours des 12 derniers mois, êtes-vous allée dans un établissement de santé pour recevoir des soins pour vous-même ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p>	→ 401
330	Est-ce qu'un membre du personnel de l'établissement de santé vous a parlé de méthodes de planification familiale ?	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p>	

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

401	VÉRIFIEZ 224: UNE NAISSANCE OU PLUS EN 2012-2017 <input type="checkbox"/> ↓ AUCUNE NAISSANCE EN 2012-2017 <input type="checkbox"/> → 648		
402	VÉRIFIEZ 215: INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES À 403 ET LE NOM ET L'ÉTAT DE SURVIE À 404 POUR CHAQUE NAISSANCE EN 2012-2017. POSEZ LES QUESTIONS SUR TOUTES CES NAISSANCES. COMMENCEZ PAR LA DERNIÈRE NAISSANCE. S'IL Y A PLUS DE 2 NAISSANCES, UTILISEZ LA DERNIÈRE COLONNE D'UN/DES QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE. Je voudrais maintenant vous poser des questions sur vos enfants nés dans les cinq dernières années. (Nous parlerons d'un enfant à la fois).		
403	NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES DE 212 DANS L'HISTORIQUE DES NAISSANCES.	DERNIÈRE NAISSANCE NUMÉRO HISTORIQUE NAISSANCE <input type="text"/> <input type="text"/>	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NUMÉRO HISTORIQUE NAISSANCE <input type="text"/> <input type="text"/>
404	À PARTIR DES QUESTIONS 212 ET 216:	NOM _____ VIVANT <input type="checkbox"/> DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/> ↓ ↓	NOM _____ VIVANT <input type="checkbox"/> DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/> ↓ ↓
405	Quand vous êtes tombée enceinte de (NOM), vouliez-vous être enceinte à ce moment-là ?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 408) ←	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 426) ←
406	VÉRIFIEZ 208: SEULEMENT UNE NAISSANCE <input type="checkbox"/> a) Est-ce que vous vouliez avoir un enfant plus tard, ou est-ce que vous ne vouliez pas d'enfant ? ↓ PLUS D'UNE NAISSANCE <input type="checkbox"/> b) Est-ce que vous vouliez avoir un enfant plus tard, ou est-ce que vous ne vouliez plus d'enfant ?	PLUS TARD 1 PLUS/AUCUN 2 (ALLEZ À 408) ←	PLUS TARD 1 PLUS/AUCUN 2 (ALLEZ À 426) ←
407	Combien de temps de plus vouliez-vous attendre ?	MOIS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 998	MOIS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 998
408	Avez-vous consulté quelqu'un pour des soins prénatals pour cette grossesse ?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 414) ←	
409	Qui avez-vous consulté ? Quelqu'un d'autre ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER CHAQUE TYPE DE PERSONNE ET ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	PROF. DE LA SANTÉ MÉDECIN A INFIRMIÈRE B SAGE-FEMME C AUTRE PERSONNEL AIDE SOIGNANTE D MATRONE E ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE F AGENT DE SANTÉ/RELAIS COMMUNAUTAIRE G AUTRE _____ X (PRÉCISEZ)	

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____																											
410	<p>Où avez-vous reçu les soins prénatals pour cette naissance ?</p> <p>Pas d'autre endroit ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____ (NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p>MAISON</p> <p>SA MAISON A</p> <p>AUTRE MAISON B</p> <p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL GOUVERNEMENT C</p> <p>CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT . . D</p> <p>MATERNITÉ ISOLÉE E</p> <p>UNITÉ VILLAGEOISE F</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ G</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ H</p> <p>CENTRE/HÔPITAL CONFSSIONELLE . . I</p> <p>AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ J</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE _____ X</p> <p>(PRÉCISEZ)</p>																												
411	De combien de mois étiez-vous enceinte quand vous avez reçu vos premiers soins prénatals pour cette grossesse ?	<p>MOIS <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NE SAIT PAS 98</p>																												
412	Durant cette grossesse, combien de fois avez-vous reçu des soins prénatals ?	<p>NOMBRE DE FOIS <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NE SAIT PAS 98</p>																												
413	Est-ce qu'au cours des visites prénatales durant cette grossesse, les examens suivants ont été effectués au moins une fois :	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>OUI</th> <th>NON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Vous a-t-on pris la tension ?</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>b) Vous a-t-on prélevé de l'urine ?</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>c) Vous a-t-on prélevé du sang ?</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>d) Vous a-t-on pris le poids ?</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>e) Vous a-t-on mesuré la taille ?</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>f) Vous a-t-on palpé à l'abdomen?</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>g) Vous a-t-on fait une échographie?</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>h) Vous a-t-on donné des conseils nutritionnels?</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		OUI	NON	a) Vous a-t-on pris la tension ?	1	2	b) Vous a-t-on prélevé de l'urine ?	1	2	c) Vous a-t-on prélevé du sang ?	1	2	d) Vous a-t-on pris le poids ?	1	2	e) Vous a-t-on mesuré la taille ?	1	2	f) Vous a-t-on palpé à l'abdomen?	1	2	g) Vous a-t-on fait une échographie?	1	2	h) Vous a-t-on donné des conseils nutritionnels?	1	2	
	OUI	NON																												
a) Vous a-t-on pris la tension ?	1	2																												
b) Vous a-t-on prélevé de l'urine ?	1	2																												
c) Vous a-t-on prélevé du sang ?	1	2																												
d) Vous a-t-on pris le poids ?	1	2																												
e) Vous a-t-on mesuré la taille ?	1	2																												
f) Vous a-t-on palpé à l'abdomen?	1	2																												
g) Vous a-t-on fait une échographie?	1	2																												
h) Vous a-t-on donné des conseils nutritionnels?	1	2																												
414	Durant cette grossesse, vous a-t-on fait une injection dans le bras pour éviter au bébé d'avoir le tétanos, c'est-à-dire des convulsions après la naissance ?	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>(ALLEZ À 417) ←</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>																												
415	Durant cette grossesse, combien de fois vous a-t-on fait une injection contre le tétanos ?	<p>NOMBRE DE FOIS <input type="text"/></p> <p>NE SAIT PAS 8</p>																												

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____
416	VÉRIFIEZ 415: INJECTIONS ANTITÉTANIQUES	2 FOIS OU PLUS <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 420) ←	
417	À n'importe quel moment avant cette grossesse, vous a-t-on fait des injections contre le tétanos ?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 420) ← NE SAIT PAS 8	
418	Avant cette grossesse, combien de fois avez-vous eu des injections contre le tétanos ? SI 7 FOIS OU PLUS INSCRIVEZ '7'.	NOMBRE DE FOIS <input type="text"/> NE SAIT PAS 8	
419	VÉRIFIEZ 418: SEULEMENT UNE FOIS <input type="checkbox"/> PLUS D'UNE FOIS <input type="checkbox"/> a) Il y a combien d'années que vous avez reçu cette injection contre le tétanos ? b) Il y a combien d'années que vous avez reçu la dernière injection contre le tétanos avant cette grossesse ?	IL Y A ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/>	
420	Durant cette grossesse, vous a-t-on donné ou avez-vous acheté des comprimés de fer ou du sirop contenant du fer ? MONTREZ LES COMPRIMÉS/SIROP.	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 422) ← NE SAIT PAS 8	
421	Durant toute la grossesse, pendant combien de jours avez-vous pris des comprimés ou du sirop ? SI LA RÉPONSE N'EST PAS NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UN NOMBRE	JOURS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 998	
422	Durant cette grossesse, avez-vous pris des médicaments contre les vers intestinaux ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
423	Durant cette grossesse, avez-vous pris des médicaments pour éviter le paludisme ?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 426) ← NE SAIT PAS 8	
423A	Quels médicaments avez-vous pris ? ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ. SI LE TYPE DE MÉDICAMENT N'EST PAS DÉTERMINÉ, MONTREZ DES ANTIPALUDÉENS COURANTS À L'ENQUÊTÉE.	SP/FANSIDAR A CHLOROQUINE B AUTRE X (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS Z	
423B	VÉRIFIEZ 423A : SP/FANSIDAR PRIS À TITRE PRÉVENTIF CONTRE LE PALUDISME.	CODE 'A' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> CODE 'A' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (PASSEZ À 426) ←	

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE
		NOM _____	NOM _____
424	Durant cette grossesse, combien de fois avez-vous pris de la SP/Fansidar ?	NOMBRE DE FOIS ... <input type="text"/> <input type="text"/>	
424B	Combien de fois avez-vous pris la SP/FANSIDAR sous direct observation d'un agent de santé?	NOMBRE DE FOIS ... <input type="text"/> <input type="text"/> AUCUNE ... 0	
425	Vous a-t-on donné la SP/Fansidar durant une visite prénatale, durant une autre visite médicale dans un établissement de santé ou l'avez-vous obtenue ailleurs ? SI PLUS D'UNE SOURCE, INSCRIVEZ LA PREMIÈRE SOURCE DE LA LISTE.	VISITE PRÉNATALE 1 AUTRE VISITE MÉDICALE 2 AILLEURS 6	
425A	VÉRIFIEZ 425 : VISITE PRÉNATALE	CODE '1' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> CODE '1' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (PASSEZ À 426) ←	
425B	Avez vous une carte prénatale pour le temps que vous étiez enceinte de (NOM) ?	OUI, CARTE VUE 1 OUI, CARTE PAS VUE 2 (ALLEZ À 426) ← PAS DE CARTE 8	
425C	VÉRIFIER LA CARTE PRÉNATALE ET ENREGISTRER LE NOMBRE DE FOIS LA SP/FANSIDAR EST DONNÉE	NOMBRE DE FOIS ... <input type="text"/> <input type="text"/> AUCUNE ... 0	
426	Quand (NOM) est né, était-il/elle très gros, plus gros que la moyenne, moyen, plus petit que la moyenne ou très petit ?	TRÈS GROS 1 PLUS GROS QUE LA MOYENNE 2 MOYEN 3 PLUS PETIT QUE LA MOYENNE 4 TRÈS PETIT 5 NE SAIT PAS 8	TRÈS GROS 1 PLUS GROS QUE LA MOYENNE 2 MOYEN 3 PLUS PETIT QUE LA MOYENNE 4 TRÈS PETIT 5 NE SAIT PAS 8
427	(NOM) a t-il /elle été pesé à la naissance ?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 429) ← NE SAIT PAS 8	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 429) ← NE SAIT PAS 8
428	Combien (NOM) pesait-il/elle ? INSCRIVEZ LE POIDS EN KILOGRAMMES À PARTIR DU CARNET DE SANTÉ, SI DISPONIBLE.	KG DU CARNET 1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> KG DE MÉMOIRE 2 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 99998	KG DU CARNET 1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> KG DE MÉMOIRE 2 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 99998

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____												
429	<p>Qui vous a assisté durant l'accouchement de (NOM) ?</p> <p>Quelqu'un d'autre ?</p> <p>INSISTEZ POUR LE/LES TYPES DE PERSONNE ET ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.</p> <p>SI L'ENQUÊTÉE DÉCLARE QUE PERSONNE N'A ASSISTÉ L'ACCOUCHEMENT, INSISTEZ POUR DÉTERMINER SI DES ADULTES ÉTAIENT PRÉSENTS À L'ACCOUCHEMENT.</p>	<p>PROF. DE LA SANTÉ MÉDECIN A INFIRMIÈRE B SAGE-FEMME C</p> <p>AUTRE PERSONNEL AIDE SOIGNANTE D MATRONE E ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE F PARENT/AMI G AUTRE _____ X (PRÉCISEZ) PERSONNE Y</p>	<p>PROF. DE LA SANTÉ MÉDECIN A INFIRMIÈRE B SAGE-FEMME C</p> <p>AUTRE PERSONNEL AIDE SOIGNANTE D MATRONE E ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE F PARENT/AMI G AUTRE _____ X (PRÉCISEZ) PERSONNE Y</p>												
430	<p>Où avez-vous accouché de (NOM) ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____ (NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p>MAISON SA MAISON 11 (PASSEZ À 434) ← AUTRE MAISON 12</p> <p>SECTEUR PUBLIC HÔPITAL GOUVERNEMENT .. 21 CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. 22 MATERNITÉ ISOLÉE .. 23 UNITÉ VILLAGEOISE .. 24 AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ 26 (PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ 31 CENTRE/HÔPITAL CONFESSIONNELLE .. 32 AUTRE SECTEUR MÉDICAL _____ 36 (PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ) (PASSEZ À 434) ←</p>	<p>MAISON SA MAISON 11 (PASSEZ À 434) ← AUTRE MAISON 12</p> <p>SECTEUR PUBLIC HÔPITAL GOUVERNEMENT .. 21 CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. 22 MATERNITÉ ISOLÉE .. 23 UNITÉ VILLAGEOISE .. 24 AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ 26 (PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ 31 CENTRE/HÔPITAL CONFESSIONNELLE .. 32 AUTRE SECTEUR MÉDICAL _____ 36 (PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ) (PASSEZ À 434) ←</p>												
431	<p>Combien de temps après l'accouchement de (NOM) êtes-vous restée là ?</p> <p>SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS.</p>	<p>HEURES 1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table></p> <p>JOURS 2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table></p> <p>SEMAINES 3 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table></p> <p>NE SAIT PAS 998</p>													
432	<p>Avez-vous accouché de (NOM) par césarienne, c'est-à-dire que l'on vous a ouvert le ventre pour faire sortir le bébé ?</p>	<p>OUI 1 NON 2 (PASSEZ À 434) ←</p>	<p>OUI 1 NON 2 (PASSEZ À 434) ←</p>												
433	<p>Quand la décision de pratiquer une césarienne a-t-elle été prise ? Était-ce avant ou après le début des douleurs ?</p>	<p>AVANT 1 APRÈS 2</p>	<p>AVANT 1 APRÈS 2</p>												

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE
		NOM _____	NOM _____
433A	Est-ce que vous avez payé pour accoucher par césarienne ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8
434	Est-ce que (NOM) a été posé sur votre poitrine, immédiatement après sa naissance ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 (ALLEZ À 434B) ←	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 (ALLEZ À 459) ←
434A	Est-ce que la peau de (NOM) était en contact avec votre peau ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8
434B	VÉRIFIEZ 430: LIEU D'ACCOUCHEMENT	CODE 11, 12, OU 96 ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 449) ←	
435	Je voudrais vous parler de contrôle de votre santé après l'accouchement, par exemple quelqu'un qui vous a posé des questions sur votre santé ou vous a examinée. Est-ce que quelqu'un a vérifié votre état de santé pendant que vous étiez dans l'établissement ?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 438) ←	
436	Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier examen ? SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS.	HEURES 1 <input type="text"/> <input type="text"/> JOURS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> SEMAINES 3 <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 998	
437	Qui a examiné votre état de santé à ce moment-là ? INSISTEZ POUR OBTENIR LA PERSONNE LA PLUS QUALIFIÉE.	PROF. DE LA SANTÉ MÉDECIN 11 INFIRMIÈRE 12 SAGE-FEMME 13 AUTRE PERSONNEL AIDE SOIGNANTE 21 MATRONE 22 ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE 23 AGENT DE SANTÉ/RELAIS COMMUNAUTAIRE 24 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
437A	Est-ce qu'une femme paie pour avoir une césarienne au Bénin ?	OUI, PAIE 1 NON, NE PAIE PAS 2 NE SAIT PAS 8	
438	Je voudrais maintenant vous parler d'exams de la santé de (NOM) après la naissance – par exemple, quelqu'un qui a examiné (NOM), qui a vérifié le cordon ombilical ou qui s'est assuré que (NOM) allait bien. Est-ce que quelqu'un a vérifié l'état de santé de (NOM) pendant que vous étiez encore dans l'établissement ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 (ALLEZ À 441) ←	

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____												
439	Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier examen de (NOM) ? SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS.	HEURES 1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> JOURS 2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> SEMAINES 3 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> NE SAIT PAS 998													
440	Qui a examiné l'état de santé de (NOM) à ce moment-là ? INSISTEZ POUR OBTENIR LA PERSONNE LA PLUS QUALIFIÉE	PROF. DE LA SANTÉ MÉDECIN 11 INFIRMIÈRE 12 SAGE-FEMME 13 AUTRE PERSONNEL AIDE SOIGNANTE 21 MATRONE 22 ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE 23 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)													
441	Je voudrais maintenant parler de ce qui s'est passé après que vous ayez quitté l'établissement. Est-ce que quelqu'un a examiné votre état de santé après que vous ayez quitté l'établissement ?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 445) ←													
442	Combien de temps après l'accouchement a eu lieu cet examen ? SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS.	HEURES 1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> JOURS 2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> SEMAINES 3 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> NE SAIT PAS 998													
443	Qui a examiné votre état de santé à ce moment-là ? INSISTEZ POUR OBTENIR LA PERSONNE LA PLUS QUALIFIÉE.	PROF. DE LA SANTÉ MÉDECIN 11 INFIRMIÈRE 12 SAGE-FEMME 13 AUTRE PERSONNEL AIDE SOIGNANTE 21 MATRONE 22 ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE 23 AGENT DE SANTÉ/RELAIS COMMUNAUTAIRE 24 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)													

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____
444	<p>Où a eu lieu l'examen ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____ (NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p>MAISON</p> <p>SA MAISON 11</p> <p>AUTRE MAISON 12</p> <p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL GOUVERNEMENT... 21</p> <p>CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. 22</p> <p>MATERNITÉ ISOLÉE ... 23</p> <p>UNITÉ VILLAGEOISE ... 24</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ 26 (PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ 31</p> <p>CENTRE/HÔPITAL CONFESSIONELLE .. 32</p> <p>AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ 36 (PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)</p>	
445	<p>Je voudrais parler des examens de l'état de santé de (NOM) après votre départ de (ÉTABLISSEMENT À 430). Est-ce-qu'un prestataire de santé ou une accoucheuse traditionnelle a vérifié l'état de santé de (NOM) dans les deux mois après votre départ de (ÉTABLISSEMENT À 430) ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>(ALLEZ À 457) ←</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>	
446	<p>Combien d'heures, de jours ou de semaines après la naissance de (NOM), cet examen a-t-il eu lieu ?</p> <p>SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS.</p>	<p>HEURES 1</p> <p>JOURS 2</p> <p>SEMAINES 3</p> <p>NE SAIT PAS 998</p>	
447	<p>Qui a examiné l'état de santé de (NOM) à ce moment-là ?</p> <p>INSISTEZ POUR OBTENIR LA PERSONNE LA PLUS QUALIFIÉE.</p>	<p>PROF. DE LA SANTÉ</p> <p>MÉDECIN 11</p> <p>INFIRMIÈRE 12</p> <p>SAGE-FEMME 13</p> <p>AUTRE PERSONNEL</p> <p>AIDE SOIGNANTE 21</p> <p>MATRONE 22</p> <p>ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE 23</p> <p>AGENT DE SANTÉ/RELAIS COMMUNAUTAIRE ... 24</p> <p>AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)</p>	

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____
448	<p>Où a eu lieu l'examen de (NOM) ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____ (NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p>MAISON</p> <p>SA MAISON 11</p> <p>AUTRE MAISON 12</p> <p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL GOUVERNEMENT... 21</p> <p>CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT ... 22</p> <p>MATERNITÉ ISOLÉE ... 23</p> <p>UNITÉ VILLAGEOISE ... 24</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC 26</p> <p>_____ (PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ 31</p> <p>CENTRE/HÔPITAL CONFESSIONELLE ... 32</p> <p>AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ 36</p> <p>_____ (PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE 96</p> <p>_____ (PRÉCISEZ) (ALLEZ À 457) ←</p>	
449	<p>Je voudrais vous parler de contrôle de votre santé après l'accouchement, par exemple quelqu'un qui vous a posé des questions sur votre santé ou vous a examinée. Est-ce que quelqu'un a vérifié votre état de santé après la naissance de (NOM) ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>(ALLEZ À 453) ←</p>	
450	<p>Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier examen ?</p> <p>SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS.</p>	<p>HEURES 1</p> <p>JOURS 2</p> <p>SEMAINES 3</p> <p>NE SAIT PAS 998</p>	
451	<p>Qui a examiné votre état de santé à ce moment-là ?</p> <p>INSISTEZ POUR OBTENIR LA PERSONNE LA PLUS QUALIFIÉE.</p>	<p>PROF. DE LA SANTÉ</p> <p>MÉDECIN 11</p> <p>INFIRMIÈRE 12</p> <p>SAGE-FEMME 13</p> <p>AUTRE PERSONNEL</p> <p>AIDE SOIGNANTE 21</p> <p>MATRONE 22</p> <p>ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE 23</p> <p>AGENT DE SANTÉ/RELAIS COMMUNAUTAIRE ... 24</p> <p>AUTRE 96</p> <p>_____ (PRÉCISEZ)</p>	

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____						
452	<p>Où a eu lieu ce premier examen ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT</p> <p>_____ (NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p>MAISON SA MAISON 11 AUTRE MAISON 12</p> <p>SECTEUR PUBLIC HÔPITAL GOUVERNEMENT... 21 CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. 22 MATERNITÉ ISOLÉE ... 23 UNITÉ VILLAGEOISE ... 24 AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ 26 (PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ 31 CENTRE/HÔPITAL CONFESSIONELLE .. 32 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ 36 (PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)</p>							
453	<p>Je voudrais vous parler des examens qui ont été faits pour vérifier l'état de santé de (NOM) après l'accouchement – par exemple, est-ce que quelqu'un a examiné (NOM), vérifié le cordon ou s'est assuré que (NOM) allait bien. Dans les deux mois après la naissance de (NOM), est-ce qu'un professionnel de santé ou une accoucheuse traditionnelle a vérifié l'état de santé de (NOM) ?</p>	<p>OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 457) ← NE SAIT PAS 8</p>							
454	<p>Combien d'heures, de jours ou de semaines après la naissance de (NOM), ce premier examen a-t-il eu lieu ?</p> <p>SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS.</p>	<p>HEURES APRÈS NAISSANCE .. 1 <table border="1" data-bbox="911 1301 1050 1352"><tr><td></td><td></td></tr></table> JOURS APRÈS NAISSANCE .. 2 <table border="1" data-bbox="911 1352 1050 1404"><tr><td></td><td></td></tr></table> SEMAINES APRÈS NAISSANCE .. 3 <table border="1" data-bbox="911 1404 1050 1456"><tr><td></td><td></td></tr></table> NE SAIT PAS 998</p>							
455	<p>Qui a examiné l'état de santé de (NOM) à ce moment-là ?</p> <p>INSISTEZ POUR OBTENIR LA PERSONNE LA PLUS QUALIFIÉE.</p>	<p>PROF. DE LA SANTÉ MÉDECIN 11 INFIRMIÈRE 12 SAGE-FEMME 13</p> <p>AUTRE PERSONNEL AIDE SOIGNANTE 21 MATRONE 22 ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE 23 AGENT DE SANTÉ/RELAIS COMMUNAUTAIRE ... 24</p> <p>AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)</p>							

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____																								
456	<p>Où a eu lieu le premier examen de (NOM) ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____ (NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p>MAISON SA MAISON 11 AUTRE MAISON 12</p> <p>SECTEUR PUBLIC HÔPITAL GOUVERNEMENT... 21 CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. 22 MATERNITÉ ISOLÉE ... 23 UNITÉ VILLAGEOISE ... 24 AUTRE SECTEUR PUBLIC 26 _____ (PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ 31 CENTRE/HÔPITAL CONFESSIONELLE .. 32 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ 36 _____ (PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE 96 _____ (PRÉCISEZ)</p>																									
457	<p>Au cours des deux jours suivant la naissance de (NOM), est-ce qu'un prestataire de santé a fait l'une des choses suivantes ?</p> <p>a) Examiné le cordon ?</p> <p>b) Vérifié la température de (NOM) ?</p> <p>c) Vous a conseillé sur les signes de danger chez les nouveau-nés ?</p> <p>d) Vous a conseillé sur l'allaitement ?</p> <p>e) Observé (NOM) en train d'être allaité ?</p>	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>OUI</th> <th>NON</th> <th>NSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) CORDON</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>b) TEMP</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>c) SIGNES</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>d) CONSEIL ALLAI- TEMENT ..</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>e) OBSERVÉ ALLAI- TEMENT ..</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		OUI	NON	NSP	a) CORDON	1	2	8	b) TEMP	1	2	8	c) SIGNES	1	2	8	d) CONSEIL ALLAI- TEMENT ..	1	2	8	e) OBSERVÉ ALLAI- TEMENT ..	1	2	8	
	OUI	NON	NSP																								
a) CORDON	1	2	8																								
b) TEMP	1	2	8																								
c) SIGNES	1	2	8																								
d) CONSEIL ALLAI- TEMENT ..	1	2	8																								
e) OBSERVÉ ALLAI- TEMENT ..	1	2	8																								
458	<p>Vos règles sont-elles revenues depuis la naissance de (NOM) ?</p>	<p>OUI 1 (ALLEZ À 460) ←</p> <p>NON 2 (ALLEZ À 461) ←</p>																									
459	<p>Est-ce que vos règles sont revenues entre la naissance de (NOM) et votre grossesse suivante ?</p>		<p>OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 463) ←</p>																								
460	<p>Pendant combien de mois après la naissance de (NOM) n'avez-vous pas eu vos règles ?</p>	<p>MOIS <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NE SAIT PAS 98</p>	<p>MOIS <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NE SAIT PAS 98</p>																								
461	<p>VÉRIFIEZ 226: L'ENQUÊTÉE EST-ELLE ENCEINTE ?</p>	<p>PAS ENCEINTE <input type="checkbox"/></p> <p>ENCEINTE OU PAS SÛRE <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 463) ←</p>																									

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE		AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE	
		NOM _____		NOM _____	
462	Avez-vous eu des rapports sexuels depuis la naissance de (NOM) ?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 464) ←			
463	Pendant combien de mois après la naissance de (NOM) n'avez-vous pas eu de rapports sexuels ?	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98		MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98	
464	Avez-vous allaité (NOM) ?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 466) ←		OUI 1 NON 2	
465	VÉRIFIEZ 404: L'ENFANT EST-IL VIVANT ?	VIVANT <input type="checkbox"/> DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 470) ← (ALLEZ À 471) ←			
466	Combien de temps après la naissance avez-vous mis (NOM) au sein pour la première fois ? SI MOINS D'1 HEURE, INSCRIVEZ '00' HEURE; SI MOINS DE 24 HEURES, INSCRIVEZ EN HEURES; SINON, EN JOURS.	IMMÉDIATEMENT 000 HEURES 1 <input type="text"/> <input type="text"/> JOURS 2 <input type="text"/> <input type="text"/>			
467	Dans les trois premiers jours après la naissance, est-ce que (NOM) a reçu autre chose à boire que le lait maternel ?	OUI 1 NON 2			
468	VÉRIFIEZ 404: L'ENFANT EST-IL VIVANT ?	VIVANT <input type="checkbox"/> ↓ (ALLEZ À 471) ←	DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 471) ←	VIVANT <input type="checkbox"/> ↓ (ALLEZ À 471) ←	DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 471) ←
469	Allaitez-vous encore (NOM) ?	OUI 1 NON 2			
470	(NOM) a-t-il bu quelque chose au biberon hier ou la nuit dernière ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8		OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
471		RETOURNEZ À 405 À LA COLONNE SUIVANTE ; OU, S'IL N'Y A PLUS DE NAISSANCES, ALLEZ À 501A.		RETOURNEZ À 405 À L'AVANT-DERNIÈRE COLONNE DU NOUVEAU QUESTIONNAIRE ; OU, S'IL N'Y A PLUS DE NAISSANCES, ALLEZ À 501A.	

SECTION 5A. VACCINATION DES ENFANTS (DERNIÈRE NAISSANCE)

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
501A	VÉRIFIEZ 215 DANS L'HISTORIQUE DES NAISSANCES : UNE NAISSANCE EN 2014-2017? UNE NAISSANCE OU PLUS EN <input type="checkbox"/> 2014-2017 ↓	AUCUNE NAISSANCE <input type="checkbox"/> EN 2014-2017	→ 601
502A	INSCRIVEZ LE NOM ET LE NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES DE 212 DU DERNIER ENFANT NÉ EN 2014-2017. NOM DE LA DERNIÈRE NAISSANCE _____	NUMÉRO HISTORIQUE DES NAISSANCES <input type="text"/> <input type="text"/>	
503A	VÉRIFIEZ 216 POUR ENFANT: VIVANT <input type="checkbox"/> ↓	DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/>	→ 501B
504A	Avez-vous un carnet ou un autre document où les vaccinations de (NOM) sont inscrites ?	OUI, A SEULEMENT UN CARNET 1 OUI, A SEULEMENT UN AUTRE DOCUMENT .. 2 OUI, A UN CARNET ET UN AUTRE DOCUMENT... 3 NON, PAS DE CARNET ET PAS D'AUTRE DOCUMENT 4	→ 507A → 507A
505A	Avez-vous déjà eu un carnet de vaccination pour (NOM) ?	OUI 1 NON 2	
506A	VÉRIFIEZ 504A: CODE '2' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓	CODE '4' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/>	→ 511A
507A	Puis-je voir le carnet ou un autre document sur lequel les vaccinations de (NOM) sont inscrites ?	OUI, SEULEMENT CARNET VU 1 OUI, SEULEMENT AUTRE DOCUMENT VU 2 OUI, CARNET ET AUTRE DOCUMENT VUS 3 NI CARNET NI AUTRE DOCUMENT VUS 4	→ 511A

SECTION 5A. VACCINATION DES ENFANTS (DERNIÈRE NAISSANCE)

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
	NOM DE LA DERNIÈRE NAISSANCE _____	NUMÉRO HISTORIQUE DES NAISSANCES <input type="text"/> <input type="text"/>	
511A	(NOM) a-t-il/elle reçu des vaccins pour éviter de contracter des maladies, y compris des vaccins reçus au cours de campagnes ou de journées de vaccination ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 525A
512A	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin du BCG contre la tuberculose, c'est-à-dire une injection dans l'avant bras gauche qui laisse habituellement une cicatrice ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
514A	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin oral contre la polio, c'est-à-dire deux gouttes dans la bouche pour éviter la polio ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 517A
515A	Est-ce que (NOM) a reçu le premier vaccin oral contre la polio dans les deux premières semaines après sa naissance ou plus tard ?	DEUX PREMIÈRES SEMAINES 1 PLUS TARD 2	
516A	Combien de fois (NOM) a-t-il/elle reçu le vaccin oral contre la polio ?	NOMBRE DE FOIS <input type="text"/>	
517A	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin Pentavalent c'est-à-dire une injection faite au bras gauche, donné parfois en même temps que les gouttes du vaccin contre la	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 519A
518A	Combien de fois (NOM) a-t-il/elle reçu le vaccin Pentavalent ?	NOMBRE DE FOIS <input type="text"/>	

SECTION 5A. VACCINATION DES ENFANTS (DERNIÈRE NAISSANCE)

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
	NOM DE LA DERNIÈRE NAISSANCE _____	NUMÉRO HISTORIQUE DES NAISSANCES <input type="text"/> <input type="text"/>	
519A	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin contre le pneumocoque, c'est-à-dire une injection dans la cuisse gauche pour éviter la pneumonie ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 523A
520A	Combien de fois (NOM) a-t-il/elle reçu le vaccin contre le pneumocoque ?	NOMBRE DE FOIS <input type="text"/>	
523A	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin contre la rougeole, c'est-à-dire une injection dans le bras pour lui éviter la rougeole ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
524A	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin contre la fièvre jaune, c'est-à-dire une injection dans la cuisse droite pour lui éviter la fièvre jaune ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
524Aa	Est-ce que (NOM) a reçu certaines de ces vaccinations au cours des douze derniers mois lors d'une campagne (journée) nationale de vaccination ?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 525A) ← NE SAIT PAS 8	
524Ab	Au cours de quelle campagne nationale de vaccination, (NOM) a-t-il reçu ces vaccinations ? [AVRIL 2017 1 OCTOBRE 2017 2 AUTRE 6 (PRÉCISEZ)	
525A	Au cours des sept derniers jours, a-t-on donné à (NOM) :	OUI NON NSP	
	a) Un mélange en poudre de micronutriments (MNP) ?	a) POUDRE 1 2 8	
	b) Le Plumpy'Nuts ?	b) PLUMPY NUTS 1 2 8	
	c) Le Plumpy'Doz ?	c) PLUMPY DOZ 1 2 8	
526A	CONTINUEZ AVEC 501B.		

SECTION 5B. VACCINATION DES ENFANTS (AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE)

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
501B	VÉRIFIEZ 215 DANS L'HISTORIQUE DES NAISSANCES: D'AUTRES NAISSANCES EN 2014-2017? D'AUTRES NAISSANCES EN 2014-2017 <input type="checkbox"/>	PLUS DE NAISSANCE EN 2014-2017 <input type="checkbox"/>	→ 601
502B	INSCRIVEZ LE NOM ET LE NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES DE 212 DE L'AVANT-DERNIER ENFANT NÉ EN 2014-2017. NOM DE L'AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE _____	NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES <input type="text"/> <input type="text"/>	
503B	VÉRIFIEZ 216 POUR ENFANT ENFANT: VIVANT <input type="checkbox"/>	DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/>	→ 526B
504B	Avez-vous un carnet ou un autre document où les vaccinations de (NOM) sont inscrites ?	OUI, A SEULEMENT UN CARNET 1 OUI, A SEULEMENT UN AUTRE DOCUMENT .. 2 OUI, A UN CARNET ET UN AUTRE DOCUMENT... 3 NON, PAS DE CARNET ET PAS D'AUTRE DOCUMENT 4	→ 507B → 507B
505B	Avez-vous déjà eu un carnet de vaccination pour (NOM) ?	OUI 1 NON 2	
506B	VÉRIFIEZ 504B: CODE '2' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/>	CODE '4' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/>	→ 511B
507B	Puis-je voir le carnet ou un autre document sur lequel les vaccinations de (NOM) sont inscrites ?	OUI, SEULEMENT CARNET VU 1 OUI, SEULEMENT AUTRE DOCUMENT VU 2 OUI, CARNET ET AUTRE DOCUMENT VUS 3 NI CARNET NI AUTRE DOCUMENT VUS 4	→ 511B

SECTION 5B. VACCINATION DES ENFANTS (AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE)

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
	NOM DE L'AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE _____	NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES <input type="text"/> <input type="text"/>	
511B	(NOM) a-t-il/elle reçu des vaccins pour éviter de contracter des maladies, y compris des vaccins reçus au cours de campagnes ou de journées de vaccination ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 525B
512B	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin du BCG contre la tuberculose, c'est-à-dire une injection dans l'avant bras gauche qui laisse habituellement une cicatrice ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
514B	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin oral contre la polio, c'est-à-dire deux gouttes dans la bouche pour éviter la polio ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 517B
515B	Est-ce que (NOM) a reçu le premier vaccin oral contre la polio dans les deux premières semaines après sa naissance ou plus tard ?	DEUX PREMIÈRES SEMAINES 1 PLUS TARD 2	
516B	Combien de fois (NOM) a-t-il/elle reçu le vaccin oral contre la polio ?	NOMBRE DE FOIS <input type="text"/>	
517B	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin Pentavalent c'est-à-dire une injection faite au bras gauche, donné parfois en même temps que les gouttes du vaccin contre la	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 519B
518B	Combien de fois (NOM) a-t-il/elle reçu le vaccin Pentavalent ?	NOMBRE DE FOIS <input type="text"/>	

SECTION 5B. VACCINATION DES ENFANTS (AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE)

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
	NOM DE L'AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE _____	NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES <input type="text"/> <input type="text"/>	
519B	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin contre le pneumocoque, c'est-à-dire une injection dans la cuisse gauche pour éviter la pneumonie ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 523B
520B	Combien de fois (NOM) a-t-il/elle reçu le vaccin contre le pneumocoque ?	NOMBRE DE FOIS <input type="text"/>	
523B	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin contre la rougeole, c'est-à-dire une injection dans le bras pour lui éviter la rougeole ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
524B	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin contre la fièvre jaune, c'est-à-dire une injection dans la cuisse droite pour lui éviter la fièvre jaune ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
524Ba	Est-ce que (NOM) a reçu certaines de ces vaccinations au cours des douze derniers mois lors d'une campagne (journée) nationale de vaccination ?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 527B) ← NE SAIT PAS 8	
524Bb	Au cours de quelle campagne nationale de vaccination, (NOM) a-t-il reçu ces vaccinations ?	AVRIL 2017 1 OCTOBRE 2017 2 AUTRE 6 (PRÉCISEZ)	
525B	Au cours des sept derniers jours, a-t-on donné à (NOM) :		
	a) Un mélange en poudre de micronutriments (MNP) ?	OUI NON NSP a) POUDRE 1 2 8	
	b) Le Plumpy'Nuts ?	b) PLUMPY NUT 1 2 8	
	c) Le Plumpy'Doz ?	c) PLUMPY DOZ 1 2 8	
526B	VÉRIFIEZ 215 DANS L'HISTORIQUE DES NAISSANCES: D'AUTRES NAISSANCES EN 2014-2017? AUTRES NAISSANCES EN 2014-2017 <input type="text"/> (ALLEZ À 502B DANS UN QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE) ←	PAS D'AUTRES NAISSANCES EN 2014-2017 <input type="text"/>	→ 601

SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

601	VÉRIFIEZ 224: UNE NAISSANCE OU PLUS EN 2012-2017 <input type="checkbox"/>	AUCUNE NAISSANCE EN 2012-2017 <input type="checkbox"/>	648
602	VÉRIFIEZ 215: INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES À 603 ET LE NOM ET L'ÉTAT DE SURVIE À 604 POUR CHAQUE NAISSANCE EN 2012-2017. POSEZ LES QUESTIONS SUR TOUTES CES NAISSANCES. COMMENCEZ PAR LA DERNIÈRE NAISSANCE. S'IL Y A PLUS DE NAISSANCES, UTILISEZ LA DERNIÈRE COLONNE D'UN/DÉS QUESTIONNAIRES ADDITIONNEL(S). Je voudrais maintenant vous poser des questions sur vos enfants nés dans les cinq dernières années. (Nous parlerons d'un enfant à la fois).		
603	NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES DE 212 DANS L'HISTORIQUE DES NAISSANCES	DERNIÈRES NAISSANCE NUMÉRO L'HISTORIQUE DES NAISSANCES <input type="text"/>	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NUMÉRO L'HISTORIQUE DES NAISSANCES <input type="text"/>
604	DE 212 ET 216:	NOM _____ VIVANT <input type="checkbox"/> DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 646) ←	NOM _____ VIVANT <input type="checkbox"/> DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 646) ←
605	Au cours des six derniers mois, a-t-on donné à (NOM) une dose de vitamine A comme [celle-ci/l'une de celles-ci] ? MONTREZ DES MODÈLES COURANTS CAPSULES.	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8
606	Au cours des sept derniers jours, a-t-on donné à (NOM) des comprimés de fer, des granules ou du sirop contenant du fer comme [celui-ci/l'un de ceux-ci] ? MONTREZ DES MODÈLES COURANTS DE COMPRIMÉS, GRANULES OU SIROP.	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8
607	Au cours des six derniers mois, a-t-on donné à (NOM) des médicaments contre les vers intestinaux comme l'albendazole	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8
608	(NOM) a-t-il eu la diarrhée au cours des deux dernières semaines ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 (ALLEZ À 618) ←	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 (ALLEZ À 618) ←

SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE		AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE	
		NOM _____		NOM _____	
609	<p>VÉRIFIEZ 469: ALLAITÉ ACTUELLEMENT</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON/ <input type="checkbox"/> PAS POSÉ </p> <p>a) Je voudrais maintenant savoir quelle quantité de liquides a été donnée à (NOM) pendant la diarrhée, y compris le lait maternel. Lui a-t-on donné à boire moins que d'habitude, environ la même quantité ou plus que d'habitude ?</p> <p>SI MOINS, INSISTEZ : Lui a-t-on donné à boire beaucoup moins que d'habitude ou un peu moins ?</p>	<p>b) Je voudrais maintenant savoir quelle quantité de liquides a été donnée à (NOM) pendant la diarrhée. Lui a-t-on donné à boire moins que d'habitude, environ la même quantité ou plus que d'habitude ?</p> <p>SI MOINS, INSISTEZ : Lui a-t-on donné à boire beaucoup moins que d'habitude ou un peu moins ?</p>	<p>BEAUCOUP MOINS 1</p> <p>UN PEU MOINS 2</p> <p>ENVIRON LA MÊME QUANTIT . . 3</p> <p>PLUS 4</p> <p>RIEN À BOIRE 5</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>	<p>BEAUCOUP MOINS 1</p> <p>UN PEU MOINS 2</p> <p>ENVIRON LA MÊME QUANTIT . . 3</p> <p>PLUS 4</p> <p>RIEN À BOIRE 5</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>	
610	<p>Quand (NOM) avait la diarrhée, lui a-t-on donné à manger moins que d'habitude, environ la même quantité, plus que d'habitude ou rien à manger ?</p> <p>SI MOINS, INSISTEZ : Lui a-t-on donné à manger beaucoup moins que d'habitude ou un peu moins ?</p>	<p>BEAUCOUP MOINS 1</p> <p>UN PEU MOINS 2</p> <p>ENVIRON LA MÊME QUANTIT . . 3</p> <p>PLUS 4</p> <p>A STOPPÉ LA NOURRITURE . . 5</p> <p>N'A JAMAIS DONNÉ À MANGER 6</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>	<p>BEAUCOUP MOINS 1</p> <p>UN PEU MOINS 2</p> <p>ENVIRON LA MÊME QUANTIT . . 3</p> <p>PLUS 4</p> <p>A STOPPÉ LA NOU... 5</p> <p>N'A JAMAIS DONNÉ À MANGER 6</p> <p>NE SAIT PAS. 8</p>		
611	<p>Avez-vous recherché des conseils ou un traitement pour la diarrhée ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p style="text-align: right;">(ALLEZ À 615) ←</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p style="text-align: right;">(ALLEZ À 615) ←</p>		

SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____
612	<p>Où êtes-vous allée pour rechercher des conseils ou un traitement ?</p> <p>Quelque part ailleurs ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____</p> <p>(NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL GOUVT. A</p> <p>CENTRE DE SANTÉ GOUVT. B</p> <p>CLINIQUE PF C</p> <p>AGENT DE TERRAIN D</p> <p>CENTRE SOCIAL.. . . . E</p> <p>AGENT DE SANTE STRAT AV F</p> <p>AGENT DE SANTE/ RELAI COMM G</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ H</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ I</p> <p>HÔPITAL CONFES-SIONNEL J</p> <p>CABINET MEDCAL PRIVÉ K</p> <p>PHARMACIE L</p> <p>ABPF M</p> <p>AGENT SANTÉ (ONG) N</p> <p>AUTRE SECTEUR MED. PRIVÉ _____ O</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE SOURCE</p> <p>BOUTIQUE P</p> <p>PRATICIEN TRADITIONNEL Q</p> <p>MARCHÉ R</p> <p>VENDEUR DE MÉDICAMENTS ITINÉRANTS S</p> <p>AUTRE _____ X</p> <p>(PRÉCISEZ)</p>	<p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL GOUVT. A</p> <p>CENTRE DE SANTÉ GOUVT. B</p> <p>CLINIQUE PF C</p> <p>AGENT DE TERRAIN D</p> <p>CENTRE SOCIAL.. . . . E</p> <p>AGENT DE SANTE STRAT AV F</p> <p>AGENT DE SANTE/ RELAI COMM G</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ H</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ I</p> <p>HÔPITAL CONFES-SIONNEL J</p> <p>CABINET MEDCAL PRIVÉ K</p> <p>PHARMACIE L</p> <p>ABPF M</p> <p>AGENT SANTÉ (ONG) N</p> <p>AUTRE SECTEUR MED. PRIVÉ _____ O</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE SOURCE</p> <p>BOUTIQUE P</p> <p>PRATICIEN TRADITIONNEL Q</p> <p>MARCHÉ R</p> <p>VENDEUR DE MÉDICAMENTS ITINÉRANTS S</p> <p>AUTRE _____ X</p> <p>(PRÉCISEZ)</p>
613	VÉRIFIEZ 612:	<p>DEUX CODES OU PLUS ENCERCLÉ <input type="checkbox"/></p> <p>SEULEMENT UN CODE ENCERCLÉ <input type="checkbox"/></p> <p>(ALLEZ À 615) ←</p>	<p>DEUX CODES OU PLUS ENCERCLÉS <input type="checkbox"/></p> <p>SEULEMENT UN CODE ENCERCLÉ <input type="checkbox"/></p> <p>(ALLEZ À 615) ←</p>
614	<p>Où êtes-vous allée en premier pour rechercher des conseils ou un traitement ?</p> <p>UTILISEZ LES CODES LETTRES DE 612.</p>	PREMIER ENDROIT <input type="checkbox"/>	PREMIER ENDROIT <input type="checkbox"/>

SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE			AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE				
		NOM _____			NOM _____				
615	<p>Avez-vous donné à (NOM) les choses suivantes à n'importe quel moment dès qu'il/elle a commencé à avoir la diarrhée :</p> <p>a) Un liquide préparé à partir d'un sachet spécial appelé ORASEL ?</p> <p>b) Un liquide maison recommandé par le gouvernement ?</p> <p>c) Du zinc, en comprimés ou en sirop ?</p>		OUI	NON	NSP		OUI	NON	NSP
		a) ORASEL ..	1	2	8	a) ORASEL ..	1	2	8
		b) LIQUIDE MAISON ..	1	2	8	b) LIQUIDE MAISON ..	1	2	8
		c) ZINC	1	2	8	c) ZINC	1	2	8
616	<p>VÉRIFIEZ 615:</p> <p>UN 'OUI' <input type="checkbox"/> ↓</p> <p>a) A-t-on donné quelque chose d'autre pour traiter la diarrhée ?</p> <p>TOUT 'NON' OU 'NSP' <input type="checkbox"/> ↓</p> <p>b) A-t-on donné quelque chose pour traiter la diarrhée ?</p>		OUI		1	OUI		1	
			NON		2	NON		2	
			(ALLEZ À 618) ←			(ALLEZ À 618) ←			
			NE SAIT PAS		8	NE SAIT PAS		8	
617	<p>VÉRIFIEZ 615:</p> <p>UN 'OUI' <input type="checkbox"/> ↓</p> <p>a) Qu'a t-on donné d'autre pour traiter la diarrhée ?</p> <p>Rien d'autre ?</p> <p>ENREGISTREZ TOUS LES TRAITEMENTS DONNÉS.</p> <p>TOUT 'NON' OU 'NSP' <input type="checkbox"/> ↓</p> <p>b) Qu'a t-on donné pour traiter la diarrhée ?</p> <p>Rien d'autre ?</p>	<p>COMPRIMÉ OU SIROP</p> <p>ANTIBIOTIQUE A</p> <p>ANTIMOTILITÉ B</p> <p>AUTRE (NON ANTIBIOTIQUE OU ANTIMOTILITÉ) C</p> <p>COMPRIMÉ OU SIROP INCONNU D</p> <p>INJECTION</p> <p>ANTIBIOTIQUE E</p> <p>NON-ANTIBIOTIQUE F</p> <p>INJECTION INCONNUE G</p> <p>(IV) INTRAVEINEUSE H</p> <p>REMÈDE MAISON/ HERBES MÉDICINALES I</p> <p>AUTRE _____ X (PRÉCISEZ)</p>	<p>COMPRIMÉ OU SIROP</p> <p>ANTIBIOTIQUE A</p> <p>ANTIMOTILITÉ B</p> <p>AUTRE (NON ANTIBIOTIQUE OU ANTIMOTILITÉ) C</p> <p>COMPRIMÉ OU SIROP INCONNU D</p> <p>INJECTION</p> <p>ANTIBIOTIQUE E</p> <p>NON-ANTIBIOTIQUE F</p> <p>INJECTION INCONNUE G</p> <p>(IV) INTRAVEINEUSE H</p> <p>REMÈDE MAISON/ HERBES MÉDICINALES I</p> <p>AUTRE _____ X (PRÉCISEZ)</p>						
618	Est-ce que (NOM) a été malade avec de la fièvre à n'importe quel moment au cours des 2 dernières semaines ?	OUI	1	NON	2	NE SAIT PAS	8	(ALLEZ À 620) ←	
619	À n'importe quel moment au cours de sa maladie, est-ce qu'on a pris à (NOM) du sang de son doigt ou de son talon ?	OUI	1	NON	2	NE SAIT PAS	8		
620	Est-ce que (NOM) a été malade avec de la toux à n'importe quel moment au cours des 2 dernières semaines ?	OUI	1	NON	2	NE SAIT PAS	8		
621	Est-ce que (NOM) a eu un souffle court et rapide ou avait-il/elle des difficultés pour respirer à n'importe quel moment au cours des 2 dernières semaines ?	OUI	1	NON	2	NE SAIT PAS	8	(ALLEZ À 623) ←	

SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____
622	Est-ce que ce souffle rapide ou ces difficultés pour respirer étaient dus à un problème de bronche ou à un nez bouché ou qui coulait ?	BRANCHE SEULEMEN 1 NEZ SEULEMEN 2 LES DEUX 3 AUTRE 6 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 8 (ALLEZ À 624) ←	BRANCHE SEULEMEN 1 NEZ SEULEMEN 2 LES DEUX 3 AUTRE 6 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 8 (ALLEZ À 624) ←
623	VÉRIFIEZ 618: A EU DE LA FIÈVRE ?	OUI <input type="checkbox"/> NON OU NSP <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 646) ←	OUI <input type="checkbox"/> NON OU NSP <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 646) ←
624	Avez-vous recherché des conseils ou un traitement pour la maladie ?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 629) ←	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À TO 629) ←
625	Où êtes-vous allée pour rechercher des conseils ou un traitement ? Quelque part ailleurs ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT. _____ (NOM DE L'ENDROIT)	SECTEUR PUBLIC HÔPITAL DU GOUV.T. GOUVERNEMENT A CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. B POSTE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. C CLINIQUE MOBILE D AGENT DE SANTÉ/ AGENT COMMUNAUTAIRE .. E AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ F (PRÉCISEZ) SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ G PHARMACIE H MÉDECIN PRIVÉ I CLINIQUE MOBILE J AGENT DE SANTÉ/ COMMUNAUTAIRE K AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ L (PRÉCISEZ) AUTRE SOURCE BOUTIQUE M PRATICIEN TRADITIONNEL N MARCHÉ O VENDEUR DE MÉDICAMENTS ITINÉRANTS P AUTRE X (PRÉCISEZ)	SECTEUR PUBLIC HÔPITAL DU GOUV.T. GOUVERNEMENT A CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. B POSTE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. C CLINIQUE MOBILE D AGENT DE SANTÉ/ AGENT COMMUNAUTAIRE .. E AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ F (PRÉCISEZ) SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ G PHARMACIE H MÉDECIN PRIVÉ I CLINIQUE MOBILE J AGENT DE SANTÉ/ COMMUNAUTAIRE K AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ L (PRÉCISEZ) OTHER SOURCE BOUTIQUE M PRATICIEN TRADITIONNEL N MARCHÉ O VENDEUR DE MÉDICAMENTS ITINÉRANTS P AUTRE X (PRÉCISEZ)
626	VÉRIFIEZ 625:	DEUX SEULEMENT CODES UN OU PLUS CODE ENCERCLÉS ENCLÉ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 628) ←	DEUX SEULEMENT CODES UN OU PLUS CODE ENCERCLÉS ENCLÉ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 628) ←

SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____
627	Où êtes-vous allée en premier pour rechercher des conseils ou un traitement ? UTILISEZ LES CODES LETTRES DE 625.	PREMIER ENDROIT <input type="checkbox"/>	PREMIER ENDROIT <input type="checkbox"/>
628	Combien de jours après le début de la maladie, avez-vous recherché des conseils ou un traitement pour (NOM) ? SI MÊME JOUR, INSCRIRE '00'.	JOURS <input type="text"/> <input type="text"/>	JOURS <input type="text"/> <input type="text"/>
629	Est-ce qu'à n'importe quel moment au cours de la maladie, (NOM) a pris des médicaments pour la maladie ?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 646) ← NE SAIT PAS 8	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 646) ← NE SAIT PAS 8
630	Quels médicaments (NOM) a-t-il/elle pris ? Aucun autre médicament ? INSCRIVEZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	ANTIPALUDIQUES COMBINAISON THÉRAPEUTIQUE À BASE D'ARTÉMISININE (CTA .. A SP/FANSIDAR B CHLOROQUINE C AMODIAQUINE D COMPRIMÉS QUININE E INJECTION/IV F ARTESUNATE VOIE RECTALE G INJECTION/IV H AUTRE ANTIPALUDIQUE _____ I (PRÉCISEZ) ANTIBIOTIQUES COMPRIMÉS/SIROP J INJECTION/IV K AUTRES MÉDICAMENTS ASPIRINE L ACETAMINOPHEN M IBUPROFEN N PARACETEMOL O AUTRE X (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS Z	ANTIPALUDIQUES COMBINAISON THÉRAPEUTIQUE À BASE D'ARTÉMISININE (CTA .. A SP/FANSIDAR B CHLOROQUINE C AMODIAQUINE D COMPRIMÉS QUININE E INJECTION/IV F ARTESUNATE VOIE RECTALE G INJECTION/IV H AUTRE ANTIPALUDIQUE _____ I (PRÉCISEZ) ANTIBIOTIQUES COMPRIMÉS/SIROP J INJECTION/IV K AUTRES MÉDICAMENTS ASPIRINE L ACETAMINOPHEN M IBUPROFEN N PARACETEMOL O AUTRE X (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS Z
631	VÉRIFIEZ 630: Y A-T-IL UN CODE A-I ENCERCLÉ?	OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> ↓ (ALLEZ À 646) ←	OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> ↓ (ALLEZ À 646) ←
631A	Combien avez-vous payé en tout pour les médicaments et consultations pour traiter la fièvre de (NOM) ? ENREGISTRER LE COÛT EN FCFA. SI PLUS DE 99 000FCFA, ENREGISTRER 99 000FCFA.	COÛT <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> GRATUIT 99995 NE SAIT PAS 99998	COÛT <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> GRATUIT 99995 NE SAIT PAS 99998

SECTION 6.SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE		AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE	
		NOM _____		NOM _____	
632	VÉRIFIEZ 630: COMBINAISON THÉRAPEUTIQUE À BASE D'ARTÉMISININE ('A') DONNÉE	CODE 'A' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓	CODE 'A' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 634) ←	CODE 'A' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓	CODE 'A' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 634) ←
633	Combien de temps après le début de la fièvre, (NOM) a-t-il/elle commencé à prendre une combinaison à base d'artémisinine ?	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8
634	VÉRIFIEZ 630: SP/FANSIDAR ('B') DONNÉE	CODE 'B' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓	CODE 'B' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 636) ←	CODE 'B' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓	CODE 'B' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 636) ←
635	Combien de temps après le début de la fièvre, (NOM) a-t-il/elle commencé à prendre de la SP/Fansidar ?	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8
636	VÉRIFIEZ 630: CHLOROQUINE ('C') DONNÉE	CODE 'C' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓	CODE 'C' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 638) ←	CODE 'C' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓	CODE 'C' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 638) ←
637	Combien de temps après le début de la fièvre, (NOM) a-t-il/elle commencé à prendre de la Chloroquine ?	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8
638	VÉRIFIEZ 630: AMODIAQUINE ('D') DONNÉE	CODE 'D' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓	CODE 'D' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 640) ←	CODE 'D' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓	CODE 'D' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 640) ←
639	Combien de temps après le début de la fièvre, (NOM) a-t-il/elle commencé à prendre de l'amodiaquine ?	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8

SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE		AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE	
		NOM _____	NOM _____	NOM _____	NOM _____
640	VÉRIFIEZ 630: QUININE ('E' OU 'F') DONNÉE	CODE 'E' OU 'F' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓	CODE 'E' OU 'F' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ← (ALLEZ À 642)	CODE 'E' OU 'F' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓	CODE 'E' OU 'F' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ← (ALLEZ À 642)
641	Combien de temps après le début de la fièvre, (NOM) a-t-il/elle commencé à prendre de la quinine ?	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8
642	VÉRIFIEZ 630: ARTESUNATE ('G' OU 'H') DONNÉ	CODE 'G' OU 'H' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓	CODE 'G' OU 'H' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ← (ALLEZ À 644)	CODE 'G' OU 'H' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓	CODE 'G' OU 'H' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ← (ALLEZ À 644)
643	Combien de temps après le début de la fièvre, (NOM) a-t-il/elle commencé à prendre de l'artésunate ?	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8
644	VÉRIFIEZ 630: AUTRE ANTIPALUDIQUE ('I') DONNÉ	CODE 'I' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓	CODE 'I' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ← (ALLEZ À 646)	CODE 'I' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓	CODE 'I' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ← (ALLEZ À 646)
645	Combien de temps après le début de la fièvre, (NOM) a-t-il/elle commencé à prendre un (AUTRE ANTIPALUDIQUE) ?	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8
645A	Est-ce que la prise en charge du paludisme pour les enfants âgés de moins de 5 ans est payable au Bénin ?	OUI, DOIT PAYER 1 NON, NE DOIT PAS PAYER 2 NE SAIT PAS 8	OUI, DOIVENT PAYER 1 NON, NE DOIVENT PAS PAYER 2 NE SAIT PAS 8	OUI, DOIT PAYER 1 NON, NE DOIT PAS PAYER 2 NE SAIT PAS 8	OUI, DOIVENT PAYER 1 NON, NE DOIVENT PAS PAYER 2 NE SAIT PAS 8
646		RETOURNEZ À 604 À LA COLONNE SUIVANTE; OU S'IL N'Y A PLUS DE NAISSANCES, ALLEZ À 647.	RETOURNEZ À 604 À L'AVANT-DERNIÈRE COLONNE DU NOUVEAU QUESTIONNAIRE; OU S'IL N'Y A PLUS DE NAISSANCES, ALLEZ À 647.		

SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
647	VÉRIFIEZ 615(a) ET 615(b), TOUTES LES COLONNES : AUCUN ENFANT N'A REÇU DE LIQUIDE DE SACHET SRO (ORASEL) <input type="checkbox"/>	UN ENFANT A REÇU DU LIQUIDE D'UN SACHET SRO (ORASEL) <input type="checkbox"/>	→ 649
648	Avez-vous entendu parler d'un produit spécial appelé ORASEL que vous pouvez obtenir pour le traitement de la diarrhée ?	OUI 1 NON 2	
649	VÉRIFIEZ 215 ET 218, TOUTES LES LIGNES: NOMBRE D'ENFANTS NÉS EN 2015-2017 VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉE UN OU PLUS <input type="checkbox"/> ↓ _____ (NOM DU PLUS JEUNE ENFANT VIVANT AVEC ELLE) ↓	AUCUN <input type="checkbox"/>	→ 701

SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES			ALLEZ À	
650	<p>Je voudrais maintenant vous poser des questions sur les liquides et aliments que (NOM DE 649) a consommés hier pendant le jour ou la nuit. J'aimerais, en particulier, savoir si votre enfant a reçu le liquide ou l'aliment que je vais citer, même s'il était mélangé avec d'autres nourritures.</p>		OUI	NON	NSP	
	a) De l'eau ?	a)	1	2	8	
	b) Des jus ou des boissons à base de jus ?	b)	1	2	8	
	c) Du bouillon ?	c)	1	2	8	
	d) Du lait tel que du lait en boîte, en poudre ou du lait frais d'animal ? SI OUI : Combien de fois (NOM) a-t-il/elle bu du lait ? SI 7 FOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '7'.	d)	1	2	8	
	e) Du lait en poudre pour bébé ? SI OUI : Combien de fois (NOM) a-t-il/elle bu du lait en poudre pour bébé ? SI 7 FOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '7'.	e)	1	2	8	
	f) D'autres liquides ?	f)	1	2	8	
	g) Du yaourt ? SI OUI : Combien de fois (NOM) a-t-il/elle mangé du yaourt ? SI 7 FOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '7'.	g)	1	2	8	
	h) Une préparation d'aliments enrichis pour bébé comme cerelac, pépité d'or, ou céréso ?	h)	1	2	8	
	i) Du pain, du riz, des pâtes, bouillie d'avoine (quaker) ou autres préparations à base de céréales ?	i)	1	2	8	
	j) Des citrouilles (goussi), carottes, courges ou courgettes qui sont jaunes ou oranges à l'intérieur ?	j)	1	2	8	
	k) Des pommes de terre blanches, ignames blanches, manioc, ou préparations à base de tubercules ?	k)	1	2	8	
	l) Des légumes à feuilles vert foncé comme l'épinard ?	l)	1	2	8	

SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
	m) Des mangues, papayes mûres ou goyave ?	m) 1 2 8	
	n) D'autres fruits ou légumes comme banane, pomme sauvage, compote de pomme, haricots verts, avocat, tomate ?	n) 1 2 8	
	o) Du foie, rognons, coeur ou autres abats ?	o) 1 2 8	
	p) De la viande, de boeuf, de porc, d'agneau, de chèvre, du poulet ou du canard ?	p) 1 2 8	
	q) Des oeufs ?	q) 1 2 8	
	r) Du poisson frais ou séché ou des crustacés ?	r) 1 2 8	
	s) N'importe quelle préparation à base de haricots, pois, lentilles ou noix ?	s) 1 2 8	
	t) Du fromage ou d'autres produits laitiers ?	t) 1 2 8	
	u) N'importe quelle préparation à base d'aliments solides, semi solides, ou mous ?	u) 1 2 8	
	v) Préparation à base d'huile de palme rouge, de noix de palme ou de sauce de pulpe de noix ?	v) 1 2 8	
	w) Des patates douces qui sont jaunes a l'intérieur ?	w) 1 2 8	
651	VÉRIFIEZ 650 (CATÉGORIES 'g' À 'w'): PAS UN SEUL 'OUI' <input type="checkbox"/> AU MOINS UN 'OUI' <input type="checkbox"/>		→ 653
652	Est-ce que hier durant le jour ou la nuit (NOM DE 649) a mangé des aliments solides, semi solides ou mous ? SI 'OUI' INSISTEZ : Quel type d'aliments solide, semi solide ou mou (NOM) a-t-il/elle mangé ?	OUI 1 (RETOURNEZ À 650 POUR INSCRIRE LES ALIMENTS) (PUIS CONTINUEZ AVEC 653) NON 2	→ 654
653	Combien de fois (NOM DE 649) a-t-il/elle mangé des aliments solides, semi solides ou mous hier durant le jour ou la nuit ? SI 7 FOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '7'.	NOMBRE DE FOIS <input type="text"/> NE SAIT PAS 8	
654	La dernière fois que (NOM DE 649) est allé aux toilettes, qu'avez-vous fait des excréments ?	ENFANT A UTILISÉ TOILETTES OU LATRIN 01 A JETÉ/RINCÉ DANS TOILETTES OU LATRINES 02 A JETÉ/RINCÉ DANS ÉGOUT OU CANIVEAU 03 A JETÉ AUX ORDURES 04 A ENTERRÉ 05 A LAISSÉ À L'AIR LIBRE 06 AUTRE 96 (PRÉCISEZ)	

SECTION 7. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
701	Êtes-vous actuellement mariée ou vivez-vous avec un homme comme si vous étiez mariée ?	OUI, ACTUELLEMENT MARIÉE 1 OUI, VIT AVEC UN HOMME 2 NON, PAS EN UNION 3	→ 704
702	Avez-vous déjà été mariée ou avez-vous déjà vécu avec un homme comme si vous étiez mariée ?	OUI, A ÉTÉ MARIÉE 1 OUI, A VÉCU AVEC UN HOMME 2 NON 3	→ 712
703	Quel est votre état matrimonial actuel : êtes-vous veuve, divorcée ou séparée ?	VEUVE 1 DIVORCÉE 2 SÉPARÉE 3	→ 709
704	Est-ce que votre (mari/partenaire) vit actuellement avec vous ou vit-il ailleurs ?	VIT AVEC ELLE 1 VIT AILLEURS 2	
705	ENREGISTREZ LE NOM ET No DE LIGNE DU MARI/PARTENAIRE DU QUESTIONNAIRE MÉNAGE. S'IL N'EST PAS LISTÉ DANS LE QUESTIONNAIRE MÉNAGE, INSCRIVEZ '00'.	NOM _____ No LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/>	
706	Est-ce que votre (mari/partenaire) a d'autres épouses ou vit-il avec d'autres femmes comme s'il était marié ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 709
707	En tout, y compris vous-même, combien a-t-il d'épouses ou de partenaires avec qui il vit comme s'il était marié ?	NOMBRE TOTAL D'ÉPOUSES ET DE FEMMES AVEC QUI IL VIT COMME MARIÉ <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98	
708	Êtes-vous la première, deuxième, ... épouse ?	RANG <input type="text"/> <input type="text"/>	
709	Avez-vous été mariée ou avez-vous vécu avec un homme une seule fois ou plus d'une fois ?	SEULEMENT UNE FOIS 1 PLUS D'UNE FOIS 2	
710	VÉRIFIEZ 709: MARIÉE/ A VÉCU AVEC UN HOMME SEULEMENT UNE FOIS <input type="checkbox"/> ↓ a) En quel mois et quelle année avez-vous commencé à vivre avec votre (mari/partenaire) ? MARIÉE/ A VÉCU AVEC UN HOMME PLUS D'UNE FOIS <input type="checkbox"/> ↓ b) Je voudrais maintenant vous parler de votre premier (mari/partenaire). En quel mois et quelle année avez-vous commencé à vivre avec lui ?	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> NE CONNAÎT PAS LE MOIS 98 ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NE CONNAÎT PAS L'ANNÉE 9998	→ 712
711	Quel âge aviez-vous quand vous avez commencé à vivre avec lui pour la première fois ?	ÂGE <input type="text"/> <input type="text"/>	

SECTION 7. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
712	VÉRIFIEZ LA PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES. AVANT DE CONTINUER, FAITES TOUT VOTRE POSSIBLE POUR VOUS TROUVER EN PRIVÉ.		
713	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur votre activité sexuelle pour mieux comprendre certains aspects importants de la vie. Je voudrais vous assurer de nouveau que vos réponses sont absolument confidentielles et qu'elles ne seront divulguées à personne. S'il arrivait que je pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, dites-le moi et je passerai à la question suivante. Quel âge aviez-vous quand vous avez eu, pour la première fois, des rapports sexuels ?	N'A JAMAIS EU DE RAPPORTS SEXUELS 00 ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/>	→ 731
714	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur votre activité sexuelle récente. Quand avez-vous eu des rapports sexuels pour la dernière fois ? SI MOINS DE 12 MOIS, LA RÉPONSE DOIT ÊTRE ENREGISTRÉE EN JOURS, SEMAINES OU MOIS. SI 12 MOIS (UNE ANNÉE) OU PLUS, LA RÉPONSE DOIT ÊTRE ENREGISTRÉE EN ANNÉES.	IL Y A DES JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A DES SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A DES MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A DES ANNÉES 4 <input type="text"/> <input type="text"/>	→ 716 → 727

SECTION 7. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

		DERNIER PARTENAIRE SEXUEL	AVANT-DERNIER PARTENAIRE SEXUEL	AVANT-AVANT-DERNIER PARTENAIRE SEXUEL
715	Quand avez-vous eu des rapports sexuels avec cette personne pour la dernière fois ?		IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINE 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/>	IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINE 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/>
716	La dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels avec cette personne, un condom a-t-il été utilisé ?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 718) ←	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 718) ←	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 718) ←
717	Un condom a-t-il été utilisé chaque fois que vous avez eu des rapports sexuels avec cette personne au cours des 12 derniers mois ?	OUI 1 NON 2	OUI 1 NON 2	OUI 1 NON 2
718	Quelle était votre relation avec cette personne avec qui vous avez eu des rapports sexuels ? SI PETIT AMI : Viviez-vous ensemble comme si vous étiez mariés ? SI OUI, ENCERCLEZ '2' SI NON, ENCERCLEZ '3'	MARI 1 PARTENAIRE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉE .. 2 PETIT AMI NE VIVANT PAS AVEC L'ENQUÊTÉE 3 RENCONTRE OCCASIONNELLE .. 4 CLIENT/PROSTITUÉE .. 5 AUTRE 6 (PRÉCISEZ)	MARI 1 PARTENAIRE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉE .. 2 PETIT AMI NE VIVANT PAS AVEC L'ENQUÊTÉE 3 RENCONTRE OCCASIONNELLE .. 4 CLIENT/PROSTITUÉE .. 5 AUTRE 6 (PRÉCISEZ)	MARI 1 PARTENAIRE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉE .. 2 PETIT AMI NE VIVANT PAS AVEC L'ENQUÊTÉE 3 RENCONTRE OCCASIONNELLE .. 4 CLIENT/PROSTITUÉE .. 5 AUTRE 6 (PRÉCISEZ)
719	Il y a combien de temps que vous avez eu vos premiers rapports sexuels avec cette personne ?	IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A ANNÉES 4 <input type="text"/> <input type="text"/>	IL Y A JOURS . 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A ANNÉES 4 <input type="text"/> <input type="text"/>	IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A ANNÉES 4 <input type="text"/> <input type="text"/>

SECTION 7. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

		DERNIER PARTENAIRE SEXUEL	AVANT-DERNIER PARTENAIRE SEXUEL	AVANT-AVANT-DERNIER PARTENAIRE SEXUEL
720	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous eu des rapports sexuels avec cette personne ? DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION. SI LE NOMBRE DE FOIS EST 95 OU PLUS, INSCRIVEZ '95'.	NOMBRE DE FOIS <input type="text"/> <input type="text"/>	NOMBRE DE FOIS <input type="text"/> <input type="text"/>	NOMBRE DE FOIS <input type="text"/> <input type="text"/>
721	Quel âge a cette personne ?	ÂGE DU PARTENAIRE <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98	ÂGE DU PARTENAIRE <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98	ÂGE DU PARTENAIRE <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98
722	À part cette personne, avez-vous eu des rapports sexuels avec une autre personne au cours des 12 derniers mois ?	OUI 1 (RETOURNEZ À 715 À COL. SUIVANTE) NON 2 (ALLEZ À 724)	OUI 1 (RETOURNEZ À 715 À COL. SUIVANTE) NON 2 (ALLEZ À 724)	
723	En tout, avec combien de personnes différentes avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois ? DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION. SI LE NOMBRE DE PERSONNES EST 95 OU PLUS,			NOMBRE DE PARTENAIRES DANS LES 12 DERNIERS MOIS .. <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98

SECTION 7. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
724	VÉRIFIEZ 106: ÂGE 15-24 <input type="checkbox"/> ↓ PAS EN UNION <input type="checkbox"/>	ÂGE 25-49 <input type="checkbox"/>	→ 727
725	VÉRIFIEZ 701: PAS EN UNION <input type="checkbox"/>	ACTUELLEMENT MARIÉE/ VIT AVEC UN HOMME <input type="checkbox"/>	→ 727
726	Au cours des 12 derniers mois avez-vous eu des rapports sexuels avec quelqu'un ou une relation sexuelle suivie avec quelqu'un parce qu'il vous a donné ou vous a dit qu'il vous donnerait des cadeaux, de l'argent, ou autre chose ?	OUI 1 NON 2	
727	En tout, durant votre vie, avec combien de personnes différentes avez-vous eu des rapports sexuels ? DANS LE CAS D'UNE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION. SI LE NOMBRE DE PARTENAIRE EST 95 OU PLUS, INSCRIVEZ '95'.	NOMBRE DE PARTENAIRE DANS LA VIE <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98	
728	VÉRIFIEZ 716, PARTENAIRE LE PLUS RÉCENT (PREMIÈRE COLONNE): OUI, <input type="checkbox"/> CONDOM A ÉTÉ UTILISÉ ↓	NON, <input type="checkbox"/> CONDOM N'A PAS ÉTÉ UTILISÉ QUESTION NON POSÉE <input type="checkbox"/>	→ 731 → 731
729	Vous avez dit que la dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels, un condom avait été utilisé. Quelle était la marque du condom utilisée cette fois là ? SI LA MARQUE N'EST PAS CONNUE, DEMANDEZ À VOIR L'EMBALLAGE.	PRUDENCE 01 COOL 02 NO LOGO 03 AUTRE 96 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 98	

SECTION 7. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À												
730	<p>Où vous étiez-vous procuré le condom la dernière fois ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____ (NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL DU GOUVERNEMENT 11</p> <p>CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT 12</p> <p>CLINIQUE MOBILE 13</p> <p>AGENT DE SANTÉ/ RELAIS COMMUNAUTAIRE 14</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC</p> <p>_____ 16 (PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ 21</p> <p>PHARMACIE 22</p> <p>SOIN MÉDICAL/CABINET CLINIQUE 23</p> <p>CLINIQUE MOBILE 24</p> <p>CENTRE/HÔPITAL CONFSSIONNELLE 25</p> <p>AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>_____ 26 (PRÉCISEZ)</p> <p>ONG</p> <p>CLINIQUE PLANIFICATION FAMILIALE 31</p> <p>AUTRE SOURCE</p> <p>BOUTIQUE 41</p> <p>INSTITUTION RELIGIEUSE 42</p> <p>AMIS/PARENTS 43</p> <p>AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)</p> <p>NE SAIT PAS 98</p>													
731	PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES DANS CETTE SECTION	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>OUI</th> <th>NON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENFANTS <10</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>HOMMES ADULTES</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>FEMMES ADULTES</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		OUI	NON	ENFANTS <10	1	2	HOMMES ADULTES	1	2	FEMMES ADULTES	1	2	
	OUI	NON													
ENFANTS <10	1	2													
HOMMES ADULTES	1	2													
FEMMES ADULTES	1	2													

SECTION 8. PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
801	VÉRIFIEZ 304: NI LUI, NI ELLE <input type="checkbox"/> STÉRILISÉ ↓	IL OU ELLE <input type="checkbox"/> STÉRILISÉ	→ 813
802	VÉRIFIEZ 226: ENCEINTE <input type="checkbox"/> ↓	PAS ENCEINTE <input type="checkbox"/> OU PAS SÛRE	→ 804
803	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Après l'enfant que vous attendez maintenant, souhaiteriez-vous un autre enfant ou préféreriez-vous ne plus en avoir ?	AVOIR UN AUTRE ENFANT' 1 N'EN VEUT PAS D'AUTRE 2 INDÉCISE/NE SAIT PAS 8	→ 805 → 812
804	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Voudriez-vous avoir (un/un autre) enfant ou préféreriez-vous ne pas (plus) avoir d'enfant ?	AVOIR (UN/UN AUTRE) ENFANT 1 PAS D'AUTRE/AUCUN 2 DIT QU'ELLE NE PEUT PAS TOMBER ENCEIN[... 3 INDÉCISE/NE SAIT PAS 8	→ 807 → 813 → 811
805	VÉRIFIEZ 226: PAS ENCEINTE <input type="checkbox"/> OU PAS SÛRE ↓ a) Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissance (d'un/un autre) enfant ? b) Après la naissance de l'enfant que vous attendez, combien de temps voudriez-vous attendre avant la naissance d'un autre enfant ?	ENCEINTE <input type="checkbox"/> ↓ MOIS 1 ANNÉES 2 BIENTÔT/MAINTENAN' 993 DIT QU'ELLE NE PEUT PAS TOMBER ENCEIN[... 994 APRÈS LE MARIAGI 995 AUTRE 996 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 998	→ 811 → 813 → 811
806	VÉRIFIEZ 226: PAS ENCEINTE <input type="checkbox"/> OU PAS SÛRE ↓	ENCEINTE <input type="checkbox"/>	→ 812
807	VÉRIFIEZ 303: UTILISE UNE MÉTHODE CONTRACEPTIVE? N'UTILISE PAS <input type="checkbox"/> ACTUELLEMENT ↓	UTILISE <input type="checkbox"/> ACTUELLEMENT	→ 813
808	VÉRIFIEZ 805: '24' MOIS OU PLUS <input type="checkbox"/> OU '02' ANNÉES OU PLUS ↓ PAS POSÉE <input type="checkbox"/> ↓ '00-23' MOIS <input type="checkbox"/> OU '00-01' ANNÉE		→ 812
809	VÉRIFIEZ 714: IL Y A DES JOURS, SEMAINES OU MOIS <input type="checkbox"/> ↓	IL Y A DES ANNÉES <input type="checkbox"/> ↓ PAS POSÉE <input type="checkbox"/>	→ 811 → 811

SECTION 8. PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
810	<p>VÉRIFIEZ 804:</p> <p>VEUT AVOIR UN/ <input type="checkbox"/> UN AUTRE ENFANT ↓</p> <p>PAS D'AUTRE/ <input type="checkbox"/> AUCUN ↓</p> <p>a) Vous avez dit que dans l'immédiat, vous ne souhaitez pas (un/un autre) enfant. Pouvez-vous me dire pourquoi vous n'utilisez pas une méthode pour éviter une grossesse ?</p> <p>Y-a-t-il une autre raison ?</p> <p>b) Vous avez dit que vous ne souhaitez pas (plus) d'enfant. Pouvez-vous me dire pourquoi vous n'utilisez pas une méthode pour éviter une grossesse ?</p> <p>Y-a-t-il une autre raison ?</p> <p>REGISTREZ TOUTES LES RAISONS MENTIONNÉES</p>	<p>PAS MARIÉE A</p> <p>RAISONS RELATIVES À LA FÉCONDITÉ</p> <p>PAS DE RAPPORTS SEXUELS B</p> <p>RAP. SEXUELS PEU FRÉQUENTS C</p> <p>MÉNOPAUSE/HYSTÉRECTOMIE D</p> <p>NE PEUT PAS TOMBER ENCEINTE E</p> <p>PAS DE RÈGLES DEPUIS DERNIÈRE NAISSANCE F</p> <p>ALLAITE G</p> <p>FATALISTE H</p> <p>OPPOSITION À L'UTILISATION</p> <p>ENQUÊTÉE OPPOSÉE I</p> <p>MARI/PARTENAIRE OPPOSÉ J</p> <p>AUTRES OPPOSÉS K</p> <p>INTERDITS RELIGIEUX L</p> <p>MANQUE DE CONNAISSANCE</p> <p>NE CONNAÎT AUCUNE MÉTHODE M</p> <p>NE CONNAÎT AUCUN ENDROIT N</p> <p>RAISONS LIÉES À LA MÉTHODE</p> <p>EFFETS SECONDAIRES/ PROBLÈMES DE SANTÉ O</p> <p>PAS ACCESSIBLE/TROP ÉLOIGNÉ P</p> <p>TROP CHER Q</p> <p>MÉTHODE PRÉFÉRÉE</p> <p>NON DISPONIBLE R</p> <p>AUCUNE MÉTHODE DISPONIBLE S</p> <p>PAS PRATIQUE À UTILISER T</p> <p>INTERFÈRE AVEC LES FONCTIONS NORMALES DU CORPS U</p> <p>AUTRE X (PRÉCISEZ)</p> <p>NE SAIT PAS Z</p>	
811	<p>VÉRIFIEZ 303: UTILISE UNE MÉTHODE CONTRACEPTIVE ?</p> <p>PAS <input type="checkbox"/> POSÉE ↓</p> <p>NON, N'UTILISE PAS ACTUELLEMENT <input type="checkbox"/> ↓</p> <p>OUI, <input type="checkbox"/> UTILISE ACTUELLEMENT</p>		→ 813
812	<p>Pensez-vous que vous utiliserez, à un certain moment dans le futur, une méthode contraceptive pour retarder ou éviter une grossesse ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>	
813	<p>VÉRIFIEZ 216:</p> <p>A DES ENFANTS <input type="checkbox"/> VIVANTS ↓</p> <p>AUCUN ENFANT <input type="checkbox"/> VIVANT ↓</p> <p>a) Si vous pouviez revenir à l'époque où vous n'aviez pas d'enfant et que vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien auriez-vous voulu en avoir ?</p> <p>b) Si vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien en voudriez-vous ?</p> <p>INSISTEZ POUR OBTENIR UNE RÉPONSE NUMÉRIQUE</p>	<p>AUCUN 00 → 815</p> <p>NOMBRE <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>AUTRE 96 → 815 (PRÉCISEZ)</p>	

SECTION 8. PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À																														
814	Parmi ces enfants, combien souhaiteriez-vous de garçons, combien souhaiteriez-vous de filles et pour combien d'entre eux, le sexe n'aurait-il pas d'importance ?	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td align="center" colspan="2">GARÇONS</td> <td align="center" colspan="2">FILLES</td> <td align="center" colspan="2">PEU IMPORTE</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> <p>NOMBRE ..</p> <p>AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)</p>	GARÇONS		FILLES		PEU IMPORTE																										
GARÇONS		FILLES		PEU IMPORTE																													
815	Au cours des derniers mois, avez-vous :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th align="center">OUI</th> <th align="center">NON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Entendu parler de la planification familiale à la radio ?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>b) Vu quelque chose sur la planification familiale à la télévision ?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>c) Lu quelque chose sur la planification familiale dans un journal ou magazine ?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>d) Reçu un message vocal ou un texte sur la planification familiale sur votre portable ?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>e) Vu quelque chose sur la planification familiale sur une affiche ?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>f) Lu quelque chose sur la planification familiale dans un journal ou magazine ?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>g) Vu quelque chose sur la planification familiale dans une séance d'animation culturelle/éducative ?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>h) Entendu parler de la planification familiale dans les lieux de culte (église/mosquée)?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>i) Entendu parler de la planification familiale à l'école?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> </tbody> </table>		OUI	NON	a) Entendu parler de la planification familiale à la radio ?	1	2	b) Vu quelque chose sur la planification familiale à la télévision ?	1	2	c) Lu quelque chose sur la planification familiale dans un journal ou magazine ?	1	2	d) Reçu un message vocal ou un texte sur la planification familiale sur votre portable ?	1	2	e) Vu quelque chose sur la planification familiale sur une affiche ?	1	2	f) Lu quelque chose sur la planification familiale dans un journal ou magazine ?	1	2	g) Vu quelque chose sur la planification familiale dans une séance d'animation culturelle/éducative ?	1	2	h) Entendu parler de la planification familiale dans les lieux de culte (église/mosquée)?	1	2	i) Entendu parler de la planification familiale à l'école?	1	2	
	OUI	NON																															
a) Entendu parler de la planification familiale à la radio ?	1	2																															
b) Vu quelque chose sur la planification familiale à la télévision ?	1	2																															
c) Lu quelque chose sur la planification familiale dans un journal ou magazine ?	1	2																															
d) Reçu un message vocal ou un texte sur la planification familiale sur votre portable ?	1	2																															
e) Vu quelque chose sur la planification familiale sur une affiche ?	1	2																															
f) Lu quelque chose sur la planification familiale dans un journal ou magazine ?	1	2																															
g) Vu quelque chose sur la planification familiale dans une séance d'animation culturelle/éducative ?	1	2																															
h) Entendu parler de la planification familiale dans les lieux de culte (église/mosquée)?	1	2																															
i) Entendu parler de la planification familiale à l'école?	1	2																															
816	A votre avis, est-il admissible ou inadmissible de parler de planification familiale:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th align="center">ADMIS-SIBLE</th> <th align="center">INAD-MISSI-BLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) À la radio ?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>b) À la télévision ?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>c) Dans un journal ou magazine ?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>d) Sur votre portable ?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>e) Sur une affiche ?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>f) Dans un prospectus/brochure ?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>g) A une séance d'animation culturelle/éducative ?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>h) Dans les lieux de culte (église/mosquée)?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>i) A l'école?</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> </tbody> </table>		ADMIS-SIBLE	INAD-MISSI-BLE	a) À la radio ?	1	2	b) À la télévision ?	1	2	c) Dans un journal ou magazine ?	1	2	d) Sur votre portable ?	1	2	e) Sur une affiche ?	1	2	f) Dans un prospectus/brochure ?	1	2	g) A une séance d'animation culturelle/éducative ?	1	2	h) Dans les lieux de culte (église/mosquée)?	1	2	i) A l'école?	1	2	
	ADMIS-SIBLE	INAD-MISSI-BLE																															
a) À la radio ?	1	2																															
b) À la télévision ?	1	2																															
c) Dans un journal ou magazine ?	1	2																															
d) Sur votre portable ?	1	2																															
e) Sur une affiche ?	1	2																															
f) Dans un prospectus/brochure ?	1	2																															
g) A une séance d'animation culturelle/éducative ?	1	2																															
h) Dans les lieux de culte (église/mosquée)?	1	2																															
i) A l'école?	1	2																															
817	VÉRIFIEZ 701:	<p align="center"> OUI, <input type="checkbox"/> ACTUELLEMENT MARIÉE OUI, <input type="checkbox"/> VIT AVEC UN HOMME NON, <input type="checkbox"/> PAS EN UNION </p>	→ 901																														
818	VÉRIFIEZ 303: UTILISE UNE MÉTHODE CONTRACEPTIVE ?	<p align="center"> UTILISE <input type="checkbox"/> ACTUELLEMENT N'UTILISE PAS <input type="checkbox"/> ACTUELLEMENT PAS POSÉE <input type="checkbox"/> </p>	→ 820 → 822																														

SECTION 8. PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
819	Diriez-vous que l'utilisation de la contraception est principalement votre décision, principalement celle de votre (mari/partenaire) ou est-ce une décision commune que vous avez prise ensemble ?	DÉCISION DE L'ENQUÊTÉ 1 DÉCISION DU MARI/PARTENAIRE 2 DÉCISION COMMUNE 3 AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ)	→ 821
820	Diriez-vous que le fait de ne pas utiliser la contraception est principalement votre décision, principalement celle de votre (mari/partenaire) ou est-ce une décision commune que vous avez prise ensemble ?	DÉCISION DE L'ENQUÊTÉ 1 DÉCISION DU MARI/PARTENAIRE 2 DÉCISION COMMUNE 3 AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ)	
821	VÉRIFIEZ 304: NI LUI, NI ELLE <input type="checkbox"/> STÉRILISÉ ↓	IL OU ELLE <input type="checkbox"/> _____	→ 901
822	Est-ce que votre (mari/partenaire) veut le même nombre d'enfants que vous ou en veut-il plus ou moins que vous ?	MÊME NOMBRE 1 PLUS D'ENFANTS 2 MOINS D'ENFANTS 3 NE SAIT PAS 8	

SECTION 9. CARACTÉRISTIQUES DU MARI ET TRAVAIL DE LA FEMME

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
901	VÉRIFIEZ 701: ACTUELLEMENT MARIÉE/ <input type="checkbox"/> VIT AVEC UN HOMME <input type="checkbox"/>	PAS EN <input type="checkbox"/> UNION	→ 909
902	Quel âge avait votre (mari/partenaire) à son dernier anniversaire ?	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES <input type="text"/>	
903	Est-ce que votre (mari/partenaire) a fréquenté l'école ?	OUI 1 NON 2	→ 906
904	Quel est le plus haut niveau d'études qu'il a atteint : primaire, secondaire 1er cycle, secondaire 2nd cycle ou supérieur ?	PRIMAIRE 1 SECONDAIRE 1ER CYCLE 2 SECONDAIRE 2ND CYCLE 3 SUPÉRIEUR 4 NE SAIT PAS 8	→ 906
905	Quelle est la [CLASSE/ANNÉE] la plus élevée qu'il a achevée à ce niveau ? SI MOINS D'1 CLASSE/ANNÉE A ÉTÉ ACHEVÉE À CE NIVEAU, INSCRIVEZ '00'.	[CLASSE/ANNÉE] <input type="text"/> NE SAIT PAS 98	
906	Est-ce que votre (mari/partenaire) a effectué un travail au cours des 7 derniers jours ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 908
907	Est-ce que votre (mari/partenaire) a effectué un travail au cours des 12 derniers mois ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 909
908	Quelle est l'occupation de votre (mari/ partenaire) ? C'est-à-dire quel genre de travail fait-il principalement ?	_____ _____ _____ <input type="text"/>	
909	En dehors de votre travail domestique, avez-vous travaillé au cours des sept derniers jours ?	OUI 1 NON 2	→ 913
910	Comme vous le savez, certaines femmes font un travail pour lequel elles sont payées en argent ou en nature. Certaines ont un petit commerce ou une petite affaire ou travaillent sur les terres ou dans l'affaire de la famille. Au cours des sept derniers jours, avez-vous fait quelque chose de ce genre ou un autre travail ?	OUI 1 NON 2	→ 913
911	Bien que vous n'avez pas travaillé au cours des sept derniers jours, est-ce que vous avez un travail ou une affaire dont vous avez dû vous absenter pour vacances, maladie, maternité ou pour une autre raison ?	OUI 1 NON 2	→ 913
912	Avez-vous fait un travail quelconque au cours des 12 derniers mois ?	OUI 1 NON 2	→ 917
913	Quelle est votre occupation? C'est-à-dire quel genre de travail faites-vous principalement ?	_____ _____ _____ <input type="text"/>	

SECTION 9. CARACTÉRISTIQUES DU MARI ET TRAVAIL DE LA FEMME

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
914	Faites-vous ce travail pour un membre de votre famille, pour quelqu'un d'autre ou êtes-vous à votre compte ?	MEMBRE DE LA FAMILLE 1 QUELQU'UN D'AUTRE 2 À SON COMPTE 3	
915	Travaillez-vous habituellement toute l'année, ou de manière saisonnière ou travaillez-vous seulement de temps en temps ?	TOUTE L'ANNÉE 1 SAISONNIER/PARTIE DE L'ANNÉE 2 DE TEMPS EN TEMPS 3	
916	Êtes-vous payée en argent ou en nature pour ce travail ou n'êtes-vous pas payée du tout ?	ARGENT SEULEMENT 1 ARGENT ET NATURE 2 NATURE SEULEMENT 3 PAS PAYÉE 4	
917	VÉRIFIEZ 701: ACTUELLEMENT <input type="checkbox"/> MARIÉE/VIT AVEC UN HOMME ↓ PAS EN UNION <input type="checkbox"/> → 925		
918	VÉRIFIEZ 916: CODE '1' OU '2' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓ AUTRE <input type="checkbox"/> → 921		
919	Habituellement, qui décide comment l'argent que vous gagnez va être utilisé : c'est vous, votre (mari/partenaire), ou conjointement vous et votre (mari/partenaire) ?	ENQUÊTÉE 1 MARI/PARTENAIRE 2 CONJOINTEMENT ENQUÊTÉE ET MARI/PARTENAIRE 3 AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ)	
920	Diriez-vous que vous gagnez plus que votre (mari/partenaire), moins ou à peu près la même chose ?	PLUS QUE LUI 1 MOINS QUE LUI 2 À PEU PRÈS LA MÊME CHOS 3 MARI/PARTENAIRE N'A PAS DE REVENUS 4 → 922 NE SAIT PAS 8	
921	Habituellement, qui décide comment l'argent que votre (mari/partenaire) gagne va être utilisé: vous, votre (mari/partenaire), ou conjointement vous et votre (mari/partenaire) ?	ENQUÊTÉE 1 MARI/PARTENAIRE 2 CONJOINTEMENT ENQUÊTÉE ET MARI/PARTENAIRE 3 MARI/PARTENAIRE N'A PAS DE REVENUS 4 AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ)	
922	Habituellement, qui prend les décisions en ce qui concerne vos propres soins de santé: vous, votre (mari/partenaire), conjointement vous et votre (mari/partenaire) ou quelqu'un d'autre ?	ENQUÊTÉE 1 MARI/PARTENAIRE 2 CONJOINTEMENT ENQUÊTÉE ET MARI/PARTENAIRE 3 QUELQU'UN D'AUTRE 4 AUTRE 6	
923	Qui prend habituellement les décisions concernant les achats importants pour le ménage ?	ENQUÊTÉE 1 MARI/PARTENAIRE 2 CONJOINTEMENT ENQUÊTÉE ET MARI/PARTENAIRE 3 QUELQU'UN D'AUTRE 4 AUTRE 6	

SECTION 9. CARACTÉRISTIQUES DU MARI ET TRAVAIL DE LA FEMME

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À																												
924	Qui prend habituellement les décisions concernant les visites à votre famille ou parents ?	ENQUÊTÉE 1 MARI/PARTENAIRE 2 CONJOINTEMENT ENQUÊTÉE ET MARI/PARTENAIRE 3 QUELQU'UN D'AUTRE 4 AUTRE 6																													
925	Est-ce que vous possédez cette maison ou une autre maison seule ou conjointement avec quelqu'un d'autre ?	SEULE SEULEMENT 1 CONJOINTEMENT SEULEMEI 2 SEULE ET CONJOINTEMENT 3 N'EN POSSÈDE PAS 4	→ 928																												
926	Avez-vous un acte de propriété pour une maison que vous possédez ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 928																												
927	Est-ce que votre nom figure sur l'acte de propriété ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8																													
928	Est-ce que vous possédez de la terre agricole ou non agricole, seule ou conjointement avec quelqu'un d'autre ?	SEULE SEULEMENT 1 CONJOINTEMENT SEULEMEI 2 SEULE ET CONJOINTEMENT 3 N'EN POSSÈDE PAS 4	→ 931																												
929	Avez-vous un acte de propriété pour une terre que vous possédez ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 931																												
930	Est-ce que votre nom figure sur l'acte de propriété ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8																													
931	PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES À CE POINT DE L'INTERVIEW (PERSONNES PRÉSENTES ET QUI ÉCOUTENT, PRÉSENTES MAIS QUI N'ÉCOUTENT PAS OU PAS PRÉSENTES).	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">PRES./</th> </tr> <tr> <th></th> <th>PRES./</th> <th>N'ÉCOUTE</th> <th>PAS</th> </tr> <tr> <th></th> <th>ÉCOUTE.</th> <th>PAS.</th> <th>PRES.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENFANTS < 10</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>MARI</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>AUTRES HOMMES</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>AUTRES FEMMES</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		PRES./				PRES./	N'ÉCOUTE	PAS		ÉCOUTE.	PAS.	PRES.	ENFANTS < 10	1	2	3	MARI	1	2	3	AUTRES HOMMES	1	2	3	AUTRES FEMMES	1	2	3	
	PRES./																														
	PRES./	N'ÉCOUTE	PAS																												
	ÉCOUTE.	PAS.	PRES.																												
ENFANTS < 10	1	2	3																												
MARI	1	2	3																												
AUTRES HOMMES	1	2	3																												
AUTRES FEMMES	1	2	3																												
932	Selon vous, est-il justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes :	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>OUI</th> <th>NON</th> <th>NSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Si elle sort sans le lui dire ?</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>b) Si elle néglige les enfants ?</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>c) Si elle argumente avec lui ?</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>d) Si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui ?</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>e) Si elle brûle la nourriture ?</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		OUI	NON	NSP	a) Si elle sort sans le lui dire ?	1	2	8	b) Si elle néglige les enfants ?	1	2	8	c) Si elle argumente avec lui ?	1	2	8	d) Si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui ?	1	2	8	e) Si elle brûle la nourriture ?	1	2	8					
	OUI	NON	NSP																												
a) Si elle sort sans le lui dire ?	1	2	8																												
b) Si elle néglige les enfants ?	1	2	8																												
c) Si elle argumente avec lui ?	1	2	8																												
d) Si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui ?	1	2	8																												
e) Si elle brûle la nourriture ?	1	2	8																												

SECTION 11. AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À															
1101	Je voudrais maintenant vous poser d'autres questions concernant des problèmes de santé. Au cours des 12 derniers mois, vous a-t-on fait une injection pour une raison quelconque ? SI OUI: Combien d'injections avez-vous eues ? SI LE NOMBRE D'INJECTIONS EST DE 90 OU PLUS OU SI LES INJECTIONS ÉTAIENT QUOTIDIENNES PENDANT 3 MOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '90'. DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION.	NOMBRE D'INJECTIONS <input type="text"/> <input type="text"/> AUCUNE 00	→ 1104															
1102	Parmi ces injections, combien ont été effectuées par un médecin, une infirmière, un pharmacien, un dentiste ou un autre professionnel de santé ? SI LE NOMBRE D'INJECTIONS EST DE 90 OU PLUS OU SI LES INJECTIONS ÉTAIENT QUOTIDIENNES PENDANT 3 MOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '90'. DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION.	NOMBRE D'INJECTIONS <input type="text"/> <input type="text"/> AUCUNE 00	→ 1104															
1103	La dernière fois que vous avez eu une injection effectuée du professionnel de santé, est-ce qu'il/elle a pris la seringue et l'aiguille d'un emballage neuf qui n'avait pas été ouvert ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8																
1104	Fumez-vous actuellement des cigarettes chaque jour, certains jours ou pas du tout ?	CHAQUE JOUR 1 CERTAINS JOURS 2 PAS DU TOUT 3	→ 1106															
1105	En moyenne, combien de cigarettes fumez-vous actuellement par jour ?	NOMBRE DE CIGARETTES <input type="text"/> <input type="text"/>																
1106	Actuellement, est-ce que vous fumez ou utilisez un autre type de tabac chaque jour, certains jours ou pas du tout ?	CHAQUE JOUR 1 CERTAINS JOURS 2 PAS DU TOUT 3	→ 1108															
1107	Actuellement, quel autre type de tabac fumez-vous ou utilisez-vous ? ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	PIPES BOURRÉES DE TABAC B CIGARES C PIPE À EAU D TABAC À CHIQUER E TABAC/POUDRE À PRISER F TABAC À MÂCHER G CHIQUER DE BETEL AVEC TABAC H AUTRE _____ X (PRÉCISEZ)																
1108	Différentes raisons peuvent empêcher les femmes d'obtenir un avis médical ou de se faire soigner. Quand vous êtes malade et que vous voulez un avis médical ou un traitement, est-ce que chacune des raisons suivantes constitue, pour vous, un problème important ou non: a) Obtenir la permission d'aller voir un médecin ? b) Obtenir l'argent nécessaire pour le conseil ou le traitement ? c) La distance pour atteindre l'établissement de santé ? d) Ne pas vouloir y aller seule ?	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">PROBLÈME IMPORTANT</th> <th style="text-align: center;">PAS UN PROBLÈME IMPORTANT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) PERMISSION</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>b) OBTENIR L'ARGEN'</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>c) DISTANCE</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>d) ALLER SEULE</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>		PROBLÈME IMPORTANT	PAS UN PROBLÈME IMPORTANT	a) PERMISSION	1	2	b) OBTENIR L'ARGEN'	1	2	c) DISTANCE	1	2	d) ALLER SEULE	1	2	
	PROBLÈME IMPORTANT	PAS UN PROBLÈME IMPORTANT																
a) PERMISSION	1	2																
b) OBTENIR L'ARGEN'	1	2																
c) DISTANCE	1	2																
d) ALLER SEULE	1	2																

SECTION 11. AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À												
1109	Êtes-vous couverte par une assurance médicale ?	OUI 1 NON 2	→ 1112												
1110	Par quel type d'assurance médicale êtes-vous couverte ? ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	MUTUELLE DE SANTÉ/ ASSURANCE SANTÉ COMMUNAUTAIRE A ASSURANCE SANTÉ PAR L'EMPLOYEUR B SÉCURITÉ SOCIALE C AUTRE ASSURANCE PRIVÉE COMMERCIALE D AUTRE _____ X (PRÉCISEZ)													
1112	VÉRIFIEZ COUVERTURE DU QUESTIONNAIRE: MÉNAGE SÉLECTIONNÉ POUR L'ENQUÊTE HOMME <input type="checkbox"/> ↓	MÉNAGE NON SÉLECTIONNÉ POUR L'ENQUÊTE HOMME <input type="checkbox"/>	→ 1201												
1113	VÉRIFIEZ 106:	15-29 ANS 1 30-49 ANS 2	→ 1201												
1114	Est-ce que je peux mesurer maintenant votre tension artérielle ? _____ SIGNATURE ENQUÊTRICE _____ DATE	OUI, L'ENQUÊTÉE ACCEPTE 1 NON, L'ENQUÊTÉE N'ACCEPTE PAS 2	→ 1201												
1115	LISEZ LES MESURES DE LA TENSION ARTÉRIELLE. ENREGISTREZ LA PRESSION SYSTOLIQUE ET LA PRESSION DIASTOLIQUE. SI VOUS NE POUVEZ PAS MESURER LA TENSION ARTÉRIELLE DE L'ENQUÊTÉE, ENREGISTREZ LA RAISON.	SYSTOLIQUE <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> DIASTOLIQUE <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> REFUSÉ 994 PROBLÈMES TECHNIQUES 995 AUTRE 996													

SECTION 12. DEVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT

NO.	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSER À																																			
1208A	VÉRIFIEZ 217 ET 218 : SÉLECTIONNEZ L'ENFANT LE PLUS JEUNE DE 3 OU 4 ANS VIVANT AVEC SA MÈRE ET ÉCRIVEZ LE NOM ET LE NUMÉRO DE LA LIGNE. NOM DE L'ENFANT LE PLUS JEUNE DE 3 OU 4 ANS DE Q.212 _____	NUMÉRO DE LA LIGNE DE L'ENFANT LE PLUS JEUNE DE 3 OU 4 ANS DE Q.219 <input type="text"/> <input type="text"/>																																				
1209	(NOM) suit-il/elle un programme d'apprentissage éducatif ou une classe d'éveil, dans un établissement public ou privé, y compris un jardin d'enfants ou une garderie communautaire ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8																																				
1210	Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (NOM) à l'une des activités suivantes : SI OUI, DEMANDEZ : Qui a participé à cette activité avec (NOM) ? ENCERCLEZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ. a) Lire des livres ou regarder des livres illustrés avec (NOM) ? b) Raconter des histoires a (NOM) ? c) Chanter des chansons a (NOM) ou avec (NOM), y compris des berceuses ? d) Emmener (NOM) en promenade en dehors de la maison, de la résidence, de la cour ou de l'enceinte ? e) Jouer avec (NOM) ? f) Nommer, compter, et/ou dessiner des choses pour ou avec (NOM) ?	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>MÈRE</th> <th>PÈRE</th> <th>AUTRE</th> <th>PERS SON NE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) LIRE DES LIVRES</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>X</td> <td>Y</td> </tr> <tr> <td>b) RACONTER DES HISTOIRES</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>X</td> <td>Y</td> </tr> <tr> <td>c) CHANTER DES CHANSONS</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>X</td> <td>Y</td> </tr> <tr> <td>d) PROMENER</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>X</td> <td>Y</td> </tr> <tr> <td>e) JOUER</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>X</td> <td>Y</td> </tr> <tr> <td>f) NOMMER/ COMPTER</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>X</td> <td>Y</td> </tr> </tbody> </table>		MÈRE	PÈRE	AUTRE	PERS SON NE	a) LIRE DES LIVRES	A	B	X	Y	b) RACONTER DES HISTOIRES	A	B	X	Y	c) CHANTER DES CHANSONS	A	B	X	Y	d) PROMENER	A	B	X	Y	e) JOUER	A	B	X	Y	f) NOMMER/ COMPTER	A	B	X	Y	
	MÈRE	PÈRE	AUTRE	PERS SON NE																																		
a) LIRE DES LIVRES	A	B	X	Y																																		
b) RACONTER DES HISTOIRES	A	B	X	Y																																		
c) CHANTER DES CHANSONS	A	B	X	Y																																		
d) PROMENER	A	B	X	Y																																		
e) JOUER	A	B	X	Y																																		
f) NOMMER/ COMPTER	A	B	X	Y																																		
1211	Je voudrais maintenant vous poser quelques questions sur la sante et le développement de votre enfant. Les enfants ne se développent pas tous de manière identique et ils n'apprennent pas tous à la même vitesse. Certains, par exemple, marchent plus tôt que d'autres. Ces questions portent sur plusieurs aspects du développement de votre enfant. Est-ce que (NOM) connaît ou peut citer au moins dix lettres de l'alphabet ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8																																				
1212	Est-ce que (NOM) peut lire au moins quatre mots simples, courants ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8																																				
1213	Est-ce que (NOM) peut citer et reconnaître tous les chiffres de 1 à 10 ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8																																				
1214	Est-ce que (NOM) peut attraper par terre avec deux doigts un petit objet, comme un bâton ou un caillou ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8																																				
1215	Est-ce que (NOM) est parfois trop malade pour jouer ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8																																				

SECTION 12. DEVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT

NO.	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSER À
1216	Est-ce que (NOM) est capable de suivre de simples instructions sur comment faire quelque chose correctement ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
1217	Quand on donne quelque chose à faire a (NOM), est-il/elle capable de le faire de manière indépendante ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
1218	Est-ce que (NOM) s'entend bien avec les autres enfants ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
1219	Est-ce que (NOM) donne des coups de pieds, mord, ou frappe les autres enfants ou les adultes ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
1220	Est-ce que (NOM) est facilement distrait ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	

SECTION 13. MORTALITÉ ADULTE ET MORTALITÉ MATERNELLE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À																																												
1301	<p>Je voudrais maintenant vous poser des questions sur vos frères et soeurs, c'est-à-dire sur tous les enfants nés de votre mère biologique, y compris ceux qui vivent avec vous, ceux qui vivent ailleurs et ceux qui sont décédés. Nous avons appris au cours des enquêtes précédentes qu'il peut être difficile d'établir une liste complète de tous les enfants nés de votre mère biologique. Nous travaillerons ensemble pour établir la liste la plus complète et pour vous aider à vous souvenir de tous vos frères et soeurs. Pouvez-vous maintenant me donner les noms de tous vos frères et soeurs nés de votre mère biologique ?</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>NOM</th> <th>NUMÉRO D'ORDRE</th> <th>NOM</th> <th>NUMÉRO D'ORDRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> <td>k _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>b _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> <td>l _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>c _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> <td>m _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>d _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> <td>n _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>e _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> <td>o _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>f _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> <td>p _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>g _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> <td>q _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>h _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> <td>r _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>i _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> <td>s _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>j _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> <td>t _____</td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	NOM	NUMÉRO D'ORDRE	NOM	NUMÉRO D'ORDRE	a _____	<input type="text"/> <input type="text"/>	k _____	<input type="text"/> <input type="text"/>	b _____	<input type="text"/> <input type="text"/>	l _____	<input type="text"/> <input type="text"/>	c _____	<input type="text"/> <input type="text"/>	m _____	<input type="text"/> <input type="text"/>	d _____	<input type="text"/> <input type="text"/>	n _____	<input type="text"/> <input type="text"/>	e _____	<input type="text"/> <input type="text"/>	o _____	<input type="text"/> <input type="text"/>	f _____	<input type="text"/> <input type="text"/>	p _____	<input type="text"/> <input type="text"/>	g _____	<input type="text"/> <input type="text"/>	q _____	<input type="text"/> <input type="text"/>	h _____	<input type="text"/> <input type="text"/>	r _____	<input type="text"/> <input type="text"/>	i _____	<input type="text"/> <input type="text"/>	s _____	<input type="text"/> <input type="text"/>	j _____	<input type="text"/> <input type="text"/>	t _____	<input type="text"/> <input type="text"/>		
NOM	NUMÉRO D'ORDRE	NOM	NUMÉRO D'ORDRE																																												
a _____	<input type="text"/> <input type="text"/>	k _____	<input type="text"/> <input type="text"/>																																												
b _____	<input type="text"/> <input type="text"/>	l _____	<input type="text"/> <input type="text"/>																																												
c _____	<input type="text"/> <input type="text"/>	m _____	<input type="text"/> <input type="text"/>																																												
d _____	<input type="text"/> <input type="text"/>	n _____	<input type="text"/> <input type="text"/>																																												
e _____	<input type="text"/> <input type="text"/>	o _____	<input type="text"/> <input type="text"/>																																												
f _____	<input type="text"/> <input type="text"/>	p _____	<input type="text"/> <input type="text"/>																																												
g _____	<input type="text"/> <input type="text"/>	q _____	<input type="text"/> <input type="text"/>																																												
h _____	<input type="text"/> <input type="text"/>	r _____	<input type="text"/> <input type="text"/>																																												
i _____	<input type="text"/> <input type="text"/>	s _____	<input type="text"/> <input type="text"/>																																												
j _____	<input type="text"/> <input type="text"/>	t _____	<input type="text"/> <input type="text"/>																																												
1302	<p>VÉRIFIEZ 1301:</p> <p>AU MOINS UN FRÈRE <input type="checkbox"/> OU UNE SOEUR LISTÉ</p> <p>AUCUN FRÈRE <input type="checkbox"/> OU SOEUR LISTÉ</p>		→ 1304																																												
1303	<p>LISEZ LEURS NOMS À L'ENQUÊTÉE ET APRÈS LE DERNIER, DEMANDEZ : Y a-t-il d'autres frères et soeurs de la même mère que vous n'avez pas cités ?</p> <p>NON <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/></p> <p>→ INSCRIVEZ D'AUTRES FRÈRES ET SOEURS À 1301.</p>																																														
1304	<p>Il arrive que des personnes oublient de citer des enfants de leur mère biologique parce qu'ils ne vivent pas avec eux ou parce qu'ils ne se voient pas très souvent. Y a-t-il des frères ou soeurs qui ne vivent pas avec vous que vous n'avez pas cités ?</p> <p>NON <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/></p> <p>→ INSCRIVEZ D'AUTRES FRÈRES ET SOEURS À 1301.</p>																																														
1305	<p>Il arrive parfois que des personnes oublient de citer des enfants de leur mère biologique parce qu'ils sont décédés. Avez-vous des frères et soeurs qui sont décédés que vous n'avez pas cités ?</p> <p>NON <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/></p> <p>→ INSCRIVEZ D'AUTRES FRÈRES ET SOEURS À 1301.</p>																																														
1306	<p>Certaines personnes ont des frères ou soeurs de la même mère mais d'un père différent. Y a-t-il des frères ou soeurs nés de votre mère biologique mais qui ont un père biologique différent que vous n'avez pas cités ?</p> <p>NON <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/></p> <p>→ INSCRIVEZ D'AUTRES FRÈRES ET SOEURS À 1301.</p>																																														
1307	<p>COMPTEZ LE NOMBRE DE FRÈRES OU DE SOEURS ENREGISTRÉS À 1301.</p>	TOTAL DE FRÈRES ET SOEURS ... <input type="text"/> <input type="text"/>																																													

SECTION 13. MORTALITÉ ADULTE ET MORTALITÉ MATERNELLE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
1308	VÉRIFIEZ 1307: Juste pour être sûre que j'ai le bon résultat : Votre mère a eu au TOTAL _____ naissances, sans vous compter, durant sa vie. Est-ce correct ? OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>	VÉRIFIEZ ET CORRIGEZ 1301 ET/OU 1307.	
1309	VÉRIFIEZ 1307: AU MOINS UN FRÈRE <input type="checkbox"/> OU UNE SOEUR LISTÉ	AUCUN FRÈRE <input type="checkbox"/> OU SOEUR LISTÉ	1401
1310	Dites-mois, s'il vous plait, quel est le frère ou la soeur qui est né le premier (la première) ? Et qui a été le suivant/la suivante ? ENREGISTREZ '01' POUR LE NUMÉRO D'ORDRE À 1301 POUR LE PREMIER FRÈRE OU SOEUR, '02' POUR LE SECOND ET AINSI DE SUITE JUSQU'À CE QUE VOUS AYEZ ENREGISTRÉ LE NUMÉRO D'ORDRE POUR TOUS LES FRÈRES ET SOEURS.		
1311	Combien de naissances votre mère a-t-elle eues avant votre propre naissance ?	NOMBRE DE NAISSANCES PRÉCÉDENTES <input type="text"/> <input type="text"/>	

SECTION 13. MORTALITÉ ADULTE ET MORTALITÉ MATERNELLE

1312	LISTEZ LES FRÈRES ET SOEURS SELON LE NUMÉRO D'ORDRE À 1301. POSEZ 1313 JUSQU'À 1324 POUR UN FRÈRE OU UNE SOEUR AVANT DE PASSER AU FRÈRE OU SOEUR SUIVANT. S'IL Y A PLUS DE 12 FRÈRES ET SOEURS, UTILISEZ UN QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE.						
1313	NOM DU FRÈRE OU DE LA SOEUR.	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
1314	(NOM) est-il de sexe masculin ou féminin ?	MASC. 1 FEM. 2	MASC. 1 FEM. 2	MASC. 1 FEM. 2	MASC. 1 FEM. 2	MASC. 1 FEM. 2	MASC. 1 FEM. 2
1315	Est-ce que (NOM) est toujours en vie ?	OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1317 ← NSP 8 ALLEZ À (02) ←	OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1317 ← NSP 8 ALLEZ À (03) ←	OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1317 ← NSP 8 ALLEZ À (04) ←	OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1317 ← NSP 8 ALLEZ À (05) ←	OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1317 ← NSP 8 ALLEZ À (06) ←	OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1317 ← NSP 8 ALLEZ À (07) ←
1316	Quel âge a (NOM) ?	<input type="text"/> <input type="text"/> ALLEZ À (02)	<input type="text"/> <input type="text"/> ALLEZ À (03)	<input type="text"/> <input type="text"/> ALLEZ À (04)	<input type="text"/> <input type="text"/> ALLEZ À (05)	<input type="text"/> <input type="text"/> ALLEZ À (06)	<input type="text"/> <input type="text"/> ALLEZ À (07)
1317	Combien y a-t-il d'années que (NOM) est décédé(e) ?	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
1318	Quel âge avait (NOM) lorsqu'il/elle est décédé(e) ? SI NE SAIT PAS, INSISTEZ ET POSEZ D'AUTRES QUESTIONS POUR OBTENIR UNE ESTIMATION.	<input type="text"/> <input type="text"/> SI HOMME, OU SI FEMME DÉCÉDÉE AVANT L'ÂGE DE 12 ANS, ALLEZ À 1323	<input type="text"/> <input type="text"/> SI HOMME, OU SI FEMME DÉCÉDÉE AVANT L'ÂGE DE 12 ANS, ALLEZ À 1323	<input type="text"/> <input type="text"/> SI HOMME, OU SI FEMME DÉCÉDÉE AVANT L'ÂGE DE 12 ANS, ALLEZ À 1323	<input type="text"/> <input type="text"/> SI HOMME, OU SI FEMME DÉCÉDÉE AVANT L'ÂGE DE 12 ANS, ALLEZ À 1323	<input type="text"/> <input type="text"/> SI HOMME, OU SI FEMME DÉCÉDÉE AVANT L'ÂGE DE 12 ANS, ALLEZ À 1323	<input type="text"/> <input type="text"/> SI HOMME, OU SI FEMME DÉCÉDÉE AVANT L'ÂGE DE 12 ANS, ALLEZ À 1323
1319	(NOM) était-elle enceinte quand elle est décédée ?	OUI 1 ALLEZ À 1323 ← NON 2	OUI 1 ALLEZ À 1323 ← NON 2	OUI 1 ALLEZ À 1323 ← NON 2	OUI 1 ALLEZ À 1323 ← NON 2	OUI 1 ALLEZ À 1323 ← NON 2	OUI 1 ALLEZ À 1323 ← NON 2
1320	Est-ce que (NOM) est décédée durant un accouchement ?	OUI 1 ALLEZ À (02) ← NON 2	OUI 1 ALLEZ À (03) ← NON 2	OUI 1 ALLEZ À (04) ← NON 2	YES 1 ALLEZ À (05) ← NON 2	OUI 1 ALLEZ À (06) ← NON 2	OUI 1 ALLEZ À (07) ← NON 2
1321	Est-ce que (NOM) est décédée dans les deux mois qui ont suivi la fin d'une grossesse ou un accouchement ?	OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1323 ←	OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1323 ←	OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1323 ←	OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1323 ←	OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1323 ←	OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1323 ←
1322	Combien de jours après la fin de la grossesse ou l'accouchement (NOM) est-elle décédée ?	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>

SECTION 13. MORTALITÉ ADULTE ET MORTALITÉ MATERNELLE

1312	LISTEZ LES FRÈRES ET SOEURS SELON LE NUMÉRO D'ORDRE À 1301. POSEZ 1313 JUSQU'À 1324 POUR UN FRÈRE OU UNE SOEUR AVANT DE PASSER AU FRÈRE OU SOEUR SUIVANT. S'IL Y A PLUS DE 12 FRÈRES ET SOEURS, UTILISEZ UN QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE.						
1313	NOM DU FRÈRE OU DE LA SOEUR.	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
1323	Est-ce que le décès de (NOM) était dû à un acte de violence ?	OUI 1 ALLEZ À (02) ← NON 2	OUI 1 ALLEZ À (03) ← NON 2	OUI 1 ALLEZ À (04) ← NON 2	OUI 1 ALLEZ À (05) ← NON 2	OUI 1 ALLEZ À (06) ← NON 2	OUI 1 ALLEZ À (07) ← NON 2
1324	Est-ce que le décès de (NOM) était dû à un accident ?	OUI 1 NON 2 ALLEZ À (02)	OUI 1 NON 2 ALLEZ À (03)	OUI 1 NON 2 ALLEZ À (04)	OUI 1 NON 2 ALLEZ À (05)	OUI 1 NON 2 ALLEZ À (06)	OUI 1 NON 2 ALLEZ À (07)
SI PLUS AUCUN FRÈRE OU SOEUR, ALLER À SECTION SUIVANTE.							

SECTION 13. MORTALITÉ ADULTE ET MORTALITÉ MATERNELLE

1312	LISTEZ LES FRÈRES ET SOEURS SELON LE NUMÉRO D'ORDRE À 1301. POSEZ 1313 JUSQU'À 1324 POUR UN FRÈRE OU UNE SOEUR AVANT DE PASSER AU FRÈRE OU SOEUR SUIVANT. S'IL Y A PLUS DE 12 FRÈRES ET SOEURS, UTILISEZ UN QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE.						
1313	NOM DU FRÈRE OU DE LA SOEUR.	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1314	(NOM) est-il de sexe masculin ou féminin ?	MASC. 1 FEM. 2	MASC. 1 FEM. 2	MASC. 1 FEM. 2	MASC. 1 FEM. 2	MASC. 1 FEM. 2	MASC. 1 FEM. 2
1315	Est-ce que (NOM) est toujours en vie ?	OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1317 ← NSP 8 ALLEZ À (08) ←	OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1317 ← NSP 8 ALLEZ À (09) ←	OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1317 ← NSP 8 ALLEZ À (10) ←	OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1317 ← NSP 8 ALLEZ À (11) ←	OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1317 ← NSP 8 ALLEZ À (12) ←	OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1317 ← NSP 8 ALLEZ À (13) ←
1316	Quel âge a (NOM) ?	<input type="text"/> <input type="text"/> ALLEZ À (08)	<input type="text"/> <input type="text"/> ALLEZ À (09)	<input type="text"/> <input type="text"/> ALLEZ À (10)	<input type="text"/> <input type="text"/> ALLEZ À (11)	<input type="text"/> <input type="text"/> ALLEZ À (12)	<input type="text"/> <input type="text"/> ALLEZ À (13)
1317	Combien y a-t-il d'années que (NOM) est décédé(e) ?	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
1318	Quel âge avait (NOM) lorsqu'il/elle est décédé(e) ? SI NE SAIT PAS, INSISTEZ ET POSEZ D'AUTRES QUESTIONS POUR OBTENIR UNE ESTIMATION.	<input type="text"/> <input type="text"/> SI HOMME, OU SI FEMME DÉCÉDÉE AVANT L'ÂGE DE 12 ANS, ALLEZ À 1323	<input type="text"/> <input type="text"/> SI HOMME, OU SI FEMME DÉCÉDÉE AVANT L'ÂGE DE 12 ANS, ALLEZ À 1323	<input type="text"/> <input type="text"/> SI HOMME, OU SI FEMME DÉCÉDÉE AVANT L'ÂGE DE 12 ANS, ALLEZ À 1323	<input type="text"/> <input type="text"/> SI HOMME, OU SI FEMME DÉCÉDÉE AVANT L'ÂGE DE 12 ANS, ALLEZ À 1323	<input type="text"/> <input type="text"/> SI HOMME, OU SI FEMME DÉCÉDÉE AVANT L'ÂGE DE 12 ANS, ALLEZ À 1323	<input type="text"/> <input type="text"/> SI HOMME, OU SI FEMME DÉCÉDÉE AVANT L'ÂGE DE 12 ANS, ALLEZ À 1323
1319	(NOM) était-elle enceinte quand elle est décédée ?	OUI 1 ALLEZ À 1323 ← NON 2	OUI 1 ALLEZ À 1323 ← NON 2	OUI 1 ALLEZ À 1323 ← NON 2	OUI 1 ALLEZ À 1323 ← NON 2	OUI 1 ALLEZ À 1323 ← NON 2	OUI 1 ALLEZ À 1323 ← NON 2
1320	Est-ce que (NOM) est décédée durant un accouchement ?	OUI 1 ALLEZ À (08) ← NON 2	OUI 1 ALLEZ À (09) ← NON 2	OUI 1 ALLEZ À (10) ← NON 2	OUI 1 ALLEZ À (11) ← NON 2	OUI 1 ALLEZ À (12) ← NON 2	OUI 1 ALLEZ À (13) ← NON 2
1321	Est-ce que (NOM) est décédée dans les deux mois qui ont suivi la fin d'une grossesse ou un accouchement ?	OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1323 ←	OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1323 ←	OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1323 ←	OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1323 ←	OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1323 ←	OUI 1 NON 2 ALLEZ À 1323 ←
1322	Combien de jours après la fin de la grossesse ou l'accouchement (NOM) est-elle décédée ?	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>

SECTION 13. MORTALITÉ ADULTE ET MORTALITÉ MATERNELLE

1312	LISTEZ LES FRÈRES ET SOEURS SELON LE NUMÉRO D'ORDRE À 1301. POSEZ 1313 JUSQU'À 1324 POUR UN FRÈRE OU UNE SOEUR AVANT DE PASSER AU FRÈRE OU SOEUR SUIVANT. S'IL Y A PLUS DE 12 FRÈRES ET SOEURS, UTILISEZ UN QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE.						
1313	NOM DU FRÈRE OU DE LA SOEUR.	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1323	Est-ce que le décès de (NOM) était dû à un acte de violence ?	OUI 1 ALLEZ À (08) ← NON 2	OUI 1 ALLEZ À (09) ← NON 2	OUI 1 ALLEZ À (10) ← NON 2	OUI 1 ALLEZ À (11) ← NON 2	OUI 1 ALLEZ À (12) ← NON 2	OUI 1 ALLEZ À (13) ← NON 2
1324	Est-ce que le décès de (NOM) était dû à un accident ?	OUI 1 NON 2 ALLEZ À (08)	OUI 1 NON 2 ALLEZ À (09)	OUI 1 NON 2 ALLEZ À (10)	OUI 1 NON 2 ALLEZ À (11)	OUI 1 NON 2 ALLEZ À (12)	OUI 1 NON 2 ALLEZ À (13)
SI PLUS AUCUN FRÈRE OU SOEUR, ALLER À SECTION SUIVANTE.							

SECTION 10. VIH/SIDA

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
1000	VÉRIFIEZ LA PAGE DE COUVERTURE: MÉNAGE SÉLECTIONNÉE POUR L'ENQUÊTE HOMME ? MÉNAGE SÉLECTIONNÉ <input type="checkbox"/> POUR L'ENQUÊTE HOMME MÉNAGE NON SÉLECTIONNÉE <input type="checkbox"/> POUR L'ENQUÊTE HOMME		→ 1500
1001	Je voudrais maintenant que nous parlions d'un autre sujet. Avez-vous déjà entendu parler de VIH ou de sida ?	OUI 1 NON 2	→ 1042
1002	Le VIH est le virus qui cause le sida. Est-ce qu'on peut réduire le risque de contracter le VIH en ayant juste un seul partenaire sexuel qui n'est pas infecté et qui n'a aucun autre partenaire sexuel ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
1003	Est-ce qu'on peut contracter le VIH par les piqûres de moustiques ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
1004	Est-ce qu'on peut réduire le risque de contracter le VIH en utilisant des condoms au cours de chaque rapport sexuel ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
1005	Est-ce qu'on peut contracter le VIH en partageant la nourriture avec une personne qui a le VIH ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
1006	Est-ce qu'on peut contracter le VIH par sorcellerie ou par des moyens surnaturels ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
1007	Est-il possible qu'une personne paraissant en bonne santé ait, en fait, le VIH ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
1008	Est-ce que le VIH peut être transmis de la mère à son enfant :	OUI NON NSP a) DURANT LA GROSSESSE 1 2 8 b) DURANT ACCOUCHE 1 2 8 c) EN ALLAITANT 1 2 8	
1009	VÉRIFIEZ 1008: AU MOINS <input type="checkbox"/> UN 'OUI' AUTRE <input type="checkbox"/>		→ 1011
1010	Y a-t-il des médicaments spéciaux qu'un médecin ou une infirmière/sage femme peut donner à une femme infectée par le VIH pour réduire le risque de transmission à son enfant ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
1011	VÉRIFIEZ 208 ET 215: DERNIÈRE NAISSANCE EN 2015-2017 <input type="checkbox"/> PAS DE NAISSANCE <input type="checkbox"/> DERNIÈRE NAISSANCE EN 2014 <input type="checkbox"/>		→ 1027 → 1027
1012	VÉRIFIEZ 408 POUR DERNIÈRE NAISSANCE: A EU DES SOINS PRÉNATALS <input type="checkbox"/> PAS DE SOINS PRÉNATALS <input type="checkbox"/>		→ 1020

SECTION 10. VIH/SIDA

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À																
1013	VÉRIFIEZ LA PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES. AVANT DE CONTINUER, FAITES TOUS LES EFFORTS POSSIBLE POUR VOUS TROUVER EN PRIVÉ.																		
1014	Au cours de l'une des visites prénatales pour votre dernière naissance, est-ce que l'on vous a parlé : a) Des bébés qui contractent le VIH de leur mère ? b) Des choses que vous pouvez faire pour ne pas contracter le VIH ? c) Effectuer un test du VIH ?	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>OUI</th> <th>NON</th> <th>NSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) VIH DE LA MÈRE</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>b) CHOSES À FAIRE</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>c) TEST DU VIH</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		OUI	NON	NSP	a) VIH DE LA MÈRE	1	2	8	b) CHOSES À FAIRE	1	2	8	c) TEST DU VIH	1	2	8	
	OUI	NON	NSP																
a) VIH DE LA MÈRE	1	2	8																
b) CHOSES À FAIRE	1	2	8																
c) TEST DU VIH	1	2	8																
1015	Dans le cadre des visites prénatales, est-ce que l'on vous a proposé d'effectuer un test du VIH ?	OUI 1 NON 2																	
1016	Je ne veux pas connaître les résultats mais avez-vous effectué un test du VIH dans le cadre de vos soins prénatals ?	OUI 1 NON 2	→ 1020																
1016A	Toutes les femmes sont censées recevoir des conseils avant effectué le test. Avant d'effectuer votre test, avez-vous reçu des conseils ?	OUI 1 NON 2																	
1017	Où le test a-t-il été fait ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT. _____ (NOM DE L'ENDROIT)	SECTEUR PUBLIC HÔPITAL DU GOUVERNEMENT 11 CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. 12 CENTRE INDÉPENDANT DE TEST ET CONSEIL 13 CLINIQUE DE PLANIFICATION FAMILIALE .. 14 SERVICES MOBILES DE TEST ET CONSEIL 15 AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ 16 (PRÉCISEZ) SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ/ MÉDECIN PRIVÉ 21 CENTRE INDÉPENDANT DE TEST ET CONSEIL 22 PHARMACIE 23 SERVICES MOBILES DE TEST ET CONSEIL 24 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ 26 (PRÉCISEZ) AUTRE SOURCE MAISON 31 LIEU DE TRAVAIL 32 CENTRE DE DÉTENTION 33 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)																	
1018	Je ne veux pas connaître les résultats mais avez-vous eu les résultats du test ?	OUI 1 NON 2	→ 1020																
1019	Toutes les femmes sont censées recevoir des conseils après avoir effectué le test. Après avoir effectué votre test, avez-vous reçu des conseils ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8																	
1020	VÉRIFIEZ 430 POUR DERNIÈRE NAISSANCE: UN CODE <input type="checkbox"/> '21-36' ENCERCLÉ ↓ AUTRE <input type="checkbox"/>		→ 1024																
1021	Entre le moment où vous êtes arrivée pour accoucher mais avant que l'enfant naisse, vous a-t-on proposé de faire un test du VIH ?	OUI 1 NON 2																	

SECTION 10. VIH/SIDA

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
1022	Je ne veux pas connaître les résultats mais vous a-t-on fait un test du VIH à ce moment-là ?	OUI 1 NON 2	→ 1024
1023	Je ne veux pas connaître les résultats mais avez-vous eu les résultats du test ?	OUI 1 NON 2	→ 1025
1024	VÉRIFIEZ 1016: OUI <input type="checkbox"/> ↓ NON OU <input type="checkbox"/> PAS POSÉE → 1027		
1025	Avez-vous effectué un test du VIH depuis le moment où vous avez fait un test durant votre grossesse ?	OUI 1 NON 2	→ 1028
1026	Il y a combien de mois que vous avez effectué votre test du VIH le plus récent ?	IL Y A DES MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> DEUX ANNÉES OU PLUS 95	→ 1033
1027	Je ne veux pas connaître les résultats mais avez-vous déjà fait un test du VIH ?	OUI 1 NON 2	→ 1031
1028	Il y a combien de mois que vous avez effectué votre test du VIH le plus récent ?	IL Y A DES MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> DEUX ANNÉES OU PLUS 95	
1029	Je ne veux pas connaître les résultats mais avez-vous eu les résultats du test ?	OUI 1 NON 2	
1030	Où le test a-t-il été fait ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT. _____ (NOM DE L'ENDROIT)	SECTEUR PUBLIC HÔPITAL DU GOUVERNEMENT 11 CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT 12 CENTRE DE DEPISTAGE VOLONTAIRE CLINIQUE DE PLAN 13 SERVICES MOBILES DE TEST 14 AU ET CONSEIL 15 _____ 16 (PRÉCISEZ) SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ/ MÉDECIN PRIVÉ 21 CENTRE INDÉPENDANT DE TEST ET CONSEIL 22 PHARMACIE 23 SERVICES MOBILES DE TEST ET CONSEIL 24 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ 26 (PRÉCISEZ) AUTRE SOURCE MAISON 31 LIEU DE TRAVAIL 32 CENTRE DE DÉTENTION 33 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	→ 1033
1031	Connaissez-vous un endroit où les gens peuvent aller pour faire un test du VIH ?	OUI 1 NON 2	→ 1033

SECTION 10. VIH/SIDA

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
1032	<p>Où est-ce ?</p> <p>Pas d'autre endroit ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____</p> <p>(NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL DU GOUVERNEMENT A</p> <p>CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT B</p> <p>CENTRE INDÉPENDANT DE TEST ET CONSEIL C</p> <p>CLINIQUE DE PLANIFICATION FAMILIALE D</p> <p>SERVICES MOBILES DE TEST ET CONSEIL E</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ F</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ/ MÉDECIN PRIVÉ G</p> <p>CENTRE INDÉPENDANT DE TEST ET CONSEIL H</p> <p>PHARMACIE I</p> <p>SERVICES MOBILES DE TEST ET CONSEIL J</p> <p>AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ K</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE _____ X</p> <p>(PRÉCISEZ)</p>	
1033	Avez-vous entendu parler de tests que les gens peuvent utiliser pour se tester eux-mêmes pour le VIH ?	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p>	→ 1035
1034	Vous êtes-vous testée vous-même en utilisant un kit de test ?	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p>	
1035	Est-ce que vous achèteriez des légumes frais à un marchand ou à un vendeur si vous saviez que cette personne a le VIH ?	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS/PAS SÛRE/ÇA DÉPENI 8</p>	
1036	Pensez-vous que des enfants vivant avec le VIH devraient être autorisés à aller à l'école avec des enfants qui n'ont pas le VIH ?	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS/PAS SÛRE/ÇA DÉPENI 8</p>	
1037	Pensez-vous que les gens hésitent à faire un test du VIH parce qu'ils ont peur de la réaction des autres si le résultat de leur test était VIH positif ?	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS/PAS SÛRE/ÇA DÉPENI 8</p>	
1038	Est-ce que les gens parlent mal de ceux qui vivent avec le VIH ou dont on pense qu'ils vivent avec le VIH ?	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS/PAS SÛRE/ÇA DÉPENI 8</p>	
1039	Est-ce que les gens qui vivent avec le VIH, ou dont on pense qu'ils vivent avec le VIH, perdent le respect des autres ?	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS/PAS SÛRE/ÇA DÉPENI 8</p>	
1040	Êtes-vous d'accord ou non avec la déclaration suivante : j'aurais honte si quelqu'un de ma famille avait le VIH.	<p>D'ACCORD 1</p> <p>PAS D'ACCORD 2</p> <p>NE SAIT PAS/PAS SÛRE/ÇA DÉPENI 8</p>	
1041	Avez-vous peur de contracter le VIH si vous étiez en contact avec la salive d'une personne vivant avec le VIH ?	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>DIT QU'ELLE A LE VIH 3</p> <p>NE SAIT PAS/PAS SÛRE/ÇA DÉPENI 8</p>	

SECTION 10. VIH/SIDA

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
1042	<p>VÉRIFIEZ 1001:</p> <p>A ENTENDU PARLER <input type="checkbox"/> PAS ENTENDU PARLER <input type="checkbox"/> DU VIH OU DU SIDA ↓ DU VIH OU DU SIDA ↓</p> <p>a) Mis à part le sida, avez-vous entendu parler d'autres infections qui peuvent se transmettre par contact sexuel ?</p> <p>b) Avez-vous entendu parler d'infections qui peuvent se transmettre par contact sexuel ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p>	
1043	<p>VÉRIFIEZ 713:</p> <p>A EU DES RAPPORTS <input type="checkbox"/> N'A JAMAIS EU DE <input type="checkbox"/> SEXUELS ↓ RAPPORTS SEXUELS →</p>		1051
1044	<p>VÉRIFIEZ 1042: A ENTENDU PARLER D'AUTRES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES ?</p> <p>OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> →</p>		1046
1045	<p>J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur votre santé au cours des 12 derniers mois. Durant les 12 derniers mois, avez-vous eu une maladie que vous avez contractée par contact sexuel ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>	
1046	<p>Il arrive parfois que les femmes aient des pertes vaginales, anormales et malodorantes. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des pertes vaginales anormales et malodorantes ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>	
1047	<p>Il arrive parfois que les femmes aient une plaie ou un ulcère génital. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu une plaie ou un ulcère génital ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>	
1048	<p>VÉRIFIEZ 1045, 1046, ET 1047:</p> <p>A EU UNE <input type="checkbox"/> N'A PAS EU <input type="checkbox"/> INFECTION ↓ D'INFECTION OU (UN 'OUI') NE SAIT PAS →</p>		1051
1049	<p>La dernière fois que vous avez eu (PROBLEME DÉCLARÉ À 1045/1046/1047), avez-vous recherché des conseils ou un traitement ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p>	1051

SECTION 10. VIH/SIDA

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
1050	<p>Où êtes-vous allée ?</p> <p>Pas d'autre endroit ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____ (NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL DU GOUVERNEMENT A</p> <p>CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT B</p> <p>CENTRE INDÉPENDANT DE TEST ET CONSEIL C</p> <p>CLINIQUE DE PLANIFICATION FAMILIALE D</p> <p>SERVICES MOBILES DE TEST ET CONSEIL E</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ F</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ/ MÉDECIN PRIVÉ G</p> <p>CENTRE INDÉPENDANT DE TEST ET CONSEIL H</p> <p>PHARMACIE I</p> <p>SERVICES MOBILES DE TEST ET CONSEIL J</p> <p>AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ K</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE SOURCE</p> <p>BOUTIQUE L</p> <p>AUTRE _____ X</p> <p>(PRÉCISEZ)</p>	
1051	Si une femme sait que son mari est atteint d'une maladie qu'elle peut contracter au cours de rapports sexuels, pensez-vous qu'il est justifié qu'elle lui demande qu'ils utilisent un condom quand ils ont des rapports sexuels ?	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>	
1052	Est-ce que vous pensez qu'il est justifié qu'une femme refuse d'avoir des rapports sexuels avec son mari quand elle sait qu'il a des relations sexuelles avec d'autres femmes ?	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>	
1053	<p>VÉRIFIEZ 701:</p> <p>ACTUELLEMENT MARIÉE/ <input type="checkbox"/> VIT AVEC UN HOMME ↓</p> <p>PAS EN UNION <input type="checkbox"/> → 1401</p>		
1054	Pouvez-vous refuser d'avoir des rapports sexuels avec votre (mari/partenaire) quand vous ne souhaitez pas en avoir ?	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>ÇA DÉPEND/PAS SÛRÉ 8</p>	
1055	Pourriez-vous demander à votre (mari/partenaire) d'utiliser un condom si vous vouliez qu'il en utilise un ?	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>ÇA DÉPEND/PAS SÛRÉ 8</p>	

SECTION 14. MALADIES NON TRANSMISSIBLES POUR LE QUESTIONNAIRE FEMME

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
1401	Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé a déjà vérifié votre tension artérielle ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
1402	Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà dit que vous aviez une tension artérielle élevée ou de l'hypertension ?	OUI 1 NON 2	→ 1406
1403	Dans les 12 derniers mois, est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a dit que vous aviez une tension artérielle élevée ou de l'hypertension ?	OUI 1 NON 2	
1404	Est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé vous a prescrit des médicaments pour contrôler votre tension artérielle ?	OUI 1 NON 2	
1405	Est-ce que vous prenez actuellement des médicaments pour contrôler votre tension artérielle ?	OUI 1 NON 2	
1406	Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé a déjà mesuré le niveau de sucre dans votre sang ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
1407	Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà dit que vous aviez un niveau élevé de sucre dans le sang ou du diabète ?	OUI 1 NON 2	→ 1411
1408	Dans les 12 derniers mois, est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a dit que vous aviez un niveau élevé de sucre dans le sang ou du diabète ?	OUI 1 NON 2	
1409	Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a prescrit des médicaments pour contrôler votre niveau de sucre ou de diabète ?	OUI 1 NON 2	
1410	Est-ce que vous prenez des médicaments pour contrôler votre niveau élevé de sucre dans le sang ou votre diabète ?	OUI 1 NON 2	
1411	Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà dit que vous aviez une maladie cardiaque ou un problème cardiaque chronique ?	OUI 1 NON 2	→ 1413
1412	Suivez-vous actuellement un traitement pour une maladie cardiaque ou un problème cardiaque chronique ?	OUI 1 NON 2	
1413	Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà dit que vous aviez une maladie pulmonaire ou un problème pulmonaire chronique telle que l'asthme ?	OUI 1 NON 2	→ 1415
1414	Suivez-vous actuellement un traitement pour une maladie pulmonaire ou un problème pulmonaire chronique ?	OUI 1 NON 2	
1415	Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà dit que vous aviez un cancer ou une tumeur ?	OUI 1 NON 2	→ 1417
1416	Suivez-vous actuellement un traitement pour un cancer ou une tumeur ?	OUI 1 NON 2	

SECTION 14. MALADIES NON TRANSMISSIBLES POUR LE QUESTIONNAIRE FEMME

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
1417	Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà dit que vous faisiez une dépression ?	OUI 1 NON 2	→ 1419
1418	Suivez-vous actuellement un traitement pour dépression ?	OUI 1 NON 2	
1419	Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà dit que vous aviez de l'arthrite ?	OUI 1 NON 2	→ 1421
1420	Suivez-vous actuellement un traitement pour l'arthrite ?	OUI 1 NON 2	
1421	Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà dit que vous aviez une autre maladie chronique, c'est à-dire une autre maladie de longue durée ?	OUI 1 <u>(SPÉCIFIEZ LA MALADIE CHRONIQUE)</u> NON 2	→ 1423
1422	Suivez-vous actuellement un traitement pour (MALADIE CHRONIQUE À 1421) ?	OUI 1 NON 2	
1423	Avez-vous entendu parler du cancer du col de l'utérus ?	OUI 1 NON 2	→ 1425
1424	Avez-vous entendu parler de tests pour le cancer du col de l'utérus ?	OUI 1 NON 2	
1425	Je vais, maintenant, vous poser des questions sur des tests qu'un professionnel de santé peut faire pour détecter un cancer du col de l'utérus. Le col de l'utérus est la partie qui relie l'utérus au vagin. Pour effectuer un test du cancer du col de l'utérus, on demande à la femme de s'allonger sur le dos en écartant les jambes. Ensuite, en utilisant une petite brosse ou un coton-tige, le professionnel de santé prélève à l'intérieur de l'utérus un échantillon. L'échantillon est envoyé dans un laboratoire pour être testé. Ce test est appelé un frottis Pap ou un test PVH. Il y a une autre méthode qui est appelée IVA ou Inspection Visuelle après application d'Acide ascétique. Au cours de ce test, le professionnel de santé applique du vinaigre dilué sur le col utérin pour voir si une réaction se produit.		
1426	Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà fait un test de dépistage du cancer du col de l'utérus ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 1430
1427	Quand a eu lieu votre dernier test pour le cancer de l'utérus ? SI MOINS D'1 ANNÉE, INSCRIVEZ '00'.	ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98	
1428	Quel était le résultat de votre dernier test pour le cancer du col de l'utérus ?	NORMAL / NÉGATIF 1 ANORMAL / POSITIF 2 PAS CLAIR / NON CONCLUANT 3 N'A PAS REÇU DE RÉSULTATS 4 NE SAIT PAS 8	→ 1430 → 1430
1429	Avez-vous suivi un traitement pour le col de l'utérus ou avez-vous fait des visites de suivi à cause des résultats du test ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	

SECTION 14. MALADIES NON TRANSMISSIBLES (TENSION ARTÉRIELLE MOYENNE)

NO.	QUESTIONS ET FILTRES	CODE	ALLEZ À	
1430	VÉRIFIEZ Q123D ET Q1115: PRESSIONS SYSTOLIQUE ET DIASTOLIQUE ENREGISTRÉES À Q123D ET À Q1115	PRESSIONS SYSTOLIQUE ET DIASTOLIQUE NON ENREGISTRÉES À Q123D ET À Q1115	→ 1436	
1431	ENREGISTREZ ET CALCULEZ LA MOYENNE DE LA PRESSION SYSTOLIQUE ET DE LA PRESSION DIASTOLIQUE DE Q123D ET Q1115.			
1432	MESURES DE LA TENSION ARTÉRIELLE DE Q123D	SYSTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	DIASTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1433	MESURES DE LA TENSION ARTÉRIELLE DE Q1115	SYSTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	DIASTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1434	SOMME DE Q1432 + Q1433	SOMME SYSTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	SOMME DIASTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1435	DIVISEZ Q1434 PAR 2	MOYENNE SYSTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	MOYENNE DIASTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	→ 1440
1436	VÉRIFIEZ Q123D PRESSION SYSTOLIQUE <u>ET</u> PRESSION DIASTOLIQUE NON ENREGISTRÉES À Q123D	LES DEUX PRESSIONS SYSTOLIQUE <u>ET</u> DIASTOLIQUE ENREGISTRÉES À Q123D		→ 1439
1437	VÉRIFIEZ Q1115: PRESSION SYSTOLIQUE ET PRESSION DIASTOLIQUE NON ENREGISTRÉE À Q1115	LES DEUX PRESSIONS SYSTOLIQUE <u>ET</u> DIASTOLIQUE ENREGISTRÉES À Q1115		→ 1439
1438	VÉRIFIEZ Q106F: PRESSION SYSTOLIQUE ET DIASTOLIQUE ENREGISTRÉES À Q106F	LES DEUX PRESSIONS SYSTOLIQUE <u>ET</u> DIASTOLIQUE <u>NON</u> ENREGISTRÉES À Q106F		→ 1500
1439	ENREGISTREZ LA PRESSION SYSTOLIQUE ET DIASTOLIQUE.	SYSTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	DIASTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

SECTION 14. MALADIES NON TRANSMISSIBLES (TENSION ARTÉRIELLE MOYENNE)

NO.	QUESTIONS ET FILTRES	CODE	ALLEZ À																																																							
1440	<p>UTILISEZ LE TABLEAU CI-DESSOUS POUR DÉTERMINER LE CODE CORRECT POUR ENREGISTRER DANS LE RAPPORT SUR LA TENSION ARTÉRIELLE ET SUR LE FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE .</p> <p>ENCERCLEZ LA LIGNE OÙ VOUS TROUVEZ LA VALEUR DE LA PRESSION SYSTOLIQUE DE Q1435 OU Q1439 .</p> <p>ENSUITE, ENCERCLEZ LA COLONNE OÙ VOUS TROUVEZ LA VALEUR DE LA PRESSION DIASTOLIQUE DE Q1435 OU Q1439 .</p> <p>LA VALEUR QUI SE TROUVE À L'INTERSECTION DE LA LIGNE ET DE LA COLONNE ENCERCLÉES DANS LE TABLEAU SERA UTILISÉE POUR COMPLÉTER Q1441.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">PRESSION SYSTOLIQUE MOYENNE</th> <th colspan="6">PRESSION DIASTOLIQUE MOYENNE</th> </tr> <tr> <th><84</th> <th>85-89</th> <th>90-99</th> <th>100-109</th> <th>110-119</th> <th>≥ 120</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤129</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>130-139</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>140-159</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>160-179</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>180-209</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>≥ 210</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	PRESSION SYSTOLIQUE MOYENNE	PRESSION DIASTOLIQUE MOYENNE						<84	85-89	90-99	100-109	110-119	≥ 120	≤129	1	2	3	4	5	6	130-139	2	2	3	4	5	6	140-159	3	3	3	4	5	6	160-179	4	4	4	4	5	6	180-209	5	5	5	5	5	6	≥ 210	6	6	6	6	6	6		
PRESSION SYSTOLIQUE MOYENNE	PRESSION DIASTOLIQUE MOYENNE																																																									
	<84	85-89	90-99	100-109	110-119	≥ 120																																																				
≤129	1	2	3	4	5	6																																																				
130-139	2	2	3	4	5	6																																																				
140-159	3	3	3	4	5	6																																																				
160-179	4	4	4	4	5	6																																																				
180-209	5	5	5	5	5	6																																																				
≥ 210	6	6	6	6	6	6																																																				
1441	<p>ENREGISTREZ DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS LE NOMBRE QUE VOUS AVEZ ENCERCLÉ À Q1440. UTILISEZ ENSUITE LES INSTRUCTIONS À DROITE DE CE NOMBRE POUR COMPLÉTER LE RAPPORT SUR LA TENSION ARTÉRIELLE ET LE FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE POUR L'ENQUÊTÉE. DONNEZ À L'ENQUÊTÉE LE FORMULAIRE ET RÉPONDEZ À TOUTES SES QUESTIONS.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CATÉGORIE DE LA TENSION ARTÉRIELLE DE L'ENQUÊTÉE</th> <th>CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ POUR VÉRIFIER LA TENSION ARTÉRIELLE DANS :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>NORMALE</td> <td>24 MOIS</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>À LA LIMITE SUPÉRIEURE DU SEUIL NORMAL</td> <td>12 MOIS</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>AU-DESSUS DU SEUIL NORMAL</td> <td>2 MOIS</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MODÉRÉMENT ÉLEVÉE</td> <td>1 MOIS</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TRÈS ÉLEVÉE</td> <td>7 JOURS</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>EXTRÊMEMENT ÉLEVÉE</td> <td>AUJOURD'HUI</td> </tr> </tbody> </table>		CATÉGORIE DE LA TENSION ARTÉRIELLE DE L'ENQUÊTÉE	CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ POUR VÉRIFIER LA TENSION ARTÉRIELLE DANS :	1	NORMALE	24 MOIS	2	À LA LIMITE SUPÉRIEURE DU SEUIL NORMAL	12 MOIS	3	AU-DESSUS DU SEUIL NORMAL	2 MOIS	4	MODÉRÉMENT ÉLEVÉE	1 MOIS	5	TRÈS ÉLEVÉE	7 JOURS	6	EXTRÊMEMENT ÉLEVÉE	AUJOURD'HUI																																				
	CATÉGORIE DE LA TENSION ARTÉRIELLE DE L'ENQUÊTÉE	CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ POUR VÉRIFIER LA TENSION ARTÉRIELLE DANS :																																																								
1	NORMALE	24 MOIS																																																								
2	À LA LIMITE SUPÉRIEURE DU SEUIL NORMAL	12 MOIS																																																								
3	AU-DESSUS DU SEUIL NORMAL	2 MOIS																																																								
4	MODÉRÉMENT ÉLEVÉE	1 MOIS																																																								
5	TRÈS ÉLEVÉE	7 JOURS																																																								
6	EXTRÊMEMENT ÉLEVÉE	AUJOURD'HUI																																																								

SECTION 15. VIOLENCE DOMESTIQUE

No.	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSEZ À
1505	A. Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre (dernier) (mari/partenaire) vous ait fait l'une des choses suivantes :	B. Combien de fois cela est-il arrivé au cours des 12 derniers mois : souvent, de temps en temps ou pas du tout ?	
		DÉJÀ ARRIVÉ	TEMPS EN PAS DANS 12 TEMPS DERNIERS MOIS
		SOUVENT	
	a) vous bouscule, secoue ou vous jette quelque chose ?	OUI 1 NON 2	→ 1 2 3
	b) vous gifle ?	OUI 1 NON 2	→ 1 2 3
	c) vous torde le bras ou vous tire les cheveux ?	OUI 1 NON 2	→ 1 2 3
	d) vous frappe à coups de poings ou avec quelque chose qui pouvait vous blesser ?	OUI 1 NON 2	→ 1 2 3
	e) vous donne des coups de pieds, vous traîne par terre ou vous batte ?	OUI 1 NON 2	→ 1 2 3
	f) essaye de vous étrangler ou de vous brûler avec l'intention de le faire ?	OUI 1 NON 2	→ 1 2 3
	g) vous menace ou vous attaque avec un couteau, un fusil ou une autre arme ?	OUI 1 NON 2	→ 1 2 3
	h) vous force physiquement à avoir des rapports sexuels avec lui quand vous ne le vouliez pas ?	OUI 1 NON 2	→ 1 2 3
	i) vous force physiquement à pratiquer d'autres actes sexuels que vous ne vouliez pas ?	OUI 1 NON 2	→ 1 2 3
	j) vous force en vous menaçant ou d'une autre manière à pratiquer des actes sexuels que vous ne vouliez pas ?	OUI 1 NON 2	→ 1 2 3
1506	VÉRIFIEZ 1505A (a-j): AU MOINS UN <input type="checkbox"/> 'OUI' ↓	PAS UN SEUL <input type="checkbox"/> 'OUI' →	1509
1507	Combien de temps (après votre mariage/après avoir commencé à vivre) avec (dernier) (mari/partenaire), cet acte s'est-il produit ou ces actes se sont-ils produits pour la première fois ? SI MOINS D'UNE ANNÉE, INSCRIVEZ '00'.	NOMBRE D'ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/> AVANT MARIAGE/AVANT VIVRE ENSEMBLE 95	
1508	Est-ce qu'à la suite d'actes commis envers vous par votre (dernier) (mari/partenaire), il vous est arrivé d'avoir :		
	a) des coupures, des hématomes ou des douleurs ?	OUI 1 NON 2	
	b) des hématomes aux yeux, des entorses, des luxations ou des brûlures ?	OUI 1 NON 2	
	c) des blessures profondes, des os cassés, des dents cassées ou d'autres blessures graves ?	OUI 1 NON 2	

SECTION 15. VIOLENCE DOMESTIQUE

No.	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSEZ À
1509	Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de battre, de gifler, de donner des coups de pied ou de faire quelque chose d'autre avec l'intention de blesser physiquement votre (dernier) (mari/partenaire) alors qu'il ne vous battait pas et ne vous faisait pas de mal physiquement ?	OUI 1 NON 2	→ 1511
1510	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois vous est-il arrivé de faire cela à votre (dernier) (mari/partenaire) : souvent, de temps en temps ou pas du tout ?	SOUVENT 1 DE TEMPS EN TEMPS 2 PAS DU TOUT 3	
1511	Est-ce que votre (dernier) (mari/partenaire) boit (buvait) de l'alcool ?	OUI 1 NON 2	→ 1513
1512	Combien de fois lui arrive-t-il (lui est-il arrivé) d'être ivre : souvent, de temps en temps ou jamais ?	SOUVENT 1 DE TEMPS EN TEMPS 2 JAMAIS 3	
1513	Vous est-il arrivé d'avoir peur (d'avoir eu peur) de votre (dernier) (mari/partenaire) : de nombreuses fois, parfois ou jamais ?	DE NOMBREUSES FOIS 1 PARFOIS PEUR 2 JAMAIS PEUR 3	
1514	VÉRIFIEZ 709: MARIÉE PLUS <input type="checkbox"/> D'UNE FOIS ↓ MARIÉE SEULEMENT <input type="checkbox"/> UNE FOIS		→ 1516
1515	A. Jusqu'ici, nous avons parlé du comportement de votre (actuel/dernier) (mari/partenaire). Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur le comportement de votre ou d'un de vos (mari(s)/partenaire(s)) précédent(s) . a) Est-ce qu'il est arrivé qu'un (mari/partenaire) précédent vous batte, vous gifle, vous donne des coups de pieds ou vous fasse quelque chose pour vous blesser physiquement ? b) Est-ce qu'il est arrivé qu'un (mari/partenaire) précédent vous force physiquement à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer des actes sexuels contre votre volonté ? c) Est-ce qu'il est arrivé qu'un (mari/partenaire) précédent vous humilie devant d'autres personnes, menace de vous faire du mal, vous ou quelqu'un qui vous est proche, vous insulte ou vous rabaisse ?	B. Il y a combien de temps que cela s'est produit ? DÉJÀ ARRIVÉ IL Y A 0-11 MOIS IL Y A 12 MOIS OU PLUS NE SE PAS SOUVIENT PAS	
		OUI 1 NON 2 ↓	→ 1 2 3
		OUI 1 NON 2 ↓	→ 1 2 3
		OUI 1 NON 2 ↓	→ 1 2 3
1516	VÉRIFIEZ 701 ET 702: A DÉJÀ ÉTÉ MARIÉE/ A DÉJÀ VÉCU AVEC <input type="checkbox"/> UN HOMME ↓ a) Depuis l'âge de 15 ans, est-ce que quelqu'un d'autre que (votre/un) (mari/partenaire) vous a battu, giflé, donné des coups de pieds ou fait quelque chose pour vous faire mal physiquement ? b) JAMAIS MARIÉE/ JAMAIS VÉCU AVEC <input type="checkbox"/> UN HOMME ↓ c) Depuis l'âge de 15 ans, est-ce que quelqu'un vous a battu, giflé ou donné des coups de pieds ou fait quelque chose d'autre pour vous faire mal physiquement ?	OUI 1 NON 2 A REFUSÉ DE RÉPONDRE/ PAS DE RÉPONSE 3	→ 1519

SECTION 15. VIOLENCE DOMESTIQUE

No.	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSEZ À
1517	Qui vous a agressé de cette façon ? Quelqu'un d'autre ? ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	MÈRE/ FEMME DU PÈRE A PÈRE/ MARI DE LA MÈRE B SOEUR/FRÈRE C FILLE/FILS D AUTRE PARENT E PETIT AMI ACTUEL F PETIT AMI PRÉCÉDEN G BELLE-MÈRE H BEAU-PÈRE I AUTRE BEAU-PARENT J ENSEIGNANT K EMPLOYEUR/QUELQU'UN AU TRAVAIL L POLICE/SOLDAT M AUTRE _____ X (PRÉCISEZ)	
1518	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-il arrivé que (cette personne/ces personnes) vous agresse (vous agressent) physiquement : souvent, de temps en temps ou pas du tout ?	SOUVENT 1 DE TEMPS EN TEMPS 2 PAS DU TOUT 3	
1519	VÉRIFIEZ 201, 226 ET 230: A DÉJÀ ÉTÉ ENCEINTE <input type="checkbox"/> (OUI À 201 OU 226 OU 230) ↓	N'A JAMAIS ÉTÉ ENCEINTE <input type="checkbox"/>	→ 1522
1520	Est-ce qu'il est arrivé que quelqu'un vous batte, vous gifle, vous donne des coups de pieds ou vous fasse quelque chose d'autre pour vous faire mal physiquement alors que vous étiez enceinte ?	OUI 1 NON 2	→ 1522
1521	Qui a agi ainsi pour vous faire mal physiquement pendant que vous étiez enceinte ? Quelqu'un d'autre ? ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	MARI/PARTENAIRE ACTUEL A MÈRE/ FEMME DU PÈRE B PÈRE/ MARI DE LA MÈRE C SOEUR/FRÈRE D FILLE/FILS E AUTRE PARENT F ANCIEN MARI/PARTENAIRE G PETIT AMI ACTUEL H ANCIEN PETIT AMI I BELLE-MÈRE J BEAU-PÈRE K AUTRE BEAU-PARENT L ENSEIGNANT M EMPLOYEUR/QUELQU'UN AU TRAVAIL N POLICE/SOLDAT O AUTRE _____ X (PRÉCISEZ)	
1522	VÉRIFIEZ 701 ET 702: A DÉJÀ ÉTÉ MARIÉE/A DÉJÀ VÉCU AVEC UN HOMME <input type="checkbox"/> ↓	JAMAIS MARIÉE/JAMAIS VÉCU AVEC UN HOMME <input type="checkbox"/>	→ 1522B
1522A	Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur des choses qui ont pu vous être faites par quelqu'un d'autre que (votre/un) (mari/partenaire). À n'importe quel moment dans votre vie, quand vous étiez enfant ou adulte, est-ce que quelqu'un vous a forcé à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer d'autres actes sexuels contre votre volonté ?	OUI 1 NON 2 A REFUSÉ DE RÉPONDRE/ PAS DE RÉPONSE 3	→ 1523 → 1524A

SECTION 15. VIOLENCE DOMESTIQUE

No.	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSEZ À
1522B	À n'importe quel moment dans votre vie, quand vous étiez enfant ou adulte, est-ce que quelqu'un vous a forcé à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer d'autres actes sexuels contre votre volonté ?	OUI 1 NON 2 A REFUSÉ DE RÉPONDRE/ PAS DE RÉPONSE 3	→ 1526
1523	Quelle est la personne qui vous a forcé la première fois que cela est arrivé?	MARI/PARTENAIRE ACTUEL 01 ANCIEN MARI/PARTENAIRE 02 PETIT AMI ACTUEL/ANCIEN 03 PÈRE/BEAU-PÈRE 04 FRÈRE/BEAU-FRÈRE 05 AUTRE PARENT 06 BEAU-PARENT 07 AMI/RENCONTRE 08 AMI DE LA FAMILLE 09 ENSEIGNANT 10 EMPLOYEUR/QUELQU'UN AU TRAVAIL 11 POLICE/SOLDAT 12 PRÊTRE/RELIGIEUX 13 INCONNU 14 AUTRE _____ 96 (PRECISEZ)	
1524	VÉRIFIEZ 701 ET 702: A DÉJÀ ÉTÉ MARIÉE/ A DÉJÀ VÉCU AVEC <input type="checkbox"/> UN HOMME ↓ a) Au cours des 12 derniers mois, est-ce que quelqu'un, autre que (votre/un) (mari/partenaire) vous a forcé physiquement à avoir des rapports sexuels contre votre volonté ? JAMAIS MARIÉE/ JAMAIS VÉCU AVEC <input type="checkbox"/> UN HOMME ↓ b) Au cours des 12 derniers mois, est-ce que quelqu'un vous a forcé physiquement à avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?	OUI 1 NON 2	→ 1525
1524A	VÉRIFIEZ 1505A (h-j) et 1515A(b): AU MOINS UN <input type="checkbox"/> 'OUI' ↓ PAS UN SEUL <input type="checkbox"/> 'OUI' →		→ 1526
1525	VÉRIFIEZ 701 ET 702: A DÉJÀ ÉTÉ MARIÉE/ A DÉJÀ VÉCU AVEC <input type="checkbox"/> UN HOMME ↓ a) Quel âge aviez-vous la première fois que quelqu'un, y compris (votre/un de vos) mari/partenaire, vous a forcé à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer d'autres actes sexuels contre votre volonté ? JAMAIS MARIÉE/ JAMAIS VÉCU AVEC <input type="checkbox"/> UN HOMME ↓ b) Quel âge aviez-vous la première fois que l'on vous a forcé à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer d'autres actes sexuels contre votre volonté ?	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98	

SECTION 15. VIOLENCE DOMESTIQUE

No.	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSEZ À																
1526	VÉRIFIEZ 1505A (a-j), 1515A (a,b), 1516, 1520, 1522A ET 1522B: AU MOINS UN <input type="checkbox"/> 'OUI' ↓	PAS UN SEUL <input type="checkbox"/> 'OUI'	→ 1530																
1527	Pensez à ce qui vous est arrivé parmi les choses dont nous venons de parler. Vous est-il arrivé de rechercher de l'aide ?	OUI 1 NON 2	→ 1529																
1528	Après de qui avez-vous recherché de l'aide ? Personne d'autre ? ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	PROPRE FAMILLE A FAMILLE DU MARI/PARTENAIRE B MARI/PARTENAIRE ACTUEL/ANCIEN C PETIT AMI ACTUEL /ANCIEN D AMI E VOISIN F RELIGIEUX G MÉDECIN/PERSONNEL SANTÉ H POLICE I HOMME DE LOI J SERVICE SOCIAL K ONG L AUTRE X (PRÉCISEZ)	→ 1530																
1529	Avez-vous parlé de cela à quelqu'un ?	OUI 1 NON 2																	
1530	Pour autant que vous le sachiez, est-ce que votre père battait votre mère ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8																	
REMERCIEZ L'ENQUÊTÉE DE SA COOPÉRATION ET RÉAFFIRMEZ-LUI QUE SES RÉPONSES RESTERONT CONFIDENTIELLES. COMPLÉTEZ LES QUESTIONS CI-DESSOUS CONCERNANT LE MODULE SUR LA VIOLENCE DOMESTIQUE SEULEMENT.																			
1531	AVEZ-VOUS DÛ INTERROMPRE L'INTERVIEW PARCE QU'UN ADULTE A ESSAYÉ D'ÉCOUTER, EST VENU DANS LA PIÈCE OU A ESSAYÉ D'INTERVENIR D'UNE AUTRE MANIÈRE ?	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>OUI 1 FOIS</th> <th>OUI, PLUS D'UNE FOIS</th> <th>NON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MARI</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>AUTRE HOMME ADULTE</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>FEMME ADULTE</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		OUI 1 FOIS	OUI, PLUS D'UNE FOIS	NON	MARI	1	2	3	AUTRE HOMME ADULTE	1	2	3	FEMME ADULTE	1	2	3	
	OUI 1 FOIS	OUI, PLUS D'UNE FOIS	NON																
MARI	1	2	3																
AUTRE HOMME ADULTE	1	2	3																
FEMME ADULTE	1	2	3																
1532	COMMENTAIRES DE L'ENQUÊTRICE / SI L'ENQUÊTE SUR LA VIOLENCE DOMESTIQUE N'A PU ÊTRE MENÉE, DONNEZ LES RAISONS. _____ _____																		
1533	ENREGISTREZ L'HEURE.	HEURES MINUTES	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>																

OBSERVATIONS DE L'ENQUÊTRICE
À REMPLIR UNE FOIS L'INTERVIEW TERMINÉE

COMMENTAIRES SUR L'INTERVIEW :

COMMENTAIRES SUR DES QUESTIONS PARTICULIÈRES :

AUTRES COMMENTAIRES :

OBSERVATION DU CHEF D'ÉQUIPE

OBSERVATION DE LA CONTRÔLEUSE

INSTRUCTIONS:

UN SEUL CODE DOIT FIGURER DANS CHAQUE CASE.
UN CODE DOIT ÊTRE INSCRIT À CHAQUE MOIS À LA COLONNE 1.

CODES À UTILISER POUR CHAQUE COLONNE

COLONNE 1: NAISSANCES, GROSSESSES, UTILIS. CONTRACEP. (2)

N NAISSANCES
G GROSSESSES
F FIN DE GROSSESSE

0 AUCUNE MÉTHODE

1 STÉRILISATION FÉMININE
2 STÉRILISATION MASCULINE
3 DIU
4 INJECTABLES
5 IMPLANTS
6 PILULE
7 CONDOM
8 CONDOM FÉMININ
9 PILULE DU LENDEMAIN
J MÉTHODE DES JOURS FIXES
K MÉTHODE DE L'AMÉNORRHÉE ET DE L'ALLAITEMENT MATERNEL
L MÉTHODE DU RYTHME

M RETRAIT
X AUTRE MÉTHODE MODERNE
Y AUTRE MÉTHODE TRADITIONNELLE

COLONNE 2: DISCONTINUATION DE L'UTILISATION CONTRACEPTIVE

0 RAPPORTS SEX. PEU FRÉQUENTS/MARI ABSENT
1 TOMBÉE ENCEINTE ALORS QU'ELLE UTILISAIT
2 SOUHAITAIT TOMBER ENCEINTE
3 MARI/PARTENAIRE DÉSAPPROUVE
4 VOULAIT MÉTHODE PLUS EFFICACE
5 PEUR DES EFFETS SECONDAIRES
6 MANQUE D'ACCESSIBILITÉ/TROP ÉLOIGNÉ
7 COÛTE TROP CHER
8 PAS PRATIQUE À UTILISER
F FATALISTE
A DIFFICULTÉS POUR TOMBER ENCEINTE/MÉNOPAUSE
D DISSOLUTION DU MARIAGE/SÉPARATION
X AUTRE

(PRÉCISEZ)

Z NE SAIT PAS

			COL. 1	COL. 2
	12	DEC	01	
	11	NOV	02	
	10	OCT	03	
2	09	SEP	04	
	08	AOUT	05	2
0	07	JUL	06	
	06	JUIN	07	0
1	05	MAI	08	
	04	AVRIL	09	1
7	03	MARS	10	
	02	FEVRIER	11	7
(1)	01	JAN	12	
<hr/>				
	12	DEC	13	
	11	NOV	14	
	10	OCT	15	
2	09	SEP	16	
	08	AOUT	17	2
0	07	JUL	18	
	06	JUIN	19	0
1	05	MAI	20	
	04	AVRIL	21	1
6	03	MARS	22	
	02	FEVRIER	23	6
	01	JAN	24	
<hr/>				
	12	DEC	25	
	11	NOV	26	
	10	OCT	27	
2	09	SEP	28	
	08	AOUT	29	2
0	07	JUL	30	
	06	JUIN	31	0
1	05	MAI	32	
	04	AVRIL	33	1
5	03	MARS	34	
	02	FEVRIER	35	5
	01	JAN	36	
<hr/>				
	12	DEC	37	
	11	NOV	38	
	10	OCT	39	
2	09	SEP	40	
	08	AOUT	41	2
0	07	JUL	42	
	06	JUIN	43	0
1	05	MAI	44	
	04	AVRIL	45	1
4	03	MARS	46	
	02	FEVRIER	47	4
	01	JAN	48	
<hr/>				
	12	DEC	49	
	11	NOV	50	
	10	OCT	51	
2	09	SEP	52	
	08	AOUT	53	2
0	07	JUL	54	
	06	JUIN	55	0
1	05	MAI	56	
	04	AVRIL	57	1
3	03	MARS	58	
	02	FEVRIER	59	3
	01	JAN	60	
<hr/>				
	12	DEC	61	
	11	NOV	62	
	10	OCT	63	
2	09	SEP	64	
	08	AOUT	65	2
0	07	JUL	66	
	06	JUIN	67	0
1	05	MAI	68	
	04	AVRIL	69	1
2	03	MARS	70	
	02	FEVRIER	71	2
	01	JAN	72	

(1) On suppose que l'année de la collecte est 2017. Pour la collecte commençant en 2018, toutes les références aux années de calendrier doivent être augmentées d'une année ; par exemple, 2011 doit être changé en 2012, 2012 doit être changé en 2013, 2013 doit être changé en 2014, et ainsi de suite pour toutes les années dans tout le questionnaire.

(2) Des codes peuvent être ajoutés pour d'autres méthodes, comme celles basées sur la connaissance de la fécondité.

ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ (EDSB-V 2017)
QUESTIONNAIRE HOMME

RÉPUBLIQUE DU BENIN
MINISTÈRE DU PLAN ET DU DÉVELOPPEMENT

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ET DE L'ANALYSE ÉCONOMIQUE (INSAE)

IDENTIFICATION				
DÉPARTEMENT _____				
COMMUNE _____				
URBAIN/RURAL (URBAIN=1, RURAL=2)				
NOM DU CHEF DE MÉNAGE _____				
NUMÉRO DE GRAPPE				
NUMÉRO DU MÉNAGE				
NOM ET NUMÉRO DE LIGNE DE L'HOMME _____				
MÉNAGE SÉLECTIONNÉ POUR L'ENQUÊTE HOMME ? (1=OUI, 2=NON)				
VISITES D'ENQUÊTEURS				
	1	2	3	VISITE FINALE
DATE	_____	_____	_____	JOUR _____
				MOIS _____
NOM DE L'ENQUÊTEUR	_____	_____	_____	ANNÉE No ENQUÊT
RÉSULTAT*	_____	_____	_____	RÉSULTAT*
PROCHAINE DATE VISITE	_____	_____	_____	NOMBRE TOTAL DE VISITES
	_____	_____	_____	_____
*CODES RÉSULTAT : 1 COMPLÉTÉ 4 REFUSÉ				
2 PAS À LA MAISON 5 PARTIELLEMENT COMPLÉTÉ 7 AUTRE _____				
3 DIFFÉRÉ 6 INCAPACITÉ (PRÉCISEZ)				
LANGUE DU QUESTIONNAIRE**	0 1	LANGUE DE L'INTERVIEW**	_____	LANGUE MATERNELLE DE L'ENQUÊTÉ**
			_____	TRADUCTEUR (OUI = 1, NON = 2)
LANGUE DU QUESTIONNAIRE**	FRANÇAIS		**CODES LANGUES :	
			01 FRANÇAIS	03 Bariba 05 Dendi 07 Yoruba
			02 Adja	04 Fon 06 Ditamari 08 Autres
SUPERVISEUR		ÉDITEUR		
_____	_____	_____	_____	_____
NOM	NUMÉRO	NOM	NUMÉRO	

PRÉSENTATION ET DEMANDE DE CONSENTEMENT

Bonjour. Je m'appelle _____ . Je travaille avec l'INSTITUT NATIONAL de la STATISTIQUE et de L'ANALYSE ECONOMIQUE (INSAE). Effectuons une enquête nationale sur la santé et sur d'autres sujets au Benin. Les informations que nous collectons aideront votre gouvernement à améliorer les services de santé. Votre ménage a été sélectionné pour cette enquête. Les questions prennent habituellement environ 20 et 30 minutes. Toutes les informations que vous nous donnerez sont strictement confidentielles et elles ne seront transmises à personne d'autre que les membres de l'équipe d'enquête. Vous n'êtes pas obligé de participer à cette enquête mais nous espérons que vous accepterez de répondre à nos questions car votre opinion est très importante. S'il arrivait que je pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, dites-le moi et je passerai à la question suivante ; vous pouvez également interrompre l'interview à n'importe quel moment.

Si vous souhaitez plus d'informations sur l'enquête, vous pouvez contacter la personne dont le nom figure sur la carte qui a déjà été donnée à votre ménage.

Avez-vous des questions à me poser ?

SIGNATURE DE L'ENQUÊTEUR _____ DATE _____

L'ENQUÊTÉ ACCEPTE
D'ÊTRE INTERVIEWÉ ... 1

L'ENQUÊTÉ REFUSE
D'ÊTRE INTERVIEWÉ ... 2 → FIN

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTÉ

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
101	INSCRIVEZ L'HEURE.	HEURES <input type="text"/> <input type="text"/> MINUTES <input type="text"/> <input type="text"/>	
102	Depuis combien de temps vivez-vous de manière continue à (NOM DE LA VILLE, PETITE VILLE OU VILLAGE ACTUEL DE RÉSIDENCE) ? SI MOINS D'UNE ANNÉE, INSCRIVEZ '00' ANNÉE.	ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/> TOUJOURS 95 VISITEUR 96	→ 105
103	Juste avant d'habiter ici, est-ce que vous viviez dans une ville à statut particulier, une autre ville ou dans une ville secondaire ?	VILLE À STATUT PARTICULIER 1 AUTRE VILLE 2 VILLE SECONDAIRE 3 EN DEHORS DU BÉNIN 4	
104	Juste avant d'habiter ici, dans quel département est-ce que vous viviez ?	ALIBORI 01 ATACORA 02 ATLANTIQUE 03 BORGOU 04 COLLINES 05 COUFFO 06 DONGA 07 LITTORAL 08 MONO 09 OUÉMÉ 10 PLATEAU 11 ZOU 12 EN DEHORS DU BENIN 96	
105	En quel mois et en quelle année êtes-vous né ?	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> NE CONNAIT PAS LE MOIS 98 ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NE CONNAIT PAS L'ANNÉE 9998	
106	Quel âge aviez-vous à votre dernier anniversaire ? COMPAREZ ET CORRIGEZ 105 ET/OU 106 SI INCOHÉRENT.	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES <input type="text"/> <input type="text"/>	
106B	VÉRIFIEZ 106: <input type="checkbox"/>	15-29 ANS 1 30-64 ANS 2	→ 107


SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTÉ

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À												
106C	<p>Au cours de l'interview, je voudrais mesurer votre tension artérielle. Je le ferai trois fois au cours de l'interview. C'est une procédure qui ne comporte aucun danger. On l'effectue pour savoir si une personne a une pression artérielle élevée. Si elle n'est pas traitée, une pression élevée peut endommager sérieusement le coeur. Je vous donnerai les résultats de la mesure de la pression artérielle après l'interview en vous expliquant ce que signifient les chiffres de votre tension artérielle. Si votre tension artérielle est élevée, nous vous conseillerons de consulter dans un établissement de santé ou de voir un médecin car nous ne pouvons pas effectuer d'autre contrôle ou fournir un traitement au cours de l'enquête.</p> <p>Avez-vous des questions à me poser sur les mesures de la tension artérielle ?</p>	<p>OUI, ENQUÊTÉ ACCEPTE 1 NON, ENQUÊTÉ N'ACCEPTE PAS 2</p>	→ 107												
	<p>_____</p> <p>SIGNATURE ENQUÊTEUR DATE</p>														
106D	<p>Avant de commencer à mesurer votre tension artérielle, je voudrais vous poser quelques questions sur des choses qui peuvent affecter ces mesures. Avez-vous fait l'une des choses suivantes dans les 30 dernières minutes :</p>	<p>OUI NON</p> <p>a) MANGÉ 1 2 b) CAFÉINE 1 2 c) FUMÉ 1 2 d) PHYSIQUE 1 2</p>													
106E	REGARDEZ LE BRAS DE L'ENQUÊTÉ ET PRENEZ LE BRASSARD APPROPRIÉ POUR PRENDRE LA TENSION														
106F	<p>LISEZ LES MESURES DE LA PRESSION ARTÉRIELLE .</p> <p>ENREGISTREZ LA PRESSION SYSTOLIQUE ET LA PRESSION DIASTOLIQUE.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ PAS MESURER LA PRESSION ARTÉRIELLE DE L'ENQUÊTÉ, ENREGISTREZ LA RAISON.</p>	<p>SYSTOLIQUE <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table></p> <p>DIASTOLIQUE <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table></p> <p>REFUSÉ 994 PROBLÈMES TECHNIQUES 995 AUTRE 996</p>													
107	Êtes-vous allé à l'école ?	<p>OUI 1 NON 2</p>	→ 111												
108	Quel est le plus haut niveau d'études que vous avez atteint : primaire, secondaire 1er cycle, secondaire 2nd cycle ou supérieur ?	<p>PRIMAIRE 1 SECONDAIRE 1^{er} CYCLE 2 SECONDAIRE 2nd CYCLE 3 SUPÉRIEUR 4</p>													

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTÉ

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
109	Quelle est LA CLASSE la plus élevée que vous avez atteint à ce niveau ? SI MOINS D'UNE ANNÉE A ÉTÉ ACHEVÉE À CE NIVEAU, INSCRIVEZ '00'.	CLASSE <input type="text"/> <input type="text"/>	
110	VÉRIFIEZ 108: PRIMAIRE OU <input type="checkbox"/> SECONDAIRE (1er ou 2eme CYCLE) ↓ SUPÉRIEUR <input type="checkbox"/> →		113
111	Je voudrais maintenant que vous me lisiez cette phrase. MONTREZ LA CARTE À L'ENQUÊTÉ. SI L'ENQUÊTÉ NE PEUT LIRE TOUTE LA PHRASE, INSISTEZ : Pouvez-vous lire une partie de la phrase ?	NE PEUT PAS LIRE DU TOUT 1 PEUT LIRE SEULEMENT UNE PARTIE DE LA PHRASE 2 PEUT LIRE TOUTE LA PHRASE 3 PAS DE CARTE DANS LA LANGUE DE L'ENQUÊTÉ 4 (PRÉCISEZ LA LANGUE) AVEUGLE/PROBLÈMES DE VUE 5	
112	VÉRIFIEZ 111: CODE '2', '3' OU '4' ↓ ENCERCLÉ CODE '1' OU '5' ENCERCLÉ →		114
113	Lisez-vous un journal ou un magazine au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?	AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE 1 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE 2 PAS DU TOUT 3	
114	Écoutez-vous la radio au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?	AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE 1 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE 2 PAS DU TOUT 3	
115	Regardez-vous la télévision au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?	AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE 1 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE 2 PAS DU TOUT 3	
116	Est-ce que vous possédez un téléphone portable ?	OUI 1 NON 2	→ 118
117	Est-ce que vous utilisez votre téléphone portable pour faire des opérations financières ?	OUI 1 NON 2	
118	Avez-vous un compte dans une banque ou dans une autre institution financière que vous pouvez utiliser vous-même ?	OUI 1 NON 2	
119	Avez-vous déjà utilisé internet ?	OUI 1 NON 2	→ 122
120	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé internet ? SI NÉCESSAIRE, INSISTEZ POUR L'UTILISATION DE N'IMPORTE QUEL ENDROIT AVEC N'IMPORTE QUEL APPAREIL	OUI 1 NON 2	→ 122
121	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous utilisé internet: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?	PRESQUE CHAQUE JOUR 1 AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE 2 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE 3 PAS DU TOUT 4	

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTÉ

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À												
122	Quelle religion pratiquez-vous ?	VODOUN 1 AUTRES TRADITIONNELLES 2 ISLAM 3 CATHOLIQUE 4 PROTESTANT METHODISTE 5 AUTRES PROTESTANTS 6 CELESTES 7 AUTRES CHRETIENS 8 AUTRES RELIGIONS 9 AUCUNE 10													
123	Quelle est votre ethnie ?	ADJA ET APPARENTÉS 1 BARIBA ET APPARENTÉS 2 DENDI ET APPARENTÉS 3 FON ET APPARENTÉES 4 YOA ET LOKPA ET APPARENTÉS 5 BETAMARIBE ET APPARENTÉS 6 PEULH ET APPARENTÉS 7 YORUBA ET APPARENTÉS 8 AUTRE BÉNINOIS 96 (PRÉCISER) AUTRE NATIONALITÉS 97 (PRÉCISER)													
123B	VÉRIFIEZ 106: 	15-29 ANS 1 30-64 ANS 2	→ 201												
123C	Est-ce que je peux commencer maintenant à mesurer votre tension artérielle ? SIGNATURE ENQUÊTEUR _____ DATE _____	OUI, ENQUÊTÉ ACCEPTE 1 NON, ENQUÊTÉ N'ACCEPTE PAS 2	→ 201												
123D	PRENEZ LES MESURES DE LA TENSION ARTÉRIELLE. ENREGISTREZ LA PRESSION SYSTOLIQUE ET LA PRESSION DIASTOLIQUE. SI VOUS NE POUVEZ PAS MESURER LA PRESSION ARTÉRIELLE DE L'ENQUÊTÉ, ENREGISTREZ LA RAISON.	SYSTOLIQUE <table border="1" data-bbox="1129 1032 1334 1144"><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> DIASTOLIQUE <table border="1" data-bbox="1129 1084 1334 1144"><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> REFUSÉ 994 PROBLÈMES TECHNIQUES 995 AUTRE 996													

CODES POUR Qs. 108 ET 109: NIVEAU D'INSTRUCTION / CLASSE

NIVEAU ATTEINT	1 = PRIMAIRE	2 = SECONDAIRE 1 ^{ER} CYCLE	3 = SECONDAIRE 2 ND CYCLE	4 = SUPÉRIEUR
	< D'1 ANNÉE A-CHEVÉE EN CI = 0	< D'1 ANNÉE ACHEVÉE EN 6 ^{ÈME} = 0	< D'1 ANNÉE ACHEVÉE EN 2 ^{NDE} = 0	< D'1 ANNÉE ACHEVÉE EN 1 ^{ÈRE} AN. = 0
CLASSE	CI = 1	6 ^{ÈME} = 1	2 ^{NDE} = 1	1 ^{ÈRE} ANNÉE = 1
ACHEVÉE	CP = 2	5 ^{ÈME} = 2	1 ^{ÈRE} = 2	2 ^{ÈME} ANNÉE = 2
AVEC SUCCÈS	CE1 = 3	4 ^{ÈME} = 3	TERMINALE = 3	3 ^{ÈME} ANNÉE = 3
	CE2 = 4	3 ^{ÈME} = 4		4 ^{ÈME} AN. OU + = 4
	CM1 = 5			
	CM2 = 6			
	NSP = 8	NSP = 8	NSP = 8	NSP = 8

SECTION 2. REPRODUCTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
201	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur tous les enfants que vous avez eus durant votre vie. Je m'intéresse à tous vos enfants biologiques, même s'ils ne sont pas légalement les vôtres ou s'ils ne portent pas votre nom. Avez-vous ou avez-vous eu des enfants que vous avez engendrés ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 206
202	Avez-vous des fils ou des filles dont vous êtes le père et qui vivent actuellement avec vous ?	OUI 1 NON 2	→ 204
203	a) Combien de fils vivent avec vous ? b) Et combien de filles vivent avec vous ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'.	a) FILS À LA MAISON <input type="text"/> <input type="text"/> b) FILLES À LA MAISON <input type="text"/> <input type="text"/>	
204	Avez-vous des fils ou filles dont vous êtes le père qui sont toujours en vie mais qui ne vivent pas avec vous ?	OUI 1 NON 2	→ 206
205	a) Combien de fils sont vivants mais qui ne vivent pas avec vous ? b) Combien de filles sont vivantes mais qui ne vivent pas avec vous ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'.	a) FILS AILLEURS <input type="text"/> <input type="text"/> b) FILLES AILLEURS <input type="text"/> <input type="text"/>	
206	Avez-vous eu une fille ou un garçon qui est né vivant mais qui est décédé par la suite ? SI NON INSISTEZ : Aucun bébé qui a crié ou fait un mouvement, qui a émis un son ou essayé de respirer ou qui a montré d'autres signes de vie pendant un très court moment ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 208
207	a) Combien de garçons sont décédés ? b) Combien de filles sont décédées ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'.	a) GARÇONS DÉCÉDÉS <input type="text"/> <input type="text"/> b) FILLES DÉCÉDÉES <input type="text"/> <input type="text"/>	
208	FAITES LA SOMME DES RÉPONSES À 203, 205, ET 207, ET INSCRIVEZ LE TOTAL. SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'.	TOTAL DES ENFANTS <input type="text"/> <input type="text"/>	
209	VÉRIFIEZ 208: A EU PLUS D'UN ENFANT <input type="checkbox"/> A EU SEULEMENT UN ENFANT <input type="checkbox"/> N'A EU AUCUN ENFANT <input type="checkbox"/>		→ 211 → 301
210	Est-ce que tous les enfants dont vous êtes le père ont tous la même mère biologique ?	OUI 1 NON 2	
211	VÉRIFIEZ 208: a) Quel âge aviez-vous quand votre premier enfant est né ? b) Quel âge aviez-vous quand votre enfant est né ?	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/>	
212	VÉRIFIEZ 203 ET 205: AU MOINS UN ENFANT VIVANT <input type="checkbox"/> AUCUN ENFANT VIVANT <input type="checkbox"/>		→ 301

SECTION 2. REPRODUCTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
213	<p>VÉRIFIEZ 203 ET 205:</p> <p>PLUS D'UN ENFANT VIVANT <input type="checkbox"/></p> <p>a) Quel âge a votre plus jeune enfant ?</p> <p>SEULEMENT UN ENFANT VIVANT <input type="checkbox"/></p> <p>b) Quel âge a votre enfant ?</p>	<p>ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/></p>	
214	<p>VÉRIFIEZ 213:</p> <p>(LE PLUS JEUNE) ENFANT A 0-2 ANS <input type="checkbox"/></p> <p>(LE PLUS JEUNE) ENFANT A 3 ANS OU PLUS <input type="checkbox"/></p>	<p>→ 301</p>	
215	<p>VÉRIFIEZ 203 ET 205:</p> <p>PLUS D'UN ENFANT VIVANT <input type="checkbox"/></p> <p>a) Quel est le nom de votre plus jeune enfant ?</p> <p>SEULEMENT UN ENFANT VIVANT <input type="checkbox"/></p> <p>b) Quel est le nom de votre enfant ?</p>	<p>_____</p> <p>(NOM DE L'ENFANT (LE PLUS JEUNE))</p>	
216	<p>Quand la mère de (NOM) était enceinte de (NOM), a-t-elle eu des examens prénatals ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>	<p>→ 218</p>
217	<p>Est-ce que vous étiez présent pendant l'un de ces examens prénatals ?</p>	<p>PRÉSENT 1</p> <p>PAS PRÉSENT 2</p>	
218	<p>Est-ce que (NOM) est né dans un hôpital ou un établissement de santé ?</p>	<p>HÔPITAL/ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ 1</p> <p>AUTRE 2</p>	
219	<p>Quand un enfant a la diarrhée, quelle quantité de liquides doit-on lui donner à boire : plus que d'habitude, environ la même quantité que d'habitude, moins que d'habitude ou rien à boire du tout ?</p>	<p>PLUS QUE D'HABITUDE 1</p> <p>ENVIRON MÊME QUANTITÉ 2</p> <p>MOINS QUE D'HABITUDE 3</p> <p>RIEN À BOIRE 4</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>	

SECTION 3. CONTRACEPTION

301	Je voudrais maintenant que nous parlions de planification familiale, c'est-à-dire les différents moyens ou méthodes qu'un couple peut utiliser pour retarder ou éviter une grossesse. Avez-vous déjà entendu parler de (MÉTHODE) ?		
01	Stérilisation féminine. INSISTEZ : Les femmes peuvent avoir une opération pour ne plus avoir d'enfants.	OUI 1 NON 2	
02	Stérilisation masculine. INSISTEZ : Les hommes peuvent avoir une opération pour ne plus avoir d'enfants.	OUI 1 NON 2	
03	DIU. INSISTEZ : Les femmes peuvent avoir un stérilet qu'un médecin ou une infirmière leur place dans l'utérus pour leur éviter une grossesse pendant un ou plusieurs mois.	OUI 1 NON 2	
04	Injectables. INSISTEZ : Les femmes peuvent avoir une injection faite par du personnel de santé pour leur éviter une grossesse pendant un mois ou plus.	OUI 1 NON 2	
05	Implants. INSISTEZ : Les femmes peuvent se faire insérer par un médecin ou une infirmière un batonnet ou plus sous la peau du haut du bras pour leur éviter une grossesse, pendant une année ou plus.	OUI 1 NON 2	
06	Pilule. INSISTEZ : Les femmes peuvent prendre une pilule chaque jour pour éviter une grossesse.	OUI 1 NON 2	
07	Condom. INSISTEZ : Les hommes peuvent mettre une capote en caoutchouc sur leur pénis avant les rapports sexuels.	OUI 1 NON 2	
08	Condom féminin. INSISTEZ : Les femmes peuvent placer un fourreau dans leur vagin avant les rapports sexuels.	OUI 1 NON 2	
09	Pilule du lendemain. INSISTEZ : Les femmes peuvent prendre dans les trois jours après des rapports sexuels non protégés des pilules spéciales qui les empêchent de tomber enceintes.	OUI 1 NON 2	

SECTION 3. CONTRACEPTION

10	Méthode des jours fixes. INSISTEZ : Les femmes utilisent un collier de perles de couleur différente pour connaître les jours où elles peuvent tomber enceintes. Durant ces jours où elles peuvent tomber enceintes, elles utilisent un condom ou elles s'abstiennent de rapports sexuels.	OUI 1 NON 2
11	Méthode de l'aménorrhée et de l'allaitement maternel (MAMA). INSISTEZ : Pendant six mois après la naissance d'un enfant, avant que les règles ne soient revenues, les femmes utilisent une méthode qui nécessite d'allaiter fréquemment le jour et la nuit.	OUI 1 NON 2
12	Méthode du rythme. INSISTEZ : Pour éviter une grossesse, les femmes n'ont pas de rapports sexuels les jours où elles pensent qu'elles peuvent tomber enceintes.	OUI 1 NON 2
13	Retrait. INSISTEZ : Les hommes peuvent faire attention et se retirer avant l'éjaculation.	OUI 1 NON 2
14	Avez-vous entendu parler d'autres moyens ou méthodes qu'une femme ou un homme peut utiliser pour éviter une grossesse ?	OUI, MÉTHODE MODERNE _____ A (PRÉCISEZ) OUI, MÉTHODE TRADITIONNELLE _____ B (PRÉCISEZ) NON Y

SECTION 3. CONTRACEPTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES			ALLEZ À
302	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous :		OUI	NON	
	a) Entendu à la radio un message sur la planification familiale ?	a) RADIO	1	2	
	b) Vu à la télévision quelque chose sur la planification familiale ?	b) TÉLÉVISION	1	2	
	c) Lu dans un journal ou un magazine quelque chose sur la planification familiale ?	c) JOURNAL OU MAGAZINE	1	2	
	d) Reçu un message vocal ou un texte sur la planification familiale sur un téléphone portable ?	d) PORTABLE	1	2	
	e) Vu quelque chose sur la planification familiale sur une affiche ?	e) AFFICHE	1	2	
	f) Lu quelque chose sur la planification familiale dans un prospectus/brochure ?	f) PROSPECTUS/BROCHURE	1	2	
	g) Vu quelque chose sur la planification familiale dans une séance d'animation culturelle/éducative ?	g) ANIMATION CULTURELLE	1	2	
	h) Entendu parler de la planification familiale dans les lieux de culte (église/mosquée)?	h) ÉGLISE/MOSQUÉE	1	2	
	i) Entendu parler de la planification familiale à l'école?	i) A L'ÉCOLE	1	2	
303	Au cours des derniers mois, avez-vous parlé de planification familiale avec un agent de santé ou un professionnel de santé ?	OUI	1	2	
		NON	2		
304	Je voudrais maintenant vous parler des risques de tomber enceintes. Entre la période des règles et les règles suivantes, est-ce qu'il y a une période où les femmes ont plus de chances de tomber enceintes ?	OUI	1		→ 306
		NON	2		
		NE SAIT PAS	8		
305	Est-ce que cette période se situe juste avant que les règles ne commencent, pendant la période des règles, juste après que les règles soient terminées ou bien au milieu de deux périodes de règles ?	JUSTE AVANT QUE LES RÉGLES COMMENCENT	1		
		PENDANT LES RÉGLES	2		
		JUSTE APRÈS LA FIN DES RÉGLES	3		
		AU MILIEU, ENTRE DEUX PÉRIODES	4		
		AUTRE _____ (PRÉCISEZ)	6		
		NE SAIT PAS	8		
306	Après la naissance d'un enfant, est-ce qu'une femme peut tomber enceinte avant que ses règles soient revenues ?	OUI	1		
		NON	2		
		NE SAIT PAS	8		
307	Je vais vous lire maintenant certaines déclarations sur la contraception. Dites-moi, s'il vous plaît, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec chacune de ces déclarations ?		PAS D'ACC- D'ACCORD	NSP	
	a) La contraception est un problème de femme et un homme ne doit pas s'en préoccuper.	a) CONTRACEPTION PROBLÈME DE FEMME	1	2	8
	b) Une femme qui utilise la contraception peut devenir une femme légère.	b) FEMME PEUT DEVENIR LÉGÈRE	1	2	8

SECTION 4. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À	
401	Êtes-vous actuellement marié ou vivez-vous avec une femme comme si vous étiez marié ?	OUI, ACTUELLEMENT MARIÉ 1 OUI, VIT AVEC UNE FEMME 2 NON, PAS EN UNION 3	→ 404	
402	Avez-vous déjà été marié ou avez-vous vécu avec une femme comme si vous étiez marié ?	OUI, A ÉTÉ MARIÉ 1 OUI, A VÉCU AVEC UNE FEMME 2 NON 3	→ 413	
403	Quel est votre état matrimonial actuel : êtes-vous veuf, divorcé ou séparé ?	VEUF 1 DIVORCÉ 2 SÉPARÉ 3	→ 410	
404	Est-ce que votre (épouse/partenaire) vit actuellement avec vous ou vit-elle ailleurs ?	VIT AVEC LUI 1 VIT AILLEURS 2		
405	Avez-vous d'autres épouses ou vivez-vous avec d'autres femmes comme si vous étiez marié ?	OUI (PLUS D'UNE ÉPOUSE) 1 NON (SEULEMENT UNE ÉPOUSE) 2	→ 407	
406	En tout, combien d'épouses ou de partenaires avec qui vous vivez comme si vous étiez marié avez-vous ?	NOMBRE TOTAL D'ÉPOUSES ET DE FEMMES AVEC QUI IL VIT COMME MARIÉ	<input type="text"/> <input type="text"/>	
407	<p>VÉRIFIEZ 405:</p> <p>UNE ÉPOUSE/ PARTENAIRE <input type="checkbox"/></p> <p>a) Dites-moi, s'il vous plaît, le nom de (votre épouse/femme avec qui vous vivez comme si vous étiez marié) ?</p> <p>PLUS D'UNE ÉPOUSE/ PARTENAIRE <input type="checkbox"/></p> <p>b) Dites-moi, s'il vous plaît, le nom de chacune de vos épouses ou femmes avec qui vous vivez comme si vous étiez marié) ?</p> <p>INSCRIVEZ LE NOM ET LE NUMÉRO DE LIGNE DU TABLEAU MÉNAGE DE CHACUNE DES ÉPOUSES ET DES FEMMES AVEC QUI IL VIT COMME MARIÉ.</p> <p>SI UNE FEMME N'EST PAS LISTÉE DANS LE MÉNAGE, INSCRIVEZ '00'.</p>	<p>NUMÉRO DE LIGNE</p> <p>NOM</p> <p><input type="text"/><input type="text"/></p> <p><input type="text"/><input type="text"/></p> <p><input type="text"/><input type="text"/></p> <p><input type="text"/><input type="text"/></p> <p><input type="text"/><input type="text"/></p> <p><input type="text"/><input type="text"/></p>	<p>408 (1)</p> <p>Quel âge avait (NOM) à son dernier anniversaire ?</p> <p>ÂGE</p> <p><input type="text"/><input type="text"/></p> <p><input type="text"/><input type="text"/></p> <p><input type="text"/><input type="text"/></p> <p><input type="text"/><input type="text"/></p> <p><input type="text"/><input type="text"/></p>	
408	POSEZ 408 POUR CHAQUE PERSONNE.			
409	<p>VÉRIFIEZ 407:</p> <p>UNE ÉPOUSE/ PARTENAIRE <input type="checkbox"/></p> <p>PLUS D'UNE ÉPOUSE/ PARTENAIRE <input type="checkbox"/></p>		→ 411	
410	Avez-vous été marié ou avez-vous vécu avec une femme une seule fois ou plus d'une fois ?	PLUS D'UNE FOIS 1 UNE SEULE FOIS 2		

SECTION 4. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
411	<p>VÉRIFIEZ 405 ET 410:</p> <p>LES DEUX SONT <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> CODE '2'</p> <p>a) En quel mois et quelle année avez-vous commencé à vivre avec votre (épouse/partenaire) ?</p> <p>b) Je voudrais maintenant vous parler de votre première (épouse/partenaire). En quel mois et quelle année avez-vous commencé à vivre avec elle ?</p>	<p>MOIS <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NE CONNAIT PAS LE MOIS 98</p> <p>ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NE CONNAIT PAS L'ANNÉ 9998</p>	<p>→ 413</p>
412	<p>Quel âge aviez-vous quand vous avez commencé à vivre avec elle pour la première fois ?</p>	<p>ÂGE <input type="text"/> <input type="text"/></p>	
413	<p>VÉRIFIEZ LA PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES. AVANT DE CONTINUER, FAITES TOUT VOTRE POSSIBLE POUR ÊTRE EN PRIVÉ.</p>		
414	<p>Je voudrais maintenant vous poser des questions sur votre activité sexuelle pour mieux comprendre certains aspects importants de la vie. Je voudrais vous assurer de nouveau que toutes vos réponses sont absolument confidentielles et qu'elles ne seront divulguées à personne. S'il arrivait que je pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, dites-le moi et je passerai à la question suivante. Quel âge aviez-vous quand vous avez eu, pour la première fois, des rapports sexuels ?</p>	<p>N'A JAMAIS EU DE RAPPORTS SEXUELS 00</p> <p>ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p>→ 501</p>
415	<p>Je voudrais vous poser des questions sur votre activité sexuelle récente. Quand avez-vous eu des rapports sexuels pour la dernière fois ?</p> <p>SI MOINS DE 12 MOIS, LA RÉPONSE DOIT ÊTRE ENREGISTRÉE EN JOURS, SEMAINES OU MOIS. SI 12 MOIS (UNE ANNÉE) OU PLUS, LA RÉPONSE DOIT ÊTRE ENREGISTRÉE EN ANNÉES.</p>	<p>IL Y A DES JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>IL Y A DES SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>IL Y A DES MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>IL Y A DES ANNÉES 4 <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p>→ 417</p> <p>→ 427</p>

SECTION 4. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

		DERNIÈRE PARTENAIRE SEXUELLE	AVANT-DERNIÈRE PARTENAIRE SEXUELLE	AVANT-AVANT DERNIÈRE PARTENAIRE SEXUELLE
416	Quand avez-vous eu des rapports sexuels avec cette personne pour la dernière fois ?		IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/>	IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/>
417	La dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels avec cette personne, un condom a-t-il été utilisé ?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 419) ←	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 419) ←	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 419) ←
418	Un condom a-t-il été utilisé chaque fois que vous avez eu des rapports sexuels avec cette personne au cours des 12 derniers mois ?	OUI 1 NON 2	OUI 1 NON 2	OUI 1 NON 2
419	Quelle était votre relation avec cette personne avec qui vous avez eu des rapports sexuels ? SI PETITE AMIE : Viviez-vous ensemble comme si vous étiez marié ? SI OUI, ENCERCLEZ '2'. SI NON, ENCERCLEZ '3'.	ÉPOUSE 1 PARTENAIRE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉ .. 2 PETITE AMIE NE VIVANT PAS AVEC L'ENQUÊTÉ 3 RENCONTRE OCCASIONNELLE .. 4 PROSTITUÉE/CLIENT .. 5 AUTRE 6 (PRÉCISEZ)	ÉPOUSE 1 PARTENAIRE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉ .. 2 PETITE AMIE NE VIVANT PAS AVEC L'ENQUÊTÉ 3 RENCONTRE OCCASIONNELLE .. 4 PROSTITUÉE/CLIENT .. 5 AUTRE 6 (PRÉCISEZ)	ÉPOUSE 1 PARTENAIRE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉ .. 2 PETITE AMIE NE VIVANT PAS AVEC L'ENQUÊTÉ 3 RENCONTRE OCCASIONNELLE .. 4 PROSTITUÉE/CLIENT .. 5 AUTRE 6 (PRÉCISEZ)
420	Il y a combien de temps que vous avez eu vos premiers rapports sexuels avec cette personne ?	IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A ANNÉES 4 <input type="text"/> <input type="text"/>	IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A ANNÉES 4 <input type="text"/> <input type="text"/>	IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A ANNÉES 4 <input type="text"/> <input type="text"/>
421	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous eu des rapports sexuels avec cette personne ? DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION. SI LE NOMBRE DE FOIS EST 95 OU PLUS, INSCRIVEZ '95'.	NOMBRE DE FOIS <input type="text"/> <input type="text"/>	NOMBRE DE FOIS <input type="text"/> <input type="text"/>	NOMBRE DE FOIS <input type="text"/> <input type="text"/>

SECTION 4. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

		DERNIÈRE PARTENAIRE SEXUELLE	AVANT-DERNIÈRE PARTENAIRE SEXUELLE	AVANT-AVANT DERNIÈRE PARTENAIRE SEXUELLE
422	Quel âge a cette personne ?	ÂGE DE LA PARTENAIRE <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98	ÂGE DE LA PARTENAIRE <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98	ÂGE DE LA PARTENAIRE <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98
423	À part cette personne, avez-vous eu des rapports sexuels avec une autre personne au cours des 12 derniers mois ?	OUI 1] (RETOURNEZ À 416COL. SUIVANTE) NON 2] (ALLEZ À 425)	OUI 1] (RETOURNEZ À 416 COL. SUIVANTE) NON 2] (ALLEZ À 425)	
424	En tout, avec combien de personnes différentes avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois ? DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION. SI LE NOMBRE DE PERSONNES EST 95 OU PLUS, INSCRIVEZ '95'.			NOMBRE DE PARTENAIRES DANS LES 12 DERNIERS MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98

SECTION 4. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
425	VÉRIFIEZ 419 (TOUTES LES COLONNES): AU MOINS UNE PARTENAIRE <input type="checkbox"/> EST UNE PROSTITUÉE ↓	AUCUNE PARTENAIRE <input type="checkbox"/> N'EST UNE PROSTITUÉE →	→ 427
426	VÉRIFIEZ 419 ET 417 (TOUTES LES COLONNES): CONDOM UTILISÉ AVEC <input type="checkbox"/> CHAQUE PROSTITUÉE	AUTRE <input type="checkbox"/>	→ 430 → 431
427	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous payé quelqu'un en échange de rapports sexuels ?	OUI 1 NON 2	→ 429
428	Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de payer quelqu'un en échange de rapports sexuels ?	OUI 1 NON 2	→ 431
429	La dernière fois que vous avez payé quelqu'un en échange de rapports sexuels, un condom a-t-il été utilisé ?	OUI 1 NON 2	→ 431
430	Est-ce qu'au cours des 12 derniers mois, un condom a été utilisé chaque fois que vous avez payé quelqu'un en échange de rapports sexuels ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
431	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous donné des cadeaux ou des présents pour avoir des rapports sexuels ou pour avoir une relation sexuelle suivie avec quelqu'un ?	OUI 1 NON 2	→ 433
432	Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de donner des cadeaux ou des présents pour avoir des rapports sexuels ou pour avoir une relation sexuelle suivie avec quelqu'un ?	OUI 1 NON 2	
433	En tout, durant votre vie, avec combien de personnes différentes avez-vous eu des rapports sexuels ? DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION. SI LE NOMBRE DE FOIS EST 95 OU PLUS, INSCRIVEZ '95'.	NOMBRE DE PARTENAIRES SUR LA DURÉE DE VIE <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98	
434 (2)	VÉRIFIEZ 417: PARTENAIRE LA PLUS RÉCENTE (PREMIÈRE COLONNE) CONDOM UTILISÉ <input type="checkbox"/> ↓	PAS POSÉE <input type="checkbox"/> PAS DE CONDOM UTILISÉ <input type="checkbox"/>	→ 438 → 438
435	Vous avez dit que la dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels, un condom avait été utilisé. Quelle était la marque du condom utilisée cette fois là ? SI LA MARQUE N'EST PAS CONNUE, DEMANDEZ À VOIR L'EMBALLAGE.	PRUDENCE 01 COOL 02 NO LOGO 03 AUTRE 96 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 98	

SECTION 4. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
436	<p>Où vous étiez-vous procuré le condom la dernière fois ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____ (NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL DU GOUVERNEMENT 11</p> <p>CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT 12</p> <p>CLINIQUE MOBILE 13</p> <p>AGENT DE SANTÉ/ RELAIS COMMUNAUTAIRE 14</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC 16</p> <p>_____ (PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ 21</p> <p>PHARMACIE 22</p> <p>SOIN MÉDICAL/CABINET CLINIQUE 23</p> <p>CLINIQUE MOBILE 24</p> <p>CENTRE/HÔPITAL CONFESIONNELLE 25</p> <p>AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ 26</p> <p>_____ (PRÉCISEZ)</p> <p>ONG</p> <p>CLINIQUE PLANIFICATION FAMILIALE 31</p> <p>AUTRE SOURCE</p> <p>BOUTIQUE 41</p> <p>INSTITUTION RELIGIEUSE 42</p> <p>AMIS/PARENTS 43</p> <p>AUTRE 96</p> <p>_____ (PRÉCISEZ)</p>	
437	<p>La dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels, est-ce que vous ou votre partenaire avait utilisé une autre méthode que le condom pour éviter ou retarder une grossesse ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>	<p>→ 439</p> <p>→ 440</p>
438	<p>La dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels, est-ce que vous ou votre partenaire avait utilisé une méthode pour éviter ou retarder une grossesse ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>	<p>→ 440</p>
439	<p>Quelle méthode avez-vous, ou votre partenaire, utilisé ?</p> <p>INSISTEZ: Est-ce que vous ou votre partenaire avait utilisé une autre méthode pour éviter une grossesse ?</p> <p>ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.</p>	<p>STÉRILISATION FÉMININE A</p> <p>STÉRILISATION MASCULINE B</p> <p>DIU C</p> <p>INJECTABLES D</p> <p>IMPLANTS E</p> <p>PILULE F</p> <p>CONDOM G</p> <p>CONDOM FÉMININ H</p> <p>PILULE DU LENDEMAIN I</p> <p>MÉTHODE DES JOURS FIXES J</p> <p>MAMA K</p> <p>MÉTHODE DU RYTHME L</p> <p>RETRAIT M</p> <p>AUTRE MÉTHODE MODERNE X</p> <p>AUTRE MÉTHODE TRADITIONNELLE Y</p>	<p>→ 501</p>
440	<p>Connaissez-vous un endroit où vous pouvez vous procurer une méthode de planification familiale ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p>	

SECTION 5. PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À								
501	VÉRIFIEZ 401: ACTUELLEMENT MARIÉ OU VIVANT AVEC UNE PARTENAIRE <input type="checkbox"/> ↓ NON MARIÉ ACTUELLEMENT ET NE VIVANT PAS AVEC UNE PARTENAIRE <input type="checkbox"/>		→ 514								
502	VÉRIFIEZ 439: HOMME NON STÉRILISÉ <input type="checkbox"/> ↓ HOMME STÉRILISÉ <input type="checkbox"/>		→ 514								
503	VÉRIFIEZ 407: UNE ÉPOUSE/PARTENAIRE <input type="checkbox"/> ↓ PLUS D'UNE ÉPOUSE/PARTENAIRE <input type="checkbox"/>		→ 509								
504	Est-ce que votre (épouse/partenaire) est actuellement enceinte ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 507								
505	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Après l'enfant que vous et votre (épouse/partenaire) attendez maintenant, souhaiteriez-vous un autre enfant ou préféreriez-vous ne plus avoir d'enfants ?	AVOIR UN AUTRE ENFANT 1 PAS D'AUTRE ENFANT 2 INDÉCIS/NE SAIT PAS 8	→ 514								
506	Après la naissance de l'enfant que vous attendez, combien de temps voudriez-vous attendre avant la naissance d'un autre enfant ?	MOIS 1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> ANNÉES 2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> BIENTÔT/MAINTENANT 993 AUTRE 996 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 998									→ 514
507	VÉRIFIEZ 208: A EU DES ENFANTS <input type="checkbox"/> ↓ a) Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Voudriez-vous avoir un autre enfant ou préféreriez-vous ne plus avoir d'enfant ? N'A PAS D'ENFANT <input type="checkbox"/> ↓ b) Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Voudriez-vous avoir un enfant ou préféreriez-vous ne pas avoir d'enfant ?	VEUT (UN/UN AUTRE) ENFANT 1 PLUS D'ENFANT/AUCUN DIT QUE LE COUPLE 2 NE PEUT PAS AVOIR D'ENFANT ÉPOUSE/PARTENAIRE STÉRILISÉE 3 INDÉCIS/NE SAIT PAS 4 8	→ 514								
508	VÉRIFIEZ 208: A DES ENFANTS <input type="checkbox"/> ↓ a) Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissance d'un autre enfant ? N'A PAS D'ENFANT <input type="checkbox"/> ↓ b) Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissance d'un enfant ?	MOIS 1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> ANNÉES 2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> BIENTÔT/MAINTENANT 993 DIT QUE LE COUPLE NE PEUT PAS AVOIR D'ENFANT 994 AUTRE 996 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 998									→ 514
509	Est-ce que l'une de vos (épouses/partenaires) est actuellement enceinte ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 512								

SECTION 5. PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À											
510	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Après la naissance (de/des enfant) que vos (épouses/partenaires) attendez, voudriez-vous avoir un autre enfant ou préféreriez-vous ne plus avoir d'enfant ?	AVOIR UN AUTRE ENFANT 1 NE PLUS EN AVOIR 2 INDÉCIS/NE SAIT PAS 8	→ 514											
511	Après la naissance de l'enfant que vous attendez, combien de temps voudriez-vous attendre avant la naissance d'un autre enfant ?	MOIS 1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> ANNÉES 2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> BIENTÔT/MAINTENANT 993 AUTRE _____ 996 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 998									→ 514			
512	VÉRIFIEZ 208: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> A DES ENFANTS <input type="checkbox"/> ↓ a) Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Voudriez-vous avoir un autre enfant ou préféreriez-vous ne plus avoir d'enfant ? </td> <td style="width: 5%; border-left: 1px dashed black;"></td> <td style="width: 45%; text-align: center; vertical-align: top;"> N'A PAS D'ENFANT <input type="checkbox"/> ↓ b) Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Voudriez-vous avoir un enfant ou préféreriez-vous ne pas avoir d'enfant ? </td> </tr> </table>	A DES ENFANTS <input type="checkbox"/> ↓ a) Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Voudriez-vous avoir un autre enfant ou préféreriez-vous ne plus avoir d'enfant ?		N'A PAS D'ENFANT <input type="checkbox"/> ↓ b) Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Voudriez-vous avoir un enfant ou préféreriez-vous ne pas avoir d'enfant ?	AVOIR (UN/UN AUTRE) ENFANT 1 PLUS D'ENFANT/AUCUN DIT QUE LE COUPLE NE PEUT PAS AVOIR D'ENFANT 3 ÉPOUSE (ÉPOUSES/PARTENAIRES) STÉRILISÉES 4 INDÉCIS/NE SAIT PAS 8	→ 514								
A DES ENFANTS <input type="checkbox"/> ↓ a) Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Voudriez-vous avoir un autre enfant ou préféreriez-vous ne plus avoir d'enfant ?		N'A PAS D'ENFANT <input type="checkbox"/> ↓ b) Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Voudriez-vous avoir un enfant ou préféreriez-vous ne pas avoir d'enfant ?												
513	VÉRIFIEZ 208: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> A DES ENFANTS <input type="checkbox"/> ↓ a) Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissance d'un autre enfant ? </td> <td style="width: 5%; border-left: 1px dashed black;"></td> <td style="width: 45%; text-align: center; vertical-align: top;"> N'A PAS D'ENFANT <input type="checkbox"/> ↓ b) Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissance d'un enfant ? </td> </tr> </table>	A DES ENFANTS <input type="checkbox"/> ↓ a) Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissance d'un autre enfant ?		N'A PAS D'ENFANT <input type="checkbox"/> ↓ b) Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissance d'un enfant ?	MOIS 1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> ANNÉES 2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> BIENTÔT/MAINTENANT DIT QUE LE COUPLE NE PEUT PAS AVOIR D'ENFANT 994 AUTRE _____ 996 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 998									
A DES ENFANTS <input type="checkbox"/> ↓ a) Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissance d'un autre enfant ?		N'A PAS D'ENFANT <input type="checkbox"/> ↓ b) Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissance d'un enfant ?												
514	VÉRIFIEZ 203 ET 205: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> A DES ENFANTS VIVANTS <input type="checkbox"/> ↓ a) Si vous pouviez revenir à l'époque où vous n'aviez pas d'enfant et que vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien auriez-vous voulu en avoir ? </td> <td style="width: 5%; border-left: 1px dashed black;"></td> <td style="width: 45%; text-align: center; vertical-align: top;"> AUCUN ENFANT VIVANT <input type="checkbox"/> ↓ b) Si vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien en voudriez-vous ? </td> </tr> </table> INSISTEZ POUR OBTENIR UNE RÉPONSE NUMÉRIQUE.	A DES ENFANTS VIVANTS <input type="checkbox"/> ↓ a) Si vous pouviez revenir à l'époque où vous n'aviez pas d'enfant et que vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien auriez-vous voulu en avoir ?		AUCUN ENFANT VIVANT <input type="checkbox"/> ↓ b) Si vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien en voudriez-vous ?	AUCUN 00 NOMBRE <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)			→ 601 → 601						
A DES ENFANTS VIVANTS <input type="checkbox"/> ↓ a) Si vous pouviez revenir à l'époque où vous n'aviez pas d'enfant et que vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien auriez-vous voulu en avoir ?		AUCUN ENFANT VIVANT <input type="checkbox"/> ↓ b) Si vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien en voudriez-vous ?												
515	Parmi ces enfants, combien souhaiteriez-vous de garçons, combien souhaiteriez-vous de filles et pour combien d'entre eux, le sexe n'aurait-il pas d'importance ?	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">GARÇONS</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">FILLES</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">PEU IMPORTE</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 33px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 33px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 33px; height: 20px;"></td> </tr> </table> NOMBRE .. AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	GARÇONS	FILLES	PEU IMPORTE									
GARÇONS	FILLES	PEU IMPORTE												

SECTION 6. EMPLOI ET RÔLE DES SEXES

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À		
601	Avez-vous fait un travail quelconque au cours des 7 derniers jours ?	OUI 1 NON 2	→ 604		
602	Bien que vous n'avez pas travaillé au cours des sept derniers jours, est-ce que vous avez un travail ou une affaire dont vous avez dû vous absenter pour vacances, maladie, maternité ou pour une autre raison ?	OUI 1 NON 2	→ 604		
603	Avez-vous fait un travail quelconque au cours des 12 derniers mois ?	OUI 1 NON 2	→ 607		
604	Quelle est votre occupation ? C'est-à-dire quel genre de travail faites-vous principalement ?	_____ _____ _____	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>		
605	Travaillez-vous habituellement toute l'année, ou de manière saisonnière ou travaillez-vous seulement de temps en temps ?	TOUTE L'ANNÉE 1 SAISONNIER/PARTIE DE L'ANNÉE 2 DE TEMPS EN TEMPS 3			
606	Êtes-vous payé en argent ou en nature pour ce travail ou n'êtes-vous pas payé du tout ?	ARGENT SEULEMENT 1 ARGENT ET NATURE 2 NATURE SEULEMENT 3 PAS PAYÉ 4			
607	VÉRIFIEZ 401: ACTUELLEMENT MARIÉ OU <input type="checkbox"/> VIVANT AVEC UNE PARTENAIRE ↓ NON MARIÉ ACTUELLEMENT <input type="checkbox"/> ET NE VIVANT PAS AVEC UNE PARTENAIRE		→ 612		
608	VÉRIFIEZ 606: CODE '1' OU '2' <input type="checkbox"/> ENCERCLÉ ↓ AUTRE <input type="checkbox"/>		→ 610		
609	Habituellement, qui décide comment l'argent que vous gagnez va être utilisé : c'est vous, votre (épouse/partenaire), ou conjointement vous et votre (épouse/partenaire) ?	ENQUÊTÉ 1 ÉPOUSE/PARTENAIRE 2 ENQUÊTÉ ET ÉPOUSE/ PARTENAIRE ENSEMBLE 3 AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ)			
610	Habituellement, qui prend les décisions en ce qui concerne vos propres soins de santé : vous, votre (épouse/partenaire), conjointement vous et votre (épouse/partenaire) ou quelqu'un d'autre ?	ENQUÊTÉ 1 ÉPOUSE/PARTENAIRE 2 ENQUÊTÉ ET ÉPOUSE/ PARTENAIRE ENSEMBLE 3 QUELQU'UN D'AUTRE 4 AUTRE 6			
611	Qui prend habituellement les décisions concernant les achats importants pour le ménage ?	ENQUÊTÉ 1 ÉPOUSE/PARTENAIRE 2 ENQUÊTÉ ET ÉPOUSE/ PARTENAIRE ENSEMBLE 3 QUELQU'UN D'AUTRE 4 AUTRE 6			

SECTION 6. EMPLOI ET RÔLE DES SEXES

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
612	Est-ce que vous possédez cette maison ou une autre maison seul ou conjointement avec quelqu'un d'autre ?	SEUL SEULEMENT 1 CONJOINTEMENT SEULEMENT 2 SEUL ET CONJOINTEMENT 3 N'EN POSSÈDE PAS 4	→ 615
613	Avez-vous un acte de propriété pour une maison que vous possédez ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 615
614	Est-ce que votre nom figure sur l'acte de propriété ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
615	Est-ce que vous possédez de la terre agricole ou non agricole, seul ou conjointement avec quelqu'un d'autre ?	SEUL SEULEMENT 1 CONJOINTEMENT SEULEMENT 2 SEUL ET CONJOINTEMENT 3 N'EN POSSÈDE PAS 4	→ 618
616	Avez-vous un acte de propriété pour une terre que vous possédez ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 618
617	Est-ce que votre nom figure sur l'acte de propriété ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
618	Selon vous, est-il justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes :		
		OUI NON NSP	
	a) Si elle sort sans le lui dire ?	a) SORT SANS LE LUI DIRE 1 2 8	
	b) Si elle néglige les enfants ?	b) NÉGLIGE LES ENFANTS 1 2 8	
	c) Si elle argumente avec lui ?	c) ARGUMENTE 1 2 8	
	d) Si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui ?	d) REFUSE RAP. SEXUELS 1 2 8	
	e) Si elle brûle la nourriture ?	e) BRÛLE NOURRITURE 1 2 8	

SECTION 7. VIH/SIDA

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
701	Je voudrais maintenant que nous parlions d'un autre sujet. Avez-vous déjà entendu parler de VIH ou de sida ?	OUI 1 NON 2	→ 727
702	Le VIH est le virus qui cause le sida. Est-ce qu'on peut réduire le risque de contracter le VIH en ayant juste un seul partenaire sexuel qui n'est pas infecté et qui n'a aucun autre partenaire sexuel ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
703	Est-ce qu'on peut contracter le virus du sida par les piqûres de moustiques ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
704	Est-ce qu'on peut réduire le risque de contracter le virus du sida en utilisant des condoms au cours de chaque rapport sexuel ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
705	Est-ce qu'on peut contracter le virus du sida en partageant la nourriture avec une personne qui a le sida ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
706	Est-ce qu'on peut contracter le virus du sida par sorcellerie ou par des moyens surnaturels ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
707	Est-il possible qu'une personne paraissant en bonne santé ait, en fait, le virus du sida ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
708	Est-ce que le virus qui cause le sida peut être transmis de la mère à son enfant :		
	a) Durant la grossesse ?	OUI NON NSP a) DURANT GROSSESSE 1 2 8	
	b) Durant l'accouchement ?	b) DURANT ACCOUCHEMENT 1 2 8	
	c) En allaitant ?	c) EN ALLAITANT 1 2 8	
709	VÉRIFIEZ 708: AU MOINS <input type="checkbox"/> UN 'OUI' ↓ AUTRE <input type="checkbox"/> → 711		
710	Y a-t-il des médicaments spéciaux qu'un médecin ou une infirmière peut donner à une femme infectée par le virus du sida pour réduire le risque de transmission à son enfant ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
711	VÉRIFIEZ LA PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES. AVANT DE CONTINUER, FAITES TOUT VOTRE POSSIBLE POUR VOUS TROUVER EN PRIVÉ.		
712	Je ne veux pas connaître les résultats mais avez-vous déjà fait un test du VIH ?	OUI 1 NON 2	→ 716
713	Il y a combien de mois que vous avez effectué votre test du VIH le plus récent ?	IL Y A MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> DEUX ANS OU PLUS 95	

SECTION 7. VIH/SIDA

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
714	Je ne veux pas connaître les résultats mais avez-vous eu les résultats du test ?	OUI 1 NON 2	
715	Où le test a-t-il été fait ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT. _____ (NOM DE L'ENDROIT)	SECTEUR PUBLIC HÔPITAL DU GOUVERNEMENT 11 CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. 12 CENTRE INDÉPENDANT DE TEST ET CONSEIL 13 CLINIQUE DE PLANIFICATION FAMILIALE .. 14 SERVICES MOBILES DE TEST ET CONSEIL 15 AUTRE SECTEUR PUBLIC 16 (PRÉCISEZ) SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ/ MÉDECIN PRIVÉ 21 CENTRE INDÉPENDANT DE TEST ET CONSEIL 22 PHARMACIE 23 SERVICES MOBILES DE TEST ET CONSEIL 24 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ 26 (PRÉCISEZ) AUTRE SOURCE MAISON 31 LIEU DE TRAVAIL 32 CENTRE DE DÉTENTION 33 AUTRE 96 (PRÉCISEZ)	→ 718
716	Connaissez-vous un endroit où les gens peuvent aller pour faire un test du VIH ?	OUI 1 NON 2	→ 718
717	Où est-ce ? Pas d'autre endroit ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT. _____ (NOM DE L'ENDROIT)	SECTEUR PUBLIC HÔPITAL DU GOUVERNEMENT A CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT B CENTRE INDÉPENDANT DE TEST ET CONSEIL C CLINIQUE DE PLANIFICATION FAMILIALE D SERVICES MOBILES DE TEST ET CONSEIL E AUTRE SECTEUR PUBLIC F (PRÉCISEZ) SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ/ MÉDECIN PRIVÉ G CENTRE INDÉPENDANT DE TEST ET CONSEIL H PHARMACIE I SERVICES MOBILES DE TEST ET CONSEIL J AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ K (PRÉCISEZ) AUTRE X (PRÉCISEZ)	

SECTION 7. VIH/SIDA

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
718	Avez-vous entendu parler de kits de tests que les gens peuvent utiliser pour se tester eux-mêmes pour le VIH ?	OUI 1 NON 2	→ 720
719	Vous êtes-vous testé vous-même en utilisant un kit de test ?	OUI 1 NON 2	
720	Est-ce que vous achèteriez des légumes frais à un marchand ou à un vendeur si vous saviez que cette personne a le virus du sida ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS/PAS SÛR/CELA DÉPEND 8	
721	Pensez-vous que des enfants vivant avec le VIH devraient être autorisés à aller à l'école avec des enfants qui n'ont pas le VIH ?	YES 1 NO 2 NE SAIT PAS/PAS SÛR/CELA DÉPEND 8	
722	Pensez-vous que les gens hésitent à faire un test du VIH parce qu'ils ont peur de la réaction des autres si le résultat de leur test était VIH positif ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS/PAS SÛR/CELA DÉPEND 8	
723	Est-ce que les gens parlent mal de ceux qui vivent avec le VIH ou dont on pense qu'ils vivent avec le VIH ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS/PAS SÛR/CELA DÉPEND 8	
724	Est-ce que les gens qui vivent avec le VIH, ou dont on pense qu'ils vivent avec le VIH, perdent le respect des autres ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS/PAS SÛR/CELA DÉPEND 8	
725	Êtes-vous d'accord ou non avec la déclaration suivante : j'aurais honte si quelqu'un de ma famille avait le VIH.	D'ACCORD 1 PAS D'ACCORD 2 NE SAIT PAS/PAS SÛR/CELA DÉPEND 8	
726	Avez-vous peur de contracter le VIH si vous étiez en contact avec la salive d'une personne vivant avec le VIH ?	OUI 1 NON 2 DÉCLARE QU'IL A LE VIH 3 NE SAIT PAS/PAS SÛR/CELA DÉPEND 8	
727	VÉRIFIEZ 701: A ENTENDU PARLER DU VIH <input type="checkbox"/> OU DU SIDA ↓ N'A PAS ENTENDU PARLER DU VIH <input type="checkbox"/> OU DU SIDA ↓ a) Mis à part le sida, avez-vous entendu parler d'autres infections qui peuvent se transmettre par contact sexuel ? b) Avez-vous entendu parler d'infections qui peuvent se transmettre par contact sexuel ?	OUI 1 NON 2	
728	VÉRIFIEZ 414: A DÉJÀ EU DES RAPPORTS SEXUELS <input type="checkbox"/> N'A JAMAIS EU DE RAPPORTS SEXUELS <input type="checkbox"/>		→ 736
729	VÉRIFIEZ 727: A ENTENDU PARLER D'AUTRES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES? OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>		→ 731
730	J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur votre santé au cours des 12 derniers mois. Durant les 12 derniers mois, avez-vous eu une maladie que vous avez contractée par contact sexuel ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
731	Il arrive parfois que les hommes aient un écoulement du pénis qui n'est pas normal. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un écoulement anormal du pénis ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	

SECTION 7. VIH/SIDA

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
732	Il arrive parfois que les hommes aient une plaie ou un ulcère dans la zone génitale. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu une plaie ou un ulcère dans la zone génitale ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
733	VÉRIFIEZ 730, 731 ET 732: A EU UNE <input type="checkbox"/> INFECTION (UN 'OUI')	N'A PAS EU <input type="checkbox"/> INFECTION OU NE SAIT PAS	→ 736
734	La dernière fois que vous avez eu (PROBLEME DÉCLARÉ À 730/731/732), avez-vous recherché des conseils ou un traitement ?	OUI 1 NON 2	→ 736
735	Où êtes-vous allé ? Pas d'autre endroit ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT. _____ (NOM DE L'ENDROIT)	SECTEUR PUBLIC HÔPITAL DU GOUVERNEMENT A CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. B CENTRE INDÉPENDANT DE TEST ET CONSEIL C CLINIQUE DE PLANIFICATION FAMILIALE .. D SERVICES MOBILES DE TEST ET CONSEILS E AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ F (PRÉCISEZ) SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ/ MÉDECIN PRIVÉ G CENTRE INDÉPENDANT DE TEST ET CONSEIL H PHARMACIE I SERVICES MOBILES DE TEST ET CONSEILS J AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ K (PRÉCISEZ) AUTRE SOURCE BOUTIQUE L AUTRE _____ X (PRÉCISEZ)	
736	Si une femme sait que son mari est atteint d'une maladie qu'elle peut contracter au cours de rapports sexuels, pensez-vous qu'il est justifié qu'elle lui demande qu'ils utilisent un condom quand ils ont des rapports sexuels ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
737	Est-ce que vous pensez qu'il est justifié qu'une femme refuse d'avoir des rapports sexuels avec son mari quand elle sait qu'il a des relations sexuelles avec une femme autre que ses épouses ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	

SECTION 8. AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
801	Certains hommes sont circoncis, c'est-à-dire qu'on leur a enlevé entièrement le prépuce du pénis. Êtes-vous circoncis ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 805
802	Quel âge aviez-vous quand vous avez été circoncis ?	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES <input type="text"/> <input type="text"/> PENDANT L'ENFANCE (<5 ANS) 95 NE SAIT PAS 98	
803	Qui a effectué la circoncision ?	PRATICIEN TRADITIONNEL/FAMILLE/AMIS 1 AGENT DE SANTÉ/PROFESSIONNEL 2 AUTRE 3 NE SAIT PAS 8	
804	Où a été effectuée la circoncision ?	ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ 1 MAISON D'UN AGENT DE SANTÉ/ PROFESSIONNEL 2 CIRCONCISION FAITE À LA MAISON 3 ENDROIT RITUEL 4 AUTRE MAISON/ENDROIT 5 NE SAIT PAS 8	
805	Je voudrais maintenant vous poser d'autres questions concernant des problèmes de santé. Au cours des 12 derniers mois, vous a-t-on fait une injection pour une raison quelconque ? SI OUI: Combien d'injections avez-vous eu ? SI LE NOMBRE D'INJECTIONS EST DE 90 OU PLUS OU SI LES INJECTIONS ÉTAIENT QUOTIDIENNES PENDANT 3 MOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '90'. DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION.	NOMBRE D'INJECTIONS <input type="text"/> <input type="text"/> AUCUNE 00	→ 808
806	Parmi ces injections, combien ont été effectuées par un médecin, une infirmière, un pharmacien, un dentiste ou un autre personnel de santé ? SI LE NOMBRE D'INJECTIONS EST DE 90 OU PLUS OU SI LES INJECTIONS ÉTAIENT QUOTIDIENNES PENDANT 3 MOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '90'. DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION.	NOMBRE D'INJECTIONS <input type="text"/> <input type="text"/> AUCUNE 00	→ 808
807	La dernière fois que vous avez eu une injection effectuée du personnel de santé, est-ce qu'il/elle a pris la seringue et l'aiguille d'un emballage neuf qui n'avait pas été ouvert ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
808	Fumez-vous actuellement du tabac tous les jours, certains jours ou pas du tout ?	TOUS LES JOURS 1 CERTAINS JOURS 2 PAS DU TOUT 3	→ 811 → 810
809	Dans le passé, est-ce que vous fumiez tous les jours ?	OUI 1 NON 2	→ 812
810	Dans le passé, est-ce que vous fumiez tous les jours, certains jours ou est-ce que vous ne fumiez pas ?	TOUS LES JOURS 1 CERTAINS JOURS 2 PAS DU TOUT 3	→ 813

SECTION 8. AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
811	<p>En moyenne, parmi les produits suivants, combien en fumez-vous actuellement par jour ? Dites-mois aussi si vous consommez ces produits mais pas chaque jour.</p> <p>SI L'ENQUÊTÉ DÉCLARE UTILISER UN PRODUIT , MAIS PAS TOUS LES JOURS, INSCRIVEZ '888'. SI LE PRODUIT N'EST PAS UTILISÉ DU TOUT, INSCRIVEZ '000'.</p> <p>a) Des cigarettes fabriquées commercialement ?</p> <p>b) Des cigarette roulées à la main ?</p> <p>c) Des pipes à tabac?</p> <p>d) Des cigares, cheroots ou cigarillos ?</p> <p>e) Nombre de séances de pipe à eau/narguilé ?</p> <p>f) Autre chose ? _____ (PRÉCISEZ)</p>	<p align="center">NOMBRE PAR JOUR</p> <p>a) CIGARETTES COMMERCIALES <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>b) CIGARETTES ROULÉES .. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>d) PIPES À TABAC <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>e) CIGARES, CHEROOTS OU CIGARILLOS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>f) NOMBRE DE SÉANCES DE PIPE À EAU/NARGULIÉ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>g) AUTRE CHOSE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p align="center">→ 813</p>
812	<p>En moyenne, parmi les produits suivants, combien en fumez-vous actuellement par semaine ? Dites-moi aussi si vous consommez ces produits, mais pas chaque jour.</p> <p>SI L'ENQUÊTÉ DÉCLARE UTILISER UN PRODUIT , MAIS PAS TOUTES LES SEMAINES, INSCRIVEZ '888'. SI LE PRODUIT N'EST PAS UTILISÉ DU TOUT, INSCRIVEZ '000'.</p> <p>a) Des cigarettes fabriquées commercialement ?</p> <p>b) Des cigarette roulées à la main ?</p> <p>c) Des pipes à tabac?</p> <p>d) Des cigares, cheroots ou cigarillos ?</p> <p>e) Nombre de séances de pipe à eau/narguilé ?</p> <p>f) Autre chose ? _____ (PRÉCISEZ)</p>	<p align="center">NOMBRE PAR SEMAINE</p> <p>a) CIGARETTES COMMERCIALES <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>b) CIGARETTES ROULÉES .. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>c) PIPES À TABAC <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>d) CIGARES, CHEROOTS OU CIGARILLOS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>e) NOMBRE DE SÉANCES DE PIPE À EAU/NARGULIÉ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>f) AUTRE CHOSE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	
813	<p>Consommez-vous actuellement du tabac non-fumé chaque jour, certains jours ou pas du tout ?</p>	<p>TOUS LES JOURS 1</p> <p>CERTAINS JOURS 2</p> <p>PAS DU TOUT 3</p>	<p align="center">→ 815</p> <p align="center">→ 816</p>

SECTION 8. AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
814	<p>En moyenne, combien de fois par jour utilisez-vous les produits suivants ? Dites-moi aussi si vous utilisez le produit, mais pas chaque jour.</p> <p>SI L'ENQUÊTÉ DÉCLARE UTILISER UN PRODUIT , MAIS PAS TOUS LES JOURS, INSCRIVEZ '888'. SI LE PRODUIT N'EST PAS UTILISÉ DU TOUT, INSCRIVEZ '000'.</p> <p>a) Du tabac à chiquer, dans la bouche ?</p> <p>b) Du tabac à priser, à inhaler par le nez ?</p> <p>c) Du tabac à mâcher ?</p> <p>d) Du Betel à mâcher ?</p> <p>e) Autre chose ? _____</p> <p style="text-align: center;">(PRÉCISEZ)</p>	<p style="text-align: center;">NOMBRE PAR JOUR</p> <p>a) TABAC À CHIQUER <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>b) TABAC À PRISER <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>c) TABAC À MÂCHER <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>d) BETEL À MÂCHER <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>e) AUTRE CHOSE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p style="text-align: center;">→ 816</p>
815	<p>En moyenne, combien de fois par semaine utilisez-vous les produits suivants ? Dites-moi aussi si vous utilisez ce produit, mais pas chaque semaine.</p> <p>SI L'ENQUÊTÉ DÉCLARE UTILISER UN PRODUIT , MAIS PAS TOUTES LES SEMAINES, INSCRIVEZ '888'. SI LE PRODUIT N'EST PAS UTILISÉ DU TOUT, INSCRIVEZ '000'.</p> <p>a) Du tabac à chiquer, dans la bouche ?</p> <p>b) Du tabac à priser, à inhaler par le nez ?</p> <p>c) Du tabac à mâcher ?</p> <p>d) Du Betel à mâcher ?</p> <p>e) Autre chose ? _____</p> <p style="text-align: center;">(PRÉCISEZ)</p>	<p style="text-align: center;">NOMBRE PAR SEMAINE</p> <p>a) TABAC À CHIQUER <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>b) TABAC À PRISER <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>c) TABAC À MÂCHER <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>d) BETEL À MÂCHER <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>e) AUTRE CHOSE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	

SECTION 9. MALADIES NON TRANSMISSIBLES POUR LE QUESTIONNAIRE HOMME

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
901	Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé a déjà vérifié votre tension artérielle ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
902	Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà dit que vous aviez une tension artérielle élevée ou de l'hypertension ?	OUI 1 NON 2	→ 906
903	Dans les 12 derniers mois, est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a dit que vous aviez une tension artérielle élevée ou de l'hypertension ?	OUI 1 NON 2	
904	Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a prescrit des médicaments pour contrôler votre tension artérielle ?	OUI 1 NON 2	
905	Est-ce que vous prenez actuellement des médicaments pour contrôler votre tension artérielle ?	OUI 1 NON 2	
906	Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé a déjà mesuré le niveau de sucre dans votre sang ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
907	Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà dit que vous aviez un niveau élevé de sucre dans le sang ou du diabète ?	OUI 1 NON 2	→ 911
908	Dans les 12 derniers mois, est-ce qu'un médecin un autre professionnel de santé vous a dit que vous aviez un niveau élevé de sucre dans le sang ou du diabète ?	OUI 1 NON 2	
909	Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a prescrit des médicaments pour contrôler votre niveau de sucre ou de diabète ?	OUI 1 NON 2	
910	Est-ce que vous prenez des médicaments pour contrôler votre niveau élevé de sucre dans le sang ou votre diabète ?	OUI 1 NON 2	
911	Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà dit que vous aviez une maladie cardiaque ou un problème cardiaque chronique ?	OUI 1 NON 2	→ 913
912	Suivez-vous actuellement un traitement pour une maladie cardiaque ou un problème cardiaque chronique ?	OUI 1 NON 2	
913	Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà dit que vous aviez une maladie pulmonaire ou un problème pulmonaire chronique ?	OUI 1 NON 2	→ 915
914	Suivez-vous actuellement un traitement pour une maladie pulmonaire ou un problème pulmonaire chronique ?	OUI 1 NON 2	

SECTION 9. MALADIES NON TRANSMISSIBLES POUR LE QUESTIONNAIRE HOMME

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
915	Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà dit que vous aviez un cancer ou une	OUI 1 NON 2	→ 917
916	Suivez-vous actuellement un traitement pour un cancer ou une tumeur ?	OUI 1 NON 2	
917	Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà dit que vous faisiez une dépression ?	OUI 1 NON 2	→ 919
918	Suivez-vous actuellement un traitement pour dépression ?	OUI 1 NON 2	
919	Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà dit que vous aviez de l'arthrite ?	OUI 1 NON 2	→ 921
920	Suivez-vous actuellement un traitement pour l'arthrite ?	OUI 1 NON 2	
921	Est-ce qu'un médecin ou un autre professionnel de santé vous a déjà dit que vous aviez une autre maladie chronique, c'est à-dire une autre maladie de longue durée ?	OUI 1 NON 2 (SPÉCIFIEZ LA MALADIE CHRONIQUE)	→ 931
922	Suivez-vous actuellement un traitement pour (MALADIE CHRONIQUE À 921) ?	OUI 1 NON 2	

SECTION 9. MALADIES NON TRANSMISSIBLES (TENSION ARTÉRIELLE MOYENNE)

NO.	QUESTIONS ET FILTRES	CODE	ALLEZ À
931	VÉRIFIEZ Q123D ET Q817D: PRESSIONS SYSTOLIQUE ET DIASTOLIQUE ENREGISTRÉES À Q123D ET À Q817D	PRESSIONS SYSTOLIQUE ET DIASTOLIQUE NON ENREGISTRÉES À Q123D ET À Q817D	→ 937
932	ENREGISTREZ ET CALCULEZ LA MOYENNE DE LA PRESSION SYSTOLIQUE ET DE LA PRESSION DIASTOLIQUE DE Q123D ET Q817D.		
933	MESURES DE LA TENSION ARTÉRIELLE DE Q123D	SYSTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	DIASTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
934	MESURES DE LA TENSION ARTÉRIELLE DE Q817D	SYSTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	DIASTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
935	SOMME DE Q933 + Q934	SOMME SYSTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	SOMME DIASTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
936	DIVISEZ Q935 PAR 2	MOYENNE SYSTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	MOYENNE DIASTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
937	VÉRIFIEZ Q123D PRESSION SYSTOLIQUE ET PRESSION DIASTOLIQUE NON ENREGISTRÉES À Q123D	LES DEUX PRESSIONS SYSTOLIQUE <u>ET</u> DIASTOLIQUE ENREGISTRÉES À Q123D	→ 940
938	VÉRIFIEZ Q817D: PRESSION SYSTOLIQUE ET PRESSION DIASTOLIQUE NON ENREGISTRÉE À Q817D	LES DEUX PRESSIONS SYSTOLIQUE <u>ET</u> DIASTOLIQUE ENREGISTRÉES À Q817D	→ 940
939	VÉRIFIEZ Q106F: PRESSION SYSTOLIQUE ET DIASTOLIQUE ENREGISTRÉES À Q106F	LES DEUX PRESSIONS SYSTOLIQUE <u>ET</u> DIASTOLIQUE <u>NON</u> ENREGISTRÉES À Q106F	→ 943
940	ENREGISTREZ LA PRESSION SYSTOLIQUE ET DIASTOLIQUE.	SYSTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	DIASTOLIQUE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

SECTION 9. MALADIES NON TRANSMISSIBLES (TENSION ARTÉRIELLE MOYENNE)

NO.	QUESTIONS ET FILTRES	CODE	ALLEZ À																																																							
941	<p>UTILISEZ LE TABLEAU CI-DESSOUS POUR DÉTERMINER LE CODE CORRECT POUR ENREGISTRER DANS LE RAPPORT SUR LA TENSION ARTÉRIELLE ET SUR LE FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE .</p> <p>ENCERCLEZ LA LIGNE OÙ VOUS TROUVEZ LA VALEUR DE LA PRESSION SYSTOLIQUE DE Q936 OU Q940.</p> <p>ENSUITE, ENCERCLEZ LA COLONNE OÙ VOUS TROUVEZ LA VALEUR DE LA PRESSION DIASTOLIQUE DE Q936 OU Q940.</p> <p>LA VALEUR QUI SE TROUVE À L'INTERSECTION DE LA LIGNE ET DE LA COLONNE ENCERCLÉES DANS LE TABLEAU SERA UTILISÉE POUR COMPLÉTER Q942.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">PRESSION SYSTOLIQUE MOYENNE</th> <th colspan="6">PRESSION DIASTOLIQUE MOYENNE</th> </tr> <tr> <th><84</th> <th>85-89</th> <th>90-99</th> <th>100-109</th> <th>110-119</th> <th>≥ 120</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤129</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>130-139</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>140-159</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>160-179</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>180-209</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>≥ 210</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	PRESSION SYSTOLIQUE MOYENNE	PRESSION DIASTOLIQUE MOYENNE						<84	85-89	90-99	100-109	110-119	≥ 120	≤129	1	2	3	4	5	6	130-139	2	2	3	4	5	6	140-159	3	3	3	4	5	6	160-179	4	4	4	4	5	6	180-209	5	5	5	5	5	6	≥ 210	6	6	6	6	6	6		
PRESSION SYSTOLIQUE MOYENNE	PRESSION DIASTOLIQUE MOYENNE																																																									
	<84	85-89	90-99	100-109	110-119	≥ 120																																																				
≤129	1	2	3	4	5	6																																																				
130-139	2	2	3	4	5	6																																																				
140-159	3	3	3	4	5	6																																																				
160-179	4	4	4	4	5	6																																																				
180-209	5	5	5	5	5	6																																																				
≥ 210	6	6	6	6	6	6																																																				
942	<p>ENREGISTREZ DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS LE NOMBRE QUE VOUS AVEZ ENCERCLÉ À Q941. UTILISEZ ENSUITE LES INSTRUCTIONS À DROITE DE CE NOMBRE POUR COMPLÉTER LE RAPPORT SUR LA TENSION ARTÉRIELLE ET LE FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE POUR L'ENQUÊTÉ. DONNEZ À L'ENQUÊTÉ LE FORMULAIRE ET RÉPONDEZ À TOUTES SES QUESTIONS.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CATÉGORIE DE LA TENSION ARTÉRIELLE DE L'ENQUÊTÉE</th> <th>CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ POUR VÉRIFIER LA TENSION ARTÉRIELLE <u>DANS</u> :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>NORMALE</td> <td>24 MOIS</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>À LA LIMITE SUPÉRIEURE DU SEUIL NORMAL</td> <td>12 MOIS</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>AU-DESSUS DU SEUIL NORMAL</td> <td>2 MOIS</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MODÉRÉMENT ÉLEVÉE</td> <td>1 MOIS</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TRÈS ÉLEVÉE</td> <td>7 JOURS</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>EXTRÊMEMENT ÉLEVÉE</td> <td>AUJOURD'HUI</td> </tr> </tbody> </table>		CATÉGORIE DE LA TENSION ARTÉRIELLE DE L'ENQUÊTÉE	CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ POUR VÉRIFIER LA TENSION ARTÉRIELLE <u>DANS</u> :	1	NORMALE	24 MOIS	2	À LA LIMITE SUPÉRIEURE DU SEUIL NORMAL	12 MOIS	3	AU-DESSUS DU SEUIL NORMAL	2 MOIS	4	MODÉRÉMENT ÉLEVÉE	1 MOIS	5	TRÈS ÉLEVÉE	7 JOURS	6	EXTRÊMEMENT ÉLEVÉE	AUJOURD'HUI																																				
	CATÉGORIE DE LA TENSION ARTÉRIELLE DE L'ENQUÊTÉE	CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ POUR VÉRIFIER LA TENSION ARTÉRIELLE <u>DANS</u> :																																																								
1	NORMALE	24 MOIS																																																								
2	À LA LIMITE SUPÉRIEURE DU SEUIL NORMAL	12 MOIS																																																								
3	AU-DESSUS DU SEUIL NORMAL	2 MOIS																																																								
4	MODÉRÉMENT ÉLEVÉE	1 MOIS																																																								
5	TRÈS ÉLEVÉE	7 JOURS																																																								
6	EXTRÊMEMENT ÉLEVÉE	AUJOURD'HUI																																																								
##	ENREGISTREZ L'HEURE.	HEURES.....	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>																																																							
		MINUTES	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>																																																							

OBSERVATION DE L'ENQUÊTEUR
À REMPLIR UNE FOIS L'INTERVIEW TERMINÉE

COMMENTAIRES SUR L'INTERVIEW :

COMMENTAIRES SUR DES QUESTIONS PARTICULIÈRES :

AUTRES COMMENTAIRES :

OBSERVATION DU CHEF D'ÉQUIPE

OBSERVATION DU CONTRÔLEUR

**ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ (EDSB-V 2017)
QUESTIONNAIRE BIOMARQUEUR #1**

RÉPUBLIQUE DU BENIN
MINISTÈRE DU PLAN ET DU DÉVELOPPEMENT

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ET DE L'ANALYSE ÉCONOMIQUE (INSAE)

IDENTIFICATION (1)

NOM DE LA LOCALITÉ _____											
NOM DU CHEF DE MÉNAGE _____											
NUMÉRO DE GRAPPE				<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>							
NUMÉRO DU MÉNAGE											
MÉNAGE SÉLECTIONNÉ POUR L'ENQUÊTE HOMME ? (1=OUI, 2=NON)				1 <input type="checkbox"/> → CONTINUEZ 2 <input type="checkbox"/> → UTILISEZ LE QUESTIONNAIRE BIOMARQUEUR #2							
VISITES L'AGENT DE TERRAIN											
	1	2	3	VISITE FINALE							
DATE	_____	_____	_____	JOUR <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>							
NOM DE L'AGENT DE TERRAIN	_____	_____	_____	MOIS							
				ANNÉE <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">2</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>	2	0	1				
2	0	1									
PROCHAINE DATE VISITE	_____	_____		NOMBRE TOTAL DE VISITES <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>							
HEURE	_____	_____									
NOTES: _____ _____ _____ _____				TOTAL D'ENFANTS ÉLIGIBLES <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>							
LANGUE DU QUESTIONNAIRE**	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td></tr></table>	0	1	LANGUE DE L'INTERVIEW**	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			LANGUE MATERNELLE DE L'ENQUÊTÉ**	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>		
0	1										
				TRADUCTEUR (OUI = 1, NON = 2)	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>						
LANGUE DU QUESTIONNAIRE**	FRANÇAIS										
	**CODES LANGUES :										
	01 FRANÇAIS	03 BARIBA	05 DENDI	07 YORUBA							
	02 ADJA	04 FON	06 DITAMARI	08 AUTRE							
SUPERVISEUR			ÉDITEUR								
_____			_____								
NOM			NOM								
	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>		NUMÉRO				

MESURE DU POIDS, DE LA TAILLE DES ENFANTS DE 0-5 ANS

101	VÉRIFIEZ COLONNE 11 DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE ET LE NOM DE TOUS LES ENFANTS ÉLIGIBLES DE 0-5 ANS À Q.102; S'IL Y A PLUS DE 6 ENFANTS, UTILISEZ UN/DÉS QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES.			
		ENFANT 1	ENFANT 2	ENFANT 3
102	VÉRIFIER TABLEAU MÉNAGE : NUMÉRO DE LIGNE DE LA COL.11 . NOM DE LA COL. 2	NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____
103	SI LA MÈRE EST ENQUÊTÉE : COPIEZ LA DATE DE NAISSANCE DE L'ENFANT (JOUR, MOIS ET ANNÉE) DU TABLEAU DES NAISSANCES. SI LA MÈRE N'EST PAS ENQUÊTÉE DEMANDEZ : Quelle est la date de naissance de (NOM) ?	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
104	VÉRIFIEZ 103: ENFANT NÉ EN 2012-2017?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 111) ←	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 111) ←	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 111) ←
105	POIDS EN KILOGRAMMES.	KG.... <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENTE9994 REFUS9995 AUTRE9996	KG.... <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENTE9994 REFUS9995 AUTRE9996	KG.... <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENTE9994 REFUS9995 AUTRE9996
106	TAILLE EN CENTIMÈTRES.	CM.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> ABSENTE9994 REFUS9995 AUTRE9996 (ALLEZ À 108) ←	CM.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> ABSENTE9994 REFUS9995 AUTRE9996 (ALLEZ À 108) ←	CM.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> ABSENTE9994 REFUS9995 AUTRE9996 (ALLEZ À 108) ←
107	MESURÉ ALLONGÉ OU DEBOUT ?	ALLONGÉ 1 DEBOUT 2	ALLONGÉ 1 DEBOUT 2	ALLONGÉ 1 DEBOUT 2
108	MESUREUR: INSCRIVEZ VOTRE NUMÉRO L'AGENT DE TERRAIN.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN
110	NUMÉRO DE LIGNE DU PARENT/AUTRE ADULTE RESPONSABLE DE L'ENFANT DE LA COLONNE 1 DU TABLEAU MÉNAGE .	NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> (INSCRIVEZ '00' SI NON LISTÉ)	NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> (INSCRIVEZ '00' SI NON LISTÉ)	NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> (INSCRIVEZ '00' SI NON LISTÉ)
111	RETOURNEZ À Q.103 À LA COLONNE SUIVANTE DE CE QUESTIONNAIRE OU À LA PREMIÈRE COLONNE DE LA PAGE SUIVANTE; S'IL N'Y A PLUS D'ENFANTS, FIN.			

MESURE DU POIDS, DE LA TAILLE DES ENFANTS DE AGE 0-5 ANS

		ENFANT 4	ENFANT 5	ENFANT 6
102	VÉRIFIER TABLEAU MÉNAGE : NUMÉRO DE LIGNE DE LA COL.11 . NOM DE LA COL. 2	NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____
103	SI LA MÈRE EST ENQUÊTÉE : COPIEZ LA DATE DE NAISSANCE DE L'ENFANT (JOUR, MOIS ET ANNÉE) DU TABLEAU DES NAISSANCES. SI LA MÈRE N'EST PAS ENQUÊTÉE DEMANDEZ : Quelle est la date de naissance de (NOM) ?	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
104	VÉRIFIEZ 103: ENFANT NÉ EN 2012-2017?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 111) ←	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 111) ←	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 111) ←
105	POIDS EN KILOGRAMMES.	KG.... <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENTE9994 REFUS9995 AUTRE9996	KG.... <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENTE9994 REFUS9995 AUTRE9996	KG.... <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENTE9994 REFUS9995 AUTRE9996
106	TAILLE EN CENTIMÈTRES.	CM.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> ABSENTE9994 REFUS9995 AUTRE9996 (ALLEZ À 108) ←	CM.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> ABSENTE9994 REFUS9995 AUTRE9996 (ALLEZ À 108) ←	CM.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> ABSENTE9994 REFUS9995 AUTRE9996 (ALLEZ À 108) ←
107	MESURÉ ALLONGÉ OU DEBOUT ?	ALLONGÉ 1 DEBOU' 2	ALLONGÉ 1 DEBOU' 2	ALLONGÉ 1 DEBOU' 2
108	MESUREUR: INSCRIVEZ VOTRE NUMÉRO L'AGENT DE TERRAIN.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN
110	NUMÉRO DE LIGNE DU PARENT/AUTRE ADULTE RESPONSABLE DE L'ENFANT DE LA COLONNE 1 DU TABLEAU MÉNAGE .	NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> (INSCRIVEZ '00' SI NON LISTÉ)	NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> (INSCRIVEZ '00' SI NON LISTÉ)	NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> (INSCRIVEZ '00' SI NON LISTÉ)
111	RETOURNEZ À Q.103 À LA COLONNE SUIVANTE DE CE QUESTIONNAIRE OU À LA PREMIÈRE COLONNE D'UN QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE; S'IL N'Y A PLUS D'ENFANTS, FIN.			

ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ (EDSB-V 2017)
QUESTIONNAIRE BIOMARQUEUR #2

RÉPUBLIQUE DU BENIN
MINISTÈRE DU PLAN ET DU DÉVELOPPEMENT

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ET DE L'ANALYSE ÉCONOMIQUE (INSAE)

IDENTIFICATION (1)

DÉPARTEMENT _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
COMMUNE _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
URBAIN/RURAL _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NOM DU CHEF DE MÉNAGE _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NUMÉRO DE GRAPPE	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NUMÉRO DU MÉNAGE	<input type="text"/>	<input type="text"/>
MÉNAGE NON SÉLECTIONNÉ POUR L'ENQUÊTE HOMME ? (1=OUI, 2=NON)	1 <input type="checkbox"/>	CONTINUEZ
	2 <input type="checkbox"/>	UTILISEZ LE QUESTIONNAIRE BIOMARQUEUR #1

VISITES L'AGENT DE TERRAIN

	1	2	3	VISITE FINALE
DATE	_____	_____	_____	JOUR <input type="text"/>
NOM DE L'AGENT DE TERRAIN	_____	_____	_____	MOIS <input type="text"/>
				ANNÉE <input type="text"/>
PROCHAINE DATE VISITE	_____	_____		NOMBRE TOTAL DE VISITES <input type="text"/>
HEURE	_____	_____		
NOTES:	_____ _____ _____ _____ _____			TOTAL DE FEMMES ÉLIGIBLES <input type="text"/>
				TOTAL D'ENFANTS ÉLIGIBLES <input type="text"/>

LANGUE DU QUESTIONNAIRE** LANGUE DE L'INTERVIEW** LANGUE MATERNELLE DE L'ENQUÊTÉ** TRADUCTEUR (OUI = 1, NON = 2)

LANGUE DU QUESTIONNAIRE** **FRANÇAIS**

**CODES LANGUES :

01 FRANÇAIS

03 Bariba

05 Dendi

07 Yoruba

02 Adja

04 Fon

06 Ditamari

08 Autres

SUPERVISEUR

ÉDITEUR

NOM NUMÉRO

NOM NUMÉRO

POIDS, TAILLE, HÉMOGLOBINE, ET PALUDISME CHEZ LES ENFANTS DE 0-5 ANS

101	VÉRIFIEZ COLONNE 11 DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE ET LE NOM DE TOUS LES ENFANTS ÉLIGIBLES DE 0-5 ANS À Q.102; S'IL Y A PLUS DE 6 ENFANTS, UTILISEZ UN/DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES.			
		ENFANT 1	ENFANT 2	ENFANT 3
102	VÉRIFIEZ NUMÉRO DE LIGNE DE LA COL.11 DANS LE TABLEAU MÉNAGE. NOM DE LA COL. 2	NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____
103	SI LA MÈRE EST ENQUÊTÉE : COPIEZ LA DATE DE NAISSANCE DE L'ENFANT (JOUR, MOIS ET ANNÉE) DU TABLEAU DES NAISSANCES. SI LA MÈRE N'EST PAS ENQUÊTÉE : DEMANDEZ : Quelle est la date de naissance de (NOM) ?	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
104	VÉRIFIEZ 103: ENFANT NÉ EN 2012-2017?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 137) ←	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 137) ←	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 137) ←
105	POIDS EN KILOGRAMMES.	KG.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENT 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996	KG.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENT 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996	KG.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENT 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996
106	TAILLE EN CENTIMÈTRES.	CM.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENT..... 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996 (ALLEZ À 107A) ←	CM.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENT..... 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996 (ALLEZ À 107A) ←	CM.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENT..... 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996 (ALLEZ À 107A) ←
107	MESURÉ ALLONGÉ OU DEBOUT ?	ALLONGÉ 1 DEBOUT 2	ALLONGÉ 1 DEBOUT 2	ALLONGÉ 1 DEBOUT 2
108	MESUREUR: INSCRIVEZ VOTRE NUMÉRO D'AGENT DE TERRAIN	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN

POIDS, TAILLE, HÉMOGLOBINE, ET PALUDISME CHEZ LES ENFANTS DE 0-5 ANS

101	VÉRIFIEZ COLONNE 11 DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE ET LE NOM DE TOUS LES ENFANTS ÉLIGIBLES DE 0-5 ANS À Q.102; S'IL Y A PLUS DE 6 ENFANTS, UTILISEZ UN/DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES.			
		ENFANT 1	ENFANT 2	ENFANT 3
102	VÉRIFIEZ NUMÉRO DE LIGNE DE LA COL.11 DANS LE TABLEAU MÉNAGE. NOM DE LA COL. 2	NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____
109	VÉRIFIEZ 103: EST-CE QUE L'ENFANT A 0-5 MOIS, C'EST-À-DIRE QU'IL EST NÉ DURANT LE MOIS DE L'ENQUÊTE OU DANS LES 5 MOIS PRÉCÉDENTS ?	0-5 MOIS 1 } (ALLEZ À 132) ← PLUS ÂGÉ 2	0-5 MOIS 1 } (ALLEZ À 132) ← PLUS ÂGÉ 2	0-5 MOIS 1 } (ALLEZ À 132) ← PLUS ÂGÉ 2
110	No DE LIGNE DU PARENT/AUTRE ADULTE RESPONSABLE DE L'ENFANT DE LA COLONNE 1 DU TABLEAU MÉNAGE .	No DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> (INSCRIVEZ '00' SI NON LISTÉ)	No DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> (INSCRIVEZ '00' SI NON LISTÉ)	No DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> (INSCRIVEZ '00' SI NON LISTÉ)

CONSENTEMENT DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE POUR LE TEST D'ANÉMIE

111	DEMANDEZ LE CONSENTEMENT POUR LE TEST D'ANÉMIE AU PARENT/AUTRE ADULTE.	<p>Dans cette enquête, nous demandons à des gens dans tout le pays de participer au test d'anémie. L'anémie est un problème de santé sérieux qui résulte généralement d'une alimentation pauvre, d'infection ou de maladie chronique. Les résultats de cette enquête permettront d'aider le gouvernement à développer des programmes pour prévenir et traiter l'anémie. Nous demandons que tous les enfants nés en 2012, ou plus tard, participent au test d'anémie inclus dans cette enquête en donnant quelques gouttes de sang d'un doigt ou du talon. Pour ce test, on utilise un équipement propre et sans risque. Il n'a jamais été utilisé auparavant et il sera jeté après chaque test.</p> <p>Le sang sera testé pour l'anémie immédiatement et le résultat vous sera communiqué tout de suite. Les résultats sont strictement confidentiels et ne seront transmis à personne en dehors de l'équipe de l'enquête.</p> <p>Avez-vous des questions à me poser ? Vous pouvez dire oui ou non pour le test. C'est votre décision. Autorisez-vous (NOM DE L'ENFANT) à participer au test d'anémie ?</p>		
112	ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIÉ ET SIGNEZ.	ACCORDÉ 1 } _____ (SIGNATURE) ← REFUS 2 } ABSENT/AUTRE 3	ACCORDÉ 1 } _____ (SIGNATURE) ← REFUS 2 } ABSENT/AUTRE 3	ACCORDÉ 1 } _____ (SIGNATURE) ← REFUS 2 } ABSENT/AUTRE 3

CONSENTEMENT DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE POUR LE TEST DE PALUDISME

113	DEMANDEZ LE CONSENTEMENT POUR LE TEST DE PALUDISME AU PARENT/AUTRE ADULTE.	<p>Dans le cadre de cette enquête, nous demandons que les enfants dans tout le pays participent à un test pour vérifier s'ils ont ou non le paludisme. Le paludisme est un problème de santé sérieux causé par un parasite transmis par la piqûre d'un moustique. Cette enquête aidera le gouvernement à développer des programmes pour prévenir le paludisme.</p> <p>Nous demandons que tous les enfants nés en 2012 ou plus tard participent au test de paludisme inclus dans cette enquête en donnant quelques gouttes de sang d'un doigt ou du talon. Nous utiliserons le sang de la même piqûre au même doigt que pour le test d'anémie. Une goutte de sang sera testée pour le paludisme immédiatement et les résultats vous seront communiqués tout de suite. Un traitement sera proposé aux enfants présentant un paludisme simple s'ils ne sont pas déjà sur traitement. Les enfants avec paludisme grave seront référés à un établissement de santé. Quelques gouttes seront prélevées sur une ou des lames et envoyées à un laboratoire pour être testées. Les résultats du test de laboratoire ne vous seront pas divulgués. Les résultats sont strictement confidentiels et ne seront transmis à personne en dehors de l'équipe de l'enquête.</p> <p>Avez-vous des questions à me poser ? Vous pouvez dire oui ou non pour le test. C'est votre décision. Autorisez-vous (NOM DE L'ENFANT) à participer au test de paludisme?</p>		
114	ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIÉ ET SIGNEZ.	ACCORDÉ 1 } _____ (SIGNATURE) ← REFUS 2 } ABSENT/AUTRE 3	ACCORDÉ 1 } _____ (SIGNATURE) ← REFUS 2 } ABSENT/AUTRE 3	ACCORDÉ 1 } _____ (SIGNATURE) ← REFUS 2 } ABSENT/AUTRE 3
115	PRÉPAREZ L'EQUIPEMENT ET LES FOURNITURES SEULEMENT POUR LE/LES TESTS POUR LESQUELS VOUS AVEZ OBTENU LE CONSENTEMENT ET CONTINUEZ AVEC LE/LES TESTS.			

POIDS, TAILLE, HÉMOGLOBINE, ET PALUDISME CHEZ LES ENFANTS DE 0-5 ANS

101	VÉRIFIEZ COLONNE 11 DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE ET LE NOM DE TOUS LES ENFANTS ÉLIGIBLES DE 0-5 ANS À Q.102; S'IL Y A PLUS DE 6 ENFANTS, UTILISEZ UN/DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES.			
		ENFANT 1	ENFANT 2	ENFANT 3
102	VÉRIFIEZ NUMÉRO DE LIGNE DE LA COL.11 DANS LE TABLEAU MÉNAGE. NOM DE LA COL. 2	NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____
116	PLACEZ LES ÉTIQUETTES CODE BARRE.	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> COLLEZ LA 1re ÉTIQUETTE CODE BARRE. </div> ABSENTE 99994 A REFUSÉ..... 99995 AUTRE 99996 COLLEZ LA 2ème ÉTIQUETTE CODE BARRE SUR LE TDR , LA 3ème SUR LA LAME GOUTTE ÉPAISSE, ET LA 4ème SUR LA FICHE DE TRANSMISSION PALU	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> LEZ LA 1re ÉTIQUETTE CODE BARRE. </div> ABSENTE 99994 A REFUSÉ..... 99995 AUTRE 99996 COLLEZ LA 2ème ÉTIQUETTE CODE BARRE SUR LE TDR , LA 3ème SUR LA LAME GOUTTE ÉPAISSE, ET LA 4ème SUR LA FICHE DE TRANSMISSION PALU	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> LEZ LA 1re ÉTIQUETTE CODE BARRE. </div> ABSENTE 99994 A REFUSÉ..... 99995 AUTRE 99996 COLLEZ LA 2ème ÉTIQUETTE CODE BARRE SUR LE TDR , LA 3ème SUR LA LAME GOUTTE ÉPAISSE, ET LA 4ème SUR LA FICHE DE TRANSMISSION PALU
117	INSCRIVEZ LE NIVEAU D'HÉMOGLOBINE ICI ET DANS LA BROCHURE ANÉMIE ET PALUDISME.	G/DL <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> REFUS 995 AUTRE 996	G/DL <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> REFUS 995 AUTRE 996	G/DL <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> REFUS 995 AUTRE 996
118	ENREGISTREZ LE CODE DU RÉSULTAT DU TDR DU PALUDISME.	TESTÉ 1 ABSENT..... 2 REFUS 4 AUTRE 5 (ALLEZ À 120) ←	TESTÉ 1 ABSENT..... 2 REFUS 4 AUTRE 5 (ALLEZ À 120) ←	TESTÉ 1 ABSENT..... 2 REFUS 4 AUTRE 5 (ALLEZ À 120) ←
119	ENREGISTREZ LE RESULTAT DU TDR DU PALUDISME ICI ET DANS LA BROCHURE SUR L'ANÉMIE ET LE PALUDISME.	POSITIF FALCIPARUM . 1 POSITIF VIVAX ... 2 POSITIF FALCIPARUM ET VIVAX 3 (ALLEZ À 122) ← NÉGATIF 4 AUTRE 6	POSITIF FALCIPARUM . 1 POSITIF VIVAX .. 2 POSITIF FALCIPARUM ET VIVAX 3 (ALLEZ À 122) ← NÉGATIF 4 AUTRE 6	POSITIF FALCIPARUM . 1 POSITIF VIVAX .. 2 POSITIF FALCIPARUM ET VIVAX 3 (ALLEZ À 122) ← NÉGATIF 4 AUTRE 6
120	VÉRIFIEZ 122: NIVEAU D'HÉMOGLOBINE	EN-DESSOUS DE 8.0 G/DL ANÉMIE SÉVÈRE 1 8.0 G/DL OU PLUS 2 ABSENT..... 3 REFUS 4 AUTRE 6 (ALLEZ À 132) ←	EN-DESSOUS DE 8.0 G/DL ANÉMIE SÉVÈRE 1 8.0 G/DL OU PLUS 2 ABSENT..... 3 REFUS 4 AUTRE 6 (ALLEZ À 132) ←	EN-DESSOUS DE 8.0 G/DL ANÉMIE SÉVÈRE 1 8.0 G/DL OU PLUS 2 ABSENT..... 3 REFUS 4 AUTRE 6 (ALLEZ À 132) ←

POIDS, TAILLE, HÉMOGLOBINE, ET PALUDISME CHEZ LES ENFANTS DE 0-5 ANS

101	VÉRIFIEZ COLONNE 11 DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE ET LE NOM DE TOUS LES ENFANTS ÉLIGIBLES DE 0-5 ANS À Q.102; S'IL Y A PLUS DE 6 ENFANTS, UTILISEZ UN/DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES.			
		ENFANT 1	ENFANT 2	ENFANT 3
102	VÉRIFIEZ NUMÉRO DE LIGNE DE LA COL.11 DANS LE TABLEAU MÉNAGE. NOM DE LA COL. 2	NUMÉRO DE LIGNE... [][] NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE... [][] NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE... [][] NOM _____
121	DÉCLARATION DE REFERENCE POUR ANÉMIE SÉVÈRE.	Le test pour le diagnostic d'anémie montre que (NOM DE L'ENFANT) a une anémie sévère. Votre enfant est sérieusement malade et doit être amené à un établissement de santé immédiatement. ALLEZ À 132		
122	Est-ce que (NOM) souffre d'une des maladies suivantes ou présente un ou des symptômes suivants: a Faiblesse extrême? b Problèmes cardiaques? c Perte de conscience? d Respiration rapide ou difficulté de respirer? e Convulsions? f Saignements anormaux? g Jaunisse/peau jaune ? h Urine foncée? SI AUCUN DES SYMPTÔMES CI-DESSUS, ENCERCLEZ CODE Y.	FAIBLESSE EXTRÊME ... A PROBLÈME CARDIAQU . B PERTE CONSCIENCE ... C RESPIRATION RAPIDE ... D CONVULSIONS E SAIGNEMENTS F JAUNISSE G URINE FONCÉ H AUCUN DES SYMPTÔMES CI-DESSUS . Y	FAIBLESSE EXTRÊME .. A PROBLÈME CARDIAQU . B PERTE CONSCIENCE .. C RESPIRATION RAPIDE .. D CONVULSIONS E SAIGNEMENTS F JAUNISSE G URINE FONCÉ H AUCUN DES SYMPTÔMES CI-DESSUS . Y	FAIBLESSE EXTRÊME .. A PROBLÈME CARDIAQU . B PERTE CONSCIENCE .. C RESPIRATION RAPIDE .. D CONVULSIONS E SAIGNEMENTS F JAUNISSE G URINE FONCÉ H AUCUN DES SYMPTÔMES CI-DESSUS . Y
123	VÉRIFIEZ 122: Y A-T-IL UN CODE A-H ENCERCLÉ ?	UN CODE A-H ENCERCL 1 (ALLEZ À 125) ← SEUL CODE Y ENCERCLÉ 2	UN CODE A-H ENCERCL 1 (ALLEZ À 125) ← SEUL CODE Y ENCERCLÉ 2	UN CODE A-H ENCERCL 1 (ALLEZ À 125) ← SEUL CODE Y ENCERCLÉ 2
124	VÉRIFIEZ 117: NIVEAU D'HÉMOGLOBINE	EN-DESSOUS DE 8.0 G/DI 1 8.0 G/DL OU PLUS 2 ABSENT 3 REFUS 4 AUTRE 6 (ALLEZ À 126) ←	EN-DESSOUS DE 8.0 G/D 1 8.0 G/DL OU PLUS 2 ABSENT 3 REFUS 4 AUTRE 6 (ALLEZ À 126) ←	EN-DESSOUS DE 8.0 G/D 1 8.0 G/DL OU PLUS 2 ABSENT 3 REFUS 4 AUTRE 6 (ALLEZ À 126) ←
125	DÉCLARATION POUR REFERENCE POUR PALUDISME GRAVE.	Le test pour le diagnostic du paludisme montre que (NOM DE L'ENFANT) a du paludisme. Votre enfant a également des symptômes de paludisme grave. Le médicament que j'ai contre le paludisme n'aidera pas votre enfant, et je ne peux pas lui donner de traitement. Votre enfant est sérieusement malade et doit être amené tout de suite à un établissement de santé. ALLEZ À 131		

POIDS, TAILLE, HÉMOGLOBINE, ET PALUDISME CHEZ LES ENFANTS DE 0-5 ANS

101	VÉRIFIEZ COLONNE 11 DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE ET LE NOM DE TOUS LES ENFANTS ÉLIGIBLES DE 0-5 ANS À Q.102; S'IL Y A PLUS DE 6 ENFANTS, UTILISEZ UN/DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES.			
		ENFANT 1	ENFANT 2	ENFANT 3
102	VÉRIFIEZ NUMÉRO DE LIGNE DE LA COL.11 DANS LE TABLEAU MÉNAGE. NOM DE LA COL. 2	NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____
126	Au cours des deux dernières semaines, est-ce que (NOM) a pris ou (NOM) prend-il de la CTA donné par un médecin, un centre de santé ou un agent de santé communautaire pour traiter le paludisme ? VÉRIFIEZ EN DEMANDANT DE VOIR LE TRAITEMENT.	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 128) ←	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 128) ←	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 128) ←
127	DÉCLARATION DE REFERENCE POUR LES ENFANTS PRENANT DÉJÀ UN MÉDICAMENT DE LA CTA.	Vous m'avez dit que (NOM DE L'ENFANT) a déjà reçu de la CTA pour le paludisme. Je ne peux pas vous donner une CTA supplémentaire. Cependant, le test montre qu'il/elle a du paludisme. Si votre enfant a de la fièvre pendant 2 jours après la dernière dose de CTA, vous devrez amener l'enfant au centre de santé le plus proche pour des examens plus approfondis. ALLEZ À 132		
128	LIRE LES INFORMATIONS POUR LE TRAITEMENT DU PALUDISME ET LA DÉCLARATION DE CONSENTEMENT AU PARENT OU AUTRE ADULTE RESPONSABLE POUR L'ENFANT.	Le test du paludisme montre que votre enfant a du paludisme. Nous pouvons vous donner gratuitement des médicaments. Le médicament est appelé CTA. La CTA est très efficace et d'ici quelques jours, il n'aura plus de fièvre, ni d'autres symptômes. Vous n'êtes pas obligé de donner le médicament à l'enfant. C'est vous qui décidez. Dites-moi s'il vous plait, si vous acceptez, ou non, le médicament.		
129	ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIÉ ET APPOSEZ VOTRE SIGNATURE.	MÉDICAMENT ACCEPTÉ 1 (SIGNATURE) ← REFUS 2 AUTRE 6 (ALLEZ À 131) ←	MÉDICAMENT ACCEPTÉ 1 (SIGNATURE) ← REFUS 2 AUTRE 6 (ALLEZ À 131) ←	MÉDICAMENT ACCEPTÉ 1 (SIGNATURE) ← REFUS 2 AUTRE 6 (ALLEZ À 131) ←

POIDS, TAILLE, HÉMOGLOBINE, ET PALUDISME CHEZ LES ENFANTS DE 0-5 ANS

101	VÉRIFIEZ COLONNE 11 DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE ET LE NOM DE TOUS LES ENFANTS ÉLIGIBLES DE 0-5 ANS À Q.102; S'IL Y A PLUS DE 6 ENFANTS, UTILISEZ UN/DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES.																		
		ENFANT 1	ENFANT 2	ENFANT 3															
102	VÉRIFIEZ NUMÉRO DE LIGNE DE LA COL.11 DANS LE TABLEAU MÉNAGE. NOM DE LA COL. 2	NUMÉRO DE LIGNE..... <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE..... <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE..... <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> NOM _____															
130	TRAITEMENT POUR LES ENFANTS DONT LE TEST DU PALUDISME EST POSITIF.	<p>INSTRUCTION POUR LE DOSAGE</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">POIDS (en Kg)/ÂGE</th> <th colspan="3">TRAITEMENT</th> </tr> <tr> <th>Jour 1</th> <th>Jour 2</th> <th>Jour 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">4,5 à 8 kg (6 -11 mois)</td> <td>1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose)</td> <td>1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose)</td> <td>1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose)</td> </tr> <tr> <td align="center">9 -17 kg (1-5 ans)</td> <td>Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette)</td> <td>Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette)</td> <td>Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette)</td> </tr> </tbody> </table> <p>DITES AUSSI AU PARENT/ADULTE RESPONSABLE POUR L'ENFANT: Si [NOM] a une fièvre élevée, une respiration difficile ou rapide, s'il ne peut pas boire ou téter, si son état s'aggrave ou s'il ne va pas mieux dans les deux jours, vous devrez l'amener immédiatement voir un professionnel de santé pour qu'il soit traité.</p>			POIDS (en Kg)/ÂGE	TRAITEMENT			Jour 1	Jour 2	Jour 3	4,5 à 8 kg (6 -11 mois)	1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose)	1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose)	1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose)	9 -17 kg (1-5 ans)	Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette)	Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette)	Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette)
POIDS (en Kg)/ÂGE	TRAITEMENT																		
	Jour 1	Jour 2	Jour 3																
4,5 à 8 kg (6 -11 mois)	1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose)	1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose)	1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose)																
9 -17 kg (1-5 ans)	Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette)	Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette)	Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette)																
131	ENREGISTREZ LE CODE RÉSULTAT DU TRAITEMENT POUR LE PALUDISME OU DE LA FICHE DE REFERENCE.	MÉDICAMENT DONNÉ 1 MÉDICAMENT REFUSÉ 2 REFERE POUR PALUDISME GRAVE 3 REFERE POUR ENFANT PRENANT DÉJÀ DE LA CTA 4 AUTRE 6	MÉDICAMENT DONNÉ 1 MÉDICAMENT REFUSÉ 2 REFERE POUR PALUDISME GRAVE 3 REFERE POUR ENFANT PRENANT DÉJÀ DE LA CTA 4 AUTRE 6	MÉDICAMENT DONNÉ 1 MÉDICAMENT REFUSÉ 2 REFERE POUR PALUDISME GRAVE 3 REFERE POUR ENFANT PRENANT DÉJÀ DE LA CTA 4 AUTRE 6															
132	RETOURNEZ À Q.103 À LA COLONNE SUIVANTE DE CE QUESTIONNAIRE OU À LA PREMIERE COLONNE DE LA PAGE SUIVANTE; S'IL N'Y A PLUS D'ENFANTS, ALLEZ À 201.																		

POIDS, TAILLE, HÉMOGLOBINE, ET PALUDISME CHEZ LES ENFANTS DE 0-5 ANS

101	VÉRIFIEZ COLONNE 11 DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE ET LE NOM DE TOUS LES ENFANTS ÉLIGIBLES DE 0-5 ANS À Q.102; S'IL Y A PLUS DE 6 ENFANTS, UTILISEZ UN/DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES.			
		ENFANT 4	ENFANT 5	ENFANT 6
102	VÉRIFIEZ NUMÉRO DE LIGNE DE LA COL.11 DANS LE TABLEAU MÉNAGE. NOM DE LA COL. 2	NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____
103	SI LA MÈRE EST ENQUÊTÉE : COPIEZ LA DATE DE NAISSANCE DE L'ENFANT (JOUR, MOIS ET ANNÉE) DU TABLEAU DES NAISSANCES. SI LA MÈRE N'EST PAS ENQUÊTÉE : DEMANDEZ : Quelle est la date de naissance de (NOM) ?	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
104	VÉRIFIEZ 103: ENFANT NÉ EN 2012-2017?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 137) ←	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 137) ←	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 137) ←
105	POIDS EN KILOGRAMMES.	KG.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENT 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996	KG.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENT 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996	KG.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENT 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996
106	TAILLE EN CENTIMÈTRES.	CM.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENT..... 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996 (ALLEZ À 107A) ←	CM.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENT..... 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996 (ALLEZ À 107A) ←	CM.... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENT..... 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996 (ALLEZ À 107A) ←
107	MESURÉ ALLONGÉ OU DEBOUT ?	ALLONGÉ 1 DEBOUT 2	ALLONGÉ 1 DEBOUT 2	ALLONGÉ 1 DEBOUT 2
108	MESUREUR: INSCRIVEZ VOTRE NUMÉRO D'AGENT DE TERRAIN	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN

POIDS, TAILLE, HÉMOGLOBINE, ET PALUDISME CHEZ LES ENFANTS DE 0-5 ANS

101	VÉRIFIEZ COLONNE 11 DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE ET LE NOM DE TOUS LES ENFANTS ÉLIGIBLES DE 0-5 ANS À Q.102; S'IL Y A PLUS DE 6 ENFANTS, UTILISEZ UN/DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES.			
		ENFANT 4	ENFANT 5	ENFANT 6
102	VÉRIFIER NUMÉRO DE LIGNE DE LA COL.11 DANS LE TABLEAU MÉNAGE. NOM DE LA COL. 2	NUMÉRO DE LIGNE... [][] NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE... [][] NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE... [][] NOM _____
109	VÉRIFIEZ 103: EST-CE QUE L'ENFANT A 0-5 MOIS, C'EST-À-DIRE QU'IL EST NÉ DURANT LE MOIS DE L'ENQUÊTE OU DANS LES 5 MOIS PRÉCÉDENTS ?	0-5 MOIS 1] (ALLEZ À 132) ← PLUS ÂGÉ 2	0-5 MOIS 1] (ALLEZ À 132) ← PLUS ÂGÉ 2	0-5 MOIS 1] (ALLEZ À 132) ← PLUS ÂGÉ 2
110	No DE LIGNE DU PARENT/AUTRE ADULTE RESPONSABLE DE L'ENFANT DE LA COLONNE 1 DU TABLEAU MÉNAGE .	No DE LIGNE... [][] (INSCRIVEZ '00' SI NON LISTÉ)	No DE LIGNE... [][] (INSCRIVEZ '00' SI NON LISTÉ)	No DE LIGNE... [][] (INSCRIVEZ '00' SI NON LISTÉ)

CONSENTEMENT DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE POUR LE TEST D'ANÉMIE

111	DEMANDEZ LE CONSENTEMENT POUR LE TEST D'ANÉMIE AU PARENT/AUTRE ADULTE.	<p>Dans cette enquête, nous demandons à des gens dans tout le pays de participer au test d'anémie. L'anémie est un problème de santé sérieux qui résulte généralement d'une alimentation pauvre, d'infection ou de maladie chronique. Les résultats de cette enquête permettront d'aider le gouvernement à développer des programmes pour prévenir et traiter l'anémie. Nous demandons que tous les enfants nés en 2012, ou plus tard, participent au test d'anémie inclus dans cette enquête en donnant quelques gouttes de sang d'un doigt ou du talon. Pour ce test, on utilise un équipement propre et sans risque. Il n'a jamais été utilisé auparavant et il sera jeté après chaque test.</p> <p>Le sang sera testé pour l'anémie immédiatement et le résultat vous sera communiqué tout de suite. Les résultats sont strictement confidentiels et ne seront transmis à personne en dehors de l'équipe de l'enquête.</p> <p>Avez-vous des questions à me poser ? Vous pouvez dire oui ou non pour le test. C'est votre décision. Autorisez-vous (NOM DE L'ENFANT) à participer au test d'anémie ?</p>		
112	ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIÉ ET SIGNEZ.	ACCORDÉ 1] _____ ← (SIGNATURE) REFUS 2] ABSENT/AUTRE 3	ACCORDÉ 1] _____ ← (SIGNATURE) REFUS 2] ABSENT/AUTRE 3	ACCORDÉ 1] _____ ← (SIGNATURE) REFUS 2] ABSENT/AUTRE 3

CONSENTEMENT DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE POUR LE TEST DE PALUDISME

113	DEMANDEZ LE CONSENTEMENT POUR LE TEST DE PALUDISME AU PARENT/AUTRE ADULTE.	<p>Dans le cadre de cette enquête, nous demandons que les enfants dans tout le pays participent à un test pour vérifier s'ils ont ou non le paludisme. Le paludisme est un problème de santé sérieux causé par un parasite transmis par la piqûre d'un moustique. Cette enquête aidera le gouvernement à développer des programmes pour prévenir le paludisme.</p> <p>Nous demandons que tous les enfants nés en 2012 ou plus tard participent au test de paludisme inclus dans cette enquête en donnant quelques gouttes de sang d'un doigt ou du talon. Nous utiliserons le sang de la même piqûre au même doigt que pour le test d'anémie. Une goutte de sang sera testée pour le paludisme immédiatement et les résultats vous seront communiqués tout de suite. Un traitement sera proposé aux enfants présentant un paludisme simple s'ils ne sont pas déjà sur traitement. Les enfants avec paludisme grave seront référés à un établissement de santé. Quelques gouttes seront prélevées sur une ou des lames et envoyées à un laboratoire pour être testées. Les résultats du test de laboratoire ne vous seront pas divulgués. Les résultats sont strictement confidentiels et ne seront transmis à personne en dehors de l'équipe de l'enquête.</p> <p>Avez-vous des questions à me poser ? Vous pouvez dire oui ou non pour le test. C'est votre décision. Autorisez-vous (NOM DE L'ENFANT) à participer au test de paludisme?</p>		
114	ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIÉ ET SIGNEZ.	ACCORDÉ 1] _____ ← (SIGNATURE) REFUS 2] ABSENT/AUTRE 3	ACCORDÉ 1] _____ ← (SIGNATURE) REFUS 2] ABSENT/AUTRE 3	ACCORDÉ 1] _____ ← (SIGNATURE) REFUS 2] ABSENT/AUTRE 3

POIDS, TAILLE, HÉMOGLOBINE, ET PALUDISME CHEZ LES ENFANTS DE 0-5 ANS

101	VÉRIFIEZ COLONNE 11 DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE ET LE NOM DE TOUS LES ENFANTS ÉLIGIBLES DE 0-5 ANS À Q.102; S'IL Y A PLUS DE 6 ENFANTS, UTILISEZ UN/DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES.			
		ENFANT 4	ENFANT 5	ENFANT 6
102	VÉRIFIEZ NUMÉRO DE LIGNE DE LA COL.11 DANS LE TABLEAU MÉNAGE. NOM DE LA COL. 2	NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____
115	PRÉPAREZ L'EQUIPEMENT ET LES FOURNITURES SEULEMENT POUR LE/LES TESTS POUR LESQUELS VOUS AVEZ OBTENU LE CONSENTEMENT ET CONTINUEZ AVEC LE/LES TESTS.			
116	PLACEZ LES ÉTIQUETTES CODE BARRE.	<p align="center">COLLEZ LA 1^{re} ÉTIQUETTE CODE BARRE.</p> <p>ABSENTE 99994 A REFUSÉ 99995 AUTRE 99996</p> <p>COLLEZ LA 2^{ème} ÉTIQUETTE CODE BARRE SUR LE TDR , LA 3^{ème} SUR LA LAME GOUTTE ÉPAISSE, ET LA 4^{ème} SUR LA FICHE DE TRANSMISSION PALU</p>	<p align="center">LEZ LA 1^{re} ÉTIQUETTE CODE BARRE.</p> <p>ABSENTE 99994 A REFUSÉ 99995 AUTRE 99996</p> <p>COLLEZ LA 2^{ème} ÉTIQUETTE CODE BARRE SUR LE TDR , LA 3^{ème} SUR LA LAME GOUTTE ÉPAISSE, ET LA 4^{ème} SUR LA FICHE DE TRANSMISSION PALU</p>	<p align="center">LEZ LA 1^{re} ÉTIQUETTE CODE BARRE.</p> <p>ABSENTE 99994 A REFUSÉ 99995 AUTRE 99996</p> <p>COLLEZ LA 2^{ème} ÉTIQUETTE CODE BARRE SUR LE TDR , LA 3^{ème} SUR LA LAME GOUTTE ÉPAISSE, ET LA 4^{ème} SUR LA FICHE DE TRANSMISSION PALU</p>
117	INSCRIVEZ LE NIVEAU D'HÉMOGLOBINE ICI ET DANS LA BROCHURE ANÉMIE ET PALUDISME.	G/DL <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> REFUS 995 AUTRE 996	G/DL <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> REFUS 995 AUTRE 996	G/DL <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> REFUS 995 AUTRE 996
118	ENREGISTREZ LE CODE DU RÉSULTAT DU TDR DU PALUDISME.	TESTÉ 1 ABSENT 2 REFUS 4 AUTRE 5 (ALLEZ À 120) ←	TESTÉ 1 ABSENT 2 REFUS 4 AUTRE 5 (ALLEZ À 120) ←	TESTÉ 1 ABSENT 2 REFUS 4 AUTRE 5 (ALLEZ À 120) ←
119	ENREGISTREZ LE RESULTAT DU TDR DU PALUDISME ICI ET DANS LA BROCHURE SUR L'ANÉMIE ET LE PALUDISME.	POSITIF FALCIPARUM . 1 POSITIF VIVAX ... 2 POSITIF FALCIPARUM ET VIVAX 3 (ALLEZ À 122) ← NÉGATIF 4 AUTRE 6	POSITIF FALCIPARUM . 1 POSITIF VIVAX .. 2 POSITIF FALCIPARUM ET VIVAX 3 (ALLEZ À 122) ← NÉGATIF 4 AUTRE 6	POSITIF FALCIPARUM . 1 POSITIF VIVAX .. 2 POSITIF FALCIPARUM ET VIVAX 3 (ALLEZ À 122) ← NÉGATIF 4 AUTRE 6
120	VÉRIFIEZ 122: NIVEAU D'HÉMOGLOBINE	EN-DESSOUS DE 8.0 G/DL ANÉMIE SÉVÈRE 1 8.0 G/DL OU PLUS 2 ABSENT 3 REFUS 4 AUTRE 6 (ALLEZ À 132) ←	EN-DESSOUS DE 8.0 G/DL ANÉMIE SÉVÈRE 1 8.0 G/DL OU PLUS 2 ABSENT 3 REFUS 4 AUTRE 6 (ALLEZ À 132) ←	EN-DESSOUS DE 8.0 G/DL ANÉMIE SÉVÈRE 1 8.0 G/DL OU PLUS 2 ABSENT 3 REFUS 4 AUTRE 6 (ALLEZ À 132) ←

POIDS, TAILLE, HÉMOGLOBINE, ET PALUDISME CHEZ LES ENFANTS DE 0-5 ANS

101	VÉRIFIEZ COLONNE 11 DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE ET LE NOM DE TOUS LES ENFANTS ÉLIGIBLES DE 0-5 ANS À Q.102; S'IL Y A PLUS DE 6 ENFANTS, UTILISEZ UN/DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES.			
		ENFANT 4	ENFANT 5	ENFANT 6
102	VÉRIFIEZ NUMÉRO DE LIGNE DE LA COL.11 DANS LE TABLEAU MÉNAGE. NOM DE LA COL. 2	NUMÉRO DE LIGNE... [][] NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE... [][] NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE... [][] NOM _____
121	DÉCLARATION DE REFERENCE POUR ANÉMIE SÉVÈRE.	Le test pour le diagnostic d'anémie montre que (NOM DE L'ENFANT) a une anémie sévère. Votre enfant est sérieusement malade et doit être amené à un établissement de santé immédiatement. ALLEZ À 132		
122	Est-ce que (NOM) souffre d'une des maladies suivantes ou présente un ou des symptômes suivants: a Faiblesse extrême? b Problèmes cardiaques? c Perte de conscience? d Respiration rapide ou difficulté de respirer? e Convulsions? f Saignements anormaux? g Jaunisse/peau jaune ? h Urine foncée? SI AUCUN DES SYMPTÔMES CI-DESSUS, ENCERCLEZ CODE Y.	FAIBLESSE EXTRÊME ... A PROBLÈME CARDIAQU . B PERTE CONSCIENCE ... C RESPIRATION RAPIDE ... D CONVULSIONS E SAIGNEMENTS F JAUNISSE G URINE FONCÉ H AUCUN DES SYMPTÔMES CI-DESSUS . Y	FAIBLESSE EXTRÊME .. A PROBLÈME CARDIAQU . B PERTE CONSCIENCE .. C RESPIRATION RAPIDE .. D CONVULSIONS E SAIGNEMENTS F JAUNISSE G URINE FONCÉ H AUCUN DES SYMPTÔMES CI-DESSUS . Y	FAIBLESSE EXTRÊME .. A PROBLÈME CARDIAQU . B PERTE CONSCIENCE .. C RESPIRATION RAPIDE .. D CONVULSIONS E SAIGNEMENTS F JAUNISSE G URINE FONCÉ H AUCUN DES SYMPTÔMES CI-DESSUS . Y
123	VÉRIFIEZ 122: Y A-T-IL UN CODE A-H ENCERCLÉ ?	UN CODE A-H ENCERCL 1 (ALLEZ À 125) ← SEUL CODE Y ENCERCLÉ 2	UN CODE A-H ENCERCL 1 (ALLEZ À 125) ← SEUL CODE Y ENCERCLÉ 2	UN CODE A-H ENCERCL 1 (ALLEZ À 125) ← SEUL CODE Y ENCERCLÉ 2
124	VÉRIFIEZ 117: NIVEAU D'HÉMOGLOBINE	EN-DESSOUS DE 8.0 G/DI 1 8.0 G/DL OU PLUS 2 ABSENT 3 REFUS 4 AUTRE 6 (ALLEZ À 126) ←	EN-DESSOUS DE 8.0 G/D 1 8.0 G/DL OU PLUS 2 ABSENT 3 REFUS 4 AUTRE 6 (ALLEZ À 126) ←	EN-DESSOUS DE 8.0 G/D 1 8.0 G/DL OU PLUS 2 ABSENT 3 REFUS 4 AUTRE 6 (ALLEZ À 126) ←
125	DÉCLARATION POUR REFERENCE POUR PALUDISME GRAVE.	Le test pour le diagnostic du paludisme montre que (NOM DE L'ENFANT) a du paludisme. Votre enfant a également des symptômes de paludisme grave. Le médicament que j'ai contre le paludisme n'aidera pas votre enfant, et je ne peux pas lui donner de traitement. Votre enfant est sérieusement malade et doit être amené tout de suite à un établissement de santé. ALLEZ À 131		

POIDS, TAILLE, HÉMOGLOBINE, ET PALUDISME CHEZ LES ENFANTS DE 0-5 ANS

101	VÉRIFIEZ COLONNE 11 DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE ET LE NOM DE TOUS LES ENFANTS ÉLIGIBLES DE 0-5 ANS À Q.102; S'IL Y A PLUS DE 6 ENFANTS, UTILISEZ UN/DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES.			
		ENFANT 4	ENFANT 5	ENFANT 6
102	VÉRIFIEZ NUMÉRO DE LIGNE DE LA COL.11 DANS LE TABLEAU MÉNAGE. NOM DE LA COL. 2	NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE..... <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____
126	Au cours des deux dernières semaines, est-ce que (NOM) a pris ou (NOM) prend-il de la CTA donné par un médecin, un centre de santé ou un agent de santé communautaire pour traiter le paludisme ? VÉRIFIEZ EN DEMANDANT DE VOIR LE TRAITEMENT.	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 128) ←	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 128) ←	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 128) ←
127	DÉCLARATION DE REFERENCE POUR LES ENFANTS PRENANT DÉJÀ UN MÉDICAMENT DE LA CTA.	Vous m'avez dit que (NOM DE L'ENFANT) a déjà reçu de la CTA pour le paludisme. Je ne peux pas vous donner une CTA supplémentaire. Cependant, le test montre qu'il/elle a du paludisme. Si votre enfant a de la fièvre pendant 2 jours après la dernière dose de CTA, vous devrez amener l'enfant au centre de santé le plus proche pour des examens plus approfondis. ALLEZ À 132		
128	LIRE LES INFORMATIONS POUR LE TRAITEMENT DU PALUDISME ET LA DÉCLARATION DE CONSENTEMENT AU PARENT OU AUTRE ADULTE RESPONSABLE POUR L'ENFANT.	Le test du paludisme montre que votre enfant a du paludisme. Nous pouvons vous donner gratuitement des médicaments. Le médicament est appelé CTA. La CTA est très efficace et d'ici quelques jours, il n'aura plus de fièvre, ni d'autres symptômes. Vous n'êtes pas obligé de donner le médicament à l'enfant. C'est vous qui décidez. Dites-moi s'il vous plait, si vous acceptez, ou non, le médicament.		
129	ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIÉ ET APPOSEZ VOTRE SIGNATURE.	MÉDICAMENT ACCEPTÉ 1 (SIGNATURE) ← REFUS 2 AUTRE 6 (ALLEZ À 131) ←	MÉDICAMENT ACCEPTÉ 1 (SIGNATURE) ← REFUS 2 AUTRE 6 (ALLEZ À 131) ←	MÉDICAMENT ACCEPTÉ 1 (SIGNATURE) ← REFUS 2 AUTRE 6 (ALLEZ À 131) ←

POIDS, TAILLE, HÉMOGLOBINE, ET PALUDISME CHEZ LES ENFANTS DE 0-5 ANS

101	VÉRIFIEZ COLONNE 11 DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE ET LE NOM DE TOUS LES ENFANTS ÉLIGIBLES DE 0-5 ANS À Q.102; S'IL Y A PLUS DE 6 ENFANTS, UTILISEZ UN/DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES.																		
		ENFANT 4	ENFANT 5	ENFANT 6															
102	VÉRIFIEZ NUMÉRO DE LIGNE DE LA COL.11 DANS LE TABLEAU MÉNAGE. NOM DE LA COL. 2	NUMÉRO DE LIGNE..... <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE..... <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE..... <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> NOM _____															
130	TRAITEMENT POUR LES ENFANTS DONT LE TEST DU PALUDISME EST POSITIF.	<p>INSTRUCTION POUR LE DOSAGE</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">POIDS (en Kg)/ÂGE</th> <th colspan="3">TRAITEMENT</th> </tr> <tr> <th>Jour 1</th> <th>Jour 2</th> <th>Jour 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">4,5 à 8 kg (6 -11 mois)</td> <td>1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose)</td> <td>1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose)</td> <td>1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose)</td> </tr> <tr> <td align="center">9 -17 kg (1-5 ans)</td> <td>Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette)</td> <td>Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette)</td> <td>Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette)</td> </tr> </tbody> </table> <p>DITES AUSSI AU PARENT/ADULTE RESPONSABLE POUR L'ENFANT: Si [NOM] a une fièvre élevée, une respiration difficile ou rapide, s'il ne peut pas boire ou téter, si son état s'aggrave ou s'il ne va pas mieux dans les deux jours, vous devrez l'amener immédiatement voir un professionnel de santé pour qu'il soit traité.</p>			POIDS (en Kg)/ÂGE	TRAITEMENT			Jour 1	Jour 2	Jour 3	4,5 à 8 kg (6 -11 mois)	1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose)	1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose)	1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose)	9 -17 kg (1-5 ans)	Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette)	Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette)	Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette)
POIDS (en Kg)/ÂGE	TRAITEMENT																		
	Jour 1	Jour 2	Jour 3																
4,5 à 8 kg (6 -11 mois)	1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose)	1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose)	1 Comprimé de 25 mg d'Artésunate et 67.5 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Rose)																
9 -17 kg (1-5 ans)	Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette)	Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette)	Comprimé de 50 mg d'Artésunate et 135 mg d'Amodiaquine (Plaquette à Bande Violette)																
131	ENREGISTREZ LE CODE RÉSULTAT DU TRAITEMENT POUR LE PALUDISME OU DE LA FICHE DE REFERENCE.	MÉDICAMENT DONNÉ 1 MÉDICAMENT REFUSÉ 2 REFERE POUR PALUDISME GRAVE 3 REFERE POUR ENFANT PRENANT DÉJÀ DE LA CTA 4 AUTRE 6	MÉDICAMENT DONNÉ 1 MÉDICAMENT REFUSÉ 2 REFERE POUR PALUDISME GRAVE 3 REFERE POUR ENFANT PRENANT DÉJÀ DE LA CTA 4 AUTRE 6	MÉDICAMENT DONNÉ 1 MÉDICAMENT REFUSÉ 2 REFERE POUR PALUDISME GRAVE 3 REFERE POUR ENFANT PRENANT DÉJÀ DE LA CTA 4 AUTRE 6															
132	RETOURNEZ À Q.103 À LA COLONNE SUIVANTE DE CE QUESTIONNAIRE OU À LA PREMIERE COLONNE DE LA PAGE SUIVANTE; S'IL N'Y A PLUS D'ENFANTS, ALLEZ À 201.																		

MESURE DU POIDS, DE LA TAILLE ET DU NIVEAU D'HÉMOGLOBINE DES FEMMES DE 15-49 ANS

201	VÉRIFIER LA COLONNE 9 DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE, LE NOM, L'ÂGE ET LE STATUT MATRIMONIAL DE TOUTES LES FEMMES ÉLIGIBLES AUX QUESTIONS 202, 203 ET 204. S'IL Y A PLUS DE 3 FEMMES, UTILISEZ UN/DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES.			
		FEMME 1	FEMME 2	FEMME 3
202	VÉRIFIEZ LE TABLEAU MÉNAGE : NUMÉRO DE LIGNE DE LA COLONNE 9. NOM DE LA COLONNE 2.	NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____
203	VÉRIFIEZ LE TABLEAU MÉNAGE COLONNE 7 (ÂGE) :	15-17 ANS 1 18-49 ANS 2	15-17 ANS 1 18-49 ANS 2	15-17 ANS 1 18-49 ANS 2
204	VÉRIFIEZ LE TABLEAU MÉNAGE COLONNE 8 (STATUT MATRIMONIAL) :	CODE 4 (JAMAIS EN UNION) 1 AUTRE 2	CODE 4 (JAMAIS EN UNION) 1 AUTRE 2	CODE 4 (JAMAIS EN UNION) 1 AUTRE 2
205	POIDS EN KILOGRAMMES.	KG. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . ABSENTE 99994 REFUS 99995 AUTRE 99996	KG. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . ABSENTE 99994 REFUS 99995 AUTRE 99996	KG. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . ABSENTE 99994 REFUS 99995 AUTRE 99996
206	TAILLE EN CENTIMÈTRES.	CM. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . ABSENTE 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996	CM. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . ABSENTE 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996	CM. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . ABSENTE 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996
207	MESUREUR: INSCRIVEZ VOTRE NUMÉRO L'AGENT DE TERRAIN.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN
208	VÉRIFIEZ 203 : ÂGE	15-17 ANS 1 18-49 ANS 2 (ALLEZ À 210) ←	15-17 ANS 1 18-49 ANS 2 (ALLEZ À 210) ←	15-17 ANS 1 18-49 ANS 2 (ALLEZ À 210) ←
209	VÉRIFIEZ 204 : STATUT MATRIMONIAL	CODE 4 (JAMAIS EN UNION) 1 AUTRE 2 (ALLEZ À 212) ←	CODE 4 (JAMAIS EN UNION) 1 AUTRE 2 (ALLEZ À 212) ←	CODE 4 (JAMAIS EN UNION) 1 AUTRE 2 (ALLEZ À 212) ←

MESURE DU POIDS, DE LA TAILLE ET DU NIVEAU D'HÉMOGLOBINE DES FEMMES DE 15-49 ANS

		FEMME 1	FEMME 2	FEMME 3
NOM DE LA COLONNE 2.		NOM _____	NOM _____	NOM _____
CONSENTEMENT DE L'ENQUÊTEE ADULTE POUR LE TEST D'ANEMIE				
C O N S E N T E M E N T A D U L T E	210	<p>DEMANDEZ LE CONSENTEMENT POUR LE TEST D'ANÉMIE.</p> <p>Dans cette enquête, nous demandons à des gens dans tout le pays de participer au test d'anémie. L'anémie est un problème de santé sérieux qui résulte généralement d'une alimentation pauvre, d'infection ou de maladie chronique. Les résultats de cette enquête permettront d'aider le gouvernement à développer des programmes pour prévenir et traiter l'anémie.</p> <p>Pour le test d'anémie, nous avons besoins de quelques gouttes de sang d'un doigt. Pour ce test, on utilise un équipement propre et sans risque. Il n'a jamais été utilisé auparavant et il sera jeté après chaque test. Le sang sera testé pour l'anémie immédiatement et le résultat vous sera communiqué tout de suite. Les résultats sont strictement confidentiels et ne seront transmis à personne en dehors de l'équipe de l'enquête.</p> <p>Avez-vous des questions à me poser ? Vous pouvez dire oui ou non pour le test. C'est votre décision. Voulez-vous participer au test d'anémie ?</p>		
	211	<p>ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIÉ ET SIGNEZ.</p> <p>ACCORDÉ 1 } ENQUÊTÉE REFUSE 2 } ←</p> <p>_____ (SIGNATURE) (SI REFUS, ALLEZ À 217)</p> <p>ABSENTE/AUTRE 3 } (ALLEZ À 217) ←</p>	<p>ACCORDÉ 1 } ENQUÊTÉE REFUSE 2 } ←</p> <p>_____ (SIGNATURE) (SI REFUS, ALLEZ À 217)</p> <p>ABSENTE/AUTRE 3 } (ALLEZ À 217) ←</p>	<p>ACCORDÉ 1 } ENQUÊTÉE REFUSE 2 } ←</p> <p>_____ (SIGNATURE) (SI REFUS, ALLEZ À 217)</p> <p>ABSENTE/AUTRE 3 } (ALLEZ À 217) ←</p>
	211A	<p>VÉRIFIEZ 226 DANS QUESTIONNAIRE FEMME OU DEMANDEZ : Êtes-vous enceinte ?</p> <p>OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8</p> <p>OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8</p> <p>OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8</p>		

CONSENTEMENT DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE POUR LE TEST D'ANEMIE				
P A R E N T A D U L T E R E S P .	212	<p>DEMANDEZ LE CONSENTEMENT DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE POUR LE TEST D'ANÉMIE.</p> <p>Dans cette enquête, nous demandons à des gens dans tout le pays de participer au test d'anémie. L'anémie est un problème de santé sérieux qui résulte généralement d'une alimentation pauvre, d'infection ou de maladie chronique. Les résultats de cette enquête permettront d'aider le gouvernement à développer des programmes pour prévenir et traiter l'anémie.</p> <p>Pour le test d'anémie, nous avons besoin de gouttes de sang d'un doigt. Pour ce test, on utilise un équipement propre et sans risque. Il n'a jamais été utilisé auparavant et sera jeté après chaque test. Le sang sera testé pour l'anémie immédiatement et le résultat vous sera communiqué à vous et à (NOM DU MINEUR} tout de suite. Les résultats sont strictement confidentiels et ne seront transmis à personne en dehors de l'équipe de l'enquête.</p> <p>Avez-vous des questions à me poser ? Vous pouvez dire oui ou non. C'est votre décision.</p>		
	213	<p>ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIÉ ET SIGNEZ.</p> <p>ACCORDÉ 1 } PARENT/AUTRE ADULTE RESPONSABLE A REFUSÉ 2 } ←</p> <p>_____ (SIGNATURE) (SI REFUS, ALLEZ À 217)</p> <p>ABSENTE/AUTRE 3 } (ALLEZ À 217) ←</p>	<p>ACCORDÉ 1 } PARENT/AUTRE ADULTE RESPONSABLE A REFUSÉ 2 } ←</p> <p>_____ (SIGNATURE) (SI REFUS, ALLEZ À 217)</p> <p>ABSENTE/AUTRE 3 } (ALLEZ À 217) ←</p>	<p>ACCORDÉ 1 } PARENT/AUTRE ADULTE RESPONSABLE A REFUSÉ 2 } ←</p> <p>_____ (SIGNATURE) (SI REFUS, ALLEZ À 217)</p> <p>ABSENTE/AUTRE 3 } (ALLEZ À 217) ←</p>

MESURE DU POIDS, DE LA TAILLE ET DU NIVEAU D'HÉMOGLOBINE DES FEMMES DE 15-49 ANS

		FEMME 1	FEMME 2	FEMME 3
	NOM DE LA COLONNE 2.	NOM _____	NOM _____	NOM _____
C O N S E N T E M E N T D E M I N E U R E	214	<p>DEMANDEZ LE CONSENTEMENT DE L'ENQUÊTÉE MINEURE POUR LE TEST D'ANÉMIE.</p> <p>Dans cette enquête, nous demandons à des gens dans tout le pays de participer au test d'anémie. L'anémie est un problème de santé sérieux qui résulte généralement d'une alimentation pauvre, d'infection ou de maladie chronique. Les résultats de cette enquête permettront d'aider le gouvernement à développer des programmes pour prévenir et traiter l'anémie.</p> <p>Pour le test d'anémie, nous avons besoin de gouttes de sang d'un doigt. Pour ce test, on utilise un équipement propre et sans risque. Il n'a jamais été utilisé auparavant et sera jeté après chaque test. Le sang sera testé pour l'anémie immédiatement et le résultat vous sera communiqué à vous et à (NOM DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE) tout de suite. Les résultats sont strictement confidentiels et ne seront transmis à personne en dehors de l'équipe de l'enquête.</p> <p>Avez-vous des questions à me poser ? Vous pouvez dire oui ou non. C'est votre décision.</p>		
	215	<p>ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIÉ ET SIGNEZ.</p> <p>ACCORDÉ 1 } ENQUÊTÉ MINEUR A REFUSÉ 2 } ←</p> <p>_____ (SIGNATURE) (SI REFUS, ALLEZ À 217)</p> <p>ABSENTE/AUTRE 3 } (ALLEZ À 217) ←</p>	<p>ACCORDÉ 1 } ENQUÊTÉ MINEUR A REFUSÉ 2 } ←</p> <p>_____ (SIGNATURE) (SI REFUS, ALLEZ À 217)</p> <p>ABSENTE/AUTRE 3 } (ALLEZ À 217) ←</p>	<p>ACCORDÉ 1 } ENQUÊTÉ MINEUR A REFUSÉ 2 } ←</p> <p>_____ (SIGNATURE) (SI REFUS, ALLEZ À 217)</p> <p>ABSENTE/AUTRE 3 } (ALLEZ À 217) ←</p>
	215A	<p>VÉRIFIEZ 226 DANS QUESTIONNAIRE FEMME OU DEMANDEZ : #N/A</p> <p>OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8</p>	<p>OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8</p>	<p>OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8</p>
	216	<p>INSCRIVEZ LE NIVEAU D'HÉMOGLOBINE ICI ET DANS LA BROCHURE ANÉMIE .</p> <p>G/DL <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/></p> <p>ABSENTE 994 REFUS 995 AUTRE 996</p>	<p>G/DL <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/></p> <p>ABSENTE 994 REFUS 995 AUTRE 996</p>	<p>G/DL <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/></p> <p>ABSENTE 994 REFUS 995 AUTRE 996</p>
	217	<p>RETOURNEZ À 202 À LA COLONNE SUIVANTE DE CE QUESTIONNAIRE OU À LA PREMIÈRE COLONNE D'UN QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE; SI PLUS DE FEMMES, FIN ENQUÊTE.</p>		

AUTRES OUTILS DU PROGRAMME DHS

Le Website du DHS Program – Télécharger gratuitement les rapports DHS, la documentation standard, les données sur les indicateurs clé ainsi que les outils de formation et les annonces.	DHSprogram.com		
STATcompiler – Créer des tableaux, des graphiques et des cartes personnalisés, en utilisant les données de 90 pays et des milliers d'indicateurs.	Statcompiler.com		
Programme DHS pour les appareils mobiles – Accéder aux indicateurs clés DHS pour 90 pays sur votre appareil mobile (Apple, Android, ou Windows).	Recherchez DHS Program dans iTunes ou Google Play Store		
Programme DHS pour utiliser les forum – Poster des questions sur les données DHS et rechercher les FAQ.	userforum.DHSprogram.com		
Vidéos d'animation – Regarder les interviews avec des experts et apprendre les bases de DHS, comme l'échantillonnage et la pondération, télécharger des ensembles de données et apprendre comment lire les tableaux DHS.	www.youtube.com/DHSProgram		
Ensemble de données – Télécharger des ensembles de données pour l'analyse.	DHSprogram.com/Data		
Spatial Data Repository – Télécharger des données démographiques et de santé localisées géographiquement pour les représenter sous forme de carte dans un système d'information géographique (SIG).	spatialdata.DHSprogram.com		
Media sociaux – Suivre le DHS Program et participer aux discussions. Rester en contact par l'intermédiaire de :			
 Facebook www.facebook.com/DHSprogram		 LinkedIn www.linkedin.com/company/dhs-program	
 YouTube www.youtube.com/DHSprogram		 Blog Blog.DHSprogram.com	
 Twitter www.twitter.com/DHSprogram			