

Monique BARRÈRE

Au Cameroun, l'infection à VIH constitue un véritable problème de santé publique. Elle représente une cause importante de mortalité avec un impact négatif sur le développement économique et social du pays. Dès 1986 le Gouvernement a créé un Comité Technique de Lutte contre le Sida ; en 1987 un Programme National de Lutte contre le Sida est mis en place. Les orientations actuelles de la lutte contre le sida au Cameroun sont consignées dans le « *Plan stratégique national de lutte contre le sida au Cameroun 2000-2005* » lancé en septembre 2000 par le Premier Ministre. Le renforcement du système de surveillance épidémiologique du VIH/sida et des IST mis en place depuis 1989 constitue un des axes stratégiques majeurs de ce plan. Ce renforcement vise à mettre à la disposition de tous les acteurs les informations permettant d'évaluer les tendances, de prévoir la gravité de la maladie et d'estimer l'impact des interventions.

Pendant les dix premières années du programme, le système de surveillance épidémiologique du VIH mis en place depuis 1989 a utilisé comme principale source d'information, la prévalence du VIH provenant d'un réseau des sites sentinelles auprès des femmes enceintes et la notification des cas de sida. Ce système n'est pas suffisamment équipé pour rendre compte de la diversité de l'épidémie. Il est limité notamment en ce qui concerne les données qualitatives.

Dans le cas des pays à « épidémie généralisée¹ » comme le Cameroun, le système de surveillance devrait mettre l'accent sur le suivi de l'infection à VIH et des comportements à hauts risques au sein de la population générale et de groupes spécifiques. En effet, l'efficacité des mesures de prévention dépend non seulement de la connaissance de l'ampleur² et du rythme de propagation de l'épidémie mais aussi de l'identification des comportements, des attitudes et des pesanteurs socioculturelles qui posent problème. Un important volet de l'EDSC-III a été consacré à la collecte des données qualitatives sur la pandémie du VIH/sida ainsi que sur les IST. L'objectif principal de ce chapitre est de présenter le niveau de connaissance sur le VIH/sida et les IST, les perceptions, les attitudes et les comportements au niveau national et régional ainsi que pour les sous groupes socio-économiques.

15.1 CONNAISSANCE, OPINIONS ET ATTITUDES

Le niveau de connaissance que la population a d'une maladie conditionne bien souvent son attitude et son comportement vis-à-vis de cette maladie. Pour cette raison, l'EDSC-III a collecté des informations qui ont permis de déterminer le niveau de connaissance du VIH/sida dans la population enquêtée.

Les informations présentées au tableau 15.1 montrent que la quasi-totalité des femmes (98 %) et des hommes (99 %) ont déclaré avoir entendu parler du VIH/sida. Comparées aux données recueillies au cours de l'EDSC-II en 1998, on constate que les proportions de femmes et d'hommes qui connaissent l'existence du VIH/sida ont augmenté, passant chez les femmes de 79 % à 98 %, et chez les hommes de 88 % à 99 %. En outre, ce niveau de connaissance est homogène car quelles que soient les caractéristiques socio-démographiques, plus de neuf enquêtés sur dix ont déclaré avoir entendu parler du VIH/sida.

¹ L'épidémie du VIH est dite généralisée lorsque l'infection est solidement installée dans la population générale et la prévalence du VIH est toujours supérieure à 1 % chez les femmes enceintes

² La prévalence du VIH dans la population fait l'objet du chapitre 16.

Tableau 15.1 Connaissance du sida

Pourcentage de femmes et d'hommes ayant entendu parler du sida, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, Cameroun 2004

Caractéristique socio-démographique	Femmes		Hommes	
	Entendu parler du sida	Effectif	Entendu parler du sida	Effectif
Âge				
15-24	97,8	4 936	99,0	2 177
15-19	97,4	2 684	98,6	1 224
20-24	98,2	2 252	99,5	953
25-29	98,4	1 747	99,9	812
30-39	98,2	2 430	99,2	1 087
40-49	96,7	1 543	99,2	738
État matrimonial				
Célibataire	97,6	2 560	98,8	2 112
A déjà eu des rapports sexuels	99,1	1 194	99,6	1 261
N'a jamais eu de rapports sexuels	96,3	1 366	97,6	850
En union	97,8	7 166	99,7	2 271
Divorcé/séparé/veuf	98,6	930	98,8	433
Milieu de résidence				
Yaoundé/Douala	99,9	2 277	99,6	1 167
Autres villes	99,1	3 559	99,5	1 645
Ensemble urbain	99,4	5 836	99,5	2 812
Rural	95,9	4 820	98,8	2 003
Région				
Adamaoua	96,4	416	100,0	214
Centre	97,9	854	98,5	368
Douala	99,8	1 197	99,6	598
Est	93,8	506	98,4	249
Extrême-Nord	96,0	1 718	98,7	620
Littoral	99,2	482	98,8	208
Nord	93,1	975	99,1	434
Nord-Ouest	99,9	1 090	99,3	506
Ouest	98,4	1 142	100,0	411
Sud	99,4	439	99,1	223
Sud-Ouest	99,4	757	99,2	415
Yaoundé	100,0	1 080	99,6	568
Niveau d'instruction				
Aucun	93,5	2 383	97,6	467
Primaire	98,2	4 109	98,6	1,736
Secondaire ou plus	100,0	4 163	99,9	2,612
Quintile de bien-être économique				
Le plus pauvre	94,0	2 007	99,1	650
Second	95,7	1 756	98,5	792
Moyen	98,7	2 046	98,9	906
Quatrième	99,7	2 283	99,2	1 110
Le plus riche	99,9	2 566	99,9	1 357
Ensemble	97,8	10 656	99,2	4 815

15.1.1 Connaissance des moyens de prévention et de transmission

La connaissance par la population des moyens de prévention est indispensable si l'on veut lutter efficacement contre la propagation du virus qui cause le sida. Au cours de l'EDSC-III, on a donc demandé aux enquêtés ce qui pouvait être fait pour éviter de contracter ce virus. À cette question, plus de deux femmes sur trois (69 %) et une proportion plus élevée d'hommes (82 %) ont déclaré qu'on pouvait limiter ses risques de contracter le VIH/sida en utilisant des condoms. En outre, 81 % des femmes et 88 %

Tableau 15.2 Connaissance des moyens de prévention du VIH

Pourcentage de femmes et d'hommes qui, en réponse à une question déterminée, déclarent qu'on peut réduire le risque de contracter le virus du sida en utilisant des condoms et en limitant les rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et qui n'est pas infecté, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, Cameroun 2004

Caractéristique socio-démographique	Femmes					Hommes				
	Utilisant des condoms	Limitant les rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et non infecté	Utilisant des condoms et en limitant les rapports sexuels à un seul partenaire non infecté	S'abstenant de rapports sexuels	Effectif d'enquêtées	Utilisant des condoms	Limitant les rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et non infecté	Utilisant des condoms et en limitant les rapports sexuels à un seul partenaire non infecté	S'abstenant de rapports sexuels	Effectif d'enquêtés
Âge										
15-24	71,2	80,8	63,6	76,8	4 936	82,8	84,5	73,0	82,3	2 177
15-19	70,3	78,5	61,4	76,3	2 684	80,7	82,0	69,8	81,7	1 224
20-24	72,2	83,6	66,1	77,3	2 252	85,6	87,6	77,2	83,0	953
25-29	69,7	84,1	63,7	78,4	1 747	84,5	90,4	78,0	84,4	812
30-39	68,0	81,8	61,8	78,6	2 430	82,3	90,2	76,5	84,6	1 087
40-49	61,0	79,2	55,3	76,7	1 543	78,0	89,3	72,0	82,6	738
État matrimonial										
Célibataire	75,2	81,2	67,0	78,7	2 560	82,4	83,8	72,4	83,0	2 112
A déjà eu des rapports sexuels	83,1	86,7	76,1	79,8	1 194	87,4	86,9	78,1	84,2	1 261
N'a jamais eu de rapports sexuels	68,3	76,3	59,1	77,7	1 366	75,0	79,3	63,9	81,1	850
En union	66,3	81,3	60,1	76,8	7 166	81,0	90,6	75,1	83,7	2 271
Divorcé/séparé/veuf	70,0	82,4	63,1	79,0	930	88,2	89,4	81,7	81,7	433
Milieu de résidence										
Yaoundé/Douala	79,8	87,3	73,2	75,6	2 277	85,4	79,5	70,8	79,9	1 167
Autres villes	74,7	83,8	67,0	81,2	3 559	81,9	89,8	75,6	83,3	1 645
Ensemble urbain	76,7	85,2	69,4	79,0	5 836	83,3	85,5	73,6	81,8	2 812
Rural	59,1	76,7	53,0	75,5	4 820	80,7	90,3	75,8	85,1	2 003
Région										
Adamaoua	48,8	82,7	45,0	83,0	416	81,2	93,4	77,5	90,1	214
Centre	75,0	78,2	66,4	74,6	854	93,8	92,2	89,4	91,5	368
Douala	81,4	89,3	76,7	78,1	1 197	87,1	74,9	68,1	82,9	598
Est	61,7	78,9	56,7	63,4	506	77,7	82,9	69,9	72,5	249
Extrême-Nord	52,9	82,7	48,8	72,3	1 718	73,2	92,5	70,0	87,1	620
Littoral	69,9	82,2	62,5	72,7	482	87,4	84,9	77,4	81,4	208
Nord	41,4	51,5	34,2	66,1	975	78,7	84,1	70,2	82,7	434
Nord-Ouest	78,2	94,2	75,4	94,6	1 090	80,6	95,4	77,2	84,9	506
Ouest	74,9	76,3	60,5	79,8	1 142	73,7	87,2	65,7	77,0	411
Sud	82,0	84,5	73,0	80,1	439	87,0	87,7	80,4	81,8	223
Sud-Ouest	83,9	89,9	78,3	92,0	757	89,0	93,8	84,9	88,4	415
Yaoundé	78,1	85,2	69,4	72,9	1 080	83,6	84,2	73,7	76,7	568
Niveau d'instruction										
Aucun	40,4	68,4	35,6	67,9	2 383	62,8	87,6	59,5	81,4	467
Primaire	69,6	80,6	61,4	77,9	4 109	78,6	84,2	68,9	80,8	1 736
Secondaire ou plus	84,1	89,5	77,7	82,4	4 163	88,2	89,7	80,9	85,1	2 612
Quintile de bien-être économique										
Le plus pauvre	47,8	71,5	42,6	70,0	2 007	75,4	92,2	72,2	86,0	650
Second	59,9	77,6	53,7	75,7	1 756	79,3	89,2	73,9	83,6	792
Moyen	69,4	80,6	61,4	79,0	2 046	82,5	89,9	76,5	83,4	906
Quatrième	77,3	85,1	69,8	79,7	2 283	83,4	84,2	73,1	82,1	1 110
Le plus riche	83,0	88,9	76,4	81,2	2 566	86,1	85,3	75,7	82,3	1 357
Ensemble	68,7	81,4	62,0	77,4	10 656	82,2	87,5	74,5	83,2	4 815

des hommes ont cité la limitation des rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et non infecté comme moyen de prévention du VIH/sida. Globalement, 62 % des femmes et 75 % des hommes ont cité ces deux moyens de prévention. En fonction de l'âge, malgré des variations irrégulières, on note, chez les femmes, que ce sont les plus âgées qui connaissent le moins fréquemment ces deux moyens de prévention (55 % à 40-49 ans contre un maximum de 66 % à 20-24 ans) ; à Yaoundé/Douala (73 %), parmi celles ayant un niveau d'instruction au moins secondaire (78 %) et, parmi celles des ménages les plus riches (76 %), environ les trois-quarts ont cité ces deux moyens de prévention. Par contre, cette proportion est particulièrement faible parmi les femmes sans niveau d'instruction (36 %), parmi celles du milieu rural (53 %) ; de même, dans les régions du Nord (34 %) et de l'Adamaoua (45 %), ces proportions sont plus faibles qu'ailleurs. Signalons aussi que pour 77 % des femmes, l'abstinence sexuelle est un moyen de prévention du VIH/sida.

Chez les hommes, les écarts selon les caractéristiques socio-démographiques sont très faibles et les variations sont pratiquement identiques à celles constatées chez les femmes; les hommes sans niveau d'instruction (60 %), les célibataires (72 %) et ceux des ménages les plus pauvres (72 %) sont ceux qui ont le moins fréquemment cité ces deux moyens de se protéger du VIH/sida. Dans les régions, les proportions varient d'un maximum de 89 % dans le Centre à un minimum de 66 % à l'Ouest. En outre, une proportion d'hommes voisine de celle des femmes (75 % contre 77 %) a cité l'abstinence comme moyen de prévention du VIH/sida.

Les conceptions erronées sur l'infection à VIH et le sida conditionnent les attitudes et les comportements vis-à-vis de cette infection. Au cours de l'enquête, une série de propositions ont été soumises aux enquêtés pour mesurer leur niveau de connaissance correcte concernant la transmission et la prévention du virus. Les résultats sont présentés aux tableaux 15.3.1 et 15.3.2.

On constate que plus des deux tiers des femmes (67%) savent qu'une personne en bonne santé peut néanmoins avoir le virus du sida. En outre, un peu moins de la moitié (46 %) savent que le sida ne peut pas être transmis par les moustiques. Pour plus d'une femme sur deux (57 %), le sida ne se transmet pas par des moyens surnaturels, et dans les deux tiers des cas (65 %), les femmes ont déclaré qu'une personne ne peut pas être infectée en partageant la nourriture de quelqu'un atteint du sida.

Globalement, seulement un peu plus du quart des femmes (28 %) rejettent les deux idées erronées les plus courantes sur la transmission, à savoir qu'on ne peut ni contracter le virus du sida par des moyens surnaturels, ni par des piqûres de moustiques. De plus, elles savent qu'une personne en bonne santé peut néanmoins avoir contracté le virus du sida. L'avant-dernière colonne du tableau présente les proportions de femmes qui ont une connaissance considérée comme complète du VIH/sida. En d'autres termes, elles savent qu'on peut réduire le risque de contracter le virus du sida en utilisant des condoms et en limitant les rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et qui n'est pas infecté. En plus, elles rejettent les idées erronées les plus courantes à propos de la transmission du sida, et savent qu'une personne paraissant en bonne santé peut avoir le virus du sida. Un peu plus d'une femme sur cinq (23 %) peut être considérée comme ayant une bonne connaissance générale concernant le sida.

Les proportions de femmes ayant une connaissance complète diffèrent selon les caractéristiques socio-démographiques. Tout d'abord, on constate que les femmes les plus jeunes possèdent plus fréquemment que les plus âgées ces informations correctes (27 % à 15-24 ans contre 10 % à 45-49 ans). On constate également des écarts en fonction du statut matrimonial des femmes puisque la proportion de femmes qui ont une connaissance complète varie d'un minimum de 18 % et 21 % parmi celles en union et en rupture d'union, à un maximum de 43 % parmi les célibataires ayant déjà eu des rapports sexuels. Ces écarts reflètent les écarts selon l'âge puisque les célibataires sont généralement plus jeunes que les femmes en union et que celles en rupture d'union. Il faut ensuite souligner que ce niveau de connaissance complète est particulièrement faible parmi les femmes du milieu rural (12 %) alors qu'à Yaoundé/Douala,

la proportion de femmes bien informées est de 36 %. C'est en fonction du niveau d'instruction et du niveau de vie du ménage que les écarts sont les plus importants : en effet, la proportion de femmes ayant une connaissance complète varie de 5 % chez celles sans niveau d'instruction à 42 % chez celles ayant un niveau d'instruction au moins secondaire. En ce qui concerne le niveau de vie du ménage, cette proportion de femmes varie d'un minimum de 7 % dans les ménages les plus pauvres à un maximum de 42 % dans les ménages les plus riches. Enfin, dans les régions, on note que dans le Nord, une femme sur vingt (5 %) est correctement informée alors que cette proportion est de 33 % dans le Sud-Ouest.

Tableau 15.3.1 Idées erronées à propos du sida et connaissance « complète » du sida : femmes

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui, en réponse à une question déterminée, rejettent des idées locales erronées à propos de la transmission ou de la prévention du sida, et qui savent qu'une personne paraissant en bonne santé peut avoir le virus du sida et pourcentage qui ont une connaissance « complète » du sida, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, Cameroun 2004

Caractéristique socio-démographique	Pourcentage d'enquêtées qui savent que :				Pourcentage rejetant les 2 idées erronées les plus courantes ¹ et sachant qu'une personne paraissant en bonne santé peut avoir le virus du sida	Pourcentage ayant une connaissance complète ² du sida	Effectif d'enquêtées
	Une personne paraissant en bonne santé peut avoir le virus du sida	Le sida ne peut pas être transmis par les moustiques	Le sida ne peut pas être transmis par des moyens surnaturels	Une personne ne peut pas être infectée en partageant les repas d'un malade du sida			
Âge							
15-19	65,5	55,0	66,6	72,3	35,0	26,5	2 684
20-24	70,5	50,6	62,4	69,3	34,5	28,4	2 252
25-29	68,7	46,1	57,3	66,1	28,7	23,2	1 747
30-34	68,8	40,9	51,7	59,5	23,6	19,6	1 350
35-39	66,5	37,9	48,4	59,1	20,7	16,8	1 080
40-44	65,3	37,2	44,0	56,2	20,0	14,4	832
45-49	56,5	33,1	38,3	51,0	13,9	10,3	711
État matrimonial							
Célibataire	74,4	64,7	71,4	79,3	45,3	35,6	2 560
A déjà eu des rapports sexuels	84,3	68,0	74,4	86,2	50,4	42,5	1 194
N'a jamais eu de rapports sexuels	65,7	61,9	68,9	73,3	40,7	29,5	1 366
En union	63,5	39,9	52,2	60,1	22,6	18,0	7 166
Divorcée/séparée/veuve	73,2	43,9	51,9	63,8	26,4	21,2	930
Milieu de résidence							
Yaoundé/Douala	90,7	64,2	65,9	82,5	45,6	36,3	2 277
Autres villes	74,9	51,8	65,1	72,8	34,6	28,0	3 559
Ensemble urbain	81,1	56,6	65,4	76,6	38,9	31,2	5 836
Rural	49,9	33,7	46,4	51,0	15,6	11,9	4 820
Région							
Adamaoua	60,0	37,6	57,1	55,2	23,2	18,0	416
Centre	70,0	46,8	49,1	65,8	25,8	21,5	854
Douala	89,7	63,2	68,8	78,6	46,4	38,4	1 197
Est	63,8	45,8	59,1	64,8	28,1	22,0	506
Extrême-Nord	44,2	30,8	54,4	45,2	15,1	10,5	1 718
Littoral	78,5	47,4	61,9	70,8	29,9	23,0	482
Nord	26,3	26,2	25,8	38,2	8,2	5,1	975
Nord-Ouest	71,3	49,5	61,3	64,8	30,8	25,9	1 090
Ouest	65,5	45,9	68,2	72,2	29,4	22,4	1 142
Sud	80,8	44,6	36,1	75,4	20,2	15,8	439
Sud-Ouest	82,7	53,5	66,9	76,1	37,7	33,3	757
Yaoundé	91,9	65,4	62,7	86,8	44,8	33,9	1 080
Niveau d'instruction							
Aucun	32,2	24,1	39,1	35,1	7,9	4,7	2 383
Primaire	63,2	36,4	51,9	59,9	18,0	13,4	4 109
Secondaire ou plus	90,6	68,6	71,8	87,1	50,4	41,7	4 163
Quintile de bien-être économique							
Le plus pauvre	36,9	25,9	42,3	40,4	10,3	7,2	2 007
Second	49,1	31,8	46,3	50,2	13,6	10,6	1 756
Moyen	64,0	39,7	55,3	63,0	22,4	16,7	2 046
Quatrième	82,2	53,7	64,9	75,7	35,7	28,9	2 283
Le plus riche	91,5	70,6	69,3	86,6	50,9	41,5	2 566
Ensemble	67,0	46,2	56,8	65,0	28,4	22,5	10 656

¹ Les deux idées erronées les plus courantes sont la transmission par des moyens surnaturels et par les moustiques.

² Sont considérés comme ayant une connaissance « complète », les femmes qui déclarent qu'on peut réduire le risque de contracter le virus du sida en utilisant des condoms et en limitant les rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et qui n'est pas infecté, qui rejettent les idées locales erronées les plus courantes à propos de la transmission du sida, et qui savent qu'une personne paraissant en bonne santé peut avoir le virus du sida.

Les résultats concernant les hommes (tableau 15.3.2) montrent d'une part que les hommes sont proportionnellement plus nombreux que les femmes à avoir une connaissance correcte de la transmission du VIH/sida : huit hommes sur dix (80 %) savent qu'une personne en bonne santé peut néanmoins avoir le sida. D'autre part, plus de la moitié (54 %) savent que le sida ne peut pas être transmis par les moustiques, les trois-quarts (74 %) rejettent l'idée erronée selon laquelle le sida peut se transmettre par des moyens surnaturels, et la même proportion rejette l'idée selon laquelle le sida peut se transmettre en partageant le repas d'une personne infectée. Globalement, 39 % rejettent les idées erronées les plus courantes et savent qu'une personne en bonne santé peut néanmoins avoir le sida.

Tableau 15.3.2 Idées erronées à propos du sida et connaissance « complète » du sida : hommes

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui, en réponse à une question déterminée, rejettent des idées locales erronées à propos de la transmission ou de la prévention du sida, et qui savent qu'une personne paraissant en bonne santé peut avoir le virus du sida, et pourcentage qui ont une connaissance « complète » du sida selon certaines caractéristiques socio-démographiques, Cameroun 2004

Caractéristique socio-démographique	Pourcentage d'enquêtés qui savent que :				Pourcentage rejetant les 2 idées erronées les plus courantes ¹ et sachant qu'une personne paraissant en bonne santé peut avoir le virus du sida	Pourcentage ayant une connaissance complète ² du sida	Effectif d'enquêtés
	Une personne paraissant en bonne santé peut avoir le virus du sida	Le sida ne peut pas être transmis par les moustiques	Le sida ne peut pas être transmis par des moyens surnaturels	Une personne ne peut pas être infectée en partageant les repas d'un malade du sida			
Âge							
15-19	71,5	61,6	79,1	80,7	42,8	33,8	1 224
20-24	82,8	55,4	76,6	76,7	41,9	35,3	953
25-29	85,1	53,4	77,6	79,4	41,7	35,1	812
30-34	81,3	50,4	72,6	71,7	35,1	31,6	620
35-39	83,2	50,5	68,3	72,5	34,2	28,9	467
40-44	81,8	44,5	68,0	67,5	33,2	26,9	394
45-49	80,9	40,9	61,1	61,5	27,3	21,9	344
État matrimonial							
Célibataire	77,9	61,0	78,4	80,6	44,9	35,9	2 112
A déjà eu des rapports sexuels	85,0	63,0	79,2	83,5	48,5	40,1	1 261
N'a jamais eu de rapports sexuels	67,3	58,0	77,3	76,3	39,5	29,6	850
En union	81,4	47,0	71,2	70,4	33,0	28,5	2 271
Divorcé/séparé/veuf	82,6	51,6	70,3	74,8	38,6	33,4	433
Milieu de résidence							
Yaoundé/Douala	90,3	66,7	77,4	86,8	53,4	42,8	1 167
Autres villes	82,0	56,6	75,9	78,7	41,4	33,9	1 645
Ensemble urbain	85,5	60,8	76,5	82,1	46,4	37,6	2 812
Rural	72,2	43,5	71,1	65,7	28,0	24,5	2 003
Région							
Adamaoua	72,3	58,6	77,7	74,1	42,9	37,1	214
Centre	81,5	50,8	67,8	71,7	36,0	34,3	368
Douala	88,7	66,4	80,8	86,2	52,2	39,9	598
Est	69,2	50,1	71,0	72,5	32,9	26,0	249
Extrême-Nord	83,2	35,7	74,5	61,5	26,4	22,8	620
Littoral	85,3	61,0	80,1	83,4	47,3	39,4	208
Nord	62,0	37,1	68,8	61,1	25,0	20,9	434
Nord-Ouest	83,7	53,7	79,3	72,8	40,9	31,5	506
Ouest	58,4	52,8	77,9	77,1	28,7	20,8	411
Sud	84,5	59,5	59,0	84,9	34,5	31,7	223
Sud-Ouest	85,3	56,4	72,5	75,6	39,2	36,0	415
Yaoundé	92,0	67,0	73,7	87,4	54,6	45,8	568
Niveau d'instruction							
Aucun	65,4	21,7	60,6	48,0	11,3	9,4	467
Primaire	69,0	37,6	68,3	61,8	20,6	15,9	1 736
Secondaire ou plus	89,8	69,9	80,7	89,1	55,6	47,0	2 612
Quintile de bien-être économique							
Le plus pauvre	67,3	32,8	68,2	54,9	20,0	16,2	650
Second	71,1	43,7	71,6	65,7	27,0	24,4	792
Moyen	76,4	48,5	73,0	72,3	33,8	28,9	906
Quatrième	81,7	57,8	76,7	80,5	42,3	33,8	1 110
Le plus riche	92,0	69,2	77,6	88,4	54,9	45,2	1 357
Ensemble	79,9	53,6	74,3	75,3	38,7	32,2	4 815

¹ Les deux idées erronées les plus courantes sont la transmission par des moyens surnaturels et par des moustiques.

² Sont considérés comme ayant une connaissance « complète », les hommes qui déclarent qu'on peut réduire le risque de contracter le virus du sida en utilisant des condoms et en limitant les rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et qui n'est pas infecté, qui rejettent les idées locales erronées les plus courantes à propos de la transmission du sida, et qui savent qu'une personne paraissant en bonne santé peut avoir le virus du sida

Environ un tiers des hommes (32 %) ont une connaissance considérée comme complète du VIH/sida, soit une proportion environ une fois et demie plus élevée que celle observée chez les femmes (23 %). Les hommes les mieux informés sont les jeunes de 25-29 ans (35 % contre un minimum de 22 % à 45-49 ans), les célibataires ayant déjà eu des rapports sexuels (40 % contre 29 % chez ceux en union). En outre, on constate des écarts importants selon le niveau d'instruction, le milieu de résidence et le niveau de vie du ménage. Seulement 9 % de ceux sans niveau d'instruction ont une connaissance complète du VIH/sida contre 47 % de ceux qui ont un niveau d'instruction secondaire ou plus. En milieu rural, un quart des hommes (25 %) peuvent être considérés comme ayant une connaissance complète du VIH/sida contre 43 % à Yaoundé/Douala. Selon le niveau de vie du ménage, cette proportion varie de 16 % parmi les ménages les plus pauvres à 45 % parmi les ménages les plus riches. Enfin, les régions de l'Ouest et du Nord détiennent les proportions les plus faibles d'hommes ayant une connaissance complète du sida (21 % dans les deux cas).

Au cours de l'enquête, on a demandé à tous les enquêtés s'ils savaient si le virus qui cause le sida pouvait être transmis de la mère à son enfant et à quel moment pouvait s'effectuer la transmission. Les résultats sont présentés au tableau 15.4.

La transmission la plus connue par les enquêtés est la transmission de la mère à l'enfant au cours de la grossesse. Les hommes sont proportionnellement plus nombreux que les femmes à avoir déclaré connaître ce mode de transmission (72 % contre 60 %). En outre, les femmes savent, dans des proportions quasiment similaires, que le virus peut aussi être transmis pendant l'accouchement et par l'allaitement (respectivement 49 % et 47 %). Par contre, les hommes qui connaissent la possibilité de transmission pendant l'accouchement sont un peu plus nombreux que ceux qui connaissent la transmission par l'allaitement (63 % et 57 %). Les femmes qui connaissent le plus fréquemment la transmission mère-enfant, quel qu'en soit le moment, sont aussi celles qui ont une connaissance complète des moyens de transmission du VIH/sida. Ce sont les femmes de Yaoundé/Douala, celles qui ont un niveau d'instruction secondaire ou plus et celles des ménages les plus riches. En ce qui concerne le statut matrimonial, on constate, curieusement, que ce sont les femmes en union qui sont les moins bien informées.

Les résultats chez les hommes font apparaître des variations différentes. En effet, on constate que près des trois-quarts de ceux de 40-49 ans ont déclaré connaître la transmission pendant la grossesse (72 % contre 57 % chez les femmes du même groupe d'âges). De même, et à la différence des femmes, les hommes en union ou l'ayant été ont déclaré connaître, dans une proportion élevée, ces trois modes de transmission. Enfin, curieusement, ce sont les hommes du milieu rural, qui sont généralement les moins bien informés, que la transmission du virus pendant la grossesse (74 % contre 68 % à Yaoundé/Douala) et pendant l'allaitement (60 % contre 50 % à Yaoundé/Douala) est la mieux connue. On note également que les hommes les plus instruits sont ceux qui connaissent le plus fréquemment la transmission pendant la grossesse (74 % contre 65 % chez ceux sans niveau d'instruction) et au cours de l'accouchement (70 % contre 50 % chez ceux sans niveau d'instruction), ce qui n'est pas le cas de la transmission par l'allaitement qui est mieux connue des hommes ayant un niveau d'instruction primaire (61 %).

Tableau 15.4 Connaissance de la transmission du VIH de la mère à l'enfant

Pourcentage de femmes et d'hommes qui savent que le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant au cours de la grossesse, pendant l'accouchement et par l'allaitement, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, Cameroun 2004

Caractéristique socio-démographique	Femmes				Hommes			
	Le VIH peut être transmis pendant la grossesse	Le VIH peut être transmis pendant l'accouchement	Le VIH peut être transmis en allaitant	Effectif d'enquêtées	Le VIH peut être transmis pendant la grossesse	Le VIH peut être transmis pendant l'accouchement	Le VIH peut être transmis en allaitant	Effectif d'enquêtés
Âge								
15-24	59,9	48,1	47,0	4 936	69,0	59,1	55,2	2 177
15-19	58,5	45,2	45,7	2 684	69,1	56,8	54,1	1 224
20-24	61,5	51,6	48,7	2 252	68,9	62,1	56,7	953
25-29	61,0	51,6	47,7	1 747	76,0	68,0	57,1	812
30-39	60,9	51,4	49,2	2 430	72,9	67,5	61,3	1 087
40-49	56,9	43,0	43,9	1 543	72,1	64,4	57,7	738
État matrimonial								
Célibataire	61,7	50,1	47,9	2 560	68,3	58,2	53,4	2 112
A déjà eu des rapports sexuels	67,4	57,0	54,6	1 194	70,2	61,6	54,2	1 261
N'a jamais eu de rapports sexuels	56,7	44,1	42,0	1 366	65,5	53,1	52,3	850
En union	59,0	48,2	46,7	7 166	74,2	66,8	60,4	2 271
Divorcé/séparé/veuf	61,7	48,0	49,1	930	73,7	70,2	60,1	433
Milieu de résidence								
Yaoundé/Douala	70,1	59,8	51,0	2 277	68,1	65,3	50,3	1 167
Autres villes	65,2	55,0	52,7	3 559	71,6	66,7	58,9	1 645
Ensemble urbain	67,1	56,9	52,0	5 836	70,1	66,1	55,3	2 812
Rural	51,1	38,7	41,3	4 820	73,5	59,4	60,0	2 003
Région								
Adamaoua	47,8	39,7	34,7	416	69,0	63,9	56,2	214
Centre	65,6	51,1	51,1	854	64,1	57,8	55,1	368
Douala	71,1	57,9	51,4	1 197	66,8	63,7	50,9	598
Est	54,8	45,4	42,4	506	62,1	59,8	57,0	249
Extrême-Nord	49,3	41,3	36,6	1 718	75,2	62,6	62,2	620
Littoral	66,5	55,7	55,5	482	73,9	69,8	60,5	208
Nord	28,4	22,4	19,3	975	77,6	57,0	54,1	434
Nord-Ouest	67,3	54,5	62,3	1 090	76,8	60,9	65,0	506
Ouest	59,8	51,0	50,7	1 142	69,1	65,2	56,0	411
Sud	68,2	50,1	50,0	439	75,8	69,6	59,7	223
Sud-Ouest	77,7	53,0	67,3	757	75,2	66,5	64,7	415
Yaoundé	69,1	61,9	50,5	1 080	69,5	67,0	49,6	568
Niveau d'instruction								
Aucun	34,3	26,0	24,5	2 383	65,0	49,8	51,2	467
Primaire	63,0	47,1	50,6	4 109	69,0	56,4	60,8	1 736
Secondaire ou plus	71,5	63,2	56,7	4 163	74,4	70,3	56,0	2 612
Quintile de bien-être économique								
Le plus pauvre	42,9	33,8	34,0	2 007	74,0	56,2	61,4	650
Second	50,1	38,2	40,5	1 756	72,0	58,0	58,9	792
Moyen	61,6	46,0	49,9	2 046	74,4	64,9	62,1	906
Quatrième	69,3	54,1	52,2	2 283	71,1	63,8	56,1	1 110
Le plus riche	70,1	64,8	55,4	2 566	68,5	68,4	52,1	1 357
Ensemble	59,9	48,7	47,2	10 656	71,5	63,3	57,3	4 815

15.1.2 Stigmatisation

Le comportement que les gens adopteraient dans différentes situations face à des personnes atteintes par le VIH/sida est révélateur du niveau de perception du risque de transmission du virus qui peut se traduire, dans la vie courante, par une stigmatisation à l'égard des personnes infectées par ce virus. Au cours de l'EDSC-III, des questions ont été posées aux enquêtés pour savoir comment ils se comporteraient dans certaines circonstances face à des personnes ayant contracté la maladie. Plus précisément, on a cherché à savoir si les enquêtés seraient prêts à prendre soin chez eux d'un parent vivant avec le VIH/sida, s'ils achèteraient des légumes frais chez un commerçant vivant avec le VIH/sida, s'ils pensaient qu'une enseignante vivant avec le VIH/sida devrait être autorisée à continuer à travailler et enfin s'ils pensaient qu'il fallait garder secret l'état d'un membre de la famille vivant avec le VIH/sida. Les résultats sont présentés, pour les femmes au tableau 15.5.1 et au tableau 15.5.2 pour les hommes.

On constate que moins d'une femme sur dix (9 %) aurait une attitude tolérante dans les quatre situations ci-dessus citées. Cette attitude de tolérance envers les personnes vivant avec le VIH/sida est légèrement plus répandue parmi les groupes de femmes dont la connaissance complète des moyens de transmission et de prévention du VIH/sida est la plus élevée. En effet, ce sont les femmes les plus jeunes (10 % contre 7 % à 40-49 ans), les célibataires ayant déjà eu des rapports sexuels (18 % contre 7 % parmi celles en union), celles qui résident à Yaoundé/Douala (16 % contre 11 % dans les Autres villes et 4 % en milieu rural), celles ayant un niveau d'instruction secondaire ou plus (16 % contre 1 % pour celles qui sont sans instruction) et enfin celles vivant dans les ménages les plus riches (16 % contre 2% pour celles des ménages les plus pauvres) qui auraient le plus fréquemment tendance à se comporter de manière tolérante à l'égard des personnes vivant avec le VIH/sida.

La proportion d'hommes qui aurait une attitude de tolérance dans les quatre situations est deux fois plus élevée que celle constatée chez les femmes (19 % contre 9 %). Les hommes étaient aussi, en proportion, près d'une fois et demie plus nombreux que les femmes à avoir une connaissance complète des moyens de transmission et de prévention du VIH/sida (32 % contre 23 %). Comme chez les femmes, on constate que les comportements tolérants à l'égard des personnes vivant avec le VIH/sida sont très influencés par le niveau de connaissance des moyens de transmission et de prévention du virus. En effet, les hommes les plus tolérants sont, comme, chez les femmes, ceux qui possèdent toutes les informations correctes sur le VIH/sida.

Tableau 15.5.1 Attitudes de tolérance envers les personnes vivant avec le VIH : femmes

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant entendu parler du sida et exprimant des attitudes de tolérance envers les personnes vivant avec le VIH, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, Cameroun 2004

Caractéristique socio-démographique	Pourcentage d'enquêtées qui :					Effectif de femmes ayant entendu parler du VIH/sida
	Seraient prêtes à s'occuper chez elle d'un parent vivant avec le VIH	Achèteraient des légumes frais à un commerçant vivant avec le VIH	Pensent qu'une enseignante vivant avec le VIH devrait être autorisée à continuer d'enseigner	Pensent qu'il n'est pas nécessaire de garder secret l'état d'un membre de la famille vivant avec le HIV	Pourcentage exprimant les quatre attitudes de tolérance	
Âge						
15-24	70,8	45,4	51,8	36,4	10,4	4 826
15-19	70,5	44,7	52,2	36,6	10,4	2 614
20-24	71,0	46,1	51,2	36,1	10,3	2 212
25-29	68,0	40,6	48,7	37,8	8,8	1 719
30-39	67,4	37,6	43,9	39,3	7,5	2 386
40-49	69,2	33,9	40,9	40,0	6,9	1 492
État matrimonial						
Célibataire	79,4	54,2	61,7	35,6	14,5	2 500
A déjà eu des rapports sexuels	88,3	62,3	67,5	35,3	17,5	1 183
N'a jamais eu de rapports sexuels	71,4	47,0	56,4	35,9	11,7	1 316
En union	64,9	36,5	43,0	38,7	7,1	7 005
Divorcée/séparée/veuve	75,1	41,2	47,5	36,9	8,4	918
Milieu de résidence						
Yaoundé/Douala	83,4	56,9	69,7	36,8	16,0	2 274
Autres villes	74,9	47,2	55,7	35,2	10,5	3 527
Ensemble urbain	78,3	51,0	61,2	35,8	12,6	5 801
Rural	58,1	28,8	31,3	40,2	4,3	4 621
Région						
Adamaoua	46,7	26,9	46,7	46,3	3,5	401
Centre	70,3	43,6	50,4	32,2	8,3	835
Douala	81,6	50,8	65,0	39,3	14,5	1 195
Est	74,5	47,1	55,7	37,2	10,1	475
Extrême-Nord	43,0	22,1	21,5	41,1	1,7	1 649
Littoral	70,9	42,4	52,1	50,3	12,9	478
Nord	48,2	13,6	30,9	39,8	3,9	908
Nord-Ouest	89,9	44,2	43,4	28,7	8,0	1 089
Ouest	66,1	43,8	45,8	41,4	8,1	1 124
Sud	84,2	59,0	56,8	45,4	13,8	437
Sud-Ouest	83,0	50,1	55,3	28,3	9,6	752
Yaoundé	85,4	63,8	74,9	34,2	17,7	1 080
Niveau d'instruction						
Aucun	42,8	14,5	19,1	40,3	1,0	2 227
Primaire	67,6	34,0	40,6	40,1	6,6	4 034
Secondaire ou plus	85,2	62,4	70,4	34,2	15,5	4 161
Quintile de bien-être économique						
Le plus pauvre	47,0	18,8	23,4	40,7	1,8	1 886
Second	59,7	28,3	29,7	41,4	4,5	1 681
Moyen	68,2	38,1	43,1	40,0	7,6	2 018
Quatrième	77,9	49,2	57,0	36,2	11,1	2 276
Le plus riche	85,3	61,3	73,6	32,9	16,3	2 562
Ensemble	69,3	41,2	47,9	37,8	9,0	10 423

Tableau 15.5.2 Attitudes de tolérance envers les personnes vivant avec le VIH : hommes

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans ayant entendu parler du sida et exprimant des attitudes de tolérance envers les personnes vivant avec le VIH, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, Cameroun 2004

Caractéristique socio-démographique	Pourcentage d'enquêtés qui :				Pourcentage exprimant les quatre attitudes de tolérance	Effectif d'hommes ayant entendu parler du VIH/sida
	Seraient prêtes à s'occuper chez elle d'un parent vivant avec le VIH	Achèteraient des légumes frais à un commerçant vivant avec le VIH	Pensent qu'une enseignante vivant avec le VIH devrait être autorisée à continuer d'enseigner	Pensent qu'il n'est pas nécessaire de garder secret l'état d'un membre de la famille vivant avec le HIV		
Âge						
15-24	81,6	53,8	57,3	52,1	19,1	2 155
15-19	79,7	53,2	55,0	49,6	17,6	1 207
20-24	83,9	54,4	60,3	55,3	21,1	948
25-29	84,3	52,0	58,2	56,7	18,5	811
30-39	82,9	47,7	53,6	57,6	18,5	1 079
40-49	81,5	40,4	51,3	58,9	16,4	732
État matrimonial						
Célibataire	82,3	56,4	58,9	52,9	20,8	2 086
A déjà eu des rapports sexuels	85,8	61,7	64,2	55,6	24,9	1 256
N'a jamais eu de rapports sexuels	77,0	48,3	51,0	48,8	14,7	830
En union	81,8	44,3	52,6	57,8	16,3	2 264
Divorcé/séparé/veuf	85,2	49,7	56,3	52,0	18,5	427
Milieu de résidence						
Yaoundé/Douala	90,4	63,5	69,1	55,9	28,3	1 162
Autres villes	85,6	55,0	60,4	50,7	19,1	1 637
Ensemble urbain	87,6	58,5	64,0	52,8	22,9	2 799
Rural	74,8	38,1	43,9	58,5	12,1	1 978
Région						
Adamaoua	68,2	46,9	55,6	65,6	18,4	214
Centre	83,7	52,5	58,0	49,4	17,4	362
Douala	92,2	57,7	65,2	56,6	25,8	596
Est	74,6	57,9	51,3	65,0	24,8	245
Extrême-Nord	70,1	30,6	35,9	59,3	6,1	612
Littoral	83,3	55,8	58,4	60,1	24,3	206
Nord	66,6	31,7	44,0	62,8	12,1	430
Nord-Ouest	88,5	46,2	49,0	54,9	17,2	502
Ouest	91,7	45,5	54,3	32,8	8,9	411
Sud	87,4	70,6	66,4	52,5	26,0	221
Sud-Ouest	84,8	50,3	62,7	54,2	16,8	412
Yaoundé	88,4	69,6	73,2	55,1	31,0	566
Niveau d'instruction						
Aucun	64,5	17,5	26,7	64,0	3,5	456
Primaire	74,5	33,5	40,4	57,3	9,9	1 712
Secondaire ou plus	90,6	66,6	70,8	52,2	26,7	2 609
Quintile de bien-être économique						
Le plus pauvre	69,6	24,6	34,7	61,0	7,6	645
Second	75,0	38,2	42,2	58,1	11,4	780
Moyen	79,0	43,8	47,8	55,9	14,6	896
Quatrième	86,3	55,6	60,4	53,4	20,6	1 101
Le plus riche	91,5	68,5	74,9	51,6	28,5	1 356
Ensemble	82,3	50,0	55,7	55,1	18,5	4 777

15.2 POPULATION AYANT EFFECTUÉ UN TEST DE VIH/SIDA

La connaissance du statut sérologique peut contribuer à limiter l'épidémie car elle permet aux personnes de se protéger et de protéger leur partenaire. Au cours de l'EDSC-III, on a demandé aux enquêtés si, au cours des 12 derniers mois, ils avaient effectué un test de VIH/sida et s'ils avaient reçu les résultats. On constate au tableau 15.6 que les trois-quarts des femmes (76 %) et une proportion encore plus élevée d'hommes (83 %) n'ont jamais effectué de test. Seulement une femme sur dix (10 %) a effectué un test et a eu connaissance des résultats ; chez les hommes, cette proportion est un peu plus élevée (14 %). Si on se limite aux 12 derniers mois, seulement 5 % des femmes et 7 % des hommes ont effectué un test et ont reçu les résultats.

Tableau 15.6 Population ayant effectué un test de VIH et ayant reçu les résultats

Pourcentage de femmes et d'hommes qui ont effectué ou non un test du VIH, pourcentage de femmes et d'hommes testés pour le VIH et ayant reçu les résultats, et pourcentage de femmes et d'hommes testés pour le VIH et ayant reçu les résultats au cours des 12 derniers mois, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, Cameroun 2004

Caractéristique socio-démographique	Femmes							Hommes						
	A effectué un test			NSP/ND	Total	Pourcentage testé et ayant reçu les résultats dans les 12 derniers mois	Effectif d'enquêtées	A effectué un test			NSP/ND	Total	Pourcentage testé et ayant reçu les résultats dans les 12 derniers mois	Effectif d'enquêtés
	A reçu les résultats	N'a pas reçu les résultats	N'a jamais été testée					A reçu les résultats	N'a pas reçu les résultats	N'a jamais été testé				
Âge														
15-24	7,3	9,7	80,1	3,0	100,0	4,4	4 936	6,7	1,4	90,9	1,0	100,0	3,9	2 177
15-19	4,7	5,1	87,2	2,9	100,0	3,0	2 684	3,1	0,7	94,7	1,4	100,0	1,9	1 224
20-24	10,3	15,1	71,6	3,0	100,0	6,0	2 252	11,3	2,3	85,9	0,5	100,0	6,5	953
25-29	11,7	17,6	68,1	2,6	100,0	5,8	1 747	19,5	2,3	78,1	0,1	100,0	9,6	812
30-39	11,0	14,6	71,9	2,5	100,0	4,5	2 430	20,8	2,4	76,0	0,8	100,0	9,1	1 087
40-49	12,8	5,3	78,0	3,9	100,0	5,3	1 543	18,8	3,2	77,2	0,8	100,0	8,3	738
État matrimonial														
Célibataire	8,6	4,6	84,2	2,6	100,0	4,4	2 560	8,9	1,1	88,7	1,2	100,0	4,6	2 112
A déjà eu des rapports sexuels	15,2	9,1	74,3	1,3	100,0	7,5	1 194	14,0	1,6	84,0	0,4	100,0	7,1	1 261
N'a jamais eu de rapports sexuels	2,7	0,7	92,8	3,7	100,0	1,6	1 366	1,3	0,5	95,8	2,4	100,0	1,0	850
En union	9,1	13,8	73,9	3,1	100,0	4,6	7 166	18,0	2,5	79,2	0,3	100,0	8,7	2 271
Divorcé/séparé/veuf	16,8	12,0	69,1	2,1	100,0	7,3	930	16,7	4,0	78,1	1,2	100,0	6,6	433
Milieu de résidence														
Yaoundé/Douala	21,6	16,8	60,7	0,9	100,0	9,1	2 277	23,7	3,1	72,7	0,4	100,0	10,5	1 167
Autres villes	10,2	13,3	75,2	1,4	100,0	5,8	3 559	14,4	2,2	82,8	0,5	100,0	7,3	1 645
Ensemble urbain	14,6	14,6	69,5	1,2	100,0	7,1	5 836	18,3	2,6	78,6	0,5	100,0	8,6	2 812
Rural	3,7	7,6	83,7	5,0	100,0	2,0	4 820	7,7	1,3	89,7	1,2	100,0	4,0	2 003
Région														
Adamaoua	5,0	7,8	83,1	4,2	100,0	2,6	416	14,6	2,8	82,6	0,0	100,0	7,8	214
Centre	6,7	10,5	80,5	2,3	100,0	3,0	854	7,2	1,9	89,4	1,5	100,0	4,4	368
Douala	21,9	18,0	59,5	0,6	100,0	8,9	1 197	22,5	1,9	75,2	0,4	100,0	9,8	598
Est	5,2	8,1	79,9	6,9	100,0	3,0	506	11,5	2,2	84,7	1,6	100,0	6,0	249
Extrême-Nord	1,1	1,1	92,2	5,6	100,0	0,8	1 718	4,2	0,6	94,0	1,3	100,0	2,7	620
Littoral	9,9	14,4	74,6	1,2	100,0	5,5	482	11,8	1,8	85,2	1,2	100,0	6,2	208
Nord	1,8	1,4	88,3	8,6	100,0	1,3	975	7,0	0,4	91,7	0,9	100,0	3,9	434
Nord-Ouest	8,0	20,5	71,4	0,1	100,0	4,8	1 090	16,9	1,5	80,9	0,7	100,0	6,4	506
Ouest	10,7	15,5	72,0	1,8	100,0	5,6	1 142	14,5	2,7	82,7	0,0	100,0	8,5	411
Sud	10,3	11,9	77,2	0,6	100,0	6,0	439	12,1	4,1	82,9	0,9	100,0	5,9	223
Sud-Ouest	12,8	16,1	70,0	1,1	100,0	7,0	757	12,8	1,7	84,7	0,8	100,0	6,4	415
Yaoundé	21,2	15,5	62,0	1,3	100,0	9,4	1 080	25,0	4,4	70,2	0,4	100,0	11,1	568
Niveau d'instruction														
Aucun	1,3	2,0	88,7	8,0	100,0	0,6	2 383	3,7	0,8	93,2	2,4	100,0	1,4	467
Primaire	6,2	12,2	79,1	2,5	100,0	3,3	4 109	7,8	1,4	89,4	1,4	100,0	4,6	1 736
Secondaire ou plus	17,9	16,2	65,5	0,4	100,0	8,7	4 163	19,8	2,7	77,4	0,1	100,0	9,1	2 612
Quintile de bien-être économique														
Le plus pauvre	1,0	4,9	86,8	7,3	100,0	0,8	2 007	4,8	0,6	93,7	0,9	100,0	2,6	650
Second	2,9	6,8	85,5	4,9	100,0	1,2	1 756	6,2	1,6	90,7	1,5	100,0	3,2	792
Moyen	5,9	10,7	81,2	2,2	100,0	2,9	2 046	10,1	1,4	87,5	1,1	100,0	5,9	906
Quatrième	12,2	16,1	70,9	0,9	100,0	5,9	2 283	15,3	2,0	81,9	0,8	100,0	7,4	1 110
Le plus riche	21,8	16,4	61,2	0,5	100,0	10,8	2 566	24,2	3,5	72,2	0,1	100,0	10,8	1 357
Ensemble	9,7	11,5	75,9	2,9	100,0	4,8	10 656	13,9	2,1	83,3	0,8	100,0	6,7	4 815

Que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, on constate que c'est parmi les jeunes de 15-19 ans que la proportion de ceux qui ont déjà effectué un test de VIH/sida et reçu les résultats est la plus faible (5 % chez les femmes et 3 % chez les hommes). En milieu rural, 4 % des femmes et 8 % des hommes ont eu connaissance de leur statut. Ces proportions sont de loin inférieures à celles des Autres villes (10 % et 14 %) et Yaoundé/Douala (22 % et 24 %). Dans les régions, ces proportions varient de respectivement 1% et 4 % chez les femmes et les hommes dans l'Extrême-Nord à 13 % pour chacun des deux sexes dans le Sud-Ouest. La probabilité d'effectuer un test et de connaître les résultats est très liée au niveau d'instruction et au niveau de vie du ménage puisque seulement 1 % des femmes sans niveau d'instruction et de celles des ménages les plus pauvres connaissent leur statut sérologique contre 18 % de celles ayant un niveau d'instruction secondaire ou plus et 22 % de celles des ménages les plus riches. Chez les hommes, on constate ce même type de variation, 20 % des hommes les plus instruits contre 4 % de ceux sans niveau d'instruction ont déjà effectué un test et en connaissent le résultat ; selon les niveaux de bien-être économique, on note que 24 % des hommes vivant dans les ménages les plus riches connaissent leur statut et que, dans les ménages les plus pauvres, cette proportion n'est que de 5 %.

En outre, on a posé aux femmes qui avaient eu une naissance au cours des deux années ayant précédé l'enquête une série de questions pour savoir si, au cours d'une visite prénatale, elles avaient reçu des conseils concernant le VIH, si elles avaient effectué volontairement³ un test au cours d'une visite prénatale et enfin si elles avaient reçu ou non les résultats de ce test. Les résultats sont présentés au tableau 15.7. Plus d'un tiers des femmes (36 %) ont déclaré avoir reçu des conseils sur le VIH/sida au cours d'une visite prénatale, c'est-à-dire qu'on leur a parlé de la transmission mère-enfant et de l'importance du test de VIH/sida. Dans 9 % des cas, les femmes ont effectué volontairement un test de VIH/sida et ont eu connaissance des résultats. Globalement, 7 % ont bénéficié de conseils, ont effectué un test et en ont reçu les résultats. Dans certains groupes de femmes, cette proportion est beaucoup plus élevée : parmi les femmes de Douala et parmi celles des ménages les plus riches, cette proportion atteint 20 %. Par contre, elle est seulement de 4 % en milieu rural et de 2 % parmi les femmes des ménages les plus pauvres. En fonction du niveau d'instruction, on constate également des écarts très importants : parmi les femmes les plus instruites, 16 % ont reçu des conseils, ont effectué un test de VIH/sida et ont été informées des résultats ; par comparaison, parmi les femmes sans niveau d'instruction, cette proportion n'est que de 1 %.

³ On leur a proposé le test et elles ont accepté d'effectuer le test.

Tableau 15.7 Femmes enceintes conseillées et testées pour le VIH

Parmi les femmes ayant eu une naissance au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, pourcentage qui, au cours des visites prénatales pour la naissance la plus récente, ont reçu des conseils, à qui on a proposé le test du VIH, qui ont accepté de se faire tester et qui ont reçu les résultats du test, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, Cameroun 2004

Caractéristique socio-démographique	A reçu des conseils sur le VIH durant une visite prénatale ¹	A effectué volontairement un test ² de VIH au cours des visites prénatales		Pourcentage qui a reçu des conseils, a été testé et a reçu les résultats	Nombre d'enquêtées qui ont eu une naissance au cours des 2 dernières années
		A reçu les résultats	N'a pas reçu les résultats		
Âge					
15-24	35,5	9,1	1,2	7,5	1 455
15-19	30,7	8,5	1,1	6,7	492
20-24	38,0	9,4	1,3	7,9	964
25-29	36,0	9,5	1,7	7,3	785
30-39	35,2	7,6	0,6	6,7	791
40-49	34,3	10,2	0,0	10,2	142
État matrimonial					
Célibataire	48,8	11,1	1,4	10,3	188
En union	34,4	8,7	1,1	7,2	2 802
Divorcée/séparée/veuve	39,1	9,3	1,6	7,9	183
Milieu de résidence					
Yaoundé/Douala	70,3	20,7	1,5	16,5	455
Autres villes	42,8	11,2	1,1	9,5	967
Ensemble urbain	51,6	14,2	1,2	11,7	1 422
Rural	22,4	4,6	1,0	3,8	1 751
Région					
Adamaoua	27,8	4,0	0,4	4,0	131
Centre	25,7	8,5	3,3	5,5	250
Douala	71,1	25,3	1,1	20,0	224
Est	30,6	7,6	0,0	6,8	174
Extrême-Nord	7,3	1,3	0,0	1,3	674
Littoral	40,6	10,0	1,5	8,3	115
Nord	7,9	2,8	0,0	2,8	355
Nord-Ouest	63,2	5,8	2,4	5,5	308
Ouest	41,6	12,9	1,5	10,1	394
Sud	39,7	13,2	0,4	12,2	125
Sud-Ouest	63,1	17,2	2,3	14,9	192
Yaoundé	69,5	16,2	2,0	13,2	231
Niveau d'instruction					
Aucun	8,7	1,4	0,1	1,3	890
Primaire	35,0	7,1	1,3	5,7	1 364
Secondaire ou plus	62,3	18,8	1,9	15,8	920
Quintile de bien-être économique					
Le plus pauvre	15,0	2,0	0,3	1,9	775
Second	21,0	3,3	1,9	2,7	654
Moyen	34,6	8,5	1,2	6,6	662
Quatrième	53,6	12,8	1,5	10,0	587
Le plus riche	66,6	22,9	0,7	20,0	495
Ensemble	35,5	8,9	1,1	7,4	3 173

¹ Les femmes à qui on a parlé de la transmission du VIH mère-enfant et de l'importance du test du VIH sont considérées ici comme ayant reçu des conseils.

² Un test a été proposé à la femme au cours d'une visite prénatale et elle a accepté d'être testée.

15.3 RAPPORTS SEXUELS À HAUTS RISQUES ET UTILISATION DU CONDOM

La multiplicité des partenaires sexuels différents augmente le risque de contracter des IST et le VIH/sida, en particulier dans les groupes de population où l'utilisation du condom comme moyen de prévention est faible. Au cours de l'enquête, on a donc demandé aux hommes et aux femmes s'ils avaient eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois ; dans le cas d'une réponse affirmative, on leur a demandé s'ils avaient eu des rapports sexuels avec plusieurs partenaires. En plus des résultats à ces questions, le tableau 15.8 présente également le nombre moyen de partenaires sexuels sur la durée de vie.

Tableau 15.8 Multiplicité des partenaires sexuels

Parmi les femmes et les hommes âgés de 15-49 ans, pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, parmi ceux ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, pourcentage qui ont eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire et, parmi les femmes et les hommes ayant déjà eu des rapports sexuels, nombre moyen de partenaire sur la durée de vie, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, Cameroun 2004

Caractéristique socio-démographique	Femmes					Hommes						
	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels les 12 derniers mois	Effectif	Pourcentage ayant eu 2+ partenaires les 12 derniers mois	Effectif ayant eu des rapports sexuels les 12 derniers mois	Nombre moyen de partenaires sexuels sur la durée de vie	Effectif ayant eu des rapports sexuels les 12 derniers mois	Effectif	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels les 12 derniers mois	Effectif ayant eu des rapports sexuels les 12 derniers mois	Nombre moyen de partenaires sexuels sur la durée de vie	Effectif ayant eu des rapports sexuels	
Âge												
15-24	63,7	4 936	10,4	3 145	2,5	3 582	54,2	2 177	41,4	1 180	2,8	1 350
15-19	48,2	2 684	11,2	1 293	2,0	1 470	36,5	1 224	35,1	447	1,6	527
20-24	82,3	2 252	9,9	1 852	2,9	2 112	76,9	953	45,3	733	3,6	823
25-29	89,1	1 747	7,1	1 556	3,5	1 730	91,9	812	39,8	746	6,1	789
30-39	87,4	2 430	5,3	2 124	4,1	2 427	95,3	1 087	40,4	1 036	8,1	1 082
40-49	80,0	1 543	4,9	1 234	3,9	1 542	94,4	738	39,1	697	11,2	738
État matrimonial												
Célibataire	37,0	2 560	19,6	948	3,5	1 194	50,8	2 112	42,1	1 073	9,2	1 261
En union	91,7	7 166	4,8	6 570	3,1	7 158	97,5	2 271	38,6	2 214	5,4	2 267
Divorcé/séparé/veuf	58,2	930	20,7	542	5,2	929	86,2	433	45,8	373	8,4	430
Milieu de résidence												
Yaoundé/Douala	75,0	2 277	13,2	1 708	4,6	1 912	82,3	1 167	46,6	960	9,5	1 018
Autres villes	73,2	3 559	7,8	2 605	3,3	3 038	73,3	1 645	38,8	1 205	6,2	1 326
Ensemble urbain	73,9	5 836	9,9	4 313	3,8	4 950	77,0	2 812	42,2	2 165	7,5	2 344
Rural	77,7	4 820	4,9	3 746	2,9	4 331	74,6	2 003	37,7	1 495	4,7	1 614
Région												
Adamaoua	79,2	416	5,7	329	2,3	363	69,4	214	39,8	149	6,8	163
Centre	76,3	854	11,7	651	5,0	762	78,1	368	44,9	287	8,1	308
Douala	74,3	1 197	13,2	889	4,4	994	80,0	598	46,2	478	8,9	502
Est	79,8	506	15,9	404	5,1	468	86,2	249	45,2	215	11,0	225
Extrême-Nord	80,8	1 718	0,8	1 389	1,5	1 531	71,0	620	31,5	440	2,4	476
Littoral	74,3	482	9,8	358	4,2	408	77,7	208	38,1	162	8,2	173
Nord	79,2	975	0,5	772	1,6	852	66,1	434	30,2	287	2,0	329
Nord-Ouest	64,8	1 090	3,1	707	2,6	931	74,9	506	38,4	379	5,8	426
Ouest	69,9	1 142	6,7	798	2,8	961	66,6	411	48,7	274	3,5	293
Sud	82,2	439	12,4	361	5,9	408	83,2	223	47,9	186	11,2	203
Sud-Ouest	76,8	757	9,6	582	3,5	685	77,6	415	28,2	322	4,9	345
Yaoundé	75,8	1 080	13,1	819	4,7	918	84,7	568	46,9	481	10,2	516
Niveau d'instruction												
Aucun	82,5	2 383	0,5	1 967	1,6	2 251	80,7	467	33,9	377	1,5	403
Primaire	74,9	4 109	8,0	3 077	3,5	3 610	72,6	1 736	36,9	1 260	5,2	1 371
Secondaire ou plus	72,4	4 163	11,8	3 015	4,3	3 420	77,5	2 612	43,8	2 023	10,4	2 185
Quintile de bien-être économique												
Le plus pauvre	80,1	2 007	2,2	1 608	2,1	1 823	74,4	650	35,3	484	2,8	516
Second	76,9	1 756	5,6	1 351	3,0	1 585	74,5	792	37,5	590	5,0	641
Moyen	73,9	2 046	7,2	1 512	3,5	1 788	74,4	906	40,7	674	6,3	731
Quatrième	74,7	2 283	9,6	1 706	3,7	1 975	75,4	1 110	38,0	837	7,2	921
Le plus riche	73,4	2 566	12,1	1 883	4,3	2 108	79,3	1 357	45,9	1 076	8,9	1 149
Ensemble	75,6	1 065	7,6	8 060	3,4	9 280	76,0	4 815	40,4	3 660	6,2	3 959

Environ les trois-quarts des femmes (76 %) ont déclaré avoir eu des rapports sexuels au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête, et parmi ces femmes, 8 % ont eu, au moins, deux partenaires. Les rapports sexuels avec des partenaires multiples sont plus fréquents parmi les jeunes femmes de 15-24 ans (en moyenne 10 %, contre 5 % à partir de 30 ans). Les femmes célibataires et surtout celles en rupture d'union ont plus fréquemment déclaré que les autres avoir eu plusieurs partenaires sexuels (respectivement 20 % et 21 % contre 5 % pour les femmes en union). En moyenne, ces femmes ont eu respectivement, 3,5 et 5,2 partenaires sexuels au cours leur vie. En outre, c'est parmi les femmes de Yaoundé/Douala (13 % contre 8 % dans les Autres villes et 5 % en rural), parmi celles qui sont les plus instruites (12 % contre moins d'un pour cent pour celles sans niveau d'instruction) et enfin parmi celles vivant dans les ménages les plus riches (12 % contre 2 % dans les ménages les plus pauvres) que cette pratique est la plus répandue. Dans ces groupes de femmes, le nombre moyen de partenaires sur la durée de vie est supérieur à 4. En fonction des régions, on constate qu'à l'Est (16 %), au Centre (12 %) et dans le Sud (12 %), plus d'une femme sur dix a déclaré avoir eu plusieurs partenaires sexuels. À l'opposé, dans l'Extrême-Nord et le Nord-Ouest, cette proportion n'atteint pas 1 %.

Les trois-quarts des hommes ont déclaré avoir eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, soit une proportion similaire à celle des femmes (76 %). Parmi ces hommes, 40 %, c'est-à-dire une proportion beaucoup plus élevée que celle des femmes (8 %), ont eu des rapports sexuels avec, au moins, deux partenaires. Le nombre moyen de partenaires sur la durée de vie des hommes s'établit à 6,2. Parmi les hommes de 20-24 ans, ceux en rupture d'union, ceux de Yaoundé/Douala, ceux de niveau d'instruction secondaire ou plus, et ceux des ménages les plus riches, plus de deux sur cinq ont déclaré avoir eu, au moins, deux partenaires sexuels.

Aux enquêtés ayant déclaré avoir eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, on a demandé si ces rapports sexuels avaient eu lieu avec des partenaires non maritaux et non cohabitants, considérés comme étant des rapports sexuels à risques. De plus, on a cherché à savoir si, au cours des derniers rapports sexuels à risques, un condom avait été utilisé (tableau 15.9).

Plus d'un quart des femmes (29 %) ont eu des rapports sexuels à risques au cours des 12 derniers mois. Chez les hommes, cette proportion est beaucoup plus élevée puisqu'elle atteint 62 %. Chez les femmes, il va de soi que la fréquence des rapports sexuels à risque est particulièrement élevée parmi les célibataires (100 %) et parmi les femmes en rupture d'union (81 %). À 15-19 ans, plus d'une jeune fille sur deux (56 %) a eu des rapports sexuels à risques. À Yaoundé/Douala (47 %), parmi les femmes de niveau d'instruction au moins secondaire (49 %) et parmi celles des ménages les plus riches (44 %), ces comportements sexuels à risque sont plus répandus que dans les autres groupes de femmes. À l'opposé, parmi les femmes sans niveau d'instruction (3 %), parmi celles des ménages les plus pauvres (8 %) et parmi celles des régions du Nord et de l'Extrême-Nord (3 % dans chaque cas), ces comportements sexuels à risques sont peu fréquents.

Parmi les femmes ayant eu des rapports sexuels à risques, 41 % ont déclaré avoir utilisé un condom au cours de ces derniers rapports sexuels à risques. Les résultats montrent que c'est parmi les femmes qui ont déclaré le plus fréquemment avoir eu des rapports sexuels à risques que l'on constate les proportions les plus élevées de celles ayant utilisé un condom, c'est-à-dire les jeunes filles de 15-19 ans (47 %), les célibataires (50 %), celles de Yaoundé/Douala (51 %), celles ayant un niveau d'instruction au moins secondaire (49 %) et celles des ménages les plus riches (53 %).

Proportionnellement, les hommes ont eu plus fréquemment que les femmes des rapports sexuels à risques (62 % contre 29 %). En outre, plus d'un homme sur deux (55 %) a déclaré avoir utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels à risques et, comme chez les femmes, ce sont ceux qui ont eu le plus de rapports à risques qui ont le plus fréquemment utilisé un condom.

Tableau 15.9 Rapports sexuels à hauts risques et utilisation du condom au cours des derniers rapports sexuels à hauts risques

Parmi les femmes et les hommes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête, pourcentage de celles/ceux qui ont eu des rapports sexuels avec un partenaire non marital et non cohabitant (rapports à hauts risques) au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête et, parmi ces femmes et ces hommes, pourcentage ayant déclaré avoir utilisé un condom la dernière fois qu'ils ont eu des rapports sexuels avec un partenaire non marital et non cohabitant, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, Cameroun 2004

Caractéristique socio-démographique	Femmes				Hommes			
	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois	Effectif de femmes sexuellement actives au cours des 12 derniers mois	Pourcentage ayant utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels à hauts risques	Effectif de femmes ayant eu des rapports à hauts risques au cours des 12 derniers mois	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois	Effectif d'hommes sexuellement actifs au cours des 12 derniers mois	Pourcentage ayant utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels à hauts risques	Effectif d'hommes ayant eu des rapports à hauts risques au cours des 12 derniers mois
Âge								
15-24	44,2	3 145	46,5	1 390	90,5	1 180	57,4	1 069
15-19	55,7	1 293	47,4	720	96,6	447	55,8	432
20-24	36,2	1 852	45,4	670	86,8	733	58,4	636
25-29	21,8	1 556	39,9	340	62,7	746	60,2	468
30-39	17,8	2 124	31,4	378	46,3	1 036	50,3	480
40-49	16,3	1 234	17,6	201	35,8	697	40,9	250
État matrimonial								
Célibataire	99,5	948	49,9	943	100,0	1 073	57,1	1 073
En union	14,1	6 570	34,7	929	38,7	2 214	53,2	857
Divorcé/séparé/veuf	80,9	542	32,7	438	90,0	373	50,5	335
Milieu de résidence								
Yaoundé/Douala	46,8	1 708	51,2	800	75,6	960	68,1	725
Autres villes	33,2	2 605	43,3	864	65,2	1 205	57,4	786
Ensemble urbain	38,6	4 313	47,1	1 664	69,8	2 165	62,6	1 511
Rural	17,2	3 746	23,7	645	50,5	1 495	38,8	755
Région								
Adamaoua	11,8	329	54,5	39	51,4	149	50,9	76
Centre	41,1	651	31,2	268	69,3	287	49,1	199
Douala	46,0	889	47,8	409	75,2	478	66,7	360
Est	32,9	404	25,3	133	68,1	215	43,6	146
Extrême-Nord	3,4	1 389	27,8	48	29,8	440	35,0	131
Littoral	43,5	358	40,6	156	76,9	162	54,6	125
Nord	3,0	772	44,7	23	31,1	287	42,2	89
Nord-Ouest	30,7	707	32,7	217	67,4	379	42,3	255
Ouest	30,0	798	50,0	240	64,4	274	69,4	176
Sud	40,9	361	36,1	148	76,0	186	51,0	141
Sud-Ouest	41,1	582	24,0	239	62,6	322	44,6	202
Yaoundé	47,8	819	54,7	391	75,9	481	69,6	365
Niveau d'instruction								
Aucun	3,1	1 967	11,0	62	22,0	377	26,9	83
Primaire	25,4	3 077	27,0	782	58,1	1 260	39,8	732
Secondaire ou plus	48,6	3 015	49,0	1 465	71,7	2 023	63,7	1 451
Quintile de bien-être économique								
Le plus pauvre	8,4	1 608	17,8	136	30,8	484	32,1	149
Second	18,3	1 351	22,6	247	49,4	590	35,2	291
Moyen	29,3	1 512	28,7	443	65,0	674	45,7	438
Quatrième	38,7	1 706	44,2	660	69,1	837	59,5	578
Le plus riche	43,8	1 883	53,1	824	75,2	1 076	67,2	809
Ensemble	28,7	8 060	40,5	2 310	61,9	3 660	54,7	2 266

Les rapports sexuels payants sont considérés comme des rapports sexuels à hauts risques. Au cours de l'EDSC-III, on a demandé aux hommes si, au cours des 12 derniers mois, ils avaient eu des rapports sexuels avec une prostituée et si, au cours de ces rapports sexuels, ils avaient utilisé un condom. Une faible proportion d'hommes (3 %) ont déclaré avoir eu des rapports sexuels avec une prostituée (tableau 15.10). Quelle que soit la caractéristique socio-démographique, cette proportion reste faible : c'est parmi les hommes en rupture d'union qu'elle est la plus élevée (6 %). Cependant, seulement 64 % de ces hommes ont déclaré avoir utilisé un condom au cours de ces derniers rapports sexuels.

Tableau 15.10 Rapports sexuels payants et utilisation du condom au cours des derniers rapports sexuels payants

Pourcentage d'hommes ayant déclaré avoir eu des rapports sexuels avec une prostituée au cours des 12 derniers mois et, parmi ces hommes, pourcentage ayant déclaré avoir utilisé un condom la dernière fois qu'ils ont eu des rapports sexuels avec une prostituée, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, Cameroun 2004

Caractéristique socio-démographique	Pourcentage ayant déclaré avoir eu des rapports sexuels avec une prostituée au cours des 12 derniers mois	Effectif d'hommes	Pourcentage ayant déclaré avoir utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels avec une prostituée	Effectif d'hommes ayant déclaré avoir eu des rapports sexuels avec une prostituée au cours des 12 derniers mois
Âge				
15-24	2,9	2 177	58,5	62
15-19	1,3	1 224	*	16
20-24	4,9	953	(65,2)	46
25-29	3,8	812	(74,9)	31
30-39	3,7	1 087	(66,0)	40
40-49	1,6	738	*	12
État matrimonial				
Célibataire	3,0	2 112	57,4	63
En union	2,5	2 271	62,5	58
Divorcé/séparé/veuf	5,8	433	(81,4)	25
Milieu de résidence				
Yaoundé/Douala	3,8	1 167	(88,9)	44
Autres villes	3,5	1 645	56,6	58
Ensemble urbain	3,6	2 812	70,5	102
Rural	2,1	2 003	47,1	43
Niveau d'instruction				
Aucun	2,0	467	*	10
Primaire	3,1	1 736	49,9	53
Secondaire ou plus	3,2	2 612	75,1	83
Quintile de bien-être économique				
Le plus pauvre	2,5	650	*	16
Second	2,6	792	*	21
Moyen	3,1	906	(61,7)	28
Quatrième	3,0	1 110	(61,1)	33
Le plus riche	3,4	1 357	(89,6)	46
Ensemble	3,0	4 815	63,5	145

() Basé sur un faible nombre de cas non pondérés
* Basé sur trop peu de cas non pondérés

15.4 INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

Une IST non traitée est un facteur de risque pour la transmission du VIH/sida. La lutte contre ces maladies s'est donc intensifiée depuis l'apparition de l'épidémie de VIH/sida. Au cours de l'enquête, on a demandé aux enquêtés s'ils avaient déjà eu une IST et/ou des symptômes d'IST. Les résultats présentés au tableau 15.11 sont basés uniquement sur les déclarations des enquêtés et ne doivent donc pas être interprétés comme une mesure de la prévalence des IST.

Tableau 15.11 Infection Sexuellement Transmissible (IST) et symptômes d'IST déclarés


Parmi les femmes et les hommes ayant déjà eu des rapports sexuels, pourcentage ayant déclaré avoir eu une IST et/ou des symptômes d'IST au cours des 12 derniers mois, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, Cameroun 2004

Caractéristique socio-démographique	Femmes					Hommes				
	Pourcentage avec une IST	Pourcentage avec des pertes vaginales anormales	Pourcentage avec une plaie/ulcère génital	Pourcentage avec IST/perte/plaie/ulcère	Effectif ayant déjà eu des rapports sexuels	Pourcentage avec une IST	Pourcentage avec des écoulements du pénis	Pourcentage avec une plaie/ulcère génital	Pourcentage avec IST/perte/plaie/ulcère	Effectif ayant déjà eu des rapports sexuels
Âge										
15-24	4,3	10,7	3,7	13,2	3 582	6,9	6,6	3,2	10,7	1 350
15-19	3,4	9,5	3,3	11,5	1 470	4,6	5,5	2,0	8,0	527
20-24	4,9	11,6	4,1	14,5	2 112	8,4	7,3	4,0	12,4	823
25-29	5,9	11,3	4,2	14,0	1 730	8,3	6,8	4,1	11,6	789
30-39	4,2	9,3	2,9	11,0	2 427	6,6	4,0	2,1	8,2	1 082
40-49	4,0	7,1	2,3	8,8	1 542	3,4	2,3	2,4	5,4	738
État matrimonial										
Célibataire	4,7	11,9	3,9	15,0	1 194	6,8	6,3	2,4	9,8	1 261
En union	4,3	9,4	3,1	11,4	7 158	5,3	4,0	2,9	8,0	2 267
Divorcé/séparé/veuf	6,0	10,9	4,9	13,4	929	11,0	7,9	4,4	13,9	430
Milieu de résidence										
Yaoundé/Douala	8,2	14,6	5,8	18,9	1 912	8,3	5,8	3,9	11,7	1 018
Autres villes	4,2	10,3	3,0	12,4	3 038	8,1	6,9	3,4	11,4	1 326
Ensemble urbain	5,8	11,9	4,1	14,9	4 950	8,2	6,4	3,6	11,5	2 344
Rural	3,1	7,4	2,5	8,8	4 331	3,9	3,3	1,9	5,9	1 614
Région										
Adamaoua	0,4	4,2	0,6	4,5	363	6,3	5,3	1,3	8,3	163
Centre	7,9	15,4	3,9	18,2	762	6,2	3,9	0,5	7,7	308
Douala	8,5	13,7	6,2	17,5	994	7,7	7,0	3,5	10,7	502
Est	3,6	12,2	6,1	14,6	468	12,3	10,2	3,5	13,9	225
Extrême-Nord	0,6	1,4	0,5	1,6	1 531	5,0	5,3	1,5	5,7	476
Littoral	6,0	12,4	3,3	15,4	408	4,3	2,5	3,2	7,5	173
Nord	0,4	1,2	0,9	1,8	852	2,2	4,5	2,2	6,3	329
Nord-Ouest	3,1	7,0	6,0	9,1	931	7,3	3,5	2,9	9,6	426
Ouest	5,7	17,9	2,7	19,7	961	4,1	3,9	4,2	8,5	293
Sud	6,9	15,7	3,1	18,7	408	6,7	3,8	2,9	8,2	203
Sud-Ouest	4,9	8,8	2,6	11,9	685	5,4	6,3	4,0	9,8	345
Yaoundé	7,8	15,6	5,4	20,4	918	8,8	4,6	4,4	12,7	516
Niveau d'instruction										
Aucun	0,4	1,4	0,8	1,9	2 251	2,8	4,5	0,9	4,9	403
Primaire	4,9	11,4	4,1	13,4	3 610	6,3	5,2	2,5	9,2	1 371
Secondaire ou plus	6,8	13,8	4,3	17,3	3 420	7,2	5,2	3,5	10,0	2 185
Quintile de bien-être économique										
Le plus pauvre	1,4	4,2	2,0	5,2	1 823	4,4	4,1	0,9	5,7	516
Second	2,6	7,6	2,6	8,7	1 585	4,9	3,6	1,8	6,3	641
Moyen	4,8	11,1	3,2	13,1	1 788	5,2	5,3	3,3	8,4	731
Quatrième	5,4	11,7	4,2	14,4	1 975	7,1	5,4	3,4	10,7	921
Le plus riche	7,6	13,7	4,5	17,5	2 108	8,5	6,2	3,8	11,7	1 149
Ensemble	4,5	9,8	3,4	12,1	9 280	6,4	5,1	2,9	9,2	3 959

Que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, la proportion de ceux ayant déclaré avoir eu une IST est relativement faible (respectivement 5 % et 3 %). Cependant, 10 % des femmes ont déclaré avoir eu des pertes vaginales anormales et 3 % un ulcère génital. Globalement, 12 % de femmes sont considérées comme ayant eu une IST et/ou un ou des symptômes révélateurs d'IST. Chez les hommes, 5 % ont déclaré avoir eu un écoulement du pénis et 3 % un ulcère génital. Globalement, 9 % des hommes sont considérés comme ayant eu une IST et/ou un ou des symptômes révélateurs d'IST. Que ce soit chez les femmes ou les hommes, on constate que c'est parmi les enquêtés qui ont eu le plus fréquemment des rapports sexuels à risques que la prévalence « déclarée » d'IST et/ou de symptômes est la plus élevée : les plus jeunes, les célibataires et ceux en rupture d'union, ceux de Yaoundé/Douala, ceux ayant un niveau d'instruction secondaire ou plus et ceux des ménages les plus riches.

Parmi les femmes ayant déclaré avoir eu une IST ou des symptômes, 61 % se sont rendues dans un établissement sanitaire ou ont consulté un professionnel de santé pour obtenir des conseils ou un traitement (graphique 15.1). Chez les hommes, cette proportion est un peu plus faible (56 %). À l'opposé, 30 % des femmes et 15 % des hommes n'ont pris aucune mesure pour traiter leur IST.

Graphique 15.1 Recherche de conseils et de traitement pour les IST



15.5 OPINIONS

La promotion de comportements sexuels sans risque fait partie des mesures destinées à contrôler l'épidémie. De plus, étant donné que les femmes sont plus vulnérables au VIH/sida que les hommes, il est important de savoir si elles sont en mesure de refuser des rapports sexuels à risque avec leur mari/partenaire. Au cours de l'enquête, on a donc demandé aux femmes et aux hommes s'ils pensaient qu'une femme qui sait que son mari a une IST puisse, soit refuser d'avoir des rapports sexuels avec lui, soit lui proposer l'utilisation d'un condom. Les résultats sont présentés au tableau 15.12. On constate que plus des trois-quarts (77 %) des femmes ont déclaré qu'une femme pouvait refuser d'avoir des rapports sexuels avec son mari/partenaire quand elle savait que ce dernier avait contracté une IST. De plus, 67 % pensent que, dans cette situation, une femme peut proposer à son/mari/partenaire un condom. Globalement, 81 % des femmes pensent que, dans le cas où le mari/partenaire a une IST, il est justifié

Tableau 15.12 Opinion sur la négociation de rapports sexuels protégés avec le conjoint

Pourcentage de femmes et d'hommes qui pensent que, si le conjoint a une IST, sa femme peut, soit refuser d'avoir des rapports sexuels avec lui, soit proposer l'utilisation du condom, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, Cameroun 2004

Caractéristique socio-démographique	Femmes				Hommes			
	Refuser les rapports sexuels	Proposer l'utilisation du condom	Refuser les rapports sexuels ou proposer l'utilisation du condom	Effectif d'enquêtées	Refuser les rapports sexuels	Proposer l'utilisation du condom	Refuser les rapports sexuels ou proposer l'utilisation du condom	Effectif d'enquêtés
Âge								
15-24	63,7	58,8	68,1	4 936	58,3	57,5	61,4	2 177
15-19	48,3	44,7	51,6	2 684	40,2	40,1	42,7	1 224
20-24	82,0	75,6	87,7	2 252	81,6	79,8	85,5	953
25-29	89,4	76,5	93,5	1 747	92,8	87,8	96,3	812
30-39	89,1	74,6	93,6	2 430	95,9	88,4	98,5	1 087
40-49	87,7	69,3	91,2	1 543	95,5	86,7	98,5	738
État matrimonial								
Célibataire	43,6	43,2	45,6	2 560	56,2	55,4	59,1	2 112
A déjà eu des rapports sexuels	93,5	92,6	97,8	1 194	94,1	92,8	98,9	1 261
N'a jamais eu de rapports sexuels	0,0	0,0	0,0	1 366	0,0	0,0	0,0	850
En union	87,7	73,6	92,7	7 166	95,7	88,5	98,8	2 271
Divorcé/séparé/veuf	88,4	79,8	92,8	930	95,0	89,1	98,6	433
Milieu de résidence								
Yaoundé/Douala	79,1	75,9	83,1	2 277	81,8	81,7	86,6	1 167
Autres villes	77,5	70,9	81,3	3 559	77,3	72,8	79,9	1 645
Ensemble urbain	78,2	72,8	82,0	5 836	79,2	76,5	82,7	2 812
Rural	76,0	59,5	80,7	4 820	77,1	70,6	79,5	2 003
Région								
Adamaoua	76,9	53,9	80,4	416	73,2	68,6	75,0	214
Centre	82,2	78,8	85,9	854	77,6	80,1	83,0	368
Douala	79,2	73,0	82,4	1 197	78,9	78,1	83,3	598
Est	82,3	66,6	86,6	506	87,2	79,6	89,6	249
Extrême-Nord	79,8	59,0	82,4	1 718	74,5	63,2	74,5	620
Littoral	76,1	72,7	81,2	482	79,3	74,9	82,0	208
Nord	59,9	31,7	67,1	975	74,4	64,0	75,6	434
Nord-Ouest	81,5	75,4	82,9	1 090	82,3	68,1	83,4	506
Ouest	66,3	64,6	75,5	1 142	66,1	68,4	70,8	411
Sud	86,6	80,6	89,4	439	83,5	84,6	89,2	223
Sud-Ouest	83,8	75,3	86,8	757	80,2	80,1	83,1	415
Yaounde	79,0	79,1	83,9	1 080	84,9	85,5	90,1	568
Niveau d'instruction								
Aucun	75,4	46,3	79,3	2 383	81,3	64,8	82,5	467
Primaire	77,5	69,5	82,7	4 109	75,2	69,2	78,1	1,736
Secondaire ou plus	77,9	76,0	81,3	4 163	79,9	78,9	83,3	2,612
Quintile de bien-être économique								
Le plus pauvre	75,3	50,5	79,5	2 007	76,7	63,3	77,8	650
Second	75,7	60,7	80,6	1 756	78,6	70,1	79,8	792
Moyen	76,7	68,0	81,4	2 046	76,6	73,4	80,0	906
Quatrième	79,6	73,7	83,8	2 283	78,1	76,5	82,1	1 110
Le plus riche	77,9	76,8	81,4	2 566	80,2	80,0	84,2	1 357
Ensemble	77,2	66,8	81,4	10 656	78,3	74,1	81,3	4 815

qu'une femme prenne des mesures pour éviter le risque de transmission soit en refusant d'avoir des rapports sexuels avec son mari/partenaire, soit en lui proposant d'utiliser un condom. On ne constate que peu de variations entre les différentes catégories de femmes, cependant celles qui partagent le moins fréquemment cette opinion sont les plus jeunes (52 % à 15-19 ans), les célibataires (46 %) et dans les régions, c'est le Nord qui détient la proportion la plus faible (67 %).

Les hommes sont, en proportion, un peu plus nombreux que les femmes à penser que celles-ci sont en droit de se protéger face à un mari/partenaire qui a une IST. Plus des trois-quarts (78 %) pensent qu'une femme peut refuser d'avoir des rapports sexuels avec un mari/partenaire qui a une IST. En outre, dans 74 % des cas, ils pensent que, dans cette situation, une femme peut proposer l'utilisation du condom au cours des rapports sexuels à son mari/partenaire. Globalement, 81 % des hommes pensent que, dans le cas où le mari/partenaire a une IST, il est justifié qu'une femme prenne des mesures pour éviter le risque de transmission soit en refusant d'avoir des rapports sexuels avec son mari/partenaire, soit en lui proposant d'utiliser un condom. On ne constate que peu de variations entre les différents groupes d'hommes. Cependant, comme chez les femmes, ceux qui partagent le moins fréquemment cette opinion sont les plus jeunes (43 % à 15-19 ans), les célibataires (59 %) et dans les régions, c'est le Nord et l'Extrême-Nord qui détiennent les proportions les plus faibles (75 % dans les deux cas).

On a également demandé aux enquêtés s'ils pensaient qu'on devrait enseigner l'utilisation du condom aux jeunes de 12-14 ans (tableau 15.13). Près de trois femmes sur cinq ont répondu par l'affirmative à cette question (59 %). Les femmes les plus âgées (50 % à 40-49 ans), les femmes en union ou en union rompue (57 %), celles du milieu rural (47 %) et surtout celles des ménages les plus pauvres (31 %) sont les moins favorables à cette initiative. Dans une proportion supérieure à celle des femmes (73 % contre 59 %), les hommes se sont déclarés favorables à ce que l'on enseigne l'utilisation du condom aux jeunes de 12-14 ans. Les résultats selon les caractéristiques socio-démographiques mettent en évidence les mêmes variations que chez les femmes.

Tableau 15.13 Adultes (femmes et hommes) qui pensent que l'utilisation du condom devrait être enseignée aux jeunes de 12-14 ans

Pourcentage de femmes et d'hommes de 18-49 ayant entendu parler du sida qui pensent que l'utilisation du condom devrait être enseignée aux jeunes de 12-14 ans, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, Cameroun 2004

Caractéristique socio-démographique	Femmes		Hommes	
	Pourcentage qui pensent que l'utilisation du condom devrait être enseignée	Effectif	Pourcentage qui pensent que l'utilisation du condom devrait être enseignée	Effectif
Âge				
18-19	64,2	1 107	75,6	461
20-24	63,7	2 252	80,6	953
25-29	60,8	1 747	75,0	812
30-39	56,7	2 430	69,8	1 087
40-49	49,6	1 543	64,1	738
État matrimonial				
Célibataire	71,2	1 282	78,4	1 386
En union/en union rompue	56,9	7 797	70,2	2 666
Milieu de résidence				
Yaoundé/Douala	75,9	1 932	81,9	1 017
Autres villes	65,1	2 980	71,6	1 359
Ensemble urbain	69,4	4 912	76,0	2 377
Rural	46,6	4 167	68,7	1 675
Région				
Adamaoua	44,5	350	74,4	182
Centre	76,3	726	79,1	303
Douala	73,5	1 013	83,6	510
Est	57,3	431	67,8	218
Extrême-Nord	33,4	1 503	50,5	519
Littoral	74,7	396	80,9	172
Nord	16,4	844	58,6	374
Nord-Ouest	60,7	917	71,8	412
Ouest	66,6	944	79,3	308
Sud	84,4	363	83,8	188
Sud-Ouest	74,1	672	79,2	357
Yaoundé	78,6	919	80,2	508
Quintile de bien-être économique				
Le plus pauvre	30,9	1 780	55,9	554
Second	45,8	1 492	64,8	666
Moyen	60,7	1 721	76,2	738
Quatrième	70,9	1 934	77,1	919
Le plus riche	79,1	2 152	80,5	1 175
Ensemble 18-49 ans	58,9	9 079	73,0	4 052

15.6 CONNAISSANCE DU VIH/SIDA ET COMPORTEMENTS SEXUELS CHEZ LES JEUNES

15.6.1 Connaissance

Les jeunes de 15-24 ans constituent une population à risque dans la mesure où à cette période de la vie, les relations sexuelles sont généralement instables et le multipartenariat fréquent. Au cours de l'EDSC-III, il a donc paru important d'évaluer dans cette population, non seulement, la connaissance correcte des moyens de transmission et de prévention du VIH/sida mais aussi les types de comportements sexuels.

Le tableau 15.14 présente les proportions de jeunes femmes et d'hommes de 15-24 ans en fonction de leur connaissance des moyens de transmission et de prévention du VIH/sida. On constate tout d'abord qu'un peu plus des deux tiers des jeunes femmes (68 %) savent qu'une personne en bonne santé peut néanmoins avoir le VIH/sida. En outre, un peu plus de la moitié des jeunes femmes (53 %) ont déclaré que le sida ne pouvait pas être transmis par des moustiques. Pour 65 % d'entre elles, le sida ne peut pas se transmettre par des moyens surnaturels et, dans 71 % des cas, elles ont déclaré qu'une personne ne peut pas être infectée en partageant les repas d'un malade du sida. Globalement, plus d'un tiers des jeunes femmes (35 %) rejettent les deux idées erronées et savent qu'une personne apparemment en bonne santé peut néanmoins avoir contracté le VIH/sida.

Le tableau 15.14 présente également les proportions de jeunes femmes qui ont une connaissance complète de la transmission et de la prévention du VIH/sida. Ces jeunes femmes savent non seulement qu'une personne apparemment en bonne santé peut néanmoins avoir contracté le VIH/sida, mais elles savent aussi que l'utilisation d'un condom et la limitation des rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et non infecté sont des moyens de prévention du VIH/sida et elles rejettent les deux idées erronées les plus courantes sur la transmission du VIH/sida. Un peu plus d'un quart des femmes (27 %) ont une connaissance complète des moyens de transmission et de prévention du VIH/sida. Les femmes les plus âgées sont, en proportion, un peu plus nombreuses à posséder toutes ces informations correctes (25 % à 15-17 ans contre 30 % à 23-24 ans). C'est ensuite parmi les célibataires ayant déjà eu des rapports sexuels (42 %), parmi les femmes de Yaoundé/Douala (42 %) et parmi celles ayant un niveau d'instruction secondaire ou plus (45 %) que l'on constate les proportions les plus élevées de femmes bien informées.

Les résultats concernant les jeunes hommes montrent que ceux-ci sont mieux informés que les jeunes femmes. En effet, plus des trois-quarts (76 %), savent qu'une personne en bonne santé peut néanmoins avoir le VIH/sida ; plus de la moitié (59 %) ont déclaré que le sida ne pouvait pas être transmis par des moustiques ; pour 78 % d'entre eux, le sida ne peut pas se transmettre par des moyens surnaturels et, dans 79 % des cas, ils ont déclaré qu'une personne ne peut pas être infectée en partageant les repas d'un malade du sida. Dans l'ensemble, 42 % des hommes contre 35 % des femmes rejettent les deux idées erronées et savent qu'une personne apparemment en bonne santé peut néanmoins avoir contracté le VIH/sida. Plus d'un tiers des hommes (35 %) ont une connaissance complète des moyens de transmission et de prévention du VIH/sida et les variations sont les mêmes que celles observées chez les femmes.

Tableau 15.14 Idées erronées à propos du sida et connaissance « complète » du sida chez les jeunes

Pourcentage d'enquêtés de 15-24 qui, en réponse à une question déterminée, rejettent des idées locales erronées à propos de la transmission ou de la prévention du sida, et qui savent qu'une personne paraissant en bonne santé peut avoir le virus du sida, et pourcentage qui ont une connaissance « complète » du sida, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, Cameroun 2004

Caractéristique socio-démographique	Pourcentage d'enquêtés qui savent que :				Pourcentage rejetant les 2 idées erronées ¹ et sachant qu'une personne paraissant en bonne santé peut avoir le virus du sida	Pourcentage ayant une connaissance complète ² du sida	Effectif d'enquêtés
	Une personne paraissant en bonne santé peut avoir le virus du sida	Le sida ne peut pas être transmis par les moustiques	Le sida ne peut pas être transmis par des moyens surnaturels	Une personne ne peut pas être infectée en partageant les repas d'un malade du sida			
FEMMES							
Âge							
15-19	65,5	55,0	66,6	72,3	35,0	26,5	2 684
15-17	61,9	55,8	65,4	70,7	34,4	25,3	1 577
18-19	70,7	53,8	68,4	74,5	35,9	28,3	1 107
20-24	70,5	50,6	62,4	69,3	34,5	28,4	2 252
20-22	68,5	51,2	62,3	68,4	34,0	27,7	1 474
23-24	74,3	49,7	62,5	71,0	35,5	29,6	777
État matrimonial							
Célibataire	72,9	64,5	72,1	79,6	44,9	34,8	2 318
A déjà eu des rapports sexuels	82,9	68,3	76,7	88,2	50,6	42,2	972
N'a jamais eu de rapports sexuels	65,6	61,7	68,8	73,4	40,8	29,4	1 346
En union	62,1	41,7	57,1	62,3	24,7	19,7	2 391
Divorcée/séparée/veuve	75,8	55,0	69,0	73,1	37,9	32,8	227
Milieu de résidence							
Yaoundé/Douala	89,4	70,0	74,6	87,0	53,5	41,8	1 114
Autres villes	76,1	59,1	73,0	78,8	42,0	33,2	1 772
Ensemble urbain	81,2	63,3	73,6	82,0	46,4	36,5	2 886
Rural	48,9	38,5	52,1	55,4	18,4	14,5	2 050
Niveau d'instruction							
Aucun	29,3	25,6	37,9	34,3	8,3	5,9	792
Primaire	58,3	39,6	58,2	62,6	19,5	14,2	1 830
Secondaire ou plus	88,5	73,0	79,0	90,1	55,9	45,2	2 315
Total	67,8	53,0	64,7	70,9	34,8	27,4	4 936
HOMMES							
Âge							
15-19	71,5	61,6	79,1	80,7	42,8	33,8	1 224
15-17	67,7	63,2	78,5	79,4	42,7	31,8	763
18-19	77,7	58,9	80,1	82,7	43,0	37,1	461
20-24	82,8	55,4	76,6	76,7	41,9	35,3	953
20-22	81,5	56,5	79,0	77,1	42,8	36,2	602
23-24	85,1	53,5	72,6	76,1	40,4	33,7	351
État matrimonial							
Célibataire	76,2	61,5	79,1	80,5	44,6	35,7	1 756
A déjà eu des rapports sexuels	84,4	64,6	80,5	84,3	49,4	41,1	934
N'a jamais eu de rapports sexuels	66,8	58,0	77,6	76,1	39,1	29,5	822
En union	75,0	45,1	71,7	69,0	27,1	23,9	293
Divorcé/séparé/veuf	83,1	54,2	77,4	80,7	47,5	42,5	128
Milieu de résidence							
Yaoundé/Douala	87,5	73,2	82,7	89,4	58,6	45,0	522
Autres villes	79,2	64,0	78,5	83,4	46,3	37,8	811
Ensemble urbain	82,4	67,6	80,2	85,7	51,1	40,6	1 333
Rural	67,0	45,1	74,6	68,2	28,7	24,8	844
Niveau d'instruction							
Aucun	55,0	15,5	55,1	45,7	7,1	6,3	120
Primaire	62,8	40,0	70,7	62,8	20,1	14,6	794
Secondaire ou plus	87,0	74,8	84,8	92,3	59,8	49,7	1 263
Total	76,4	58,9	78,0	78,9	42,4	34,5	2 177

¹ Les deux idées erronées les plus courantes sont la transmission par des moyens surnaturels et par les moustiques.

² Sont considérés comme ayant une connaissance « complète », les jeunes qui déclarent qu'on peut réduire le risque de contracter le virus du sida en utilisant des condoms et en limitant les rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et qui n'est pas infecté, qui rejettent les idées locales erronées les plus courantes à propos de la transmission du sida, et qui savent qu'une personne paraissant en bonne santé peut avoir le virus du sida

15.6.2 Comportements sexuels

La connaissance de l'âge aux premiers rapports sexuels est utile car elle permet d'adapter les programmes de prévention du VIH/sida afin de réduire l'exposition des jeunes aux rapports sexuels à risques. On constate que, chez les femmes de 15-24 ans, un tiers avait eu leurs premiers rapports sexuels en 15 ans (35 %) (tableau 15.15). Si on se limite aux femmes de 18-24 ans, la grande majorité (88 %) avait eu leurs premiers rapports sexuels 18 ans. C'est parmi les jeunes femmes de 15-24 ans du milieu rural (43 %) et parmi celles sans instruction (56 %) que la proportion de celles qui ont eu des premiers rapports sexuels avant 15 ans est la plus élevée.

Caractéristique socio-démographique	Femmes				Hommes			
	15 ans	Effectif d'enquêtées de 15-24 ans	18 ans	Effectif d'enquêtées de 18-24 ans	15 ans	Effectif d'enquêtés de 15-24 ans	18 ans	Effectif d'enquêtés de 18-24 ans
Âge								
15-19	31,9	2 684	na	na	23,1	1 224	na	na
15-17	27,6	1 577	na	na	22,1	763	na	na
18-19	37,9	1 107	97,2	881	24,7	461	97,7	294
20-24	37,7	2 252	84,5	2 109	22,9	953	76,3	820
20-22	38,7	1 474	85,9	1 354	22,5	602	81,6	493
23-24	35,7	777	82,2	755	23,5	351	68,3	327
État matrimonial								
Célibataire	15,9	2 318	82,5	679	20,8	1 756	82,9	735
En union/en union rompue	51,0	2 618	90,0	2 310	32,1	421	80,2	380
Milieu de résidence								
Yaoundé/Douala	22,0	1 114	83,4	652	22,2	522	82,5	327
Autres villes	33,1	1 772	87,2	1 035	24,3	811	83,8	403
Ensemble urbain	28,8	2 886	85,7	1 687	23,4	1 333	83,2	730
Rural	42,6	2 050	91,6	1 303	22,3	844	79,6	385
Région								
Adamaoua	39,3	194	91,9	117	14,2	88	75,3	33
Centre	36,3	403	84,9	253	29,0	178	95,0	94
Douala	19,2	558	82,5	316	18,9	265	83,5	151
Est	57,4	234	89,8	148	37,1	110	90,0	66
Extrême-Nord	48,2	724	92,5	457	12,9	250	69,7	92
Littoral	23,2	217	91,4	117	22,4	97	82,5	51
Nord	35,7	413	92,0	249	10,4	186	61,4	78
Nord-Ouest	33,0	512	88,0	294	34,9	239	86,7	128
Ouest	29,9	575	89,1	339	11,8	208	81,7	73
Sud	50,5	203	91,8	123	48,9	104	92,2	60
Sud-Ouest	32,4	348	86,1	240	24,6	196	80,2	114
Yaoundé	24,7	556	84,3	336	25,6	257	81,6	176
Niveau d'instruction								
Aucun	55,9	792	94,9	552	10,2	120	56,1	59
Primaire	39,5	1 830	90,8	1 119	21,1	794	81,7	373
Secondaire ou plus	23,3	2 315	83,4	1 319	25,4	1 263	84,3	683
Ensemble	34,5	4 936	88,3	2 990	23,0	2 177	82,0	1 115

na = Non applicable

Parmi les hommes de 15-24 ans, environ un quart (23 %) ont eu leur premiers rapports sexuels avant d'atteindre 15 ans. Par ailleurs, parmi les 18-24 ans, 82 % ont eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre 18 ans. Contrairement aux femmes, on ne constate pas ici d'écart selon le milieu de résidence et, du point de vue de l'instruction, ce sont les hommes les plus instruits qui sont proportionnellement les plus nombreux à avoir eu leurs premiers rapports avant 15 ans (25 % contre 10 % chez ceux sans niveau d'instruction).

Le tableau 15.16 présente les proportions de jeunes femmes et de jeunes hommes de 15-24 ans qui ont déjà eu des rapports sexuels selon qu'ils ont ou non utilisé un condom au cours des premiers rapports sexuels. Seulement 18 % des femmes ont déclaré avoir utilisé un condom au cours de leurs premiers rapports sexuels ; cette proportion est cependant nettement plus élevée parmi les célibataires (35 %), parmi celles de Yaoundé/Douala (36 %), et parmi celles ayant un niveau d'instruction secondaire ou plus (33 %). On note également des écarts selon l'âge, la fréquence d'utilisation du condom au cours des premiers rapports sexuels étant plus élevée parmi les plus jeunes de 15-19 ans que parmi les plus âgées de 20-24 ans. De même, les femmes qui connaissent un endroit où se procurer un condom ont utilisé plus fréquemment un condom au cours de leurs premiers rapports sexuels.

Tableau 15.16 Utilisation du condom aux premiers rapports sexuels par les jeunes de 15-24 ans				
Parmi les femmes et les hommes de 15-24 ans et ayant déjà eu des rapports sexuels, pourcentage qui ont utilisé un condom au cours des premiers rapports, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, Cameroun 2004				
Caractéristique socio-démographique	Femmes		Hommes	
	A utilisé le condom durant les premiers rapports sexuels	Effectif	A utilisé le condom durant les premiers rapports sexuels	Effectif
Âge				
15-19	24,3	1 470	31,1	527
15-17	27,2	589	33,4	231
18-19	22,4	881	29,3	295
20-24	14,4	2 112	25,0	823
20-22	15,0	1 356	26,7	496
23-24	13,2	757	22,5	327
État matrimonial				
Célibataire	35,3	972	29,3	934
En union/en union rompue	12,2	2 609	23,0	415
Milieu de résidence				
Yaoundé/Douala	36,0	758	38,6	381
Autres villes	20,8	1 257	28,6	499
Ensemble urbain	26,6	2 014	32,9	880
Rural	8,0	1 567	17,0	469
Niveau d'instruction				
Aucun	0,7	660	7,5	62
Primaire	10,2	1 335	19,2	433
Secondaire ou plus	32,7	1 587	33,0	855
Connait un endroit où se procurer des condoms				
Oui	27,0	2 275	nd	nd
Non	3,5	1 307	nd	nd
Ensemble 15-24	18,4	3 582	27,4	1 350

nd = Non déterminé

La proportion d'hommes de 15-24 ans ayant utilisé un condom au cours des premiers rapports sexuels est plus élevée que celle des femmes (27 % contre 18 %). Comme chez les femmes, ceux de 15-19 ans ont déclaré un peu plus fréquemment que ceux de 20-24 ans avoir utilisé un condom au cours de leurs premiers rapports sexuels (31 % contre 25 %). On note que c'est à Yaoundé/Douala et parmi ceux de niveau d'instruction secondaire ou plus que cette fréquence d'utilisation est, de loin, la plus élevée (respectivement, 39 % et 33 %).

Le tableau 15.17 présente les pourcentages de jeunes célibataires de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête et, parmi eux, le pourcentage de ceux qui ont utilisé un condom au cours de ces derniers rapports sexuels. Environ un tiers des jeunes femmes célibataires (34 %) ont déclaré avoir eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois et, parmi ces femmes, 51 % ont déclaré avoir utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels. On constate que la fréquence des rapports sexuels est plus élevée à partir de 20 ans, parmi celles de Yaoundé/Douala (41 %) et parmi les femmes les plus instruites (41 %). C'est également dans ces groupes de femmes que l'utilisation du condom a été la plus fréquente. La proportion de jeunes hommes célibataires ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois est un peu plus élevée que celle des femmes (45 %). Parmi eux, 57 % ont utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels. Comme chez les femmes, ce sont les hommes à partir de 20 ans, ceux de Yaoundé/Douala (59 %) et ceux de niveau d'instruction secondaire ou plus (51 %) qui ont été les plus actifs sexuellement. On constate également que c'est dans ces groupes d'hommes que l'utilisation du condom a été la plus fréquente.

Tableau 15.17 Jeunes de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels prémaritaux au cours des 12 derniers mois et utilisation du condom au cours des derniers rapports sexuels prémaritaux

Parmi les jeunes célibataires de 15-24 ans, pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois et, parmi ces derniers, pourcentage ayant utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, Cameroun 2004

Caractéristique socio-démographique	Femmes					Hommes				
	N'a jamais eu des rapports sexuels	Ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois	Effectif de célibataires de 15-24 ans	Ayant utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels	Effectif de célibataire de 15-24 ans sexuellement actifs au cours des 12 derniers mois	N'a jamais eu de rapports sexuels	Ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois	Effectif de célibataires de 15-24 ans	Ayant utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels	Effectif de célibataire de 15-24 ans sexuellement actifs au cours des 12 derniers mois
Âge										
15-19	67,3	26,5	1 792	49,7	474	62,3	31,3	1 112	53,8	348
15-17	77,1	19,8	1 278	48,3	254	72,7	22,6	726	52,4	164
18-19	42,9	43,0	514	51,3	221	42,7	47,7	386	55,0	184
20-24	26,6	60,0	526	53,0	316	20,0	69,1	644	59,4	445
20-22	29,6	57,5	402	53,7	231	23,4	65,1	448	58,0	292
23-24	16,9	68,1	124	51,1	85	12,4	78,2	196	62,2	153
Milieu de résidence										
Yaoundé/Douala	51,6	41,0	688	67,5	282	33,5	59,3	408	74,7	242
Autres villes	57,4	34,0	888	51,2	302	46,9	43,1	665	57,7	287
Ensemble urbain	54,9	37,1	1 576	59,1	585	41,8	49,3	1 073	65,5	528
Rural	64,8	27,7	742	28,1	205	54,7	38,8	683	40,0	265
Niveau d'instruction										
Aucun	93,6	1,6	140	*	2	66,7	26,1	87	*	23
Primaire	66,2	27,5	744	31,3	204	55,2	39,5	651	41,1	257
Secondaire ou plus	50,4	40,7	1 435	58,1	583	39,7	50,5	1 017	65,8	513
Ensemble 15-24	58,1	34,1	2 318	51,0	790	46,8	45,2	1 756	57,0	794

() Basé sur un faible nombre de cas non pondérés

* Basé sur trop peu de cas non pondérés

Plus de deux jeunes femmes sur cinq (44 %) ont eu des rapports sexuels à risques au cours des 12 derniers mois (tableau 15.18). Chez les hommes, cette proportion est beaucoup plus élevée puisqu'elle atteint 91 %. Que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, il va de soi que la fréquence des rapports sexuels à risques est particulièrement élevée parmi les célibataires (100 %) puisque les partenaires sexuels des célibataires sont non cohabitants, c'est-à-dire à risques. À Yaoundé/Douala (68 %) et parmi les femmes de niveau d'instruction au moins secondaire (69 %) ces comportements sexuels à risques sont plus répandus que dans les autres groupes de femmes. À l'opposé, c'est parmi les femmes sans niveau d'instruction (3 %) que ces comportements sexuels à risques sont les moins fréquents.

Tableau 15.18 Rapports sexuels à hauts risques et utilisation du condom par les jeunes de 15-24 ans

Pourcentage de jeunes de 15-24 ans sexuellement actifs ayant eu des rapports sexuels avec un partenaire non-marital et non-cohabitant (rapports à hauts risques) au cours des 12 derniers mois et, parmi ceux-ci, pourcentage qui ont déclaré avoir utilisé un condom la dernière fois qu'ils ont eu des rapports à hauts risques, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, Cameroun 2004

Caractéristique socio-démographique	Femmes				Hommes			
	Pourcentage ayant eu des rapports à hauts risques au cours des 12 derniers mois	Effectif d'enquêtées sexuellement actives les 12 derniers mois	Pourcentage ayant utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels à hauts risques	Effectif d'enquêtées 15-24 ayant eu des rapports à hauts risques au cours des 12 derniers mois	Pourcentage ayant eu des rapports à hauts risques au cours des 12 derniers mois	Effectif d'enquêtés sexuellement actifs les 12 derniers mois	Pourcentage ayant utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels à hauts risques	Effectif d'enquêtés 15-24 ayant eu des rapports à hauts risques au cours des 12 derniers mois
Âge								
15-19	55,7	1 293	47,4	720	96,6	447	55,8	432
15-17	64,1	527	46,3	338	100,0	193	55,7	193
18-19	49,8	766	48,4	382	94,0	254	55,9	239
20-24	36,2	1 852	45,4	670	86,8	733	58,4	636
20-22	36,6	1 182	49,0	433	90,5	434	59,2	393
23-24	35,5	670	38,9	238	81,5	299	57,2	243
État matrimonial								
Célibataire	99,8	790	51,1	788	100,0	794	56,9	794
En union/en union rompue	25,5	2 355	40,5	602	71,1	387	58,8	275
Milieu de résidence								
Yaoundé/Douala	68,0	691	58,1	469	97,5	344	73,8	335
Autres villes	50,4	1 083	49,8	545	93,1	419	58,7	390
Ensemble urbain	57,2	1 773	53,6	1 015	95,1	763	65,7	726
Rural	27,3	1 372	27,1	375	82,2	417	39,9	343
Niveau d'instruction								
Aucun	2,9	593	*	17	53,2	54	(36,5)	29
Primaire	35,3	1 163	29,7	411	87,9	387	40,0	340
Secondaire ou plus	69,2	1 389	53,9	962	94,7	739	66,7	700
Ensemble 15-24	44,2	3 145	46,5	1 390	90,5	1 180	57,4	1 069

() Basé sur un faible nombre de cas non pondérés

* Basé sur trop peu de cas non pondérés

Parmi les jeunes femmes ayant eu des rapports sexuels à risques, 47 % ont déclaré avoir utilisé un condom au cours de ces derniers rapports sexuels à risques. Les résultats montrent que c'est parmi les femmes qui ont déclaré le plus fréquemment avoir eu des rapports sexuels à risques que l'on constate les proportions les plus élevées de celles ayant utilisé un condom, c'est-à-dire les jeunes filles de 15-19 ans (47 %), les célibataires (51 %), celles de Yaoundé/Douala (58 %) et celles ayant un niveau d'instruction au moins secondaire (54 %).

Proportionnellement, les hommes ont eu plus fréquemment que les femmes des rapports sexuels à risques (91 % contre 44 %). En outre, plus d'un homme sur deux (57 %) a déclaré avoir utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels à risques et, comme chez les femmes, ce sont ceux qui ont eu le plus fréquemment des rapports sexuels à risques qui ont aussi le plus fréquemment utilisé un condom.

Le tableau 15.19 présente les proportions de jeunes femmes et de jeunes hommes selon la catégorie de risque à laquelle ils appartiennent. En effet, l'on distingue les trois catégories suivantes :

- les jeunes qui n'ont couru aucun risque de transmission du VIH par voie sexuelle puisqu'ils n'ont jamais eu de rapports sexuels. Ils représentent une proportion de 27 % chez les femmes et 38 % chez les hommes. Ces proportions sont plus importantes chez les plus jeunes que chez les plus âgés, tant pour les femmes (45 % à 15-19 ans contre 6 % à 20-24 ans) que pour les hommes (57 % à 15-19 ans contre 14 % à 20-24 ans) ;
- les jeunes qui ont déjà eu des rapports sexuels mais qui n'ont pas couru de risque de transmission du VIH par voie sexuelle au cours de la période récente (12 derniers mois). Ce sont ceux qui, soit n'ont pas eu de rapports sexuels, soit ont eu des comportements sexuels sains et responsables (un seul partenaire et utilisation du condom lors des derniers rapports sexuels). Ils représentent 21 % et 23 % respectivement chez les femmes et les hommes ;
- les jeunes qui ont couru le risque de contracter le VIH parce qu'ils ont adopté des comportements à risque (48 % chez les femmes contre 26 % chez les hommes). Ce sont ceux des qui ont soit eu un seul partenaire mais n'ont pas utilisé de condoms lors des derniers rapports, soit qui ont utilisé de condoms mais ont eu plusieurs partenaires, soit enfin, ceux qui ont eu des rapports avec plusieurs partenaires sans utiliser un condom. Il va de soi que les jeunes de cette dernière sous-catégorie courent des risques plus élevés de contracter le VIH.

	15-19	20-24	15-24
FEMMES			
N'a jamais eu de rapports	45,3	6,2	27,4
A eu des rapports, mais pas les 12 derniers mois	6,6	11,5	8,8
Un seul partenaire & condom les derniers rapports	11,2	14,1	12,5
Un seul partenaire pas de condom les derniers rapports	31,5	60,0	44,5
Rapports avec plus d'un partenaire et condom les derniers rapports	2,6	3,0	2,8
Rapports avec plus d'un partenaire et pas de condom les derniers rapports	2,9	5,1	3,9
Total	100,0	100,0	100,0
Effectif	2,684	2,252	4,936
HOMMES			
N'a jamais eu de rapports	57,0	13,7	38,0
A eu des rapports, mais pas les 12 derniers mois	6,5	9,4	7,8
Un seul partenaire & condom les derniers rapports	12,5	19,3	15,5
Un seul partenaire pas de condom les derniers rapports	11,2	22,8	16,2
Rapports avec plus d'un partenaire et condom les derniers rapports	7,2	19,6	12,6
Rapports avec plus d'un partenaire et pas de condom les derniers rapports	5,6	15,2	9,8
Total	100,0	100,0	100,0
Effectif	1 224	953	2 177

Le fait pour une jeune femme d'avoir des rapports sexuels avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle et qui a donc plus de chances d'être infecté, augmente son risque de contracter le VIH/sida. Parmi les femmes âgées de 15-19 ans qui ont eu des rapports sexuels hors union au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête, seulement 3 % ont déclaré avoir eu ces rapports sexuels avec un homme plus âgé d'au moins 10 ans. On n'observe aucun écart suivant l'âge de la femme. Entre les femmes célibataires et celles en union ou en rupture d'union, l'écart est négligeable (3 % contre 2 %) (tableau 15.20). Par contre, en milieu rural, et parmi les femmes de niveau d'instruction primaire, on constate une proportion plus élevée de femmes ayant eu des rapports sexuels avec un partenaire âgé de 10 ans ou plus. En effet, 5 % des femmes du milieu rural contre 1 % en milieu urbain et 6 % de celles ayant un niveau primaire contre 1 % parmi celles ayant un niveau au moins secondaire ont déclaré avoir eu, au cours des 12 derniers mois, des rapports sexuels avec un partenaire qui avait, au moins, 10 ans de plus qu'elles.

Tableau 15.20 Disparité d'âges entre partenaires sexuels

Parmi les femmes âgées de 15-19 ans ayant eu des rapports sexuels non maritaux au cours des 12 derniers mois, pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec un homme plus âgé qu'elles de 10 ans ou plus, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, Cameroun 2004

Caractéristique socio-démographique	Pourcentage ayant eu des rapports non maritaux avec un homme âgé de 10 ans ou plus	Effectif de femmes 15-19 ayant au des rapports non maritaux au cours des 12 derniers mois
Âge		
15-19	2,6	720
15-17	2,5	338
18-19	2,7	382
État matrimonial		
Célibataire	2,2	474
En union/en union rompue	3,3	246
Milieu de résidence		
Yaoundé/Douala	1,2	200
Autres villes	1,3	291
Ensemble urbain	1,3	491
Rural	5,4	229
Niveau d'instruction		
Aucun	*	6
Primaire	6,0	219
Secondaire ou plus	1,1	495
Ensemble 15-19	2,6	720

* Basé sur trop peu de cas non pondérés

Il est reconnu que la consommation excessive d'alcool perturbe le jugement et contribue à augmenter la pratique de comportements à risques. Par ailleurs, c'est généralement à des âges jeunes que ces comportements à risques sous l'effet de l'alcool sont les plus fréquents. Au cours de l'EDSC-III, on a donc demandé aux enquêtés âgés de 15-24 ans si, la dernière fois qu'ils ont eu des rapports sexuels, ils avaient, eux ou leur partenaire, bu de l'alcool. Une proportion très proche de femmes (9 %) et d'hommes (10 %) ont déclaré qu'ils avaient bu de l'alcool la dernière fois qu'ils avaient eu des rapports sexuels

(tableau 15.21). Chez les femmes comme chez les hommes, on constate que ce comportement est nettement plus fréquent à partir de 20 ans et parmi ceux et celles en union ou en union rompue. Le milieu de résidence ne fait pas apparaître d'écarts importants surtout chez les hommes ; tout au plus peut-on souligner qu'en milieu rural, la proportion de femmes ayant déclaré avoir bu de l'alcool est légèrement plus élevée qu'en milieu urbain (11 % contre 8 %). En fonction du niveau d'instruction, on note de légers écarts : chez les femmes, ce sont celles qui ont un niveau d'instruction au moins secondaire qui ont déclaré le moins fréquemment avoir eu ce comportement (7 % contre 11 % pour celles ayant un niveau primaire). Chez les hommes, c'est parmi ceux sans niveau d'instruction que la proportion ayant déclaré avoir consommé de l'alcool avant les rapports sexuels au cours des 12 derniers mois est la plus faible (6 % contre 11 % parmi ceux de niveau d'instruction secondaire).

Caractéristique socio-démographique	Femmes		Hommes	
	Pourcentage ayant bu de l'alcool	Effectif	Pourcentage ayant bu de l'alcool	Effectif
Âge				
15-19	5,2	2 684	3,9	1 224
15-17	3,3	1 577	2,3	763
18-19	7,9	1 107	6,5	461
20-24	13,4	2 252	18,6	953
20-22	12,4	1 474	14,0	602
23-24	15,3	777	26,3	351
État matrimonial				
Célibataire	3,9	2 318	8,4	1 756
En union/en union rompue	13,4	2 618	18,2	421
Milieu de résidence				
Yaoundé/Douala	7,6	1 114	11,9	522
Autres villes	7,7	1 772	9,4	811
Ensemble urbain	7,7	2 886	10,4	1 333
Rural	10,7	2 050	10,2	844
Niveau d'instruction				
Aucun	9,7	792	6,1	120
Primaire	10,6	1 830	10,4	794
Secondaire ou plus	7,4	2 315	10,7	1 263
Ensemble 15-24	8,9	4 936	10,3	2 177