

## ERRATUM dans

Institut National de la Statistique du Rwanda (INSR) et ORC Macro. 2006. *Enquête Démographique et de Santé Rwanda 2005*. Calverton, Maryland, U.S.A. : INSR et ORC Macro.

### Date des corrections: Le 13 Juin 2013

**Corrections apportées:** Une erreur survenue dans les données sur l'altitude avait entraîné des estimations erronées de la prévalence de l'anémie ; la prévalence de l'anémie étant ajustée en fonction de l'altitude. Les données sur l'altitude ont été, par la suite, corrigées et la prévalence de l'anémie a été estimée en fonction de ces nouvelles valeurs de l'altitude. Les tableaux des résultats corrigés et le texte qui les accompagne sont présentés dans la version électronique du rapport révisé.

**Des corrections ont été apportées au texte et tableaux suivants:** Le texte des pages 143-147 dans la section 10.3 qui traite les tableaux 10.08 à 10.11 et les tableaux 10.08 à 10.11.

**Les corrections apportées aux tableaux des résultats sont présentées ci-après:**

Tableau 10.8 Prévalence de l'anémie chez les enfants					
Pourcentage d'enfants de 6-59 mois anémiés, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Rwanda 2005					
Caractéristique sociodémographique	Anémié	Pourcentage d'enfants souffrant d'une anémie			Effectif d'enfants
		Légère (10,0-10,9 g/dl)	Modérée (7,0-9,9 g/dl)	Sévère (en dessous de 7,0 g/dl)	
<b>Âge de l'enfant en mois</b>					
6-9	77,4 74,2	20,7 23,0	46,9 48,2	9,8 3,0	254
10-11	67,9 67,7	21,4 25,4	37,2 41,1	9,3 1,2	149
12-23	64,1 59,5	21,8 22,5	30,9 32,3	11,4 4,6	796
24-35	54,8 50,1	21,5 23,5	25,0 24,4	8,2 2,1	898
36-47	51,2 46,0	21,7 23,2	23,2 21,9	6,3 0,8	708
48-59	44,9 38,9	16,1 17,1	21,4 20,9	7,4 1,0	732
<b>Sexe</b>					
Masculin	56,9 53,0	21,9 23,5	26,5 27,0	8,5 2,5	1 741
Féminin	55,7 50,1	19,0 20,4	28,1 27,7	8,6 2,0	1 797
<b>Milieu de résidence</b>					
Urbain	54,3 46,6	17,1 17,8	24,2 26,8	13,0 2,0	495
Rural	56,6 52,3	21,0 22,6	27,8 27,5	7,8 2,3	3 042
<b>Province</b>					
Ville de Kigali	69,6 54,6	13,0 16,6	31,4 35,2	25,1 2,7	226
Sud	47,2 47,0	20,6 20,8	24,2 24,0	2,4 2,2	908
Ouest	59,3 58,2	26,0 27,4	30,8 30,2	2,6 0,5	933
Nord	56,2 43,5	18,8 19,6	23,6 22,1	13,9 1,9	729
Est	59,6 55,7	17,2 20,4	29,2 30,8	13,3 4,6	741
<b>Niveau d'instruction de la mère<sup>1</sup></b>					
Aucune instruction	57,3 54,4	21,4 22,4	28,7 29,2	7,1 2,8	923
Primaire	57,8 53,0	20,7 22,4	28,5 28,5	8,7 2,1	1 656
Secondaire ou plus	53,4 47,7	18,7 21,0	24,7 24,6	10,0 2,1	588
<b>Quintile de bien-être économique</b>					
Le plus pauvre	59,8 54,2	20,3 21,9	30,6 29,3	8,9 2,9	721
Second	61,1 56,1	22,9 24,9	28,2 28,2	10,1 2,9	755
Moyen	54,1 51,1	18,7 20,9	26,5 28,1	8,9 2,1	733
Quatrième	54,5 50,7	20,5 21,0	27,8 27,9	6,1 1,7	740
Le plus riche	50,7 44,1	19,6 20,5	22,5 22,3	8,6 1,3	588
Ensemble	56,3 51,5	20,4 21,9	27,3 27,4	8,5 2,2	3 537

Note : Le tableau est basé sur les enfants qui ont dormi dans le ménage la nuit précédant l'enquête. La prévalence est ajustée en fonction de l'altitude en utilisant la formule du CDC (1998).  
g/dl = grammes par décilitre.  
<sup>1</sup> Pour les femmes qui n'ont pas été enquêtées, l'information provient du questionnaire ménage.

Tableau 10.9 Prévalence de l'anémie chez les femmes

Pourcentage de femmes de 15-49 ans anémiées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Rwanda 2005

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes souffrant d'une anémie				Effectif de femmes
	Anémiée	Anémie légère	Anémie modérée	Anémie sévère	
<b>Groupe d'âges<sup>1</sup></b>					
15-19	29,0 21,8	18,0 17,0	8,7 3,8	2,3 1,0	1 317
20-24	33,2 25,2	18,9 19,0	11,4 5,3	2,9 0,9	1 145
25-29	32,0 25,3	18,2 19,2	10,9 5,3	2,9 0,8	826
30-34	32,3 24,7	17,3 18,2	11,3 5,5	3,7 1,0	811
35-39	37,0 30,1	21,6 20,2	12,3 9,5	3,1 0,5	536
40-44	35,7 29,2	22,2 21,9	11,7 6,5	1,8 0,8	555
45-49	36,7 30,3	22,0 21,4	12,2 8,0	2,5 1,0	466
<b>Enfants nés vivants<sup>2</sup></b>					
Aucun enfant	30,2 22,6	18,1 17,4	9,6 4,2	2,5 1,0	2 142
1	35,0 26,8	17,6 18,6	13,3 7,2	4,2 1,0	539
2-3	32,6 25,8	20,1 20,8	9,8 4,5	2,7 0,6	1 028
4-5	34,6 27,8	19,2 18,6	13,1 8,1	2,3 1,2	876
6 ou plus	35,5 29,0	21,3 21,3	11,2 7,1	3,0 0,6	1 072
<b>État de la femme<sup>2</sup></b>					
Enceinte	35,0 28,8	13,1 14,2	17,6 13,6	4,3 1,0	432
Allaite au sein	32,6 25,8	19,9 19,9	10,1 5,1	2,6 0,8	1 923
Ni l'un, ni l'autre	32,6 25,1	19,6 19,2	10,4 5,0	2,6 0,9	3 302
<b>Milieu de résidence</b>					
Urbain	33,3 22,6	16,4 16,7	14,0 5,2	3,0 0,8	938
Rural	32,7 26,2	19,7 19,5	10,2 5,8	2,7 0,9	4 719
<b>Province</b>					
Ville de Kigali	45,9 24,8	17,7 18,4	21,4 5,6	6,7 0,8	547
Sud	28,0 28,3	20,8 20,9	6,7 6,3	0,5 1,2	1 518
Ouest	26,2 22,8	18,5 17,8	6,7 4,5	1,1 0,5	1 397
Nord	31,6 17,7	13,3 13,1	12,0 3,9	6,3 0,7	1 020
Est	41,6 32,7	23,7 23,6	15,2 8,0	2,8 1,1	1 175
<b>Niveau d'instruction<sup>1</sup></b>					
Aucune instruction	34,9 29,2	20,6 20,5	11,9 7,9	2,4 0,8	1 273
Primaire	32,3 24,9	19,1 18,8	10,5 5,2	2,8 0,9	3 824
Secondaire ou plus	31,0 22,7	16,7 17,7	10,9 3,9	3,4 1,1	560
<b>Quintile de bien-être économique</b>					
Le plus pauvre	34,3 28,3	19,5 19,4	11,9 8,1	2,9 0,8	1 197
Second	34,6 27,2	21,9 20,8	10,7 5,2	2,0 1,2	1 197
Moyen	34,1 25,9	19,3 19,9	11,2 4,9	3,6 1,1	1 044
Quatrième	30,9 25,4	18,5 18,5	9,2 6,2	3,1 0,7	1 115
Le plus riche	29,9 21,0	16,5 16,5	11,3 3,9	2,2 0,6	1 103
Ensemble	32,8 25,6	19,2 19,0	10,9 5,7	2,7 0,9	5 657

Note : Le tableau est basé sur les femmes qui ont dormi dans le ménage la nuit précédant l'enquête. La prévalence est ajustée en fonction de l'altitude en utilisant la formule du CDC (1998). Les femmes dont le taux d'hémoglobine est <7,0 g/dl ont une anémie sévère, celles dont le taux est compris entre 7,0-9,9 g/dl ont une anémie modérée, et les femmes enceintes dont le taux est compris entre 10,0-10,9 g/dl et les femmes non enceintes dont le taux est compris entre 10,0-11,9 g/dl ont une anémie légère.

<sup>1</sup> Pour les femmes qui n'ont pas été enquêtées, l'information provient du questionnaire ménage.

<sup>2</sup> Non compris les femmes qui n'ont pas été enquêtées.

**Tableau 10.10 Prévalence de l'anémie chez les enfants selon le niveau d'anémie de la mère**

Pourcentage des enfants âgés de 6-59 mois par gravité de l'anémie, selon la gravité de l'anémie chez la mère, Rwanda 2005

Anémie chez la mère	Atteints d'anémie	Pourcentage d'enfants souffrant d'une anémie			Non anémié	Effectif d'enfants
		Légère (10,0-10,9 g/dl)	Modérée (7,0-9,9 g/dl)	Sévère (en dessous de 7,0 g/dl)		
Atteinte d'anémie	71,3 62,2	15,9 21,2	31,8 36,6	23,5 4,4	37,8	1 019 815
<b>Pourcentage de femmes souffrant d'une anémie</b>						
Légère	61,9 59,6	20,5 21,5	35,3 34,0	6,1 4,1	40,4	613 625
Modérée	81,8 71,0	11,0 20,0	30,4 45,7	40,4 5,3	29,0	325 172
Sévère	100,0 *	1,1 *	11,4 *	87,5 *	30,5	81 18
<b>Non anémié</b>	<b>48,5</b>	<b>22,2</b>	<b>24,8</b>	<b>1,5</b>	<b>51,5</b>	<b>2 470</b>
Ensemble	54,9 51,9	20,0 22,0	26,7 27,7	8,2 2,2	48,1	3 285

Note : \* Basé sur trop peu de cas non pondérés. Le tableau est basé sur les enfants qui ont dormi dans le ménage la nuit précédant l'enquête. La prévalence est ajustée en fonction de l'altitude (et en fonction du fait que la mère fume ou non) en utilisant la formule du CDC (1998). Le tableau concerne seulement les enfants et les mères dont les taux d'hémoglobine sont disponibles.

**Tableau 10.11 Prévalence de l'anémie chez les hommes**

Pourcentage d'hommes de 15-59 ans anémiés, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Rwanda 2005

Caractéristique sociodémographique	Anémié	Pourcentage d'hommes souffrant d'une anémie			Effectif d'hommes
		Anémie légère (12,0-12,9 g/dl)	Anémie modérée (9,0-11,9 g/dl)	Anémie sévère (en dessous de 9,0 g/dl)	
<b>Groupe d'âges<sup>1</sup></b>					
15-19	34,9 29,3	12,9 12,8	18,2 15,7	3,9 0,8	1 082
20-24	24,3 17,9	9,9 8,6	11,1 8,5	3,4 0,8	918
25-29	24,8 16,2	7,4 6,6	12,8 8,3	4,6 1,3	615
30-34	23,6 14,4	6,7 5,7	13,2 7,4	3,8 1,3	486
35-39	27,1 16,9	8,7 7,0	15,8 9,1	2,6 0,7	432
40-44	27,6 22,3	9,3 10,4	14,0 10,4	4,2 1,5	398
45-49	32,1 27,1	11,0 12,4	15,1 12,3	6,0 2,5	373
50-54	35,8 30,3	12,8 12,3	16,2 15,6	6,8 2,4	256
55-59	35,6 28,6	10,0 11,5	17,4 12,3	8,2 4,8	145
<b>Milieu de résidence</b>					
Urbain	26,8 14,5	8,4 6,8	14,4 7,0	4,0 0,7	782
Rural	29,3 23,5	10,3 10,2	14,7 11,8	4,3 1,4	3 922
<b>Province</b>					
Ville de Kigali	33,8 13,0	7,5 5,8	17,9 6,5	8,4 0,7	476
Sud	26,4 26,6	11,8 11,4	13,2 13,8	1,4 1,4	1 230
Ouest	21,1 18,6	8,4 8,3	11,1 9,5	1,6 0,8	1 161
Nord	29,7 16,5	7,9 8,1	12,1 7,3	9,7 1,1	838
Est	37,9 29,0	12,6 12,1	21,1 14,7	4,2 2,3	1 000
<b>Niveau d'instruction<sup>1</sup></b>					
Aucune instruction	30,4 25,7	9,2 9,7	17,4 14,3	3,8 1,7	827
Primaire	30,0 23,1	10,7 10,2	14,7 11,5	4,6 1,4	3 317
Secondaire ou plus	19,6 9,5	7,0 6,0	10,0 3,2	2,7 0,3	560
<b>Quintile de bien-être économique</b>					
Le plus pauvre	31,5 26,6	11,9 11,6	14,4 13,3	5,2 1,7	846
Second	33,3 26,0	9,8 9,8	17,7 14,2	5,9 2,1	877
Moyen	30,4 23,9	9,9 10,2	15,5 12,4	5,0 1,3	963
Quatrième	27,3 21,2	10,2 9,6	14,4 10,8	2,6 0,8	988
Le plus riche	22,9 13,6	8,6 7,3	11,6 5,5	2,7 0,8	1 031
Ensemble	28,9 22,0	10,0 9,6	14,6 11,0	4,2 1,3	4 705

Note : Le tableau est basé sur les hommes qui ont dormi dans le ménage la nuit précédant l'enquête. La prévalence est ajustée en fonction de l'altitude en utilisant la formule du CDC (1998).

<sup>1</sup> Pour les hommes qui n'ont pas été enquêtés, l'information provient du questionnaire ménage.