

Sénégal



Enquête Démographique
et de Santé Continue
(EDS-Continue)

2018

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL



Sénégal : Enquête Démographique et de Santé Continue (EDS-Continue) 2018

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)
Dakar, Sénégal

The DHS Program
ICF
Rockville, Maryland, USA

Mai 2020



Ce rapport présente les résultats de la sixième année de l'Enquête Démographique et de Santé Continue au Sénégal (EDS-Continue 2018), exécutée par l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) en collaboration avec le ministère de la Santé et l'Action sociale (MSAS). Elle a été réalisée avec l'appui financier du Gouvernement du Sénégal, l'Agence des États-Unis pour le Développement international (USAID), la Cellule de Lutte contre la Malnutrition (CLM), la Banque Mondiale, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et Nutrition International. Elle a bénéficié de l'assistance technique du programme mondial des Enquêtes Démographiques et de Santé (Demographic and Health Survey–The DHS Program, ICF).

Pour tous renseignements concernant l'EDS-Continue 2017, contacter :

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)
Rocade Fann Bel-air Cerf-volant B.P. 116 ; Dakar RP (Sénégal)
Téléphone : (221) 33 869 21 39/33 869 21 60
Fax : (221) 33 824 36 15
E-mail : statsenegal@ansd.sn / statsenegal@yahoo.fr
Site web : www.ansd.sn

Concernant The DHS Program, des renseignements peuvent être obtenus auprès de :

ICF
530 Gaither Road, Suite 500, Rockville, MD 20850 USA
Téléphone : 1-301-407-6500
Fax : 1-301-407-6501
E-mail : info@dhsprogram.com
Internet : www.dhsprogram.com

Citation recommandée :

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) [Sénégal], et ICF. 2018. *Sénégal : Enquête Démographique et de Santé Continue (EDS-Continue 2018)*. Rockville, Maryland, USA : ANSD et ICF.

Le contenu de ce rapport relève de la seule responsabilité de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) et ICF et ne reflète pas nécessairement les vues de l'USAID, du Gouvernement des États-Unis ou d'autres agents donatrices.

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES TABLEAUX ET DES GRAPHIQUES	vii
AVANT-PROPOS	xiii
REMERCIEMENTS	xv
SIGLES ET ABRÉVIATIONS	xvii
LIRE ET COMPRENDRE LES TABLEAUX DE L'ENQUETE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ CONTINUE AU SÉNÉGAL (EDS CONTINUE 20187)	xix
INDICATEURS SUR LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE	xxvii
CARTE DU SÉNÉGAL	xxviii
1 PRÉSENTATION ET MÉTHODOLOGIE DE L'ENQUÊTE	1
1.1 Contexte des politiques nationales	1
1.2 Objectifs de l'enquête	2
1.3 Conception de l'échantillon	2
1.4 Questionnaires.....	3
1.5 Anthropométrie.....	3
1.6 Prétest.....	4
1.7 Formation du personnel de collecte	4
1.8 Collecte des données.....	4
1.9 Traitement des données.....	4
1.10 Taux de réponse	5
2 CARACTÉRISTIQUES DES LOGEMENTS ET DE LA POPULATION DES MÉNAGES	7
2.1 Conditions de vie des ménages	8
2.1.1 Sources d'approvisionnement de l'eau de boisson et traitement	8
2.1.2 Installations sanitaires.....	8
2.1.3 Exposition à la fumée à l'intérieur du logement	9
2.1.4 Autres caractéristiques du logement	9
2.1.5 Biens durable des ménages	9
2.1.6 Bien-être économique du ménage.....	10
2.1.7 Lavage des mains.....	10
2.2 Population des ménages et composition.....	11
2.2.1 Structure de la population	11
2.2.2 Taille et composition des ménages	11
2.3 Instruction	12
2.3.1 Niveau d'instruction atteint	12
2.3.2 Fréquentation scolaire.....	13
2.4 Les transferts sociaux et monétaires.....	14
2.4.1 Connaissance de programmes de transferts sociaux	14
2.4.2 Support de programmes de transferts sociaux	15
2.4.3 Transferts d'argent.....	15
2.4.4 Possession de comptes bancaires—participation à des tontines	16
2.5 Couverture maladie universelle.....	16
2.6 Couverture de l'initiative de gratuité des soins pour les enfants de moins de cinq ans.....	17
2.7 Handicap des personnes de 5 ans et plus.....	17
3 CARACTÉRISTIQUES DES ENQUÊTÉS	37
3.1 Caractéristiques de base des enquêtés.....	37
3.2 Niveau d'instruction et alphabétisation	38
3.3 Exposition aux médias et utilisation de l'internet	39
3.4 Emploi.....	39
3.5 Occupation	40
4 NUPTIALITÉ ET ACTIVITÉ SEXUELLE	57
4.1 État matrimonial.....	57
4.2 Polygamie	58
4.3 Âge à la première union	59
4.4 Âge aux premiers rapports sexuels.....	60

4.5	Activité sexuelle.....	61
4.5.1	Activité sexuelle récente.....	61
4.5.2	Partenaires sexuels multiples.....	62
4.5.3	Rapports sexuels payants.....	62
4.5.4	Premiers rapports sexuels.....	63
4.5.5	Rapports sexuels pré-nuptiaux.....	63
4.5.6	Partenaires sexuels multiples chez les jeunes de 15-24 ans.....	63
5	FÉCONDITÉ.....	81
5.1	Fécondité actuelle.....	81
5.2	Enfants déjà nés et enfants survivants.....	83
5.3	Intervalles intergénéral.....	83
5.4	Menopause.....	84
5.5	Âge à la première naissance.....	85
5.6	Fécondité des adolescentes et comportements en matière de santé reproductive avant l'âge de 15 ans.....	86
5.6.1	Fécondité des adolescentes.....	86
5.6.2	Comportements en matière de santé reproductive avant l'âge de 15 ans.....	87
6	PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ.....	95
6.1	Désir d'avoir un autre enfant.....	95
6.2	Taille idéale de la famille.....	97
6.3	Planification de la fécondité.....	98
6.4	Taux de fécondité désiré.....	99
7	PLANIFICATION FAMILIALE.....	107
7.1	Connaissance et utilisation de la contraception.....	107
7.2	Connaissance de la période de fertilité.....	109
7.3	Source d'approvisionnement des méthodes modernes.....	110
7.4	Choix informé.....	110
7.5	Discontinuation des méthodes contraceptives.....	111
7.6	Demande en planification familiale.....	111
7.7	Prise de décision sur la planification familiale.....	113
7.8	Exposition aux messages sur la planification familiale.....	114
7.9	Contact des non utilisatrices de la contraception avec des prestataires de planification familiale.....	114
8	MORTALITÉ DES ENFANTS.....	131
8.1	Mortalité infantile et mortalité juvénile.....	132
8.2	Facteurs de risque biodémographiques.....	134
8.3	Mortalité périnatale.....	135
8.4	Comportement procréateur à hauts risques.....	135
9	SANTÉ MATERNELLE.....	141
9.1	Couverture et contenu des soins prénatals.....	142
9.1.1	Prestataires qualifiés.....	142
9.1.2	Stade de la grossesse et nombre de visites prénatales.....	142
9.2	Composants des visites prénatales.....	143
9.3	Protection contre le tétanos néonatal.....	144
9.4	Services d'accouchement.....	144
9.4.1	Accouchement en établissement de santé.....	144
9.4.2	Assistance durant l'accouchement par un prestataire de santé qualifié.....	145
9.4.3	Accouchement par césarienne.....	146
9.4.4	Durée du séjour dans l'établissement de santé après la naissance.....	146
9.5	Soins postnatals.....	146
9.5.1	Examen postnatal de la mère.....	146
9.5.2	Examen postnatal du nouveau-né.....	147
9.6	Problèmes d'accès aux soins de santé.....	149
9.7	Fistule obstétricale.....	149
10	SANTÉ DE L'ENFANT.....	165
10.1	Poids à la naissance.....	165
10.2	Vaccination des enfants.....	166

10.3	Symptômes d'infections respiratoires aiguës	168
10.4	Fièvre	169
10.5	Maladies diarrhéiques	169
10.5.1	Prévalence de la diarrhée	169
10.5.2	Pratiques alimentaires durant la diarrhée	170
10.5.3	Thérapie de réhydratation par voie orale (TRO) et autres traitements de la diarrhée	170
10.5.4	Source des conseils ou traitements	171
10.5.5	Connaissance des sachets de SRO	171
10.5.6	Traitement des maladies infantiles.....	172
10.6	Évacuation des selles des enfants.....	172
11	NUTRITION DES ENFANTS ET DES ADULTES.....	187
11.1	État nutritionnel des enfants.....	187
11.1.1	Mesure de l'état nutritionnel des jeunes enfants	188
11.1.2	Collecte des données.....	189
11.1.3	Niveaux de sous-nutrition des enfants	189
11.2	Alimentation du nourrisson et du jeune enfant	190
11.2.1	Allaitement	191
11.2.2	Allaitement exclusif.....	191
11.2.3	Durée médiane de l'allaitement	192
11.2.4	Aliments de complément	193
11.2.5	Apport alimentaire minimum acceptable.....	193
11.3	Présence de sel iodé dans les ménages.....	195
11.4	Consommation de micronutriments et supplémentation parmi les enfants	195
11.5	Consommation de micronutriments parmi les mères	197
12	PALUDISME.....	211
12.1	Possession de moustiquaires imprégnées d'insecticide.....	211
12.2	Accès et utilisation des MII dans les ménages	212
12.3	Utilisation des MII par les enfants et les femmes enceintes.....	213
12.4	Paludisme pendant la grossesse	214
12.5	Prise en charge du paludisme chez les enfants.....	215
13	SITUATION DES ENFANTS	227
13.1	Enregistrement des naissances a l'état civil	227
13.2	Enfants orphelins et résidence avec les parents.....	228
13.3	Développement du jeune enfant.....	229
13.3.1	Éducation de la petite enfance	229
13.3.2	Soutien à l'apprentissage	230
13.3.3	Matériel d'apprentissage.....	231
13.4	Encadrement inapproprié des jeunes enfants	232
13.5	Indice de développement du jeune enfant	233
14	EXCISION.....	243
14.1	Connaissance de l'excision	244
14.2	Prévalence et âge à l'excision	244
14.2.1	Prévalence et type de l'excision.....	244
14.2.2	Âge à l'excision	245
14.3	Prévalence et âge des filles à l'excision.....	245
14.4	Opinions sur l'excision	246
	RÉFÉRENCES.....	255
ANNEXE A	PLAN DE SONDAGE	257
A.1	Objectifs.....	257
A.2	Base de sondage.....	257
A.3	Procédure de tirage et la répartition de l'échantillon.....	258
A.4	Calcul des probabilités de tirage	259
A.5	Résultats de l'enquête	261
ANNEXE B	ERREURS DE SONDAGE	265

ANNEXE C	TABLEAUX POUR L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES	275
ANNEXE D	PERSONNEL DE L'EDS-CONTINUE SÉNÉGAL 2018	279
ANNEXE E	QUESTIONNAIRES	283

LISTE DES TABLEAUX ET DES GRAPHIQUES

1	PRÉSENTATION ET MÉTHODOLOGIE DE L'ENQUÊTE	1
	Tableau 1.1 Résultats des interviews ménages et individuelles.....	5
2	CARACTÉRISTIQUES DES LOGEMENTS ET DE la POPULATION DES MÉNAGES	7
	Tableau 2.1 Eau utilisée par les ménages pour boire	19
	Tableau 2.2 Disponibilité de l'eau.....	20
	Tableau 2.3 Type de toilettes utilisées par les ménages.....	20
	Tableau 2.4 Caractéristiques du logement	21
	Tableau 2.5 Biens possédés par les ménages	22
	Tableau 2.6 Quintiles de bien-être économique.....	22
	Tableau 2.7 Lavage des mains	23
	Tableau 2.8 Population des ménages par âge, sexe et milieu de résidence.....	24
	Tableau 2.9 Composition des ménages.....	25
	Tableau 2.10.1 Niveau d'instruction de la population des ménages : Femme.....	26
	Tableau 2.10.2 Niveau d'instruction de la population des ménages : Homme	27
	Tableau 2.11 Taux de fréquentation scolaire	28
	Tableau 2.12 Connaissance d'un programme de transferts sociaux	29
	Tableau 2.13 Support reçu grâce à un programme de transferts sociaux.....	30
	Tableau 2.14 Moment auquel a été reçu un support d'un programme de transferts sociaux	30
	Tableau 2.15 Provenance et destination du transfert d'argent	31
	Tableau 2.16 Participation à des tontines et disposition de compte bancaire	32
	Tableau 2.17 Assurance médicale : Population des ménages	33
	Tableau 2.18 Initiative de gratuité des soins pour les enfants de moins de cinq ans dans des ménages.....	34
	Tableau 2.19 Handicap des personnes âgés de 5 ans et plus.....	35
	Graphique 2.1 Types d'installations sanitaires utilisées par les ménages par résidence.....	9
	Graphique 2.2 Quintiles de bien-être économique par résidence.....	10
	Graphique 2.3 Pyramide des âges de la population	11
	Graphique 2.4 Fréquentation scolaire au niveau secondaire par résidence.....	13
3	CARACTÉRISTIQUES DES ENQUÊTÉS	37
	Tableau 3.1 Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés	43
	Tableau 3.2.1 Niveau d'instruction : Femmes	44
	Tableau 3.2.2 Niveau d'instruction : Hommes	45
	Tableau 3.3.1 Alphabétisation : Femmes.....	46
	Tableau 3.3.2 Alphabétisation : Hommes.....	47
	Tableau 3.4.1 Exposition aux médias : Femmes.....	48
	Tableau 3.4.2 Exposition aux médias : Hommes.....	49
	Tableau 3.5.1 Utilisation de l'internet : Femmes.....	50
	Tableau 3.5.2 Utilisation de l'internet : Hommes.....	51
	Tableau 3.6.1 Emploi : Femmes	52
	Tableau 3.6.2 Emploi : Hommes	53
	Tableau 3.7.1 Occupation : Femmes.....	54
	Tableau 3.7.2 Occupation : Hommes.....	55
	Tableau 3.8 Type d'emploi : Femmes	56
	Graphique 3.1 Niveau d'instruction des enquêtés	38
	Graphique 3.2 Exposition aux médias	39
	Graphique 3.3 Emploi par niveau d'instruction.....	40
	Graphique 3.4 Occupation	41

4	NUPTIALITÉ ET ACTIVITÉ SEXUELLE	57
	Tableau 4.1 État matrimonial actuel	65
	Tableau 4.2.1 Nombre de coépouses	66
	Tableau 4.2.2 Nombre d'épouses des hommes	67
	Tableau 4.3 Âge à la première union	68
	Tableau 4.4 Âge médian à la première union selon certaines caractéristiques	69
	Tableau 4.5 Âge aux premiers rapports sexuels	70
	Tableau 4.6 Âge médian aux premiers rapports sexuels selon certaines caractéristiques	71
	Tableau 4.7.1 Activité sexuelle récente : Femmes.....	72
	Tableau 4.7.2 Activité sexuelle récente : Hommes.....	73
	Tableau 4.8.1 Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois : Femmes.....	74
	Tableau 4.8.2 Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois : Hommes.....	75
	Tableau 4.9 Rapports sexuels payants et utilisation du condom au cours des derniers rapports sexuels payants	76
	Tableau 4.10 Âge aux premiers rapports sexuels parmi les jeunes.....	76
	Tableau 4.11 Rapports sexuels pré-nuptiaux parmi les jeunes.....	77
	Tableau 4.12.1 Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des douze derniers mois parmi les jeunes : Femmes	78
	Tableau 4.12.2 Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois parmi les jeunes : Hommes.....	79
	Graphique 4.1 État matrimonial.....	58
	Graphique 4.2 Proportion de femmes et d'hommes célibataires par âge.....	58
	Graphique 4.3 Tendances de la polygamie	59
	Graphique 4.4 Âge médian des femmes à la première union par milieu de résidence.....	60
	Graphique 4.5 Premier rapports sexuels avant d'atteindre l'âge de 18 ans	60
5	FÉCONDITÉ	81
	Tableau 5.1 Fécondité actuelle	88
	Tableau 5.2 Fécondité selon certaines caractéristiques.....	88
	Tableau 5.3 Tendance de la fécondité par âge	89
	Tableau 5.4 Enfants nés vivants et enfants survivants des femmes	89
	Tableau 5.5 Intervalles intergénéraliques	90
	Tableau 5.6 Aménorrhée, abstinence et insusceptibilité post-partum.....	91
	Tableau 5.7 Durée médiane de l'aménorrhée, de l'abstinence post-partum et de l'insusceptibilité post-partum.....	91
	Tableau 5.8 Ménopause Pourcentage de femmes de 30-49 ans qui sont en ménopause, selon l'âge, Sénégal 2018.....	92
	Tableau 5.9 Âge à la première naissance	92
	Tableau 5.10 Âge médian à la première naissance	92
	Tableau 5.11 Fécondité des adolescentes	93
	Tableau 5.12 Rapports sexuels et comportements en matière de santé reproductive avant l'âge de 15 ans	93
	Graphique 5.1 Tendances de la Fécondité par milieu de résidence	82
	Graphique 5.2 Tendances de la fécondité par âge.....	82
	Graphique 5.3 Fécondité par bien-être économique du ménage.....	83
	Graphique 5.4 Naissances autres que les naissances de rang un par nombre de mois depuis la naissance précédente	83
	Graphique 5.5 Age médian à la première naissance par milieu de résidence	86
	Graphique 5.6 Fécondité des adolescentes par milieu de résidence	87
6	PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ	95
	Tableau 6.1 Préférences en matière de fécondité par nombre d'enfants vivants	101
	Tableau 6.2.1 Désir de limiter les naissances : Femmes.....	101
	Tableau 6.2.2 Désir de limiter les naissances : Hommes.....	102
	Tableau 6.3 Nombre idéal d'enfants selon le nombre d'enfants vivants	103

Tableau 6.4	Nombre idéal d'enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques	104
Tableau 6.5	Planification de la fécondité.....	105
Tableau 6.6	Taux de fécondité désirée.....	105
Graphique 6.1	Femmes 15-49 ans actuellement en union qui ne désirent plus d'enfants.....	96
Graphique 6.2	Désir de limiter le nombre d'enfants par nombre d'enfants vivants : tendance	96
Graphique 6.3	Nombre moyen idéal d'enfants parmi les femmes et les hommes de 15-49 ans	97
Graphique 6.4	Naissances par planification de la grossesse	98
Graphique 6.5	Fécondité désirée et fécondité actuelle : tendances.....	99
7	PLANIFICATION FAMILIALE.....	107
Tableau 7.1	Connaissance des méthodes contraceptives	117
Tableau 7.2	Connaissance des méthodes contraceptives selon certaines caractéristiques sociodémographiques	118
Tableau 7.3	Utilisation actuelle de la contraception selon âge	119
Tableau 7.4	Utilisation actuelle de la contraception selon certaines caractéristiques sociodémographiques.....	121
Tableau 7.5	Connaissance de la période de fertilité.....	123
Tableau 7.6	Connaissance de la période de fertilité par âge	123
Tableau 7.7	Source d'approvisionnement des méthodes modernes de contraception ...	123
Tableau 7.8	Choix informé de la méthode contraceptive	124
Tableau 7.9	Taux de discontinuation des méthodes contraceptives sur 12 mois	124
Tableau 7.10	Raisons de la discontinuation des méthodes contraceptives	125
Tableau 7.11.1	Besoins et demande en matière de planification familiale parmi les femmes actuellement en union.....	126
Tableau 7.11.2	Besoins et demande en matière de planification familiale de l'ensemble des femmes et pour les femmes non sexuellement actives.....	127
Tableau 7.12	Prise de décision concernant la planification familiale	128
Tableau 7.13	Utilisation future de la contraception	128
Tableau 7.14	Exposition aux messages sur la planification familiale.....	129
Tableau 7.15	Contact des non-utilisatrices de la contraception avec des prestataires de planification familiale.....	130
Graphique 7.1	Utilisation contraceptive	109
Graphique 7.2	Tendances de l'utilisation contraceptive	109
Graphique 7.3	Source d'approvisionnement des méthodes modernes de contraception ...	110
Graphique 7.4	Taux de discontinuation des méthodes contraceptives.....	111
Graphique 7.5	Demande en matière de planification familiale.....	112
Graphique 7.6	Besoins non satisfaits en matière de PF pour espacer et pour limiter	113
Graphique 7.7	Contact des non-utilisatrices avec les prestataires	115
8	MORTALITÉ DES ENFANTS.....	131
Tableau 8.1	Quotients de mortalité des enfants de moins de 5 ans.....	137
Tableau 8.2	Quotients de mortalité des enfants sur 5 ans selon certaines caractéristiques démographiques.....	137
Tableau 8.3	Quotients de mortalité des enfants sur 10 ans selon d'autres caractéristiques.....	138
Tableau 8.4	Mortalité périnatale	139
Tableau 8.5	Comportement procréateur à hauts risques	140
Graphique 8.1	Tendances de la mortalité des enfants de moins de 5 ans	133
Graphique 8.2	Mortalité infanto-juvénile par niveau d'instruction de la mère.....	133
Graphique 8.3	Mortalité des enfants de moins de 5 ans selon l'intervalle avec la naissance précédente	135

9	SANTÉ MATERNELLE	141
	Tableau 9.1 Soins prénatals	151
	Tableau 9.2 Nombre de visites prénatales et stade de la grossesse à la première visite	152
	Tableau 9.3 Composants des visites prénatales	153
	Tableau 9.4 Vaccination antitétanique.....	154
	Tableau 9.5 Lieu de l'accouchement	155
	Tableau 9.6 Assistance au cours de l'accouchement	156
	Tableau 9.7 Césarienne.....	157
	Tableau 9.8 Durée du séjour dans l'établissement de santé après la naissance	157
	Tableau 9.9 Moment où le premier examen postnatal a été dispensé à la mère	158
	Tableau 9.10 Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal à la mère.....	159
	Tableau 9.11 Moment où le premier examen postnatal a été dispensé au nouveau-né....	160
	Tableau 9.12 Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal au nouveau-né.....	161
	Tableau 9.13 Contenu des examens postnatals dispensés aux nouveau-nés.....	162
	Tableau 9.14 Problèmes d'accès aux soins de santé	163
	Tableau 9.15 Connaissance et prévalence de la fistule obstétricale.....	164
	Graphique 9.1 Tendances de la couverture en soins prénatals.....	142
	Graphique 9.2 Composants des soins prénatals	143
	Graphique 9.3 Lieu d'accouchement : tendances	145
	Graphique 9.4 Naissances ayant eu lieu dans un établissement de santé par bien-être économique du ménage.....	145
	Graphique 9.5 Soins postnatals selon le lieu de l'accouchement.....	147
10	SANTÉ DE L'ENFANT.....	165
	Tableau 10.1 Taille et poids de l'enfant à la naissance.....	174
	Tableau 10.2 Vaccinations par source d'information	175
	Tableau 10.3 Vaccinations par caractéristique sociodémographique	176
	Tableau 10.4 Possession et observation des carnets de vaccination, selon certaines caractéristiques sociodémographiques	177
	Tableau 10.5 Prévalence et traitement des symptômes d'IRA.....	178
	Tableau 10.6 Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant présenté des symptômes d'IRA	179
	Tableau 10.7 Prévalence et traitement de la fièvre	180
	Tableau 10.8 Prévalence et traitement de la diarrhée	181
	Tableau 10.9 Pratiques alimentaires durant la diarrhée	182
	Tableau 10.10 Thérapie de Réhydratation par voie orale, supplémentation en zinc et administration d'autres traitements contre la diarrhée	183
	Tableau 10.11 Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant eu la diarrhée ..	184
	Tableau 10.12 Connaissance des sachets SRO ou des liquides SRO préconditionnés	185
	Tableau 10.13 Évaluation des selles des enfants	186
	Graphique 10.1 Vaccinations infantiles	167
	Graphique 10.2 Tendances de la couverture vaccinale.....	167
	Graphique 10.3 Prévalence de la diarrhée par âge.....	169
	Graphique 10.4 Pratiques alimentaires pendant la diarrhée.....	170
	Graphique 10.5 Traitement de la diarrhée	171
	Graphique 10.6 Prévalence et traitement des maladies infantiles.....	172
11	NUTRITION DES ENFANTS ET DES ADULTES.....	187
	Tableau 11.1 État nutritionnel des enfants.....	199
	Tableau 11.2 Allaitement initial	201
	Tableau 11.3 Type d'allaitement selon l'âge de l'enfant.....	202
	Tableau 11.4 Indicateurs de l'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) concernant l'allaitement.....	202
	Tableau 11.5 Durée médiane de l'allaitement	203

Tableau 11.6	Aliments et liquides reçus par les enfants le jour ou la nuit ayant précédé l'interview.....	204
Tableau 11.7	Consommation de collations sucrées, collations salées et boissons gazeuses par les enfants âgés de 6 à 23 mois le jour ou la nuit ayant précédé l'interview.....	205
Tableau 11.8	Apport alimentaire minimum acceptable.....	206
Tableau 11.9	Présence de sel iodé dans le ménage.....	207
Tableau 11.10	Consommation de micronutriments par les enfants.....	208
Tableau 11.11	Aliments thérapeutiques et compléments alimentaires.....	209
Tableau 11.12	Consommation de micronutriments par les mères.....	210
Graphique 11.1	Tendances de l'état nutritionnel des enfants.....	190
Graphique 11.2	Retard de croissance chez les enfants par niveau de bien-être économique du ménage.....	190
Graphique 11.3	Tendances de l'allaitement initial.....	191
Graphique 11.4	Pratiques d'allaitement par âge.....	192
Graphique 11.5	Tendances de l'allaitement exclusif.....	192
Graphique 11.6	Tendances de la durée médiane d'allaitement.....	192
Graphique 11.7	Indicateurs ANJE sur l'apport alimentaire minimum acceptable.....	194
12	PALUDISME.....	211
Tableau 12.1	Possession de moustiquaires par les ménages.....	218
Tableau 12.2	Source d'obtention des moustiquaires.....	219
Tableau 12.3	Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII).....	220
Tableau 12.4	Accès à une MII.....	220
Tableau 12.5	Utilisation des moustiquaires par les ménages.....	221
Tableau 12.6	Utilisation des MII existantes.....	221
Tableau 12.7	Utilisation des moustiquaires par les enfants.....	222
Tableau 12.8	Utilisation des moustiquaires par les femmes enceintes.....	223
Tableau 12.9	Utilisation du traitement préventif intermittent (TPIg) par les femmes pendant la grossesse.....	224
Tableau 12.10	Prévalence, diagnostic et traitement précoce des enfants avec de la fièvre.....	225
Tableau 12.11	Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant de la fièvre.....	226
Graphique 12.1	Possession de MII dans les ménages : tendance.....	212
Graphique 12.2	Accès et utilisation des MII : tendances.....	213
Graphique 12.3	Utilisation du TPIg par les femmes enceintes : tendances.....	215
13	SITUATION DES ENFANTS.....	227
Tableau 13.1	Enregistrement à l'état civil des naissances d'enfants de moins de 5 ans..	235
Tableau 13.2	Enfants orphelins et résidence avec les parents.....	236
Tableau 13.3	Éducation de la petite enfance.....	237
Tableau 13.4	Soutien à l'apprentissage.....	238
Tableau 13.5	Matériel d'apprentissage.....	239
Tableau 13.6	Encadrement inapproprié des enfants.....	240
Tableau 13.7	Index de développement du jeune enfant.....	241
Graphique 13.1	Enregistrement des naissances d'enfants de moins de 5 ans auprès des autorités civiles : tendances.....	228
Graphique 13.2	Enregistrement des naissances d'enfants de moins de 5 ans auprès des autorités civiles par quintile de bien-être économique du ménage.....	228
Graphique 13.3	Enfants qui fréquente un programme d'éducation préscolaire par niveau d'instruction de la mère.....	230
Graphique 13.4	Soutien à l'apprentissage par quintile de bien-être économique.....	231
Graphique 13.5	Utilisation d'au moins deux types de jouets.....	232
14	EXCISION.....	243
Tableau 14.1	Connaissance de l'excision.....	249
Tableau 14.2	Prévalence de l'excision.....	250

Tableau 14.3	Âge à l'excision	251
Tableau 14.4	Prévalence de l'excision et âge à l'excision : Filles de 0-14 ans.....	251
Tableau 14.5	Excision des filles de 0-14 ans selon les caractéristiques sociodémographiques de la mère	252
Tableau 14.6	Opinion des femmes et des hommes sur l'excision, en tant que nécessité religieuse.....	253
Tableau 14.7	Opinion des femmes et des hommes concernant le maintien ou non de cette pratique.....	254
Graphique 14.1	Type d'excision.....	244
Graphique 14.2	Tendances d'excision des filles.....	245
Graphique 14.3	Âge à l'excision parmi les femmes et les filles.....	246
Graphique 14.4	Opinion sur l'excision par ethnie	247
ANNEXE A PLAN DE SONDRAGE		257
Tableau A.1	Répartition de nombres de DR et la taille moyenne de DR en ménages par région et selon le milieu de résidence (RGPH-2013).....	258
Tableau A.2	Répartition de ménage par région et selon le milieu de résidence (RGPH-2013).....	258
Tableau A.3	Répartition de l'échantillon grappes et de l'échantillon ménages par région et par type de résidence, EDS Continue Sénégal 2018	259
Tableau A.4	Répartition de nombres attendus de femmes et hommes enquêtés avec succès par région et par type de résidence, EDS Continue Sénégal 2018.....	259
Tableau A.5	Résultats de l'enquête : Femme	262
Tableau A.6	Résultats de l'enquête : Homme	263
ANNEXE B ERREURS DE SONDRAGE		265
Tableau B.1	Erreurs de sondage : Échantillon Total, EDS Continue Sénégal 2018.....	267
Tableau B.2	Erreurs de sondage : Échantillon Total, EDS Continue Sénégal 2018.....	268
Tableau B.3	Erreurs de sondage : Échantillon Urbain, EDS Continue Sénégal 2018....	269
Tableau B.4	Erreurs de sondage : Échantillon Rural, EDS Continue Sénégal 2018.....	270
Tableau B.5	Erreurs de sondage : Échantillon Nord, EDS Continue Sénégal 2018.....	271
Tableau B.6	Erreurs de sondage : Échantillon Ouest, EDS Continue Sénégal 2018.....	272
Tableau B.7	Erreurs de sondage : Échantillon Centre, EDS Continue Sénégal 2018	273
Tableau B.8	Erreurs de sondage : Échantillon Sud, EDS Continue Sénégal 2018.....	274
ANNEXE C TABLEAUX POUR L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES		275
Tableau C.1	Répartition par âge de la population des ménages	275
Tableau C.2.1	Répartition par âge des femmes éligibles et interviewées.....	276
Tableau C.2.2	Répartition par âge des hommes éligibles et interviewés.....	276
Tableau C.3	Complétude de l'enregistrement	277
Tableau C.4	Naissances par année de naissance.....	277
Tableau C.5	Enregistrement de l'âge au décès en jours	278
Tableau C.6	Enregistrement de l'âge au décès en mois	278

AVANT-PROPOS

Le Sénégal a réalisé des Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS) en 1986, 1992, 1997, 2005, et 2010-2011. Au sortir de l'édition de 2010-2011, notre pays s'est engagé dans la mise en œuvre d'un programme d'enquêtes dont la périodicité de collecte de données est ramenée à un an (EDS-continue). A la suite de la phase pilote du projet de l'enquête Continue (2012-2017) initiée par l'USAID, le Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération à travers l'ANSD avec la collaboration du Ministère de la Santé et de l'Action Sociale, s'est engagé pour pérenniser l'enquête Continue. Ce rapport présente les résultats de la première année de pérennisation (2018).

L'Enquête Continue comporte deux volets : l'Enquête Démographique et de Santé Continue (EDS-Continue) qui collecte des données auprès des ménages et l'Enquête Continue sur la Prestation des Services de Soins de Santé (ECPSS) qui collecte les données auprès des structures de santé.

Je me réjouis de la qualité de la collaboration entre le Ministère de l'Économie, des Finances et du Plan (MEFP) et le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale (MSAS), pour la réalisation de ce projet qui est d'une importance capitale pour notre pays.

L'enquête de 2018, a été réalisée de bout en bout par l'expertise nationale. Cette sixième phase de l'Enquête Continue a porté sur des thèmes développés dans les précédentes, en particulier la fécondité, la planification familiale, les soins pré et postnatals, les maladies de l'enfant, leur prévention et leur prise en charge, ainsi que la mortalité infantile-juvénile. Elle a aussi abordé des modules spéciaux relatifs entre autre aux violences domestiques, l'excision etc.

En mettant en place le dispositif de l'Enquête Démographique et de Santé Continue (EDS-Continue) et l'Enquête Continue sur la Prestation des Services de Soins de Santé (ECPSS), l'ANSD entend mettre à la disposition des décideurs politiques, des planificateurs et des chercheurs des données actualisées pour une bonne planification du développement économique et social.

À travers cette enquête, l'ANSD poursuit des efforts à l'endroit des utilisateurs pour leur faciliter l'accès aux données ; les bases et les documents relatifs à l'enquête de 2018 sont mise en ligne sur internet et sont téléchargeables.

La mise en œuvre de cette enquête a mobilisé des ressources financières importantes. L'État du Sénégal, l'Agence Américaine pour le développement International (USAID), la Banque Mondiale (BM), le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), l'ONU Femmes, Nutrition Internationale (NI), Helen Keller International (HKI), la Cellule de Lutte Contre la Malnutrition (CLM), et à ICF International ont assuré le financement de l'enquête et l'appui technique de sa mise en œuvre.

Je remercie tous les partenaires institutionnels et toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette importante opération. J'exprime ma profonde gratitude aux services de l'État et aux populations pour leur appui et leur disponibilité tout au long du travail de collecte des données.



The image shows a circular official stamp in red ink. The text around the perimeter of the stamp reads "République du Sénégal" at the top and "Ministère de la Santé et de l'Action Sociale" at the bottom. In the center of the stamp, it says "Le Ministre". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp is a rectangular red stamp with the name "Abdoulaye Diouf SARR" in bold red capital letters.

REMERCIEMENTS

Le projet de l'Enquête Continue comporte deux volets : l'Enquête Démographique et de Santé Continue (EDS-Continue) qui collecte des données auprès des ménages et l'Enquête Continue sur la Prestation des Services de Soins de Santé (ECPSS) qui collecte les données auprès des structures de santé. Le projet vise à répondre notamment aux besoins permanents en données pour planifier, suivre et évaluer les programmes de santé et de population. Il reste également un cadre idéal pour le renforcement de capacités au sein de nos institutions, en collecte, traitement, analyse et diffusion de données.

A la suite de la phase pilote du projet de l'enquête Continue (2012-2017) initiée par l'USAID, le Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération à travers l'ANSD avec la collaboration du Ministère de la Santé et de l'Action Sociale, s'est engagé pour pérenniser l'enquête Continue. Ce rapport présente les résultats de la première année de pérennisation (2018).


L'EDS-Continue et ECPSS ont nécessité la mobilisation d'importantes ressources financières, de la disponibilité et de la compétence de plusieurs personnes ressources. Je voudrais donc, à l'occasion de la publication du présent rapport, adresser mes sincères remerciements aux partenaires techniques et financiers (PTF), notamment l'Etat du Sénégal, l'Agence Américaine pour le développement International (USAID), la Banque Mondiale (BM), le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), l'ONU Femmes, à Nutrition Internationale (NI), à Helen Keller International (HKI), à la Cellule de Lutte Contre la Malnutrition (CLM), et à ICF International qui ont appuyé l'ANSD tout le long de ce projet.

L'enquête de 2018, a été réalisée de bout en bout par l'expertise nationale. Je salue l'abnégation du personnel de l'ANSD et celui du Ministère de la Santé et de l'Action Sociale, au niveau central comme au niveau périphérique pour leur précieuse collaboration ; les membres des Comités de pilotage et technique pour leur contribution et leur disponibilité.

Je voudrais également témoigner ma profonde gratitude et ma reconnaissance à l'égard des autorités administratives, locales, religieuses et coutumières, et aux populations des localités enquêtées pour l'accueil chaleureux qu'elles ont réservé au personnel de terrain et leur disponibilité.

J'adresse toutes mes félicitations au personnel de terrain superviseurs, chefs d'équipe, chauffeurs, enquêteurs, techniciens de santé pour leur professionnalisme, leur dévouement et leur endurance qui ont été déterminants pour la réussite de l'enquête.

Enfin, je salue le concours des collègues de l'ensemble des services techniques, administratifs, logistiques et financiers de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie qui se sont tous mobilisés pour assurer un succès à cette importante enquête.



The image shows a circular official stamp in pink ink. The text around the perimeter of the stamp reads "AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE". In the center of the stamp, the words "Le Directeur Général" are printed. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp is a rectangular pink stamp containing the name "Babacar NDIR" in bold pink letters.

SIGLES ET ABRÉVIATIONS


ANJE	Pratiques alimentaires appropriées du nourrisson et du jeune enfant
ANSD	Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
CNERS	Comité National d'Éthique pour la Recherche en Santé
CTA	Combinaisons Thérapeutiques à base d'Artémisinine
DHS	Demographic and Health Surveys
DPES	Document de Politique Économique et Social
DR	District de Recensement
DTC	Diphtérie, Tétanos et Coqueluche
ICP	Infirmiers/ères Chefs de Poste
IRA	Infections Respiratoires Aiguës
ISF	Indice Synthétique de Fécondité
IST	Infections sexuellement transmissibles
MII	Moustiquaires Imprégnées d'Insecticide
OIT	Organisation Internationale du Travail
OMD	Objectifs du Millénaire pour le Développement
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
PEC	Prise En Charge du Paludisme
PEV	Programme Élargi de Vaccinations
PFTE	Pires Formes de Travail des Enfants
PID	Pulvérisation Intradomiciliaire
PNDS	Plan National de Développement Sanitaire
PNLP	Programme National de Lutte contre le Paludisme
PPG	Paludisme pendant la grossesse
PPTE	Pays Pauvre Très Endetté
RGP	Recensement Général de la Population
RGPH	Recensement Général de la Population et de l'Habitat
SP	Sulfadoxine-Pyriméthamine
SRO	Sels de Réhydratation par voie Orale
TAR	Thérapies antirétrovirales
TBF	Taux Brut de Fréquentation scolaire
TBN	Taux Brut de Natalité
TDR	Test de Diagnostic Rapide
TGFG	Taux Global de Fécondité Générale
TME	Transmission mère-enfant du VIH
TNF	Taux Net de Fréquentation scolaire
TPIg	Traitement Préventif Intermittent
TRO	Traitement de Réhydratation par voie Orale
UCAD	Université Cheikh Anta Diop

LIRE ET COMPRENDRE LES TABLEAUX DE L'ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ CONTINUE AU SÉNÉGAL (EDS CONTINUE 2018)

Le nouveau format du rapport final de l'EDS Continue 2018 se base sur environ 150 tableaux de données. Pour consultation facile, les tableaux se trouvent à la fin de chaque chapitre (les utilisateurs peuvent aussi les accéder à travers des liens dans le texte dans la version électronique). De plus, ce format plus convivial présente à peu près 70 graphiques qui soulignent clairement des tendances au cours de temps et les tendances régionales, et par des caractéristiques sociodémographiques. Le texte a été simplifié à fin de souligner les points clés avec des points à puces et d'identifier clairement les détails des indicateurs avec des boîtes de définition.

Bien que le texte et les graphiques présentés dans chaque chapitre soulignent certains résultats importants des tableaux, chaque résultat ne peut pas être discuté ou présenté graphiquement. Pour cette raison, les utilisateurs de données de l'EDS Continue 2018 doivent être à l'aise en lisant et interprétant les tableaux.

Les pages suivantes fournissent une introduction à l'organisation des tableaux de l'EDS Continue 2018 et la présentation des caractéristiques sociodémographiques, aussi bien qu'un résumé bref de l'échantillonnage pour aider avec la compréhension des dénominateurs. De plus, cette section fournit des exercices pour les utilisateurs pour pratiquer leurs nouvelles compétences en interprétation des tableaux de l'EDS Continue 2018.



Exemple 1 : Exposition aux médias : Femmes

Une question posée à tous les enquêtés

1							
Tableau 3.4.1 Exposition aux médias : Femmes							
Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui sont exposées à certains médias, au moins, une fois par semaine, selon certaines caractéristiques sociodémographiques Sénégal 2018							
3						2	
Caractéristique sociodémographique	Lit un journal, au moins, une fois par semaine	Regarde la télévision, au moins, une fois par semaine	Écoute la radio, au moins, une fois par semaine	Les trois médias, au moins, une fois par semaine	Aucun média, au moins, une fois par semaine	Effectif de femmes	
Groupe d'âges							
15-19	11,7	69,3	36,8	3,7	22,7	2 056	
20-24	21,4	69,9	42,8	7,9	20,1	1 686	
25-29	17,4	69,2	50,7	10,6	19,8	1 591	
30-34	9,0	66,5	50,5	6,4	21,9	1 387	
35-39	11,8	64,2	55,3	7,6	20,2	1 153	
40-44	8,4	60,0	50,3	4,0	25,1	868	
45-49	8,6	65,0	58,0	7,1	20,3	673	
Résidence							
Urbain	24,0	85,7	49,3	11,9	9,4	4 518	
Rural	3,8	50,1	45,4	2,0	32,4	4 896	
Région							
Nord	5,3	61,0	48,2	2,3	25,1	1 565	
Ouest	26,7	85,4	50,0	13,2	7,9	3 725	
Centre	3,5	59,1	47,7	1,9	26,2	2 870	
Sud	7,3	39,3	37,1	4,3	45,8	1 254	
Niveau d'instruction							
Pas d'instruction	0,2	53,5	45,8	0,2	30,3	4 304	
Primaire	9,6	76,2	49,2	4,9	16,3	2 070	
Moyen/secondaire ou plus	35,0	80,4	48,1	17,4	12,2	3 040	
Quintiles de bien-être économique							
Le plus bas	1,4	14,9	38,8	0,6	55,3	1 508	
Second	2,7	40,0	43,8	1,2	38,4	1 659	
Moyen	6,7	79,8	48,6	3,4	15,1	1 908	
Quatrième	14,4	87,7	49,5	7,4	8,0	2 065	
Le plus élevé	34,2	92,4	52,2	17,2	3,8	2 273	
Ensemble	4	13,5	63,2	47,3	6,8	21,4	9 414

Étape 1 : Lisez le titre et le sous-titre. Ils vous présentent le sujet et la population de référence que le tableau décrit. Par exemple, ce tableau porte sur les femmes de 15-49 ans et leur exposition aux médias. Ces questions ont été posées à toutes les femmes de 15-49 ans dans les ménages sélectionnés.

Étape 2 : Regardez les en-têtes des colonnes—soulignées en vert dans l'Exemple 1. Ils décrivent la façon dont l'information est présentée. Dans ce tableau, les trois premières colonnes de données présentent les différents types de médias auxquels les femmes peuvent être exposées hebdomadairement. La quatrième colonne présente les femmes qui accèdent les trois médias au moins une fois par semaine et la quatrième colonne montre les femmes qui n'accèdent aucun média hebdomadairement. La dernière colonne énumère le nombre de femmes enquêtées.

Étape 3 : Regardez les titres des lignes—soulignées en bleu dans l'Exemple 1. Les lignes montrent comment l'exposition aux médias varie selon les caractéristiques sociodémographiques. Ce tableau présente l'exposition aux médias par âge, milieu de résidence, région, niveau d'instruction, et quintile de bien-être économique. La plupart des tableaux de l'EDS Continue 2018 présentent les données selon ces catégories.

Étape 4 : Regardez la dernière ligne en bas du tableau—soulignée en rose. Ces pourcentages représentent l'ensemble des femmes qui sont exposées à chaque type de média au moins une fois par semaine. Dans cet exemple, 13,5 %* de femmes de 15-49 ans lisent un journal au moins une fois par semaine, 63,2 % regardent la télévision au moins une fois par semaine et 47,3 % écoutent la radio hebdomadairement.

Étape 5 : Pour identifier le pourcentage de femmes ayant un niveau d’instruction moyen/secondaire ou plus qui sont exposées aux trois médias hebdomadairement, tracez deux lignes, comme celles qui se trouvent sur le tableau. Dans cet exemple, 17,4 % de femmes de 15-49 ans ayant un niveau d’instruction moyen/secondaire ou plus sont exposées aux trois médias au moins une fois par semaine.

En regardant les tendances selon les caractéristiques sociodémographiques, nous voyons comment l’exposition aux médias varie à travers le Sénégal. Les médias sont souvent utilisés pour communiquer des messages portant sur la santé. Les gérants des programmes et les décideurs politiques peuvent mieux toucher leurs populations cibles s’ils connaissent comment l’exposition aux médias varie parmi les groupes différentes.

Pratique : Utilisez ce tableau pour répondre aux questions suivantes :

- Quel pourcentage de femmes de 15-49 ans n’accèdent aucun média au moins une fois par semaine ?
- Dans quel group d’âge la proportion de femmes exposées à la radio est-elle la plus élevée ?
- Comparez les femmes en milieu urbain à celles en milieu rural—dans quel group l’exposition à la télévision est-elle la plus élevée ?
- Quels sont les pourcentages minimum et maximum (la gamme) de femmes qui n’accèdent aucun média une fois par semaine selon la région ?
- Est-ce qu’il y a une association claire entre l’exposition hebdomadaire à un journal et le niveau d’instruction ?
- Est-ce qu’il y a une association claire entre l’exposition hebdomadaire à la télévision et le quintile de bien-être économique ?

Réponses :

a) 21,4 %

b) Femmes de 45-49 ans : 58,0 % de femmes dans ce groupe d’âge écoutent la radio hebdomadairement.

c) Femmes en milieu urbain, 85,7 % regardent la télévision hebdomadairement contre 40,1 % de femmes en milieu rural.

d) Le pourcentage de femmes qui n’accèdent aucun média une fois par semaine varie d’un minimum de 7,9 % à l’Ouest à un maximum de 45,8 dans la région Sud.

e) L’exposition hebdomadaire à un journal augmente avec le niveau d’instruction : 0,2 % de femmes sans instruction lisent un journal au moins une fois par semaine comparé à 35,0 % de femmes ayant un niveau d’instruction moyen/secondaire ou plus.

f) L’exposition hebdomadaire à la radio augmente avec le niveau de bien-être économique : 14,0 % de femmes du quintile le plus bas écoutent la radio au moins une fois par semaine comparé à 92,4 % de femmes du quintile le plus élevé.

*Pour ce document, les données sont présentées exactement comment elles se trouvent dans le tableau, y compris les décimales. Cependant, le texte dans le reste de ce rapport arrondi les chiffres aux points de pourcentage entiers.

Exemple 2 : Prévalence et traitement des symptômes d'IRA

Une question posée à un sous-groupe des enquêtées

Tableau 10.5 Prévalence et traitement des symptômes d'IRA					
1 Parmi les enfants de moins de 5 ans, pourcentage ayant eu des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA) au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview ; parmi les enfants ayant présenté des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018					
Caractéristique sociodémographique	Parmi les enfants de moins de 5 ans :		Parmi les enfants de moins de 5 ans avec des symptômes d'IRA :		
	Pourcentage avec des symptômes d'IRA ¹	Effectif d'enfants	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés ²	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés le jour même ou le jour suivant	Effectif d'enfants
Âge en mois					
<6	5,5	541	(60,6)	(34,2)	30
6-11	7,3	666	(56,1)	(19,9)	49
12-23	6,0	1 227	62,8	31,6	74
24-35	5,6	1 092	55,5	30,3	61
36-47	3,7	1 106	(60,7)	(21,6)	41
48-59	3,0	1 189	(55,3)	(36,3)	36
Sexe					
Masculin	4,9	2 937	57,3	33,5	145
Féminin	5,1	2 883	60,1	24,1	146
Consommation de tabac/cigarettes par la mère					
Ne fume pas	5,0	5 820	58,7	28,8	291
Combustible utilisé pour cuisiner					
Électricité ou gaz	5,3	1 342	(65,5)	(32,7)	72
Charbon/lignite	4,8	3 231	50,9	22,7	156
Charbon de bois	4,8	1 193	(67,7)	(36,9)	57
Excréments d'animaux	(10,7)	38	*	*	4
Autre combustible	*	2	*	*	0
Pas de repas préparé dans le ménage	*	14	*	*	2
Résidence					
Urbain	5,1	2 210	72,6	35,6	113
Rural	4,9	3 610	49,8	24,4	178
Région					
Nord	4,0	952	(45,7)	(7,6)	38
Ouest	5,2	1 828	(76,1)	(37,0)	95
Centre	6,5	2 097	51,2	29,8	137
Sud	2,3	943	(52,3)	(23,4)	22
Niveau d'instruction de la mère					
Pas d'instruction	4,3	3 622	49,6	20,5	155
Primaire	5,2	1 184	78,9	42,9	62
Moyen/Secondaire ou plus	7,3	1 014	60,7	34,3	74
Quintiles de bien-être économique					
Le plus bas	3,8	1 352	40,3	19,4	51
Second	4,8	1 281	54,8	21,9	62
Moyen	5,8	1 156	61,4	34,7	67
Quatrième	4,4	1 011	(65,1)	(39,8)	45
Le plus élevé	6,5	1 020	(69,3)	(29,1)	66
Ensemble	5,0	5 820	58,7	28,8	291

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Les symptômes d'IRA incluent une respiration courte et rapide associé à des problèmes de congestion dans la poitrine et/ou des difficultés respiratoires associés à des problèmes de congestion dans la poitrine.

² Sont inclus les conseils ou traitements fournis par : secteur public, secteur médical privé boutique, marché et vendeur de médicaments ambulants. Ne sont pas pris en compte ici les conseils ou traitements fournis par un praticien traditionnel.

³ Y compris l'herbe, les arbustes et les résidus agricoles.

Étape 1 : Lisez le titre et le sous-titre. Dans cet exemple, le tableau porte sur deux groupes différents : (a) les enfants de moins de cinq ans et (b) les enfants de moins de cinq ans qui avaient des symptômes d'IRA au cours des deux semaines ayant précédé l'interview.

Étape 2 : Identifiez les deux groupes. D'abord, identifiez les colonnes qui portent sur les enfants de moins de cinq ans (a), puis isolez les colonnes qui ne portent que sur les enfants de moins de cinq ans qui avaient des symptômes d'IRA (b).

Étape 3 : Regardez le groupe (a). Quel pourcentage d'enfants de moins de cinq ans avaient des symptômes d'IRA au cours des deux semaines ayant précédé l'interview ? C'est 5,0 %.

Maintenant, regardez le groupe (b). Combien d'enfants avaient des symptômes d'IRA ? Seulement 460 ou 4,3 % des 10 763 enfants de moins de cinq ans. Le groupe (b) est un sous-groupe du groupe (a).

Étape 4 : Il n'y a que 291 enfants de moins de cinq ans qui avaient des symptômes d'IRA. Quand ces enfants sont répartis par caractéristiques sociodémographiques, il y a parfois trop peu de cas pour que les pourcentages soient fiables.

- Des conseils ou un traitement ont été cherchés pour quel pourcentage d'enfants de moins de six mois ayant eu des symptômes d'IRA ? 60,6 %. Ce pourcentage est entre parenthèses parce qu'il porte sur un effectif réduit (25-49 enfants non pondérés) dans cette catégorie. Les lecteurs doivent donc faire très attention en utilisant ce pourcentage—il est possible qu'il n'est pas précis. (Pour plus d'information sur les effectifs pondérés et non pondérés, voyez Exemple 3.)
- Des conseils ou un traitement ont été cherchés pour quel pourcentage d'enfants dans des ménages qui utilisent excréments d'animaux ayant eu des symptômes d'IRA ? Il n'y a pas de valeur, mais un astérisque parce qu'il y a très peu de cas (moins de 25 enfants non pondérés) dans cette catégorie. Le résultat pour ce groupe n'est pas présenté. Le groupe est trop petit, donc le résultat n'est pas fiable.

Note : Quand les parenthèses ou les astérisques sont utilisés dans un tableau, l'explication est notée en bas du tableau. S'il n'y a pas des parenthèses ou astérisques dans le tableau, cela signifie qu'il y a assez de cas dans toutes les catégories pour que les données soient fiables.

Exemple 3 : Comprendre les pondérations d'échantillonnage de tableaux de l'EDS Continue 2018

Tableau 3.1 Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés			
Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans par certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018			
Caractéristique sociodémographique	Femmes		
	Pourcentage pondéré	Effectif pondéré	Effectif non pondéré
Région			
Nord	16,6	1 565	1 994
Ouest	39,6	3 725	1 643
Centre	30,5	2 870	3 199
Sud	13,3	1 254	2 578
Ensemble 15-49	100,0	9 414	9 414

Un échantillon est un sous-ensemble d'une population tiré pour être enquêté. Dans l'EDS Continue 2018, l'échantillon représente la population nationale entière. La plupart de pays qui font des EDS veulent collecter des données et diffuser les résultats pour le pays entier mais aussi pour les régions du pays. L'échantillon de l'EDS Continue 2018 est représentatif au niveau national, au niveau des grandes régions, et pour les milieux urbains et ruraux.

L'EDS Continue 2018 vise à produire des résultats représentatifs au niveau de l'ensemble du pays, et au niveau des grandes régions. Il faut donc que l'échantillon de chaque région représente la population réelle de cette région et que l'échantillon national représente la population réelle du pays. Si les régions d'un pays varient en dimension de la population, en particulier, si quelques régions ont des populations très réduites, un échantillon aléatoire ne comprendrait pas assez d'enquêtés de chaque région pour pouvoir fournir des résultats valables. Pour résoudre ce problème, des régions avec des populations réduites sont sur-échantillonnées. Par exemple, supposons que vous ayez assez de fonds pour enquêter 9 414 femmes dans une enquête qui doit être représentative au niveau national et au niveau régional (comme dans le tableau en haut pour le Sénégal). Au Sénégal, la population n'est pas distribuée uniformément parmi les régions : quelques régions sont peuplées (comme Ouest), mais d'autres (Région Sud) ont des populations plus limitées. Cette région doit être sur-échantillonnée.

Un spécialiste en sondage peut déterminer combien de femmes doivent être enquêtées dans chaque région pour obtenir des statistiques fiables. Dans le cas du Sénégal, la **colonne bleue (1)** montre le nombre de femmes enquêtées dans chaque grande région (le nombre varie de 3 199 dans la grande région Sud à 1 994 dans le Nord). Avec ces effectifs, il y a assez d'enquêtées pour avoir des statistiques fiables dans chaque grande région.

Toutefois, avec cette distribution des enquêtées, quelques régions sont surreprésentées et d'autres sont sous-représentées. Par exemple, la grande région Sud représente 13 % de la population du Sénégal. Par contre, l'Ouest représente environ 40 % de la population. La population de la grande région de l'Ouest est 3 fois plus grande que celle du Sud, mais la colonne bleue montre que l'EDS Continue 2018 n'a pas enquêté 3 fois plus de femmes dans le Sud (2578) qu'à l'Ouest (1 643). Cela ne représente pas exactement la population du pays.

Pour obtenir des statistiques qui représentent le pays entier, la distribution des femmes dans l'échantillon doit ressembler la distribution des femmes dans le pays. Les femmes d'une petite région, comme le Sud, ne doivent que peu contribuer au total national. De même, les femmes d'une région plus grande, comme l'Ouest, doivent contribuer plus. Par conséquent, les statisticiens modifient mathématiquement ou « pondèrent » le nombre de femmes enquêtées de chaque région pour que la contribution de chaque région au total national soit proportionnelle à la population réelle du pays. Les chiffres de la **colonne violette (2)** montrent que l'effectif de 9 414 femmes n'a pas changé, mais la distribution des femmes par région a changé pour représenter leur contribution réelle à la population totale.

Comment les statisticiens pondèrent chaque catégorie ? Ils recalculent les catégories pour qu'elles reflètent la population réelle du pays. Si vous comparez **la colonne verte (3)** à la distribution réelle de la population du Sénégal, vous verrez que les femmes de chaque région contribuent à l'échantillon total avec le même poids qu'elles ont réellement dans la population du pays. Maintenant l'effectif pondéré des femmes représente les femmes habitent réellement dans le Sud et celles qui habitent à l'Ouest.

Avec un échantillon pondéré, il est possible d'enquêter assez de femmes pour fournir des statistiques fiables au niveau national et au niveau régional sans fausser la distribution réelle de la population du pays. En général, les tableaux ne montrent que les effectifs pondérés d'enquêtés, ne soyez pas donc inquiets si les effectifs pondérés semblent petits : ils peuvent représenter un plus grand nombre de femmes enquêtées. Rappelez-vous que le tableau utilisera les parenthèses et les astérisques pour vous avertir qu'il y a trop peu cas non pondérés dans une catégorie.

INDICATEURS SUR LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Indicateurs sur les objectifs de développement durable, EDS Continue Sénégal 2018

Indicateur	Sexe			Numéro de tableaux dans le Rapport EDS
	Masculin	Féminin	Total	
2. Éliminer la faim				
2.2.1 Prévalence du retard de croissance parmi les enfants de moins de 5 ans	21,7	15,9	18,8	11.1
2.2.2 Prévalence de la malnutrition parmi les enfants de moins de 5 ans	9,7	8,9	9,3	11.1
a) Prévalence de l'émaciation parmi les enfants de moins de 5 ans	8,1	7,5	7,8	11.1
b) Prévalence du surpoids (obésité) parmi les enfants de moins de 5 ans	1,6	1,3	1,5	11.1
3. Bonne santé et bien-être				
3.1.1 Taux de mortalité maternelle ¹	nd	nd	nd	-
3.1.2 Proportion des naissances assistées par un professionnel qualifié	na	na	74,2	9.6
3.2.1 Taux de mortalité infanto-juvénile ²	59	43	51	8.1
3.2.2 Taux de mortalité néonatale ²	27	19	23	8.1
3.7.1 Proportion de femmes en âge de procréer (âgées de 15-49 ans) dont les besoins en fins de planification familiale sont satisfaits à l'aide des méthodes modernes	na	54,7	na	7.11.1
3.7.2 Taux de natalité parmi les adolescentes par 1 000 femmes				
a) Filles âgées de 10-14 ans ³	na	0	na	5.1
b) Femmes âgées de 15-19 ans ⁴	na	68	na	5.1
3.a.1 Taux de prévalence ajustée selon l'âge de l'utilisation actuelle de tabac parmi les personnes âgées de 15 et plus ⁵	nd	nd	nd	-
3.b.1 Proportion de la population cible couverte par tous les vaccins inclus dans leur programme national ⁶	50,0	53,5	51,8	10.3
5. Égalité entre les sexes				
5.2.1 Proportion de femmes et de filles âgées de 15 ans ou plus ayant vécu en couple victimes de violences physiques. Sexuelles ou psychologiques infligées au cours des 12 mois précédents par leur partenaire actuel ou un ancien partenaire, par forme de violence et par âge ^{7,8}	nd	nd	nd	-
a) Violence physique	nd	nd	nd	-
b) Violence sexuelle	nd	nd	nd	-
c) Violence psychologique	nd	nd	nd	-
5.3.1 Proportion de femmes âgées de 20-24 ans ayant été mariées ou en union avant l'âge de 15 ans et avant l'âge de 18 ans				
a) Avant l'âge de 15 ans	na	7,8	na	4.3
b) Avant l'âge de 18 ans	na	25,5	na	4.3
5.6.1 Proportion de femmes âgées de 15-49 ans qui prennent des décisions informées concernant les relations sexuelles, l'utilisation de contraceptifs et les soins de santé génésique ⁹	na	5,8	na	nd
5.b.1 Proportion d'individus possédant un téléphone portable ¹⁰	83,3	70,8	77,1	2.5
	Résidence			
	Urbain	Rural		
7. Énergie propre et à coût abordable				
7.1.1 Proportion de la population ayant accès à l'électricité	93,5	45,0	66,0	2.4
7.1.2 Proportion de la population ayant une dépendance primaire sur les carburants et la technologie ¹¹	54,6	5,7	26,8	2.4
8. Travail décent et croissance économique				
8.7.2 Proportion d'adultes (15 ans et plus) ayant un compte dans une banque. Dans une autre institution financière. ou avec un fournisseur de service mobile et de transfert d'argent ¹²	16,4	9,1	12,8 ^a	nd
16. Paix, justice et institutions fortes				
16.9.1 Proportion d'enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été enregistrée à l'état civil	78,0	75,6	76,8	13.1
17. Partenariats pour la réalisation des objectifs				
17.8.1 Proportion d'individus utilisant l'internet ¹³	54,4	39,4	46,9 ^a	3.5.1, 3.5.2

na = Non applicable ; nd = Non disponible

¹ Exprimés en termes de mortalité maternelle par 100 000 naissances vivantes durant la période de 7 ans précédant l'enquête

² Exprimés en termes de mortalité par 1 000 naissances vivantes pour la période de 5 ans précédant l'enquête

³ Equivalent au taux de fécondité par âge pour les filles âgées de 10-14 ans durant la période de 3 ans précédant l'enquête, exprimés en terme de naissances par 1 000 filles âgées de 10-14 ans

⁴ Equivalent au taux de fécondités par âge des femmes âgées de 15-19 ans durant la période de 3 ans précédant l'enquête, exprimés en terme de naissances par 1 000 filles âgées de 15-19 ans

⁵ Les données ne sont pas standardisées pour l'âge et sont disponibles pour seulement les femmes et hommes de 15-49 ans,

⁶ Les données sont présentées pour les enfants de 12-23 mois qui ont reçu tous les vaccins appropriés à leur âge qui sont inclus dans le programme national : BCG, trois doses de DTC-HepB-Hib, quatre doses du vaccin oral contre la polio, trois doses du vaccin contre le pneumocoque, deux doses du vaccin contre le rotavirus et une dose de vaccin anti-rougeoleux,

⁷ Les données sont disponibles seulement pour les femmes âgées de 15-49 ans qui ont déjà été en union, Tableau non disponible dans ce Rapport,

⁸ Dans le DHS, la violence psychologique est nommée violence émotionnelle, Tableau non disponible dans ce Rapport,

⁹ Données disponibles seulement pour les femmes actuellement en union qui ne sont pas enceintes, Tableau non disponible dans ce Rapport,

¹⁰ Données disponibles seulement pour hommes et femmes âgés de 15-49 ans


¹¹ Mesuré comme le pourcentage de la population utilisant de l'énergie non polluante pour la cuisson

¹² Données disponibles pour les femmes et les hommes de 15 à 49 ans qui ont et utilisent un compte dans une banque ou une autre institution financière; les informations sur l'utilisation d'un fournisseur de services mobiles ne sont pas disponibles, Tableau non disponible dans ce Rapport

¹³ Les données sont disponibles pour les femmes et hommes âgés de 15-49 ans qui ont utilisé l'internet dans les 12 mois précédents,

^a Le total est calculé comme une moyenne arithmétique simple des pourcentages des colonnes hommes et femmes,

SÉNÉGAL



Les enquêtes Démographiques et de Santé Continues (EDS-Continue) au Sénégal, font suite aux EDS de 1986, 1992, 1997, 2005, et 2010-11. A la suite de l'enquête de 2010-2011, le Sénégal s'est engagé dans la mise en œuvre d'un programme d'enquêtes dont la périodicité de collecte de données a été ramenée à un an. La première édition de l'Enquête Continue au Sénégal a couvert la période de 2012-2017 et a été exécutée annuellement par l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) en collaboration avec le Ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS). Elle a bénéficié de l'appui technique du programme mondial des Enquêtes Démographiques et de Santé de ICF International.

Le Gouvernement du Sénégal vient de réaliser, entre avril et décembre 2018, la sixième phase de l'Enquête Continue conformément au programme d'actions du Schéma Directeur de la Statistique. Le projet de l'EDS-Continue offre la possibilité de créer un flux continu de données sur la population, ce qui aidera à répondre à la demande de suivi plus régulier des indicateurs de couverture et d'impact résultant des initiatives mondiales en cours, visant à renforcer les programmes de santé.

L'Enquête Démographique et de Santé Continue (EDS-Continue) de 2018 a été exécutée par l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) en collaboration avec le ministère de la Santé et l'Action sociale (MSAS). Elle a été réalisée avec l'appui financier du Gouvernement du Sénégal, l'Agence des États-Unis pour le Développement international (USAID), la Cellule de Lutte contre la Malnutrition (CLM), la Banque Mondiale, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), ONU Femmes, Helen Keller International (HKI) et Nutrition International.

Pour la mise en œuvre de l'enquête, un comité de pilotage a été mis en place comprenant, en plus de l'équipe technique de l'EDS-Continue, le Ministère de la Santé et les partenaires au développement.

1.1 CONTEXTE DES POLITIQUES NATIONALES

Le Plan Sénégal Emergent (PSE), qui est la référence nationale de la politique économique, sociale et environnementale du pays ambitionne une croissance forte et inclusive pour répondre aux aspirations des populations à un mieux-être. La mise en place des conditions pour un développement humain durable constitue une des pierres angulaires du PSE. À cet effet, le Sénégal compte concrétiser l'accès aux services sociaux de base par l'amélioration de l'éducation et de la qualité des soins et de renforcer les dispositifs de protection sociale.

Pour le développement du secteur de la santé et de l'action sociale, le Ministère de tutelle s'est doté d'un Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2009–2018 dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sanitaire du Gouvernement. Ce plan décennal repose sur la vision d'un « Sénégal où tous les individus, tous les ménages et toutes les collectivités bénéficient d'un accès universel à des services de santé promotionnels, préventifs, curatifs et ré-adaptatifs de qualité sans aucune forme d'exclusion et où il leur est garanti un niveau de santé économiquement et socialement productif ». Le PNDS constitue le cadre de référence de toutes les interventions dans le secteur de la santé et de l'action sociale.

Les données de l'Enquête Démographique et de Santé Continue (EDS-Continue) contribuent au suivi des objectifs du PSE, du PNDS et des programmes spécifiques tels que la Couverture Maladie Universelle.

1.2 OBJECTIFS DE L'ENQUÊTE

L'Enquête Démographique et de Santé Continue (EDS-Continue) a comme objectifs fondamentaux de : (1) répondre aux besoins permanents en données pour planifier, suivre et évaluer les programmes de santé et de population, et (2) renforcer les capacités au sein des institutions du pays pour collecter, traiter, analyser, diffuser et utiliser ces données.

L'objectif principal de l'EDS-Continue de 2018 est de fournir des estimations actualisées des indicateurs démographiques et de santé. En particulier, au cours de l'EDS-Continue de 2018, des données ont été collectées sur des indicateurs spécifiques au pays. Les objectifs de l'EDS-Continue de 2018 sont, entre autres, de recueillir des données et des informations à l'échelle nationale et des régions administratives permettant de calculer des indicateurs dans les domaines suivants et d'en retracer les tendances :

- Analphabétisme et éducation ;
- Accès à l'eau et assainissement ;
- Niveaux de connaissance et pratique contraceptive des femmes ;
- Santé maternelle : visites prénatales, assistance à l'accouchement, vaccination, prévalence et traitement de la diarrhée et autres maladies chez les enfants de moins de cinq ans ;
- Prévention et traitement du paludisme, utilisation de moustiquaires ;
- Prévention chez la femme enceinte et traitement des enfants atteints de fièvre ;
- Violence basée sur le genre ;
- Pratiques nutritionnelles des enfants, y compris l'allaitement, réalisation d'un test du sel utilisé pour la cuisine pour sa teneur en iode, et prise des mesures anthropométriques pour évaluer l'état nutritionnel des enfants de 0-59 mois.

Les données collectées au cours de l'EDS-Continue de 2018 ont pour objectif d'aider les responsables politiques et les gestionnaires de programme à faire le suivi et l'évaluation des effets et impacts de leur intervention auprès des populations et à mettre en place les programmes et les stratégies pour améliorer l'état de santé de la population du pays.

1.3 CONCEPTION DE L'ÉCHANTILLON

L'EDS-Continue de 2018 vise à produire des résultats représentatifs au niveau national, des milieux urbain et rural, et des 4 grandes régions éco-géographiques du Sénégal. Le tirage de l'échantillon a été fait strate par strate. Ainsi, l'échantillon est basé sur un sondage aréolaire stratifié et tiré à deux degrés. Au premier degré, 214 grappes (Unités Primaires de Sondage UPS) ont été tirées à partir de la liste des Zones de Dénombrement (ZD) établies au cours du Recensement Général de la Population et de l'Habitat de, l'Agriculture et de l'Élevage (RGPHAE) réalisé en 2013, en procédant à un tirage systématique avec probabilité proportionnelle à la taille, la taille de l'UPS étant le nombre de ménages. Un dénombrement des ménages dans chacune de ces grappes a fourni une liste des ménages à partir de laquelle a été tiré, au second degré, un échantillon de 22 ménages par grappe, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural avec un tirage systématique à probabilité égale. Un total de 4 708 ménages (1 848 en milieu urbain et 2 860 en milieu rural) a été sélectionné.

Toutes les femmes âgées de 15-49 ans vivant habituellement dans les ménages sélectionnés ou présentes la nuit précédant l'interview, étaient éligibles pour être enquêtées. De plus, dans un sous-échantillon d'un ménage sur deux, tous les hommes de 15-59 ans étaient éligibles pour être enquêtés. Aussi, tous les enfants de moins de cinq ans étaient éligibles pour les mesures anthropométriques.

1.4 QUESTIONNAIRES

Quatre questionnaires ont été utilisés dans l'EDS-Continue de 2018 : le questionnaire ménage, le questionnaire femme, le questionnaire homme, et le questionnaire biomarqueur spécifique pour les mesures anthropométriques. Les questionnaires, basés sur les questionnaires modèles de The DHS Program, ont été adaptés pour tenir compte des problèmes démographiques et de santé appropriés au Sénégal.

Le questionnaire ménage a permis d'enregistrer tous les membres du ménage et les visiteurs qui ont dormi la nuit précédant l'interview avec certaines caractéristiques sociodémographiques telles que le lien de parenté avec le chef de ménage, le sexe, l'âge, la situation de résidence, le niveau d'instruction, etc. Ce questionnaire a aussi permis d'identifier les femmes, les hommes et les enfants éligibles pour les interviews individuelles et/ou pour les mesures anthropométriques. Il a également permis de collecter les informations sur les caractéristiques du ménage, telles que la principale source d'approvisionnement en eau de boisson, le type de toilettes, le type de matériaux du sol du logement, la possession de certains biens durables, la possession et l'utilisation de la moustiquaire, le lavage des mains et l'utilisation de sel iodé pour cuisiner dans le ménage. Il a aussi inclus des questions sur la Couverture Maladie Universelle à tous les membres du ménage et des questions sur divers programmes d'aide économique extérieure fournie aux ménages (transferts sociaux). Enfin, le questionnaire ménage a permis de collecter les données sur la situation des enfants.

Le questionnaire individuel femme a été utilisé pour enregistrer les informations des femmes âgées de 15-49 ans, résidentes ou visiteuses la nuit précédant l'interview. Il comprend les sections suivantes :

- Caractéristiques sociodémographiques de l'enquêtée ;
- Reproduction ;
- Contraception ;
- Grossesse et soins postnatals ;
- Vaccination des enfants ;
- Santé de l'enfant et nutrition ;
- Mariage et activité sexuelle ;
- Préférences en matière de fécondité ;
- Caractéristiques du mari et travail de la femme ;
- Autres problèmes de santé ;
- Développement du jeune enfant ;
- Violences basées sur le genre.

Dans ce rapport, comme dans le cas d'autres rapports des enquêtes annuelles, les informations présentées ne couvrent pas tous les aspects inclus dans les questionnaires. C'est le cas des données sur la violence domestique (VD). Toutefois, en collaboration avec les partenaires qui s'intéresseraient à ces aspects, l'ANSD est disposée à produire un rapport spécifique sur les VD.

Le questionnaire individuel homme est indépendant du questionnaire femme, mais la plupart des questions posées aux hommes âgés de 15-59 ans sont identiques à celles posées aux femmes de 15-49 ans.

Le questionnaire biomarqueur permet d'enregistrer les données anthropométriques (poids et taille) collectées chez les enfants de moins de 5 ans.

Après la finalisation des outils de collecte, le protocole et les questionnaires de l'enquête ont été transmis au Comité national d'éthique pour analyse et approbation.

1.5 ANTHROPOMÉTRIE

La taille et le poids ont été mesurés pour les enfants de moins de cinq ans dans tous les ménages sélectionnés. Les mesures du poids ont été obtenues en utilisant des balances électroniques (SECA) tandis que les mesures

de la taille ont été prises à l'aide des toises graduées : les enfants âgés de moins de deux ans ont été mesurés en position couchée alors que les plus âgés ont été mesurés en position debout.

1.6 PRÉTEST

Les travaux de terrain de l'enquête pilote se sont déroulés dans quatre grappes de la ville de Dakar. Ces grappes ont été choisies dans l'échantillon de l'enquête principale. Les leçons tirées de ce prétest (rendement des enquêteurs, acceptation de l'enquête, etc.) ont été valorisées dans la finalisation des outils de collecte et de la stratégie de mise en œuvre de l'enquête.

1.7 FORMATION DU PERSONNEL DE COLLECTE

Comme il s'agit d'une enquête continue, les agents de terrain de la grande phase de 2017 ont été reconduits (selon leur expérience et capacité). La formation a été organisée du 19 au 28 avril 2018. Elle a concerné vingt enquêtrices, cinq chefs d'équipes et cinq agents mesureurs. Afin de pallier aux éventuelles démissions, six agents supplémentaires ont été retenus et mis sur liste d'attente.

Toutes les sessions de formation ont porté sur les techniques d'interview, le remplissage des questionnaires, Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI), les techniques de prise des mesures anthropométriques. L'approche utilisée a consisté en (i) une lecture concomitante des manuels d'instructions et des questionnaires, suivie d'explications et de démonstrations ; (ii) des jeux de rôle en salle entre personnel en formation, suivis de discussions ; (iii) des pratiques sur le terrain dans des ménages réels et dans des formations sanitaires suivies de discussions en salle ; et (iv) l'organisation d'une évaluation des connaissances acquises.

1.8 COLLECTE DES DONNÉES

La collecte des données a été réalisée de juin à décembre 2018 avec une pause de 30 jours, soit une période de huit mois de collecte. Trente agents ont été recrutés et répartis en cinq équipes de travail, chacune composée de six personnes dont un chef d'équipe, trois enquêtrices, un mesureur et un chauffeur. Les cinq équipes ont été placées sous la responsabilité de trois superviseurs-analystes de terrain.

Comme toutes les autres EDS-Continues réalisées depuis 2011, la collecte de données de 2018 s'est faite à l'aide des tablettes PC. Les membres de l'équipe échangeaient des données à l'aide de Bluetooth alors que le transfert des données vers les serveurs, par les chefs d'équipes, se faisait par internet. À la fin de chaque journée, les chefs d'équipe devaient transférer les données au serveur central. Le suivi de la collecte était régulier au niveau du bureau et du terrain.

1.9 TRAITEMENT DES DONNÉES

Parallèlement aux travaux de collecte des données sur le terrain auprès des ménages, une équipe travaillait sur les éditions secondaires pour un meilleur suivi de la qualité des données recueillies par les agents de terrain. L'utilisation des tablettes comme outils de collecte a permis une saisie automatique au moyen du logiciel CSPro incorporé dans les tablettes. Un programme de contrôle de qualité a permis de détecter, pour chaque équipe, les principales erreurs de collecte. Ces informations étaient communiquées aux équipes lors des missions de supervision afin d'améliorer la qualité des données.

La vérification de la cohérence interne des données saisies et l'apurement final de l'ensemble des données ont été réalisés durant les mois de janvier et février 2019. Les tableaux n'ont été produits et sortis qu'après l'apurement final des données.

1.10 TAUX DE RÉPONSE

Le **Tableau 1.1** présente les taux de réponse pour l'EDS-Continue de 2018 suivant la catégorie de questionnaire. Au total, 4 708 ménages avaient été sélectionnés pour l'enquête. Parmi ces ménages, 4 619 ont été identifiés au moment de l'enquête et, parmi ceux-là, 4 592 ont été interviewés avec succès, donnant ainsi un taux de réponse de 99,4 %. Dans les ménages interviewés, 9 673 femmes éligibles ont été identifiées pour des interviews individuelles. Parmi elles, 9 414 ont répondu à l'interview, ce qui donne un taux de réponse de 97,3 %. Au total, 4 004 hommes éligibles étaient identifiés dans les ménages échantillon et 3 764 ont été interviewés avec succès, ce qui a donné un taux de réponse de 94 %.

Tableau 1.1 Résultats des interviews ménages et individuelles

Effectif de ménages, nombre d'interviews et taux de réponse selon le milieu de résidence (non pondéré), Sénégal 2018

Résultat	Résidence		
	Urbain	Rural	Ensemble
Interviews ménage			
Ménages sélectionnés	1 804	2 904	4 708
Ménages identifiés	1 760	2 859	4 619
Ménages interviewés	1 742	2 850	4 592
Taux de réponse des ménages ¹	99,0	99,7	99,4
Interviews des femmes de 15-49 ans			
Effectif de femmes éligibles	3 605	6 068	9 673
interviewées	3 506	5 908	9 414
Taux de réponse des femmes éligibles ²	97,3	97,4	97,3
Interviews des hommes de 15-59 ans			
Effectif d'hommes éligibles	1 527	2 477	4 004
Effectif d'hommes éligibles interviewés	1 428	2 336	3 764
Taux de réponse des hommes éligibles ²	93,5	94,3	94,0

¹ Ménages interviewés/ménages identifiés.

² Enquêtes interviewés/enquêtés éligibles.

Résultats clés

- Un peu plus de huit ménages sur dix (81 %) disposent d'une source d'eau améliorée, avec cependant un écart entre le milieu urbain (92 %) et le milieu rural (69 %). Dans plus de sept cas sur dix (71 %), l'eau provient d'un robinet.
- Plus de la moitié des ménages (56 %) disposent de toilettes améliorées et, à l'opposé, 44 % des ménages utilisent des toilettes non améliorées, en majorité des toilettes partagées (22 %). De plus 11 % ne disposent d'aucun type de toilettes.
- Environ un ménage sur cinq (21 %) est exposé, tous les jours, à la fumée de cigarette dans le logement.
- Globalement, 50 % des femmes contre 44 % des hommes n'ont aucun niveau d'instruction.
- Au cours de l'enquête, on a pu observer dans 44 % des ménages, l'endroit où les membres du ménage se lavent les mains. En milieu urbain, ce pourcentage est nettement plus élevé qu'en milieu rural (56 % contre 33 %).
- Au Sénégal un ménage comprend, en moyenne, 8,7 personnes.
- Parmi les enfants de moins de cinq ans, 50 % bénéficient de l'Initiative de gratuité des soins pour les enfants de moins de cinq ans.

Les informations collectées au cours de l'EDS Continue 2018 sur les caractéristiques socio-économiques de la population des ménages sont utiles pour interpréter les indicateurs démographiques. En outre, elles peuvent fournir une indication approximative de la représentativité de l'enquête. Les informations sur la situation des ménages permettent de mieux connaître les conditions de vie dans lesquelles vivent les populations.

Ce chapitre a pour objectif de présenter les données sur les ménages concernant la source d'approvisionnement de l'eau de boisson, l'utilisation d'installations sanitaires, l'exposition à la fumée à l'intérieur du logement, le niveau de bien-être économique, le lavage des mains, la composition de la population des ménages, le niveau d'instruction atteint, la fréquentation scolaire, les transferts sociaux et monétaires et la couverture maladie.

2.1 CONDITIONS DE VIE DES MÉNAGES

2.1.1 Sources d'approvisionnement de l'eau de boisson et traitement

Sources d'approvisionnement améliorées de l'eau de boisson

Comprennent l'eau de robinet, les puits à pompe ou forage, les puits creusés protégés, l'eau de source protégée et l'eau de pluie. Les ménages qui utilisent de l'eau en bouteille pour boire sont considérés comme utilisant une source d'eau améliorée seulement si l'eau qu'ils utilisent pour cuisiner ou se laver les mains provient aussi d'une source améliorée.

Échantillon : Ménages

Les résultats de l'EDS Continue 2018 montrent qu'un peu plus de huit ménages sur dix (81 %) s'approvisionnent en eau de boisson provenant d'une source d'eau améliorée. Dans la majorité des cas (57 %), l'eau consommée provient d'un robinet dans le logement et pour 8 % des ménages, l'eau provient de robinets publics/fontaine. Les ménages dont l'eau de consommation ne provient pas d'une source améliorée représentent 19 %. Dans leur majorité, ces ménages utilisent l'eau des puits creusés non protégés (14 %) (**Tableau 2.1**).

En outre, 34 % des ménages ont déclaré que l'eau n'a pas été disponible pendant au moins une journée au cours des deux semaines précédant l'enquête (**Tableau 2.2**).

Tendances : Globalement, on note une tendance à la hausse de la disponibilité de source d'eau améliorée au Sénégal, passant de 71 % en 2005 à 81 % en 2018. Cependant, il est important de relever qu'entre 2014 et 2018 l'évolution est assez irrégulière.

Variations par caractéristiques

En milieu urbain, 92 % des ménages s'approvisionnent à une source d'eau améliorée alors qu'en milieu rural, cette proportion n'est que de 69 %.

En revanche, 36 % des ménages urbains ont déclaré que l'eau n'a pas été disponible pendant au moins une journée au cours des deux semaines précédant l'enquête contre 31 % en milieu rural (**Tableau 2.2**).

2.1.2 Installations sanitaires

Installations sanitaires améliorées

Comprennent les types suivants de toilettes non partagées : chasse d'eau/ chasse d'eau manuelle connectée à un système d'égout, à une fosse septique, ou à une fosse d'aisances ; fosse d'aisances améliorée auto-aérée ; fosse d'aisances avec dalle ; toilettes à compostage

Échantillon : Ménages

L'accès à des installations sanitaires adéquates et la promotion de pratiques hygiéniques constituent des objectifs importants pour la réalisation des objectifs de développement durables (ODD). L'EDS Continue 2018 montre que 56 % des ménages sénégalais utilisent des installations sanitaires améliorées et non partagées. Un peu plus de deux ménages sénégalais sur cinq n'ont accès qu'à des toilettes non améliorées (partagées ou non) (44 %). Dans la majorité des cas, il s'agit de toilettes partagées (22 %) ; le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune installation sanitaire représente 11 % (**Tableau 2.3**).

Variations selon le milieu de résidence

L'utilisation de toilettes améliorées non partagées est, comme on s'y attendait, beaucoup plus fréquente en milieu urbain qu'en milieu rural (63 % contre 49 %). Le pourcentage de ménages utilisant des toilettes partagées est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural (31 % contre 12 %). Par contre, le pourcentage de ménages utilisant des toilettes non améliorées est près de quatre fois plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain (19 % contre 5 %) (**Tableau 2.3**) (**Graphique 2.1**).

2.1.3 Exposition à la fumée à l'intérieur du logement

En 2018, un peu plus d'un ménage sur cinq est exposé tous les jours à la fumée de cigarette (21 %). Les ménages du milieu urbain sont beaucoup plus exposés à la fumée que ceux du milieu rural (26 % contre 15 %) (**Tableau 2.4**). Par ailleurs, 33 % des ménages utilisent des combustibles non polluants pour la cuisine. Cette proportion varie considérablement selon le milieu de résidence. En effet, en milieu urbain la proportion des ménages utilisant un combustible non polluant est de 58 % contre 7 % en milieu rural.

2.1.4 Autres caractéristiques du logement


Le **Tableau 2.4** présente aussi la répartition des ménages selon certaines caractéristiques du logement. Dans l'ensemble, 68 % des ménages vivent dans un logement avec de l'électricité comme source d'éclairage. Ce pourcentage varie de manière importante selon le milieu de résidence, seulement 42 % des ménages ruraux disposant de l'électricité contre 92 % en milieu urbain (**Tableau 2.4**).

Au Sénégal, un peu plus d'un tiers (34 %) des ménages habitent dans un logement dont le sol est revêtu de ciment et cette proportion est un peu plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain (42 % contre 26 %). Dans plus de trois cas sur dix (32 %), le sol du logement est recouvert de carrelage et ce type de revêtement est plus fréquent en milieu urbain qu'en milieu rural (53 % contre 11 %). En outre, pour 16 % des ménages, le sol du logement est constitué de bandes de vinyle ou d'asphalte et ce pourcentage varie de 15 % en milieu urbain à 16 % en milieu rural. Enfin, les données montrent que dans 13 % des cas, le sol du logement est recouvert de terre ou de sable et cette proportion varie de 23 % en rural à 2 % en urbain.

2.1.5 Biens durable des ménages

Au cours de l'EDS Continue 2018, on a demandé aux ménages s'ils possédaient, ou non, certains biens de confort. Les résultats montrent que la possession d'un téléphone cellulaire est presque générale (97 % des ménages ont déclaré en avoir au moins un) et ce pourcentage est aussi élevé en milieu urbain qu'en milieu rural (98 % en milieu urbain contre 96 % en milieu rural). La radio et la télévision constituent aussi des biens durables assez répandus parmi les ménages sénégalais (respectivement 66 % et 61 %). Cependant, la possession d'une télévision est plus fréquente en milieu urbain qu'en milieu rural (85 % contre 36 %) (**Tableau 2.5**).

Graphique 2.1 Types d'installations sanitaires utilisées par les ménages par résidence



2.1.6 Bien-être économique du ménage

Indice de bien-être économique

On attribue aux ménages des scores basés sur le nombre et le type de biens durables possédés, lesquels biens vont de la télévision à la bicyclette ou au vélo, et portent également sur les caractéristiques du logement comme la source d’approvisionnement en eau de boisson, le type de toilettes utilisées et le matériau de revêtement du sol. Ces scores sont générés en utilisant l’analyse en composantes principales. Les quintiles de bien-être économique nationaux sont construits en attribuant le score du ménage à chaque membre habituel (de droit) du ménage, classant chaque personne dans la population des ménages en fonction de son score et en divisant la distribution en cinq catégories égales, chacune représentant ainsi 20 % de la population.


Échantillon : Ménages

Les résultats font apparaître une disparité importante non seulement entre le milieu rural et le milieu urbain mais aussi entre les quatre grandes régions. En milieu urbain, près des quatre cinquièmes de la population (78 %) sont classés dans les deux quintiles les plus riches contre seulement 11 % en milieu rural où plus des trois cinquièmes de la population (65 %) sont classés dans les deux quintiles les plus pauvres (**Graphique 2.2**).

Au niveau régional, les résultats révèlent que c’est le Sud qui concentre les niveaux de pauvreté les plus élevés, avec plus de 73 % de la population classés dans les deux premiers quintiles. Elle est suivie de la région du Centre où plus de moitié de sa population (53 %) peut être considérée comme pauvre contre seulement 11 % de celle de la région Ouest (**Tableau 2.6**).

Graphique 2.2 Quintiles de bien-être économique par résidence

Répartition (en %) de la population de droit par quintile de bien-être économique



2.1.7 Lavage des mains

Le lavage des mains est une action hygiénique importante qui permet d’éviter la transmission de germes cutanés et qui a donc des implications sur la santé de tous les membres du ménage et, en particulier, sur celle des enfants. Au cours de la collecte sur le terrain les enquêteurs ont demandé à voir l’endroit où les membres du ménage se lavent le plus souvent les mains. L’enquêteur devait aussi noter si l’eau et certains produits nettoyants étaient disponibles à cet endroit.

Les résultats montrent qu’au niveau national, dans seulement 44 % des cas, l’enquêteur a pu observer l’endroit où les membres du ménage se lavent les mains. Ce pourcentage est nettement plus élevé en milieu urbain qu’en milieu rural (56 % contre 33 %). Dans les grandes régions, il varie de 61 % au Sud à 8 % au Nord. On note aussi que cette proportion augmente avec le quintile de bien-être, passant de 27 % dans le quintile le plus bas à 73 % dans le quintile le plus élevé.

Parmi les ménages dans lesquels l’endroit pour se laver les mains a été observé, 14 % ne disposaient ni d’eau, ni de savon, ni d’un autre produit nettoyant ; ce pourcentage varie de 8 % en milieu urbain à 24 % en milieu rural. Au niveau régional, c’est dans la zone Sud que le pourcentage de ménages qui ne disposent d’aucun de ces éléments nécessaires pour se laver les mains est le plus élevé (29 %) ; à l’opposé, dans celle de l’Ouest, ce pourcentage est assez faible (4 %) (**Tableau 2.7**).

2.2 POPULATION DES MÉNAGES ET COMPOSITION

Ménage

Une personne ou un groupe de personnes apparentées ou non qui vivent ensemble dans le même logement, qui reconnaissent un individu, femme ou homme, comme chef de ménage, qui partagent les mêmes repas et qui sont considérés comme une seule unité.

Population de fait

Toutes les personnes qui sont restées dans les ménages sélectionnés la nuit avant l'interview (qu'elles soient des résidents habituels ou des visiteurs).

Population de droit

Toutes les personnes qui sont des résidents habituels des ménages sélectionnés, qu'elles aient passés ou non, la nuit avant l'interview dans le ménage.

Comment les données sont-elles calculées

Sauf indication contraire, tous les tableaux sont calculés sur la population de fait.

2.2.1 Structure de la population


Le **Tableau 2.8** présente la répartition de la population des ménages par âge, sexe et milieu de résidence. La structure par âge traduit une fécondité passée assez élevée. En effet, les résultats montrent que plus d'un Sénégalais sur deux (54 %) a moins de 20 ans (57 % des hommes et 51 % des femmes). En outre, ce pourcentage est plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain (59 % contre 47 %).

La pyramide de la population (**Graphique 2.3**) présente une base élargie qui se rétrécit rapidement, caractéristique des populations à fécondité et à mortalité élevée. On observe des écarts entre hommes et femmes notamment entre 25 et 60 ans, âges où, généralement, le phénomène migratoire touche plus les hommes que les femmes.

En outre, on remarque, chez les femmes, « une échancrure » aux âges 45-49 ans qui traduit un manque de femmes et, à l'opposé, un surplus à 50-54 ans. Il est fort possible que cette situation soit la conséquence d'un mauvais enregistrement par les enquêteurs de l'âge des femmes susceptibles de répondre au questionnaire individuel. Concrètement, il s'agirait donc d'un vieillissement artificiel des femmes du groupe d'âges 45-49 ans vers le groupe d'âges supérieur.

Graphique 2.3 Pyramide des âges de la population

Répartition (en %) de la population des ménages



2.2.2 Taille et Composition des ménages

Dans l'ensemble, les résultats du **Tableau 2.9** montrent que 68 % des ménages sénégalais sont dirigés par un homme. À l'opposé, dans 32 % des cas, c'est une femme qui est le chef de ménage.

Les résultats montrent aussi, que les ménages au Sénégal ont une taille moyenne élevée (8,7 personnes en moyenne par ménage), avec des différences selon le milieu de résidence (10 en milieu rural contre 7,5 en milieu urbain). En outre, un peu plus de deux ménages sur cinq (42 %) comprennent neuf personnes ou plus.

Les données de ce tableau révèlent aussi que 33 % des ménages comprennent des enfants de moins de 18 ans vivant sans leurs parents et que 38 % des ménages comptent un orphelin et/ou un enfant de moins de 18 ans vivant sans ses parents.

2.3 INSTRUCTION

2.3.1 Niveau d'instruction atteint

Nombre médian d'années d'instruction complétées

La moitié de la population a complété moins du nombre médian d'années d'instruction et l'autre moitié a complété plus du nombre médian d'années d'instruction.

Échantillon : Population de fait des ménages âgée de 6 ans et plus.

L'instruction pour tous, l'un des Objectifs de Développement durable, constitue un enjeu majeur du développement économique, car considéré comme une pierre angulaire de l'amélioration des conditions de vie des populations. L'éducation influence tous les secteurs de l'économie et la vie des individus.

Au cours de l'enquête, des questions ont été posées concernant le plus haut niveau d'instruction atteint par les membres des ménages âgés de six ans et plus. Les résultats sont présentés au **Tableau 2.10.1** pour les femmes et au **Tableau 2.10.2** pour les hommes.

Les résultats montrent un écart de niveau d'instruction en faveur des hommes. Globalement, 50 % des femmes contre 44 % des hommes n'ont aucun niveau d'instruction. Les pourcentages de femmes et d'hommes ayant complété le niveau primaire sont quasiment identiques (respectivement 3 % et 2 %). Les proportions d'hommes et de femmes ayant fréquenté le niveau secondaire sans le compléter sont respectivement de 18 % et de 17 %. Quel que soit le sexe, seulement 1 % ont complété ce niveau. Le niveau supérieur est atteint par 3 % des femmes et 5 % des hommes.

Variations par caractéristiques

- La proportion de la population avec aucun niveau d'instruction est plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain, ceci aussi bien chez les hommes que chez les femmes. En urbain, 32 % des femmes et 27 % des hommes n'ont aucun niveau d'instruction contre 64 % des femmes et 58 % des hommes en milieu rural.
- Au niveau régional, le Centre (66 % pour les femmes et 61 % pour les hommes) et le Nord (58 % pour les femmes et 55 % pour les hommes) sont les zones où les proportions de la population sans aucun niveau d'instruction sont les plus élevées.
- Des générations les plus anciennes aux plus récentes, on remarque que le pourcentage de personnes sans niveau d'instruction a diminué de manière importante, passant, chez les femmes, de 92 % parmi celles de 65 ans et plus à 61 % à 30-34 ans et à 27 % à 10-14 ans. Chez les hommes, ces pourcentages sont respectivement de 79 %, 44 % et 27 %. Il est important de noter que dans les générations les plus jeunes (âgées de 6-9 ans à l'enquête), les pourcentages de femmes sans instruction sont un peu plus faibles que chez les hommes (47 % contre 53 %).

2.3.2 Fréquentation scolaire

Taux net de fréquentation scolaire (TNF)

Pourcentage de la population d'âge de fréquentation scolaire qui fréquente le niveau primaire ou le niveau secondaire.

Échantillon : Enfants de 6-11 ans pour le TNF niveau primaire et enfants de 12-18 ans pour le TNF niveau secondaire

Taux brut de fréquentation scolaire (TBF)

Nombre total d'enfants fréquentant le niveau primaire divisé par la population d'âge officiel de fréquentation du niveau primaire et nombre total d'enfants fréquentant le niveau secondaire divisé par la population d'âge officiel de fréquentation du niveau secondaire.

Échantillon : Enfants de 6-11 ans pour le TBF niveau primaire et enfants de 12-18 ans pour le TBF niveau secondaire


L'EDS Continue 2018 s'est intéressé à la fréquentation scolaire de toutes les personnes âgées de 6 à 24 ans dans les ménages. Le **Tableau 2.11** présente les taux nets et les taux brut de fréquentation par niveau d'instruction, par sexe et selon certaines caractéristiques socioéconomiques. Globalement, le taux net de fréquentation scolaire au niveau primaire est estimé à 52 %. Cela signifie qu'un peu plus d'un enfant de 6-11 ans sur deux fréquentent l'école primaire. Par contre, ce taux net est beaucoup plus faible au niveau secondaire (32 %).

Variations par caractéristiques

- Qu'ils soient nets ou bruts, les taux de fréquentation scolaire sont beaucoup plus élevés dans le milieu urbain que dans celui rural
- Les taux nets et brut de fréquentation scolaire au niveau primaire sont légèrement plus élevés chez les filles que chez les garçons. Par contre au niveau secondaire, les écarts entre les genres sont assez faibles (**Graphique 2.4**).
- Les taux de fréquentation scolaire, qu'ils soient nets ou bruts, augmentent avec le quintile de bien-être économique, ceci au niveau primaire comme secondaire.

Graphique 2.4 Fréquentation scolaire au niveau secondaire par résidence

Taux net de fréquentation scolaire pour le niveau secondaire parmi les enfants de 12-18 ans



Indice de parité entre les genres (IPG)

Ratio des filles par rapport aux garçons qui fréquentent le niveau primaire et ratio des filles par rapport aux garçons qui fréquentent l'école secondaire. L'indice traduit l'importance de l'écart entre les genres.

Échantillon : Élèves de l'école primaire et élèves de l'école secondaire

Au niveau primaire, l'indice de parité entre les genres (IPG) est de 1,07 pour le taux net. Au niveau secondaire il est un peu plus faible (1,04), mais indique toujours qu'un peu plus de filles que de garçons fréquentent l'école. Ces résultats montrent donc qu'au Sénégal, les filles ne sont pas défavorisées, en termes de fréquentation scolaire au niveau primaire ou secondaire, par rapport aux garçons.

L'IPG varie entre les grandes régions. Au niveau primaire, toutes les zones ont un indice de parité supérieur à 1, traduisant un avantage des filles sur le plan scolaire par rapport aux garçons. Au niveau secondaire, c'est

dans les zones Sud (0,85) et Centre (0,86) que l'on observe un écart entre les genres sur le plan scolaire au détriment des filles. À l'opposé, dans celles Ouest (1,13) et Nord (1,30), on constate la situation inverse.

Au niveau primaire, l'IPG varie peu selon le niveau de bien-être économique. En revanche, au niveau secondaire, on enregistre des écarts entre pauvres et riches en termes de fréquentation entre filles et garçons et indiquent que c'est dans les quintiles le plus bas que l'écart entre les genres, au détriment des filles, est le plus important (0,80 pour le premier et 0,76 pour le deuxième).

Tendances : L'IPG au niveau primaire pour le taux net a légèrement augmenté passant de 1,03 à 1,07 entre 2012-13 et 2018. Au niveau secondaire, cet indice est passé de 0,99 à 1,04 dans la même période. Ces résultats semblent montrer un resserrement des écarts entre les genres.

2.4 LES TRANSFERTS SOCIAUX ET MONÉTAIRES

Au cours de l'enquête auprès des ménages, on a posé des questions sur des programmes d'aides économiques extérieures dont les ménages auraient bénéficié. On entend ici par aide extérieure, tout soutien économique qui vient du gouvernement ou d'une organisation non gouvernementale comme une bourse de sécurité familiale, une bourse d'étude, un programme de transfert autre que la bourse d'étude et la bourse de sécurité familiale, un programme de structure privée/ONG ou de tout autre programme de support extérieur. Les aides fournies par la famille ou par d'autres parents, amis ou voisins ne sont pas prises en compte ici. Ces questions avaient, non seulement, pour objectif de savoir si les ménages connaissaient l'existence d'un ou de plusieurs de ces programmes mais aussi de savoir si quelqu'un, dans le ménage, en avait bénéficié et à quel moment la personne avait bénéficié de cette aide. À noter que la bourse de sécurité familiale est un programme conditionnel du Gouvernement du Sénégal destiné aux ménages pauvres. Moyennant une allocation annuelle de 100 000 francs CFA, le ménage s'engage à scolariser les enfants, à disposer d'un carnet de vaccination à jour et de déclarer les enfants à l'état civil.

L'enquête EDS Continue 2018 a permis aussi de vérifier si un membre du ménage disposait d'un compte bancaire ou d'un compte dans une institution financière. Enfin, on a aussi demandé si un membre du ménage participait à des tontines.

2.4.1 Connaissance de programmes de transferts sociaux

Au Sénégal, 96 % des ménages connaissent au moins un programme de transferts sociaux. En outre, 94 % des ménages connaissent la bourse de sécurité familiale et 63 % connaissent les bourses d'études (**Tableau 2.12**).

Variations par caractéristique

Globalement, on ne note pas de variations importantes en ce qui concerne la connaissance d'un programme de transferts sociaux. Tout au plus peut-on mentionner que :

- Les ménages vivant dans la zone Nord (90 %) connaissent moins bien l'existence de programmes de transferts sociaux que les ménages vivant dans les autres grandes régions où les pourcentages de ceux qui connaissent sont supérieurs à 95 %.
- Le pourcentage de ménages connaissant l'existence de programmes de transferts sociaux est plus élevé parmi ceux qui sont classés dans le quintile le plus élevé que dans les autres (98 % pour le quintile le plus élevé contre 95 % dans les autres quintiles de bien-être économique).
- Le niveau de connaissance augmente avec le niveau d'instruction du Chef de ménage (CM) passant de 95 % dans les ménages où le chef n'a pas d'instruction à 98 % dans ceux où il a un niveau moyen/secondaire ou plus.

2.4.2 Support de programmes de transferts sociaux

On a également demandé si le ménage ou un membre du ménage bénéficiait d'une aide économique par le biais d'un programme. Les résultats sont présentés au **Tableau 2.13**.

Au Sénégal, un peu plus d'un cinquième des ménages (21 %) ont déclaré avoir reçu une aide économique par le biais d'au moins un programme de transferts sociaux. En particulier, on constate que seulement 14 % ont bénéficié de la bourse de sécurité familiale. Il en est de même des bourses d'études puisque 63 % des ménages ont déclaré les connaître et que seulement 5 % en ont bénéficié.

Variations par caractéristique

- Le pourcentage de ménages ayant reçu une bourse de sécurité familiale baisse en fonction du quintile de bien-être économique, passant de 29 % dans les ménages classés dans le quintile le plus bas à 4 % dans ceux du quintile de bien-être le plus élevé. Cela indique que ce programme bénéficie surtout aux quintiles les plus pauvres, ce à quoi on s'attendait puisque ces ménages constituent la cible de ce type de programme d'aide.
- Le pourcentage de ménages ayant obtenu la bourse de sécurité familiale varie avec le niveau d'instruction du chef de ménage : dans les ménages où le chef n'a aucun niveau d'instruction ou le niveau primaire, respectivement 17 % et 13 % ont obtenu ce type d'aide contre seulement 5 % quand le chef de ménage a le niveau d'instruction moyen/secondaire ou plus.
- Il est plus fréquent de bénéficier de la bourse de sécurité familiale quand on vit en milieu rural (20 %) qu'en milieu urbain (9 %).
- Dans la zone du Sud, près de trois ménages sur dix (29 %) ont déclaré percevoir la bourse de sécurité familiale, faisant de cette région, celle qui détient le pourcentage le plus élevé de ménages qui bénéficient de cette mesure économique du programme phare du Gouvernement. En revanche, seuls 7 % des ménages vivant à l'Ouest et 10 % de ceux vivant au Nord, perçoivent ce type d'aide.

En plus des questions sur la connaissance et l'obtention des aides des programmes de transferts sociaux, on a demandé à quel moment avant l'enquête, le support économique avait été reçu. Les résultats sont présentés au **Tableau 2.14**. Parmi les bénéficiaires de bourses de sécurité familiale, environ 4 ménages sur cinq (80 %) ont reçu leur bourse au cours des 6 mois ayant précédé l'enquête. Concernant la bourse d'étude, on constate que seulement 48 % l'avaient reçue au cours des six derniers mois. Pour les autres transferts de l'État, ces pourcentages sont de 43 % et de 26 % quand il s'agit d'un soutien d'un programme d'une structure privée/ONG.

2.4.3 Transferts d'argent

Au cours de l'enquête, on a cherché à savoir si le ménage ou un de ses membres avait envoyé des fonds au Sénégal ou à l'étranger et s'il en avait reçu, ce qui permet de mieux connaître l'origine et la destination des transferts d'argent des ménages. Les résultats sont présentés au **Tableau 2.15**.

Plus de deux ménages sur cinq (45 %) ont déclaré avoir envoyé de l'argent et, dans la majorité des cas, il s'agit d'un envoi au Sénégal (40 % contre 5 % à l'étranger). Par ailleurs, 59 % ont déclaré en avoir reçu et, ici aussi, dans la majorité des cas, l'argent provient du Sénégal (39 %). Par contre, il est quatre fois plus fréquent de recevoir de l'argent de l'étranger que d'en envoyer (20 % contre 5 %).

Variations par caractéristique

- Les pourcentages de ménages effectuant des transferts d'argent, qu'ils en envoient ou en reçoivent, augmentent du quintile le plus bas au plus élevé, passant respectivement de 18 % à 68 % et de 40 % à

66 %. Les transferts dans le pays sont plus fréquents que les transferts internationaux. Les ménages les plus riches reçoivent bien plus souvent que les autres des transferts internationaux

- L'envoi d'argent, en particulier à l'intérieur du pays, est à peine plus important dans les ménages dirigés par les hommes (46 %) que par les femmes (43 %). Par contre, le pourcentage de ménages dirigés par une femme et qui reçoivent de l'argent est plus élevé que celui des ménages dirigés par un homme (72 % contre 53 %). Une part non négligeable de ces transferts est reçue de l'étranger (27 % contre 16 % pour les ménages dirigés par un homme).
- Les ménages du milieu urbain envoient plus fréquemment de l'argent que ceux du milieu rural (58 % contre 31 %). Il s'agit surtout d'envoi au Sénégal (52 % contre 28 %).

2.4.4 Possession de comptes bancaires—participation à des tontines

Dans environ trois ménages sur dix (31 %), un des membres possède un compte en banque ou un compte dans une institution financière et, dans plus de la moitié des ménages (55 %), un des membres a participé à des tontines (**Tableau 2.16**).

Variations par caractéristique

- La possession d'un compte bancaire est plus fréquente dans les ménages du milieu urbain (45 % contre 17 % en milieu rural), dans ceux dans lesquels le chef de ménage a le niveau d'instruction moyen ou secondaire ou plus (67 % contre 19 % quand il n'a aucun niveau d'instruction) et dans les ménages du quintile le plus élevé (73 % contre 5 % dans le plus bas).
- La participation à des tontines varie selon le quintile de bien-être économique, le pourcentage passant de 36 % dans le quintile le plus bas à 60 % dans le quintile le plus élevé. Elle est bien plus fréquente au Centre (70 %) et dans une moindre mesure à l'Ouest (59 %).

2.5 COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE

L'extension de la couverture du risque maladie constitue un des objectifs du Plan Sénégal Emergent (PSE), notamment dans son axe 2 intitulé « Capital humain, Protection sociale et Développement durable ». La mise en œuvre de ce programme prioritaire est conduite par l'Agence de la Couverture Maladie Universelle créée en janvier 2015. L'Agence vise une couverture du risque maladie d'au moins 75 % de la population du Sénégal à la fin de l'année 2021.

Plusieurs mécanismes de prise en charge visent à couvrir le risque maladie des populations : Imputation budgétaire pour les actifs et retraités de la Fonction Publique, Institutions de Prévoyance Maladie (IPM) et Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) pour les actifs et retraités du secteur privé ; assurances privées commerciales, mutuelles de santé, initiative de gratuité des enfants de moins de cinq ans et Plan sésame.

Le **Tableau 2.17** présente les pourcentages de la population de fait des ménages qui ont bénéficié d'une assurance médicale. Dans 84 % des cas, les ménages sénégalais ne sont couverts par aucune assurance médicale. Quel que soit le type d'assurance médicale disponible, les niveaux d'utilisation sont très faibles. Par contre, parmi les enfants de moins de cinq ans, la moitié (50 %) a bénéficié de l'Initiative de gratuité des soins pour les enfants de moins de cinq ans.

Les mutuelles de santé communautaires constituent le type d'assurance maladie le plus utilisé avec 4 %, en dehors de l'initiative de la gratuité des soins aux moins de cinq ans. Les imputations budgétaires qui sont destinées aux agents de la fonction publique et à leur famille sont utilisées par près de 2 % de la population. Les IPM, destinées aux travailleurs des entreprises privées et à leurs familles, couvrent un peu plus de 1 % de la population. Il en est de même pour les mutuelles de santé professionnelles.

Variations selon certaines caractéristiques

- En milieu rural, 86 % des ménages ne bénéficient d'aucun type d'assurance maladie, contre 80 % en milieu urbain.
- Les résultats selon les régions montrent des écarts : dans l'Ouest, 90 % des ménages n'ont aucune couverture santé contre 78 % dans le nord. De même, les pourcentages de ménages affiliés à des mutuelles de santé communautaires varient et sont plus élevés à l'Ouest (7 %) et, dans une moindre mesure, au Centre (3 %) que dans le Nord et le Sud (2 % dans chaque cas).
- C'est dans le groupe d'âge 40-44 ans que le pourcentage d'utilisateurs des IPM est le plus élevé (3 %). En outre, le pourcentage de personnes ayant bénéficié d'une assurance médicale du type IPM est plus élevé dans la zone Nord (4 %), contrairement aux autres régions.
- C'est dans le groupe d'âges 50-64 ans que le pourcentage de bénéficiaires des imputations budgétaires est le plus élevé (4 %). L'utilisation de ce type d'assurance maladie est plus fréquente en milieu urbain avec 4 %.

2.6 COUVERTURE DE L'INITIATIVE DE GRATUITÉ DES SOINS POUR LES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS

Le **Tableau 2.18** présente la couverture de l'Initiative de Gratuité des Soins pour les enfants de moins de cinq ans selon les caractéristiques sociodémographiques pour la population des enfants de moins de cinq ans. Parmi les enfants de 0-4 ans, plus d'un sur deux bénéficie de l'Initiative de gratuité des soins pour les enfants de moins de cinq ans (50 %).

Variations par caractéristique

- Le pourcentage d'enfants de 0-4 ans couverts par l'Initiative de gratuité des soins est plus élevé dans le milieu urbain (54 %) que dans le milieu rural (47 %).
- Les enfants vivant dans la région du Sud (19 %) présentent la couverture la plus faible. Par contre, les régions du Centre (62 %) et celle de l'Ouest (54 %) sont celles où les enfants sont les mieux couverts par cette assurance.
- La couverture de l'Initiative de gratuité des soins pour les enfants de moins de cinq ans augmente du quintile le plus bas au quatrième quintile : en effet, si, dans les ménages du quintile le plus bas, environ trois enfants de moins de cinq ans sur dix (34 %) profitent de cette assurance, ces pourcentages sont de 58 % dans le quintile moyen et de 63 % dans le quatrième quintile. Cela indique que cette initiative a un effet régressif contraire aux objectifs de ce programme.

2.7 HANDICAP DES PERSONNES DE 5 ANS ET PLUS

Les questions sur le handicap ont été modifiées de manière importante par rapport à ce que les précédents enquêtes/recensements proposaient. Depuis 2013, le Sénégal a adopté la méthodologie du Groupe de Washington, qui a élaboré, à partir de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé de l'OMS, de nouveaux outils de mesure des incapacités qui peuvent être utilisés dans le cadre de recensements et d'enquêtes nationales. L'un des objectifs de ce travail est de pouvoir disposer d'informations de base comparables dans le monde entier. Les questions portent sur six domaines fonctionnels ou fonctions essentielles : la vue, l'ouïe, la communication, les fonctions cognitives, la marche et l'autonomie pour se laver ou s'habiller. Pour évaluer le niveau de handicap et sa gravité, on a demandé au cours de l'enquête auprès des ménages si des membres du ménage n'avaient aucune difficulté, quelques difficultés, beaucoup de difficultés ou ne pouvaient pas du tout faire certaines choses dans les six domaines fonctionnels évoqués ci-dessus.

Domaines fonctionnels

La vue, l'ouïe, la communication, les fonctions cognitives, la marche et monter des marches, l'autonomie pour se laver ou s'habiller.

Échantillon : Population de fait des ménages âgés de 5 ans et plus.

Le **Tableau 2.19** présente le pourcentage de personnes âgées de 5 ans et plus ayant des difficultés fonctionnelles, par domaine fonctionnel précédemment défini selon certaines caractéristiques sociodémographiques.

Au Sénégal, 4 % de la population âgée de 5 ans et plus ont des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine, c'est-à-dire qu'ils éprouvent beaucoup de difficultés ou qu'ils ne peuvent pas fonctionner dans un domaine. Ce pourcentage augmente régulièrement avec l'âge, passant de 1 % chez les enfants de 6-9 ans à 33 % chez les personnes âgées de 70 ans et plus.

C'est le handicap visuel qui a été le plus fréquemment déclaré : 2 % de la population de 6 ans et plus ayant des difficultés fonctionnelles dans ce domaine. Cette proportion varie peu jusqu'à 35-39 ans puis augmente pour concerner pratiquement une personne sur cinq à 70 ans et plus. Les pourcentages de population affectées par les autres types de handicap sont très faibles mais ils ont tous tendance à augmenter avec l'âge.

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur les caractéristiques de la population des ménages et du logement, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 2.1** Eau utilisée par les ménages pour boire
- **Tableau 2.2** Disponibilité de l'eau
- **Tableau 2.3** Types d'installations sanitaires utilisées par les ménages
- **Tableau 2.4** Caractéristiques du logement
- **Tableau 2.5** Biens possédés par le ménage
- **Tableau 2.6** Quintiles de bien-être économique
- **Tableau 2.7** Lavage des mains
- **Tableau 2.8** Population des ménages par âge, sexe et milieu de résidence
- **Tableau 2.9** Composition des ménages
- **Tableau 2.10.1** Niveau d'instruction de la population des ménages : Femme
- **Tableau 2.10.2** Niveau d'instruction de la population des ménages : Homme
- **Tableau 2.11** Taux de fréquentation scolaire
- **Tableau 2.12** Connaissance d'un programme de transferts sociaux
- **Tableau 2.13** Support reçu grâce à un programme de transferts sociaux
- **Tableau 2.14** Moment auquel a été reçu un support d'un programme de transferts sociaux
- **Tableau 2.15** Provenance et destination du transfert d'argent
- **Tableau 2.16** Possession de compte bancaire et participation à des tontines
- **Tableau 2.17** Assurance médicale : Population des ménages
- **Tableau 2.18** Initiative de gratuité soins enfants âgés de moins de cinq ans
- **Tableau 2.19** Handicap des personnes âgées de 5 ans et plus

Tableau 2.1 Eau utilisée par les ménages pour boire

Répartition (en %) des ménages et de la population de droit par provenance de l'eau pour boire et en fonction du temps pour s'approvisionner en eau et pourcentage utilisant une méthode appropriée pour le traitement de l'eau, selon le milieu de résidence, Sénégal 2018

Caractéristique	Ménages			Enquêtés		
	Urbain	Rural	Ensemble	Urbain	Rural	Ensemble
Source d'approvisionnement en eau de boisson						
Source améliorée	91,9	69,1	80,6	90,9	70,6	79,4
Robinet dans logement/ concession/cour/parcelle	74,1	40,1	57,2	77,6	45,3	59,3
Robinet chez le voisin	5,3	6,1	5,7	3,8	5,0	4,4
Robinet public/fontaine	2,8	12,6	7,7	3,1	11,8	8,0
Puits à pompe/ forage	0,3	5,5	2,9	0,4	4,4	2,7
Puits creusé protégé	2,2	4,4	3,3	2,3	4,0	3,2
Source protégée	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
Eau de pluie	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Eau en bouteille	7,0	0,3	3,7	3,6	0,1	1,6
Source non améliorée	7,7	30,3	18,9	8,9	28,9	20,3
Puits creusé non protégé	4,5	22,9	13,6	4,7	21,8	14,4
Source d'eau non protégée	0,0	0,2	0,1	0,0	0,3	0,2
Camion-citerne/charrette avec petite citerne	3,2	6,4	4,7	4,1	6,1	5,2
Eau de surface	0,0	0,8	0,4	0,0	0,7	0,4
Eau en bouteille, source non améliorée pour la cuisine/se laver les mains ¹	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Autre source	0,3	0,6	0,4	0,3	0,5	0,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Temps de trajet pour s'approvisionner en eau de boisson						
Eau sur place ²	90,0	54,3	72,3	88,7	57,4	71,0
Moins de 30 minutes	8,3	29,2	18,7	8,8	27,3	19,3
30 minutes ou plus	1,2	16,0	8,5	1,7	15,0	9,2
NSP/manquant	0,5	0,5	0,5	0,8	0,3	0,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Moyen de traitement de l'eau³						
Ébullition	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Ajout d'eau de Javel/chlore	6,9	10,6	8,7	7,9	9,4	8,8
Passée à travers un linge	7,2	20,2	13,6	7,5	19,8	14,5
Céramique, sable ou autre filtre	1,6	0,5	1,1	1,0	0,5	0,7
Désinfection solaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Laisser reposer et régler	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
Autre	1,2	0,2	0,7	0,5	0,1	0,3
Aucun traitement	85,3	72,8	79,1	85,6	74,4	79,2
Pourcentage utilisant une méthode appropriée de traitement ⁴	8,6	11,0	9,8	9,0	9,6	9,3
Effectif	2 318	2 274	4 592	17 357	22 759	40 116

¹ Les ménages qui consomment de l'eau en bouteille sont classés comme utilisant de l'eau d'une source améliorée ou non améliorée en fonction de la provenance de l'eau utilisée pour cuisiner et pour se laver les mains.

² Y compris l'eau provenant d'un robinet chez le voisin.

³ Les enquêtés peuvent déclarer plusieurs méthodes de traitement de l'eau et, par conséquent, la somme des pourcentages peut dépasser 100 %.

⁴ Les méthodes appropriées de traitement de l'eau comprennent l'ébullition, l'ajout de chlore, le filtrage et la désinfection solaire.

Tableau 2.2 Disponibilité de l'eau

Parmi les ménages et la population de droit utilisant de l'eau d'un robinet ou de l'eau provenant d'un puits à pompe ou d'un forage, pourcentage ayant été confronté à un manque d'eau dans les 2 dernières semaines, selon le milieu de résidence, Sénégal 2018

Disponibilité de l'eau dans les 2 dernières semaines	Ménages			Enquêtés		
	Urbain	Rural	Ensemble	Urbain	Rural	Ensemble
Non disponible pour au moins un jour	35,7	30,7	33,7	36,5	30,8	33,7
Disponible sans interruption d'au moins un jour	63,7	69,0	65,9	63,1	69,0	66,0
Ne sait pas/manquant	0,6	0,3	0,5	0,4	0,2	0,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif utilisant de l'eau canalisée ou de l'eau d'un puits tubulaire ¹	2 077	1 468	3 545	15 363	15 155	30 518

¹ Y compris les ménages déclarant que l'eau utilisée pour boire provient principalement d'un robinet ou d'un puits à pompe ou d'un forage ainsi que ceux qui déclarent que l'eau utilisée pour boire est de l'eau en bouteille tant que leur source principale d'eau utilisée pour la cuisine et pour se laver les mains provient d'un robinet ou d'un puits à pompe ou d'un forage.

Tableau 2.3 Type de toilettes utilisées par les ménages

Répartition (en %) des ménages et de la population de droit par type de toilettes/latrines et répartition (en %) des ménages et de la population de droit disposant de toilettes/latrines par endroit où se trouvent ces installations selon le milieu de résidence, Sénégal 2018

Type de toilettes/latrines et endroit où elles sont situées	Ménages			Enquêtés		
	Urbain	Rural	Ensemble	Urbain	Rural	Ensemble
Toilettes améliorées	63,4	49,0	56,3	72,7	53,6	61,8
Chasse d'eau/chasse d'eau manuelle connectée à un système d'égout	16,8	0,2	8,6	14,1	0,2	6,2
Chasse d'eau/chasse d'eau manuelle reliée à une fosse septique	39,6	23,3	31,5	49,5	25,8	36,1
Chasse d'eau/chasse d'eau manuelle reliée à une fosse d'aisances	1,2	5,1	3,1	1,9	5,6	4,0
Fosse d'aisances améliorée ventilée	1,7	4,4	3,0	1,9	4,9	3,6
Fosse d'aisances avec dalle	3,7	15,9	9,7	4,9	16,9	11,7
Toilettes à compostage	0,4	0,1	0,3	0,4	0,2	0,3
Toilettes non améliorées	36,6	51,0	43,7	27,3	46,4	38,2
Toilettes partagées¹	31,0	11,9	21,5	21,8	10,4	15,3
Chasse d'eau/chasse d'eau manuelle connectée à un système d'égout	10,2	0,1	5,2	5,6	0,1	2,5
Chasse d'eau/chasse d'eau manuelle reliée à une fosse septique	17,5	4,2	10,9	13,4	3,6	7,8
Chasse d'eau/chasse d'eau manuelle reliée à une fosse d'aisances	1,0	0,9	1,0	0,7	0,7	0,7
Fosse d'aisance améliorée ventilée	0,6	1,2	0,9	0,7	1,1	0,9
Fosses d'aisances avec dalle	1,7	5,6	3,6	1,4	4,9	3,4
Toilettes non améliorées	4,6	18,5	11,5	4,7	18,5	12,5
Toilettes non améliorées						
Chasse d'eau/chasse d'eau manuelle non reliée à des égouts/fosse septique/fosse d'aisances	0,6	0,4	0,5	0,8	0,4	0,6
Fosse d'aisances sans dalle/trou ouvert	3,0	13,9	8,4	3,2	14,4	9,5
Toilettes/latrines suspendues	0,5	2,3	1,4	0,5	2,3	1,5
Autre	0,6	1,8	1,2	0,2	1,3	0,9
Défécation en plein air (pas de toilettes/nature)	0,9	20,6	10,7	0,9	17,5	10,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de ménages/population	2 318	2 274	4 592	17 357	22 759	40 116
Endroit où se trouvent les toilettes						
Dans le logement	39,0	21,2	31,2	38,0	20,0	28,6
Dans la cour/concession/parcelle	59,9	73,3	65,8	61,2	75,4	68,6
Ailleurs	1,1	5,4	3,0	0,8	4,6	2,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de ménages/population utilisant des toilettes/latrines	2 296	1 807	4 102	17 206	18 770	35 976

¹ Toilettes partagées qui seraient considérées comme "améliorées" si elles n'étaient pas partagées par deux ménages ou plus.

Tableau 2.4 Caractéristiques du logement

Répartition (en %) des ménages et de la population de droit par certaines caractéristiques du logement, pourcentage utilisant du combustible solide pour cuisiner, et répartition (en %) des ménages par fréquence à laquelle on fume dans le logement, selon le milieu de résidence, Sénégal 2018

Caractéristique du logement	Ménages			Enquêtés		
	Urbain	Rural	Ensemble	Urbain	Rural	Ensemble
Électricité						
Oui	92,4	42,1	67,5	93,5	45,0	66,0
Non	7,6	57,9	32,5	6,5	55,0	34,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Matériau de revêtement du sol						
Terre/sable	2,3	23,0	12,5	2,3	21,3	13,1
Bouse	0,2	3,4	1,8	0,3	3,0	1,8
Planche en bois	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Palme/bambou	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,1
Parquet ou bois poli	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Vinyle ou bandes d'asphalte	14,9	16,0	15,5	14,5	17,4	16,1
Carrelage	52,6	11,3	32,1	51,1	11,6	28,7
Ciment	26,0	41,7	33,8	28,4	42,0	36,1
Moquette	1,1	0,2	0,6	0,8	0,1	0,4
Autre	2,9	3,9	3,4	2,7	4,2	3,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Pièces utilisées pour dormir						
Une	22,7	8,1	15,5	8,8	2,8	5,4
Deux	20,7	17,3	19,0	14,2	9,7	11,7
Trois ou plus	56,7	74,6	65,6	77,1	87,4	82,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Endroit pour cuisiner						
Dans le logement	59,4	53,1	56,3	61,7	53,3	56,9
Dans un bâtiment séparé	24,9	35,7	30,2	29,8	38,5	34,8
À l'extérieur	7,2	7,2	7,2	6,5	6,8	6,7
Pas de repas préparé dans le ménage	8,3	3,1	5,7	1,8	0,7	1,2
Autre	0,2	0,8	0,5	0,2	0,6	0,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Combustible utilisé pour cuisiner						
Électricité	1,9	0,9	1,4	2,1	0,9	1,4
GPL/gaz naturel/biogaz	55,5	6,4	31,2	52,5	4,7	25,4
Charbon/lignite	10,9	72,8	41,6	15,0	78,5	51,0
Charbon de bois	23,3	15,5	19,4	28,5	13,9	20,3
Bouse	0,0	1,2	0,6	0,0	1,2	0,7
Autre combustibles	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Pas de repas préparé dans le ménage	8,3	3,1	5,7	1,8	0,7	1,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Pourcentage utilisant un combustible solide pour cuisiner ¹	34,1	89,5	61,5	43,5	93,6	71,9
Pourcentage utilisant un combustible non polluant pour cuisiner ²	57,5	7,3	32,6	54,6	5,7	26,8
Fréquence à laquelle on fume dans le logement						
Tous les jours	26,0	15,2	20,7	26,0	15,6	20,1
Une fois par semaine	2,7	1,6	2,1	2,0	1,4	1,6
Une fois par mois	0,6	0,9	0,7	0,7	0,9	0,8
Moins d'une fois par mois	1,2	1,1	1,1	1,4	1,0	1,2
Jamais	69,4	81,2	75,2	69,7	81,0	76,1
Ne sait pas	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Total	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Effectif de ménages/population	2 318	2 274	4 592	17 357	22 759	40 116

GPL = Gaz propane liquéfié.

¹ Y compris le charbon/lignite, le charbon de bois, le bois, la paille/branchages/herbes, les résidus agricoles et la bouse.

² Y compris l'électricité et le gaz de pétrole liquéfié/gaz naturel/biogaz.

Tableau 2.5 Biens possédés par les ménages

Pourcentage de ménages possédant certains équipements, des moyens de transport de la terre agricole et du bétail/animaux de ferme par milieu de résidence, Sénégal 2018

Possession	Résidence		
	Urbain	Rural	Ensemble
Biens possédés par le ménage			
Radio	64,3	67,2	65,7
Télévision	85,1	35,6	60,6
Antenne MMDS/TV5	10,2	3,4	6,8
Abonnement à CANAL	32,6	8,7	20,7
Téléphone fixe	7,7	0,8	4,3
Téléphone cellulaire	97,9	95,7	96,9
Machine à laver	2,3	0,5	1,4
Réfrigérateur	53,1	12,7	33,1
Réchaud/cuisinière à gaz/électrique	12,5	2,6	7,6
Foyer amélioré	31,3	18,9	25,1
Vidéo/Lecteur CD/DVD	15,0	3,4	9,2
Climatiseur	3,6	0,6	2,1
Ordinateur	27,0	4,3	15,8
Internet à la maison	10,8	2,3	6,6
Moyens de transport			
Bicyclette	9,6	15,7	12,7
Mobylette/motocyclette/scooter	12,8	12,1	12,5
Voiture personnelle	11,4	3,0	7,2
Voiture ou camion a titre commercial	2,5	1,9	2,2
Charette	3,8	44,7	24,1
Charrue	2,9	45,8	24,1
Pirogue/filet de pêche	1,3	2,1	1,7
Possession de terres agricoles	9,4	69,8	39,3
Possession d'animaux de ferme ¹	37,6	84,8	61,0
Possession d'un compte bancaire	45,2	16,7	31,1
Effectif	2 318	2 274	4 592

¹ Vaches, taureaux, autre bétail, chevaux, ânes, chèvres, moutons, poulets ou autre volaille.

Tableau 2.6 Quintiles de bien-être économique

Répartition (en %) de la population de droit par quintile de bien-être économique et coefficient de Gini, selon le milieu de résidence et la région, Sénégal 2018

Résidence/région	Quintiles de bien-être économique					Total	Effectif d'enquêtés	Coefficient de Gini
	Le plus bas	Second	Moyen	Quatrième	Le plus élevé			
Résidence								
Urbain	2,1	5,3	14,4	36,4	41,7	100,0	17 357	0,16
Rural	33,6	31,3	24,2	7,5	3,4	100,0	22 759	0,32
Région								
Nord	23,1	22,0	29,5	19,2	6,1	100,0	6 956	0,10
Ouest	1,9	8,9	12,9	30,5	45,9	100,0	14 228	0,38
Centre	25,7	27,7	23,8	15,3	7,5	100,0	12 449	0,27
Sud	45,2	27,7	18,1	6,9	2,2	100,0	6 484	0,29
Ensemble	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0	40 116	0,35

Tableau 2.7. Lavage des mains

Pourcentage de ménages dans lesquels l'endroit le plus souvent utilisé pour se laver les mains a été observé selon que l'endroit est fixe ou mobile et pourcentage total de ménages dont on a observé l'endroit utilisé pour le lavage des mains ; Parmi ces ménages dont l'endroit pour se laver les mains a été observé, répartition (en %) par disponibilité d'eau, de savon et d'autres produits nettoyants, selon certaines caractéristiques socio-économiques, Sénégal 2018.

Caractéristique socioéconomiques	Parmi les ménages dont l'endroit pour se laver les mains a été observé :				Parmi les ménages dont l'endroit pour se laver les mains a été observé, pourcentage ayant :						Effectif de ménages dans lesquels l'endroit pour se laver les mains a été observé		
	l'endroit pour se laver les mains est fixe		et dont l'endroit pour se laver les mains est mobile		Eau et un produit nettoyant autre que le savon		Savon ou détergent mais pas d'eau ³		Produit nettoyant autre que le savon ²			Pas d'eau, pas d'autre produit nettoyant	
	et dont l'endroit pour se laver les mains est fixe	et dont l'endroit pour se laver les mains est mobile	Ensemble	Effectif de ménages	Savon ou détergent ¹	Eau seulement ²	Savon ou détergent mais pas d'eau ³	Produit nettoyant autre que le savon ²	Pas d'eau, pas d'autre produit nettoyant	Total			
Résidence													
Urbain	39,8	15,8	55,5	2 318	72,9	16,9	1,9	0,0	7,9	100,0	1 287		
Rural	8,4	24,3	32,7	2 274	41,4	29,6	5,0	0,1	23,8	100,0	744		
Région													
Nord	2,0	5,5	7,5	740	61,1	2,3	13,4	0,0	23,2	100,0	55		
Ouest	45,9	10,4	56,3	1 920	74,4	19,8	1,5	0,0	4,0	100,0	1 082		
Centre	13,2	23,6	36,8	1 178	37,8	34,0	7,4	0,3	20,5	100,0	433		
Sud	8,0	53,1	61,1	754	52,8	16,3	1,3	0,0	29,3	100,0	460		
Quintiles de bien-être économique													
Le plus bas	2,5	24,7	27,2	858	34,5	31,4	2,0	0,1	31,8	100,0	233		
Second	4,3	28,1	32,4	843	35,3	33,8	4,0	0,0	26,9	100,0	273		
Moyen	8,6	24,1	32,7	820	48,5	22,5	6,1	0,3	21,3	100,0	268		
Quatrième	30,6	17,4	48,0	1 004	64,0	21,1	4,6	0,1	10,3	100,0	482		
Le plus élevé	63,4	9,1	72,6	1 068	81,5	14,2	1,0	0,0	3,3	100,0	775		
Ensemble	24,2	20,0	44,2	4 592	61,4	21,5	3,0	0,1	13,7	100,0	2 031		

¹ Comprend le savon ou un produit nettoyant en morceau, liquide, en poudre ou sous forme de pâte. Cette colonne inclut les ménages ayant du savon et de l'eau seulement ainsi que ceux qui ont du savon et de l'eau et un autre produit nettoyant.

² les produits nettoyants autres que le savon comprennent des produits disponibles localement comme la cendre, la boue ou le sable.

³ Y compris les ménages disposant de savon seulement ainsi que ceux ayant du savon et un autre produit nettoyant.

Tableau 2.8 Population des ménages par âge, sexe et milieu de résidence

Répartition (en%) de la population de fait des ménages par différents groupes d'âges et pourcentage de la population de fait des ménages de 10-19 ans, selon le sexe et le milieu de résidence, Sénégal 2018

Groupe d'âges	Urbain			Rural			Ensemble		
	Homme	Femme	Ensemble	Homme	Femme	Ensemble	Homme	Femme	Ensemble
<5	14,2	12,4	13,2	18,8	15,6	17,1	16,8	14,2	15,4
5-9	13,9	11,2	12,5	18,6	15,8	17,1	16,6	13,8	15,1
10-14	12,0	11,7	11,8	14,7	13,7	14,2	13,5	12,8	13,2
15-19	9,6	9,8	9,7	10,6	10,1	10,3	10,2	9,9	10,0
20-24	8,9	9,4	9,2	6,3	7,0	6,7	7,5	8,0	7,8
25-29	7,2	8,7	8,0	4,9	6,7	5,9	5,9	7,6	6,8
30-34	7,3	7,6	7,4	4,4	5,9	5,2	5,6	6,6	6,2
35-39	5,5	6,2	5,8	4,0	4,9	4,5	4,6	5,4	5,1
40-44	4,9	4,3	4,6	3,0	4,0	3,5	3,8	4,1	4,0
45-49	3,6	3,8	3,7	2,4	2,7	2,6	2,9	3,2	3,1
50-54	2,9	4,4	3,7	2,1	3,9	3,1	2,5	4,1	3,4
55-59	2,3	3,1	2,7	2,0	2,9	2,5	2,1	3,0	2,6
60-64	3,3	2,4	2,8	2,8	1,9	2,3	3,0	2,1	2,6
65-69	1,5	2,1	1,8	2,0	1,9	1,9	1,8	2,0	1,9
70-74	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,3	1,4	1,2	1,3
75-79	0,8	0,6	0,7	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8
80 +	0,7	1,0	0,9	1,1	0,9	1,0	0,9	1,0	0,9
Ne sait pas/manquant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Groupe d'âges dépendants									
0-14	40,1	35,3	37,5	52,1	45,1	48,3	46,9	40,9	43,6
15-64	55,5	59,6	57,7	42,6	50,0	46,6	48,2	54,2	51,4
65+	4,4	5,0	4,7	5,3	4,9	5,1	4,9	5,0	4,9
Ne sait pas/manquant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Populations des enfants et des adultes									
0-17	45,8	41,3	43,4	58,8	51,1	54,7	53,2	46,9	49,8
18+	54,2	58,7	56,6	41,1	48,9	45,3	46,8	53,1	50,2
Ne sait pas/manquant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Adolescents 10-19	21,6	21,4	21,5	25,3	23,8	24,5	23,7	22,8	23,2
Effectif d'enquêtés	8 123	9 479	17 602	10 535	12 396	22 931	18 658	21 875	40 533

Tableau 2.9 Composition des ménages

Répartition (en%) des ménages par sexe du chef de ménage et par taille du ménage ; Taille moyenne des ménages ; pourcentage de ménages avec des orphelins et des enfants de moins de 18 ans vivant sans leur parent, selon le milieu de résidence, Sénégal 2018

Caractéristique	Résidence		Ensemble
	Urbain	Rural	
Chef de ménage			
Homme	59,1	76,2	67,6
Femme	40,9	23,8	32,4
Total	100,0	100,0	100,0
Nombre de membres habituels			
0	0,0	0,0	0,0
1	7,5	2,6	5,1
2	6,1	2,6	4,4
3	9,0	3,6	6,3
4	8,6	5,5	7,0
5	12,1	8,2	10,1
6	11,1	9,3	10,2
7	6,6	9,2	7,9
8	6,0	8,5	7,3
9+	33,1	50,6	41,7
Total	100,0	100,0	100,0
Taille moyenne du ménage	7,5	10,0	8,7
Pourcentage de ménages avec des orphelins et des enfants de moins de 18 ans vivant sans leurs parents			
Orphelin double	1,1	1,3	1,2
Orphelin simple ¹	11,2	17,0	14,0
Enfants vivant sans leur parent ²	26,8	39,6	33,1
Enfant orphelin et/ou enfant vivant sans leurs parents	30,8	45,0	37,8
Effectif de ménages	2 318	2 274	4 592

Note : Le tableau est basé sur la population de droit des ménages, c'est-à-dire les résidents habituels.

¹ Comprend les enfants dont l'un des parents est décédé et dont l'état de survie de l'autre est inconnu.

² Les enfants vivant sans leur parent sont les enfants de moins de 18 ans qui vivent dans un ménage dans lequel il n'y a ni leur père, ni leur mère, et dont le père et/ou la mère sont en vie.

Tableau 2.10.1 Niveau d'instruction de la population des ménages : Femme

Répartition (en %) de la population de fait des femmes des ménages âgées de six ans et plus, en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années complétées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Aucun	Primaire incomplet	Primaire complet ¹	Secondaire incomplet	Secondaire complet ²	Supérieur	Ne sait pas/ manquant	Total	Effectif	Nombre médian d'années complétées
Groupe d'âges										
6-9	47,3	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	100,0	2 452	0,0
10-14	27,0	57,8	3,8	11,1	0,0	0,0	0,4	100,0	2 810	2,4
15-19	26,7	19,9	3,5	49,0	0,2	0,2	0,5	100,0	2 174	5,5
20-24	33,3	12,3	2,4	39,3	2,5	9,7	0,6	100,0	1 757	6,0
25-29	48,0	18,1	1,8	20,6	2,1	8,4	1,1	100,0	1 653	1,4
30-34	60,7	20,8	2,5	9,5	0,2	5,4	0,8	100,0	1 446	0,0
35-39	61,4	22,6	2,7	8,3	0,5	3,8	0,8	100,0	1 191	0,0
40-44	64,9	19,0	3,3	8,8	0,8	2,0	1,2	100,0	906	0,0
45-49	61,2	19,1	1,9	12,5	0,3	3,7	1,3	100,0	694	0,0
50-54	76,8	9,8	1,1	9,0	0,7	2,1	0,5	100,0	902	0,0
55-59	78,9	9,8	1,7	8,2	0,1	0,6	0,7	100,0	657	0,0
60-64	76,4	9,3	1,4	10,3	0,0	2,6	0,0	100,0	468	0,0
65+	92,3	1,5	1,2	3,8	0,4	0,7	0,1	100,0	1 087	0,0
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	*	*	*	100,0	3	*
Résidence										
Urbain	32,1	31,9	3,4	24,7	1,1	6,0	0,8	100,0	8 087	3,6
Rural	64,1	23,4	1,3	10,3	0,2	0,4	0,4	100,0	10 113	0,0
Région										
Nord	57,6	26,4	2,6	12,0	0,4	0,6	0,4	100,0	3 139	0,0
Ouest	32,3	31,4	3,2	24,3	1,1	6,9	0,7	100,0	6 602	3,8
Centre	65,8	21,2	0,9	10,9	0,3	0,5	0,5	100,0	5 697	0,0
Sud	50,1	30,3	2,2	15,5	0,3	0,8	0,7	100,0	2 760	0,0
Quintiles de bien-être économique										
Le plus bas	71,5	20,9	1,1	5,9	0,0	0,0	0,5	100,0	3 389	0,0
Second	63,2	24,0	1,4	10,6	0,2	0,3	0,2	100,0	3 525	0,0
Moyen	54,2	27,1	2,1	15,3	0,3	0,6	0,5	100,0	3 662	0,0
Quatrième	39,7	34,2	2,3	19,3	1,1	2,6	0,8	100,0	3 691	1,8
Le plus élevé	24,7	28,9	4,0	30,3	1,3	10,1	0,8	100,0	3 929	4,7
Ensemble	49,9	27,2	2,2	16,7	0,6	2,9	0,6	100,0	18 197	0,0

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ A achevé avec succès 6 classes du niveau primaire.² A achevé avec succès 7 classes du niveau secondaire.

Tableau 2.10.2 Niveau d'instruction de la population des ménages : Homme

Répartition (en %) de la population de fait des hommes des ménages âgés de six ans et plus, en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années complétées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Aucun	Primaire incomplet	Primaire complet ¹	Secondaire incomplet	Secondaire complet ²	Supérieur	Ne sait pas/ manquant	Total	Effectif	Nombre médian d'années complétées
Groupe d'âges										
6-9	53,2	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	2 525	0,0
10-14	26,9	59,0	4,0	9,8	0,0	0,0	0,3	100,0	2 524	2,3
15-19	27,7	20,4	3,9	46,9	0,1	0,2	0,7	100,0	1 898	5,2
20-24	31,1	15,0	2,4	39,6	3,8	7,4	0,6	100,0	1 393	6,1
25-29	38,4	15,4	2,3	24,1	2,1	16,8	0,8	100,0	1 102	4,5
30-34	44,2	22,4	3,2	13,8	2,3	12,6	1,6	100,0	1 051	2,8
35-39	54,1	20,3	2,7	12,6	0,6	8,2	1,5	100,0	863	0,0
40-44	46,0	21,2	5,0	14,1	3,5	5,8	4,3	100,0	716	1,2
45-49	48,1	19,7	3,6	14,5	2,8	6,7	4,6	100,0	548	0,0
50-54	57,0	11,8	3,2	16,9	2,4	5,2	3,5	100,0	458	0,0
55-59	60,6	8,3	5,7	12,3	2,2	8,6	2,3	100,0	398	0,0
60-64	68,1	5,2	2,1	11,5	1,4	7,9	3,9	100,0	566	0,0
65+	79,4	3,4	4,1	7,4	1,2	3,7	0,9	100,0	916	0,0
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	*	*	*	100,0	2	*
Résidence										
Urbain	27,1	31,7	4,0	24,4	2,1	9,0	1,7	100,0	6 744	4,0
Rural	57,5	25,8	2,0	12,2	0,6	1,3	0,8	100,0	8 217	0,0
Région										
Nord	54,8	27,6	3,1	11,4	0,5	1,9	0,8	100,0	2 555	0,0
Ouest	28,0	31,0	4,1	23,5	2,2	9,8	1,4	100,0	5 603	4,0
Centre	61,2	22,7	1,3	12,0	0,6	1,4	0,7	100,0	4 278	0,0
Sud	37,9	33,2	2,9	20,8	1,0	2,2	2,0	100,0	2 525	1,2
Quintiles de bien-être économique										
Le plus bas	65,8	22,4	1,5	9,2	0,2	0,4	0,6	100,0	2 882	0,0
Second	55,3	26,9	2,6	12,9	0,4	0,9	0,9	100,0	2 968	0,0
Moyen	46,9	31,2	2,4	15,8	0,8	1,5	1,4	100,0	2 966	0,0
Quatrième	34,4	33,4	4,3	19,6	1,4	5,0	1,8	100,0	3 116	2,3
Le plus élevé	18,0	27,9	3,7	30,3	3,3	15,6	1,3	100,0	3 028	5,6
Ensemble	43,8	28,4	2,9	17,7	1,2	4,8	1,2	100,0	14 961	0,6

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ A achevé avec succès 6 classes du niveau primaire.² A achevé avec succès 7 classes du niveau secondaire.

Tableau 2.11 Taux de fréquentation scolaire

Taux net de fréquentation scolaire (TNF) et taux brut de fréquentation scolaire (TBF) de la population de fait des ménages, par sexe et niveau d'études, et indice de parité entre les genres selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Taux net de fréquentation scolaire ¹				Taux brut de fréquentation scolaire ²			
	Homme	Femme	Ensemble	Indice de parité entre les genres ³	Homme	Femme	Ensemble	Indice de parité entre les genres ³
NIVEAU PRIMAIRE								
Résidence								
Urbain	67,4	73,0	70,1	1,08	94,3	107,0	100,5	1,13
Rural	40,8	44,0	42,4	1,08	65,0	70,1	67,5	1,08
Région								
Nord	39,8	48,0	43,8	1,21	65,2	76,3	70,7	1,17
Ouest	65,7	73,3	69,3	1,12	92,1	106,1	98,8	1,15
Centre	37,2	38,1	37,6	1,02	57,0	64,3	60,7	1,13
Sud	61,0	62,6	61,8	1,03	93,5	91,4	92,4	0,98
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	34,2	37,4	35,8	1,09	54,9	57,7	56,3	1,05
Second	43,9	45,8	44,8	1,04	64,7	74,1	69,3	1,15
Moyen	49,5	55,1	52,3	1,11	82,0	85,2	83,6	1,04
Quatrième	62,3	67,2	64,6	1,08	89,8	106,9	97,9	1,19
Le plus élevé	73,1	78,8	75,9	1,08	98,9	108,7	103,8	1,10
Ensemble	50,5	54,2	52,3	1,07	75,6	83,1	79,3	1,10
NIVEAU SECONDAIRE								
Résidence								
Urbain	43,6	48,7	46,4	1,12	67,6	68,4	68,0	1,01
Rural	23,6	21,1	22,3	0,89	35,1	31,6	33,3	0,90
Région								
Nord	19,6	25,5	22,7	1,30	29,6	35,0	32,4	1,18
Ouest	44,3	50,0	47,4	1,13	67,7	70,6	69,3	1,04
Centre	23,6	20,4	21,8	0,86	36,6	31,0	33,4	0,85
Sud	34,8	29,7	32,3	0,85	51,5	44,2	47,9	0,86
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	17,7	14,2	15,8	0,80	26,2	19,4	22,6	0,74
Second	28,0	21,4	24,5	0,76	38,7	32,2	35,3	0,83
Moyen	24,6	32,0	28,4	1,30	39,5	49,9	44,9	1,27
Quatrième	36,5	38,6	37,7	1,06	56,0	52,2	53,9	0,93
Le plus élevé	54,8	58,1	56,6	1,06	85,8	82,5	84,0	0,96
Ensemble	31,5	32,6	32,1	1,04	47,9	47,0	47,4	0,98

¹ Le taux net de fréquentation scolaire (TNF) pour le niveau primaire est le pourcentage de la population d'âge officiel de fréquentation du niveau primaire (6-11 ans) qui fréquente l'école primaire. Le taux net de fréquentation scolaire pour le niveau secondaire est le pourcentage de la population d'âge officiel de fréquentation du niveau secondaire (12-18 ans) qui fréquente l'école secondaire. Par définition le taux net de fréquentation ne peut excéder 100 %.

² Le taux brut de fréquentation scolaire (TBF) au niveau primaire est le nombre total d'élèves du niveau primaire, exprimé en pourcentage de la population d'âge officiel de fréquentation du niveau primaire. Le taux brut de fréquentation scolaire au niveau secondaire est le nombre total d'élèves du niveau secondaire, exprimé en pourcentage de la population d'âge officiel de fréquentation du niveau secondaire. S'il y a pour un niveau donné un nombre important d'élèves plus âgés ou plus jeunes que l'âge officiel pour ce niveau, le TBF peut excéder 100 %.

³ L'indice de parité entre les genres au niveau primaire est le ratio du TBF au niveau primaire des filles sur le TBF des garçons.

Tableau 2.12 Connaissance d'un programme de transferts sociaux

Pourcentage de ménages connaissant un service de transfert social, Sénégal 2018

Caractéristiques sociodémographiques	Bourse de sécurité familiale	Bourse d'étude	Autre transfert de l'Etat	Programme de structure privée/ONG	Tout autre programme de support extérieur	Au moins un programme	Effectif
Sexe du chef de ménage							
Masculin	93,9	61,0	45,3	37,9	19,7	95,8	3 103
Féminin	92,9	65,6	45,6	35,0	13,2	95,4	1 489
Âge du chef de ménage							
15-19	*	*	*	*	*	*	2
20-24	77,5	61,3	40,0	40,9	16,3	90,2	79
25-29	86,0	49,0	32,0	31,7	12,4	87,1	150
30-34	86,4	55,4	35,9	32,1	17,2	88,2	295
35-39	92,9	60,3	44,7	39,8	20,8	94,0	448
40-44	91,1	58,0	43,4	36,0	15,1	95,2	492
45-49	95,1	62,9	45,6	32,9	14,1	97,4	461
50-54	94,9	62,1	46,5	38,8	18,1	97,3	500
55-59	94,6	65,6	46,1	32,3	15,3	95,9	468
60-64	96,4	64,0	47,9	39,6	20,7	97,8	595
65-69	96,0	69,0	51,1	40,3	20,2	97,3	434
70-74	96,5	67,1	45,9	30,8	14,3	97,8	315
75-79	94,2	65,7	53,7	49,6	21,0	96,9	181
80 +	95,1	63,6	45,0	42,9	21,5	98,0	172
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	*	*	2
Résidence							
Urbain	92,2	72,8	46,6	36,9	14,8	95,6	2 318
Rural	94,9	52,0	44,1	37,0	20,5	95,8	2 274
Région							
Nord	89,2	39,6	45,3	46,5	22,9	90,2	740
Ouest	92,2	74,2	46,3	34,6	10,8	96,1	1 920
Centre	95,6	58,4	52,4	35,1	21,9	96,5	1 178
Sud	98,2	61,6	32,0	36,7	23,0	98,8	754
Niveau d'instruction du chef de ménage							
Aucun	93,4	52,3	41,5	31,8	15,3	94,7	2 955
Primaire	94,8	70,3	45,7	41,4	16,7	96,6	700
Moyen/secondaire ou plus	93,2	91,1	59,2	51,4	26,7	98,2	862
NSP/manquant	90,3	65,5	36,5	36,0	11,9	97,0	75
Quintiles de bien-être économique							
Le plus bas	95,3	40,3	38,6	34,5	17,2	95,5	858
Second	94,3	50,8	40,8	33,6	19,4	95,3	843
Moyen	93,2	59,8	46,4	38,5	19,4	94,8	820
Quatrième	93,6	69,3	44,2	36,3	13,9	94,6	1 004
Le plus élevé	91,8	85,3	54,7	41,1	18,6	97,8	1 068
Ensemble	93,5	62,5	45,4	37,0	17,6	95,7	4 592

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 2.13 Support reçu grâce à un programme de transferts sociaux

Pourcentage de ménages dans lesquels un membre a reçu un support grâce à un programme de transferts sociaux, Sénégal 2018

Caractéristiques sociodémographiques	Bourse de sécurité familiale	Bourse d'étude	Autre transfert de l'Etat	Programme de structure privée/ONG	Tout autre programme de support extérieur	Au moins un programme	Effectif
Sexe du chef de ménage							
Masculin	15,7	4,1	2,4	1,3	0,2	21,9	3 103
Féminin	10,8	6,8	2,9	0,6	0,3	19,5	1 489
Âge du chef de ménage							
15-19	*	*	*	*	*	*	2
20-24	6,5	12,8	0,1	0,0	0,0	19,5	79
25-29	8,5	0,7	0,8	0,2	0,0	10,3	150
30-34	5,3	4,0	1,6	1,0	0,0	10,4	295
35-39	7,1	1,0	2,1	0,5	0,3	10,5	448
40-44	12,3	2,6	1,8	1,1	0,2	16,7	492
45-49	11,9	4,8	2,8	0,9	0,1	18,5	461
50-54	15,5	5,9	2,3	0,6	0,3	22,3	500
55-59	15,6	8,6	2,9	0,7	0,5	26,4	468
60-64	17,0	5,4	3,8	1,9	0,1	25,3	595
65-69	19,4	6,8	3,2	1,6	0,5	29,6	434
70-74	20,8	4,7	2,9	1,7	0,3	28,6	315
75-79	14,4	4,0	4,6	2,3	0,0	21,3	181
80 +	22,4	6,9	1,0	0,3	0,7	29,2	172
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	*	*	2
Résidence							
Urbain	8,7	8,0	2,8	0,3	0,3	18,0	2 318
Rural	19,6	1,8	2,4	1,9	0,2	24,2	2 274
Région							
Nord	9,7	2,1	5,4	2,5	0,2	18,7	740
Ouest	7,4	9,2	2,3	0,1	0,1	17,4	1 920
Centre	18,1	1,2	1,8	0,6	0,0	20,8	1 178
Sud	29,4	2,8	1,6	3,0	1,1	33,4	754
Niveau d'instruction du chef de ménage							
Aucun	17,2	2,9	2,7	1,2	0,3	22,4	2 955
Primaire	13,3	6,8	3,1	1,1	0,2	21,7	700
Moyen/secondaire ou plus	4,9	10,2	1,8	0,6	0,2	16,8	862
NSP/manquant	6,1	7,5	0,8	0,8	0,0	14,2	75
Quintiles de bien-être économique							
Le plus bas	28,6	1,3	3,1	2,6	0,2	32,9	858
Second	21,6	1,8	2,5	1,7	0,2	26,4	843
Moyen	13,7	1,6	2,0	1,0	0,5	17,5	820
Quatrième	7,0	7,9	2,3	0,3	0,3	15,6	1 004
Le plus élevé	3,5	10,1	2,9	0,1	0,0	15,4	1 068
Ensemble	14,1	5,0	2,6	1,1	0,2	21,1	4 592

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 2.14 Moment auquel a été reçu un support d'un programme de transferts sociaux

Répartition (en %) des ménages qui ont reçu ou dont un membre a reçu un support par le biais d'un programme de transferts sociaux selon le moment, avant l'enquête, auquel ce support a été reçu, EDS Continue Sénégal 2018

Caractéristiques sociodémographiques	Bourse de sécurité Familiale	Bourse d'étude	Autre transfert de l'Etat	Programme de structure privée/ONG	Tout autre programme de support extérieur
0-6 mois	80,3	47,8	43,1	25,5	*
7-11 mois	0,4	6,5	4,6	6,3	*
1-2 Années	7,8	12,8	27,9	22,1	*
2+ Années	9,3	19,1	22,0	43,4	*
NSP/manquant	2,2	13,8	2,4	2,7	*
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	647	228	118	49	11

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 2.15 Provenance et destination du transfert d'argent

Répartition en pourcentage des ménages ayant envoyé ou reçu de l'argent au Sénégal ou à l'international, Sénégal, 2018

Caractéristiques sociodémographiques	Envoi			Réception			Effectif de ménages
	Sénégal	International	Total	Sénégal	International	Ensemble	
Sexe du chef de ménage							
Masculin	40,8	4,9	45,7	36,2	16,3	52,5	3 103
Féminin	38,1	4,6	42,7	45,2	26,5	71,7	1 489
Âge du chef de ménage							
15-19	*	*	*	*	*	*	2
20-24	21,2	11,6	32,8	33,3	21,7	55,0	79
25-29	38,5	6,3	44,8	35,7	15,2	50,9	150
30-34	49,6	9,9	59,6	28,9	14,4	43,4	295
35-39	42,8	6,5	49,2	38,2	21,1	59,3	448
40-44	41,4	6,2	47,6	35,0	15,3	50,3	492
45-49	41,2	6,9	48,1	37,4	18,9	56,3	461
50-54	43,9	4,8	48,7	44,6	13,2	57,7	500
55-59	44,5	2,9	47,3	36,3	18,4	54,7	468
60-64	33,2	2,7	35,9	40,4	22,3	62,7	595
65-69	37,3	2,4	39,7	43,2	24,0	67,3	434
70-74	39,5	1,6	41,1	42,9	25,6	68,5	315
75-79	32,3	2,5	34,8	44,4	25,7	70,0	181
80 +	33,8	4,0	37,8	46,5	25,9	72,4	172
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	*	*	2
Résidence							
Urbain	51,5	6,9	58,4	32,7	27,2	59,9	2 318
Rural	28,1	2,7	30,8	45,7	11,9	57,6	2 274
Région							
Nord	17,2	2,9	20,1	37,7	17,4	55,1	740
Ouest	57,4	6,5	63,9	30,3	28,0	58,3	1 920
Centre	36,8	3,0	39,8	60,3	10,7	71,0	1 178
Sud	22,6	5,2	27,8	30,0	14,4	44,4	754
Niveau d'instruction du chef de ménage							
Aucun	32,8	4,4	37,3	42,0	15,7	57,7	2 955
Primaire	43,2	5,6	48,8	37,8	21,9	59,7	700
Moyen/secondaire ou plus	60,0	5,3	65,4	30,2	31,0	61,2	862
NSP/manquant	57,4	6,9	64,3	39,2	23,2	62,4	75
Quintiles de bien-être économique							
Le plus bas	14,5	3,3	17,8	34,7	5,4	40,1	858
Second	25,1	3,2	28,4	49,4	8,4	57,8	843
Moyen	38,5	3,3	41,8	49,1	15,2	64,4	820
Quatrième	50,8	8,3	59,2	39,6	23,2	62,9	1 004
Le plus élevé	62,9	5,1	68,0	26,4	39,9	66,3	1 068
Ensemble	39,9	4,8	44,7	39,1	19,6	58,7	4 592

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 2.16 Participation à des tontines et disposition de compte bancaire

Répartition (en %) des ménages ayant un compte bancaire ou un compte dans une institution financière et pourcentage de ménages dont un membre a participé à des tontines, Sénégal, 2018

Caractéristiques sociodémographiques	Compte bancaire ou dans une institution financière	Participation d'un membre du ménage à des tontines	Effectif des ménages
Sexe du chef de ménage			
Masculin	31,3	53,4	3 103
Féminin	30,7	57,9	1 489
Âge du chef de ménage			
15-19	*	*	2
20-24	21,5	22,7	79
25-29	28,3	32,2	150
30-34	30,6	38,4	295
35-39	30,4	46,1	448
40-44	28,4	53,9	492
45-49	31,7	52,9	461
50-54	29,9	55,2	500
55-59	31,8	61,1	468
60-64	36,5	61,1	595
65-69	34,8	60,2	434
70-74	28,5	64,6	315
75-79	23,0	66,6	181
80 +	34,2	65,9	172
Ne sait pas/manquant	*	*	2
Résidence			
Urbain	45,2	54,2	2 318
Rural	16,7	55,6	2 274
Région			
Nord	17,1	42,4	740
Ouest	45,9	59,3	1 920
Centre	19,6	70,2	1 178
Sud	25,2	31,9	754
Niveau d'instruction du chef de ménage			
Aucun	19,3	55,3	2 955
Primaire	36,3	54,6	700
Moyen/secondaire ou plus	67,1	53,6	862
NSP/manquant	36,6	57,3	75
Quintiles de bien-être économique			
Le plus bas	4,8	35,6	858
Second	11,7	54,9	843
Moyen	22,1	62,3	820
Quatrième	32,8	60,2	1 004
Le plus élevé	72,9	59,7	1 068
Ensemble	31,1	54,9	4 592

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 2.17 Assurance médicale : Population des ménages

Population (de fait) des ménages ayant une assurance médicale selon certaines caractéristiques, sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristiques sociodémographiques	Mutuelle de santé COM	Mutuelle de santé Prof	Mutuelle de santé COMPL	IPM	Imputation budgétaire	Assurances privées	Assurance Maladies retraités (IPRES)	Assurance Maladies retraités (FNR)	Initiative de gratuité des soins pour les enfants de moins de cinq ans	Plan SESAME	Aucune	Population de fait
Âge												
<5	1,4	0,9	0,1	1,7	1,3	0,3	0,1	0,1	49,5	0,0	46,5	6 240
5-9	3,5	1,3	0,1	1,2	1,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	92,4	6 107
10-14	3,5	1,1	0,1	1,1	1,5	0,3	0,1	0,2	0,0	0,0	92,3	5 333
15-19	3,9	0,9	0,1	0,7	1,6	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	92,6	4 073
20-24	3,3	0,7	0,1	0,6	1,2	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	93,5	3 151
25-29	3,0	0,9	0,1	1,5	1,4	0,6	0,0	0,3	0,0	0,0	92,3	2 756
30-34	2,6	1,5	0,1	1,5	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	93,0	2 497
35-39	3,7	1,3	0,2	2,3	2,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	89,8	2 054
40-44	4,7	3,0	0,0	3,3	2,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	1 621
45-49	5,1	3,3	0,4	2,5	2,2	0,3	0,5	0,6	0,0	0,0	85,3	1 242
50-54	5,7	2,8	0,1	1,7	4,4	0,3	0,6	0,2	0,0	0,0	85,5	1 360
55-59	6,0	2,1	0,1	1,2	3,8	0,3	1,1	0,7	0,0	0,0	85,4	1 055
60-64	4,6	1,4	0,1	1,7	4,2	0,0	5,2	0,9	0,0	2,4	80,6	1 034
65-69	6,5	0,6	0,7	0,1	1,6	0,0	5,5	1,8	0,0	4,6	78,5	770
70-74	5,2	0,8	0,7	0,6	1,7	0,1	5,7	0,2	0,0	5,8	79,1	529
75-79	4,2	0,4	0,3	0,2	3,0	0,0	3,6	1,5	0,0	7,1	80,8	325
80 +	3,1	0,6	0,0	1,4	1,0	0,0	2,2	1,8	0,0	8,2	81,7	378
Ne sait pas/ manquant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	5
Résidence												
Urbain	2,5	2,3	0,2	2,7	3,6	0,5	1,0	0,5	7,0	0,4	80,2	17 602
Rural	4,2	0,5	0,1	0,4	0,4	0,0	0,1	0,0	8,1	0,3	86,1	22 930
Région												
Nord	1,7	2,6	0,1	3,6	4,9	0,7	1,3	0,8	6,4	0,4	78,3	9 404
Ouest	7,2	0,7	0,1	0,2	0,9	0,1	0,2	0,2	0,8	0,1	89,7	1 409
Centre	2,8	0,8	0,1	0,2	0,4	0,0	0,2	0,1	11,7	0,6	83,4	5 107
Sud	1,9	1,9	0,0	1,2	1,2	0,0	0,5	0,0	8,1	0,4	85,2	2 841
Niveau d'instruction												
Aucun	3,3	0,6	0,1	0,7	0,6	0,1	0,3	0,1	na	0,5	80,8	22 922
Primaire	3,6	1,6	0,2	1,9	1,5	0,1	0,5	0,2	na	0,1	90,5	10 111
Moyen/secondaire ou plus	3,8	3,0	0,2	2,9	5,7	1,0	0,9	0,8	na	0,2	82,2	7 215
NSP/manquant	2,9	1,7	0,0	2,8	1,2	0,0	0,6	0,0	na	0,4	90,7	283
Niveau d'instruction du chef de ménage												
Aucun	3,3	0,4	0,1	0,5	0,3	0,1	0,2	0,0	8,0	0,3	86,9	28 727
Primaire	3,9	2,0	0,3	2,3	1,3	0,1	1,0	0,4	7,5	0,3	81,4	5 468
Moyen/secondaire ou plus	3,7	4,6	0,3	4,9	9,1	1,4	1,2	1,2	5,8	0,6	69,3	5 775
NSP/manquant	4,4	2,7	0,1	0,9	1,6	0,1	0,1	0,0	10,7	0,0	79,7	562
Quintiles de bien-être économique												
Le plus bas	4,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,2	89,0	8 011
Second	4,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	8,2	0,3	86,6	8 123
Moyen	3,9	1,1	0,2	0,7	0,3	0,0	0,2	0,0	8,9	0,4	84,5	8 086
Quatrième	2,8	1,5	0,1	1,1	2,0	0,1	0,5	0,2	8,2	0,5	83,8	8 097
Le plus élevé	2,2	3,3	0,2	4,9	6,2	1,1	1,6	1,0	6,5	0,4	73,8	8 214
Ensemble	3,5	1,3	0,1	1,4	1,7	0,3	0,5	0,2	7,6	0,4	83,5	40 531

Tableau 2.18 Initiative de gratuité des soins pour les enfants de moins de cinq ans dans des ménages

Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans ayant bénéficié de l'Initiative de gratuité des soins pour les enfants de moins de cinq ans, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant bénéficié de l'initiative de gratuité des soins pour les enfants de moins de cinq ans	Population (de fait) des enfants de moins de cinq ans
Résidence		
Urbain	53,1	2 327
Rural	47,4	3 913
Région		
Nord	45,2	1 037
Ouest	54,1	1 907
Centre	62,2	2 245
Sud	18,6	1 052
Niveau d'instruction du chef de ménage		
Pas d'instruction	48,7	4 689
Primaire	54,8	750
Moyen/secondaire ou plus	47,5	709
NSP/manquant	64,9	92
Quintiles de bien-être économique		
Le plus bas	34,0	1 498
Second	48,0	1 380
Moyen	57,6	1 248
Quatrième	63,3	1 053
Le plus élevé	50,4	1 061
Total	49,5	6 240

Tableau 2.19 Handicap des personnes âgées de 5 ans et plus

Pourcentage de personnes âgées de 5 ans et plus ayant des difficultés fonctionnelles, par domaine, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS Continue Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de personnes âgées de 5 ans et plus ayant des difficultés fonctionnelles ¹ dans le domaine de :						Pourcentage de personnes âgées de 5 ans et plus ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine	Effectif
	Vue	Ouïe	Marche	Auto-soins	Communication	Mémorisation		
Sexe								
Masculin	1,7	0,8	1,0	0,3	0,5	0,5	3,5	15 521
Féminin	1,8	0,6	1,3	0,4	0,3	0,4	3,5	18 762
Groupe d'âges								
6-9	0,3	0,2	0,2	0,7	0,5	0,2	1,3	6 108
10-14	0,3	0,3	0,2	0,1	0,3	0,1	1,0	5 333
15-19	0,4	0,3	0,4	0,1	0,4	0,4	1,4	4 070
20-24	0,6	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	1,3	3 150
25-29	0,6	0,2	0,2	0,0	0,3	0,2	1,3	2 756
30-34	0,6	1,0	0,3	0,1	0,7	0,4	2,1	2 497
35-39	0,7	0,5	0,8	0,1	0,2	0,5	2,4	2 054
40-44	1,4	0,9	0,8	0,1	0,3	0,3	3,2	1 621
45-49	1,9	0,1	0,7	0,2	0,1	0,3	3,1	1 241
50-54	2,2	0,5	1,2	0,1	0,2	0,5	4,1	1 360
55-59	4,4	0,7	3,1	0,3	0,3	0,0	8,2	1 055
60-64	5,0	1,5	3,5	0,5	0,2	0,1	9,8	1 034
65-69	6,8	2,2	5,3	1,2	0,0	1,2	13,2	770
70+	19,6	7,2	15,2	3,7	1,8	5,5	32,7	1 233
Résidence								
Urbain	1,9	0,5	1,2	0,3	0,3	0,4	3,5	15 273
Rural	1,5	0,8	1,2	0,4	0,5	0,5	3,5	19 010
Région								
Nord	1,0	0,4	1,1	0,4	0,3	0,4	2,5	5 882
Ouest	2,1	0,6	1,3	0,3	0,3	0,4	3,9	12 585
Centre	2,1	1,0	1,3	0,5	0,5	0,7	4,1	10 346
Sud	1,0	0,6	0,8	0,2	0,3	0,4	2,5	5 469
Niveau d'instruction du chef de ménage								
Pas d'instruction	1,6	0,8	1,4	0,4	0,4	0,5	3,6	24 030
Primaire	1,8	0,6	0,8	0,4	0,2	0,3	3,1	4 718
Moyen/secondaire ou plus	2,1	0,5	0,8	0,2	0,2	0,3	3,7	5 065
NSP/manquant	1,3	0,0	1,5	0,4	0,0	0,0	2,8	469
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	1,3	1,0	1,2	0,4	0,4	0,5	3,3	6 511
Second	1,9	0,9	1,2	0,5	0,6	0,6	4,0	6 739
Moyen	1,7	0,6	1,4	0,3	0,4	0,6	3,4	6 836
Quatrième	1,6	0,4	1,3	0,3	0,3	0,4	3,2	7 044
Le plus élevé	2,1	0,5	0,9	0,3	0,2	0,3	3,7	7 152
Total	1,7	0,7	1,2	0,4	0,4	0,5	3,5	34 283

¹ Sont considérées comme ayant une difficulté fonctionnelle dans un domaine, les personnes âgées de 5 ans et plus qui ont déclaré avoir « Beaucoup de difficultés » ou « Ne peut pas ... » faire l'activité signalée.

CARACTÉRISTIQUES DES ENQUÊTÉS

Résultats clés

- **Niveau d'instruction** : Un peu plus d'un tiers (37 %) des hommes et 46 % des femmes de 15-49 ans n'ont aucun niveau d'instruction.
- **Exposition aux médias** : Une femme de 15-49 ans sur cinq (21 %) et un homme de 15-49 ans sur cinq (18 %) ne sont exposés régulièrement à aucun média.
- **Emploi** : Près de la moitié des femmes (49 %) et plus de quatre hommes sur cinq (82 %) de 15-49 ans travaillaient au cours des sept jours précédant l'enquête.
- **Occupation** : La majorité des femmes (46 %) qui travaillaient au cours des douze mois avant l'enquête étaient occupées dans les ventes et services. La majorité des hommes (33 %) étaient occupés dans l'agriculture.

Ce chapitre présente les résultats concernant les caractéristiques démographiques et socio-économiques des enquêtés comme l'âge, le niveau d'instruction le lieu de résidence, l'état matrimonial, l'emploi et le niveau de bien-être économique. Ces informations sont particulièrement utiles pour comprendre les facteurs qui influencent l'utilisation des services de santé reproductive, le recours à la contraception et les comportements en matière de santé.

3.1 CARACTÉRISTIQUES DE BASE DES ENQUÊTÉS

Au cours de l'EDS Continue 2018, 9 414 femmes et 3 387 hommes de 15-49 ans ont été enquêtés (**Tableau 3.1**). La répartition par groupe d'âges quinquennaux présente une allure décroissante assez régulière, les proportions diminuant avec l'âge, passant chez les femmes de 22 % à 15-19 ans à 7 % à 45-49 ans et, chez les hommes, de respectivement 25 % à 7 %. Près de six femmes sur dix ont moins de 30 ans (57 %). Chez les hommes, la proportion est identique (57 %).

Près de la moitié des femmes (46 %) et plus d'un tiers des hommes (37 %) n'ont aucun niveau d'instruction.

Au moment de l'enquête, la proportion de femmes en union était largement supérieure à celle des hommes (64 % contre 39 %). La proportion des femmes en rupture d'union (veuves, divorcées, et séparées) est deux fois plus élevée que celle des hommes (6 % contre 2 %).

La population sénégalaise est quasiment répartie entre le milieu urbain et rural (52 % des femmes et 51 % des hommes habitent en milieu rural contre respectivement 48 % et 49 % en urbain).

La répartition de la population par quintile de bien-être économique ne met pas en évidence de différence entre les hommes et les femmes. Près d'une femme sur cinq (16 %) et 17 % des hommes vivent dans un ménage classé dans le quintile le plus bas et près d'un quart des femmes (24 %) et 21 % des hommes vivent dans un ménage du quintile le plus élevé.

3.2 NIVEAU D'INSTRUCTION ET ALPHABÉTISATION

Alphabétisation

On suppose que les enquêtés qui ont fréquenté un niveau supérieur ou secondaire sont alphabétisés. Tous les autres enquêtés, qui ont lu à haute voix une phrase préparée qui leur a été montrée sont considérés comme alphabétisés s'ils ont pu lire toute la phrase ou une partie de la phrase.


Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans.

Les résultats de l'enquête ont montré que près d'un tiers des hommes (29 %) ont un niveau d'instruction secondaire incomplet contre 26 % chez les femmes. La proportion d'hommes ayant un niveau supérieur est presque le double de celle des femmes (8 % contre 5 %) (**Graphique 3.1**). Dans l'ensemble, le nombre médian d'années d'étude complétées est de 2,8 pour les femmes et 4,2 pour les hommes de 15-49 ans. Près d'une femme de 15-49 ans sur deux est alphabétisée (49 %) contre 59 % des hommes de 15-49 ans (**Tableaux 3.3.1 et 3.3.2 et Graphique 3.1**).

Tendances : Entre 2005 et 2018, les pourcentages de femmes et d'hommes sans aucune instruction ont diminué de manière importante et soutenue, passant chez les femmes de 60 à 46 % et, chez les hommes, de 41 % à 37 %.

Graphique 3.1 Niveau d'instruction des enquêtés

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou complété



Variations par caractéristique

- On note une amélioration du niveau d'instruction des générations anciennes aux plus récentes, le pourcentage d'enquêtés sans niveau d'instruction étant passé de 60 % chez les femmes de la tranche d'âges 45-49 ans à 29 % chez les femmes de la tranche d'âges 15-24 ans et, chez les hommes, de respectivement de 56 à 28 %.
- Le niveau d'instruction est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural. En effet, 63 % des femmes n'ont aucun niveau d'instruction en milieu rural contre 27 % en milieu urbain. Chez les hommes, on observe aussi des écarts importants (respectivement 52 % contre 22 %).
- Les proportions de femmes et d'hommes sans niveau d'instruction diminuent avec l'augmentation du niveau de bien-être économique, variant pour les femmes de 75 à 20 % et chez les hommes de 61 à 13 %.
- Le taux d'alphabétisation est plus élevé en milieu urbain (74% chez les hommes et 66 % chez les femmes) qu'en milieu rural (respectivement 44 % et 33 %).
- Le taux d'alphabétisation augmente avec l'amélioration du niveau de bien-être du ménage, passant chez les femmes de 22 % dans le quintile le plus bas à 74 % dans le plus élevé et, chez les hommes, de respectivement 32 % à 86 %.

3.3 EXPOSITION AUX MEDIAS ET UTILISATION DE L'INTERNET

Exposition aux médias

On demande aux enquêtés combien de fois ils ont lu un journal, écouté la radio ou regardé la télévision. Ceux qui déclarent au moins une fois par semaine sont considérés comme étant exposés régulièrement à ce type de média.


Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans.

Globalement, le taux d'exposition aux médias est assez satisfaisant au Sénégal, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. En effet, seulement moins d'une femme sur quatre (21 %) et 18 % des hommes de 15-49 ans ne sont régulièrement exposés à aucun média (**Tableaux 3.4.1 et 3.4.2**). La télévision est le média le plus utilisé chez les femmes comme chez les hommes (respectivement 67 % et 72%). Par contre l'exposition aux journaux est très faible, en particulier parmi les hommes (14 % chez les femmes et 7 % chez les hommes (**Graphique 3.2**).

En outre, 39 % des femmes et 54 % des hommes de 15-49 ans ont déclaré avoir utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois. Parmi ces utilisateurs, 45 % des femmes et 34 % des hommes l'ont utilisé presque chaque jour (**Tableaux 3.5.1 et 3.5.2**).

Graphique 3.2 Exposition aux médias

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui sont exposés à des médias chaque semaine



Variations par caractéristiques

- L'exposition aux médias augmente avec le niveau d'instruction. Le pourcentage de femmes exposées à aucun média varie de 30 % parmi celles sans niveau d'instruction à 12 % parmi celles ayant un niveau moyen/secondaire ou plus. Chez les hommes, on note la même tendance : respectivement 25 % à 12 %.
- Les proportions de femmes et d'hommes qui ne sont régulièrement exposés à aucun média diminuent du quintile le plus bas au plus élevé, passant de 55 % à 4 % chez les femmes et de 54 % à 3 % chez les hommes.
- L'utilisation de l'internet au cours des douze derniers mois augmente avec le niveau d'instruction, passant, chez les femmes de 16 % parmi celles sans aucun niveau d'instruction à 72 % parmi celles ayant le niveau moyen/secondaire ou plus et, chez les hommes, de respectivement 35 % à 78 %.
- Le niveau de bien-être économique influence, de manière importante, l'utilisation de l'internet, cela aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Dans le quintile le plus élevé 72 % des femmes et 88 % des hommes ont utilisé l'internet au cours des douze derniers mois contre respectivement 5 % et 15 % dans le plus bas.

3.4 EMPLOI

Travaille actuellement

Inclut les enquêtés qui travaillaient dans les sept jours qui précédaient l'enquête.

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans.

Lors de l'EDS Continue 2018, des questions relatives à l'emploi ont été posées aux hommes et aux femmes. Ces questions ont permis d'identifier les hommes et les femmes qui travaillaient au moment de l'enquête, c'est-à-dire au cours des sept jours précédant l'enquête, et ceux qui avaient effectué un travail quelconque, à un certain moment, au cours des douze mois ayant précédé l'enquête.


Près de la moitié des femmes (49 %) et plus de quatre hommes sur cinq (82 %) ont déclaré qu'ils travaillaient au cours des sept jours ayant précédé l'enquête. En outre, 9 % des femmes et 7 % des hommes ont déclaré qu'ils travaillaient au cours des douze mois précédant l'enquête mais qu'ils ne travaillaient plus au moment de l'enquête. Dans 11 % des cas, les hommes n'avaient pas travaillé au cours des douze mois ayant précédé l'enquête contre 41 % chez les femmes (**Tableaux 3.6.1 et 3.6.2**).

Variations par caractéristique

- Plus le niveau d'instruction augmente, plus la proportion de ceux qui travaillaient au cours des sept derniers jours diminue. Chez les femmes, ces proportions passent de 57 % parmi celles sans niveau d'instruction à 37 % parmi celles de niveau secondaire ou plus. Chez les hommes, les proportions varient respectivement de 94 % à 64 % (**Graphique 3.3**).

Graphique 3.3 Emploi par niveau d'instruction

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui travaillent actuellement



3.5 OCCUPATION

Occupation

Classés dans les catégories cadre, technicien/direction, employé, ventes et services, manuel qualifié, manuel non qualifié, employé de maison, agriculture et autre.

Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans qui travaillaient au moment de l'enquête ou qui ont travaillé dans les 12 mois qui précédaient l'enquête.

Parmi les hommes de 15-49 ans qui travaillaient au cours des douze mois précédant l'enquête, la majorité était occupée dans l'agriculture (33 %) suivi par les ventes et services (28 %). Chez les femmes, ce sont les ventes et services qui occupaient la majorité d'entre elles (46 %) suivi de l'agriculture (27 %). Seulement 4 % des femmes et 7 % des hommes de 15-49 ans occupaient un emploi qualifié/technicien/direction (**Graphique 3.4**) (**Tableaux 3.7.1** et **3.7.2**).


Variations par caractéristique

- Un pourcentage élevé de femmes qui n'ont aucun niveau d'instruction travaillent dans les ventes et services (43 %) et dans l'agriculture (39 %). Les femmes qui ont un niveau moyen/secondaire ou plus travaillent principalement dans les ventes et services (45 %) et en tant que cadre (15 %). Les hommes sans niveau d'instruction travaillent dans l'agriculture (40 %) ou occupent un emploi dans les ventes et services ou un emploi non qualifié (29 % dans les deux cas). En outre, un homme sur cinq ayant un niveau moyen/secondaire ou plus travaille en tant que cadre (21 %) mais 26 % sont occupés dans l'agriculture.
- Le pourcentage de femmes qui sont employées dans l'agriculture diminue du quintile le plus bas au plus élevé, passant, de 72 % à 3 %. Le pourcentage d'hommes travaillant dans les emplois qualifiés/techniques/encadrement augmente avec le quintile, passant de 1 % dans le plus bas à 22 % dans le plus élevé.

Le **Tableau 3.8** présente la répartition des femmes ayant eu un emploi au cours des douze derniers mois en fonction du type de rémunération, du type d'employeur et de la régularité de l'emploi selon le secteur d'activité (agricole ou non-agricole). Dans le secteur agricole, 60 % des femmes sont employées par un membre de la famille contre 10 % dans le secteur non agricole. En outre, il est plus fréquent que les femmes travaillent toute l'année dans le secteur non agricole que dans le secteur agricole (77 % contre 6 %) où 92 % des femmes ont un travail saisonnier. Concernant le type de rémunération, le **Tableau 3.8** montre que la quasi-totalité des femmes (85 %) travaillant dans le secteur non agricole ont été rémunérées en argent seulement contre 18 % de celles travaillant dans le secteur agricole, secteur dans lequel 55 % ne sont pas rémunérées.

Graphique 3.4 Occupation

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui travaillaient au cours des 12 mois précédant l'enquête par type d'occupation



LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur les caractéristiques des enquêtés, consultez les tableaux suivants :

- **Tableau 3.1** **Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés**
- **Tableau 3.2.1** **Niveau d'instruction : Femmes**
- **Tableau 3.2.2** **Niveau d'instruction : Hommes**
- **Tableau 3.3.1** **Alphabétisation : Femmes**
- **Tableau 3.3.2** **Alphabétisation : Hommes**
- **Tableau 3.4.1** **Exposition aux médias : Femmes**
- **Tableau 3.4.2** **Exposition aux médias : Hommes**
- **Tableau 3.5.1** **Utilisation de l'internet : Femmes**
- **Tableau 3.5.2** **Utilisation de l'internet : Hommes**
- **Tableau 3.6.1** **Emploi : Femmes**
- **Tableau 3.6.2** **Emploi : Hommes**
- **Tableau 3.7.1** **Occupation : Femmes**
- **Tableau 3.7.2** **Occupation : Hommes**
- **Tableau 3.8** **Type d'emploi des femmes**

Tableau 3.1 Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans par certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Femmes			Hommes		
	Pourcentage pondéré	Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Pourcentage pondéré	Effectif pondéré	Effectif non pondéré
Groupe d'âges						
15-19	21,8	2 056	2 208	25,4	861	927
20-24	17,9	1 686	1 679	17,8	604	618
25-29	16,9	1 591	1 543	13,9	469	475
30-34	14,7	1 387	1 375	13,4	452	428
35-39	12,3	1 153	1 100	12,0	405	383
40-44	9,2	868	860	10,4	351	302
45-49	7,2	673	649	7,2	245	261
Religion						
Musulmane	96,2	9 053	9 127	96,2	3 259	3 264
Chrétienne	3,8	360	284	3,7	127	128
Animiste	0,0	0	0	0,0	1	2
Sans religion	0,0	1	2	0,0	0	0
Ethnie						
Wolof	41,8	3 931	3 427	40,2	1 363	1 171
Poular	24,9	2 342	2 827	24,6	833	987
Serer	14,5	1 362	1 082	15,3	517	445
Mandingue/socé	5,0	468	762	4,1	138	261
Diola	4,3	408	359	3,6	123	138
Soninké	2,1	193	227	4,6	157	119
Autre/non Sénégalais	7,5	710	730	7,6	256	273
État matrimonial						
Célibataire	30,5	2 873	2 603	59,4	2 013	2 001
Marié	63,7	5 993	6 362	38,8	1 313	1 348
Vivant ensemble	0,2	20	19	0,2	6	5
Divorcé/séparé	4,6	437	327	1,5	50	35
Veuf	1,0	91	103	0,1	4	5
Résidence						
Urbain	48,0	4 518	3 506	49,0	1 659	1 298
Rural	52,0	4 896	5 908	51,0	1 728	2 096
Région						
Nord	16,6	1 565	1 994	16,3	553	686
Ouest	39,6	3 725	1 643	39,6	1 340	589
Centre	30,5	2 870	3 199	28,7	971	1 073
Sud	13,3	1 254	2 578	15,4	523	1 046
Niveau d'instruction						
Pas d'instruction	45,7	4 304	4 778	36,9	1 250	1 370
Primaire	22,0	2 070	2 016	25,3	855	821
Moyen/secondaire ou plus	32,3	3 040	2 620	37,8	1 282	1 203
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	16,0	1 508	2 295	17,4	588	887
Second	17,6	1 659	2 086	18,0	611	768
Moyen	20,3	1 908	2 183	20,1	680	745
Quatrième	21,9	2 065	1 742	24,0	812	639
Le plus élevé	24,1	2 273	1 108	20,5	696	355
Ensemble 15-49	100,0	9 414	9 414	100,0	3 387	3 394
50-59	na	na	na	na	375	368
Total 15-59	na	na	na	na	3 762	3 762

Note : Le niveau d'instruction correspond au plus haut niveau d'instruction atteint, qu'il ait été achevé ou non.
na = Non applicable

Tableau 3.2.1 Niveau d'instruction : Femmes

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années d'instruction achevées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristiques sociodémographiques	Plus haut niveau d'instruction atteint						Total	Nombre médian d'années complétées	Effectif de femmes
	Aucun niveau	Primaire incomplet	Primaire complet ¹	Secondaire incomplet	Secondaire complet ²	Supérieur			
Groupe d'âges									
15-24	28,7	16,5	3,1	45,7	1,1	4,9	100,0	5,8	3 742
15-19	26,3	19,8	3,6	49,8	0,3	0,2	100,0	5,5	2 056
20-24	31,7	12,5	2,5	40,8	2,1	10,6	100,0	6,4	1 686
25-29	45,5	19,8	2,2	22,0	1,8	8,6	100,0	2,7	1 591
30-34	60,3	22,1	2,1	9,6	0,2	5,6	100,0	a	1 387
35-39	61,3	22,2	3,1	9,3	0,4	3,8	100,0	a	1 153
40-44	64,4	20,3	3,5	9,7	0,1	2,0	100,0	a	868
45-49	60,1	20,4	2,2	13,2	0,2	3,9	100,0	a	673
Résidence									
Urbain	27,2	23,4	3,8	34,3	1,4	9,9	100,0	5,0	4 518
Rural	62,8	15,4	1,8	18,9	0,3	0,8	100,0	a	4 896
Région									
Nord	54,6	18,8	3,7	21,3	0,5	1,1	100,0	a	1 565
Ouest	27,0	23,6	3,5	33,3	1,3	11,2	100,0	5,0	3 725
Centre	64,4	14,5	0,8	18,8	0,5	1,1	100,0	a	2 870
Sud	47,5	17,6	3,9	28,5	0,7	1,7	100,0	2,2	1 254
Quintiles de bien-être économique									
Le plus bas	74,5	11,9	1,8	11,7	0,1	0,1	100,0	a	1 508
Second	61,8	15,2	2,2	19,8	0,4	0,6	100,0	a	1 659
Moyen	49,8	19,8	2,7	26,1	0,5	1,1	100,0	a	1 908
Quatrième	36,7	26,3	2,1	28,8	1,6	4,5	100,0	4,2	2 065
Le plus élevé	19,7	20,1	4,5	38,5	1,3	15,9	100,0	7,4	2 273
Ensemble	45,7	19,2	2,8	26,3	0,9	5,2	100,0	2,8	9 414

¹ A achevé avec succès 6 classes du niveau primaire

² A achevé avec succès 7 classes du niveau secondaire

a = Sans objet parce que moins de 50 % des femmes n'ont aucune éducation formelle

Tableau 3.2.2 Niveau d'instruction : Hommes

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années d'instruction achevées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Plus haut niveau d'instruction atteint						Total	Nombre médian d'années complétées	Effectif d'hommes
	Aucun niveau	Primaire incomplet	Primaire complet ¹	Secondaire incomplet	Secondaire complet ²	Supérieur			
Groupe d'âges									
15-24	28,1	20,4	2,2	43,8	2,2	3,2	100,0	5,3	1 465
15-19	26,4	22,6	2,6	47,6	0,5	0,2	100,0	5,1	861
20-24	30,6	17,2	1,7	38,5	4,5	7,5	100,0	5,7	604
25-29	35,4	22,1	0,7	22,1	2,2	17,5	100,0	4,3	469
30-34	36,0	30,4	1,7	19,8	0,8	11,3	100,0	3,7	452
35-39	52,5	23,1	0,5	11,5	0,7	11,7	100,0	a	405
40-44	45,4	27,7	3,9	18,1	0,8	4,1	100,0	2,4	351
45-49	56,2	25,0	1,5	12,2	0,6	4,4	100,0	a	245
Résidence									
Urbain	21,6	26,4	2,0	35,3	2,1	12,5	100,0	5,5	1 659
Rural	51,6	20,5	1,7	22,5	1,0	2,7	100,0	a	1 728
Région									
Nord	45,6	25,9	0,0	25,2	0,2	3,1	100,0	1,2	553
Ouest	21,0	26,8	2,3	33,7	2,4	13,6	100,0	5,6	1 340
Centre	57,5	16,5	2,5	19,8	1,3	2,3	100,0	a	971
Sud	30,1	24,7	1,4	36,6	1,2	5,9	100,0	4,6	523
Quintiles de bien-être économique									
Le plus bas	61,0	19,0	1,5	17,0	0,2	1,2	100,0	a	588
Second	50,2	23,1	2,3	22,2	0,6	1,7	100,0	a	611
Moyen	39,6	25,3	3,2	27,0	1,3	3,6	100,0	3,2	680
Quatrième	28,1	27,1	1,4	32,7	1,7	9,0	100,0	4,7	812
Le plus élevé	12,5	21,1	1,0	41,8	3,6	19,9	100,0	8,0	696
Ensemble 15-49	36,9	23,4	1,9	28,8	1,6	7,5	100,0	4,2	3 387
50-59	55,0	14,6	2,9	18,4	1,0	8,1	100,0	a	375
Total 15-59	38,7	22,5	2,0	27,8	1,5	7,5	100,0	4,1	3 762

¹ A achevé avec succès 6 classes du niveau primaire.

² A achevé avec succès 7 classes du niveau secondaire.

a = Sans objet parce que moins de 50 % des hommes n'ont aucune éducation formelle.

Tableau 3.3.1 Alphabétisation : Femmes

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans par niveau d'instruction atteint et niveau d'alphabétisation et pourcentage de femmes alphabétisées selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Pas d'instruction ou niveau primaire					Total	Pourcentage alphabétisé ¹	Effectif de femmes
	Secondaire ou supérieur	Peut lire une phrase entière	Peut lire une partie de phrase	Ne peut pas lire	Pas de carte dans la langue de l'enquêtée			
Groupe d'âges								
15-24	4,9	53,7	6,9	34,1	0,4	100,0	65,5	3 742
15-19	0,2	60,0	7,6	31,9	0,3	100,0	67,8	2 056
20-24	10,6	46,0	6,1	36,9	0,4	100,0	62,7	1 686
25-29	8,6	30,0	9,6	51,4	0,3	100,0	48,3	1 591
30-34	5,6	18,7	9,5	65,8	0,4	100,0	33,9	1 387
35-39	3,8	21,1	10,3	64,6	0,3	100,0	35,1	1 153
40-44	2,0	22,5	6,4	69,0	0,1	100,0	31,0	868
45-49	3,9	22,7	6,8	66,6	0,0	100,0	33,4	673
Résidence								
Urbain	9,9	47,1	8,5	34,1	0,3	100,0	65,6	4 518
Rural	0,8	24,7	7,7	66,5	0,3	100,0	33,2	4 896
Région								
Nord	1,1	27,7	10,6	60,6	0,0	100,0	39,4	1 565
Ouest	11,2	47,1	7,4	33,9	0,5	100,0	65,6	3 725
Centre	1,1	24,4	7,9	66,4	0,2	100,0	33,3	2 870
Sud	1,7	36,1	7,7	54,4	0,0	100,0	45,6	1 254
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	0,1	15,1	7,1	77,5	0,1	100,0	22,3	1 508
Second	0,6	25,2	7,7	66,4	0,1	100,0	33,5	1 659
Moyen	1,1	33,7	9,7	55,2	0,4	100,0	44,4	1 908
Quatrième	4,5	41,7	9,8	43,6	0,3	100,0	56,1	2 065
Le plus élevé	15,9	52,2	6,3	25,3	0,4	100,0	74,4	2 273
Ensemble	5,2	35,5	8,1	51,0	0,3	100,0	48,7	9 414

¹ C'est-à-dire les femmes qui ont fréquenté l'école au niveau supérieur et celles qui peuvent lire une phrase entière ou une partie de phrase

Tableau 3.3.2 Alphabétisation : Hommes

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans par niveau d'instruction atteint et niveau d'alphabétisation et pourcentage d'hommes alphabétisés selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Pas d'instruction ou niveau primaire					Total	Pourcentage alphabétisé ¹	Effectif d'hommes
	Secondaire ou supérieur	Peut lire une phrase entière	Peut lire une partie de phrase	Ne peut pas lire	Aveugle/malvoyante			
Groupe d'âges								
15-24	3,2	55,9	7,1	33,3	0,3	100,0	66,3	1 465
15-19	0,2	59,6	5,7	34,3	0,1	100,0	65,6	861
20-24	7,5	50,7	9,2	32,0	0,7	100,0	67,4	604
25-29	17,5	33,0	7,6	41,8	0,0	100,0	58,2	469
30-34	11,3	33,8	12,4	42,6	0,0	100,0	57,4	452
35-39	11,7	27,8	4,6	56,0	0,0	100,0	44,0	405
40-44	4,1	37,1	10,7	48,1	0,0	100,0	51,9	351
45-49	4,4	32,4	11,9	51,3	0,0	100,0	48,7	245
Résidence								
Urbain	12,5	52,0	9,8	25,5	0,2	100,0	74,2	1 659
Rural	2,7	34,0	6,9	56,4	0,1	100,0	43,6	1 728
Région								
Nord	3,1	36,2	7,2	53,3	0,2	100,0	46,5	553
Ouest	13,6	51,5	9,9	24,7	0,3	100,0	75,0	1 340
Centre	2,3	32,4	7,9	57,4	0,0	100,0	42,6	971
Sud	5,9	46,8	6,3	41,0	0,0	100,0	59,0	523
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	1,2	25,0	5,5	68,3	0,0	100,0	31,7	588
Second	1,7	35,0	8,4	55,0	0,0	100,0	45,0	611
Moyen	3,6	42,4	8,7	45,2	0,2	100,0	54,7	680
Quatrième	9,0	50,2	9,0	31,8	0,0	100,0	68,2	812
Le plus élevé	19,9	56,4	9,5	13,7	0,6	100,0	85,7	696
Ensemble 15-49	7,5	42,8	8,3	41,3	0,1	100,0	58,6	3 387
50-59	8,1	33,1	6,8	51,9	0,1	100,0	48,0	375
Ensemble 15-59	7,5	41,8	8,2	42,3	0,1	100,0	57,5	3 762

¹ C'est-à-dire les hommes qui ont fréquenté l'école au niveau supérieur et ceux qui peuvent lire une phrase entière ou une partie de phrase.

Tableau 3.4.1 Exposition aux médias : Femmes

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui sont exposées à certains médias, au moins, une fois par semaine, selon certaines caractéristiques sociodémographiques Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Lit un journal, au moins, une fois par semaine	Regarde la télévision, au moins, une fois par semaine	Écoute la radio, au moins, une fois par semaine	Les trois médias, au moins, une fois par semaine	Aucun média, au moins, une fois par semaine	Effectif de femmes
Groupe d'âges						
15-19	11,7	69,3	36,8	3,7	22,7	2 056
20-24	21,4	69,9	42,8	7,9	20,1	1 686
25-29	17,4	69,2	50,7	10,6	19,8	1 591
30-34	9,0	66,5	50,5	6,4	21,9	1 387
35-39	11,8	64,2	55,3	7,6	20,2	1 153
40-44	8,4	60,0	50,3	4,0	25,1	868
45-49	8,6	65,0	58,0	7,1	20,3	673
Résidence						
Urbain	24,0	85,7	49,3	11,9	9,4	4 518
Rural	3,8	50,1	45,4	2,0	32,4	4 896
Région						
Nord	5,3	61,0	48,2	2,3	25,1	1 565
Ouest	26,7	85,4	50,0	13,2	7,9	3 725
Centre	3,5	59,1	47,7	1,9	26,2	2 870
Sud	7,3	39,3	37,1	4,3	45,8	1 254
Niveau d'instruction						
Pas d'instruction	0,2	53,5	45,8	0,2	30,3	4 304
Primaire	9,6	76,2	49,2	4,9	16,3	2 070
Moyen/secondaire ou plus	35,0	80,4	48,1	17,4	12,2	3 040
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	1,4	14,9	38,8	0,6	55,3	1 508
Second	2,7	40,0	43,8	1,2	38,4	1 659
Moyen	6,7	79,8	48,6	3,4	15,1	1 908
Quatrième	14,4	87,7	49,5	7,4	8,0	2 065
Le plus élevé	34,2	92,4	52,2	17,2	3,8	2 273
Ensemble	13,5	67,2	47,3	6,8	21,4	9 414

Tableau 3.4.2 Exposition aux médias : Hommes

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui sont exposés à certains médias, au moins, une fois par semaine, selon certaines caractéristiques sociodémographiques Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Lit un journal, au moins, une fois par semaine	Regarde la télévision, au moins, une fois par semaine	Écoute la radio, au moins, une fois par semaine	Les trois médias, au moins, une fois par semaine	Aucun média, au moins, une fois par semaine	Effectif d'hommes
Groupe d'âges						
15-19	1,0	72,5	37,2	0,9	22,9	861
20-24	6,0	73,6	56,1	4,4	18,2	604
25-29	6,3	70,2	67,0	5,1	17,8	469
30-34	9,3	71,0	70,9	7,8	15,2	452
35-39	7,9	69,7	75,4	5,4	14,0	405
40-44	14,4	74,8	75,3	11,0	13,0	351
45-49	11,5	65,8	76,0	9,2	15,9	245
Résidence						
Urbain	12,6	88,8	68,7	9,6	6,5	1 659
Rural	1,1	55,1	52,6	1,0	28,5	1 728
Région						
Nord	4,5	70,5	59,1	3,2	15,3	553
Ouest	13,7	91,9	74,6	10,7	2,8	1 340
Centre	1,6	63,4	64,5	1,2	17,6	971
Sud	0,7	35,9	18,4	0,6	58,8	523
Niveau d'instruction						
Pas d'instruction	0,3	56,1	61,4	0,3	25,3	1 250
Primaire	6,1	77,5	60,6	4,7	15,8	855
Moyen/secondaire ou plus	13,3	82,7	59,6	10,4	11,7	1 282
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	0,0	21,1	39,2	0,0	53,9	588
Second	1,0	53,3	55,0	1,0	26,6	611
Moyen	2,2	85,2	60,6	2,0	9,6	680
Quatrième	11,0	91,1	73,6	8,3	4,3	812
Le plus élevé	16,9	94,1	68,0	12,9	2,9	696
Ensemble 15-49	6,7	71,6	60,5	5,2	17,7	3 387
50-59	13,5	63,1	72,3	11,1	17,2	375
Ensemble 15-59	7,4	70,7	61,7	5,8	17,7	3 762

Tableau 3.5.1 Utilisation de l'internet : Femmes

Pourcentage des femmes de 15-49 ans qui ont déjà utilisé l'internet et qui l'ont utilisé au cours des 12 derniers mois ; parmi les femmes ayant utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois, répartition (en%) par fréquence d'utilisation au cours du mois dernier, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	A déjà utilisé l'internet	A utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois	Effectif de femmes	Parmi les femmes ayant utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois, pourcentage qui, au cours du mois dernier, l'ont utilisé :				Total	Effectif de femmes
				Presque chaque jour	Au moins une fois par semaine	Moins d'une fois par semaine	N'a pas utilisé du tout		
Groupe d'âges									
15-19	39,7	37,3	2056	31,1	35,5	28,0	5,4	100,0	767
20-24	57,4	55,5	1686	44,0	30,6	23,5	1,9	100,0	935
25-29	49,7	48,4	1591	50,4	24,6	23,1	2,0	100,0	770
30-34	36,5	35,9	1387	52,0	25,5	20,7	1,8	100,0	497
35-39	33,2	33,0	1153	48,6	24,3	22,6	4,6	100,0	380
40-44	25,3	24,5	868	45,2	33,8	20,1	0,9	100,0	213
45-49	22,9	21,7	673	59,6	28,2	12,2	0,0	100,0	146
Résidence									
Urbain	61,4	59,8	4518	50,2	27,8	20,4	1,6	100,0	2 700
Rural	21,7	20,6	4896	30,7	32,7	30,7	6,0	100,0	1 009
Région									
Nord	32,9	31,6	1565	38,4	33,9	23,8	3,9	100,0	495
Ouest	61,6	60,3	3725	50,7	28,0	20,2	1,0	100,0	2 248
Centre	25,1	23,7	2870	34,0	24,9	32,7	8,4	100,0	679
Sud	24,5	22,9	1254	35,8	39,5	23,3	1,4	100,0	287
Niveau d'instruction									
Pas d'instruction	16,6	15,9	4304	33,5	30,8	31,0	4,7	100,0	686
Primaire	41,2	39,9	2070	40,1	29,1	27,2	3,5	100,0	827
Moyen/secondaire ou plus	74,7	72,2	3040	50,2	28,6	19,3	1,9	100,0	2 196
Quintiles de bien-être économique									
Le plus bas	5,4	4,6	1508	18,5	42,7	37,3	1,5	100,0	69
Second	17,4	16,3	1659	20,5	36,8	36,5	6,3	100,0	271
Moyen	35,4	33,6	1908	31,0	31,5	31,3	6,2	100,0	642
Quatrième	55,2	53,1	2065	40,6	29,8	27,0	2,6	100,0	1 096
Le plus élevé	72,6	71,7	2273	58,4	25,9	14,7	1,0	100,0	1 631
Ensemble	40,8	39,4	9414	44,9	29,1	23,2	2,8	100,0	3 709

Tableau 3.5.2 Utilisation de l'internet : Hommes

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont déjà utilisé l'internet et qui l'ont utilisé au cours des 12 derniers mois ; parmi les hommes ayant utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois, répartition (en%) par fréquence d'utilisation au cours du mois dernier, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	A déjà utilisé l'internet	A utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois	Effectif de femmes	Parmi les hommes ayant utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois, pourcentage qui, au cours du mois dernier, l'ont utilisé :				Total	Effectif d'hommes
				Presque chaque jour	Au moins une fois par semaine	Moins d'une fois par semaine	N'a pas utilisé du tout		
Groupe d'âges									
15-19	41,9	41,0	861	23,3	25,3	48,8	2,6	100,0	353
20-24	73,6	71,3	604	31,8	28,2	38,2	1,7	100,0	431
25-29	70,9	70,5	469	43,1	22,4	34,1	0,4	100,0	331
30-34	66,7	64,2	452	32,8	30,9	34,7	1,6	100,0	290
35-39	52,6	51,7	405	41,8	22,2	35,2	0,7	100,0	209
40-44	50,4	49,4	351	37,2	29,8	32,5	0,5	100,0	173
45-49	25,1	22,8	245	41,4	11,6	45,2	1,7	100,0	56
Résidence									
Urbain	73,7	71,9	1 659	37,0	24,7	37,5	0,8	100,0	1 193
Rural	38,6	37,6	1 728	29,4	28,3	39,7	2,5	100,0	650
Région									
Nord	48,3	47,4	553	45,0	29,4	25,3	0,2	100,0	262
Ouest	77,3	74,8	1 340	34,1	23,4	42,1	0,3	100,0	1 002
Centre	43,0	42,2	971	34,4	29,3	31,0	5,3	100,0	410
Sud	32,4	32,1	523	18,6	28,0	53,2	0,2	100,0	168
Niveau d'instruction									
Pas d'instruction	35,3	34,8	1 250	30,9	29,1	38,5	1,5	100,0	435
Primaire	50,6	48,1	855	26,3	23,2	48,2	2,3	100,0	411
Moyen/secondaire ou plus	79,2	77,7	1 282	39,1	25,8	34,1	1,0	100,0	996
Quintiles de bien-être économique									
Le plus bas	15,0	14,8	588	10,6	21,2	66,1	2,1	100,0	87
Second	36,3	35,0	611	22,7	32,8	42,5	1,9	100,0	214
Moyen	55,5	53,2	680	26,2	28,9	42,8	2,1	100,0	362
Quatrième	70,8	69,6	812	39,1	21,7	38,0	1,2	100,0	565
Le plus élevé	90,2	88,4	696	42,1	26,5	30,5	0,9	100,0	615
Ensemble 15-49	55,8	54,4	3 387	34,3	26,0	38,3	1,4	100,0	1 843
50-59	33,0	30,7	375	47,9	20,4	31,7	0,0	100,0	115
Ensemble 15-59	53,5	52,0	3 762	35,1	25,7	37,9	1,3	100,0	1 958

Tableau 3.6.1 Emploi : Femmes

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans en fonction du fait qu'elles travaillent ou non, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	A travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête		N'a pas travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête	Total	Effectif de femmes
	Travaille actuellement ¹	Ne travaille pas actuellement			
Groupe d'âges					
15-19	28,9	8,5	62,6	100,0	2 056
20-24	32,6	9,3	58,1	100,0	1 686
25-29	50,7	10,3	39,1	100,0	1 591
30-34	58,6	9,8	31,6	100,0	1 387
35-39	64,6	11,5	23,9	100,0	1 153
40-44	70,6	8,1	21,4	100,0	868
45-49	77,1	7,5	15,4	100,0	673
État matrimonial					
Célibataire	35,4	9,1	55,4	100,0	2 873
En union	54,1	9,6	36,3	100,0	6 013
En rupture d'union	69,3	8,9	21,8	100,0	528
Nombre d'enfants vivants					
0	35,7	8,6	55,7	100,0	3 527
1-2	48,3	10,5	41,1	100,0	2 450
3-4	60,9	8,8	30,3	100,0	1 717
5+	66,8	10,0	23,3	100,0	1 721
Résidence					
Urbain	48,4	7,6	44,0	100,0	4 518
Rural	50,1	11,0	38,9	100,0	4 896
Région					
Nord	42,5	9,2	48,3	100,0	1 565
Ouest	48,0	9,5	42,5	100,0	3 725
Centre	54,0	9,6	36,4	100,0	2 870
Sud	50,5	8,9	40,6	100,0	1 254
Niveau d'instruction					
Pas d'instruction	56,8	9,0	34,2	100,0	4 304
Primaire	52,1	11,1	36,8	100,0	2 070
Moyen/secondaire ou plus	36,7	8,8	54,5	100,0	3 040
Quintiles de bien-être économique					
Le plus bas	49,7	14,8	35,5	100,0	1 508
Second	50,7	10,1	39,2	100,0	1 659
Moyen	47,1	8,1	44,8	100,0	1 908
Quatrième	50,7	9,1	40,2	100,0	2 065
Le plus élevé	48,4	6,7	44,9	100,0	2 273
Ensemble	49,3	9,4	41,3	100,0	9 414

¹ « Travaille actuellement » signifie que les femmes ont travaillé au cours des sept derniers jours. En outre les femmes qui n'ont pas travaillé au cours des sept derniers jours mais qui ont un emploi régulier et qui étaient absentes parce qu'elles étaient en congé, malades ou en vacances ou pour d'autres raisons sont incluses ici.

Tableau 3.6.2 Emploi : Hommes

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans en fonction du fait qu'ils travaillent ou non, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	A travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête		N'a pas travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête	Manquant/ ne sait pas	Total	Effectif d'hommes
	Travaille actuellement ¹	Ne travaille pas actuellement				
Groupe d'âges						
15-19	59,2	14,5	26,3	0,0	100,0	861
20-24	73,7	13,9	12,4	0,0	100,0	604
25-29	85,0	5,4	9,5	0,0	100,0	469
30-34	98,1	0,4	1,5	0,0	100,0	452
35-39	97,4	0,2	2,3	0,0	100,0	405
40-44	98,8	0,3	0,9	0,0	100,0	351
45-49	99,5	0,0	0,5	0,0	100,0	245
État matrimonial						
Célibataire	70,7	11,5	17,8	0,0	100,0	2 013
En union	98,9	0,5	0,6	0,0	100,0	1 319
En rupture d'union	(99,1)	(0,0)	(0,9)	(0,0)	100,0	55
Nombre d'enfants vivants						
0	72,5	10,8	16,7	0,0	100,0	2 155
1-2	98,8	0,6	0,6	0,0	100,0	536
3-4	99,5	0,5	0,0	0,0	100,0	389
5+	98,7	0,2	1,1	0,0	100,0	306
Résidence						
Urbain	75,6	7,0	17,4	0,0	100,0	1 659
Rural	88,4	7,1	4,5	0,0	100,0	1 728
Région						
Nord	76,4	15,2	8,4	0,0	100,0	553
Ouest	78,4	7,0	14,6	0,0	100,0	1 340
Centre	88,2	4,8	7,0	0,0	100,0	971
Sud	86,6	2,8	10,7	0,0	100,0	523
Niveau d'instruction						
Pas d'instruction	94,4	1,6	4,0	0,0	100,0	1 250
Primaire	91,4	3,6	5,0	0,0	100,0	855
Moyen/secondaire ou plus	64,0	14,6	21,4	0,0	100,0	1 282
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	93,5	3,8	2,7	0,0	100,0	588
Second	91,0	5,3	3,7	0,0	100,0	611
Moyen	83,6	8,6	7,8	0,0	100,0	680
Quatrième	77,0	8,1	14,9	0,0	100,0	812
Le plus élevé	69,4	8,4	22,2	0,0	100,0	696
Ensemble 15-49	82,1	7,0	10,8	0,0	100,0	3 387
50-59	95,2	0,5	4,3	0,0	100,0	375
Ensemble 15-59	83,4	6,4	10,2	0,0	100,0	3 762

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

¹ « Travaille actuellement » signifie que les hommes ont travaillé au cours des sept derniers jours. En outre les hommes qui n'ont pas travaillé au cours des sept derniers jours mais qui ont un emploi régulier et qui étaient absents parce qu'ils étaient en congé, malades ou en vacances ou pour d'autres raisons sont inclus ici.

Tableau 3.7.1 Occupation : Femmes

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans qui ont travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête par type d'occupation, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Emploi qualifié/ encadrement	Employée de bureau	Vente et services	Emploi manuel qualifié	Emploi manuel non qualifié	Employée de maison	Agriculture	Manquant	Total	Effectif de femmes
Groupe d'âges										
15-19	0,9	0,0	24,9	6,3	0,7	24,9	38,1	4,1	100,0	768
20-24	3,2	0,9	36,1	11,0	0,2	15,8	30,3	2,5	100,0	706
25-29	5,9	0,1	42,5	10,4	0,1	10,3	26,8	4,0	100,0	969
30-34	4,6	0,5	51,7	6,9	0,1	8,9	24,7	2,6	100,0	948
35-39	4,1	0,7	54,2	5,3	0,6	7,7	24,0	3,3	100,0	878
40-44	3,0	0,0	56,1	4,9	0,0	8,2	24,5	3,2	100,0	683
45-49	5,1	1,6	57,4	5,1	0,5	7,3	21,3	1,8	100,0	570
État matrimonial										
Célibataire	4,3	1,0	36,7	8,8	0,4	25,4	19,4	3,9	100,0	1 280
En union	3,5	0,1	48,3	6,9	0,3	6,3	31,8	2,9	100,0	3 828
En rupture d'union	6,4	2,4	52,5	6,2	0,1	20,6	8,5	3,4	100,0	413
Nombre d'enfants vivants										
0	5,3	0,9	36,5	8,9	0,6	21,9	22,2	3,7	100,0	1 563
1-2	6,7	1,0	45,6	9,5	0,1	10,8	23,0	3,4	100,0	1 442
3-4	1,8	0,0	53,9	5,9	0,1	7,4	28,3	2,7	100,0	1 197
5+	1,2	0,0	50,1	4,1	0,3	5,0	36,6	2,6	100,0	1 320
Résidence										
Urbain	6,9	1,0	62,7	8,4	0,3	16,4	2,1	2,3	100,0	2 531
Rural	1,4	0,1	31,7	6,3	0,3	7,9	48,4	3,8	100,0	2 991
Région										
Nord	2,7	0,3	43,2	13,5	0,3	6,6	32,7	0,6	100,0	810
Ouest	7,0	1,1	58,8	7,5	0,4	17,7	6,0	1,6	100,0	2 142
Centre	1,7	0,1	40,7	5,7	0,1	8,3	38,2	5,2	100,0	1 825
Sud	1,6	0,0	24,5	3,7	0,4	9,4	55,1	5,2	100,0	745
Niveau d'instruction										
Pas d'instruction	0,2	0,0	42,6	5,9	0,1	8,9	39,0	3,2	100,0	2 831
Primaire	0,5	0,1	54,1	10,0	0,5	16,0	17,7	1,1	100,0	1 308
Moyen/secondaire ou plus	14,8	1,9	44,8	7,6	0,4	13,8	11,8	4,8	100,0	1 383
Quintiles de bien-être économique										
Le plus bas	0,3	0,0	15,2	3,7	0,1	8,2	71,6	0,9	100,0	973
Second	0,4	0,1	26,4	4,0	0,3	9,8	54,7	4,3	100,0	1 009
Moyen	1,4	0,1	53,4	10,2	0,3	9,9	17,6	7,2	100,0	1 053
Quatrième	3,4	0,5	67,3	7,1	0,2	17,5	2,8	1,3	100,0	1 235
Le plus élevé	12,2	1,6	58,1	10,5	0,5	12,3	2,5	2,4	100,0	1 252
Ensemble	3,9	0,5	45,9	7,3	0,3	11,8	27,2	3,1	100,0	5 522

Tableau 3.7.2. Occupation : Hommes

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans qui travaillent au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête par type d'occupation, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Emploi qualifié/encadrement	Employé de bureau	Vente et services	Emploi manuel qualifié	Emploi manuel non qualifié	Employé de maison	Agriculture	Manquant	Total	Effectif d'hommes
Groupe d'âges										
15-19	0,2	0,0	14,1	11,6	10,5	0,0	60,2	3,4	100,0	635
20-24	2,3	1,3	28,6	18,7	6,4	0,3	36,4	5,9	100,0	529
25-29	4,4	2,2	29,3	20,7	2,4	1,0	29,9	9,9	100,0	424
30-34	10,6	1,3	33,1	22,7	1,2	1,2	25,7	4,2	100,0	445
35-39	17,7	0,0	27,4	23,5	0,6	0,2	25,1	5,5	100,0	396
40-44	9,8	0,5	32,8	25,2	0,7	0,9	19,6	10,5	100,0	347
45-49	7,9	3,4	38,2	18,9	0,8	0,0	27,2	3,7	100,0	244
État matrimonial										
Célibataire	2,8	1,1	24,2	20,2	6,9	0,7	40,0	4,2	100,0	1 655
En union	11,8	1,1	30,5	18,6	0,5	0,3	29,2	8,1	100,0	1 311
En rupture d'union	(6,5)	(0,0)	(51,6)	(18,6)	(1,9)	(0,0)	(10,9)	(10,4)	100,0	54
Nombre d'enfants vivants										
0	3,1	1,0	24,6	19,6	6,4	0,7	39,8	4,7	100,0	1 795
1-2	15,9	2,4	28,6	22,0	0,7	0,0	21,2	9,2	100,0	533
3-4	12,1	0,3	36,2	16,0	0,2	0,8	26,1	8,3	100,0	389
5+	5,2	0,0	30,8	18,6	0,8	0,0	39,7	4,8	100,0	303
Résidence										
Urbain	12,0	1,9	36,4	27,5	4,3	1,0	11,3	5,6	100,0	1 369
Rural	2,4	0,4	20,0	12,8	3,9	0,0	54,3	6,3	100,0	1 651
Région										
Nord	2,4	0,5	27,8	18,1	1,7	0,3	45,6	3,7	100,0	507
Ouest	12,5	2,2	31,9	29,4	3,3	1,0	13,6	6,0	100,0	1 144
Centre	3,2	0,3	24,8	12,7	7,5	0,2	42,5	8,8	100,0	903
Sud	4,0	0,3	21,1	9,9	1,8	0,0	59,9	3,0	100,0	467
Niveau d'instruction										
Pas d'instruction	1,1	0,0	28,7	15,9	5,4	0,2	40,7	7,9	100,0	1 200
Primaire	1,7	0,9	28,4	28,3	3,9	0,4	32,2	4,2	100,0	813
Moyen/secondaire ou plus	17,6	2,4	25,1	16,6	2,5	0,9	29,8	5,2	100,0	1 007
Quintiles de bien-être économique										
Le plus bas	0,8	0,0	12,3	5,1	1,8	0,0	76,9	3,0	100,0	572
Second	3,1	0,1	21,8	14,2	5,5	0,0	50,4	4,8	100,0	588
Moyen	3,5	0,3	29,1	24,0	4,6	0,4	27,4	10,6	100,0	627
Quatrième	7,4	1,4	36,6	31,5	5,8	1,3	10,5	5,4	100,0	691
Le plus élevé	20,0	3,6	35,7	19,7	1,9	0,5	12,7	5,8	100,0	541
Ensemble 15-49	6,7	1,1	27,4	19,5	4,1	0,5	34,8	6,0	100,0	3 020
50-59	12,7	0,5	29,5	15,0	1,6	2,0	33,1	5,7	100,0	359
Total 15-59	7,4	1,0	27,6	19,0	3,8	0,6	34,6	6,0	100,0	3 379

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Tableau 3.8 Type d'emploi : Femmes

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans qui travaillent au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête en fonction du type de rémunération, du type d'employeur et de la régularité de l'emploi, selon le secteur d'activité (agricole et non-agricole), Sénégal 2018

Caractéristique de l'emploi	Travail agricole	Travail non agricole	Manquant	Total
Type de revenu				
Argent seulement	18,3	84,9	74,7	66,4
Argent et en nature	21,8	1,5	0,8	7,0
En nature seulement	5,4	0,3	0,0	1,7
Pas rémunérée	54,5	13,4	24,5	24,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Type d'employeur				
Employé par un membre de la famille	60,0	10,3	6,1	23,7
Employé par quelqu'un qui n'est pas membre de la famille	2,5	23,8	28,7	18,2
Travaille à son propre compte	37,4	65,9	65,1	58,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Régularité de l'emploi				
Toute l'année	5,8	76,8	81,8	57,7
Saisonnier	92,1	13,8	13,0	35,1
Occasionnel	2,1	9,3	5,2	7,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes ayant eu un emploi au cours des 12 derniers mois	1 501	3 848	173	5 522

Note : L'ensemble comprend les femmes dont l'information sur le type d'emploi est manquante et qui ne sont pas présentées séparément.

Résultats clés

- **État matrimonial actuel** : Près des deux tiers (64 %) des femmes et 39 % des hommes de 15-49 ans étaient en union au moment de l'enquête.
- **Polygamie** : Parmi les femmes de 15-49 ans actuellement en union, 32 % ont déclaré avoir une coépouse ou plus. Parmi les hommes de 15-59 ans actuellement en union, 15 % ont déclaré avoir, au moins, deux épouses.
- **Âge à la première union** : L'âge médian à la première union pour les femmes de 30-49 ans est estimé à 20 ans contre 26,6 ans parmi les hommes du même groupe d'âges.
- **Âge aux premiers rapports sexuels** : L'âge médian aux premiers rapports sexuels est plus précoce chez les femmes que chez les hommes de 25-49 ans : 19,8 ans contre 24,5 ans.

L'union et l'activité sexuelle permettent de déterminer dans quelle mesure les femmes sont exposées au risque de grossesse. Ce sont donc des déterminants importants du niveau de la fécondité. En outre, le calendrier et les conditions dans lesquelles ont lieu l'union et l'activité sexuelle ont des conséquences importantes sur la vie des femmes et des hommes.

4.1 ÉTAT MATRIMONIAL

Actuellement en union


Les femmes et les hommes qui ont déclaré qu'ils étaient mariés ou qu'ils vivaient ensemble avec un partenaire comme s'ils étaient mariés au moment de l'enquête.

Échantillon : Femmes de 15-49 ans et hommes de 15-59 ans.

Au Sénégal, environ deux femmes de 15-49 ans sur trois (64 %) et un peu moins de deux hommes de 15-49 ans sur cinq (39 %) étaient en union au moment de l'enquête. Parmi ceux-ci, la quasi-totalité était mariée et moins d'un pour cent vivait en union consensuelle. Le célibat concernait 30 % des femmes et 59 % des hommes de 15-49 ans. Cinq pour cent des femmes et 2 % des hommes étaient divorcés ou séparés. Un pour cent des femmes et moins de 1 % des hommes étaient veufs (**Tableau 4.1** et **Graphique 4.1**).

Graphique 4.1 État matrimonial


Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans et des hommes de 15-59 ans



Les résultats montrent également que les proportions de femmes célibataires diminuent rapidement avec l'âge, passant de 79 % à 15-19 ans à 3 % à 40-44 ans et 4 % chez les 45-49 ans. À l'opposé, le pourcentage de femmes mariées augmente avec l'âge. Il passe de 21 % parmi les femmes âgées de 15-19 ans à 88 % dans le groupe d'âges 40-44 ans (**Graphique 4.2**). On note le même type de tendance chez les hommes.

Graphique 4.2 Proportion de femmes et d'hommes célibataires par âge

Pourcentage de femmes et d'hommes célibataires au moment de l'enquête par âge



Tendances : Dans l'ensemble, on ne constate pas de modification importante de de l'état matrimonial au Sénégal entre 2010-2011 et 2018.

4.2 POLYGAMIE

Polygamie

Les femmes qui ont déclaré que leur mari ou partenaire a d'autres épouses sont considérées comme vivant en union polygame.


Échantillon : Femmes de 15-49 ans et hommes de 15-59 ans actuellement en union.

Les données de l'enquête ont permis de distinguer les femmes qui vivaient en union monogamique de celles qui vivaient en union polygamique. Malgré la prédominance des unions monogamiques (68 % des femmes en union et 90 % des hommes de 15-49 ans en union), la polygamie est une pratique assez répandue au Sénégal puisqu'elle concerne 32 % des femmes de 15-49 ans en union et 10 % des hommes de ce même groupe d'âges (**Tableau 4.2.1** et **Tableau 4.2.2**).

Tendances : Entre 2012-2013 et 2018, le pourcentage de femmes vivant en union polygamique est resté pratiquement stable autour de 32 % (**Graphique 4.3**). Chez les hommes aussi, la variation est assez faible (de 12 % en 2010-2011 à 10 % en 2018).

Graphique 4.3 Tendances de la polygamie

Parmi les femmes de 15-49 ans en union, pourcentage en union polygame



La pratique de la polygamie varie de manière importante selon certaines caractéristiques socioéconomiques.

Variation par caractéristique

- La proportion de femmes en union polygamique augmente régulièrement avec l'âge, passant de 13 % parmi celles de 15-19 ans à 51 % parmi celles de 45-49 ans. Chez les hommes, la polygamie augmente aussi avec l'âge, passant de 3 % parmi ceux de 25-29 ans à 19 % parmi ceux de 45-49 ans.
- La proportion de femmes en union polygamique est plus importante en milieu rural (37 %) qu'en milieu urbain (24 %).
- La proportion de femmes en union polygamique varie entre les zones : c'est dans la zone du Centre que l'on note le pourcentage le plus élevé de femmes vivant en union polygamique (40 %) contre 22 % dans l'Ouest.
- La proportion de femmes en union polygamique diminue avec le niveau d'instruction, passant de 39 % parmi celles n'ayant aucun niveau d'instruction à 17 % parmi celles ayant le niveau moyen/secondaire ou plus.
- La proportion de femmes en union polygamique diminue du quintile de bien être le plus bas au plus élevé, passant de 38 % à 25 %.

4.3 ÂGE À LA PREMIÈRE UNION

Âge médian à la première union

Âge auquel la moitié des enquêtés sont entrés en première union.

Échantillon : Femmes de 20-49 ans et de 25-49 ans et hommes de 30-59 ans.

Au Sénégal, les femmes entrent en union très tôt. L'âge médian à la première union est de 20,4 ans chez les femmes âgées de 25-49 ans. Près du tiers des femmes de 25-49 ans (32 %) avait déjà contracté une première union avant d'atteindre 18 ans exacts. Parmi les hommes de 30-49 ans, cet âge médian à la première union est estimé à 26,6 ans contre 20,3 ans parmi les femmes du même groupe d'âges (**Tableau 4.3**).


Tendances : L'âge médian à la première union chez les femmes de 25-49 ans a légèrement augmenté entre 2010-2011 et 2018. En effet, il est passé de 19,3 ans à 20,4 ans.

Variation par caractéristique

- Le milieu de résidence influence beaucoup sur l'âge à la première union. Les femmes du milieu urbain entrent en première union plus tard que celles du milieu rural (âge médian de 22,5 ans contre 18,8 ans parmi les femmes de 25-49 ans) (**Graphique 4.4** et **Tableau 4.4**).
- L'âge médian à la première union chez les femmes de 25-49 ans est beaucoup plus élevé dans la zone Ouest avec un âge médian de 22,6 ans contre 18,8 ans dans le Sud.
- Le niveau d'instruction influence aussi l'âge médian à la première union des femmes. Ainsi, parmi celles de 25-49 ans, l'âge médian passe de 18,7 ans chez celles sans niveau d'instruction, à 21,3 ans chez celles ayant le niveau primaire.
- L'âge médian à la première union augmente avec le niveau de bien-être économique, variant de 17,6 ans parmi les femmes dont le ménage est classé dans le quintile le plus bas à 24,3 ans parmi celles dont le ménage est classé dans le quintile le plus élevé (**Tableau 4.4**).

Graphique 4.4 Âge médian des femmes à la première union par milieu de résidence

Âge médian à la première union parmi les femmes de 25-49 ans



4.4 ÂGE AUX PREMIERS RAPPORTS SEXUELS

Âge médian aux premiers rapports sexuels

Âge auquel la moitié des enquêtés ont eu leurs premiers rapports sexuels.


Échantillon : Femmes de 20-49 ans et de 25-49 ans et hommes 25-59.

Au Sénégal, l'âge médian aux premiers rapports sexuels chez les femmes âgées de 25-49 ans est de 19,8 ans, soit légèrement inférieur à celui de l'âge médian d'entrée en première union (20,4 ans). Ainsi chez les femmes, les premiers rapports sexuels ne se passent toujours pas dans le cadre de l'union. Chez les hommes de 25-49 ans, cet âge médian, est estimé à 24,5 ans et il est donc plus élevé que chez les femmes (19,8 ans).

Tendances : L'âge médian aux premiers rapports sexuels des femmes de 25-49 ans a légèrement augmenté entre 2010-2011 et 2018. En effet, estimé à 18,8 ans en 2010-2011, il est passé à 19,8 ans en 2018. On note la même tendance à la hausse chez les hommes, l'âge médian aux premiers rapports sexuels étant passé de 22,7 ans à 24,5 ans (**Graphique 4.5**).

Graphique 4.5 Premier rapports sexuels avant d'atteindre l'âge de 18 ans

Pourcentage ayant eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre l'âge de 18 ans



Variations par caractéristique

- Les résultats selon le milieu de résidence montrent que les femmes de 25-49 ans vivant en milieu urbain ont leurs premiers

rappports sexuels à un âge plus tardif que celui des femmes du milieu rural (21,5 ans contre 18,5 ans). Chez les hommes de 25-59 ans, il n'y a pratiquement pas d'écart entre milieux de résidence (24,6 en urbain contre 24,5 en rural) (**Tableau 4.6**).

- Les femmes de la région du Sud débutent plus tôt leur vie sexuelle (âge médian 17,8 ans). À l'inverse, c'est dans la région de l'Ouest que les femmes ont eu leur premier rapport le plus tard (âge médian égal à 21,6 ans).
- L'âge médian aux premiers rapports sexuels chez les femmes de 25-49 ans augmente avec le niveau d'instruction : 18,5 ans parmi les femmes sans niveau d'instruction contre 20,6 ans parmi celles ayant le niveau primaire et 24,4 ans parmi celles ayant le niveau moyen/secondaire ou plus. Les femmes ayant un niveau moyen/secondaire ou plus ont donc leurs premiers rapports sexuels un peu moins de six sept ans plus tard que les femmes n'ayant aucun niveau d'instruction. Chez les hommes de 25-59 ans, l'âge médian aux premiers rapports sexuels est un peu tardif chez ceux ayant le niveau primaire par rapport à ceux ayant le niveau moyen/secondaire ou plus (23,9 ans contre 22,7 ans).
- Chez les femmes de 25-49 ans, l'âge médian varie sous l'influence du niveau de bien-être économique. C'est dans le quintile le plus bas qu'on note l'âge aux premiers rapports sexuels le plus précoce (17,4 ans) et dans le plus élevé, que l'on note le plus tardif (23,4 ans). Chez les hommes, par contre, on ne note pas d'écarts importants entre les quintiles.

4.5 ACTIVITÉ SEXUELLE

4.5.1 Activité sexuelle récente

La fréquence des rapports sexuels est également un facteur important de l'exposition au risque de grossesse. Dans l'ensemble, 45 % des femmes de 15-49 ans étaient sexuellement actives au moment de l'enquête, car elles ont déclaré avoir eu, au moins une fois, des rapports sexuels durant les quatre semaines ayant précédé l'enquête. Près de deux femmes sur dix (18 %) avaient eu leurs derniers rapports sexuels dans la dernière année avant l'enquête et pour 9 % des femmes, les derniers rapports sexuels avaient eu lieu il y a plus d'un an. À l'opposé, une femme sur quatre (28 %) n'avait jamais eu de rapports sexuels (**Tableau 4.7.1**). Chez les hommes de 15-49 ans, le **Tableau 4.7.2** montre que 33 % avaient eu leurs derniers rapports sexuels dans les quatre dernières semaines. De plus, 15 % avaient eu leurs derniers rapports sexuels dans la dernière année avant l'enquête, et pour 9 % des hommes, les derniers rapports sexuels avaient eu lieu il y a plus d'un an.

Variations par caractéristique

- La proportion de femmes sexuellement actives au moment de l'enquête augmente avec l'âge ; elle passe d'un minimum de 14 % à 15-19 ans (âge auquel 76 % n'ont jamais eu de rapports sexuels) à un maximum de 68 % à 40-44 ans. Le pourcentage d'hommes sexuellement actifs augmente également avec l'âge, passant de 2 % à 15-19 ans à 73 % à 45-49 ans.
- La proportion des femmes sexuellement actives varie selon l'état matrimonial. Elle est très faible chez les femmes célibataires (2 %) et chez celles en rupture d'union (3 %). Par contre, sept femmes en union sur dix sont sexuellement actives et 23 % ont eu leurs derniers rapports sexuels au cours de la dernière année avant l'enquête. L'activité sexuelle récente est également plus élevée chez les hommes en union (78 %) que chez les autres.
- La durée de l'union semble influencer sur l'activité sexuelle récente chez les femmes. Parmi les femmes ayant été en union une seule fois, la proportion de femmes sexuellement actives varie de 63 % chez celles dont la durée de l'union se situe entre 0 et 4 ans, à 80 % chez celles en union depuis 25 ans ou plus.

- La proportion de femmes sexuellement actives est plus élevée en milieu rural (51 %) qu'en milieu urbain (39 %). L'activité sexuelle récente des hommes est plus élevée en milieu rural (35 %) qu'en milieu urbain (30 %).

4.5.2 Partenaires sexuels multiples

Le pourcentage de femmes ayant déclaré avoir eu, au cours des douze derniers mois, au moins deux partenaires sexuels est extrêmement faible (0,3%). Le pourcentage de femmes ayant eu, au cours des douze derniers mois, des rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient est plus élevé mais reste faible (3 %) (**Tableaux 4.8.1**). Chez les hommes, le pourcentage de ceux qui ont eu un partenaire non régulier est plus élevé que celui de ceux qui ont au moins deux partenaires sexuels au des 12 derniers mois (respectivement 10 % et 7 %) (**Tableaux 4.8.2**).

Le pourcentage de femmes et d'hommes ayant utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels avec un partenaire non régulier est de respectivement 38 % et 68 %.

Variations par caractéristique

- Chez les femmes, les rapports sexuels avec un partenaire non régulier sont plus fréquents chez les jeunes de 20-24 ans et 25-29 ans (4 % contre 2-3 % dans les autres groupes d'âges).
- Chez les femmes comme chez les hommes, les rapports sexuels avec un partenaire non régulier au cours des douze derniers mois sont plus fréquents en milieu urbain qu'en milieu rural, 5 % des femmes en milieu urbain contre 2 % en milieu rural ayant eu des rapports sexuels avec un partenaire qui n'est ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivent. Chez les hommes, ces pourcentages sont de 12 % contre 8 %.
- Les résultats selon les régions montrent que le pourcentage de femmes ayant eu, au cours des douze derniers mois, des rapports sexuels avec un partenaire non régulier est plus élevé dans les régions du Sud et de l'ouest (respectivement 6 % et 5 %) que dans les autres (moins d'un pour cent). Chez les hommes, c'est aussi dans les régions du sud et de l'ouest (respectivement 14 % et 13 %) que ce pourcentage est le plus élevé.
- L'utilisation du condom parmi les femmes ayant eu des rapports sexuels avec un partenaire non régulier est plus fréquente parmi celles de 20-24 ans (41 %), en milieu urbain qu'en milieu rural (39 % contre 35 %).
- Chez les hommes, c'est parmi ceux de 25-29 ans et 30-39 ans (78 % et 79 %), en milieu urbain (77% contre 56 % en milieu rural), parmi ceux ayant le niveau d'instruction moyen/secondaire ou plus (76 % contre 46 % parmi ceux sans niveau d'instruction) que l'utilisation du condom au cours des derniers rapports sexuels avec un partenaire non régulier est la plus fréquente. On note aussi que l'utilisation du condom au cours de rapports sexuels avec un partenaire non régulier augmente du quintile le plus bas au quatrième quintile, passant de 44% à 74 %.

4.5.3 Rapports sexuels payants

Le fait de payer en échange de rapports sexuels crée une situation d'inégalité entre les partenaires pour négocier des rapports sexuels plus sûrs.

Le **Tableau 4.9** montre que 2 % des hommes de 15-49 ans ont déclaré avoir déjà eu des rapports sexuels payants. Au cours des 12 derniers mois, ce pourcentage est de 0,2 %.

Tendances : Entre 2005 et 2014, le pourcentage d'hommes de 15-49 ans ayant déclaré avoir eu des rapports sexuels payants a augmenté, de 1 à 4 %, puis a diminué pour concerner 2 % des hommes en 2018.

Variations par caractéristique

- Le pourcentage d'hommes de 15-49 ans ayant déjà eu des rapports sexuels payants augmente avec l'âge. Ces rapports payants sont plus fréquents entre 40-49 ans (5 %) contre moins d'un pour cent à 15-24 ans. C'est à 50-59 ans que les rapports sexuels payants sont les plus fréquents (6 %).

4.5.4 Premiers rapports sexuels

Les jeunes qui ont leurs premiers rapports sexuels à un âge précoce courent, en général, un risque plus élevé de tomber enceintes ou de contracter une IST que les jeunes qui commencent leur vie sexuelle plus tard. L'utilisation régulière du condom contribue à réduire de tels risques.

En 2018, le pourcentage de jeunes femmes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avant 15 ans est presque deux fois plus élevé que chez les hommes (7 % contre 4 %). Le pourcentage de jeunes femmes et de jeunes hommes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avant 18 ans est élevé (respectivement 30 % et 16 %) (**Tableau 4.10**).

Tendances : Depuis 2012-2013, le pourcentage de jeunes femmes ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans est resté stable, autour de 8 %. On note la même tendance chez les hommes, le pourcentage tournant autour de 5 %. Concernant les rapports sexuels avant l'âge de 18 ans, on ne note pas de changements importants chez les femmes. Par contre, chez les hommes, on note entre 2014 et 2017, une légère augmentation, le pourcentage étant passé de 14 % à 17 % et en 2018 à 16 %.

Variations par caractéristique

- Le pourcentage de femmes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avant 15 ans et avant 18 ans est plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain. En effet, chez les jeunes femmes de 15-24 ans, les rapports sexuels avant 15 ans sont trois fois plus fréquents en milieu rural qu'en milieu urbain (9 % contre 3 %) et ceux avant 18 ans 2,5 fois plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain (41 % contre 17 %) (**Tableau 4.10**).
- Les rapports sexuels chez les jeunes femmes de 15-24 ans avant 15 ans et avant 18 ans diminuent avec le niveau d'instruction.

4.5.5 Rapports sexuels pré-nuptiaux

En 2018, 93 % des jeunes femmes et 83 % des jeunes hommes célibataires de 15-24 ans n'ont jamais eu de rapports sexuels. Le pourcentage diminue en fonction de l'âge. Il n'y a pas une grande différence entre le milieu urbain et le milieu rural chez les jeunes femmes (93 % contre 94 %) et chez les jeunes hommes (80 % contre 86 %) (**Tableau 4.11**).

4.5.6 Partenaires sexuels multiples chez les jeunes de 15-24 ans

Les rapports sexuels avec deux partenaires ou plus au cours des douze derniers mois ne sont pas très fréquents chez les jeunes de 15-24 ans (moins de 1 % chez les femmes et 2 % chez les hommes (**Tableau 4.12.1** et **4.12.2**). Parmi les femmes, 3% des femmes ont eu, au cours des douze derniers mois, des rapports sexuels avec un partenaire non régulier. Parmi les hommes, ce pourcentage est plus élevé (10 %). En outre, parmi les femmes ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, 35 % ont des rapports sexuels avec un partenaire plus âgé qu'elle d'au moins dix ans.

Parmi les jeunes hommes ayant eu au cours des 12 derniers mois, des rapports sexuels avec un partenaire non régulier, 65 % ont utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels.

Variations par caractéristique

- Le pourcentage d'hommes ayant eu, au cours des douze derniers mois, des rapports sexuels avec un partenaire non régulier est plus de quatre fois plus élevé parmi ceux ayant le niveau primaire que parmi ceux sans niveau d'instruction (16 % contre 3%).
- Le pourcentage de femmes ayant eu, au cours des 12 derniers mois, des rapports sexuels avec un partenaire non régulier est plus élevé parmi les célibataires (5 %), celles du milieu urbain (4 %) et celles ayant le niveau primaire (6 %).
- L'utilisation du condom lors des rapports sexuels avec un partenaire non régulier est plus fréquente chez les hommes du milieu urbain (76 %) et parmi ceux ayant le niveau d'instruction moyen/secondaire ou plus (69 %).

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur l'union et l'activité sexuelle, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 4.1** **État matrimonial actuel**
- **Tableau 4.2.1** **Nombre de coépouses**
- **Tableau 4.2.2** **Nombre d'épouses des hommes**
- **Tableau 4.3** **Âge à la première union**
- **Tableau 4.4** **Âge médian à la première union selon certaines caractéristiques**
- **Tableau 4.5** **Âge aux premiers rapports sexuels**
- **Tableau 4.6** **Âge médian aux premiers rapports sexuels selon certaines caractéristiques**
- **Tableau 4.7.1** **Activité sexuelle récente : Femmes**
- **Tableau 4.7.2** **Activité sexuelle récente : Hommes**
- **Tableau 4.8.1** **Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois : Femmes**
- **Tableau 4.8.2** **Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois : Hommes**
- **Tableau 4.9** **Rapports sexuels payants et utilisation du condom au cours des derniers rapports sexuels payants**
- **Tableau 4.10** **Âge aux premiers rapports sexuels parmi les jeunes**
- **Tableau 4.11** **Rapports sexuels pré-nuptiaux parmi les jeunes**
- **Tableau 4.12.1** **Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des douze derniers mois parmi les jeunes : Femmes**
- **Tableau 4.12.2** **Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois parmi les jeunes : Hommes**

Tableau 4.1 État matrimonial actuel

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans par état matrimonial actuel, selon l'âge, Sénégal 2018

Groupe d'âges	État matrimonial						Total	Pourcentage d'enquêtés actuellement en union	Effectif d'enquêtés
	Célibataire	Marié	Vivant ensemble	Divorcé	Séparé	Veuf			
FEMMES									
15-19	78,5	20,7	0,0	0,6	0,1	0,0	100,0	20,8	2 056
20-24	45,8	49,9	0,4	3,0	0,7	0,4	100,0	50,2	1 686
25-29	15,5	78,7	0,3	4,7	0,5	0,3	100,0	79,0	1 591
30-34	9,4	82,5	0,2	6,4	0,5	1,0	100,0	82,7	1 387
35-39	5,3	85,9	0,2	6,9	0,1	1,6	100,0	86,1	1 153
40-44	2,6	88,2	0,3	5,4	0,6	3,0	100,0	88,5	868
45-49	4,0	85,2	0,1	7,2	0,1	3,5	100,0	85,2	673
Ensemble 15-49	30,5	63,7	0,2	4,3	0,4	1,0	100,0	63,9	9 414
HOMMES									
15-19	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	861
20-24	94,3	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	5,7	604
25-29	65,3	33,7	0,4	0,6	0,0	0,0	100,0	34,1	469
30-34	37,3	60,1	0,0	2,6	0,0	0,0	100,0	60,1	452
35-39	14,9	81,2	1,0	2,9	0,0	0,0	100,0	82,2	405
40-44	7,9	86,3	0,0	4,7	0,1	0,9	100,0	86,3	351
45-49	8,1	88,6	0,0	2,8	0,0	0,5	100,0	88,6	245
Ensemble 15-49	59,4	38,8	0,2	1,5	0,0	0,1	100,0	38,9	3 387
50-59	1,3	93,0	0,1	4,8	0,2	0,7	100,0	93,1	375
Total 15-59	53,6	44,2	0,2	1,8	0,0	0,2	100,0	44,3	3 762

Tableau 4.2.1 Nombre de coépouses

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans, actuellement en union par nombre de coépouses et pourcentage de femmes actuellement en union ayant une coépouse ou plus, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Nombre de coépouses				Total	Pourcentage ayant une coépouse ou plus ¹	Effectif de femmes
	0	1	2+	Ne sait pas			
Groupe d'âges							
15-19	86,5	12,4	1,0	0,1	100,0	13,4	427
20-24	85,8	12,1	1,9	0,2	100,0	14,0	847
25-29	80,1	17,6	2,2	0,0	100,0	19,9	1 256
30-34	66,0	28,8	5,3	0,0	100,0	34,0	1 147
35-39	58,4	33,7	7,9	0,0	100,0	41,6	993
40-44	51,3	36,0	12,7	0,0	100,0	48,7	768
45-49	48,7	37,3	13,9	0,2	100,0	51,2	574
Résidence							
Urbain	76,1	20,2	3,7	0,0	100,0	23,9	2 460
Rural	63,0	29,2	7,7	0,1	100,0	36,9	3 553
Région							
Nord	69,2	25,9	4,8	0,0	100,0	30,8	1 076
Ouest	77,8	18,7	3,5	0,0	100,0	22,2	2 007
Centre	59,8	31,1	9,0	0,1	100,0	40,1	2 092
Sud	66,4	27,1	6,4	0,1	100,0	33,6	838
Niveau d'instruction							
Pas d'instruction	60,6	31,3	8,1	0,1	100,0	39,4	3 605
Primaire	77,7	18,2	4,1	0,0	100,0	22,3	1 323
Moyen/secondaire ou plus	83,0	15,3	1,6	0,0	100,0	16,9	1 085
Quintiles de bien-être économique							
Le plus bas	62,2	31,0	6,8	0,0	100,0	37,8	1 213
Second	66,0	28,4	5,5	0,0	100,0	34,0	1 200
Moyen	68,5	23,8	7,4	0,2	100,0	31,3	1 215
Quatrième	70,4	23,9	5,6	0,0	100,0	29,6	1 225
Le plus élevé	75,0	20,1	4,9	0,0	100,0	25,0	1 159
Ensemble	68,4	25,5	6,1	0,1	100,0	31,6	6 013

¹ Non compris les femmes qui ont répondu « Ne sait pas » quand on leur a demandé si leur conjoint avait d'autres épouses/partenaires

Tableau 4.2.2 Nombre d'épouses des hommes

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans en union, par nombre d'épouses, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Nombre d'épouses			Total	Effectif d'hommes
	1	2+	Ne sait pas		
Groupe d'âges					
20-24	(100,0)	(0,0)	(0,0)	100,0	35
25-29	97,3	2,7	0,0	100,0	160
30-34	95,6	4,4	0,0	100,0	272
35-39	90,7	9,3	0,0	100,0	333
40-44	84,4	15,6	0,0	100,0	303
45-49	81,5	18,5	0,0	100,0	217
Résidence					
Urbain	92,3	7,7	0,0	100,0	591
Rural	87,7	12,3	0,0	100,0	728
Région					
Nord	84,8	15,2	0,0	100,0	217
Ouest	94,6	5,4	0,0	100,0	491
Centre	87,6	12,4	0,0	100,0	405
Sud	88,0	12,0	0,0	100,0	206
Niveau d'instruction					
Pas d'instruction	86,7	13,3	0,0	100,0	699
Primaire	91,9	8,1	0,0	100,0	334
Moyen/secondaire ou plus	94,8	5,2	0,0	100,0	287
Quintiles de bien-être économique					
Le plus bas	83,8	16,2	0,0	100,0	283
Second	88,3	11,7	0,0	100,0	244
Moyen	91,6	8,4	0,0	100,0	259
Quatrième	92,5	7,5	0,0	100,0	280
Le plus élevé	93,0	7,0	0,0	100,0	252
Ensemble 15-49	89,8	10,2	0,0	100,0	1 319
50-59	68,2	31,8	0,0	100,0	349
Ensemble 15-59	85,3	14,7	0,0	100,0	1 668

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés.

Tableau 4.3 Âge à la première union

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui étaient en première union avant d'atteindre certains âges exacts et âge médian à la première union selon l'âge actuel, Sénégal 2018

Age actuel	Pourcentage en première union avant d'atteindre l'âge exact :					Pourcentage de célibataires	Effectif d'enquêtés	Âge médian à la première union
	15	18	20	22	25			
FEMMES								
15-19	4,6	na	na	na	na	78,5	2 056	a
20-24	7,8	25,5	40,1	na	na	45,8	1 686	a
25-29	7,9	29,0	46,2	61,6	76,1	15,5	1 591	20,5
30-34	10,4	34,3	49,6	61,6	75,1	9,4	1 387	20,1
35-39	8,7	30,2	44,9	57,8	74,4	5,3	1 153	20,7
40-44	9,5	32,4	47,8	62,8	79,5	2,6	868	20,3
45-49	6,9	33,7	49,7	62,3	76,4	4,0	673	20,0
20-49	8,6	30,2	45,8	na	na	17,1	7 358	a
25-49	8,8	31,6	47,4	61,1	76,1	8,6	5 672	20,4
30-49	9,2	32,6	47,9	60,9	76,1	5,9	4 082	20,3
HOMMES								
15-19	0,0	na	na	na	na	100,0	861	a
20-24	0,0	0,5	0,8	na	na	94,3	604	a
25-29	0,1	1,0	1,9	7,4	18,8	65,3	469	24,8
30-34	0,4	2,4	4,6	8,2	18,8	37,3	452	26,3
35-39	0,0	0,4	3,7	8,0	19,1	14,9	405	26,8
40-44	0,5	0,5	3,6	9,7	19,7	7,9	351	26,7
45-49	0,0	1,4	3,6	7,8	21,0	8,1	245	26,8
20-49	0,2	1,0	2,8	na	na	45,6	2 526	a
25-49	0,2	1,2	3,4	8,2	19,3	30,3	1 922	a
30-49	0,2	1,3	3,9	8,4	19,5	19,0	1 453	26,6
20-59	0,2	1,0	2,6	na	na	39,9	2 901	a
25-59	0,2	1,1	3,1	7,4	18,3	25,6	2 297	a
30-59	0,3	1,1	3,4	7,4	18,2	15,4	1 828	26,7

Note : L'âge à la première union est défini comme étant l'âge auquel l'enquêté(e) a commencé à vivre avec son premier époux/épouse/partenaire.

na = Non applicable pour cause de troncature.

a = Non calculé parce que moins de 50 % des enquêtés ont commencé à vivre pour la première fois avec leur époux/épouse/partenaire avant d'atteindre le début du groupe d'âges.

Tableau 4.4 Âge médian à la première union selon certaines caractéristiques

Âge médian à la première union parmi les femmes de 20-49 ans et de 25-49 ans et, âge médian à la première union parmi les hommes de 20-54[59] ans et de 25-54[59] ans, selon certaines caractéristiques, Sénégal 2018

Caractéristique	Âge des femmes	
	20-49	25-49
Résidence		
Urbain	a	22,5
Rural	18,9	18,8
Région		
Nord	19,5	19,3
Ouest	a	22,6
Centre	19,1	19,0
Sud	18,9	18,8
Niveau d'instruction		
Pas d'instruction	18,6	18,7
Primaire	a	21,3
Moyen/secondaire ou plus	a	a
Quintiles de bien-être économique		
Le plus bas	17,5	17,6
Second	18,7	18,5
Moyen	20,0	19,7
Quatrième	a	21,2
Le plus élevé	a	24,3
Ensemble	a	20,4

Note : L'âge à la première union est défini comme étant l'âge auquel l'enquêté(e) a commencé à vivre avec son premier époux/épouse/partenaire.

a = Non calculé parce que moins de 50 % des femmes ou des hommes ont commencé à vivre pour la première fois avec leur époux/épouse/partenaire avant d'atteindre le début du groupe d'âges.

Tableau 4.5 Âge aux premiers rapports sexuels

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans ayant eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre certains âges exacts, pourcentage n'ayant jamais eu de rapports sexuels et âge médian aux premiers rapports sexuels, selon l'âge actuel, Sénégal 2018

Âge actuel	Pourcentage ayant déjà eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre l'âge exact de :					Pourcentage n'ayant jamais eu de rapports sexuels	Effectif	Âge médian aux premiers rapports sexuels
	15	18	20	22	25			
FEMMES								
15-19	5,4	na	na	na	na	75,8	2 056	a
20-24	8,0	28,6	43,4	na	na	41,9	1 686	a
25-29	9,1	33,4	50,0	66,1	79,0	11,3	1 591	20,0
30-34	12,2	38,2	52,9	64,6	76,4	7,3	1 387	19,6
35-39	9,8	34,4	50,3	63,3	77,1	3,2	1 153	20,0
40-44	10,3	34,6	50,5	65,8	81,6	1,4	868	19,9
45-49	7,7	37,2	52,9	64,3	78,3	1,1	673	19,5
20-49	9,6	33,8	49,4	na	na	14,2	7 358	a
25-49	10,0	35,4	51,2	64,9	78,3	5,9	5 672	19,8
15-24	6,6	na	na	na	na	60,5	3 742	a
HOMMES								
15-19	3,0	na	na	na	na	90,3	861	a
20-24	5,7	17,3	25,7	na	na	67,4	604	a
25-29	2,6	11,4	24,9	35,2	46,9	40,4	469	a
30-34	4,3	10,1	25,7	41,2	56,3	12,9	452	23,1
35-39	2,7	13,6	24,1	35,9	47,8	8,2	405	25,4
40-44	2,8	13,7	28,5	39,4	54,1	3,0	351	24,4
45-49	0,0	13,0	29,8	44,0	58,0	3,2	245	23,0
20-49	3,4	13,4	26,1	na	na	28,0	2 526	a
25-49	2,7	12,2	26,2	38,6	52,0	15,6	1 922	24,5
15-24	4,1	na	na	na	na	80,9	1 465	a
20-59	3,2	13,3	26,0	na	na	24,3	2 901	a
25-59	2,6	12,3	26,1	38,5	52,2	13,0	2 297	24,5

na = Non applicable pour cause de troncature.

a = Non calculé parce que moins de 50 % des enquêtés ont eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre le début du groupe d'âges.

Tableau 4.6 Âge médian aux premiers rapports sexuels selon certaines caractéristiques

Âge médian aux premiers rapports sexuels parmi les femmes de 20-49 ans et de 25-49 ans et âge médian aux premiers rapports sexuels parmi les hommes de 25-59 ans, selon certaines caractéristiques, Sénégal 2018

Caractéristique	Âge des femmes		Âge des hommes
	20-49	25-49	25-59
Résidence			
Urbain	a	21,5	24,6
Rural	18,6	18,5	24,5
Région			
Nord	19,6	19,4	a
Ouest	a	21,6	24,5
Centre	18,9	18,8	a
Sud	17,8	17,8	21,4
Niveau d'instruction			
Pas d'instruction	18,4	18,5	a
Primaire	a	20,6	23,9
Moyen/Secondaire ou plus	a	24,4	22,7
Quintiles de bien-être économique			
Le plus bas	17,3	17,4	23,4
Second	18,4	18,3	a
Moyen	19,6	19,3	24,9
Quatrième	a	20,6	24,9
Le plus élevé	a	23,4	24,8
Ensemble	a	19,8	24,5

a = Non calculé parce que moins de 50 % des enquêtés ont eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre le début du groupe d'âges.

Tableau 4.7.1 Activité sexuelle récente : Femmes

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans en fonction du moment auquel ont eu lieu leurs derniers rapports sexuels, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Derniers rapports sexuels :			N'a jamais eu de rapports sexuels	Total	Effectif de femmes
	Dans les 4 dernières semaines	Dans la dernière année ¹	Il y a un an ou plus			
Groupe d'âges						
15-19	13,5	8,3	2,3	75,8	100,0	2 056
20-24	33,0	17,3	7,9	41,9	100,0	1 686
25-29	56,3	22,6	9,8	11,3	100,0	1 591
30-34	58,3	21,7	12,7	7,3	100,0	1 387
35-39	61,1	21,8	13,8	3,2	100,0	1 153
40-44	67,6	20,6	10,5	1,4	100,0	868
45-49	64,7	17,9	16,3	1,1	100,0	673
État matrimonial						
Célibataire	2,0	5,3	4,5	88,1	100,0	2 873
En union	69,7	23,2	6,0	1,0	100,0	6 013
En rupture d'union	2,8	23,5	72,0	1,7	100,0	528
Durée de l'union²						
0-4 ans	62,6	28,1	5,4	4,0	100,0	1 422
5-9 ans	69,0	23,8	7,1	0,1	100,0	1 125
10-14 ans	73,2	19,7	6,8	0,4	100,0	1 009
15-19 ans	71,1	23,2	5,7	0,0	100,0	796
20-24 ans	74,0	20,4	5,6	0,0	100,0	495
25 ans+	80,1	15,4	4,6	0,0	100,0	429
Mariée plus d'une fois	69,5	24,4	6,1	0,0	100,0	737
Résidence						
Urbain	39,1	16,3	11,7	33,0	100,0	4 518
Rural	51,1	19,2	7,1	22,7	100,0	4 896
Région						
Nord	45,9	18,6	8,8	26,7	100,0	1 565
Ouest	40,1	15,7	10,6	33,7	100,0	3 725
Centre	53,6	18,1	5,0	23,3	100,0	2 870
Sud	41,2	22,1	15,7	21,0	100,0	1 254
Niveau d'instruction						
Pas d'instruction	59,4	20,8	9,0	10,8	100,0	4 304
Primaire	47,4	16,8	11,4	24,4	100,0	2 070
Moyen/Secondaire ou plus	23,9	14,2	8,2	53,7	100,0	3 040
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	55,9	20,9	7,8	15,4	100,0	1 508
Second	52,9	18,9	6,7	21,5	100,0	1 659
Moyen	45,2	17,8	8,4	28,7	100,0	1 908
Quatrième	41,8	18,2	11,3	28,8	100,0	2 065
Le plus élevé	36,1	14,6	11,0	38,3	100,0	2 273
Total	45,3	17,8	9,3	27,6	100,0	9 414

¹ Non compris les femmes qui ont eu des rapports sexuels au cours des quatre dernières semaines.² Non compris les femmes qui ne sont pas actuellement en union.

Tableau 4.7.2 Activité sexuelle récente : Hommes

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans en fonction du moment auquel ont eu lieu leurs derniers rapports sexuels, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Derniers rapports sexuels :				N'a jamais eu de rapports sexuels	Total	Effectif d'hommes
	Dans les 4 dernières semaines	Dans la dernière année ¹	Il y a un an ou plus	Manquant			
Groupe d'âges							
15-19	2,0	4,5	3,2	0,0	90,3	100,0	861
20-24	8,7	11,2	12,7	0,0	67,4	100,0	604
25-29	25,2	21,3	13,1	0,0	40,4	100,0	469
30-34	49,8	22,8	14,6	0,0	12,9	100,0	452
35-39	65,9	18,9	6,9	0,0	8,2	100,0	405
40-44	71,1	19,6	6,3	0,0	3,0	100,0	351
45-49	73,2	16,0	7,6	0,0	3,2	100,0	245
État matrimonial							
Célibataire	3,8	10,3	12,6	0,0	73,3	100,0	2 013
En union	77,8	20,4	1,2	0,0	0,6	100,0	1 319
En rupture d'union	(11,5)	(32,5)	(54,5)	(0,0)	(1,5)	100,0	55
Durée de l'union²							
0-4 ans	69,5	27,4	1,0	0,0	2,1	100,0	375
5-9 ans	80,3	17,8	1,9	0,0	0,0	100,0	339
10-14 ans	84,6	14,4	1,0	0,0	0,0	100,0	231
15-19 ans	83,3	16,7	0,0	0,0	0,0	100,0	174
20-24 ans	73,2	26,8	0,0	0,0	0,0	100,0	79
25 ans+	(75,5)	(24,5)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	100,0	22
Marié plus d'une fois	79,6	17,0	3,5	0,0	0,0	100,0	100
Résidence							
Urbain	30,4	16,0	11,8	0,0	41,8	100,0	1 659
Rural	35,0	13,2	6,1	0,0	45,7	100,0	1 728
Région							
Nord	33,6	11,8	8,0	0,0	46,5	100,0	553
Ouest	31,9	16,0	11,5	0,0	40,5	100,0	1 340
Centre	33,9	11,1	4,9	0,0	50,1	100,0	971
Sud	31,9	20,2	10,3	0,0	37,7	100,0	523
Niveau d'instruction							
Pas d'instruction	45,9	12,0	5,1	0,0	36,9	100,0	1 250
Primaire	33,7	16,6	10,1	0,0	39,6	100,0	855
Moyen/secondaire ou plus	19,3	15,7	11,6	0,0	53,4	100,0	1 282
Quintiles de bien-être économique							
Le plus bas	39,7	14,5	4,7	0,0	41,1	100,0	588
Second	34,0	11,9	6,4	0,0	47,6	100,0	611
Moyen	32,2	13,0	10,8	0,0	44,0	100,0	680
Quatrième	29,3	14,5	12,5	0,0	43,6	100,0	812
Le plus élevé	30,2	18,6	8,3	0,0	42,9	100,0	696
Ensemble 15-49	32,7	14,6	8,8	0,0	43,8	100,0	3 387
50-59	87,1	9,8	3,1	0,0	0,0	100,0	375
Ensemble 15-59	38,2	14,1	8,3	0,0	39,4	100,0	3 762

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

¹ Non compris les hommes qui ont eu des rapports sexuels au cours des quatre dernières semaines.

² Non compris les hommes qui ne sont pas actuellement en union.

Tableau 4.8.1 Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois : Femmes

Parmi toutes les femmes de 15-49 ans, pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire sexuel au cours des douze derniers mois et pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des douze derniers mois avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient ; parmi les femmes ayant eu, au cours des 12 derniers mois, plus d'un partenaire sexuel, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels ; parmi les femmes de 15-49 ans qui ont eu des rapports sexuels au cours des douze derniers mois avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels avec cette personne ; Parmi les femmes ayant déjà eu des rapports sexuels, nombre moyen de partenaires sexuels sur la durée de vie, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Toutes les femmes			Femmes ayant eu 2 partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois	Femmes ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient	Parmi les femmes qui ont déjà eu des rapports sexuels ¹		
	Pourcentage ayant eu 2 partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient	Effectif de femmes	Effectif de femmes	Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels avec cette personne	Effectif de femmes	Nombre moyen de partenaires sexuels sur la durée de vie	Effectif de femmes
Groupe d'âges								
15-24	0,2	3,3	3 742	9	35,2	125	1,1	1 477
15-19	0,1	2,9	2 056	3	29,3	60	1,1	497
20-24	0,4	3,9	1 686	6	40,6	65	1,1	980
25-29	0,5	4,2	1 591	7	(40,2)	67	1,2	1 411
30-39	0,2	2,8	2 540	4	(46,7)	71	1,3	2 401
40-49	0,2	1,4	1 542	3	*	22	1,5	1 521
État matrimonial								
Célibataire	0,4	7,4	2 873	12	34,8	212	1,7	341
En union	0,1	0,1	6 013	4	*	6	1,2	5 950
En rupture d'union	1,6	12,8	528	9	(47,4)	68	1,7	519
Résidence								
Urbain	0,3	4,6	4 518	15	38,7	207	1,4	3 027
Rural	0,2	1,6	4 896	9	35,1	78	1,2	3 784
Région								
Nord	0,1	0,6	1 565	2	*	9	1,2	1 147
Ouest	0,5	5,0	3 725	17	39,0	185	1,4	2 469
Centre	0,0	0,7	2 870	0	(24,7)	19	1,2	2 202
Sud	0,4	5,9	1 254	5	39,7	74	1,4	991
Niveau d'instruction								
Pas d'instruction	0,1	1,0	4 304	4	(18,7)	42	1,3	3 839
Primaire	0,5	4,7	2 070	10	28,1	98	1,4	1 563
Moyen/secondaire ou plus	0,3	4,8	3 040	10	49,5	147	1,3	1 408
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	0,2	1,8	1 508	4	41,6	27	1,2	1 276
Second	0,0	2,1	1 659	0	25,9	35	1,2	1 303
Moyen	0,4	2,8	1 908	8	27,1	53	1,3	1 361
Quatrième	0,3	4,6	2 065	6	43,9	95	1,3	1 470
Le plus élevé	0,3	3,4	2 273	6	(41,3)	76	1,3	1 401
Ensemble 15-49	0,3	3,0	9 414	24	37,7	286	1,3	6 810

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

¹ Les moyennes sont calculées en excluant les enquêtées qui ont donné des réponses non numériques.

Tableau 4.8.2 Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois : Hommes

Parmi tous les hommes de 15-49 ans, pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec plus d'une partenaire sexuelle au cours des douze derniers mois et pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des douze derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient ; parmi les hommes ayant eu, au cours des douze derniers mois, plus d'une partenaire sexuelle, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels ; parmi les hommes de 15-49 ans qui ont eu des rapports sexuels au cours des douze derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels avec cette personne ; Parmi les hommes ayant déjà eu des rapports sexuels, nombre moyen de partenaires sexuelles sur la durée de vie, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Parmi tous les hommes			Parmi les hommes ayant eu 2 partenaires sexuelles ou plus au cours des 12 derniers mois		Hommes ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient		Hommes ayant déjà eu des rapports sexuels ¹	
	Pourcentage ayant eu 2 partenaires sexuelles ou plus au cours des 12 derniers mois	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse ni la partenaire avec qui ils vivaient	Effectif d'hommes	Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé durant les derniers rapports sexuels	Effectif d'hommes	Pourcentage ayant déclaré avoir utilisé un condom lors des derniers rapports sexuels avec cette personne	Effectif d'hommes	Nombre moyen de partenaire sexuels	Effectif d'hommes
Groupe d'âges									
15-24	2,0	9,8	1 465	*	29	64,7	143	2,8	275
15-19	1,1	6,5	861	*	9	43,8	56	2,3	81
20-24	3,3	14,4	604	*	20	78,1	87	3,0	194
25-29	3,5	13,6	469	*	16	79,4	64	3,2	278
30-39	8,7	9,8	857	16,6	74	63,2	84	3,8	750
40-49	19,1	7,5	596	7,8	113	(74,3)	45	4,2	554
État matrimonial									
Célibataire	2,8	13,7	2 013	(71,2)	56	68,2	276	4,6	524
En union	13,1	3,5	1 319	2,4	173	(69,0)	46	3,1	1279
En rupture d'union	(6,8)	(24,7)	55	*	4	*	13	(8,0)	53
Type d'union									
Union polygame	96,2	1,0	135	0,0	130	*	1	3,7	126
Union non polygame	3,7	3,7	1 184	(9,7)	44	(69,3)	44	3,1	1 153
Non actuellement en union	2,9	14,0	2 068	(72,9)	60	68,3	290	4,9	577
Résidence									
Urbain	6,9	12,0	1 659	31,7	114	76,8	199	4,7	953
Rural	6,9	7,9	1 728	9,9	119	56,1	137	2,6	904
Région									
Nord	7,7	7,9	553	6,2	42	55,9	44	2,6	294
Ouest	7,1	13,0	1 340	(35,3)	95	73,6	174	5,0	791
Centre	6,4	4,6	971	8,8	62	47,6	44	2,1	448
Sud	6,5	14,1	523	18,8	34	76,0	74	3,5	323
Niveau d'instruction									
Pas d'instruction	8,6	4,0	1 250	4,1	108	45,8	50	2,5	770
Primaire	7,0	13,1	855	21,9	60	66,3	112	4,4	503
Moyen/secondaire ou plus	5,1	13,6	1 282	46,2	66	76,2	174	4,6	583
Quintiles de bien-être économique									
Le plus bas	9,3	8,2	588	1,6	55	43,8	48	2,2	339
Second	7,1	8,7	611	14,6	44	68,4	53	2,8	311
Moyen	5,2	8,7	680	(22,3)	35	70,0	59	3,4	367
Quatrième	5,6	10,6	812	(30,0)	46	73,6	86	4,6	444
Le plus élevé	7,8	12,9	696	(35,3)	54	(75,6)	90	4,8	395
Ensemble 15-49	6,9	9,9	3 387	20,5	233	68,4	336	3,7	1856
50-59	29,4	5,3	375	0,6	110	*	20	4,9	342
Ensemble 15-59	9,1	9,5	3 762	14,1	344	68,7	356	3,9	2 199

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

¹ Les moyennes sont calculées en excluant les enquêtés qui ont donné des réponses non numériques.

Tableau 4.9 Rapports sexuels payants et utilisation du condom au cours des derniers rapports sexuels payants

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont déjà eu des rapports sexuels payants et pourcentage ayant déclaré avoir eu des rapports sexuels payants au cours des douze derniers mois et, parmi ces derniers, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels payants, selon l'âge, Sénégal 2018

Groupe d'âges	Parmi tous les hommes			Effectif d'hommes	Effectif d'hommes
	Pourcentage ayant déjà eu des rapports sexuels payants	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels payants au cours des 12 derniers mois	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels payants au cours des 12 derniers mois		
Groupe d'âges					
15-24	0,5	0,1	1 465	2	
15-19	0,1	0,0	861	0	
20-24	0,9	0,3	604	2	
25-29	0,9	0,1	469	1	
30-39	2,4	0,2	857	1	
40-49	4,8	0,6	596	3	
Ensemble 15-49	1,8	0,2	3 387	7	
50-59	6,1	0,0	375	0	
Ensemble 15-59	2,2	0,2	3 762	7	

Tableau 4.10 Âge aux premiers rapports sexuels parmi les jeunes

Pourcentage de jeunes femmes et de jeunes hommes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans et pourcentage de jeunes femmes et de jeunes hommes de 18-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Femmes				Hommes			
	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans	Effectif d'enquêtées (15-24)	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	Effectif d'enquêtées (18-24)	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans	Effectif d'enquêtés (15-24)	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	Effectif d'enquêtés (18-24)
Groupe d'âges								
15-19	5,4	2 056	na	na	3,0	861	na	na
15-17	3,5	1 237	na	na	2,5	538	na	na
18-19	8,4	819	32,5	819	3,9	323	14,4	323
20-24	8,0	1 686	28,6	1 686	5,7	604	17,3	604
20-22	8,7	1 088	29,3	1 088	5,0	372	16,6	372
23-24	6,7	598	27,2	598	6,7	232	18,4	232
Résidence								
Urbain	3,1	1 720	17,1	1 191	4,3	660	19,4	433
Rural	9,5	2 022	41,4	1 314	4,0	805	13,6	494
Niveau d'instruction								
Pas d'instruction	13,3	1 074	51,7	771	1,5	412	8,0	279
Primaire	7,9	732	41,6	389	5,5	332	24,1	179
Moyen/secondaire ou plus	2,4	1 935	13,9	1 345	5,0	721	18,2	469
Ensemble	6,6	3 742	29,9	2 505	4,1	1 465	16,3	927

na = Non applicable

Tableau 4.11 Rapports sexuels pré-nuptiaux parmi les jeunes

Parmi les femmes et les hommes de 15-24 ans célibataires, pourcentage qui n'ont jamais eu de rapports sexuels, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Parmi les femmes de 15-24 ans célibataires		Parmi les hommes de 15-24 ans célibataires	
	Pourcentage qui n'a jamais eu des rapports sexuels	Effectif de femmes célibataires	Pourcentage qui n'a jamais eu des rapports sexuels	Effectif d'hommes célibataire
Groupe d'âges				
15-19	95,0	1 614	90,3	861
15-17	97,6	1 101	94,5	538
18-19	89,5	513	83,4	323
20-24	88,4	771	70,9	569
20-22	90,0	549	75,7	362
23-24	84,4	222	62,3	207
Résidence				
Urbain	92,4	1 296	79,1	649
Rural	93,5	1 089	85,5	782
Niveau d'instruction				
Pas d'instruction	94,7	384	92,0	393
Primaire	88,4	489	78,5	325
Moyen/secondaire ou plus	93,9	1 512	79,3	713
Ensemble	92,9	2 385	82,6	1 430

Tableau 4.12.1 Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des douze derniers mois parmi les jeunes : Femmes

Parmi toutes les jeunes femmes de 15-24 ans, pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire sexuel au cours des douze derniers mois ; et pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des douze derniers mois avec un partenaire non marital et non cohabitant ; parmi les jeunes femmes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels au cours des douze derniers mois, pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec un partenaire plus âgé qu'elle d'au moins 10 ans, selon certaines caractéristiques sociodémographiques Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Parmi toutes les femmes de 15-24 ans			Femmes de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois	
	Pourcentage ayant eu deux partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec un partenaire non marital et non cohabitant	Effectif de femmes	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec un partenaire plus âgé qu'elle d'au moins dix ans	Effectif de femmes
Groupe d'âges					
15-19	0,1	2,9	2 056	29,3	60
15-17	0,1	1,9	1 237	(31,9)	23
18-19	0,3	4,5	819	(27,7)	37
20-24	0,4	3,9	1 686	40,6	65
20-22	0,1	3,2	1 088	(38,3)	34
23-24	0,9	5,1	598	*	31
État matrimonial					
Célibataire	0,2	4,9	2 385	36,2	118
En union	0,3	0,6	1 357	*	8
Résidence					
Urbain	0,3	4,4	1 720	36,4	75
Rural	0,2	2,5	2 022	33,4	50
Niveau d'instruction					
Pas d'instruction	0,1	1,3	1 074	*	14
Primaire	0,6	5,8	732	(13,0)	43
Moyen/secondaire ou plus	0,2	3,6	1 935	54,4	69
Ensemble 15-24	0,2	3,3	3 742	35,2	125

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Tableau 4.12.2 Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois parmi les jeunes : Hommes

Parmi tous les jeunes hommes de 15-24 ans, pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire sexuel au cours des douze derniers mois ; et pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des douze derniers mois avec un partenaire non marital et non cohabitant ; parmi les hommes ayant eu plus d'un partenaire sexuel au cours des douze derniers mois, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé pendant les derniers rapports sexuels ; parmi les jeunes hommes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels au cours des douze derniers mois avec un partenaire non marital et non cohabitant, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels avec ce partenaire, selon certaines caractéristiques sociodémographiques Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Hommes de 15-24 ans			Hommes de 15-24 ans ayant eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	Hommes de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois avec un partenaire non-marital, non-cohabitant	
	Pourcentage ayant eu 2 partenaires ou plus dans les 12 derniers mois	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois avec un partenaire non-marital, non-cohabitant	Effectif d'hommes	Effectif d'hommes	Pourcentage ayant déclaré avoir utilisé un condom lors des derniers rapports sexuels avec ce partenaire	Effectif d'hommes
Groupe d'âges						
15-19	1,1	6,5	861	9	43,8	56
15-17	0,5	4,2	538	3	*	23
18-19	1,9	10,3	323	6	(48,9)	33
20-24	3,3	14,4	604	20	78,1	87
20-22	2,6	12,4	372	10	71,6	46
23-24	4,4	17,7	232	10	(85,3)	41
État matrimonial						
Célibataire	2,0	10,0	1 430	29	64,7	143
En union	(0,0)	(0,0)	35	0	*	0
Résidence						
Urbain	3,2	11,3	660	21	76,4	74
Rural	1,0	8,5	805	8	51,8	68
Niveau d'instruction						
Pas d'instruction	0,1	3,2	412	0	*	13
Primaire	3,4	15,9	332	11	(65,9)	53
Moyen/secondaire ou plus	2,4	10,7	721	17	68,9	77
Ensemble 15-24	2,0	9,8	1 465	29	64,7	143

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Résultats clés

- **Indice synthétique de fécondité** : Au Sénégal l'indice synthétique de fécondité est de 4,4 enfants par femme. Cet indice a baissé lentement mais régulièrement de 6,4 enfants en 1986 à 4,4 en 2018.
- **Âge médian à la première naissance** : Parmi les femmes de 25-49 ans, actuellement en union, l'âge médian à la première naissance est estimé à 21,9 ans.
- **Espacement des naissances** : Le nombre médian de mois depuis la naissance précédente est de pratiquement trois ans (35,3 mois).

Le nombre d'enfants qu'a une femme dépend de plusieurs facteurs, comme l'âge auquel elle commence à avoir des enfants, l'intervalle entre les naissances et son aptitude à la reproduction. Le report de la première naissance et l'allongement de l'intervalle intergénéral ont joué un rôle important dans la réduction des niveaux de fécondité dans de nombreux pays. Ces facteurs ont aussi des conséquences positives en termes de santé. À l'opposé, des intervalles intergénéral courts (de moins de 24 mois) peuvent avoir des effets néfastes pour les nouveau-nés et pour leur mère, comme des naissances avant terme, des faibles poids à la naissance et le décès. La maternité à un âge très jeune est associée à un risque accru de complications durant la grossesse et à la naissance de l'enfant et à des niveaux élevés de mortalité néonatale.

Ce chapitre présente les niveaux et tendances de la fécondité au Sénégal et certains déterminants proches de la fécondité. Plus précisément, il présente l'Indice Synthétique de Fécondité (ISF), l'intervalle intergénéral, l'insusceptibilité de tomber enceinte (à la suite de l'aménorrhée post-partum, de l'abstinence post-partum ou de la ménopause) et l'âge à la première naissance et la fécondité des adolescentes.

5.1 FÉCONDITÉ ACTUELLE

Indice synthétique de fécondité

Nombre moyen d'enfants qu'aurait une femme en fin de vie féconde si elle avait des enfants aux taux de fécondité par âge actuels. Les taux de fécondité par âge sont calculés pour la période des trois années qui précèdent l'enquête, basés sur l'historique détaillée des naissances fourni par les femmes.

Échantillon : Femmes de 15-49 ans

Le niveau de la fécondité au Sénégal est estimé à 4,4 enfants par femme. Il varie selon le milieu de résidence, de 3,2 enfants par femme en milieu urbain à 5,5 enfants par femme en milieu rural (**Tableau 5.1**). Les résultats de l'enquête montrent une fécondité toujours précoce et élevée. En effet, estimé à 68 % chez les femmes de 15-19 ans, les taux de fécondité par groupe d'âges augmentent rapidement pour atteindre un maximum de 214 % chez les femmes de 25-29 ans. Ces données montrent aussi en milieu rural comme en milieu urbain, que les taux de fécondité les plus élevés sont observés dans le groupe d'âges 25-29 ans.

Le taux global de fécondité générale, c'est-à-dire le nombre annuel moyen de naissances vivantes dans la population des femmes en âge de procréer, est estimé à 146 ‰ (Tableau 5.1). Il est plus élevé en milieu rural (178 ‰) qu'en milieu urbain (110 ‰).


Tendances : L'indice synthétique de fécondité a baissé lentement mais régulièrement de 6,4 enfants en 1986 à 4,4 en 2018 (Graphique 5.1). Les mêmes tendances sont observées en milieu rural et en milieu urbain, bien qu'en milieu urbain la baisse soit plus importante. En effet, entre 1986 et 2018, l'ISF est passé de 7,1 enfants par femme à 5,5 enfants par femme en milieu rural contre 5,4 enfants par femme à 3,2 enfants par femme dans la même période en milieu urbain.

Par ailleurs, la comparaison des résultats de l'enquête actuelle avec les enquêtes précédentes montre que les courbes des taux de fécondité par âge présentent une allure similaire. En effet, la fécondité demeure précoce aux âges 15-19 ans, puis augmente très rapidement pour atteindre son maximum à 25-29 ans et diminue ensuite régulièrement avec l'âge (Tableau 5.3 et Graphique 5.2).


Variations par caractéristique

- Le niveau de la fécondité varie selon la zone de résidence des femmes. L'indice synthétique de fécondité le plus faible est enregistré dans la partie Ouest du pays (en moyenne, 3,2 enfants par femme). Par contre, les niveaux les plus élevés sont enregistrés dans les régions du Centre (5,5 enfants par femme) et du Sud (5,2 enfants par femme) (Tableau 5.2).
- L'indice synthétique de fécondité varie selon l'instruction de la femme. En effet, plus le niveau d'instruction est faible, plus l'indice synthétique de fécondité est élevé. Il passe de 2,8 chez les femmes de niveau moyen/secondaire ou plus à 5,7 chez celles qui n'ont aucun niveau d'instruction (Tableau 5.2).

Graphique 5.1 Tendances de la Fécondité par milieu de résidence



Graphique 5.2 Tendances de la fécondité par âge



- Les résultats de l'enquête montrent que plus le quintile de bien-être économique est faible plus l'indice synthétique de fécondité est élevé. Il passe de 2,9 enfants chez les femmes qui vivent dans un ménage du quintile le plus élevé à 6,5 chez celles vivant dans un ménage du quintile le plus bas (**Graphique 5.3**).

5.2 ENFANTS DÉJÀ NÉS ET ENFANTS SURVIVANTS

Les résultats de l'enquête montrent qu'en moyenne les femmes de 45-49 ans ont donné naissance à 5,4 enfants au cours de leur vie et, parmi eux, 4,8 enfants étaient en vie au moment de l'enquête. Pour les femmes en union, ces nombres moyens sont respectivement de 5,9 enfants et 5,2 enfants (**Tableau 5.4**).

Au Sénégal, environ 2 % des femmes âgées de 45-49 ans actuellement en union n'ont jamais eu d'enfants et peuvent être considérées comme stériles (**Tableau 5.4**).

5.3 INTERVALLES INTERGÉNÉSIQUE

Intervalle intergénérisque médian

Nombre de mois écoulés depuis la naissance précédente pour la moitié des enfants qui sont nés.

Échantillon : Naissances autres que les naissances de rang un qui ont eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête.

L'intervalle intergénérisque médian est de 35,3 mois. En outre, 38 % des naissances ont eu lieu entre 24 et 35 mois après la naissance précédente. Cependant, on constate toujours qu'une proportion élevée de naissances a eu lieu avant l'intervalle intergénérisque recommandé qui est de 24 mois au moins (14 %) (**Tableau 5.5** et **Graphique 5.4**).


Tendances : Depuis 2010-2011, la durée médiane de l'intervalle intergénérisque a peu varié, passant de 33,8 mois à 35,3 mois en 2018.

Variations par caractéristique

- Les femmes vivant en milieu urbain ont plus tendance à espacer leurs naissances (intervalle intergénérisque médian de 37,9 mois) que celles vivant en milieu rural (intervalle intergénérisque médian de 34,3 mois) (**Tableau 5.5**).


Graphique 5.3 Fécondité par bien-être économique du ménage

ISF pour les 3 années avant l'enquête



Graphique 5.4 Naissances autres que les naissances de rang un par nombre de mois depuis la naissance précédente

Répartition (en %) des naissances autres que les naissances de rang un par nombre de mois depuis la naissance précédente



- Les résultats montrent que l'intervalle intergénérisique médian varie selon l'état de survie de la dernière naissance. En effet, l'intervalle est de 30,6 mois quand la naissance précédente est décédée et de 35,6 mois quand elle est vivante.
- L'intervalle intergénérisique médian augmente avec le niveau de bien-être socio-économique, passant de 32,4 mois dans le quintile le plus bas à 38,9 mois dans le plus élevé.
- La région Ouest présente l'intervalle intergénérisique médian le plus élevé (36,9 mois) alors que dans les autres grandes régions, il varie entre 34 et 35,5 mois.

5.4 MENOPAUSE

Aménorrhée post-partum

Période entre la naissance de l'enfant et le retour des règles.

Abstinence post-partum

Période entre la naissance de l'enfant et la reprise des rapports sexuels.

Insusceptibilité post-partum

Période pendant laquelle on considère qu'une femme ne court pas de risque de tomber enceinte, soit parce qu'elle est en aménorrhée post-partum et/ou en abstinence post-partum.

Échantillon : Femmes qui ont donné naissance au cours des trois années ayant précédé l'enquête

Durée médiane de l'aménorrhée post-partum

Nombre de mois écoulés entre la naissance d'un enfant et le retour des règles pour la moitié des femmes.

Échantillon : Femmes qui ont donné naissance au cours des 3 années ayant précédé l'enquête

Durée médiane de l'insusceptibilité post-partum

Nombre de mois suivant une naissance après lesquels la moitié des femmes ne sont plus protégées contre le risque de grossesse, du fait de l'aménorrhée post-partum ou de l'abstinence post-partum.

Échantillon : Femmes qui ont donné naissance dans les 3 années ayant précédé l'enquête.

L'insusceptibilité de tomber enceinte dépend, entre autres facteurs, du retour de l'ovulation, qui est influencé par la durée et l'intensité de l'allaitement et de l'abstinence sexuelle post-partum. Pour 38 % de naissances ayant eu lieu au cours des trois années ayant précédé l'enquête, les mères étaient en insusceptibilité de tomber enceinte ; pour 31 % des naissances, les mères étaient en aménorrhée et pour 17 % des naissances, les mères étaient en abstinence post-partum. En moyenne, les femmes restent 14,4 mois sans être susceptibles de tomber enceinte après une naissance. Pour la moitié des naissances, les femmes restent en insusceptibilité de tomber enceinte jusqu'à 12,7 mois (**Tableau 5.6**).

Tendances : Depuis 2010-2011, on remarque une tendance à la baisse de la durée médiane de l'insusceptibilité post-partum, la durée étant passée de 14,2 mois à 12,7 mois en 2018.

Variations par caractéristique

- L'écart du nombre de mois médian d'insusceptibilité de tomber enceinte entre les grandes régions reste élevé. Avec 8,3 mois, c'est dans la région Ouest que ce nombre médian de mois d'insusceptibilité post-

partum est le plus faible, suivie de la zone Nord avec 10 mois et du Centre avec 13,2 mois. C'est dans la région Sud qu'il est le plus élevé (16,3 mois).

- La durée d'insusceptibilité post-partum diminue avec le niveau d'instruction des femmes, passant de 14,4 mois parmi celles sans niveau d'instruction à 8,5 mois parmi celles ayant le niveau moyen/secondaire ou plus.
- La durée d'insusceptibilité baisse du quintile le plus bas au plus élevé, passant de 15,5 mois à 8,1 mois.
- Ces écarts sont davantage dus à des différences de durées de l'aménorrhée post-partum (à cause d'une durée plus longue de l'allaitement) que de l'abstinence post-partum (**Tableau 5.7**).

Ménopause

Les femmes sont considérées comme ayant atteint la ménopause si elles ne sont ni enceintes, ni en aménorrhée post-partum et si elles n'ont pas eu de règles pendant une période de 6 mois avant l'enquête ou si elles déclarent qu'elles sont en ménopause ou qu'elles ont eu une hystérectomie, ou si elles n'ont jamais eu de règles.

Échantillon : Femmes de 30-49 ans

Au Sénégal, 6 % des femmes de 30-49 ans peuvent être considérées comme étant en ménopause. Le pourcentage de femmes en ménopause augmente avec l'âge, de 2 % parmi celles de 30-34 ans à 28 % parmi celles de 48-49 ans (**Tableau 5.8**).

5.5 ÂGE À LA PREMIÈRE NAISSANCE

Âge médian à la première naissance

Âge auquel la moitié des femmes ont eu leur premier enfant.

Échantillon : Femmes de 20-49 ans et 25-49 ans

Au Sénégal, l'âge médian à la première naissance des femmes âgées de 25-49 ans est de 21,9 ans. Cela veut dire que la moitié des femmes âgées de 25-49 ans ont eu leur première naissance avant cette âge. En outre, 18 % des femmes âgées de 25-49 ans ont eu leur première naissance avant l'âge exact de 18 ans et 69 % avant l'âge exact de 25 ans (**Tableau 5.9**).


Tendances : Depuis 2010-2011, on constate une légère tendance à la hausse de l'âge médian à la première naissance des femmes âgées de 25-49 ans, passant de 21,0 ans à 21,9 ans. Cette tendance est cohérente dans un contexte de baisse de la fécondité.

Variations par caractéristique

- En milieu urbain, les femmes âgées de 25-49 ans ont eu leur première naissance à un âge plus tardif que celles vivant en milieu rural, soit respectivement 23,8 ans et 20,6 ans (**Tableau 5.10**) (**Graphique 5.5**).
- L'âge médian à la première naissance varie pour les femmes de 25-49 ans selon la région de résidence. Il est de 23,9 ans dans la région de Ouest contre 20,1 ans dans celle du Sud.
- En outre, parmi les femmes de 30-49 ans, l'âge médian à la première naissance augmente avec le niveau d'instruction, de 20,7 ans parmi les femmes de 25-49 ans sans niveau d'instruction il s'établit à 22,9 ans parmi les femmes qui ont un niveau primaire et à 29 ans parmi celles ayant le niveau moyen/secondaire ou plus.
- Par ailleurs, l'âge médian à la première naissance des femmes âgées de 30-49 ans tend à augmenter du quintile le plus bas au plus élevé, de 19,8 ans à 26,7 ans (**Tableau 5.10**).

Graphique 5.5 Age médian à la première naissance par milieu de résidence

Âge médian à la première naissance
parmi les femmes de 25-49 ans



5.6 FÉCONDITÉ DES ADOLESCENTES ET COMPORTEMENTS EN MATIÈRE DE SANTÉ REPRODUCTIVE AVANT L'ÂGE DE 15 ANS

Fécondité des adolescentes

Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui ont donné naissance à leur premier enfant ou qui sont enceintes de leur premier enfant

Échantillon : Femmes de 15-19 ans

5.6.1 Fécondité des adolescentes

Au Sénégal, environ 15 % des femmes âgées de 15-19 ans ont déjà commencé leur vie procréative : 11 % ont déjà eu une naissance vivante et 4 % sont enceintes de leur premier enfant (**Tableau 5.11**).


Tendances : Entre 2012-2013 et 2018, la proportion de femmes âgées de 15-19 ans ayant commencé leur vie procréative n'a pratiquement pas varié, passant de 16 % à 15 %.

Variations par caractéristique

- Les résultats selon le milieu de résidence révèlent que la fécondité est plus élevée chez les adolescentes qui vivent dans le milieu rural que chez celles vivant dans le milieu urbain. Environ, 18 % des femmes âgées de 15-19 ans, résidant en milieu rural ont déjà commencé leur vie procréative alors qu'en milieu urbain, ce pourcentage n'est que de 10 % (**Graphique 5.6**).
- La fécondité des adolescentes varie selon la région de résidence. En effet, le pourcentage d'adolescentes qui ont déjà commencé leur vie procréative la plus faible est enregistré dans la région Ouest (9 %) par contre la région Sud a le pourcentage le plus élevé (26 %).
- Plus le niveau d'instruction est élevé, plus la proportion d'adolescentes ayant commencé leur vie procréative est faible. Chez les adolescentes qui n'ont aucun niveau d'instruction, 28 % ont déjà commencé leur vie procréative. Par contre parmi celles qui ont un niveau primaire ou moyen/secondaire ou plus, le pourcentage est respectivement de 15 % et de 8 %.
- La fécondité des adolescentes varie selon le quintile de bien-être économique du ménage. En effet, 26 % des adolescentes vivant dans un ménage appartenant au quintile de bien-être économique le plus bas, ont déjà commencé leur vie procréative contre 4 % parmi celles des ménages du quintile le plus élevé.

Graphique 5.6 Fécondité des adolescentes par milieu de résidence

Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui ont commencé leur vie procréative



5.6.2 Comportements en matière de santé reproductive avant l'âge de 15 ans

- Parmi les adolescents de 15-19 ans, 5 % des femmes et 3 % des hommes ont eu leurs premiers rapports sexuels avant l'âge de 15 ans. Dans ce même groupe d'âges, 5 % des femmes avaient déjà contracté une union avant d'atteindre l'âge de 15 ans et 1 % des femmes avaient un enfant avant l'âge de 15 ans (**Tableau 5.12**).

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur les niveaux de fécondité et sur certains déterminants proches de la fécondité, consulter les tableaux suivants :

- Tableau 5.1** Fécondité actuelle
- Tableau 5.2** Fécondité selon certaines caractéristiques
- Tableau 5.3** Tendances de la fécondité par âge
- Tableau 5.4** Enfants nés vivants et enfants survivants des femmes
- Tableau 5.5** Intervalles intergénérisiques
- Tableau 5.6** Aménorrhée, abstinence et insusceptibilité post-partum
- Tableau 5.7** Durée médiane de l'aménorrhée, de l'abstinence et de l'insusceptibilité post-partum
- Tableau 5.8** Ménopause
- Tableau 5.9** Âge à la première naissance
- Tableau 5.10** Âge médian à la première naissance
- Tableau 5.11** Fécondité des adolescentes
- Tableau 5.12** Rapports sexuels et comportements en matière de santé reproductive avant l'âge de 15 ans

Tableau 5.1 Fécondité actuelle

Taux de fécondité par âge, Indice Synthétique de Fécondité (ISF), et Taux Global de Fécondité Générale (TGFG) et Taux Brut de Natalité (TBN) pour la période des trois années ayant précédé l'enquête par milieu de résidence, Sénégal 2018

Groupe d'âges	Résidence		Ensemble
	Urbain	Rural	
<15	0	0	0
15-19	34	95	68
20-24	132	226	178
25-29	172	257	214
30-34	144	220	181
35-39	111	178	147
40-44	45	87	67
45-49	4	29	15
ISF(15-49)	3,2	5,5	4,4
TGFG	110	178	146
TBN	27,2	37,0	32,7

Notes : Les taux sont exprimés pour 1 000 femmes. Les taux entre crochets sont tronqués. Les taux correspondent à la période 1-36 mois précédant l'enquête. Les taux pour les femmes âgées de 10-14 ans sont basés sur des données rétrospectives provenant des femmes âgées de 15-17 ans.

ISF = Indice Synthétique de Fécondité exprimé pour une femme.

TGFG = Taux Global de Fécondité Générale exprimé pour 1 000 femmes âgées de 15-44 ans.

TBN = Taux Brut de natalité exprimé pour 1 000 individus.

Tableau 5.2 Fécondité selon certaines caractéristiques

Indice Synthétique de Fécondité pour les trois années précédant l'enquête, pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement enceintes et nombre moyen d'enfants nés vivants pour les femmes de 40-49 ans, selon certaines caractéristiques, Sénégal 2018

Caractéristique	Indice Synthétique de Fécondité	Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement enceintes	Nombre moyen d'enfants nés vivants des femmes de 40-49 ans
Résidence			
Urbain	3,2	6,5	4,1
Rural	5,5	9,1	6,4
Région			
Nord	4,5	7,8	5,4
Ouest	3,2	6,7	4,2
Centre	5,5	8,5	6,2
Sud	5,2	10,1	6,1
Niveau d'instruction			
Pas d'instruction	5,7	9,6	6,0
Primaire	3,8	7,7	4,6
Moyen/secondaire ou plus	2,8	5,6	3,2
Quintiles de bien-être économique			
Le plus bas	6,5	10,7	7,1
Second	5,8	8,8	6,5
Moyen	4,3	7,8	5,9
Quatrième	3,4	8,4	4,5
Le plus élevé	2,9	4,9	3,3
Ensemble	4,4	7,9	5,3

Note : L'Indice Synthétique de Fécondité correspond à la période de 1-36 mois précédant l'enquête.

Tableau 5.3 Tendance de la fécondité par âge

Taux de fécondité par âge par période de cinq ans précédant l'enquête, selon les groupes d'âge, Sénégal 2018

Âge de la mère à la naissance	Nombre d'années précédant l'enquête			
	0-4	5-9	10-14	15-19
<15	1	5	5	7
15-19	73	84	94	97
20-24	174	211	207	216
25-29	215	232	245	237
30-34	197	236	259	
35-39	155	202		
40-44	74			

Notes : Les taux de fécondité par groupe d'âges sont exprimés pour 1 000 femmes. Les taux entre crochets sont tronqués. Les taux excluent le mois de l'interview.

Les taux pour les femmes âgées de 10-14 ans pour la période de 0-4 ans sont basés sur des données rétrospectives provenant des femmes âgées de 15-19 ans.

Tableau 5.4 Enfants nés vivants et enfants survivants des femmes

Répartition (en %) de toutes les femmes de 15-49 ans et des femmes de 15-49 ans en union par nombre d'enfants nés vivants, nombre moyen d'enfants nés vivants et nombre moyen d'enfants survivants, par groupe d'âges, Sénégal 2018

Groupe d'âges	Nombre d'enfants nés vivants											Total	Effectif de femmes	Nombre moyen d'enfants nés vivants	Nombre moyen d'enfants survivants
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+				
TOUTES LES FEMMES															
15-19	88,8	9,5	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	2 056	0,13	0,12
20-24	54,1	23,9	14,9	4,9	2,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1 686	0,78	0,73
25-29	21,5	19,1	24,7	18,1	10,9	4,4	1,0	0,2	0,1	0,0	0,0	100,0	1 591	1,96	1,86
30-34	14,5	11,1	14,4	17,8	16,8	11,9	6,2	4,9	1,9	0,3	0,2	100,0	1 387	3,12	2,92
35-39	9,4	7,9	10,2	14,0	13,6	15,2	12,4	8,9	5,4	2,1	0,9	100,0	1 153	4,09	3,80
40-44	5,4	7,1	6,1	8,1	11,7	12,1	16,0	13,9	9,9	5,3	4,3	100,0	868	5,17	4,67
45-49	5,2	6,1	6,3	10,1	6,7	15,4	14,3	12,5	8,6	6,7	8,1	100,0	673	5,41	4,78
Ensemble	36,9	13,3	11,5	9,8	7,9	6,6	5,1	4,0	2,5	1,3	1,1	100,0	9 414	2,32	2,14
FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION															
15-19	56,7	37,0	5,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	427	0,51	0,48
20-24	21,8	37,4	27,2	9,3	3,8	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	847	1,37	1,28
25-29	9,8	20,0	27,7	21,7	13,7	5,6	1,2	0,2	0,1	0,0	0,0	100,0	1 256	2,33	2,21
30-34	7,4	8,9	15,0	19,4	19,1	14,2	7,3	5,9	2,2	0,4	0,2	100,0	1 147	3,53	3,30
35-39	5,5	5,9	9,3	14,7	14,1	16,9	14,0	10,1	6,1	2,4	1,1	100,0	993	4,45	4,14
40-44	2,8	6,4	5,4	8,2	12,6	11,5	16,2	15,1	11,1	5,8	4,7	100,0	768	5,44	4,92
45-49	2,0	4,4	3,6	10,8	6,9	16,4	16,0	14,3	9,0	7,4	9,1	100,0	574	5,85	5,17
Ensemble	12,0	16,0	15,4	14,1	11,6	9,8	7,6	6,1	3,7	1,9	1,7	100,0	6 013	3,38	3,11

Tableau 5.5 Intervalles intergénérisiques

Répartition (en %) des naissances, autres que les naissances de rang un, ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête par nombre de mois écoulés depuis la naissance précédente et nombre médian de mois depuis la naissance précédente, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Mois depuis la naissance précédente						Total	Effectifs de naissances autres que de premier rang	Nombre médian de mois depuis la naissance précédente
	7-17	18-23	24-35	36-47	48-59	60+			
Âge de la mère									
15-19	(15,7)	(27,0)	(56,1)	(0,0)	(1,1)	(0,0)	100,0	37	(26,3)
20-29	4,8	13,4	43,7	21,4	9,1	7,6	100,0	1 688	32,7
30-39	3,2	8,8	35,4	23,1	14,3	15,1	100,0	2 268	36,8
40-49	3,2	6,6	30,5	23,0	15,3	21,3	100,0	646	39,1
Sexe de l'enfant précédent									
Masculin	3,6	10,2	39,0	21,7	11,9	13,7	100,0	2 420	35,1
Féminin	4,2	10,5	36,7	23,0	13,1	12,5	100,0	2 219	35,5
Survie de la naissance précédente									
Vivante	3,0	10,1	38,1	22,9	12,7	13,3	100,0	4 379	35,6
Décédée	18,6	14,4	34,8	12,8	8,6	10,8	100,0	260	30,6
Rang de naissance									
2-3	4,0	10,5	38,8	22,5	11,5	12,8	100,0	2 150	34,8
4-6	3,5	9,6	35,1	22,2	13,9	15,6	100,0	1 787	36,6
7+	4,6	11,7	42,3	22,1	11,6	7,8	100,0	701	32,9
Résidence									
Urbain	3,4	8,9	32,9	21,0	14,7	19,1	100,0	1 624	37,9
Rural	4,2	11,1	40,6	23,0	11,2	9,9	100,0	3 015	34,3
Région									
Nord	4,0	10,9	37,0	22,0	11,8	14,3	100,0	774	35,5
Ouest	4,1	8,3	34,5	21,8	14,5	16,8	100,0	1 352	36,9
Centre	3,5	11,4	39,1	23,3	12,0	10,7	100,0	1 729	34,7
Sud	4,3	10,8	42,1	21,5	10,6	10,8	100,0	785	34,0
Niveau d'instruction de la mère									
Pas d'instruction	4,0	10,7	40,1	22,2	12,1	11,0	100,0	3 190	34,6
Primaire	3,7	9,3	32,8	21,6	13,6	19,0	100,0	937	37,5
Moyen/secondaire ou plus	3,5	10,0	33,8	24,3	12,7	15,7	100,0	512	37,1
Quintiles de bien-être économique									
Le plus bas	4,5	12,3	44,5	22,8	8,8	7,1	100,0	1 182	32,4
Second	4,5	11,6	42,0	21,5	10,6	9,8	100,0	1 055	33,9
Moyen	3,8	9,3	35,5	25,5	12,8	13,2	100,0	892	36,7
Quatrième	1,8	7,5	31,9	22,3	18,5	18,0	100,0	797	39,6
Le plus élevé	4,4	9,8	30,5	18,7	14,0	22,5	100,0	713	38,9
Ensemble	3,9	10,3	37,9	22,3	12,5	13,1	100,0	4 639	35,3

Note : Les naissances de rang 1 sont exclues. L'intervalle pour les naissances multiples est le nombre de mois écoulés depuis la grossesse précédente qui a abouti à une naissance vivante. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Tableau 5.6 Aménorrhée, abstinence et insusceptibilité post-partum

Pourcentage de naissances des trois années ayant précédé l'enquête dont les mères sont en aménorrhée, en abstinence et en insusceptibilité post-partum, selon le nombre de mois depuis la naissance et durées médiane et moyenne, Sénégal 2018

Nombre de mois depuis la naissance	Pourcentage de naissances pour lesquelles les mères sont :			Effectif de naissances
	En aménorrhée	En abstinence	En insusceptibilité ¹	
< 2	92,5	94,2	97,8	200
2-3	74,4	42,4	82,7	175
4-5	70,4	31,2	76,1	172
6-7	53,7	18,8	61,3	221
8-9	50,0	19,9	61,1	227
10-11	44,5	19,6	54,1	227
12-13	38,0	12,3	44,3	226
14-15	41,5	12,9	49,7	187
16-17	32,8	7,7	39,1	194
18-19	19,1	13,9	30,5	206
20-21	14,2	5,3	18,7	224
22-23	9,7	6,3	15,3	212
24-25	4,5	3,8	7,8	204
26-27	2,7	2,7	5,4	147
28-29	0,4	8,2	8,6	155
30-31	1,7	5,3	7,0	169
32-33	3,1	2,1	4,7	225
34-35	4,1	2,6	6,4	224
Ensemble	31,2	17,0	37,5	3 593
Médiane	8,8	3,6	12,7	na
Moyenne	12,1	7,2	14,4	na

Note : Les estimations sont basées sur le statut au moment de l'enquête.

na = Non applicable.

¹ Y compris les naissances pour lesquelles les mères sont encore, soit en aménorrhée, soit en abstinence, (ou les deux), à la suite d'une naissance.

Tableau 5.7 Durée médiane de l'aménorrhée, de l'abstinence post-partum et de l'insusceptibilité post-partum

Nombre médian de mois d'aménorrhée post-partum, d'abstinence post-partum et d'insusceptibilité post-partum à la suite d'une naissance ayant eu lieu au cours des trois années ayant précédé l'enquête selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Aménorrhée post-partum	Abstinence post-partum	Insusceptibilité post-partum ¹
Âge de la mère			
15-29	7,9	3,6	11,8
30-49	10,9	3,5	13,8
Résidence			
Urbain	6,0	3,8	8,7
Rural	12,6	3,4	14,6
Région			
Nord	8,6	3,5	10,0
Ouest	6,0	3,5	8,3
Centre	12,2	2,8	13,2
Sud	12,3	10,1	16,3
Niveau d'instruction			
Pas d'instruction	13,1	3,5	14,4
Primaire	7,2	3,5	8,4
Moyen/secondaire ou plus	4,4	3,6	8,5
Quintiles de bien-être économique			
Le plus bas	13,6	4,6	15,5
Second	12,6	3,0	15,2
Moyen	7,2	3,5	9,5
Quatrième	5,0	3,7	8,6
Le plus élevé	(5,6)	(3,3)	8,1
Ensemble	8,8	3,6	12,7

Note : Les médianes sont basées sur le statut au moment de l'enquête (statut actuel).

¹ Y compris les naissances pour lesquelles les mères sont encore, soit en aménorrhée, soit en abstinence, (ou les deux), ... la suite d'une naissance.

Tableau 5.8 Ménopause Pourcentage de femmes de 30-49 ans qui sont en ménopause, selon l'âge, Sénégal 2018

Groupe d'âges	Pourcentage en ménopause	Effectif de femmes
Âge		
30-34	2,4	1 387
35-39	2,3	1 153
40-41	6,1	392
42-43	6,2	322
44-45	9,4	330
46-47	15,7	267
48-49	28,0	230
Ensemble	5,9	4 082

¹ Le pourcentage de femmes qui 1) ne sont pas enceintes, 2) ont eu une naissance dans les 5 dernières années et ne sont pas en aménorrhée post-partum et 3) celles qui présentent les caractéristiques suivantes : a) les dernières règles ont eu lieu 6 mois ou plus avant l'interview ou b) elles ont déclaré qu'elles étaient en ménopause ou qu'elles avaient eu une hystérectomie ou c) elles n'avaient jamais eu de règles.

Tableau 5.9 Âge à la première naissance

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant déjà donné naissance avant d'atteindre certains âges exacts, pourcentage n'ayant jamais donné naissance et âge médian à la première naissance, selon l'âge actuel, Sénégal 2018

Âge actuel	Pourcentage ayant eu une naissance avant d'atteindre l'âge exact de :					Pourcentage n'ayant jamais donné naissance	Effectif de femmes	Âge médian à la première naissance
	15	18	20	22	25			
15-19	0,8	na	na	na	na	88,8	2 056	a
20-24	2,5	14,9	29,3	na	na	54,1	1 686	a
25-29	2,1	16,4	34,1	51,0	70,1	21,5	1 591	21,9
30-34	3,7	20,6	36,6	52,7	67,9	14,5	1 387	21,6
35-39	1,7	17,9	34,1	48,7	66,4	9,4	1 153	22,2
40-44	3,3	17,8	32,9	49,7	70,3	5,4	868	22,0
45-49	1,0	15,5	34,6	50,7	67,0	5,2	673	21,9
20-49	2,5	17,2	33,4	na	na	22,4	7 358	a
25-49	2,5	17,8	34,6	50,7	68,5	12,9	5 672	21,9

na = Non applicable.

a = Sans objet parce que moins de 50 % de femmes ont donné une naissance avant d'atteindre le début du groupe d'âges.

Tableau 5.10 Âge médian à la première naissance

Âge médian à la première naissance parmi les femmes de 25-49 ans et de 30-49 ans selon certaines caractéristiques, Sénégal 2018

Caractéristique	Âge des femmes	Âge des femmes
	25-49	30-49
Résidence		
Urbain	23,8	23,9
Rural	20,6	20,6
Région		
Nord	21,5	21,5
Ouest	23,9	24,1
Centre	20,8	20,8
Sud	20,1	20,2
Niveau d'instruction		
Pas d'instruction	20,6	20,7
Primaire	22,5	22,9
Moyen/Secondaire ou plus	a	29,0
Quintiles de bien-être économique		
Le plus bas	19,6	19,8
Second	20,4	20,3
Moyen	21,3	21,1
Quatrième	22,7	22,7
Le plus élevé	a	26,7
Ensemble	21,9	21,9

a = Sans objet parce que moins de 50 % de femmes ont donné une naissance avant d'atteindre le début du groupe d'âges.

Tableau 5.11 Fécondité des adolescentes

Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui ont eu une naissance vivante ou qui sont enceintes d'un premier enfant et pourcentage ayant commencé leur vie procréative, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui :		Pourcentage ayant déjà commencé leur vie procréative	Effectif de femmes
	ont eu une naissance vivante	sont enceintes d'un premier enfant		
Âge				
15-17	3,7	2,1	5,7	1 237
15	0,4	0,5	0,9	418
16	2,4	2,1	4,4	463
17	9,1	3,9	13,0	357
18	17,8	6,9	24,7	481
19	29,4	4,9	34,3	338
Résidence				
Urbain	7,0	3,0	10,1	866
Rural	14,2	4,1	18,3	1 190
Région				
Nord	10,3	2,4	12,7	390
Ouest	6,4	2,9	9,3	674
Centre	12,9	3,9	16,7	681
Sud	19,0	6,5	25,5	311
Niveau d'instruction				
Pas d'instruction	20,9	7,1	28,0	541
Primaire	11,9	3,3	15,3	481
Moyen/secondaire ou plus	5,8	2,0	7,8	1 035
Quintiles de bien-être économique				
Le plus bas	19,9	6,1	26,0	363
Second	16,3	3,8	20,1	417
Moyen	10,9	3,8	14,7	465
Quatrième	7,1	3,2	10,3	408
Le plus élevé	2,7	1,6	4,3	404
Ensemble	11,2	3,7	14,9	2 056

Tableau 5.12 Rapports sexuels et comportements en matière de santé reproductive avant l'âge de 15 ans

Parmi les femmes et les hommes de 15-19 ans, pourcentage qui ont commencé leur vie sexuelle, qui étaient en union et qui avaient donné naissance/engendré un enfant avant l'âge de 15 ans, selon le sexe, Sénégal 2018

Sexe	A eu des rapport sexuels avant l'âge de 15ans	En union avant l'âge de 15ans	A donné naissance/enfanté un enfant avant l'âge de 15ans		Effectif
Femmes	5,4	4,6	0,8		2 056
Hommes	3,0	0,0	0,0		861

Résultats clés

- **Désir d'un autre enfant** : Environ huit femmes de 15-49 ans actuellement en union sur dix souhaitent un autre enfant (77 %) : 31 % le désirent dans les deux ans, 42 % souhaitent attendre au moins deux ans et 5 % en souhaitent un autre mais ne savent pas quand.
- **Limitation des naissances** : Parmi les femmes de 15-49 ans actuellement en union, 20 % ne désirent plus avoir d'enfants ou sont stérilisées contre 4 % parmi les hommes en union du même groupe d'âges.
- **Nombre idéal d'enfants** : Le nombre idéal moyen d'enfants pour les femmes de 15-49 ans actuellement en union est de 5,9.
- **Planification de la fécondité** : Parmi les naissances ayant eu lieu au cours des cinq années avant l'enquête, la majorité était désirée et a eu lieu au moment voulu (85 %). Seulement 2 % des naissances n'étaient pas souhaitées.
- **Fécondité désirée** : Le nombre moyen d'enfants désiré est de quatre (4).

Les informations sur les préférences en matière de fécondité peuvent aider les responsables des programmes de planification familiale à connaître le nombre d'enfants désirés, les grossesses qui ne se sont pas produites au moment voulu et celles qui n'étaient pas souhaitées. Ces informations peuvent également permettre d'évaluer la demande contraceptive, qu'elle soit orientée vers l'espacement des naissances ou leur limitation. En outre, les résultats sur les préférences en matière de fécondité peuvent suggérer les tendances de la fécondité dans le futur.

Ce chapitre présente les résultats concernant le souhait d'avoir ou non un enfant, le moment où cet enfant était souhaité et la taille idéale de la famille. Il présente aussi les résultats à la question de savoir si la dernière naissance était ou non désirée. En outre, dans ce chapitre, figure le taux de fécondité désiré théorique, c'est-à-dire si toutes les naissances non voulues avaient été évitées.

6.1 DÉSIR D'AVOIR UN AUTRE ENFANT

Désir d'avoir un autre enfant

On a demandé aux femmes et aux hommes s'ils souhaitaient plus d'enfants et, si oui, combien de temps ils voulaient attendre avant la naissance du prochain enfant. On considère que les femmes et les hommes qui sont stérilisés ne veulent plus d'enfants.

Échantillon : les femmes et les hommes de 15-49 ans actuellement en union

Le désir d'avoir ou non des enfants supplémentaires dépend généralement de l'âge de la femme et du nombre d'enfants actuellement en vie.


Les résultats présentés au **Tableau 6.1** montrent qu'au Sénégal, environ une femme de 15-49 ans, actuellement en union, sur cinq (19 %) a déclaré qu'elle ne désirait plus d'enfants tandis que plus de sept femmes sur dix (77 %) en voulaient un ou un autre. Cependant, parmi l'ensemble des femmes en union, près de la moitié, (42 %) souhaite attendre au moins deux ans pour avoir un enfant et le tiers (31 %) le souhaiterait rapidement. Celles ayant deux enfants voudraient en majorité (58 %) espacer leur prochaine naissance d'au moins deux ans. Ceci reste valable pour les femmes ayant un ou trois enfants mais dans une moindre mesure (57 % et 56 %, respectivement). Si on considère que les indécises ne veulent pas d'enfants tout de suite, ces taux dépassent 60% pour les femmes qui ont entre 1 et 3 enfants, soit près de la moitié de la cible (49 %).

Comme attendu, la proportion de femmes qui ne veulent plus d'enfants augmente régulièrement avec le nombre d'enfants actuellement en vie : elle passe de moins de 1 % chez les femmes qui ont un seul enfant à 8 % à la parité 3; 38 % à la parité 5 et 58 % à la parité 6 ou plus (**Graphique 6.1**). Donc, plus de la majorité des femmes (61 %) c'est-à-dire celles ne voulant plus d'enfants (19 %) et celles désirant retarder d'au moins deux ans la naissance de leurs prochains enfants (42 %), peuvent être considérées comme des candidates potentielles à la planification familiale.

Tendances : Le **Graphique 6.2** présente la tendance, entre 2012-2013 et 2018, du pourcentage de femmes qui ne désirent plus d'enfants selon le nombre d'enfants vivants. On ne constate pas de changements importants, cela quelle que soit la parité.

Graphique 6.1 Femmes 15-49 ans actuellement en union qui ne désirent plus d'enfants

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union qui ne désirent plus d'enfants




Variations par caractéristiques

- La proportion de femmes ne voulant plus d'enfants est légèrement plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural (21 % contre 19 %) (**Tableau 6.2.1**).
- Contrairement à toute attente, on constate que la proportion de femmes qui ne désirent plus d'enfants diminue avec l'augmentation du niveau d'instruction passant de 22 % parmi celles sans aucun niveau d'instruction à 12 % parmi celles ayant un niveau d'instruction moyen/secondaire ou plus.

Graphique 6.2 Désir de limiter le nombre d'enfants par nombre d'enfants vivants : tendance

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ne désirent plus d'enfants



- Les résultats selon les grandes régions montrent que c'est dans l'Ouest et le Centre que la proportion de femmes ne désirant plus d'enfant est la plus élevée (respectivement 22 % et 20 %). En particulier, on remarque qu'à partir de quatre enfants, celles qui ne souhaitent plus d'enfants représentent plus de 35% dans la grande région Ouest contre moins de 20% dans les autres grandes régions.

- Par ailleurs, les résultats concernant les hommes de 15-49 ans en union montrent que plus de neuf hommes sur dix (93 %) souhaiteraient un ou un autre enfant, soit un pourcentage plus élevé que chez les femmes (77 %). En plus, ceux qui souhaiteraient espacer la prochaine naissance de deux ans ou plus (43 %) sont plus nombreux que ceux qui souhaiteraient un enfant rapidement (36 %). Par ailleurs, la proportion d'hommes de 15-49 ans en union ne souhaitant plus d'enfants est beaucoup plus faible que chez les femmes (3 % contre 19 %) (**Tableau 6.1**).

Variations par caractéristiques

- À la différence des femmes, on constate chez les hommes que le désir de ne plus avoir d'enfants ne change pas avec le niveau d'instruction, passant de 3 % à 4 % (**Tableau 6.2.2**).

6.2 TAILLE IDÉALE DE LA FAMILLE

Taille idéale de la famille

On a demandé aux enquêtés qui n'avaient pas d'enfants, « Si vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien en voudriez-vous ? » Aux enquêtés qui avaient des enfants, on a demandé : « Si vous pouviez revenir à l'époque où vous n'aviez pas d'enfants et choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien auriez-vous voulu en avoir ? »


Échantillon : Femmes et hommes de 15-49 ans

L'analyse de la distribution des femmes selon le nombre idéal d'enfants montre que dans l'ensemble, un peu plus du tiers des femmes (35 %), désirent avoir six enfants ou plus. Cette proportion de femmes désirant avoir six enfants ou plus augmente avec le nombre d'enfants actuellement en vie, passant de 22 % chez les femmes sans enfant à 55 % chez les femmes ayant six enfants ou plus (**Tableau 6.3**). Globalement, le nombre moyen idéal d'enfants par femme varie de 5,4 parmi toutes les femmes à 5,9 enfants chez les femmes actuellement en union.

Chez les hommes, le nombre moyen idéal d'enfants est beaucoup plus élevé que chez les femmes : il est de 6,5 parmi tous les hommes et de 8,0 parmi les hommes en union (**Graphique 6.3**). L'opinion des hommes sur la taille idéale de la famille est assez différente de celle des femmes.

Graphique 6.3 Nombre moyen idéal d'enfants parmi les femmes et les hommes de 15-49 ans

Nombre moyen idéal d'enfants parmi les femmes et les hommes de 15-49 ans



Tendances : La taille idéale de la famille n'a pratiquement pas changé au cours des cinq dernières années, que ce soit parmi toutes les femmes ou parmi les femmes en union. Par contre chez les hommes elle a régressé d'environ un demi-point par rapport à 2017.

Variations par caractéristique

- Le nombre idéal d'enfants est légèrement plus bas chez les femmes plus jeunes et augmente avec l'âge des femmes, variant de 5 enfants chez celles de 15-19 ans à 5,9 enfants à 40-44 ans (**Tableau 6.4**). On retrouve cette même tendance chez les hommes, le nombre moyen idéal d'enfants passant de 5,6 enfants parmi ceux de 15-19 ans à 8,6 à 45-49 ans.

- Selon la région de résidence, on constate que le nombre idéal d'enfants chez les femmes varie de 4,8 dans l'Ouest à 6,1 dans le Centre. Chez les hommes, c'est aussi dans le Centre que ce nombre idéal est le plus élevé (7,7) et, dans l'Ouest, qu'il est le plus faible (5,9).
- Que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, le nombre idéal d'enfants diminue avec le niveau d'instruction. Il passe de 6,3 chez les femmes sans instruction à 4,5 parmi celles ayant le niveau moyen/secondaire ou plus. Chez les hommes, il passe respectivement de 8,2 à 5,5.

6.3 PLANIFICATION DE LA FÉCONDITÉ

Planification de la fécondité

Les femmes ont déclaré soit que leur naissance la plus récente était voulue au moment où elle s'est produite (naissance planifiée), ou plus tard (naissance mal planifiée) soit qu'elle n'était pas souhaitée (naissance non désirée).

Échantillon : Grossesses actuelles et naissances des cinq années ayant précédé l'enquête des femmes de 15-49 ans

Le **Tableau 6.5** et le **Graphique 6.4** montrent que la quasi-totalité des naissances (98 %) des cinq dernières années étaient désirées : 85 % ont eu lieu au moment voulu et 13 % étaient voulues plus tard. Les grossesses non désirées représentent 2 %. En termes de besoins de planification familiale, ces résultats signifient que pour 15 % des naissances ayant eu lieu au cours des cinq années précédant l'enquête, les femmes auraient eu besoin d'utiliser la contraception, soit pour éviter l'enfant non désiré (2 %) ou retarder des naissances (13 %).


Tendances : Au cours des cinq dernières années, la proportion de naissances ayant eu lieu au moment voulu a augmenté, passant de 75 % en 2012-2013 à 85 % en 2018. Dans la même période, la proportion de naissances qui ne se sont pas produites au moment voulu a diminué, de 20 % à 13 % de même que la proportion de naissances non désirées est passée de 4 % à 2 %.

Variations par caractéristique

- Les résultats montrent que la proportion de naissances non désirées augmente avec le rang de naissance. Les naissances de rang 1,2 et 3 sont plus désirées que les autres (4 et plus). En effet, 90 % étaient souhaitées et ont eu lieu au moment voulu contre 81 % de celles de rang 4 ou plus.
- Selon l'âge de la mère, on constate que les naissances qui sont les plus désirées sont celles des mères jeunes, puisque la proportion de naissances non désirées passe de moins de 1 % parmi les femmes âgées de moins de 20 ans à 11 % parmi celles de 44-45 ans (**Tableau 6.5**).

Graphique 6.4 Naissances par planification de la grossesse

Répartition (en %) des naissances de femmes de 15-49 ans ayant eu lieu au cours des cinq années précédant l'enquête (y compris la grossesse actuelle) par planification de la grossesse



Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100% en raison des arrondis

6.4 TAUX DE FÉCONDITÉ DÉSIRÉ

Naissances non désirées

Toutes les naissances qui dépassent le nombre d'enfants déclaré comme idéal par la femme.

Naissances désirées

Toutes les naissances dont le nombre est en dessous ou égal au nombre d'enfants déclaré par la femme, comme le nombre idéal.

Taux de fécondité désiré

Nombre moyen d'enfants qu'aurait une femme en fin de vie féconde si elle avait des enfants aux taux de fécondité par âge actuels, en excluant les naissances non désirées.


Échantillon : Femmes de 15-49 ans

La comparaison du taux de fécondité avec celui de la fécondité désirée met en évidence l'impact démographique potentiel de la prévention des naissances non désirées. Si toutes les naissances non désirées étaient évitées, l'ISF des femmes au Sénégal serait de 4 enfants au lieu de 4,4 enfants (**Tableau 6.6**).

Tendances : Entre 2012-2013, 2016 et 2018, le nombre moyen d'enfants par femme est passé respectivement de 5,3 à 4,7 puis 4,4. L'Indice Synthétique de Fécondité Désiré (ISFD) est passé de 4,6 à 4,2 puis 4,0 pour les mêmes périodes. En général, les deux indicateurs ont suivi entre 1986 et 2018 une tendance similaire avec une différence oscillant entre 0,8 enfants et 0,4 en faveur de l'ISF (**Graphique 6.5**).

Graphique 6.5 Fécondité désirée et fécondité actuelle : tendances

Nombre désiré et nombre actuel d'enfants par femme



Variations par caractéristique

- L'ISFD est plus faible en milieu urbain qu'en milieu rural (3,0 contre 5,0).
- Selon la région, l'ISFD varie d'un minimum de 2,9 dans la région Ouest à 5,0 dans la région Centre.
- Le taux de fécondité désirée varie selon le niveau d'instruction de 5,3 parmi les femmes sans niveau d'instruction contre 2,6 parmi celles ayant le niveau moyen/secondaire ou supérieur.
- L'ISFD est près de 6 enfants par femme (5,9) dans le quintile le plus bas est presque la moitié de cette valeur dans le quintile le plus élevé.
- Les variations les plus importantes entre l'ISF et l'ISFD sont notées au niveau des quintiles de pauvreté les plus bas (0,7 et 0,6) et au niveau de la région Centre (0,5).

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur les préférences en matière de fécondité, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 6.1** Préférences en matière de fécondité par nombre d'enfants vivants
- **Tableau 6.2.1** Désir de limiter les naissances : Femmes
- **Tableau 6.2.2** Désir de limiter les naissances : Hommes
- **Tableau 6.3** Nombre idéal d'enfants selon le nombre d'enfants vivants
- **Tableau 6.4** Nombre idéal d'enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques
- **Tableau 6.5** Planification de la fécondité
- **Tableau 6.6** Taux de fécondité désirée

Tableau 6.1 Préférences en matière de fécondité par nombre d'enfants vivants

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans actuellement en union et des hommes de 15-49 ans actuellement en union par désir d'enfants, selon le nombre d'enfants vivants, Sénégal 2018

Désir d'enfants	Nombre d'enfants vivants							Ensemble 15-49	Total 15-59
	0	1	2	3	4	5	6+		
FEMMES									
Veut un autre bientôt ²	88,0	35,7	30,5	29,4	19,9	17,5	12,3	30,9	na
Veut un autre plus tard ³	3,9	56,9	58,1	56,0	49,6	34,1	19,1	41,7	na
Veut un autre, ne sait pas quand	6,6	5,8	5,4	4,1	3,9	3,1	2,7	4,5	na
Indécise	0,0	0,3	0,9	0,8	2,5	2,1	3,3	1,5	na
Ne veut plus d'enfant	0,5	0,6	3,8	8,1	21,7	38,0	58,1	19,1	na
Stérilisé ⁴	0,0	0,1	0,3	0,7	0,3	0,2	1,1	0,5	na
S'est déclarée stérile	1,0	0,5	0,8	0,8	2,0	4,9	3,5	1,8	na
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	na
Effectif	590	1 052	993	913	753	642	1 069	6 013	na
HOMMES									
Veut un autre bientôt ²	80,9	40,1	32,9	29,7	31,7	26,4	22,7	35,8	36,0
Veut un autre plus tard ³	1,9	46,8	56,4	42,2	50,2	51,6	40,5	43,3	38,0
Veut un autre, ne sait pas quand	12,0	11,4	10,0	23,6	9,9	9,0	17,6	14,1	14,6
Indécise	0,0	0,0	0,0	0,7	6,0	5,1	7,7	2,5	3,3
Ne veut plus d'enfant	0,0	1,4	0,6	1,7	2,3	8,0	10,7	3,3	6,7
Stérilisé ⁴	2,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2
S'est déclarée stérile	2,5	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,7	0,7	1,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	125	229	238	248	160	115	205	1 319	1 668

na = Non applicable

¹ Le nombre d'enfants vivants exclut la grossesse actuelle.² Veut une autre naissance dans les deux ans.³ Veut espacer la prochaine naissance de deux ans ou plus.⁴ Y compris la stérilisation féminine et masculine.⁵ Le nombre d'enfants vivants pour les hommes comprend un enfant supplémentaire si l'épouse de l'enquêtée est enceinte (ou si l'une des épouses est enceinte, pour les hommes ayant actuellement plus d'une épouse).**Tableau 6.2.1 Désir de limiter les naissances : Femmes**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union qui ne veulent plus d'enfants, par nombre d'enfants vivants, selon certaines caractéristiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Nombre d'enfants vivants							Total
	0	1	2	3	4	5	6+	
Résidence								
Urbain	0,0	1,1	6,7	13,9	34,2	51,0	66,0	20,6
Rural	0,9	0,4	1,8	4,2	14,5	30,9	56,7	18,9
Région								
Nord	0,0	1,2	3,6	7,8	15,7	29,3	47,5	16,4
Ouest	0,0	0,8	6,4	13,2	35,3	54,7	72,5	22,1
Centre	1,4	0,5	3,1	5,5	17,0	34,5	60,8	20,3
Sud	0,0	0,5	0,3	5,6	15,4	26,3	48,7	15,8
Niveau d'instruction								
Pas d'instruction	1,1	0,7	4,4	4,6	16,2	34,3	57,0	21,8
Primaire	0,0	1,9	2,2	10,1	26,3	50,0	65,7	19,9
Moyen/secondaire ou plus	0,0	0,2	5,4	22,4	57,7	(42,4)	(80,0)	11,7
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	0,0	0,4	2,9	3,2	14,4	20,2	49,8	18,0
Second	1,9	0,0	1,0	3,2	15,6	30,8	60,6	20,5
Moyen	0,8	0,8	0,8	6,9	14,6	35,0	59,5	18,5
Quatrième	0,0	0,8	2,2	4,3	27,0	54,0	62,4	18,9
Le plus élevé	0,0	1,4	10,8	22,7	39,4	60,4	(85,9)	22,2
Ensemble	0,5	0,7	4,1	8,9	22,0	38,2	59,2	19,6

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Les femmes stérilisées ou celles dont le partenaire/mari est stérilisé sont considérées comme ne voulant plus d'enfant.

¹ Le nombre d'enfants vivants inclut la grossesse actuelle

Tableau 6.2.2 Désir de limiter les naissances : Hommes

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans actuellement en union qui ne veulent plus d'enfants, par nombre d'enfants vivants, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Nombre d'enfants vivants							Total
	0	1	2	3	4	5	6+	
Résidence								
Urbain	(7,3)	0,0	0,0	3,1	2,6	(10,4)	8,1	3,2
Rural	0,0	3,3	1,3	0,0	2,0	6,4	11,7	4,0
Région								
Nord	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(3,7)	(0,0)	(7,0)	8,8	3,1
Ouest	*	(3,7)	(1,3)	1,4	*	*	(15,0)	4,1
Centre	0,0	0,0	0,0	1,6	4,9	(3,5)	9,8	3,0
Sud	(0,0)	1,7	0,7	1,9	5,0	(9,9)	10,6	4,4
Niveau d'instruction								
Pas d'instruction	4,6	0,8	1,6	2,0	0,0	10,4	8,4	4,1
Primaire	(0,0)	2,5	0,0	(1,1)	4,4	*	14,1	3,4
Moyen/secondaire ou plus	*	2,1	0,0	(1,8)	*	*	*	2,9
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	(0,0)	1,6	0,7	0,0	(0,0)	(6,5)	9,7	3,6
Second	(0,0)	5,8	(3,2)	(2,7)	(2,5)	*	14,0	6,0
Moyen	*	0,0	0,0	(4,7)	(2,1)	(3,5)	(0,0)	1,6
Quatrième	(7,7)	(1,8)	(0,0)	(0,0)	(2,2)	*	(17,7)	5,4
Le plus élevé	*	(0,0)	*	*	*	*	*	1,6
Ensemble 15-49	2,7	1,7	0,6	1,7	2,3	8,0	10,7	3,6
50-59	*	*	*	(23,0)	(19,0)	(12,0)	23,7	19,4
Ensemble 15-59	2,5	1,7	0,6	4,7	5,7	8,8	17,2	6,9

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. Les hommes stérilisés ou qui ont déclaré à la question concernant le désir d'enfants que leur épouse/partenaire était stérilisée sont considérés comme ne voulant plus d'enfant.

¹ Le nombre d'enfants vivants comprend un enfant supplémentaire si l'épouse/partenaire de l'enquête est enceinte (ou si une des épouses est enceinte, pour les hommes qui ont actuellement plus d'une épouse).

Tableau 6.3 Nombre idéal d'enfants selon le nombre d'enfants vivants

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans par nombre idéal d'enfants et nombre idéal moyen d'enfants pour l'ensemble des enquêtés et pour les enquêtés actuellement en union, selon le nombre d'enfants vivants, Sénégal 2018

Nombre idéal d'enfants	Nombre d'enfants vivants ¹							Total
	0	1	2	3	4	5	6+	
FEMMES								
0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,6	0,0	0,1
1	0,3	0,6	0,0	0,4	0,0	0,1	0,2	0,2
2	4,3	3,5	3,0	1,5	1,6	0,4	0,5	2,8
3	12,7	8,9	4,6	4,4	2,2	3,6	2,5	7,6
4	29,0	27,6	26,7	17,8	15,2	8,6	8,5	22,3
5	20,0	18,3	18,8	18,0	15,3	18,8	9,8	17,7
6+	22,0	27,1	32,8	43,9	51,7	52,0	54,6	34,9
Réponse non numérique	11,7	14,0	14,0	14,0	14,0	15,8	23,9	14,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	3 329	1 359	1 149	1 003	793	672	1 109	9 414
Nombre idéal moyen d'enfants pour :²								
Ensemble	4,8	5,0	5,4	5,7	5,9	6,2	6,8	5,4
Effectif	2 939	1 168	988	863	682	565	844	8 050
Actuellement en union	5,6	5,3	5,6	5,7	5,9	6,3	6,8	5,9
Effectif	492	904	861	789	645	541	811	5 043
HOMMES³								
0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1
2	2,2	3,5	1,8	0,0	0,4	0,4	0,0	1,8
3	9,8	10,6	8,9	1,5	0,8	0,6	0,7	7,9
4	14,7	15,6	14,9	5,8	6,0	4,8	2,1	12,6
5	19,9	16,0	15,0	12,7	17,0	2,8	3,9	16,9
6+	27,2	25,0	26,1	35,7	45,7	38,4	52,9	30,4
Réponse non numérique	25,9	29,4	33,3	44,3	30,2	52,7	40,4	30,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	2 110	285	251	255	165	115	207	3 387
Nombre idéal moyen d'enfants pour :²								
Ensemble	5,9	5,8	6,3	7,9	8,1	8,7	12,2	6,5
Effectif	1 563	201	167	142	115	54	123	2 365
Actuellement en union	7,9	5,9	6,4	8,0	8,1	8,7	12,2	8,0
Effectif	72	157	155	136	114	54	122	812
Nombre idéal moyen d'enfants pour les hommes de 15-59 ans :²								
Ensemble	5,8	5,7	6,2	7,6	7,8	8,4	11,6	6,7
Effectif d'hommes	1 580	212	185	178	138	72	235	2 600
Actuellement en union	7,6	5,9	6,3	7,6	7,8	8,4	11,7	8,1
Effectif	78	166	166	171	137	72	234	1 023

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

¹ Le nombre d'enfants vivants inclut la grossesse actuelle pour les femmes.

² Les moyennes sont calculées en excluant les enquêtés qui ont fourni des réponses non numériques.

³ Pour les hommes, le nombre d'enfants vivants comprend un enfant supplémentaire si l'épouse de l'enquêté est enceinte (ou si l'une des épouses est enceinte si l'homme a actuellement plus d'une épouse).

Tableau 6.4 Nombre idéal d'enfants selon certaines caractéristiques sociodémographique

Nombre idéal moyen d'enfants pour l'ensemble des femmes de 15-49 ans, et des hommes de 15-49 ans selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Nombre moyen	Effectif de femmes ¹
FEMMES		
Groupe d'âges		
15-19	5,0	1 749
20-24	5,1	1 512
25-29	5,4	1 391
30-34	5,7	1 184
35-39	5,6	961
40-44	5,9	702
45-49	5,7	550
Résidence		
Urbain	4,7	4 034
Rural	6,1	4 016
Région		
Nord	5,5	1 165
Ouest	4,8	3 438
Centre	6,1	2 486
Sud	5,7	961
Niveau d'instruction		
Pas d'instruction	6,3	3 477
Primaire	5,2	1 760
Moyen/secondaire ou plus	4,5	2 813
Quintiles de bien-être économique		
Le plus bas	6,6	1 136
Second	6,1	1 387
Moyen	5,6	1 650
Quatrième	5,0	1 791
Le plus élevé	4,5	2 086
Ensemble	5,4	8 050
HOMMES		
Groupe d'âges		
15-19	5,6	625
20-24	6,1	460
25-29	6,2	339
30-34	6,4	309
35-39	7,2	259
40-44	8,0	226
45-49	8,6	148
Résidence		
Urbain	5,7	1 286
Rural	7,4	1 079
Région		
Nord	6,9	417
Ouest	5,9	1 057
Centre	7,7	446
Sud	6,6	446
Niveau d'instruction		
Pas d'instruction	8,9	650
Primaire	6,3	621
Moyen/secondaire ou plus	5,2	1 094
Quintiles de bien-être économique		
Le plus bas	8,2	356
Second	7,3	398
Moyen	6,5	472
Quatrième	5,9	569
Le plus élevé	5,5	570
Ensemble	6,5	2 365

¹ Effectif de femmes et d'hommes ayant donné une réponse non numérique.

Tableau 6.5 Planification de la fécondité

Répartition (en %) des naissances de femmes de 15-49 ans ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête (y compris les grossesses actuelles), par planification de la grossesse, selon le rang de naissance et l'âge de la mère à la naissance de l'enfant, Sénégal 2018

Rang de naissance et âge de la mère à la naissance de l'enfant	Planification de la naissance				Total	Effectif de naissances
	Voulue au moment	Voulue plus tard	Non désirée	Manquant		
Rang de naissance						
1	90,0	8,2	0,7	1,0	100,0	1 609
2	87,1	12,1	0,5	0,2	100,0	1 343
3	85,1	13,6	0,9	0,4	100,0	1 076
4+	80,5	15,2	4,2	0,1	100,0	2 779
Âge de la mère à la naissance de l'enfant						
<20	84,0	13,7	0,7	1,6	100,0	794
20-24	86,7	11,9	0,9	0,5	100,0	1 548
25-29	85,1	14,0	0,7	0,2	100,0	1 854
30-34	84,3	14,0	1,6	0,2	100,0	1 408
35-39	84,3	10,6	5,1	0,0	100,0	852
40-44	81,5	7,1	11,3	0,0	100,0	320
45-49	(64,8)	(5,6)	(29,7)	(0,0)	(100,0)	30
Ensemble	84,8	12,7	2,1	0,4	100,0	6 806

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Tableau 6.6 Taux de fécondité désirée

Indice Synthétique de Fécondité Désirée (ISFD) et Indice Synthétique de Fécondité (ISF) pour les trois années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Taux de fécondité désiré	Taux de fécondité
Résidence		
Urbain	3,0	3,2
Rural	5,0	5,5
Région		
Nord	4,3	4,5
Ouest	2,9	3,2
Centre	5,0	5,5
Sud	4,9	5,2
Niveau d'instruction		
Pas d'instruction	5,3	5,7
Primaire	3,6	3,8
Moyen/secondaire ou plus	2,6	2,8
Quintiles de bien-être économique		
Le plus bas	5,9	6,5
Second	5,2	5,8
Moyen	4,1	4,3
Quatrième	3,1	3,4
Le plus élevé	2,7	2,9
Ensemble	4,0	4,4

Note : Les taux sont basés sur les naissances des femmes de 15-49 ans durant la période 1-36 mois précédant l'enquête. L'ISF est le même que celui présenté au Tableau 5.2.

Résultats clés

- **Utilisation de la contraception** : parmi les femmes de 15-49 ans en union, 27 % utilisaient, au moment de l'enquête, une méthode contraceptive : 25 % une méthode moderne et 2 % une méthode traditionnelle.
- **Méthode moderne utilisée** : les méthodes modernes les plus utilisées par les femmes en union sont les implants (9 %) et les injectables (9 %).
- **Tendance** : La prévalence de la contraception moderne a augmenté de manière continue pendant les dernières années, passant de 16 % en 2012-2013 à 25 % en 2018. Dans la même période, l'utilisation des implants est passée de 3 % à 9 %.
- **Discontinuation contraceptive** : Parmi les épisodes contraceptifs commencés dans les 5 années précédant l'enquête, 32 % ont été discontinués dans les 12 mois. La pilule est la méthode qui connaît le taux de discontinuation le plus élevé (44 %) et la raison de la discontinuation la plus fréquemment citée est le souhait de tomber enceinte (35%).
- **Besoins non satisfaits en matière de PF** : Plus d'une femme de 15-49 ans actuellement en union sur cinq (21 %) a des besoins non satisfaits en matière de planification familiale.
- **Demande en PF satisfaite** : Parmi les femmes en union, 27 % de la demande en planification familiale est satisfaite.

Les couples peuvent utiliser des méthodes contraceptives pour limiter ou espacer le nombre d'enfants. Ce chapitre présente les résultats sur l'utilisation et les sources d'approvisionnement des méthodes contraceptives, le choix informé des méthodes, les taux et les raisons de discontinuation contraceptive. En outre, il présente l'estimation de la demande potentielle en planification familiale ainsi que les résultats concernant le contact des non utilisatrices de la contraception avec des prestataires de planification familiale.

7.1 CONNAISSANCE ET UTILISATION DE LA CONTRACEPTION

Le **Tableau 7.1** présente les pourcentages de femmes et d'hommes qui ont déclaré avoir entendu parler d'au moins une méthode contraceptive. Il montre que la connaissance des méthodes contraceptives est généralisée au Sénégal. Au moins neuf femmes sur dix ont déclaré connaître au moins une méthode contraceptive (94 % des femmes, soit 97 % des femmes en union et 98 % des femmes sexuellement actives). Chez les hommes le pourcentage de connaissance est de 93 %.

Parmi les méthodes modernes, on constate que chez les femmes les injectables (89 %), la pilule (88 %) et les implants (86 %) sont les méthodes les plus connues. Chez les hommes ce sont le condom masculin (92 %), la pilule (72 %) et les injectables (68 %).

En moyenne, les femmes et les hommes de 15-49 ans actuellement en union connaissent respectivement 7,9 et 7,5 méthodes.

En outre, on peut voir au **Tableau 7.2** que la connaissance des méthodes contraceptives est assez élevée quel que soit le sous-groupe de population avec au moins 97 % des femmes et des hommes qui ont déclaré connaître au moins une méthode, sauf pour le groupe des 15-19 ans où le pourcentage de connaissance n'est que de 87 % chez les femmes. La connaissance d'au moins une méthode contraceptive augmente avec le niveau de bien-être économique, passant, chez les femmes, de 92 % dans le plus bas à 100 % dans le plus élevé et, chez les hommes de respectivement 95 % à 100 %.

Prévalence de la contraception

Pourcentage de femmes qui utilisent une méthode contraceptive

Échantillon : Toutes les femmes de 15-49 ans, actuellement en union et les femmes de 15-49 ans non en union et sexuellement actives

Au Sénégal, 19 % des femmes âgées de 15-49 ans utilisent actuellement une méthode contraceptive quelconque, en majorité une méthode moderne (18 %). L'utilisation de la contraception moderne chez les femmes âgées de 15-49 ans augmente avec l'âge de la femme pour atteindre son niveau le plus élevé dans le groupe d'âges 35-39 ans (29 %). À partir de 40 ans, on note une baisse de l'utilisation de la contraception qui passe, pour les méthodes modernes, à 25 % chez les femmes âgées de 40-44 ans et à 24 % chez celles de 45-49 ans.

Chez les femmes de 15-49 ans actuellement en union, 27 % utilisent une méthode contraceptive dont 25 % une méthode moderne. La prévalence selon l'âge suit presque la même tendance que celle observée chez l'ensemble des femmes : un maximum atteint à l'âge de 35-39 ans où le pourcentage d'utilisatrices de méthodes modernes est le plus élevé (31 %), puis une diminution progressive (26 % à 45-49 ans) (**Tableau 7.3**).

Parmi les femmes qui ne sont pas en union et sexuellement actives (**Tableau 7.3**), le pourcentage de celles qui utilisent une méthode de contraception est plus élevée que parmi les femmes en union (45 % contre 27 %). Ces femmes utilisent, en majorité, une méthode moderne (41 %).

Méthodes modernes

Comprennent la stérilisation masculine et féminine, les injectables, le dispositif intra-utérin (DIU), les pilules contraceptives, les implants, le condom masculin et le condom féminin, la méthode des jours fixes (MJF), la méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA) et la pilule du lendemain.

Parmi les méthodes contraceptives modernes utilisées par les femmes en union, les implants (9 %) et les injectables (9 %) sont les méthodes les plus utilisées. Chez les femmes non en union et sexuellement actives ce sont le condom masculin et les implants qui sont le plus utilisés (respectivement 19 % et 12 %) (**Tableau 7.3** et **7.3.1** et **Graphique 7.1**).


Tendances : La comparaison avec les résultats des enquêtes précédentes montre que la prévalence contraceptive moderne parmi les femmes en union continue d'augmenter jusqu'à 2017. En effet, de 16 % en 2012-2013, la prévalence est passée à 21 % en 2015 pour atteindre 26 % en 2017. Les données de 2018 montrent une certaine stabilisation de cette tendance dans les deux dernières années (26 % en 2017 et 25 % en 2018) (**Graphique 7.2**).

Variations par caractéristique

- Les résultats de l'enquête montrent que l'utilisation de la contraception moderne par les femmes en union est plus élevée en milieu urbain (33 %) qu'en milieu rural (20 %) (**Tableau 7.4**).
- L'utilisation de la contraception moderne est plus élevée dans la région Ouest (35 %) et reste faible dans le Sud (18 %).
- La pratique contraceptive moderne augmente avec le quintile de bien-être économique. La prévalence passe de 15 % dans le quintile le plus bas à 35 % dans le quintile le plus élevé. Elle augmente aussi avec le nombre d'enfants vivants de la femme : de 1 % chez les femmes sans enfant à 32 % chez celles ayant cinq enfants ou plus.
- Les femmes de niveau d'instruction primaire utilisent beaucoup plus la contraception moderne (34 % contre 21 % chez celles sans aucun niveau et 29 % chez celles de niveau moyen/secondaire ou plus) (**Tableau 7.4**).


Graphique 7.1 Utilisation contraceptive

Pourcentage de femmes en union de 15-49 ans qui utilisent actuellement une méthode contraceptive



Graphique 7.2 Tendances de l'utilisation contraceptive

Pourcentage de femmes actuellement en union qui utilisent une méthode de contraception



7.2 CONNAISSANCE DE LA PÉRIODE DE FERTILITÉ

Pour être efficaces, certaines méthodes nécessitent, au préalable, une bonne connaissance du cycle menstruel. Pour évaluer cette connaissance, on a demandé à toutes les femmes si elles pensaient qu'au cours du cycle menstruel, il y avait une période pendant laquelle une femme avait plus de chances de tomber enceinte. Le **Tableau 7.5** présente, parmi toutes les femmes de 15-49 ans, les pourcentages de celles qui savent situer correctement la période de fertilité, en fonction de l'âge. Globalement, plus d'une femme sur cinq (22 %) sait situer correctement la période du cycle menstruel où elle a le plus de chances de tomber enceinte. Les variations selon l'âge sont assez irrégulières et on ne note pas de tendance. C'est dans le groupe d'âges 25-29 ans que le pourcentage de femmes qui ont une bonne connaissance du cycle menstruel est le plus élevé (29 % contre 13 % à 15-19 ans) (**Tableau 7.6**).

7.3 SOURCE D'APPROVISIONNEMENT DES METHODES MODERNES

Source d'approvisionnement des méthodes modernes


Endroit où la méthode moderne actuellement utilisée a été obtenue la dernière fois.

Échantillon : Femmes de 15-49 ans utilisant actuellement une méthode moderne de contraception.

Au Sénégal, la principale source d'approvisionnement des utilisatrices de méthodes contraceptives modernes est le secteur public (89 %) pour toutes les méthodes. Dans ce secteur, ce sont les postes de santé qui jouent le rôle le plus important (63 %) ; le rôle des centres de santé du gouvernement n'est pas non plus négligeable puisque 15 % des utilisatrices y ont obtenu leur méthode moderne. Au cours des 5 dernières années, ce pourcentage a augmenté, passant de 37 % en 2010-2011 à 63 % en 2018. Les méthodes comme les implants, les injectables et le DIU s'obtiennent dans plus de 93 % des cas dans le secteur public. Concernant, la pilule, le pourcentage est un peu plus faible (79 %). Le condom masculin, par contre, est essentiellement distribué par le secteur médical privé et essentiellement dans les pharmacies (67 %) (**Tableau 7.7**). Parmi les femmes utilisatrices de méthodes modernes, 9 % se sont approvisionnées par le biais du secteur médical privé. Ces résultats corroborent ceux obtenus en 2017 (**Graphique 7.3**).

Graphique 7.3 Source d'approvisionnement des méthodes modernes de contraception

Répartition (en %) des utilisatrices actuelles de méthodes modernes selon la source d'approvisionnement la plus récente



Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100 % en raison de l'arrondissement.

7.4 CHOIX INFORMÉ

Choix informé

Un choix informé signifie qu'au moment où la femme a commencé l'épisode actuel d'utilisation de la méthode, elle a été informée sur les effets secondaires de la méthode, sur ce qu'il fallait faire en cas d'effets secondaires et sur d'autres méthodes qu'elle pourrait utiliser.

Échantillon : Femmes de 15-49 ans qui utilisent actuellement certaines méthodes modernes de contraception et dont le dernier épisode d'utilisation a commencé dans les 5 années avant l'enquête.

Les résultats de l'enquête montrent que parmi les utilisatrices actuelles de méthodes modernes âgées de 15-49 ans, dont la dernière période d'utilisation a commencé au cours des 5 années ayant précédé l'enquête, 84 % ont été informées sur les effets secondaires possibles ou les problèmes liés à l'utilisation de la méthode. Le pourcentage d'utilisatrices ayant été informées de ce qu'il fallait faire en cas d'effets secondaires est également élevé (82 %) de même que celui des utilisatrices informées, par un agent de santé ou un agent en Planning Familial de l'existence d'autres méthodes qu'elles pourraient utiliser (89 %). Globalement, les femmes utilisatrices actuelles de méthodes modernes qui ont reçu les trois informations représentent 79 % (**Tableau 7.8**).

7.5 DISCONTINUATION DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES

Taux de discontinuation contraceptive

Pourcentage d'épisodes contraceptifs discontinués au cours des 12 mois


Échantillon : Épisodes d'utilisation contraceptive des 5 années avant l'enquête des femmes actuellement âgées de 15-49 ans (une femme a pu avoir plus d'un épisode).

Environ un tiers des femmes (32 %) qui ont commencé à utiliser une méthode contraceptive dans les 5 années avant l'enquête ont abandonné la méthode dans les 12 mois (**Tableau 7.9**). Les taux de discontinuation sont plus élevés pour la pilule (44 %) et les injectables (41 %) que pour les implants (12 %) (**Graphique 7.4**).

Dans l'ensemble, les raisons de discontinuation d'une méthode les plus fréquemment avancées sont le souhait de tomber enceinte (35 %) et les soucis pour la santé / effets secondaires (29 %) (**Tableau 7.10**).

Graphique 7.4 Taux de discontinuation des méthodes contraceptives

Pourcentage d'épisodes contraceptifs discontinués au cours des 12 mois, parmi les femmes de 15-49 ans



7.6 DEMANDE EN PLANIFICATION FAMILIALE

Besoins non satisfaits en matière de planification familiale

Proportion de femmes qui (1) ne sont pas enceintes et ni en aménorrhée post-partum et qui sont considérées comme étant fécondes et qui veulent retarder la venue du prochain enfant de deux années ou plus ou qui ne veulent plus d'enfant mais qui n'utilisent pas de méthode contraceptive, ou (2) dont la grossesse actuelle a été mal planifiée ou est non souhaitée, ou (3) qui sont en aménorrhée post-partum et dont la dernière naissance des deux dernières années était mal planifiée ou non souhaitée.

Échantillon : Toutes les femmes de 15-49 ans, les femmes de 15-49 ans actuellement en union et les femmes de 15-49 ans non en union et sexuellement actives

Demande pour la planification familiale :

Besoins non satisfaits pour la planification familiale + utilisation actuelle de la contraception (n'importe quelle méthode)

Proportion de demande satisfaite :

Utilisation actuelle de la contraception (n'importe quelle méthode)

Besoins non satisfaits + utilisation actuelle de la contraception (n'importe quelle méthode)

Proportion de demande satisfaite par les méthodes modernes :

Utilisation actuelle de la contraception (n'importe quelle méthode moderne)

Besoins non satisfaits + utilisation actuelle de la contraception (n'importe quelle méthode)

La définition des besoins non satisfaits en matière de planification familiale a été révisée pour permettre des comparaisons dans le temps et entre les enquêtes. Les tendances des estimations des besoins non satisfaits présentés ici ont été recalculées en utilisant la définition révisée et elles peuvent donc être légèrement différentes des valeurs présentées dans les rapports précédents.

Environ 21 % des femmes âgées de 15-49 ans, actuellement en union, ont des besoins non satisfaits en matière de planification familiale dont 15 % pour espacer les naissances et 5 % pour les limiter mais ces femmes n'utilisent pas la contraception (**Tableau 7.11.1** et **Graphique 7.5**). Près de trois femmes en union sur dix (27 %) ont des besoins satisfaits en matière de planification familiale c'est-à-dire qu'elles utilisent la contraception. Par conséquent, la demande totale en matière de planification familiale s'élève à 48 % et seulement un peu plus de la moitié de cette demande (53 %) est satisfaite par des méthodes modernes.

Parmi toutes les femmes de 15-49 ans, 14 % ont des besoins non satisfaits, orientés principalement vers l'espacement (10 %) (**Tableau 7.11.2**).

Parmi les femmes non en union sexuellement actives, le pourcentage ayant des besoins non satisfaits est plus élevé (49 %). Un peu moins de la moitié de ces femmes utilisent la contraception (45 %) et, par conséquent, la demande totale s'élève à 94 %. Dans cette catégorie de femmes, 48 % de la demande sont satisfaites et 44 %, par des méthodes modernes.


Tendances : La demande totale en planification a connu une légère augmentation entre 2012-2013 et 2017, passant de 47 % à 50 %. En 2018, elle a connu une baisse de deux points (48 %). Dans la même période, le pourcentage de besoins non satisfaits a diminué passant de 29 % à 21 % et le pourcentage de demande satisfaite par des méthodes modernes a augmenté de manière importante, passant de 34 % en 2012-2013 à 53 % en 2018.

Variations par caractéristique

- Le **Tableau 7.11.1** montre que la demande totale en planification familiale et le pourcentage de demande satisfaite varient selon l'âge des femmes en union. De 28 % chez les femmes à 15-19 ans, la demande totale en planification passe à 54 % à 35-39 ans, puis diminue pour se situer à 46 % chez les femmes de 45-49 ans. Le pourcentage de demande satisfaite est plus faible chez les femmes en union de 15-19 ans (33 %) que chez celles de 35-39 ans (62 %).
- La proportion de femmes actuellement en union et dont les besoins en planification familiale ne sont pas satisfaits est plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain (23 % contre 17 %).
- Les résultats selon le niveau d'instruction montrent que les besoins non satisfaits sont plus élevés chez les femmes en union non instruites que parmi celles qui ont un niveau moyen/secondaire ou plus (23 % contre 17 %).

Graphique 7.5 Demande en matière de planification familiale


Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans actuellement en union selon les besoins en matière de planification familiale



- Le pourcentage de femmes ayant des besoins non satisfaits en planification familiale varie d'un maximum de plus de 24 % dans la région du Nord à un minimum de 16 % dans celle de l'Ouest. Quelle que soit la région, les besoins non satisfaits sont essentiellement orientés vers l'espacement des naissances. Dans la région du Nord où les besoins non satisfaits sont évalués à 24 %, 19 % sont des besoins non satisfaits pour espacer les naissances et seulement 6 % pour les limiter (**Graphique 7.6**).

Graphique 7.6 Besoins non satisfaits en matière de PF pour espacer et pour limiter

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ayant des besoins non satisfaits en matière de PF par région



7.7 PRISE DE DÉCISION SUR LA PLANIFICATION FAMILIALE

Durant l'enquête, on a recueilli des informations sur la prise de décision en matière d'utilisation de la planification familiale auprès de deux catégories de femmes en union, à savoir celles qui utilisent actuellement la contraception et celles qui ne l'utilisent pas actuellement. Parmi les femmes utilisatrices actuelles de la planification familiale, la décision d'utiliser est le plus souvent prise par les deux conjoints (67 %) alors que dans 10 % des cas, elle a été prise par le mari/partenaire. En outre, 20 % des femmes ont pris seules la décision d'utiliser la contraception. Par conséquent, la femme est impliquée dans 87 % des cas dans la décision d'utiliser la planification des naissances (**Tableau 7.12**).

Par contre, on constate que dans certaines régions, le rôle de l'homme dans cette prise de décision est encore important : c'est le cas de la région du Nord où dans 23 % des cas, la décision sur la planification est principalement prise par le mari/partenaire. Par comparaison, cette proportion est de 7 % dans la région de l'Ouest, 9 % dans le Centre et 12 % dans le Sud.

Parmi les femmes en union qui n'utilisent pas actuellement la planification, la décision est uniquement prise par la femme dans 56 % des cas. Dans 20 % des cas, la décision est prise en commun et dans 22 % des cas, c'est principalement l'homme qui décide ne pas utiliser la contraception. La tendance est la même pour toutes les régions où dans plus de 50 % des cas, c'est la femme qui a pris seule la décision, c'est dans la région du Sud que le pourcentage de femmes ayant décidé principalement de ne pas utiliser la contraception est le plus élevé (66 %).

Utilisation future de la contraception

Aux femmes non-utilisatrices, on a aussi posé une question sur leur intention d'utiliser, dans l'avenir, la contraception.

Trois femmes qui n'utilisent pas actuellement de contraception sur cinq n'ont pas l'intention d'utiliser une méthode contraceptive dans le futur (60 %) tandis qu'à l'opposé, 31 % ont l'intention d'en utiliser une ultérieurement et 9 % ne sont pas sûres. Le pourcentage de femmes qui ont déclaré avoir l'intention d'utiliser, dans l'avenir, la contraception augmente jusqu'à la parité 1 (36 %) et diminue légèrement à partir de la parité 2 (**Tableau 7.13**).

7.8 EXPOSITION AUX MESSAGES SUR LA PLANIFICATION FAMILIALE

Le **Tableau 7.14** fournit des informations concernant l'exposition des femmes et des hommes aux messages sur la planification familiale véhiculés par certains médias (radio, télévision et magazine/journal) ou par téléphone portable.

Au Sénégal, les messages de sensibilisation sur la planification familiale passent principalement par la radio et la télévision. Les messages sur la planification familiale ont été entendus à la télévision par 46 % des femmes (28 % chez les hommes de 15-49 ans) suivie de la radio avec une proportion de 42 % (32 % chez les hommes de 15-49 ans). L'exposition aux messages sur la planification familiale par le biais des journaux/magazines et du téléphone portable est très faible soit respectivement 8 % et 1 % (3 % et 0,1 % chez les hommes de 15-49 ans).

En outre, 44 % des femmes de 15-49 ans contre 62 % des hommes de 15-49 ans n'ont ni vu, ni entendu des messages sur la planification familiale, quel que soit le moyen de communication.

Variation selon certaines caractéristiques

- L'analyse des régions montre aussi que les messages de sensibilisation sur la planification familiale n'ont pas atteints leur cible, cela quel que soit le moyen de communication puisque par exemple, dans la région du sud, 59 % des femmes n'ont été exposés à aucun message sur la Planification Familiale (67 % chez les hommes âgés de 15-49 ans) ; dans les régions du nord et du centre, ces pourcentages sont respectivement de 56 % et 54 % (76 % et 74 % chez les hommes âgés de 15-49 ans). C'est dans la région ouest que la proportion de femmes et d'hommes qui n'ont reçu aucun message sur la PF est la plus faible (26 % chez femmes et 45 % chez les hommes).
- Le pourcentage de femmes qui n'ont reçu aucun message sur la planification familiale par le biais des quatre médias est nettement plus élevé en milieu rural (54 % chez les femmes et 71 % chez les hommes) qu'en milieu urbain (respectivement 33 % et 53 %).
- L'exposition aux messages sur la planification familiale varie en fonction du niveau de bien-être économique. Ainsi les proportions de femmes et d'hommes âgés de 15 - 49 ans qui n'ont reçu aucun message par le biais des quatre médias diminuent du quintile le plus bas au plus élevé, passant chez les femmes de 67 % à 27 % et chez les hommes de 73 % à 49 %.
- Parmi les femmes sans aucun niveau d'instruction, 52 % n'ont reçu aucun message sur la planification familiale par le biais des quatre médias contre 41 % parmi celles ayant le niveau primaire et 35 % parmi celles ayant au moins un niveau secondaire.

7.9 CONTACT DES NON UTILISATRICES DE LA CONTRACEPTION AVEC DES PRESTATAIRES DE PLANIFICATION FAMILIALE.

Contact des non-utilisatrices de la contraception avec des prestataires de planification familiale

Les enquêtées ayant discuté de planification familiale au cours des 12 mois avant l'enquête avec un agent de terrain ou durant une visite dans un établissement de santé.


Échantillon : Femmes de 15-49 ans qui n'utilisent pas actuellement de méthode contraceptive

Au cours de l'enquête, on a cherché à savoir si les non utilisatrices de la contraception avaient au moins discuté de la planification familiale avec un agent de terrain ou dans un établissement de santé, au cours des 12 derniers mois ayant précédé l'enquête. Le **Tableau 7.15** et le **Graphique 7.7** présentent les résultats.

La majorité des femmes (87 %) non-utilisatrices de la contraception n'ont parlé de planification familiale ni avec un agent de terrain, ni dans un établissement de santé.

Graphique 7.7 Contact des non-utilisatrices avec les prestataires

Parmi les femmes de 15-49 ans non-utilisatrices de la contraception, pourcentage qui, au cours des 12 derniers mois



Variations par caractéristique

- La proportion de femmes non-utilisatrices n'ayant pas discuté de planification familiale dans un établissement sanitaire ou avec un agent de terrain est plus élevée chez les femmes de 15-19 ans (96 % contre 82 % chez les femmes de 30-34 ans). C'est dans le groupe d'âges 35-39 ans que le pourcentage de femmes qui se tiennent informées sur la planification familiale est le plus élevé puisque 4 % en ont parlé à un agent de santé et 18 % dans un établissement de santé.
- La proportion de femmes non-utilisatrices de la contraception ayant discuté de planification familiale est légèrement plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain. En effet, seulement 3 % en milieu urbain ont discuté avec un agent de terrain et 10 % en ont parlé dans un établissement de santé tandis que ces pourcentages sont respectivement de 4 % et de 12 % en milieu rural.
- Le pourcentage de femmes n'ayant parlé de la planification ni avec un agent de terrain ni dans un établissement de santé augmente avec le niveau d'instruction, variant de 84 % parmi celles n'ayant aucun niveau d'instruction à 87 % parmi celles ayant le niveau primaire et à 90 % parmi celles ayant le niveau moyen/secondaire ou plus (**Tableau 7.15**).

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'information sur la planification familiale, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 7.1** Connaissances des méthodes contraceptives
- **Tableau 7.2** Connaissances des méthodes contraceptives selon certaines caractéristiques sociodémographiques
- **Tableau 7.3** Utilisation actuelle de la contraception selon âge
- **Tableau 7.4** Utilisation de la contraception selon certaines caractéristiques sociodémographiques
- **Tableau 7.5** Connaissance de la période fertilité
- **Tableau 7.6** Connaissance de la période fertilité par âge
- **Tableau 7.7** Sources d'approvisionnement des méthodes modernes de contraception
- **Tableau 7.8** Choix informé de la méthode contraceptive
- **Tableau 7.9** Taux de discontinuation des méthodes contraceptives sur 12 mois
- **Tableau 7.10** Raison de la discontinuation des méthodes contraceptives
- **Tableau 7.11.1** Besoins et demande en matière de planification familiale parmi les femmes actuellement en union
- **Tableau 7.11.2** Besoins et demande en matière de planification familiale de l'ensemble des femmes et des femmes non en union sexuellement actives
- **Tableau 7.12** Prise de décision concernant la planification familiale
- **Tableau 7.13** Utilisation future de la contraception
- **Tableau 7.14** Exposition aux messages sur la planification familiale
- **Tableau 7.15** Contact des non-utilisatrices de la contraception avec des prestataires de planification familiale

Tableau 7.1 Connaissance des méthodes contraceptives

Pourcentage de tous les enquêtés de 15-49 ans, pourcentage d'enquêtés de 15-49 ans actuellement en union et pourcentage d'enquêtés de 15-49 ans qui ne sont pas en union et qui sont sexuellement actifs qui ont entendu parler d'une méthode contraceptive, selon la méthode, Sénégal 2018

Méthode	Femmes			Hommes		
	Ensemble des femmes	Femmes actuellement en union	Femmes non en union sexuellement actives ¹	Ensemble des hommes	Hommes actuellement en union	Hommes non en union sexuellement actifs ¹
N'importe quelle méthode	94,0	97,3	97,9	93,0	98,5	100,0
Une méthode moderne	94,0	97,3	97,9	93,0	98,5	100,0
Stérilisation féminine	63,2	72,6	87,0	40,4	54,6	46,5
Stérilisation masculine	30,2	36,8	27,8	17,3	26,0	15,4
Pilule	88,1	93,2	94,0	72,3	85,9	89,3
DIU	58,8	70,0	69,6	22,9	33,7	21,4
Injectables	88,6	95,1	92,5	67,6	86,9	79,6
Implants	85,6	93,8	93,5	53,7	77,7	57,1
Condom masculin	80,2	83,5	85,6	91,8	97,5	100,0
Condom féminin	44,0	45,8	47,8	52,3	60,9	63,2
Pilule du lendemain	23,4	21,5	52,1	32,8	41,5	54,0
Méthode des jours fixes (MJF)	32,1	39,4	31,6	11,4	17,1	3,1
Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA)	44,9	51,7	58,1	26,1	39,8	20,6
Autre méthode moderne	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Une méthode traditionnelle	50,7	55,2	39,6	60,4	72,3	74,9
Nombre moyen de méthodes connues par les enquêté(e)s de 15-49 ans	7,1	7,9	8,0	5,9	7,5	6,9
Effectif d'enquêté(e)s	9 414	6 013	73	3 387	1 319	82
Nombre moyen de méthodes connues par les enquêtés de 15-59 ans	na	na	na	6,1	7,5	6,7
Effectif d'enquêtés	na	na	na	3 762	1 668	88

na = Non applicable

¹ Sexuellement actif signifie que la personne a eu ses derniers rapports sexuels dans les 30 jours qui ont précédant l'enquête.

Tableau 7.2 Connaissance des méthodes contraceptives selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans, actuellement en union, qui ont entendu parler d'au moins une méthode contraceptive et pourcentage ayant entendu parler d'au moins une méthode moderne, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Femmes			Hommes		
	Ont entendu parler d'une méthode	Ont entendu parler d'une méthode moderne ¹	Effectif	Ont entendu parler d'une méthode	Ont entendu parler d'une méthode moderne ¹	Effectif
Groupe d'âges						
15-19	86,5	86,5	427	*	*	0
20-24	96,8	96,7	847	(94,9)	(94,9)	35
25-29	98,1	98,1	1 256	99,0	99,0	160
30-34	98,6	98,6	1 147	96,8	96,8	272
35-39	98,4	98,4	993	99,3	99,3	333
40-44	98,4	98,4	768	98,7	98,7	303
45-49	98,0	98,0	574	99,6	99,6	217
Résidence						
Urbain	99,5	99,5	2 460	99,6	99,6	591
Rural	95,7	95,7	3 553	97,7	97,7	728
Région						
Nord	98,4	98,3	1 076	98,2	98,2	217
Ouest	99,8	99,8	2 007	100,0	100,0	491
Centre	95,8	95,8	2 092	96,7	96,7	405
Sud	93,3	93,3	838	99,1	99,1	206
Niveau d'instruction						
Pas d'instruction	96,0	96,0	3 605	97,8	97,8	699
Primaire	98,9	98,9	1 323	98,9	98,9	334
Moyen/secondaire ou plus	99,5	99,5	1 085	100,0	100,0	287
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	92,0	91,9	1 213	95,4	95,4	283
Second	95,8	95,8	1 200	100,0	100,0	244
Moyen	99,0	99,0	1 215	98,2	98,2	259
Quatrième	99,8	99,8	1 225	99,6	99,6	280
Le plus élevé	100,0	100,0	1 159	99,9	99,9	252
Ensemble 15-49	97,3	97,3	6 013	98,5	98,5	1 319
50-59	na	na	na	96,9	96,9	349
Total 15-59	na	na	na	98,2	98,2	1 668

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés.

na = Non applicable

¹ Stérilisation féminine, stérilisation masculine, pilule, DIU, injectables, implants, condom masculin, condom féminin, pilule du lendemain, méthode de l'Allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA) d'autres méthodes modernes.

Tableau 7.3 Utilisation actuelle de la contraception selon âge

Répartition (en %) de l'ensemble des femmes de 15-49 ans, des femmes de 15-49 ans actuellement en union et des femmes de 15-49 ans non en union et sexuellement actives, par méthode contraceptive actuellement utilisée et selon l'âge, Sénégal 2018

Groupe d'âges	Une méthode moderne										Une méthode traditionnelle				Effectif de femmes		
	N'importe quelle méthode moderne	Une méthode moderne	Stérilisation féminine	Pilule	DIU	Injec-tables	Implants	Condom masculin	Méthode des jours fixes (MJF)	Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA)	Une méthode traditionnelle	Rythme	Retrait	Autre ¹		N'utilise pas actuel-lement	Total
TOUTES LES FEMMES																	
15-19	3,3	3,2	0,0	0,3	0,0	0,9	1,5	0,5	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	96,7	100,0	2 056
20-24	13,7	12,9	0,0	1,5	0,4	5,6	4,0	1,4	0,1	0,0	0,8	0,1	0,2	0,5	86,3	100,0	1 686
25-29	24,8	22,9	0,0	3,1	0,8	8,7	8,9	1,2	0,0	0,2	1,9	1,2	0,0	0,6	75,2	100,0	1 591
30-34	26,7	25,9	0,3	3,8	2,1	8,9	9,3	1,2	0,3	0,0	0,9	0,5	0,0	0,4	73,3	100,0	1 387
35-39	30,6	28,8	0,2	5,5	3,3	9,2	9,4	0,3	0,9	0,1	1,8	1,0	0,4	0,5	69,4	100,0	1 153
40-44	27,4	24,9	0,7	4,1	3,2	5,7	9,9	0,7	0,6	0,0	2,5	1,3	0,0	1,2	72,6	100,0	868
45-49	25,7	23,5	2,4	3,9	5,1	3,8	6,5	1,1	0,8	0,0	2,2	1,2	0,1	0,9	74,3	100,0	673
Total	19,4	18,2	0,3	2,7	1,6	5,9	6,4	0,9	0,3	0,0	1,2	0,6	0,1	0,5	80,6	100,0	9 414
FEMMES ACTUELLEMENT MARIÉES																	
15-19	9,3	9,1	0,0	1,4	0,0	3,3	3,9	0,4	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,2	90,7	100,0	427
20-24	23,6	22,1	0,0	2,9	0,8	10,6	7,1	0,6	0,1	0,0	1,5	0,2	0,3	1,0	76,4	100,0	847
25-29	28,2	26,4	0,0	3,9	1,0	10,9	10,1	0,2	0,0	0,2	1,8	0,9	0,0	0,8	71,8	100,0	1 256
30-34	28,0	27,0	0,3	4,4	2,5	9,4	9,7	0,4	0,3	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	72,0	100,0	1 147
35-39	33,4	31,3	0,2	6,3	3,4	10,5	9,5	0,2	1,1	0,1	2,1	1,2	0,4	0,5	66,6	100,0	993
40-44	29,2	26,8	0,8	4,4	3,6	6,1	10,3	0,8	0,7	0,0	2,4	1,0	0,0	1,4	70,8	100,0	768
45-49	28,1	25,5	2,7	4,1	5,1	4,4	7,1	1,3	0,9	0,0	2,5	1,5	0,1	0,9	71,9	100,0	574
Total	27,1	25,4	0,5	4,2	2,3	8,7	8,8	0,5	0,4	0,1	1,7	0,8	0,1	0,8	72,9	100,0	6 013

À suivre...

Tableau 7.3—Suite

Age	N'importe quelle méthode	Une méthode moderne										Une méthode traditionnelle			Effectif de femmes										
		Une méthode moderne féminine	Stérilisation masculine	Pilule	DIU	Injectables	Implants	Condom masculin	Condom féminin	Pilule du lendemain	Méthode des jours fixes (MJF)	Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA)	Autre méthode moderne	Une méthode traditionnelle		Rythme	Retrait	Autre ¹	N'utilise pas actuellement	Total					
Ensemble	45,2	41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	12,0	18,7	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	54,8	100,0	73

FEMMES NON EN UNION SEXUELLEMENT ACTIVES¹

Note : Si plus d'une méthode actuelle utilisée, seule la plus efficace est prise en compte dans ce tableau

MJF = Méthode des Jours Fixes.

MAMA = Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée.

¹ Femmes ayant eu des rapports sexuels au cours des 30 jours ayant précédant l'enquête.

Tableau 7.4. Utilisation actuelle de la contraception selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans actuellement en union et des femmes de 15-49 ans non en union sexuellement par méthode contraceptive actuellement utilisée, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Une méthode moderne										Une méthode traditionnelle				Total	Effectif de femmes
	N'importe quelle méthode moderne	Stérilisation féminine	Pilule	DIU	Injectables	Implants	Condom masculin	Méthode des jours fixes (MJF)	Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA)	Une méthode traditionnelle	Rythme	Retrait	Autre ¹	N'utilise pas actuellement		
Nombre d'enfants vivants																
0	1,2	0,0	0,5	0,0	0,1	0,3	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	98,8	100,0	769
1-2	27,0	0,2	4,5	1,1	9,7	9,0	0,5	0,1	0,0	1,8	0,8	0,2	0,8	73,0	100,0	2 000
3-4	31,9	0,6	5,9	2,1	11,3	8,7	0,8	1,1	0,1	1,3	0,8	0,2	0,2	68,1	100,0	1 594
5+	34,8	0,8	3,9	5,0	9,1	12,6	0,3	0,4	0,1	2,6	1,0	0,1	1,6	65,2	100,0	1 650
Résidence																
Urbain	35,4	0,6	6,5	3,2	11,0	10,3	0,9	0,9	0,0	2,0	1,4	0,2	0,3	64,6	100,0	2 460
Rural	21,4	0,3	2,6	1,7	7,2	7,8	0,2	0,1	0,1	1,5	0,4	0,1	1,1	78,6	100,0	3 553
Région																
Nord	23,3	0,5	5,5	1,5	8,8	6,2	0,1	0,1	0,1	0,5	0,2	0,0	0,3	76,7	100,0	1 076
Ouest	37,0	0,6	6,6	3,4	12,0	10,1	1,0	1,0	0,0	2,3	1,8	0,1	0,3	63,0	100,0	2 007
Centre	22,7	0,4	2,4	2,1	7,2	8,2	0,2	0,1	0,1	2,1	0,4	0,2	1,5	77,3	100,0	2 092
Sud	19,4	0,3	1,0	1,3	4,5	10,7	0,5	0,2	0,0	1,0	0,1	0,1	0,8	80,6	100,0	838
Niveau d'instruction																
Pas d'instruction	22,7	0,3	2,4	2,0	8,4	8,0	0,1	0,1	0,1	1,4	0,3	0,1	1,0	77,3	100,0	3 605
Primaire	35,8	0,6	6,7	4,2	9,8	10,3	0,9	1,2	0,0	2,2	1,2	0,4	0,6	64,2	100,0	1 323
Moyen/Secondaire ou plus	31,3	0,9	6,9	1,2	8,6	9,7	1,2	0,7	0,0	2,2	1,9	0,1	0,2	68,7	100,0	1 085
Quintiles de bien-être économique																
Le plus bas	15,5	0,2	0,8	1,6	4,2	7,5	0,2	0,1	0,1	0,9	0,1	0,0	0,8	84,5	100,0	1 213
Second	24,6	0,3	2,6	1,7	8,4	9,4	0,1	0,1	0,1	1,9	0,1	0,2	1,6	75,4	100,0	1 200
Moyen	26,6	0,5	4,1	1,9	9,5	8,5	0,2	0,1	0,0	2,0	1,0	0,2	0,8	73,4	100,0	1 215
Quatrième	31,6	0,2	6,4	2,6	10,1	10,5	0,4	0,2	0,0	1,2	0,8	0,1	0,4	68,4	100,0	1 225
Le plus élevé	37,8	1,1	7,1	3,9	11,5	8,1	1,6	1,8	0,0	2,6	2,1	0,2	0,4	62,2	100,0	1 159
Ensemble	27,1	0,5	4,2	2,3	8,7	8,8	0,5	0,4	0,1	1,7	0,8	0,1	0,8	72,9	100,0	6 013

À suivre...

Table 7.4—Suite

Caractéristique sociodémographique	Une méthode moderne										Une méthode traditionnelle								
	N'importe quelle méthode	Une méthode moderne	Stérili- sation mas- culine	Pilule	DIU	Injec- tables	Implants	Condom mas- culin	Condom féminin	Pilule du lende- main	Méthode des jours fixes (MJF)	Méthode de l'Alaitement Maternel et de l'Améno- rhéa (MAMA)	Autre méthode moderne	Une méthode tradition- nelle	Rythme Retrait	Autre ¹	N'utilise pas actuel- lement	Total	Effectif de femmes
Résidence																			
Urbain	(51,6)	(46,2)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(12,0)	(12,9)	(21,4)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(5,4)	(0,0)	(0,0)	(48,4)	100,0	55
Rural	(25,6)	(25,6)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(3,3)	(9,5)	(10,4)	(0,0)	(0,0)	(2,4)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(74,4)	100,0	18
Ensemble	45,2	41,1	0,0	0,0	0,0	9,8	12,0	18,7	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	54,8	100,0	73

Note : Si plus d'une méthode actuelle utilisée, seule la plus efficace est prise en compte dans ce tableau. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

MJF = Méthode des Jours Fixes,

MAMA = Méthode de l'Alaitement Maternel et de l'Aménorrhée,

¹ Femme ayant eu des rapports sexuels dans les 30 jours précédant l'enquête.

Tableau 7.5 Connaissance de la période de fertilité

	Ensemble des femmes de 15-49 ans
A situé la période fertile :	
Juste avant le début des règles	3,9
Durant les règles	1,8
Juste après la fin des règles	32,9
Au milieu du cycle/entre deux périodes de règles	21,6
Autre	0,0
Pas de moment spécifique	10,2
Ne sait pas	29,6
Manquant	0,0
Total	100,0
Effectif de femmes	9 414

Tableau 7.6 Connaissance de la période de fertilité par âge

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui savent situer correctement la période de fertilité pendant le cycle ovulatoire, selon l'âge, Sénégal 2018

Groupe d'âges	Pourcentage avec une connaissance complète de la période fertile	Effectif de femmes
15-19	12,6	2 056
20-24	25,0	1 686
25-29	29,2	1 591
30-34	20,8	1 387
35-39	20,9	1 153
40-44	24,0	868
45-49	23,0	673
Ensemble	21,6	9 414

Note : Une connaissance correcte de la période de fertilité est définie ainsi : « Au milieu de deux cycles menstruels »

Tableau 7.7 Source d'approvisionnement des méthodes modernes de contraception

Répartition (en %) des utilisatrices actuelles de méthodes modernes de contraception, âgées de 15-49 ans, par source d'approvisionnement la plus récente, selon la méthode, Sénégal 2018

Source de la méthode	Stérilisation féminine	DIU	Injectables	Implants	Pilule	Condom masculin	MJF	Total
Secteur public	(97,7)	93,4	97,6	95,4	79,4	19,9	*	88,9
Hôpital du Gouvernement	(71,3)	4,8	0,8	8,5	1,5	0,0	*	5,1
Centre de santé du Gouvernement	(26,4)	18,0	16,8	15,2	12,6	7,2	*	15,1
Poste de santé	(0,0)	56,8	75,1	64,6	61,8	11,0	*	62,7
Centre PF du Gouvernement	(0,0)	1,3	1,9	1,0	2,1	0,0	*	1,4
Case de santé	(0,0)	3,2	2,3	1,3	1,1	0,0	*	1,7
Pharmacie communautaire	(0,0)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	*	0,0
Strat.avancée/equ. mobile	(0,0)	9,0	0,0	4,2	0,0	0,0	*	2,3
Autre public	(0,0)	0,3	0,7	0,6	0,4	1,2	*	0,6
Secteur médical privé	(2,3)	6,6	2,3	3,8	20,6	67,3	*	9,2
Hôpital/clinique privé	(2,3)	6,6	1,7	3,8	6,8	0,0	*	3,5
Pharmacie	(0,0)	0,0	0,6	0,0	13,3	67,3	*	5,6
Médecin privé	(0,0)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*	0,0
Dispensaire religieux	(0,0)	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	*	0,1
Autre source	(0,0)	0,0	0,1	0,0	0,0	9,2	*	1,2
Ami/parent	(0,0)	0,0	0,1	0,0	0,0	9,2	*	1,2
Autre	(0,0)	0,0	0,0	0,8	0,0	3,6	*	0,7
Ne sait pas	(0,0)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*	0,0
Manquant	(0,0)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*	0,0
Total	(100,0)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*	100,0
Effectif de femmes	28	149	553	607	258	86	27	1 709

Note : L'ensemble inclut d'autres méthodes modernes mais exclut la Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA). Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

MJF = Méthode des Jours Fixes.

Tableau 7.8 Choix informé de la méthode contraceptive

Parmi les utilisatrices actuelles de certaines méthodes modernes, âgées de 15-49 ans, dont la dernière période d'utilisation d'une méthode a commencé dans les 5 années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant été informé de possibles effets secondaires ou de problèmes liés à l'utilisation de cette méthode, pourcentage ayant été informé sur ce qu'il fallait faire en cas d'effets secondaires, pourcentage ayant été informé sur l'existence d'autres méthodes qu'elles pourraient utiliser et pourcentage ayant reçu les 3 types d'information, selon la méthode et la source initiale de la méthode, Sénégal 2018

Méthode/source	Parmi les utilisatrices actuelles de méthodes modernes dont la dernière période d'utilisation a commencé au cours des cinq années ayant précédé l'enquête :				Effectif de femmes
	Pourcentage ayant été informé de possibles effets secondaires ou de problèmes liés à l'utilisation de cette méthode	Pourcentage ayant été informé de ce qu'il fallait faire en cas d'effets secondaires	Pourcentage ayant été informé par un agent de santé ou un agent en planification familiale d'autres méthodes qui pourraient être utilisées	Pourcentage qui a été informés des trois (Indice d'information sur la méthode)	
Méthode					
Stérilisation féminine	*	*	*	*	12
Pilule	81,1	78,1	90,7	77,2	231
DIU	84,3	82,9	89,5	78,4	127
Injectables	84,2	81,6	90,6	79,0	523
Implants	84,6	82,8	87,9	78,9	555
Source initiale de la méthode¹					
Secteur public	83,8	81,5	89,3	78,2	1 346
Hôpital du Gouvernement	78,8	78,8	79,1	75,2	70
Centre de santé du Gouvernement	86,6	85,8	94,1	83,1	224
Poste de santé	83,1	80,3	89,7	77,4	935
Centre PF du Gouvernement	(90,8)	(90,8)	(96,8)	(89,9)	27
Case de santé	*	*	*	*	26
Strat.avancée/equ.mobile	87,9	83,9	79,3	76,5	45
Autre public	*	*	*	*	17
Hôpital/clinique privé	(91,4)	(89,7)	(99,0)	(89,7)	62
Pharmacie	*	*	*	*	35
Médecin privé	*	*	*	*	1
Dispensaire religieux	*	*	*	*	2
Ensemble	83,8	81,5	89,4	78,5	1 448

Note : Le tableau n'inclut que les méthodes figurant sur la liste. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés.

¹ Source au moment où a commencé l'Episode d'utilisation de la méthode actuelle.

Tableau 7.9 Taux de discontinuation des méthodes contraceptives sur 12 mois

Parmi les épisodes d'utilisation contraceptive ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête, pourcentage d'épisodes discontinués dans les 12 mois, selon la raison de discontinuation et de la méthode, Sénégal 2018

Méthode	Échec de la méthode	Souhaitait tomber enceinte	Autres raisons liées à la fécondité ²	Effets secondaires/raisons liées à la santé	Souhaitait une méthode plus efficace	Autres raisons liées à la méthode ³	Autres raisons	N'importe quelle raison ⁴	A changé pour une autre méthode ⁵	Nombre d'épisodes d'utilisation ⁶
DIU	(3,6)	(0,6)	(3,4)	(3,9)	(2,0)	(0,1)	(1,3)	(14,9)	(1,8)	176
Injectables	1,5	6,5	8,3	18,1	1,2	0,9	4,2	40,7	5,1	1 251
Implants	0,4	1,9	0,1	6,0	0,1	0,2	3,5	12,2	3,0	811
Pilule	2,0	8,9	14,9	12,3	1,4	1,2	3,6	44,4	6,2	599
Autre ¹	6,9	6,8	3,5	0,8	6,8	1,4	4,4	30,6	4,4	323
Toutes les méthodes	2,0	5,5	6,7	11,4	1,6	0,8	3,7	31,7	4,5	3 160

Note : Les valeurs sont basées sur des calculs de table de survie en utilisant les informations sur les épisodes d'utilisation qui ont eu lieu 3-62 mois avant l'enquête. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

¹ Y compris : stérilisation féminine, stérilisation masculine, méthode du rythme, retrait, autres méthodes traditionnelles, autres méthodes modernes, condom masculin, condom féminin, méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA), contraception d'urgence, méthode des jours fixes.

² Inclut rapports sexuels peu fréquents/mari absent, difficulté à tomber enceinte/ménopause et dissolution de l'union/séparation.

³ Inclut difficultés d'accès/trop éloigné, coût trop élevé et utilisation peu pratique.

⁴ Les raisons de discontinuation sont mutuellement exclusives et leur somme correspond au total dans cette colonne.

⁵ On considère qu'une femme a changé de méthode si elle a utilisé une méthode différente au cours du mois suivant la discontinuation ou si elle a donné comme raison de discontinuation qu'elle "souhaitait une méthode plus efficace" et qu'elle a commencé à utiliser une autre méthode dans les deux mois qui ont suivi la discontinuation.

⁶ Tous les épisodes d'utilisation qui ont lieu dans les 5 années sont inclus. Les épisodes d'utilisation incluent les épisodes qui ont été discontinués pendant la période d'observation ainsi que les épisodes d'utilisation qui n'ont pas été discontinués durant la période d'observation.

Tableau 7.10 Raisons de la discontinuation des méthodes contraceptives

Répartition (en %) des discontinuations de méthodes contraceptives dans les 5 années ayant précédé l'enquête par raison principale de discontinuation, selon la méthode spécifique, Sénégal 2018

Raison	DIU	Injectables	Implants	Pilule	Condom masculin	Autre	Toutes les méthodes
Est tombée enceinte pendant l'utilisation	(10,8)	3,1	0,9	4,9	(10,0)	22,6	4,8
Voulait tomber enceinte	(30,1)	35,6	38,0	34,4	(19,7)	28,8	35,0
Mari/partenaire désapprouvait	(1,6)	3,2	9,6	4,7	(10,0)	4,6	5,2
Souhaitait une méthode plus efficace	(5,7)	3,2	2,4	3,3	(19,7)	17,4	4,3
Soucis pour la santé/effets secondaires	(24,7)	33,9	38,2	24,6	(0,0)	3,8	29,3
Manque d'accès/trop loin	(0,0)	0,2	0,0	0,2	(0,0)	0,0	0,1
Coûte trop cher	(0,0)	0,5	0,3	1,1	(0,0)	0,0	0,6
Peu pratique à utiliser	(0,4)	1,5	0,8	1,5	(7,3)	1,6	1,4
Cela dépend de Dieu/fataliste	(2,0)	0,2	0,2	0,5	(0,0)	0,5	0,3
Difficultés pour tomber enceinte/ménopause	(1,6)	0,2	0,5	0,0	(0,0)	0,0	0,2
Rapports sexuels peu fréquents/mari éloigné	(7,1)	11,1	1,8	18,0	(10,8)	6,2	10,8
Dissolution de l'union/séparation	(2,2)	2,1	1,0	3,2	(2,7)	1,8	2,2
Autre	(13,9)	5,1	6,2	3,7	(10,4)	12,7	5,6
Ne sait pas	(0,0)	0,0	0,0	0,0	(9,5)	0,0	0,2
Manquant	(0,0)	0,0	0,0	0,0	(0,0)	0,0	0,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nombre de discontinuations	59	943	345	531	35	77	2 049

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Tableau 7.11.1 Besoins et demande en matière de planification familiale parmi les femmes actuellement en union

Pourcentage de femmes de 15-49 ans, actuellement en union, ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, pourcentage dont les besoins en matière de planification familiale sont satisfaits, demande totale en planification familiale et pourcentage de la demande en planification familiale qui est satisfaite, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Besoins non satisfaits en matière de planification familiale			Besoins satisfaits en matière de planification familiale (utilisation actuelle)			Demande totale en planification familiale ¹			Effectif de femmes	Pourcentage de demande satisfaite ²	Pourcentage de demande satisfaite par des méthodes modernes ³
	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total			
Groupe d'âges												
15-19	18,9	0,0	18,9	9,1	0,2	9,3	28,1	0,2	28,3	427	33,0	32,0
20-24	21,2	0,4	21,6	23,6	0,1	23,6	44,8	0,4	45,2	847	52,2	48,8
25-29	20,0	0,9	20,9	27,1	1,1	28,2	47,1	1,9	49,0	1 256	57,4	53,8
30-34	19,0	2,9	21,9	23,6	4,4	28,0	42,6	7,3	49,9	1 147	56,1	54,0
35-39	13,1	7,1	20,2	20,1	13,4	33,4	33,1	20,5	53,6	993	62,4	58,4
40-44	6,4	14,3	20,7	6,6	22,6	29,2	13,0	36,9	49,9	768	58,5	53,6
45-49	1,8	15,8	17,6	1,8	26,2	28,1	3,6	42,1	45,7	574	61,4	55,9
Résidence												
Urbain	11,6	5,2	16,8	24,6	10,8	35,4	36,2	16,0	52,2	2 460	67,9	64,1
Rural	17,9	5,4	23,3	14,2	7,2	21,4	32,1	12,6	44,7	3 553	47,9	44,5
Région												
Nord	18,6	5,7	24,3	17,1	6,2	23,3	35,7	11,9	47,6	1 076	48,9	47,8
Ouest	10,2	5,4	15,6	25,5	11,5	37,0	35,7	16,9	52,6	2 007	70,4	66,0
Centre	17,3	5,2	22,5	14,5	8,2	22,7	31,9	13,4	45,3	2 092	50,2	45,7
Sud	18,0	4,9	23,0	13,2	6,2	19,4	31,2	11,1	42,4	838	45,8	43,4
Niveau d'instruction												
Pas d'instruction	16,6	6,2	22,8	14,5	8,2	22,7	31,2	14,4	45,5	3 605	49,9	46,8
Primaire	12,2	4,9	17,1	24,1	11,7	35,8	36,3	16,6	52,9	1 323	67,7	63,6
Moyen/secondaire ou plus	14,6	2,8	17,4	24,6	6,7	31,3	39,2	9,5	48,7	1 085	64,3	59,7
Quintiles de bien-être économique												
Le plus bas	18,2	5,9	24,1	9,9	5,7	15,5	28,1	11,5	39,6	1 213	39,2	37,0
Second	17,9	5,4	23,3	16,7	7,8	24,6	34,6	13,2	47,8	1 200	51,3	47,4
Moyen	18,4	5,1	23,5	18,6	8,1	26,6	37,0	13,2	50,2	1 215	53,1	49,2
Quatrième	11,8	4,6	16,4	22,7	8,9	31,6	34,5	13,5	48,1	1 225	65,8	63,2
Le plus élevé	10,0	5,6	15,5	24,6	13,1	37,8	34,6	18,7	53,3	1 159	70,9	66,0
Ensemble	15,3	5,3	20,6	18,5	8,7	27,1	33,8	14,0	47,7	6 013	56,9	53,3

Note : Les valeurs figurant dans ce tableau sont basés sur la définition envisagée des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, décrite dans Bradley et al, 2012.

¹ La demande totale Equivaut À la somme des besoins non satisfaits et des besoins satisfaits.

² Le pourcentage de demande satisfaite Equivaut aux besoins satisfaits divisés par la demande totale.

³ Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine, la stérilisation masculine, la pilule, le DIU, les injectables, les implants, le condom masculin, le condom féminin, la pilule du lendemain, la Méthode des Jours Fixes (MJF), la Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA) et d'autres méthodes modernes.

Tableau 7.11.2 Besoins et demande en matière de planification familiale de l'ensemble des femmes et pour les femmes non sexuellement actives

Pourcentage de toutes les femmes de 15-49 ans et des femmes de 15-49 ans, non en union sexuellement actives, ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, pourcentage dont les besoins en matière de la planification familiale sont satisfaits, demande totale en planification familiale et pourcentage de la demande en planification familiale qui est satisfaite, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Besoins non satisfaits en matière de planification familiale			Besoins satisfaits en matière de planification familiale (utilisation actuelle)			Demande totale en planification familiale ¹			Effectif de femmes	Pourcentage de demande satisfaite ²	Pourcentage de demande satisfaite par des méthodes modernes ³
	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total			
ENSEMBLE DES FEMMES												
Groupe d'âges												
15-19	5,0	0,0	5,0	3,2	0,0	3,3	8,3	0,0	8,3	2 056	39,4	38,1
20-24	11,6	0,2	11,8	13,6	0,1	13,7	25,2	0,3	25,5	1 686	53,7	50,6
25-29	16,4	0,7	17,1	23,8	1,0	24,8	40,2	1,7	41,9	1 591	59,2	54,7
30-34	16,4	2,4	18,8	23,1	3,7	26,7	39,4	6,1	45,5	1 387	58,7	56,8
35-39	11,3	6,1	17,4	18,6	12,0	30,6	29,9	18,2	48,1	1 153	63,7	59,9
40-44	5,7	12,7	18,3	6,5	20,9	27,4	12,2	33,6	45,7	868	59,9	54,5
45-49	2,4	13,5	16,0	2,2	23,6	25,7	4,6	37,1	41,7	673	61,7	56,4
Résidence												
Urbain	7,2	2,8	10,1	16,3	6,3	22,6	23,5	9,2	32,7	4 518	69,2	65,2
Rural	13,4	3,9	17,3	11,1	5,4	16,5	24,5	9,3	33,8	4 896	48,8	45,4
Région												
Nord	13,1	3,9	17,0	12,0	4,3	16,3	25,1	8,2	33,3	1 565	49,0	48,0
Ouest	6,4	2,9	9,3	16,8	6,8	23,6	23,2	9,7	32,9	3 725	71,8	67,3
Centre	12,9	3,8	16,7	10,9	6,1	17,0	23,8	9,9	33,7	2 870	50,5	46,1
Sud	13,7	3,3	17,0	12,2	4,2	16,4	25,9	7,5	33,4	1 254	49,1	46,3
Niveau d'instruction												
Pas d'instruction	14,2	5,2	19,4	13,0	7,1	20,1	27,2	12,3	39,5	4 304	50,8	47,9
Primaire	8,8	3,1	12,0	17,9	7,7	25,6	26,8	10,8	37,6	2 070	68,2	64,5
Moyen/secondaire ou plus	6,2	1,0	7,2	11,5	2,8	14,3	17,7	3,8	21,5	3 040	66,5	60,9
Quintiles de bien-être économique												
Le plus bas	15,2	4,7	19,9	8,7	4,6	13,4	24,0	9,4	33,3	1 508	40,2	37,9
Second	13,9	3,9	17,8	13,1	5,8	19,0	27,0	9,7	36,7	1 659	51,6	47,6
Moyen	12,4	3,3	15,6	13,4	5,3	18,7	25,7	8,6	34,3	1 908	54,4	50,3
Quatrième	7,5	2,8	10,2	17,3	5,6	22,9	24,8	8,3	33,1	2 065	69,1	66,7
Le plus élevé	5,8	2,8	8,7	14,0	7,3	21,3	19,8	10,1	29,9	2 273	71,0	65,6
Ensemble	10,4	3,4	13,8	13,6	5,8	19,4	24,0	9,2	33,3	9 414	58,4	54,7
FEMMES PAS SEXUELLEMENT ACTIVE⁴												
Ensemble	48,2	0,3	48,5	40,6	4,6	45,2	88,9	4,9	93,8	73	48,2	43,9

Note : Les valeurs figurant dans ce tableau sont basés sur la définition envisagée des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, décrite dans Bradley et al, 2012

¹ La demande totale équivaut à la somme des besoins non satisfaits et des besoins satisfaits

² Le pourcentage de demande satisfaite équivaut aux besoins satisfaits divisés par la demande totale

³ Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine, la stérilisation masculine, la pilule, le DIU, les injectables, les implants, le condom masculin, le condom féminin, la pilule du lendemain, la Méthode des Jours Fixes (MJF), la Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA) et d'autres méthodes modernes

⁴ Femmes qui ont eu des rapports sexuels dans les 30 jours qui ont précédé l'enquête

Tableau 7.12 Prise de décision concernant la planification familiale

Parmi les femmes de 15-49 ans, actuellement en union et utilisatrices actuelles de la planification familiale, répartition (en%) en fonction de la personne qui prend la décision d'utiliser la planification familiale ; parmi les femmes actuellement en union qui n'utilisent pas actuellement la planification familiale, répartition (en %) en fonction de la personne qui prend la décision de ne pas utiliser la planification familiale, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Parmi les femmes actuellement en union qui sont des utilisatrices actuelles de la planification					Effectif de femmes	Parmi les femmes actuellement en union qui ne sont pas des utilisatrices actuelles de la planification					Effectif de femmes	
	Principalement la femme	La femme et le mari/partenaire ensemble	Principalement le mari/partenaire	Autre/ne sait pas/manquant	Total		Principalement la femme	La femme et le mari/partenaire ensemble	Principalement le mari/partenaire	Autre/ne sait pas/manquant	Total		
Groupe d'âges													
15-19	13,5	67,1	17,6	1,7	100,0	40	48,5	19,5	29,8	2,2	100,0	300	
20-24	8,8	71,2	17,3	2,8	100,0	200	49,9	23,7	24,1	2,3	100,0	500	
25-29	11,9	77,8	8,9	1,4	100,0	354	51,2	23,7	23,0	2,1	100,0	723	
30-34	22,0	66,0	9,8	2,2	100,0	321	56,3	20,6	21,4	1,6	100,0	666	
35-39	26,3	63,5	8,2	2,0	100,0	332	60,5	19,0	18,6	1,8	100,0	564	
40-44	22,3	60,9	11,8	5,0	100,0	224	64,6	14,5	18,0	2,9	100,0	509	
45-49	32,4	56,1	7,0	4,5	100,0	161	60,3	16,8	19,7	3,2	100,0	408	
Nombre d'enfants vivants													
0	*	*	*	*	*	9	60,3	24,7	12,2	2,8	100,0	581	
1-2	11,8	74,4	11,0	2,8	100,0	540	54,2	23,0	21,5	1,3	100,0	1 197	
3-4	20,6	68,2	9,6	1,7	100,0	508	54,5	19,5	23,4	2,6	100,0	929	
5+	26,9	59,3	10,5	3,3	100,0	575	57,2	14,1	26,1	2,6	100,0	964	
Résidence													
Urbain	18,5	71,5	8,3	1,7	100,0	871	60,0	22,9	15,2	1,9	100,0	1 311	
Rural	21,6	61,9	12,8	3,7	100,0	761	53,9	18,4	25,3	2,4	100,0	2 360	
Région													
Nord	16,8	57,5	22,8	3,0	100,0	251	51,6	12,2	32,1	4,1	100,0	704	
Ouest	18,7	72,3	6,8	2,1	100,0	743	58,9	22,7	17,2	1,3	100,0	1 028	
Centre	20,3	67,0	8,8	3,8	100,0	476	51,9	24,9	21,7	1,5	100,0	1 377	
Sud	29,4	57,4	12,0	1,2	100,0	162	66,4	13,3	16,8	3,5	100,0	562	
Niveau d'instruction													
Pas d'instruction	19,7	64,7	12,1	3,4	100,0	819	54,5	18,8	24,7	2,0	100,0	2 376	
Primaire	22,0	66,0	9,6	2,4	100,0	474	60,6	15,7	20,7	2,9	100,0	698	
Moyen/secondaire ou plus	17,7	74,0	7,2	1,1	100,0	340	56,9	29,9	10,7	2,5	100,0	597	
Quintiles de bien-être économique													
Le plus bas	26,5	57,1	12,5	4,0	100,0	188	53,0	15,8	29,0	2,2	100,0	868	
Second	21,6	59,2	14,9	4,3	100,0	295	56,9	15,7	25,3	2,1	100,0	766	
Moyen	21,9	61,1	15,0	2,0	100,0	324	52,4	22,4	22,3	2,9	100,0	752	
Quatrième	16,3	74,1	7,0	2,5	100,0	388	58,4	22,8	16,4	2,4	100,0	674	
Le plus élevé	17,8	74,7	5,9	1,5	100,0	438	61,1	25,6	11,9	1,4	100,0	611	
Ensemble	19,9	67,0	10,4	2,7	100,0	1 632	56,0	20,0	21,7	2,2	100,0	3 671	

Note : Dans ce tableau, les femmes qui sont actuellement enceintes sont exclues. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés.

Tableau 7.13 Utilisation future de la contraception

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans, actuellement en union qui n'utilisent pas de méthode contraceptive par intention d'utiliser, selon le nombre d'enfants vivants, Sénégal 2018

Intention d'utiliser dans le futur	Nombre d'enfants vivants ¹					Total
	0	1	2	3	4+	
A l'intention d'utiliser	17,9	35,6	33,3	30,8	31,9	30,8
Pas sûre	20,0	9,8	8,9	6,7	6,2	9,2
N'a pas l'intention d'utiliser	62,1	54,6	57,7	62,5	61,9	60,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes	581	823	682	625	1 669	4 381

¹ Y compris la grossesse actuelle

Tableau 7.14 Exposition aux messages sur la planification familiale

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui ont entendu ou vu un message sur la planification familiale à la radio, à la télévision, dans un journal ou un magazine, ou sur un téléphone portable au cours des derniers mois, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Femme						Homme					
	Radio	Télévision	Journaux/ magazines	Mobile phone	Aucun des quatre médiats	Effectif de femmes	Radio	Télévision	Journaux/ magazines	Mobile phone	Aucun des quatre médiats	Effectif d'hommes
Groupe d'âges												
15-19	25,6	29,1	4,9	0,3	64,2	2 056	11,0	10,0	0,2	0,0	84,8	861
20-24	42,1	49,2	12,7	1,0	41,8	1 686	28,2	25,5	3,2	0,1	63,5	604
25-29	46,9	51,3	11,6	1,0	37,1	1 591	37,9	30,4	8,5	0,2	56,3	469
30-34	46,8	50,7	5,7	1,0	37,6	1 387	46,4	36,3	3,9	0,1	47,9	452
35-39	49,4	50,6	8,4	1,3	38,1	1 153	41,5	40,4	3,5	0,0	48,8	405
40-44	49,1	48,3	7,1	1,1	39,0	868	45,9	39,8	4,1	0,0	49,7	351
45-49	52,5	52,6	7,5	0,4	33,8	673	44,6	34,9	3,6	0,0	52,0	245
Résidence												
Urbain	48,2	61,7	14,7	1,2	33,1	4 518	39,1	38,1	5,5	0,1	52,5	1 659
Rural	36,8	31,0	2,5	0,5	54,1	4 896	25,6	17,6	1,4	0,0	70,7	1 728
Région												
Nord	32,0	33,1	3,6	0,2	55,9	1 565	19,2	16,1	1,4	0,0	75,8	553
Ouest	55,3	66,6	16,6	1,3	26,4	3 725	45,8	44,0	5,8	0,0	44,9	1 340
Centre	34,2	34,4	1,8	0,5	53,8	2 870	22,2	13,6	0,7	0,1	74,4	971
Sud	35,0	25,4	4,8	0,9	58,8	1 254	29,7	23,8	4,6	0,2	66,9	523
Niveau d'instruction												
Pas d'instruction	39,1	35,2	0,8	0,3	51,5	4 304	27,9	20,3	0,2	0,0	68,5	1 250
Primaire	44,3	50,4	5,7	0,7	41,3	2 070	31,1	24,7	0,8	0,0	64,2	855
Moyen/secondaire ou plus	45,5	57,4	20,9	1,7	35,1	3 040	37,1	36,7	8,3	0,1	53,7	1 282
Quintiles de bien-être économique												
Le plus bas	30,9	10,2	1,3	0,1	67,2	1 508	27,0	12,7	1,2	0,0	72,6	588
Second	39,0	26,0	2,4	0,5	54,3	1 659	28,6	17,3	1,4	0,1	67,9	611
Moyen	39,3	48,9	3,8	0,5	44,8	1 908	26,8	25,1	1,3	0,1	66,9	680
Quatrième	45,3	59,2	8,5	0,8	36,5	2 065	36,3	34,3	3,4	0,1	56,2	812
Le plus élevé	52,0	68,8	21,1	1,9	27,1	2 273	40,4	44,0	9,2	0,0	48,9	696
Ensemble 15-49	42,3	45,7	8,4	0,8	44,0	9 414	32,2	27,6	3,4	0,1	61,8	3 387
50-59	na	na	na	na	na	0	46,8	39,2	6,0	0,0	47,2	375
Ensemble 15-59	na	na	na	na	na	0	33,7	28,8	3,7	0,1	60,3	3 762

na = Non applicable

Tableau 7.15 Contact des non-utilisatrices de la contraception avec des prestataires de planification familiale

Parmi les femmes de 15-49 ans non utilisatrices de la contraception, pourcentage qui, au cours des 12 derniers mois, a reçu la visite d'un agent de terrain avec qui elles ont parlé de planification familiale, pourcentage qui s'est rendu dans un établissement de santé et a parlé de planification familiale, pourcentage qui s'est rendu dans un établissement de santé et n'a pas parlé de planification familiale et pourcentage qui n'a pas parlé de planification familiale, que ce soit avec un agent de terrain ou dans un établissement de santé selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes qui ont reçu la visite d'un agent de terrain qui a parlé de planification familiale	Pourcentage de femmes ayant visité un établissement de santé au cours des 12 derniers mois et qui :		Pourcentage de femmes qui n'ont parlé de planification familiale ni avec un agent de terrain, ni dans un établissement de santé	Effectif de femmes
		Ont parlé de planification familiale	N'ont pas parlé de planification familiale		
Groupe d'âges					
15-19	1,4	2,6	41,3	96,3	1 989
20-24	2,6	11,3	53,8	87,1	1 455
25-29	5,0	19,3	57,3	78,2	1 196
30-34	5,5	15,2	60,8	81,9	1 016
35-39	4,2	17,6	58,0	79,6	800
40-44	3,4	12,0	57,4	85,4	630
45-49	5,5	6,5	58,6	89,2	500
Résidence					
Urbain	2,9	9,8	56,7	88,2	3 497
Rural	4,0	12,4	49,9	85,3	4 089
Région					
Nord	0,6	9,3	48,1	90,4	1 310
Ouest	2,5	8,8	62,5	89,4	2 846
Centre	4,2	13,5	52,8	83,7	2 381
Sud	8,0	14,7	34,2	81,0	1 049
Niveau d'instruction					
Pas d'instruction	4,0	13,5	53,5	84,2	3 440
Primaire	3,3	11,4	51,4	86,5	1 540
Moyen/secondaire ou plus	2,9	8,1	53,5	89,9	2 606
Quintiles de bien-être économique					
Le plus bas	5,1	11,3	41,9	85,6	1 306
Second	4,9	14,8	49,4	82,5	1 345
Moyen	3,8	11,9	54,1	85,5	1 552
Quatrième	2,3	8,4	61,9	90,1	1 593
Le plus élevé	2,0	10,3	55,2	88,4	1 790
Ensemble	3,5	11,2	53,1	86,6	7 586

Résultats clés

- **Mortalité infantile** : Pour la période des 5 années ayant précédé l'enquête, le quotient de mortalité infantile est estimé à 37 ‰. Cela signifie que sur 1 000 naissances vivantes, 37 décèdent avant leur premier anniversaire.
- **Mortalité infanto-juvénile** : Le quotient de mortalité infanto-juvénile est estimé à 51 ‰. En d'autres termes, au Sénégal pour la période des 5 années ayant précédé l'enquête, sur 1 000 naissances vivantes, 51 décèdent avant leur cinquième anniversaire.
- **Variations par milieu de résidence et région** : Le risque de décéder entre la naissance et le cinquième anniversaire est plus élevé en milieu rural (57 ‰) qu'en milieu urbain (41 ‰). Le quotient de mortalité des enfants de moins de 5 ans, pour la période des 10 années ayant précédé l'enquête, varie d'un minimum de 39 ‰ dans les régions de l'Ouest à un maximum de 89 ‰ dans les régions du sud.

Les informations sur la mortalité des enfants sont pertinentes pour l'évaluation démographique de la population, et sont considérées comme un indicateur important du développement socio-économique et de la qualité de vie d'un pays. Elles peuvent aussi permettre d'identifier les enfants qui courent des risques élevés de mortalité et de mettre en place des stratégies pour réduire ces risques.

Ce chapitre présente les niveaux, tendances et différentiels de la mortalité périnatale, néonatale, infantile et infanto-juvénile. Il présente aussi les facteurs biodémographiques et les comportements procréateurs qui contribuent à augmenter les risques de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Les indicateurs de mortalité sont calculés à partir d'information obtenues par l'historique des naissances, dans lequel les femmes déclarent toutes les naissances qu'elles ont eues, ainsi que, pour chaque enfant, la date de naissance, l'état de survie, l'âge actuel ou l'âge au décès.

La qualité des estimations de la mortalité calculées à partir des informations provenant de l'historique des naissances dépend de la capacité de la mère à se souvenir de tous les enfants à qui elle a donné naissance mais aussi de leur date de naissance et de leur âge au décès. Les problèmes qui peuvent affecter la qualité des données comprennent :

- L'omission sélective dans l'historique des naissances de celles qui n'ont pas survécu, ce qui peut induire une sous-estimation de la mortalité des enfants.
- Le déplacement des dates de naissances, qui peut biaiser les tendances de la mortalité. Cela arrive quand un enquêteur enregistre sciemment une naissance à une date différente de celle à laquelle elle s'est produite. Cela peut aussi arriver quand un enquêteur essaye de diminuer sa charge de travail en esquivant toutes les questions supplémentaires qui portent sur les naissances ayant eu lieu au cours des 5 années avant l'enquête.

- La qualité de l'âge au décès. Une mauvaise déclaration de l'âge de l'enfant au décès peut biaiser les variations par âge de la mortalité, en particulier si l'effet net de la mauvaise déclaration de l'âge est le transfert des décès d'une tranches d'âges à une autre.
- Toute méthode de mesure de la mortalité des enfants qui repose sur les déclarations de la mère, comme l'historique des naissances, suppose que la mortalité adulte féminine n'est pas élevée, ou si c'est le cas, qu'il y a peu ou aucune corrélation entre les risques de mortalité des mères et ceux de leurs enfants.

Des indicateurs de la qualité des données de la mortalité sur lesquels les estimations présentées dans ce chapitre sont basées figurent en Annexe C, Tableaux C.3-C.6.

8.1 MORTALITÉ INFANTILE ET MORTALITÉ JUVÉNILE

Quotient de mortalité néonatale : probabilité de décéder avant d'atteindre un mois.

Quotient de mortalité postnéonatale : probabilité de décéder entre le premier mois et le premier anniversaire (calculé par différence entre les taux de mortalité infantile et néonatale).

Quotient de mortalité infantile : probabilité de décéder entre la naissance et le premier anniversaire.

Quotient de mortalité juvénile : probabilité de décéder entre le premier et le cinquième anniversaire.

Quotient de mortalité infanto-juvénile : probabilité de décéder entre la naissance et le cinquième anniversaire.

Le quotient de mortalité infantile pour les 5 années antérieures à l'enquête (période 2014-2018) est estimé à 37 ‰ et celui de la mortalité juvénile à 15 ‰ (**Tableau 8.1**). Cela veut dire sur 1 000 naissances vivantes, 37 meurent avant d'atteindre leur premier anniversaire et 15 décèdent entre le premier et le cinquième anniversaire. Pendant cette période, le risque global de décès entre la naissance et le cinquième anniversaire est estimé à 51 ‰, soit moins d'un enfant sur dix. Autrement dit, sur 1 000 naissances vivantes, 51 n'atteignent pas leur cinquième anniversaire.

Tendances

- Les tendances de la mortalité des enfants au cours des vingt et une dernière année montrent globalement une baisse du niveau de la mortalité, particulièrement jusqu'à 2014 quelque que soit la composante de la mortalité. Par contre, à partir de 2014, on note un ralentissement de cette tendance ainsi que des variations plus irrégulières.
- De 1997 à 2018, le quotient de mortalité néonatale est passé de 37 ‰ à 23 ‰, soit une baisse de 38 %. Pour la mortalité infantile, le quotient est passé de 68 ‰ à 37 ‰, soit une baisse de 46 %. La diminution est plus importante au cours de la période 1997-2014 pendant laquelle le quotient est passé de 68 ‰ à 33 ‰, soit une baisse de 51 %.

- La diminution de la mortalité infanto-juvénile sur la période a été plus importante : en effet, le quotient est passé de 139 ‰ à 51 ‰. La plus forte baisse a été enregistrée sur la période 2005-2010-2011. En effet, au cours de cette période, le quotient de mortalité est passé de 121 ‰ à 72 ‰, soit une baisse de 40 % (**Graphique 8.1**).

Variations par caractéristiques

Les niveaux de mortalité par sexe et par milieu de résidence présentés au **Tableau 8.2** sont calculés pour la période des 5 années ayant précédé l'enquête. Par contre, les estimations


selon d'autres caractéristiques sociodémographiques (**Tableau 8.3**) ont été calculées pour la période des dix années avant l'enquête, de façon à disposer dans chaque sous-groupe de population d'un nombre de cas suffisamment important pour permettre le calcul des probabilités.

- Les niveaux de mortalité varient selon les milieux de résidence. En effet, quel que soit le type de mortalité considéré, le quotient est nettement plus élevé en milieu rural. Ainsi, pour la mortalité infantile, on constate que le quotient est plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain : 40 ‰ contre 32 ‰. Il en est de même pour le quotient de mortalité néonatale qui varie de 26 ‰ en milieu rural à 20 ‰ en milieu urbain. La probabilité de décéder entre le premier et le cinquième anniversaire est aussi nettement plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain (18 ‰ contre 9 ‰). Globalement, le risque de décéder entre la naissance et le cinquième anniversaire varie de 57 ‰ en milieu rural à 41 ‰ en milieu urbain (**Tableau 8.2**). Ces disparités sont liées, en partie, à des différences dans la prise en charge de la grossesse, notamment dans le suivi prénatal et les conditions d'accouchement plus favorables en milieu urbain (voir Chapitre 9), et à d'autres facteurs différents par milieu de résidence tel que l'état nutritionnel et de santé des mères et des enfants (voir Chapitre 10).

- Le quotient de mortalité infanto-juvénile varie en sens inverse du niveau d'instruction de la mère. Plus le niveau d'instruction de la mère est élevé plus le quotient de mortalité infanto-juvénile est faible. Ainsi, le quotient de mortalité infanto-juvénile est plus élevé chez les enfants dont la mère n'a aucun niveau d'instruction (64 ‰) que chez ceux dont elle a le niveau secondaire ou plus (41 ‰). En ce qui concerne la mortalité juvénile, les quotients observés sont plus faibles que ceux de la mortalité infantile, mais les disparités sont plus fortes. De 22 ‰ chez les enfants dont la mère n'a aucun niveau d'instruction, le quotient de mortalité juvénile tombe à 3 ‰ chez les enfants dont la mère a un niveau d'instruction secondaire ou plus. Le quotient de mortalité infantile varie, quant à lui, de 43 ‰ parmi les enfants dont la mère n'a aucun niveau d'instruction à 38 ‰ quand elle a le niveau moyen/secondaire ou plus (**Tableau 8.3** et **Graphique 8.2**).


Graphique 8.1 Tendances de la mortalité des enfants de moins de 5 ans

Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période des 5 ans avant l'enquête



Graphique 8.2 Mortalité infanto-juvénile par niveau d'instruction de la mère

Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période des 10 années ayant précédé l'enquête



- La mortalité des enfants varie avec le niveau de bien-être économique du ménage. Les probabilités de décéder baissent quand on passe du quintile le plus bas au quintile le plus élevé. Par exemple, le quotient de mortalité infantile varie de 47 ‰ dans le quintile le plus bas à 27 ‰ dans le plus élevé, et le quotient de mortalité juvénile de respectivement 31 ‰ à 9 ‰.
- Le niveau de mortalité des enfants varie sensiblement d'une région à l'autre. La région du sud est celle qui détient les quotients de mortalité les plus élevés suivies des régions du centre et du nord : les quotients de mortalité infanto-juvénile varient de 89 ‰ dans la région du sud à 62 ‰ dans celle du Centre et à 54 ‰ dans celles du Nord. La région de l'ouest du pays enregistre le quotient de mortalité infanto-juvénile le plus faible, soit 39 ‰. Les mêmes tendances sont observées pour les quotients de mortalité infantile et juvénile.
- Le risque de décéder avant le premier mois de vie présente moins de disparités entre les zones régionales. Les quotients de mortalité néonatale les plus élevés sont enregistrés dans les régions Sud (32 ‰) et Centre (28 ‰). La région de l'Ouest garde le quotient de mortalité néonatale le plus bas (19 ‰).
- Le quotient de mortalité infantile varie d'un maximum de 55 ‰ dans la région Sud à un minimum de 32 ‰ dans la région Ouest.

8.2 FACTEURS DE RISQUE BIODÉMOGRAPHIQUES

Le rôle déterminant de certains facteurs de risques sur les niveaux de mortalité des enfants, basés sur les caractéristiques de la mère et de l'enfant a été mis en évidence dans de nombreuses études. Les **Tableaux 8.2** et **8.3** présentent les niveaux de mortalité néonatale, infantile et infanto-juvénile en fonction de ces facteurs de risques.


Variations par caractéristique

- Dans la plupart des populations, on constate que les garçons présentent un risque de mortalité à la naissance légèrement plus élevé que celui des filles. Au Sénégal, ce phénomène est observé avec des quotients de mortalité néonatale (27 ‰ contre 19 ‰), infantile (45 ‰ contre 28 ‰), et infanto-juvénile (59 ‰ contre 43 ‰) plus élevés chez les garçons que chez les filles. Par contre, on constate que le quotient de mortalité juvénile est quasiment identique (15 ‰ pour les garçons contre 14 ‰ pour les filles).
- La mortalité des enfants varie selon l'âge de la mère à la naissance de l'enfant. Les enfants dont l'âge de la mère à leur naissance était inférieur à 20 ans courent un risque plus élevé de décéder que les autres, cela quelle que soit la composante de la mortalité. Par exemple, le quotient de mortalité infantile est estimé à 64 ‰ pour les enfants dont la mère avait moins de 20 ans à la naissance contre 36 ‰ quand cet âge était de 20-29 ans. Pour le quotient de mortalité infanto-juvénile, ces niveaux sont de respectivement 83 ‰ et 53 ‰.
- Le rang de naissance influence les risques de décéder des enfants, en particulier pendant le premier mois. Pendant cette période de la vie, il apparaît que les naissances de rang 1 et les naissances de rangs élevés sont celles qui courent les risques les plus élevés, le quotient de mortalité néonatale variant de 31 ‰ pour le rang 1 et de 35 ‰ pour les rangs 7 et plus contre 20 ‰ et 23 ‰ pour les autres rangs. On retrouve cette même variation selon le rang de naissance pour la composante infantile : 45 ‰ pour le rang 1 et 51 ‰ pour les rangs 7 et plus contre 38 ‰ et 37 ‰ pour les autres rangs. Les niveaux de la mortalité juvénile et la mortalité infanto-juvénile sont un peu plus élevés pour les naissances de rangs sept ou plus. (respectivement 24 ‰ et 74 ‰).

- L'augmentation de l'intervalle intergénérisique diminue le risque de décéder, cela quelle que soit la composante de la mortalité. En effet, le quotient de mortalité infantile des enfants nés moins de deux ans après la naissance précédente est plus élevé que celui des enfants dont la naissance a eu lieu au moins quatre ans après la naissance précédente (64 ‰ contre 33 ‰). Le quotient de mortalité juvénile passe de 31 ‰ quand l'intervalle est inférieur à deux ans à 9 ‰ quand il est de quatre ans ou plus (**Tableau 8.3** et **Graphique 8.3**).

Graphique 8.3 Mortalité des enfants de moins de 5 ans selon l'intervalle avec la naissance précédente

Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période des 10 années ayant précédé l'enquête



- Les risques de mortalité des enfants varient aussi selon la taille de l'enfant à la naissance déclarée par leur mère. Les données du **Tableau 8.3** montrent que pour la mortalité infantile, les enfants de petite taille à la naissance ont un quotient de mortalité plus élevé que celui des enfants qui étaient moyens ou gros (57 ‰ contre 26 ‰). L'écart relatif est aussi grand dans le cas de la mortalité néonatale (36 ‰ contre 16 ‰).

8.3 MORTALITÉ PÉRINATALE

Taux de mortalité périnatale

Les décès périnataux comprennent les mort-nés (décès fœtaux qui se sont produits après sept mois de grossesse) et les décès néonataux précoces (décès de naissances vivantes qui se sont produits entre 0-6 jours). Le taux de mortalité périnatale est la somme des décès périnataux divisés par le nombre de grossesses de sept mois ou plus, exprimé pour 1 000.

Échantillon : Nombre de grossesses de sept mois ou plus des femmes de 15-49 ans au cours des 5 années ayant précédé l'enquête.

Pour la période des 5 années ayant précédé l'enquête, 113 mort-nés et 117 décès néonataux précoces ont été enregistrés. Le taux de mortalité périnatale est donc estimé à 37 décès pour mille grossesses de sept mois ou plus (37 ‰) (**Tableau 8.4**).

8.4 COMPORTEMENT PROCRÉATEUR À HAUTS RISQUES

Plusieurs études ont montré l'effet de certaines caractéristiques démographiques et biologiques des mères sur les chances de survie des jeunes enfants. Parmi ces caractéristiques, l'âge de la mère à la naissance (moins de 18 ans) ou (plus de 34 ans), l'intervalle intergénérisique court (moins de 24 mois après la naissance précédente) et un rang de naissance élevé (supérieur à trois) jouent un rôle particulièrement important qui contribue à augmenter les risques de décéder des enfants.

Le **Tableau 8.5** présente les pourcentages d'enfants nés au cours des 5 années avant l'enquête qui sont classés dans différentes catégories de risques.

- Vingt-huit pour cent des naissances des 5 dernières années ne se trouvent dans aucune catégorie à hauts risques évitables et 19 ‰ sont classés dans une catégorie à risque inévitable qui comprend les premières naissances de femmes entre 18 et 34 ans.
- Un peu plus d'un tiers des naissances (34 ‰) se trouvent dans la catégorie à haut risque unique et 20 ‰ sont classées dans la catégorie à hauts risques multiples.

- Les ratios de risques indiquent l'association entre des facteurs de risques et la mortalité des enfants. Une naissance appartenant à une catégorie quelconque à haut risque unique (non compris les enfants de rang 1) court un risque de décéder 1,54 fois supérieur à celle n'appartenant à aucune catégorie à hauts risques. La fécondité précoce apparaît comme un facteur de risque élevé puisque les naissances dont l'âge de la mère à la naissance était inférieur à 18 ans courent un risque de décéder 3,24 fois plus élevé que la catégorie de référence.
- Le ratio de risque est plus élevé parmi les naissances classées dans la catégorie à hauts risques multiples (1,96). En particulier, le risque le plus élevé (2,12) concerne les naissances dont l'intervalle intergénéral est inférieur à 24 mois et dont le rang de naissance supérieur à 3. De même, 14 % des naissances appartiennent à la catégorie de hauts risques multiples qui combinent l'âge de la mère supérieur à 34 ans et le rang de naissance supérieur à 3.

À partir de cette analyse du comportement procréateur à haut risque, on a essayé de déterminer la proportion de femmes actuellement en union qui, potentiellement, pourraient avoir un tel comportement. Pour cela, à partir de l'âge actuel des femmes, de l'intervalle écoulé depuis leur dernière naissance et du rang de leur dernière naissance, on détermine dans quelle catégorie se situerait la prochaine naissance, si chaque femme concevait un enfant au moment de l'enquête. Il s'agit donc d'une simulation ayant pour objectif de déterminer quelles proportions des futures naissances entreraient dans les catégories à risques, en l'absence de tout comportement régulateur de la fécondité. Il apparaît que 74 % des femmes en union seraient classées dans la catégorie à hauts risques évitables si elles avaient conçu un enfant au moment de l'enquête, 31 % appartiendraient à la catégorie à haut risque unique et 43 % à la catégorie à hauts risques multiples.

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur la mortalité des enfants, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 8.1** Quotients de mortalité des enfants de moins de 5 ans
- **Tableau 8.2** Quotients de mortalité des enfants de moins de 5 ans selon certaines caractéristiques sociodémographiques
- **Tableau 8.3** Quotients de mortalité des enfants de moins de 5 ans pour la période des dix années ayant précédé l'enquête selon d'autres caractéristiques sociodémographiques
- **Tableau 8.4** Mortalité périnatale
- **Tableau 8.5** Comportement procréateur à hauts risques

Tableau 8.1 Quotients de mortalité des enfants de moins de 5 ans

Quotients de mortalité néonatale, postnéonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile par période de 5 ans ayant précédé l'enquête, Sénégal 2018

Nombre d'années ayant précédé l'enquête	Mortalité néonatale (NN)	Mortalité postnéonatale (PNN) ¹	Mortalité infantile (1q0)	Mortalité juvénile (4q1)	Mortalité infanto-juvénile (5q0)
0-4	23	13	37	15	51
5-9	27	18	44	21	65
10-14	26	20	46	32	76

¹ Calculé par différence entre les taux de mortalité infantile et néonatale**Tableau 8.2 Quotients de mortalité des enfants sur 5 ans selon certaines caractéristiques démographiques**

Quotients de mortalité néonatale, postnéonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile des enfants de moins de 5 ans pour la période des 5 années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques démographiques, EDS-Continue, Sénégal 2018

Caractéristiques sociodémographiques	Mortalité néonatale (NN)	Mortalité postnéonatale (PNN) ¹	Mortalité infantile (1q0)	Mortalité juvénile (4q1)	Mortalité infanto-juvénile (5q0)
Sexe de l'enfant					
Masculin	27	18	45	14	59
Féminin	19	9	28	15	43
Résidence					
Urbain	20	12	32	9	41
Rural	26	14	40	18	57
Ensemble	23	13	37	15	51

¹ Calculé par différence entre les taux de mortalité infantile et néonatale

Tableau 8.3 Quotients de mortalité des enfants sur 10 ans selon d'autres caractéristiques

Quotients de mortalité néonatale, postnéonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile des enfants de moins de 5 ans pour la période des 10 années ayant précédé l'enquête, selon d'autres caractéristiques sociodémographiques, EDS-Continue, Sénégal 2018

Caractéristiques sociodémographiques	Mortalité néonatale (NN)	Mortalité postnéonatale (PNN) ¹	Mortalité infantile (1q0)	Mortalité juvénile (4q1)	Mortalité infanto-juvénile (5q0)
Âge de la mère à la naissance de l'enfant					
<20	40	25	64	20	83
20-29	21	15	36	18	53
30-39	26	13	39	17	56
40-49	30	(8)	(38)	*	*
Rang de naissance					
1	31	13	45	11	55
2-3	20	18	38	20	57
4-6	23	14	37	18	54
7+	35	16	51	24	74
Intervalle avec la naissance précédente²					
<2 années	37	27	64	31	93
2 années	25	16	41	20	60
3 années	11	8	20	18	38
4 années+	21	12	33	9	42
Taille à la naissance³					
Petit/très petit	36	22	57	na	na
Moyen ou gros	16	10	26	na	na
Région					
Nord	25	15	41	14	54
Ouest	19	14	32	7	39
Centre	28	13	41	22	62
Sud	32	24	55	36	89
Niveau d'instruction de la mère					
Pas d'instruction	25	18	43	22	64
Primaire	25	11	36	13	48
Moyen/Secondaire ou plus	26	12	38	3	41
Quintiles de bien-être économique					
Le plus bas	29	18	47	31	76
Second	23	19	43	23	65
Moyen	34	9	43	14	57
Quatrième	22	17	39	7	46
Le plus élevé	15	12	27	9	35

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

na = Non applicable.

¹ Calculé par différence entre les taux de mortalité infantile et néonatale.

² Non compris les naissances de rang 1.

³ Quotients pour la période des 5 années avant l'enquête.

Tableau 8.4 Mortalité périnatale

Effectif de mort-nés, de décès néonataux précoces et taux de mortalité périnatale pour la période des 5 années ayant précédé l'enquête selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Effectifs de mort-nés ¹	Effectif de décès néonataux précoces ²	Taux de mortalité périnatale ³	Effectif de grossesses de 7 mois ou plus
Âge de la mère à la naissance de l'enfant				
<20	15	16	44	710
20-29	39	55	31	3 084
30-39	43	37	40	2 009
40-49	16	8	74	321
Intervalle avec la naissance précédente en mois⁴				
Première grossesse	26	35	46	1 331
<15	10	22	45	693
15-26	15	21	26	1 397
27-38	18	14	27	1 187
39+	43	25	45	1 515
Résidence				
Urbain	24	39	27	2 287
Rural	89	78	44	3 836
Région				
Nord	21	19	39	1 012
Ouest	15	32	25	1 888
Centre	56	45	46	2 214
Sud	21	21	41	1 009
Niveau d'instruction de la mère				
Pas d'instruction	71	65	36	3 821
Primaire	22	25	38	1 236
Moyen/Secondaire ou plus	19	27	43	1 066
Quintiles de bien-être économique				
Le plus bas	31	31	43	1 443
Second	28	22	37	1 351
Moyen	26	24	42	1 217
Quatrième	12	28	37	1 073
Le plus élevé	15	11	25	1 039
Ensemble	113	117	37	6 123

¹ Les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits à 7 mois de grossesse ou plus.

² Les décès néonataux précoces sont des décès qui se sont produits à 0-6 jours parmi les enfants nés vivants.

³ La somme du nombre de mort-nés et de décès néonataux divisée par le nombre de grossesses à 7 mois ou plus, exprimé pour 1 000.

⁴ Les catégories correspondent aux intervalles entre naissances de <24 mois, 24-35 mois, 36-47 mois et 48 mois ou plus.

Tableau 8.5 Comportement procréateur à hauts risques

Répartition (en %) des enfants nés au cours des 5 années ayant précédé l'enquête par catégorie de hauts risques de mortalité et ratio de risque et répartition (en %) des femmes actuellement en union par catégorie de hauts risques si elles concevaient un enfant au moment de l'enquête, Sénégal 2018

Catégories de risques	Naissances des 5 années ayant précédé l'enquête		Pourcentage de femmes actuellement en union ¹
	Pourcentage de naissances	Ratio de risques	
Dans aucune catégorie à haut risque évitable	27,7	1,00	16,6
Catégorie à risque inévitable			
Naissance de rang 1, âge entre 18 et 34 ans	19,0	1,54	9,2
Dans une des catégories de hauts risques évitables	53,2	1,69	74,1
Catégorie à haut risque unique			
Âge de la mère <18	4,5	3,24	1,2
Âge de la mère >34	2,5	2,87	6,5
Intervalle inter génésique <24 mois	4,7	2,62	9,6
Rang de naissance >3	21,8	0,80	13,9
Sous total	33,5	1,54	31,1
Catégorie à hauts risques multiples			
Âge <18 et intervalle inter génésique <24 mois ²	0,4	(2,02)	0,2
Âge >34 et intervalle intergénésique <24 mois	0,1	*	0,5
Âge >34 et rang de naissance >3	13,5	2,00	28,5
Âge >34 et intervalle intergénésique <24 mois et rang de naissance >3	1,4	0,79	5,4
Intervalle inter génésique <24 mois et rang de naissance >3	4,3	2,12	8,4
Sous total	19,7	1,96	43,0
Total	100,0	na	100,0
Dans une des catégories de hauts risques évitables			
Âge de la mère <18	4,9	3,15	1,4
Âge de la mère >34	17,5	2,05	40,9
Intervalle inter génésique <24 mois	10,9	2,19	24,1
Rang de naissance >3	41,0	1,33	56,2
Effectif de naissances/femmes	6 064	na	6 013

Note : Le rapport de risque est le rapport de la proportion de naissances décédées parmi les naissances appartenant à chaque catégorie à haut risque spécifique à la proportion de naissances décédées parmi celles n'appartenant à aucune catégorie à hauts risques. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

na = Non applicable.

¹ Les femmes sont classées dans les catégories à risque selon le statut qu'elles auraient à la naissance de l'enfant si elles concevaient un enfant au moment de l'enquête : âge actuel inférieur à 17 ans et 3 mois ou supérieur à 34 ans et 2 mois, la dernière naissance a eu lieu il y a 15 derniers mois ou la dernière naissance était de rang 3 ou plus.

² Y compris la catégorie : âge < 18 ans et rang de naissance >3.

^a Y compris les femmes stérilisées.

Résultats clés

- **Couverture en soins prénatals** : La quasi-totalité des femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance dans les 5 dernières années ont reçu des soins prénatals pour la naissance la plus récente dispensés par un prestataire qualifié (98 %). Près de six femmes sur dix ont effectué au moins quatre visites prénatales (59 %) et dans 64 % des cas, la première visite prénatale a eu lieu avant le quatrième mois de grossesse.
- **Composants des soins prénatals** : La prise de la tension artérielle est l'examen le plus fréquemment effectué pendant les visites prénatales (99 %). En outre, parmi les femmes ayant reçu des soins prénatals, 94 % ont effectué un prélèvement d'urine et 87 % un prélèvement sanguin.
- **Lieu et assistance à l'accouchement** : Parmi les naissances ayant eu lieu au cours des cinq années avant l'enquête, près de quatre sur cinq ont eu lieu dans un établissement de santé (82 %). En outre, 74 % des naissances se sont déroulées avec l'assistance de personnel qualifié.
- **Soins postnatals** : Près de huit femmes sur dix (84 %) ont reçu des soins postnatals administrés par du personnel qualifié dans les deux jours qui ont suivi la naissance ; de même, 84 % des nouveau-nés ont eu des soins postnatals dans les deux premiers jours qui ont suivi leur naissance.

L'Etat du Sénégal a toujours affirmé son engagement à faire de la santé de la reproduction un domaine prioritaire en garantissant l'accès à des services de qualité. Les services de soins de santé durant la grossesse, l'accouchement et après l'accouchement sont importants pour la survie et le bien-être de la mère et de l'enfant. À cet effet, différentes stratégies sont mises en œuvre pour une amélioration durable de la santé maternelle et néonatale conformément aux orientations du Plan National de Développement Sanitaire 2009-2018. Ce Plan a, parmi ses objectifs principaux, de réduire le fardeau de la morbidité et de la mortalité maternelles et infanto juvéniles et d'accroître les performances du secteur en matière de prévention et de lutte contre la maladie, en particulier le paludisme, le VIH/SIDA, la tuberculose et le diabète.

9.1 COUVERTURE ET CONTENU DES SOINS PRÉNATALS

9.1.1 Prestataires qualifiés

Soins prénatals par un prestataire qualifié

Soins reçus durant la grossesse dispensés par des prestataires qualifiés, comme les médecins, les infirmiers/infirmières et les sages-femmes.

Échantillon : Femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête.

- Au Sénégal, la quasi-totalité des femmes (98 %), de 15 à 49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des cinq années avant l'enquête, ont reçu des soins prénatals par du personnel de santé qualifié, pour la naissance la plus récente. Ces soins ont été, dans la grande majorité des cas, dispensés par une sage-femme (91 %). Par contre, dans 4 % des cas, ce sont les infirmiers (ères) qui ont dispensé ces soins et, dans 3 % des cas, ce sont les médecins (**Tableau 9.1**).


Tendances : La couverture en soins prénatals est restée élevée et relativement stable sur la période allant de 2012-2013 à 2018. De 95 % en 2012-2013, la proportion de femmes ayant reçu des soins prénatals est passée à 97 % en 2018 (**Graphique 9.1**).

Variations par caractéristique

- La couverture en soins prénatals par un prestataire formé est homogène et très élevée quelle que soit la caractéristique sociodémographique considérée
- La proportion de femmes ayant reçu des soins prénatals d'un médecin augmente avec le niveau d'instruction, de 1 % chez les femmes sans niveau d'instruction à 2 % parmi les femmes de niveau primaire et à 11 % parmi celles de niveau moyen ou plus.

Graphique 9.1 Tendances de la couverture en soins prénatals

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 5 années précédant l'enquête (pour la naissance la plus récente)



9.1.2 Stade de la grossesse et nombre de visites prénatales

L'OMS recommande à chaque femme enceinte de faire au moins quatre visites prénatales et d'effectuer la première dans le premier trimestre de la grossesse.

Le **Tableau 9.2** montre que la proportion de femmes enceintes qui ont eu au moins quatre visites prénatals est de 59 %. Cette proportion varie selon le milieu de résidence. Elle est plus élevée en milieu urbain (71 %) qu'en milieu rural (50 %). En outre, environ les deux tiers (64 %) des femmes ont eu leur première visite prénatale dans le premier trimestre. En milieu urbain, ce pourcentage s'établit à 78 % contre 55 % en milieu rural.

Tendances : Sur la période 2012-2018, on constate une tendance à la hausse du pourcentage de femmes qui ont effectué au moins quatre visites prénatals, le pourcentage étant passé de 47 % en 2012 à 59 % en 2018. Dans la même période, on note une légère augmentation du pourcentage de femmes ayant eu leur première visite prénatale dans le premier trimestre de la grossesse, celui-ci étant passé de 56 % à 64 % (**Graphique 9.1**).

9.2 COMPOSANTS DES VISITES PRÉNATALES

Un suivi efficace des femmes pendant la grossesse doit inclure certains examens médicaux. Au cours de l'EDS Continue 2018, on a demandé aux femmes si, pendant leur grossesse, elles avaient effectué certains examens. Les résultats sont présentés au **Tableau 9.3**.

La quasi-totalité des femmes ayant eu une naissance vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête (96 %) ont pris du fer sous forme de comprimés ou de sirop au cours de leur grossesse la plus récente. Ce pourcentage est homogène et reste très élevé quel que soit le type de caractéristique sociodémographique. L'administration de fer aux femmes pendant la grossesse est donc généralisée au Sénégal. En outre, 45 % des femmes ont pris des médicaments contre les parasites intestinaux.


Tendances : De 2012-2013 à 2018, on note une augmentation du pourcentage de femmes ayant pris du fer pendant la grossesse : 93 % à 96 %. Le pourcentage de femmes à qui on a administré des médicaments contre les parasites intestinaux a aussi augmenté, passant de 25 % à 45 % dans la même période.

Variations par caractéristique

- L'administration de médicaments contre les vers intestinaux pendant la grossesse est plus fréquente en milieu urbain (51 %) qu'en milieu rural (41 %).
- Le pourcentage de femmes qui ont pris des médicaments contre les parasites intestinaux augmente avec le niveau d'instruction passant de 41 % chez les femmes n'ayant aucun niveau d'instruction à 53 % chez les femmes de niveau d'instruction moyen/secondaire ou plus.
- Selon les régions, on note des disparités : c'est dans le Nord que le pourcentage de femmes ayant reçu des médicaments contre les parasites intestinaux est le plus faible et dans le Sud qu'il est le plus élevé (26 % contre 53 %).
- On note aussi des variations en fonction du bien-être économique : dans le quintile le plus bas, 33 % des femmes ont pris des médicaments contre les parasites intestinaux contre 53 % dans le quintile le plus élevé.
- Parmi les femmes ayant reçu des soins prénatals, la quasi-totalité a effectué les examens de base comme la vérification de la tension artérielle (99 %), le prélèvement d'urine (94 %) et le prélèvement sanguin (87 %) (**Tableau 9.3** et **Graphique 9.2**).

Graphique 9.2 Composants des soins prénatals

Parmi les femmes ayant reçu des soins postnatals pour la naissance la plus récente, pourcentage ayant effectué certains examens



9.3 PROTECTION CONTRE LE TÉTANOS NÉONATAL

Protection contre le tétanos néonatal

La protection du nouveau-né contre le tétanos dépend du nombre de doses de vaccin antitétanique reçues antérieurement par la mère.

Une naissance est protégée contre le tétanos néonatal si la mère a reçu l'une des combinaisons suivantes :

- Deux injections de vaccin antitétanique au cours de la grossesse ou
- Deux injections ou plus, la troisième ayant été effectuée dans les trois années avant la naissance ou
- Trois injections ou plus, la dernière ayant été effectuée dans les cinq années avant la naissance ou
- Quatre injections ou plus, la dernière ayant été effectuée dans les dix années avant la naissance ou
- Cinq injections ou plus à n'importe quel moment avant la naissance

Échantillon : Dernières naissances vivantes des femmes de 15-49 ans ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête.

Près d'une femme sur deux (46 %) ayant eu une naissance vivante au cours des cinq dernières années a reçu deux injections antitétaniques ou plus durant la grossesse de la naissance la plus récente. En outre, pour 85 % de femmes, la naissance vivante la plus récente était protégée contre le tétanos néonatal (**Tableau 9.4**).

Tendances : Le pourcentage de femmes dont la dernière naissance vivante est protégée contre le tétanos néonatal a progressivement augmenté, passant de 82 % en 2012-2013 à 85 % en 2018.

Variations selon certaines caractéristiques

- Les naissances vivantes récentes les mieux protégées contre le tétanos néonatal sont celles de rang de 2-3 (91 %). Les naissances de rang 6 et plus sont moins protégées (77 %).
- Les naissances des femmes du milieu urbain (88 %) sont mieux protégées contre le tétanos néonatal que celles des femmes du milieu rural (83 %).
- La couverture contre le tétanos néonatal augmente avec le niveau d'instruction de la mère, passant de 83 % parmi celles sans niveau d'instruction à 88 % parmi celles ayant le niveau moyen/secondaire ou plus.
- On note aussi des variations en fonction du bien-être économique : dans le quintile le plus bas, pour 78 % des femmes, la dernière naissance était protégée contre le tétanos néonatal contre 90 % dans le quintile le plus élevé.
- La couverture antitétanique néonatale est plus faible dans la région Nord que dans les autres (76 % contre 81 % dans le Sud et 91 % dans l'Ouest).

9.4 SERVICES D'ACCOUCHEMENT

9.4.1 Accouchement en établissement de santé

Accouchements en établissement de santé


Accouchements qui se déroulent dans un établissement de santé.

Échantillon : Toutes les naissances vivantes ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête

En 2018, parmi les naissances ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête, environ les trois-quarts (82 %) se sont déroulées dans un établissement (une structure) de santé (**Tableau 9.5**).

Tendances : Entre 2012 et 2018, le pourcentage de naissances ayant eu lieu dans un établissement de santé a augmenté, passant de 71 % à 82 % ; à l'opposé, dans la même période, le pourcentage de naissances qui se sont déroulées à la maison a diminué, de 28 % à 18 % (**Graphique 9.3**).


Graphique 9.3 Lieu d'accouchement : tendances



Variations par caractéristique

- D'une manière générale, la plupart des naissances se déroulant dans les établissements de santé ont lieu dans le secteur public (78 %) alors que cette proportion n'est que de 4 % dans le secteur privé.
- Le pourcentage de naissances ayant lieu dans un établissement de santé est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural (95 % contre 73 %).
- On note des écarts entre les régions, 95 % des naissances ayant lieu dans un établissement de santé dans la région Ouest contre 68 % dans la région Sud (**Tableau 9.5**).
- Le pourcentage de naissances ayant eu lieu dans un établissement de santé augmente de manière importante avec le niveau de bien-être économique, passant de 54 % dans le quintile le plus bas à 97 % dans le quatrième quintile et le quintile le plus élevé (**Graphique 9.4**).

Graphique 9.4 Naissances ayant eu lieu dans un établissement de santé par bien-être économique du ménage



9.4.2 Assistance durant l'accouchement par un prestataire de santé qualifié

Assistance durant l'accouchement par un prestataire de santé qualifié

Naissances dont l'accouchement s'est déroulé avec l'assistance de médecins ou d'infirmières/sages-femmes.

Échantillon : Toutes les naissances vivantes ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête

Au Sénégal, 74 % des accouchements ont été assistés par un prestataire de santé formé : 66 % par une sage-femme, 6 % par un médecin et 2 % par un(e) infirmier(ère). Les matrones/accoucheuses traditionnelles ont assisté 14 % des accouchements. Par contre, dans 4 % des cas, les femmes n'ont bénéficié d'aucune assistance (**Tableau 9.6**).

Tendances : La proportion d'accouchements assistés par un prestataire de santé qualifié a augmenté passant de 51 % en 2012 à 74 % en 2018.

Variations par caractéristique

- Le pourcentage de naissances qui se sont déroulées avec l'assistance de prestataire de santé formé varie entre milieux de résidence. En milieu urbain, plus de neuf naissances sur dix (92 %) ont été assistées par un prestataire formé contre un peu moins des deux tiers en milieu rural (63 %).
- Les résultats selon les régions mettent aussi en évidence des disparités. Les pourcentages de naissances assistées par un prestataire formé les plus faibles sont observés au Sud (57 %) et au Nord (67 %). Les pourcentages les plus élevés sont notés au Centre (70 %) et à l'Ouest (92 %).
- Le pourcentage de naissances assistées par un prestataire formé tend à augmenter avec le niveau d'instruction de la mère, passant de 66 % quand elle n'a aucun niveau d'instruction à 92 % quand elle a le niveau Moyen/Secondaire ou plus.

9.4.3 Accouchement par césarienne

Les accouchements par césarienne peuvent réduire la mortalité maternelle et néonatale et éviter des complications telles que la fistule obstétricale. Cependant, la pratique de la césarienne, sans raisons médicales, peut faire courir aux femmes des risques pour leur santé à court terme et à long terme. Au Sénégal, seulement 5 % des accouchements ont eu lieu par césarienne : 2 % ont été décidés avant le début des douleurs et 3 % après le début des douleurs (**Tableau 9.7**).

Tendances : Entre 2012-2013 et 2018, le pourcentage d'accouchements par césarienne a peu varié, variant de 4 % à 5 %.

Variation par caractéristique

- Le pourcentage de naissances par césarienne est plus élevé en milieu urbain (8 %) qu'en milieu rural (3 %).
- Le pourcentage de naissances par césarienne est plus élevé dans la région Ouest du pays (7 %) et plus faible au Sud (3 %).
- Le pourcentage de naissances qui ont eu lieu par césarienne est plus élevé quand l'accouchement s'est déroulé dans un établissement privé (15 %) que public (5 %).
- Ce pourcentage augmente de manière importante avec le niveau de bien-être économique, passant de 2 % dans le quintile le plus bas à 11 % dans le quintile le plus élevé.

9.4.4 Durée du séjour dans l'établissement de santé après la naissance

Le **Tableau 9.8** présente les pourcentages de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des cinq années avant l'enquête qui ont accouché dans un établissement de santé par durée de séjour dans l'établissement selon le type d'accouchement. On constate que la durée du séjour dans l'établissement de santé après l'accouchement est nettement plus longue quand l'accouchement a eu lieu par césarienne que par voie basse : 90 % des femmes accouchées par césarienne sont restées au moins trois jours dans l'établissement de santé contre 8 % de celles ayant accouché par voie basse.

9.5 SOINS POSTNATALS

9.5.1 Examen postnatal de la mère

Une proportion importante de décès maternels et de décès de nouveau-nés qui se produisent dans la période néonatale ont lieu dans les 48 heures qui suivent l'accouchement. Il est donc fortement recommandé que les femmes effectuent une visite postnatale dans les deux jours qui suivent l'accouchement. Au cours de l'enquête, on a demandé aux femmes qui avaient accouché au cours des deux années ayant précédé l'enquête

si, après leur dernier accouchement, elles avaient effectué un examen postnatal et combien de temps après l'accouchement cet examen avait eu lieu.

Près de neuf femmes sur dix (84 %) ont reçu des soins postnatals dans les deux jours qui ont suivi l'accouchement de la dernière naissance vivante. Par contre, 9 % n'ont jamais reçu de soins postnatals (**Tableau 9.9**).


Tendances : Entre 2012-2013 et 2018, le pourcentage de femmes ayant eu un examen postnatal au cours des deux jours après la naissance a augmenté, passant de 67 % à 84 %.

Variations par caractéristique

- Le pourcentage de femmes ayant reçu leurs premiers soins postnatals dans les deux premiers jours suivant la naissance, est plus élevé dans la région Ouest (94 %) suivie de celle du Centre (85 %), c'est dans la région Sud qu'il est le plus faible (70 %).
- La couverture en soins postnatals dans les délais recommandés a tendance à augmenter avec le niveau d'instruction de la mère, passant de 80 % quand la femme n'a aucun niveau d'instruction à 91 % quand elle a le niveau primaire et à 90 % quand elle a le niveau moyen/secondaire ou plus.
- Le pourcentage de femmes ayant reçu des soins postnatals dans les délais recommandés a tendance à augmenter avec le niveau de bien-être économique, passant de 63 % dans le quintile le plus bas à 94 % dans le quatrième quintile et 93 % dans le quintile le plus élevé.
- Le pourcentage de femmes ayant reçu des soins postnatals dans les délais recommandés est plus élevé quand l'accouchement s'est déroulé dans un établissement de santé qu'ailleurs (93 % contre 36 %) (**Graphique 9.5**).

Graphique 9.5 Soins postnatals selon le lieu de l'accouchement

Pourcentage des dernières naissances des 2 années avant l'enquête pour lesquelles les femmes et les nouveau-nés ont reçu des soins postnatals dans les 2 jours après la naissance en 2018



Type de prestataire

Les compétences du prestataire déterminent ses capacités à diagnostiquer des problèmes et à recommander un traitement ou une référence appropriée. Au Sénégal, parmi les femmes ayant eu une naissance dans les deux années avant l'enquête, 78 % ont eu un examen postnatal dispensé par un prestataire de santé qualifié, à savoir un médecin, un(e) infirmier(ère) ou une sage-femme. Par contre, dans 6 % des cas, c'est une matrone ou une accoucheuse traditionnelle qui a dispensé les soins postnatals à la mère (**Tableau 9.10**).

9.5.2 Examen postnatal du nouveau-né

Au cours de l'EDS Continue 2018, on a demandé à toutes les femmes, qui avaient eu une naissance vivante au cours des deux dernières années, si quelqu'un avait examiné leur nouveau-né, combien de temps après l'accouchement cet examen avait eu lieu et enfin quel type de prestataire avait effectué l'examen. Les soins postnatals dans les 48 premières heures ont été administrés à 84 % des nouveau-nés (**Tableau 9.11**).

Tendances : Entre 2015 et 2018, le pourcentage de nouveau-nés ayant reçu des soins postnatals dans les délais recommandés est passé de 50 % à 84 %.

Variation par caractéristique

- L'examen postnatal du nouveau-né dans les premiers deux jours est plus fréquent quand la naissance a eu lieu dans un établissement de santé qu'ailleurs (94 % contre 31 %) (**Graphique 9.5**).
- En milieu urbain, 94 % des nouveau-nés ont eu un examen postnatal dans les deux jours qui ont suivi leur naissance contre 78 % en milieu rural.
- La couverture en soins postnatals du nouveau-né augmente du quintile le plus bas au plus élevé, passant de 62 % à 96 %.

Type de prestataire

En ce qui concerne le type de prestataire, on constate que 78 % des nouveau-nés ont reçu des soins postnatals dans les premières 48 heures dispensés par un prestataire de santé qualifié (médecin/infirmier/sage-femme). Dans 6 % des cas, ce sont les matrones et accoucheuses traditionnelles qui ont encore donné ces soins. (**Tableau 9.12**).

Contenu des examens postnatals

L'enquête a également recueilli des données sur les composants des soins postnatals. Plus précisément, on a cherché à savoir si certains actes avaient été effectués dans les deux jours suivant la naissance et si des conseils avaient été dispensés à la mère, en particulier ceux concernant les signes de danger chez le nouveau-né. Pour seulement 72 % des dernières naissances vivantes ayant eu lieu au cours des deux années ayant précédé l'enquête, au moins deux actes/conseils ont été dispensés dans les premières 48 heures (**Tableau 9.13**).

Les actes qui ont été les plus fréquemment effectués sont la prise du poids (74 %) suivi des soins du cordon ombilical (71 %) et de la prise de la température (69 %). Par contre, l'observation de l'allaitement (mise au sein précoce) n'a été effectuée que dans 26 % des cas, alors que pour près d'une naissance sur deux (48 %), des conseils sur l'allaitement ont été donnés. Le pourcentage de naissances pour lesquelles on a donné des conseils sur les signes de danger est, en revanche, un peu plus faible (43 %).

Variations selon certaines caractéristiques

- Le pourcentage de naissances pour lesquelles on a dispensé au moins deux actes/conseils au cours des deux premiers jours est nettement plus élevé quand la naissance a eu lieu dans un établissement de santé qu'ailleurs (77 % contre 42 %).
- Le pourcentage de naissances pour lesquelles on a dispensé au moins deux actes/conseils au cours des premiers jours passe de 67 % quand la mère n'a aucun niveau d'instruction à 76 % quand elle a le niveau moyen/secondaire ou plus.
- Les résultats selon le niveau de bien-être économique montrent que dans le quintile le plus bas, seulement un peu plus d'une naissance sur deux a bénéficié d'au moins deux actes ou conseils dans les délais recommandés (53 %) contre 77 % dans le quintile moyen et 83 % dans le plus élevé.

9.6 PROBLÈMES D'ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ

Problèmes d'accès aux soins de santé

On a demandé aux femmes si l'un des éléments suivants constituait un problème important lorsqu'elles recherchaient un conseil médical ou un traitement quand elles étaient malades :

- Obtenir la permission d'aller chez un médecin
- Avoir l'argent pour des conseils ou un traitement
- Distance à l'établissement de santé
- Ne pas vouloir y aller seule

Échantillon : Femmes de 15-49 ans

Parmi les femmes de 15-49 ans, 52 % ont au moins un problème d'accès aux soins de santé. Ces problèmes sont notamment liés à l'accessibilité financière (43 %), à l'accessibilité géographique inhérente à la distance (21 %), au fait de ne pas vouloir s'y rendre seule (13 %) et à l'obtention de la permission d'aller se faire soigner (12 %) (**Tableau 9.14**).

9.7 FISTULE OBSTÉTRICALE

La fistule obstétricale est une lésion du périnée qui a pour conséquence l'incontinence urinaire ou fécale chronique. La fistule peut être causée, entre autres, par une grossesse précoce, un accouchement prolongé ou un traumatisme.

Au Sénégal, 25 % des femmes de 15-49 ans ont entendu parler de la fistule obstétricale. Le pourcentage de femmes ayant déclaré avoir actuellement ou avoir eu une fistule obstétricale est faible (0,2 %) (**Tableau 9.15**).

Variations selon certaines caractéristiques

- Le pourcentage de femmes ayant entendu parler de la fistule obstétricale est nettement plus élevé parmi les femmes de 35-49 ans que parmi les plus jeunes (38 % contre 25 % à 20-34 ans et 10 % à 15-19 ans).
- Le pourcentage de femmes ayant entendu parler de la fistule obstétricale ne varie pas de manière importante entre les régions, de 21 % dans la région Nord à 28 % dans les régions Ouest et Sud.
- Le pourcentage de femmes ayant déclaré avoir actuellement ou avoir eu une fistule obstétricale ne présente pas des variations selon les caractéristiques analysées.

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'information sur la santé maternelle, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 9.1** Soins prénatals
- **Tableau 9.2** Nombre de visites prénatales et stade de la grossesse à la première visite
- **Tableau 9.3** Composants des visites prénatales
- **Tableau 9.4** Vaccination antitétanique
- **Tableau 9.5** Lieu de l'accouchement
- **Tableau 9.6** Assistance au cours de l'accouchement
- **Tableau 9.7** Césarienne
- **Tableau 9.8** Durée du séjour dans l'établissement de santé après la naissance
- **Tableau 9.9** Moment où le premier examen postnatal a été dispensé à la mère
- **Tableau 9.10** Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal à la mère
- **Tableau 9.11** Moment où le premier examen postnatal a été dispensé au nouveau-né
- **Tableau 9.12** Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal au nouveau-né
- **Tableau 9.13** Contenu des soins postnatals dispensés aux nouveau-nés
- **Tableau 9.14** Problèmes d'accès aux soins de santé
- **Tableau 9.15** Connaissance et prévalence de la fistule obstétricale

Tableau 9.1 Soins prénatals

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête par type de prestataire de santé vu durant la grossesse de la naissance vivante la plus récente, et pourcentage ayant reçu, pour la naissance la plus récente, des soins prénatals dispensés par un prestataire de santé qualifié, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Prestataire de soins prénatals					Pourcentage ayant reçu des soins prénatals par un prestataire formé ¹		
	Médecin	Sage-femme	Infirmière	Matrone/accoucheuse traditionnelle	Autre	Pas de soins prénatals	Total	Effectif de femmes
Âge à la naissance								
<20	0,6	92,1	5,8	0,1	0,1	1,3	100,0	461
20-34	3,0	91,0	3,8	0,2	0,0	2,0	100,0	3 012
35-49	4,9	88,5	3,9	0,2	0,1	2,3	100,0	879
Rang de naissance								
1	4,8	91,0	3,2	0,1	0,0	0,9	100,0	963
2-3	3,8	90,6	3,8	0,2	0,0	1,6	100,0	1 532
4-5	2,8	90,5	3,6	0,3	0,0	2,7	100,0	1 007
6+	0,3	90,2	5,9	0,4	0,1	3,2	100,0	850
Résidence								
Urbain	6,5	92,1	0,9	0,0	0,0	0,4	100,0	1 763
Rural	0,8	89,6	6,2	0,4	0,1	3,1	100,0	2 589
Région								
Nord	1,0	89,8	6,6	0,0	0,0	2,7	100,0	720
Ouest	7,1	91,2	1,3	0,1	0,0	0,2	100,0	1 457
Centre	1,4	93,7	2,4	0,1	0,1	2,4	100,0	1 486
Sud	0,6	83,4	10,7	1,2	0,0	4,1	100,0	689
Niveau d'instruction								
Pas d'instruction	1,1	90,4	5,0	0,3	0,1	3,1	100,0	2 563
Primaire	2,0	94,4	3,0	0,2	0,0	0,4	100,0	958
Moyen/Secondaire ou plus	10,7	86,8	2,1	0,0	0,0	0,4	100,0	832
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	0,4	83,5	9,8	0,7	0,1	5,5	100,0	915
Second	0,4	90,9	5,7	0,3	0,1	2,7	100,0	921
Moyen	0,3	97,2	1,7	0,1	0,0	0,7	100,0	874
Quatrième	2,2	96,0	1,2	0,0	0,0	0,6	100,0	825
Le plus élevé	13,2	85,8	1,0	0,0	0,0	0,1	100,0	817
Ensemble	3,1	90,6	4,0	0,2	0,0	2,0	100,0	4 353

Note : Si plus d'un prestataire de soins prénatals a été déclaré, seul celui possédant les qualifications les plus élevées a été pris en compte dans ce tableau.

¹ Sont considérés, dans le pays, comme des prestataires de soins prénatals formés les Médecin, sage-femme et infirmière/ICP

Tableau 9.2 Nombre de visites prénatales et stade de la grossesse à la première visite

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête par nombre de visites prénatales pour la naissance vivante la plus récente et en fonction du stade de la grossesse au moment de la première visite prénatale ; parmi les femmes qui ont eu une visite prénatale, nombre médian de mois de grossesse à la première visite, selon le milieu de résidence, Sénégal 2018

Nombre de visites prénatales et stade de la grossesse	Résidence		
	Urbain	Rural	Ensemble
Nombre de consultations prénatales			
Aucune	0,4	3,1	2,0
1	3,1	4,9	4,2
2-3	23,8	41,6	34,4
4+	71,4	49,7	58,5
Ne sait pas/manquant	1,4	0,7	1,0
Total	100,0	100,0	100,0
Nombre de mois de grossesse à la première consultation prénatale			
Aucune consultation prénatale	0,4	3,1	2,0
<4	77,6	55,2	64,2
4-5	16,5	29,2	24,0
6-7	3,8	10,2	7,6
8+	0,3	1,1	0,8
Ne sait pas/manquant	1,4	1,2	1,3
Total	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes	1 763	2 589	4 353
Nombre médian de mois de grossesse à la première visite prénatale (pour les femmes ayant reçu des soins prénatals)			
	3,2	3,8	3,5
Effectif de femmes ayant reçu des soins prénatals	1 756	2 510	4 265

Tableau 9.3 Composants des visites prénatales

Parmi les femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant pris du fer, sous forme de comprimés ou de sirop, et pourcentages ayant pris des médicaments contre les parasites intestinaux au cours de la grossesse de la naissance vivante la plus récente ; parmi les femmes ayant reçu des soins prénatals pour la naissance vivante la plus récente ayant eu lieu dans les cinq années ayant précédé, pourcentage ayant effectué certains examens prénatals, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Parmi les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête, pourcentage qui, durant la grossesse la plus récente, ont pris :			Parmi les femmes ayant reçu des soins prénatals pour la naissance la plus récente des cinq dernières années, pourcentage qui :			
	Du fer sous forme de comprimés ou de sirop	Des médicaments contre les parasites intestinaux	Effectif de femmes ayant eu une naissance vivante dans les cinq dernières années	Ont eu leur tension artérielle vérifiée	Ont eu un prélèvement d'urine	Ont eu un prélèvement de sang	Effectif de femmes ayant reçu des soins prénatals pour la naissance la plus récente
Âge à la naissance							
<20	96,7	43,9	461	99,7	89,7	84,7	455
20-34	96,3	44,6	3 012	99,2	94,5	87,5	2 952
35-49	95,9	46,0	879	99,3	93,8	87,0	859
Rang de naissance							
1	97,7	46,0	963	99,7	93,9	91,7	954
2-3	97,0	45,6	1 532	99,7	94,8	88,1	1 508
4-5	94,9	44,6	1 007	98,7	94,0	83,3	980
6+	94,9	42,0	850	99,0	92,0	84,5	823
Résidence							
Urbain	97,9	51,0	1 763	99,5	96,8	91,8	1 756
Rural	95,1	40,6	2 589	99,2	91,8	83,8	2 510
Région							
Nord	95,8	26,1	720	98,9	87,1	72,0	701
Ouest	98,8	50,8	1 457	99,7	97,7	92,2	1 454
Centre	95,5	44,4	1 486	99,5	95,3	88,4	1 450
Sud	93,0	52,5	689	98,5	89,3	89,2	661
Niveau d'instruction							
Pas d'instruction	95,0	40,7	2 563	99,1	92,5	83,2	2 483
Primaire	97,8	48,7	958	99,4	95,4	90,5	954
Moyen/Secondaire ou plus	98,3	52,8	832	99,8	96,3	95,0	829
Quintiles de bien-être économique							
Le plus bas	91,2	33,3	915	98,1	86,2	76,5	865
Second	95,7	43,7	921	99,4	93,8	84,6	897
Moyen	97,2	44,9	874	99,3	95,8	88,6	868
Quatrième	98,7	50,1	825	99,9	97,0	91,3	820
Le plus élevé	99,1	53,3	817	99,9	96,8	95,4	816
Ensemble	96,3	44,8	4 353	99,3	93,9	87,1	4 265

Tableau 9.4 Vaccination antitétanique

Parmi les mères de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant reçu deux injections antitétaniques ou plus au cours de la grossesse de la naissance vivante la plus récente et pourcentage dont la dernière naissance vivante a été protégée contre le tétanos néonatal, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant reçu deux injections ou plus durant la dernière grossesse de la naissance vivante la plus récente	Pourcentage dont la naissance vivante la plus récente est protégée contre le tétanos néonatal ¹	Effectif de mères
Âge à la naissance			
<20	70,4	80,7	461
20-34	46,3	87,2	3 012
35-49	34,2	80,3	879
Rang de naissance			
1	81,8	83,1	963
2-3	42,4	90,7	1 532
4-5	34,0	85,3	1 007
6+	28,4	77,2	850
Résidence			
Urbain	55,7	87,9	1 763
Rural	40,1	83,2	2 589
Région			
Nord	31,0	76,0	720
Ouest	59,2	90,9	1 457
Centre	37,6	85,7	1 486
Sud	54,6	81,2	689
Niveau d'instruction			
Pas d'instruction	38,7	83,2	2 563
Primaire	51,6	87,9	958
Moyen/Secondaire ou plus	64,2	87,9	832
Quintiles de bien-être économique			
Le plus bas	37,5	77,5	915
Second	43,5	84,5	921
Moyen	41,7	85,7	874
Quatrième	52,4	89,1	825
Le plus élevé	58,8	89,7	817
Ensemble	46,4	85,1	4 353

¹ Y compris les mères ayant reçu deux injections au cours de la grossesse de la naissance vivante ou, au moins, deux injections (la dernière ayant été effectué au cours des trois années ayant précédé la dernière naissance vivante), ou, au moins, trois injections (la dernière ayant été effectué au cours des cinq années ayant précédé la dernière naissance vivante), ou, au moins, quatre injections (la dernière ayant été effectué au cours des dix années ayant précédé la dernière naissance vivante), ou, au moins, cinq injections avant la dernière naissance vivante.

Tableau 9.5 Lieu de l'accouchement

Répartition (en %) des naissances vivantes ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête par lieu d'accouchement et pourcentage dont l'accouchement s'est déroulé dans un établissement de santé, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Établissement de santé			Total	Pourcentage dont l'accouchement s'est déroulé dans un établissement de santé	Effectif de naissances
	Secteur public	Secteur privé	Maison			
Âge de la mère à la naissance						
<20	81,8	1,9	15,8	99,5	83,7	702
20-34	77,4	4,4	17,8	99,6	81,8	4 301
35-49	76,0	3,8	19,8	99,7	79,8	1 061
Rang de naissance						
1	85,2	6,9	7,1	99,1	92,0	1 425
2-3	79,3	5,0	15,4	99,6	84,2	2 150
4-5	73,7	2,2	24,1	100,0	75,9	1 328
6+	69,8	0,9	28,9	99,6	70,7	1 161
Visites prénatales¹						
Aucune	23,1	0,0	76,9	100,0	23,1	87
1-3	72,8	1,3	25,5	99,6	74,1	1 677
4+	86,0	6,7	6,9	99,6	92,6	2 547
Ne sait pas/manquant	79,7	0,0	20,3	100,0	79,7	42
Résidence						
Urbain	87,2	8,1	4,3	99,6	95,3	2 293
Rural	71,8	1,6	26,2	99,6	73,4	3 771
Région						
Nord	74,4	1,3	24,3	100,0	75,7	997
Ouest	86,3	8,4	4,4	99,2	94,8	1 899
Centre	76,1	3,0	20,6	99,7	79,1	2 175
Sud	67,6	0,6	31,5	99,7	68,2	993
Niveau d'instruction de la mère						
Pas d'instruction	73,3	1,6	24,9	99,7	74,9	3 782
Primaire	85,9	5,3	8,6	99,7	91,2	1 230
Moyen/Secondaire ou plus	83,7	11,2	3,8	98,8	94,9	1 053
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	53,3	0,5	45,5	99,3	53,8	1 422
Second	77,0	0,7	21,9	99,6	77,7	1 332
Moyen	90,0	2,2	7,8	100,0	92,2	1 197
Quatrième	93,4	3,7	2,7	99,8	97,1	1 069
Le plus élevé	81,2	15,5	2,5	99,2	96,7	1 044
Ensemble	77,6	4,0	17,9	99,6	81,7	6 064

¹ Concerne seulement la naissance vivante la plus récente ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête.

Tableau 9.6. Assistance au cours de l'accouchement

Répartition (en %) des naissances vivantes ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête par catégorie de personnel ayant assisté l'accouchement, pourcentage de naissances dont l'accouchement a été assisté par un prestataire de santé qualifié, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Personne ayant assisté l'accouchement							Total	Pourcentage dont l'accouchement a été assisté par un prestataire formé ¹	Effectif de naissances
	Médecin	Sage-femme	Infirmière	Matrone/ accoucheuse traditionnelle	Parents/Autre	Personne				
Âge de la mère à la naissance										
<20	5,4	67,0	4,3	14,5	6,5	2,3	100,0	76,6	702	
20-34	5,6	66,4	2,1	13,3	9,1	3,5	100,0	74,1	4 301	
35-49	5,6	66,1	1,1	13,7	9,2	4,3	100,0	72,8	1 061	
Rang de naissance										
1	10,8	73,6	2,7	8,8	3,2	0,9	100,0	87,2	1 425	
2-3	5,8	69,2	2,3	11,9	7,9	2,9	100,0	77,3	2 150	
4-5	3,3	61,1	1,8	18,3	11,3	4,2	100,0	66,3	1 328	
6+	1,4	58,4	1,7	16,8	14,5	7,1	100,0	61,6	1 161	
Visites prénatales¹										
Aucune	0,0	14,0	0,9	40,8	28,9	15,3	100,0	15,0	87	
1-3	3,8	59,3	2,4	17,8	12,5	4,3	100,0	65,4	1 677	
4+	9,0	75,3	1,8	8,8	3,7	1,5	100,0	86,1	2 547	
Ne sait pas/manquant	0,0	62,5	5,4	14,0	13,0	5,1	100,0	67,9	42	
Lieu de l'accouchement										
Établissement de santé	6,8	80,3	2,6	9,3	0,7	0,2	100,0	89,7	4 952	
Établissement public	5,5	80,9	2,7	9,8	0,7	0,3	100,0	89,2	4 707	
Établissement privé	31,2	67,8	0,5	0,5	0,0	0,0	100,0	99,5	245	
Autre	0,2	4,6	0,3	32,1	44,9	18,0	100,0	5,1	1 112	
Résidence										
Urbain	9,7	81,3	1,4	5,1	1,2	1,5	100,0	92,3	2 293	
Rural	3,1	57,3	2,7	18,6	13,4	4,7	100,0	63,2	3 771	
Région										
Nord	4,7	58,8	3,0	20,2	9,4	3,9	100,0	66,5	997	
Ouest	9,8	80,4	1,8	5,7	1,0	1,4	100,0	92,0	1 899	
Centre	3,6	65,0	1,6	15,1	12,2	2,7	100,0	70,1	2 175	
Sud	3,0	50,4	3,6	18,2	15,8	9,0	100,0	57,0	993	
Niveau d'instruction de la mère										
Pas d'instruction	3,2	60,2	2,3	17,4	12,2	4,6	100,0	65,8	3 782	
Primaire	5,1	78,1	2,0	7,6	4,8	2,3	100,0	85,2	1 230	
Moyen/Secondaire ou plus	14,8	74,9	1,9	6,2	1,4	0,8	100,0	91,6	1 053	
Quintiles de bien-être économique										
Le plus bas	1,8	39,4	3,8	21,9	24,2	8,8	100,0	45,1	1 422	
Second	2,8	62,3	1,9	17,8	11,5	3,8	100,0	67,0	1 332	
Moyen	3,5	76,8	1,9	13,3	2,5	2,0	100,0	82,2	1 197	
Quatrième	5,8	86,3	0,8	6,3	0,6	0,2	100,0	92,9	1 069	
Le plus élevé	16,5	76,1	2,1	4,2	0,0	1,1	100,0	94,7	1 044	
Ensemble	5,6	66,4	2,2	13,5	8,8	3,5	100,0	74,2	6 064	

Note : Si l'enquêtée a déclaré que plus d'une personne avait assisté l'accouchement, seule la personne possédant les qualifications les plus élevées est prise en compte dans ce tableau.

¹ Le personnel formé comprend les Médecins, sage-femmes et infirmières/ICP.

² Concerne seulement la naissance vivante la plus récente ayant eu au lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête.

Tableau 9.7 Césarienne

Pourcentage de naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête dont l'accouchement a eu lieu par césarienne, pourcentage accouché par césarienne qui était planifiée avant le début des douleurs de l'accouchement et pourcentage accouché par césarienne décidée après le début des douleurs de l'accouchement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage accouché par césarienne	Moment auquel a été prise la décision de réaliser une césarienne		Effectif de naissances
		Décidée avant le début des douleurs	Décidée après le début des douleurs	
Âge de la mère à la naissance				
<20	4,8	0,8	4,0	702
20-34	4,6	1,8	2,8	4 301
35-49	5,9	3,6	2,3	1 061
Rang de naissance				
1	9,3	2,8	6,5	1 425
2-3	4,3	2,2	2,0	2 150
4-5	3,4	1,8	1,5	1 328
6+	2,1	0,8	1,3	1 161
Visites prénatales¹				
Aucune	0,0	0,0	0,0	87
1-3	3,8	1,5	2,3	1 677
4+	7,2	3,1	4,1	2 547
Ne sait pas/manquant	0,0	0,0	0,0	42
Lieu de naissance				
Établissement de santé	5,9	2,4	3,5	4 952
Établissement public	5,4	2,2	3,2	4 707
Établissement privé	15,0	7,2	7,8	245
Résidence				
Urbain	7,6	3,5	4,2	2 293
Rural	3,1	1,1	2,0	3 771
Région				
Nord	4,6	1,6	3,1	997
Ouest	7,4	3,2	4,2	1 899
Centre	3,5	1,7	1,9	2 175
Sud	2,9	0,8	2,1	993
Niveau d'instruction de la mère				
Pas d'instruction	3,1	1,0	2,1	3 782
Primaire	4,4	1,9	2,5	1 230
Moyen/Secondaire ou plus	11,4	5,7	5,8	1 053
Quintiles de bien-être économique				
Le plus bas	2,1	0,8	1,4	1 422
Second	2,9	0,4	2,5	1 332
Moyen	3,9	1,0	2,9	1 197
Quatrième	5,5	2,4	3,1	1 069
Le plus élevé	11,3	6,4	4,9	1 044
Ensemble	4,8	2,0	2,8	6 064

Note : La question sur la césarienne n'est proposée qu'aux femmes qui ont accouché dans un établissement de santé. Dans ce tableau, on suppose que les femmes qui n'ont pas accouché dans un établissement de santé n'ont pas accouché par césarienne.

¹ Concerne seulement la naissance la plus récente ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête.

Tableau 9.8 Durée du séjour dans l'établissement de santé après la naissance

Parmi les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête dont l'accouchement de la naissance vivante la plus récente s'est déroulée dans un établissement de santé, répartition (en %) par durée de séjour dans l'établissement de santé suivant leur naissance vivante la plus récente, Sénégal 2018

Type d'accouchement	< 6 heures	6-11 heures	12-23 heures	1-2 jours	3 jours ⁺	NSP/ manquant	Total	Effectif de femmes
Naissance par voie basse	15,3	22,7	15,5	38,2	8,2	0,1	100,0	3 375
Naissance par césarienne	0,9	0,2	2,3	6,6	89,6	0,4	100,0	247
Manquant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32

Tableau 9.9 Moment où le premier examen postnatal a été dispensé à la mère

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance dans les deux années ayant précédé l'enquête, répartition (en %) par durée écoulée entre l'accouchement et le premier examen postnatal de la mère pour la naissance vivante la plus récente et pourcentage de femmes ayant eu une naissance dans les 2 années ayant précédé l'enquête qui ont reçu un examen postnatal au cours des deux jours ayant suivi la naissance, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Durée écoulée entre l'accouchement et le moment où la mère a reçu ses premiers soins postnatals ¹						Pas d'examen post-natals ²	Total	Pourcentage de femmes ayant reçu un examen postnatal dans les deux jours après la naissance ¹	Effectif de femmes
	Moins de 4 heures	4-23 heures	1-2 jours	3-6 jours	7-41 jours	Ne sait pas/ Manquant				
Âge à la naissance										
<20	77,4	4,2	2,5	0,6	3,7	4,1	7,6	100,0	84,0	288
20-34	74,2	6,6	3,4	0,5	3,6	2,6	9,0	100,0	84,2	1 720
35-49	73,4	4,5	6,1	0,4	2,9	2,1	10,5	100,0	84,1	427
Rang de naissance										
1	81,9	5,8	2,7	0,2	2,0	3,8	3,6	100,0	90,4	632
2-3	75,1	6,5	3,6	0,6	4,0	2,7	7,5	100,0	85,2	837
4-5	69,9	6,2	4,8	0,7	4,4	2,0	12,0	100,0	80,9	530
6+	68,1	4,8	4,5	0,6	3,4	1,8	16,7	100,0	77,4	436
Lieu d'accouchement										
Établissement de santé	84,6	5,8	2,6	0,3	1,6	3,0	2,1	100,0	93,0	2 056
Ailleurs	19,3	6,6	10,4	1,9	13,6	0,7	47,5	100,0	36,3	378
Résidence										
Urbain	84,0	5,7	3,5	0,1	2,1	2,6	2,0	100,0	93,3	912
Rural	68,7	6,1	4,0	0,7	4,3	2,7	13,4	100,0	78,8	1 523
Région										
Nord	71,9	4,1	4,1	0,7	1,7	2,4	15,1	100,0	80,1	406
Ouest	82,3	6,8	4,4	0,1	3,2	1,6	1,5	100,0	93,5	750
Centre	72,8	7,6	4,1	0,6	4,7	1,3	8,9	100,0	84,5	885
Sud	65,9	2,5	1,5	0,7	3,2	8,1	18,1	100,0	69,9	395
Niveau d'instruction										
Pas d'instruction	70,1	5,8	4,0	0,5	4,2	2,5	13,0	100,0	79,8	1 459
Primaire	82,3	6,6	2,1	0,2	2,2	2,5	4,0	100,0	91,1	476
Moyen/Secondaire ou plus	79,5	5,8	4,9	0,8	2,8	3,5	2,7	100,0	90,3	500
Quintiles de bien-être économique										
Le plus bas	55,0	4,1	3,8	0,9	6,6	3,3	26,2	100,0	62,9	549
Second	73,7	8,1	3,8	0,4	3,2	2,0	9,0	100,0	85,6	565
Moyen	82,3	6,3	1,7	0,9	2,0	3,5	3,2	100,0	90,4	495
Quatrième	85,7	5,9	2,2	0,2	3,2	1,5	1,2	100,0	93,9	409
Le plus élevé	80,6	5,1	7,7	0,0	1,8	3,0	1,7	100,0	93,4	416
Ensemble	74,4	5,9	3,8	0,5	3,5	2,7	9,1	100,0	84,2	2 435

¹ Sont incluses les femmes qui ont eu un examen postnatal dispensé par un médecin, une sage-femme, une infirmière, un agent de santé communautaire ou une sage-femme traditionnelle.

² Y compris les femmes qui ont eu un examen postnatal après 41 jours.

Tableau 9.10 Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal à la mère

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance dans les deux années ayant précédé l'enquête, répartition (en %) par type de prestataire de santé ayant dispensé le premier examen postnatal de la mère au cours des deux jours ayant suivi la dernière naissance vivante, selon certaines caractéristiques sociodémographiques Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Type de prestataire de santé qui a dispensé les premiers soins postnatals à la mère :		Pas d'examen postnatal au cours des deux jours après la naissance	Total	Effectif de femmes
	Médecin/infirmière/sage-femme	Matrone/accoucheuse traditionnelle			
Âge à la naissance					
<20	79,6	4,5	16,0	100,0	288
20-34	78,3	6,0	15,8	100,0	1 720
35-49	77,2	6,9	15,9	100,0	427
Rang de naissance					
1	86,5	3,8	9,6	100,0	632
2-3	79,7	5,4	14,8	100,0	837
4-5	73,5	7,3	19,1	100,0	530
6+	69,1	8,3	22,6	100,0	436
Lieu d'accouchement					
Établissement de santé	86,9	6,1	7,0	100,0	2 056
Ailleurs	31,3	5,0	63,7	100,0	378
Résidence					
Urbain	91,4	1,9	6,7	100,0	912
Rural	70,4	8,4	21,2	100,0	1 523
Région					
Nord	73,4	6,7	19,9	100,0	406
Ouest	92,5	1,1	6,5	100,0	750
Centre	76,2	8,3	15,5	100,0	885
Sud	60,8	9,1	30,1	100,0	395
Niveau d'instruction					
Pas d'instruction	72,2	7,6	20,2	100,0	1 459
Primaire	86,6	4,5	8,9	100,0	476
Moyen/Secondaire ou plus	87,9	2,3	9,7	100,0	500
Quintiles de bien-être économique					
Le plus bas	54,2	8,8	37,1	100,0	549
Second	77,3	8,3	14,4	100,0	565
Moyen	84,0	6,4	9,6	100,0	495
Quatrième	91,9	2,0	6,1	100,0	409
Le plus élevé	91,0	2,4	6,6	100,0	416
Ensemble	78,2	5,9	15,8	100,0	2 435

Tableau 9.11 Moment où le premier examen postnatal a été dispensé au nouveau-né

Répartition (en %) des dernières naissances vivantes ayant eu lieu au cours des deux années ayant précédé l'enquête par durée écoulée entre le premier examen postnatal et l'accouchement et pourcentage de naissances ayant eu un examen postnatal dans les deux premiers jours après la naissance, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Durée écoulée entre l'accouchement et le moment où le nouveau-né a reçu ses premiers soins postnatals ¹						Pas d'examen postnatals ²	Total	Pourcentage de naissances ayant eu un examen postnatal dans les deux premiers jours après la naissance ¹	Effectif de naissances
	Moins d'1 heure	1-3 heures	4-23 heures	1-2 jours	3-6 jours	Ne sait pas/manquant				
Âge de la mère à la naissance										
<20	69,3	10,6	2,1	2,1	0,5	3,5	11,9	100,0	84,1	288
20-34	68,3	10,8	3,0	2,3	1,2	1,9	12,5	100,0	84,4	1 720
35-49	66,8	10,2	1,7	3,4	1,2	2,3	14,4	100,0	82,0	427
Rang de naissance										
1	76,2	10,7	1,2	1,7	0,2	3,9	6,1	100,0	89,8	632
2-3	70,3	10,0	3,8	2,2	1,2	1,8	10,6	100,0	86,3	837
4-5	61,5	12,7	3,2	3,7	1,6	1,2	16,2	100,0	81,1	530
6+	60,5	9,5	2,1	2,4	1,5	1,5	22,4	100,0	74,6	436
Lieu d'accouchement										
Établissement de santé	79,7	10,8	2,2	1,0	0,8	2,4	3,0	100,0	93,7	2 056
Ailleurs	5,5	9,8	5,3	10,2	2,8	0,6	65,7	100,0	30,8	378
Résidence										
Urbain	79,0	10,7	2,8	1,4	0,6	2,0	3,5	100,0	93,8	912
Rural	61,7	10,7	2,6	3,1	1,4	2,2	18,3	100,0	78,1	1 523
Région										
Nord	46,8	23,5	3,0	3,6	1,2	0,4	21,5	100,0	76,9	406
Ouest	83,4	5,6	4,0	1,7	0,5	1,3	3,5	100,0	94,7	750
Centre	70,0	9,9	1,8	3,0	1,4	1,1	12,7	100,0	84,7	885
Sud	57,0	8,8	1,9	1,5	1,4	7,9	21,6	100,0	69,1	395
Niveau d'instruction de la mère										
Pas d'instruction	63,1	10,6	2,3	3,3	1,2	1,9	17,6	100,0	79,3	1 459
Primaire	75,5	12,0	3,3	0,5	0,4	1,8	6,5	100,0	91,3	476
Moyen/Secondaire ou plus	75,9	9,7	3,0	1,7	1,6	3,2	4,8	100,0	90,4	500
Quintiles de bien-être économique										
Le plus bas	46,9	9,1	1,9	3,7	1,6	2,8	34,0	100,0	61,5	549
Second	66,1	12,0	2,7	2,2	1,4	2,5	13,1	100,0	83,0	565
Moyen	72,7	11,9	4,0	2,1	0,8	3,1	5,4	100,0	90,7	495
Quatrième	80,4	10,8	2,7	1,5	0,5	0,6	3,6	100,0	95,3	409
Le plus élevé	81,7	9,5	2,1	2,4	0,9	1,3	2,1	100,0	95,7	416
Ensemble	68,2	10,7	2,7	2,4	1,1	2,2	12,8	100,0	84,0	2 435

¹ Sont inclus les nouveau-nés qui ont eu un examen postnatal dispensé par un médecin, une sage-femme, une infirmière, un agent de santé communautaire ou une sage-femme traditionnelle.

² Y compris les nouveau-nés qui ont eu un examen après la première semaine.

Tableau 9.12 Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal au nouveau-né

Répartition (en %) des dernières naissances vivantes ayant eu lieu au cours des deux années ayant précédé l'enquête par type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal au nouveau-né dans les deux jours après la naissance selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Type de prestataire de santé qui a dispensé les premiers soins postnatals au nouveau-né		Pas d'examen postnatal au cours des deux jours après la naissance	Total	Effectif de naissances
	Médecin/infirmière/sage-femme	Matrone/accoucheuse traditionnelle			
Âge de la mère à la naissance					
<20	79,8	4,3	15,9	100,0	288
20-34	78,6	5,8	15,6	100,0	1 720
35-49	75,0	7,0	18,0	100,0	427
Rang de naissance					
1	85,7	4,1	10,2	100,0	632
2-3	80,7	5,7	13,7	100,0	837
4-5	73,6	7,5	18,9	100,0	530
6+	67,7	6,8	25,4	100,0	436
Lieu d'accouchement					
Établissement de santé	87,3	6,4	6,3	100,0	2 056
Ailleurs	28,0	2,9	69,2	100,0	378
Résidence					
Urbain	92,0	1,8	6,2	100,0	912
Rural	69,8	8,3	21,9	100,0	1 523
Région					
Nord	72,2	4,7	23,1	100,0	406
Ouest	93,0	1,7	5,3	100,0	750
Centre	76,4	8,4	15,3	100,0	885
Sud	59,7	9,4	30,9	100,0	395
Niveau d'instruction de la mère					
Pas d'instruction	71,9	7,4	20,7	100,0	1 459
Primaire	87,1	4,2	8,7	100,0	476
Moyen/Secondaire ou plus	87,6	2,7	9,6	100,0	500
Quintiles de bien-être économique					
Le plus bas	53,5	8,0	38,5	100,0	549
Second	75,2	7,8	17,0	100,0	565
Moyen	83,9	6,8	9,3	100,0	495
Quatrième	92,8	2,5	4,7	100,0	409
Le plus élevé	93,1	2,6	4,3	100,0	416
Ensemble	78,1	5,9	16,0	100,0	2 435

Tableau 9.13 Contenu des examens postnatals dispensés aux nouveau-nés

Parmi les naissances vivantes les plus récentes ayant eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, pourcentage pour lesquelles on a effectué certains examens et pourcentage pour lesquelles on a effectué au moins deux actes/conseils au cours des deux premiers jours après la naissance, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Parmi les dernières naissances ayant eu lieu au cours des deux années avant l'enquête, pourcentage pour lesquelles on a effectué certains examens au cours des deux jours qui ont suivi la naissance						Pesé ¹	Pourcentage pour lesquelles on a effectué au moins deux actes/conseils au cours des deux premiers jours après la naissance	Effectif de naissances
	Examen du cordon	Prise de température	Conseil sur les signes de danger	Conseil sur l'allaitement	Observation de l'allaitement	Pesé ¹			
Âge de la mère à la naissance									
<20	69,9	68,2	45,0	48,3	30,3	69,1	70,9	288	
20-34	71,5	69,7	42,5	48,5	25,1	76,2	71,8	1 720	
35-49	70,5	68,0	42,1	46,3	24,5	69,0	70,8	427	
Rang de naissance									
1	74,8	73,0	44,4	54,4	31,4	83,5	75,0	632	
2-3	73,2	71,9	47,3	49,9	22,6	77,8	73,9	837	
4-5	67,7	65,6	35,2	42,2	23,6	65,7	68,1	530	
6+	65,7	63,0	40,6	42,5	25,3	63,6	66,2	436	
Lieu d'accouchement									
Établissement de santé	76,2	74,5	46,4	53,0	28,3	84,3	77,1	2 056	
Ailleurs	43,5	40,5	22,7	21,5	10,9	18,5	41,6	378	
Résidence									
Urbain	78,9	78,6	47,8	54,9	27,7	89,3	79,6	912	
Rural	66,5	63,6	39,7	44,0	24,3	65,0	66,7	1 523	
Région									
Nord	74,0	70,6	35,8	50,1	8,0	62,3	74,4	406	
Ouest	77,9	77,9	40,8	52,9	25,0	89,7	78,3	750	
Centre	72,0	70,1	52,4	44,4	29,6	70,9	72,7	885	
Sud	53,4	49,5	31,7	45,0	35,8	63,7	53,1	395	
Niveau d'instruction de la mère									
Pas d'instruction	66,8	64,2	38,2	43,2	21,6	65,7	67,0	1 459	
Primaire	79,6	79,0	51,7	56,4	32,9	79,9	80,9	476	
Moyen/Secondaire ou plus	75,6	74,7	47,2	54,4	30,2	93,0	75,9	500	
Quintiles de bien-être économique									
Le plus bas	53,2	49,9	28,4	36,4	21,9	50,7	52,7	549	
Second	70,9	69,3	43,6	46,7	25,9	68,8	72,0	565	
Moyen	76,8	73,5	47,1	50,4	24,6	78,1	77,3	495	
Quatrième	76,5	76,0	44,4	47,9	23,6	87,4	77,4	409	
Le plus élevé	82,9	82,7	53,6	62,7	33,1	94,4	83,2	416	
Ensemble	71,1	69,2	42,7	48,1	25,6	74,1	71,5	2 435	

¹ Concerne les nouveau-nés qui ont été pesés « À la naissance ». Il se peut que certains nouveau-nés pesés au cours des 2 jours après la naissance aient été exclus.

Tableau 9.14 Problèmes d'accès aux soins de santé

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont déclaré qu'elles avaient des problèmes importants d'accès aux soins de santé quand elles étaient malades, par type de problèmes rencontrés, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Problèmes d'accès aux soins de santé				Au moins un problème d'accès aux soins de santé	Effectif de femmes
	Obtenir la permission d'aller se faire soigner	Obtenir l'argent pour aller se faire soigner	Distance jusqu'à l'établissement de santé	Ne veut pas s'y rendre seule		
Groupe d'âges						
15-19	12,0	38,7	20,6	20,6	52,4	2 056
20-34	11,7	39,6	20,5	11,1	47,7	4 663
35-49	13,2	52,1	21,7	11,7	57,2	2 695
Nombre d'enfants vivants						
0	10,7	37,0	17,2	15,0	47,7	3 527
1-2	11,7	36,4	19,1	10,6	45,0	2 450
3-4	12,5	47,1	21,8	11,4	53,6	1 717
5+	15,7	60,5	29,7	15,9	66,3	1 721
État matrimonial						
Célibataire	12,7	39,4	15,7	14,2	49,2	2 873
En union	11,7	44,3	23,7	13,2	52,6	6 013
En rupture d'union	15,0	46,8	16,6	10,2	51,3	528
Emploi au cours des 12 derniers mois						
Ne travaillait pas	11,1	38,5	20,5	14,4	48,4	3 892
Travaillait et était payée en argent	13,2	44,2	17,0	9,6	51,0	4 055
Travaillait et n'était pas payée en argent	12,2	51,4	32,4	20,8	61,2	1 467
Résidence						
Urbain	14,0	35,9	8,2	5,9	41,1	4 518
Rural	10,5	49,5	32,5	20,2	61,0	4 896
Région						
Nord	4,6	51,1	32,8	17,1	59,6	1 565
Ouest	19,2	35,6	9,3	3,7	40,4	3 725
Centre	8,6	45,0	24,2	13,8	55,7	2 870
Sud	8,8	50,0	32,3	36,3	64,4	1 254
Niveau d'instruction						
Pas d'instruction	13,3	52,1	28,1	16,4	60,4	4 304
Primaire	13,5	40,7	17,2	11,8	48,8	2 070
Moyen/Secondaire ou plus	9,7	31,6	13,1	10,0	40,7	3 040
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	13,7	61,5	47,8	34,7	74,2	1 508
Second	12,4	52,8	33,6	17,6	65,0	1 659
Moyen	10,4	43,1	18,9	10,8	51,4	1 908
Quatrième	15,3	38,8	7,2	5,3	44,0	2 065
Le plus élevé	9,7	27,2	7,6	5,5	33,3	2 273
Ensemble	12,2	43,0	20,8	13,3	51,5	9 414

Tableau 9.15 Connaissance et prévalence de la fistule obstétricale

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant entendu parler de la fistule obstétricale, pourcentage de femmes connaissant personnellement une femme qui a ou qui a eu de la fistule obstétricale et pourcentage de femmes ayant déclaré avoir ou avoir eu une fistule obstétricale, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes ayant entendu parler de la fistule	Pourcentage de femmes ayant déclaré avoir ou avoir eu une fistule	Effectif de femmes
Groupe d'âges			
15-19	9,7	0,1	2 056
20-34	25,0	0,2	4 663
35-49	37,9	0,2	2 695
Nombre d'enfants vivants			
0	19,4	0,1	3 527
1-2	26,2	0,1	2 450
3-4	30,7	0,2	1 717
5+	31,2	0,2	1 721
État matrimonial			
Célibataire	17,6	0,1	2 873
En union	28,2	0,2	6 013
En rupture d'union	35,6	0,1	528
Résidence			
Urbain	29,3	0,1	4 518
Rural	21,7	0,2	4 896
Région			
Nord	21,2	0,2	1 565
Ouest	28,1	0,2	3 725
Centre	23,2	0,2	2 870
Sud	27,6	0,1	1 254
Niveau d'instruction			
Pas d'instruction	23,6	0,3	4 304
Primaire	22,2	0,0	2 070
Moyen/Secondaire ou plus	30,1	0,1	3 040
Quintiles de bien-être économique			
Le plus bas	19,2	0,2	1 508
Second	21,0	0,3	1 659
Moyen	21,9	0,0	1 908
Quatrième	27,4	0,2	2 065
Le plus élevé	33,7	0,1	2 273
Ensemble	25,4	0,2	9 414

Résultats clés

- **Vaccination** : Trois enfants de 12-23 mois sur quatre (77 %) ont reçu tous les vaccins de base.
- **Symptômes d'IRA** : des conseils ou traitement ont été recherchés pour 59 % des enfants de moins de cinq ans qui ont eu des symptômes d'IRA dans les deux semaines avant l'interview.
- **Fièvre** : des conseils ou traitement ont été recherchés pour 53 % des enfants de moins de cinq ans qui ont eu de la fièvre dans les deux semaines avant l'interview.
- **Diarrhée** : des conseils ou traitement ont été recherchés pour 46 % des enfants de moins de cinq ans qui ont eu la diarrhée dans les deux semaines avant l'interview. Parmi les enfants ayant eu la diarrhée dans les deux semaines avant l'interview, 58 % ont reçu une TRO. **Par contre, 28 % n'ont reçu aucun traitement.**

Les données sur la santé et la survie des enfants peuvent aider les décideurs et les responsables de programmes à évaluer l'efficacité des stratégies actuelles, à élaborer des interventions appropriées pour prévenir les décès causés par les maladies infantiles et améliorer la santé des enfants au Sénégal.

Ce chapitre présente les résultats concernant le poids à la naissance, la couverture vaccinale des jeunes enfants, la prévalence et les traitements des trois maladies infantiles les plus courantes. Les symptômes d'infections respiratoires aiguës (IRA), la fièvre et la diarrhée, y sont aussi analysés. En outre, étant donné l'importance des pratiques hygiéniques appropriées dans la prévention et la réduction des maladies diarrhéiques, le chapitre présente aussi les résultats sur l'évacuation des selles des enfants.

10.1 POIDS À LA NAISSANCE

Faible poids à la naissance

Pourcentage de naissances dont le poids déclaré à la naissance est <2,5 kg sans tenir compte de l'âge gestationnel.

Échantillon : Naissances vivantes ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête pour lesquelles on dispose d'un poids à la naissance déclaré, soit basé sur un enregistrement écrit, soit basé sur la déclaration de la mère.

Dans l'ensemble, un poids à la naissance a été déclaré pour un peu plus de six enfants sur dix (63 %). Ce pourcentage varie de manière importante selon les caractéristiques sociodémographiques. En effet, on dispose d'un poids à la naissance pour 73 % des naissances de rang 1 contre 51 % de celles de rangs 6 et plus. En milieu urbain, 79 % des naissances ont été pesées contre 53 % en milieu rural. On dispose d'un poids à la naissance pour 88 % des naissances dont la mère a le niveau moyen/secondaire ou plus contre 53 % quand la mère n'a aucun niveau d'instruction. Il faut tenir compte de ces différentiels quand on compare les enfants de faible poids à la naissance.

Parmi les enfants pour lesquels on pèse à la naissance a été déclaré, 12 % pèsent moins de 2,5 kg (**Tableau 10.1**).

- Les régions de l'Ouest et du Centre enregistrent le pourcentage le plus élevé de naissance pesant moins de 2,5 kg (12 %) et c'est dans la zone Nord que l'on enregistre le pourcentage le plus faible (10 %).

10.2 VACCINATION DES ENFANTS

Le programme élargi de vaccination (PEV) initié au Sénégal depuis 1979, visait la réduction de la morbidité et de la mortalité liées à sept maladies cibles que sont : la tuberculose, la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole et la fièvre jaune.

Le vaccin contre l'hépatite B qui était initialement administré dans le cadre du Programme National de Lutte contre l'Hépatite B (PNLHB) a été officiellement introduit dans le PEV en 2004.

En juillet 2005, le vaccin contre les infections à *Haemophilus influenzae* b (Hib) a été introduit, portant le nombre d'antigènes à neuf. Cet antigène initialement administré dans une présentation séparée a été combiné au DTC-Hep B à partir de 2005, donnant naissance au « Pentavalent » DTCHePB-Hib.

Entre 2013 et 2016, cinq nouveaux vaccins ont été introduits : vaccin anti pneumococcique conjugué 13 valent (PCV13), vaccin contre la rubéole combinée à la rougeole (RR), vaccin monovalent contre les diarrhées à rotavirus (Rotarix), le vaccin polio inactivé (VPI) et le vaccin monovalent contre les hépatites B à la naissance (Hep B).

Par ailleurs, une seconde dose de RR a été introduite en 2014 et est administrée aux enfants à partir de 15 mois. Entre 2014 et 2016, un projet de démonstration de la vaccination des jeunes filles âgées de 9 ans contre les infections au virus du papillome humain (HPV) a été mis en œuvre au niveau de deux districts sanitaires. Le vaccin contre le HPV est officiellement introduit dans le PEV de routine en novembre 2018. Les axes stratégiques majeurs du PEV sont :

- Le renforcement du système de santé et de la vaccination ;
- Le financement adéquat et durable du PEV ;
- Le renforcement de la logistique, des infrastructures et de la maintenance des équipements ;
- L'amélioration de la communication et de la mobilisation sociale en faveur du PEV ;
- L'amélioration du système de gestion des vaccins ;
- L'amélioration de la gestion des données sanitaires ;
- Le renforcement des ressources humaines ;
- Le renforcement de la coordination à tous les niveaux ;
- L'implication de la société civile.

Couverture de tous les vaccins de base

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu des vaccins spécifiques à n'importe quel moment avant l'enquête (selon le carnet de vaccination ou la déclaration de la mère). On considère qu'un enfant a reçu tous les vaccins de base, s'il a reçu au moins :

- Une dose du vaccin BCG qui protège contre la tuberculose
- Trois doses de vaccin DTC qui protège contre la diphtérie, la coqueluche
- Trois doses de vaccin contre la polio
- Une dose de vaccin contre la rougeole

Échantillon : Enfants vivants de 12-23 mois


Au Sénégal, 77 % des enfants de 12-23 mois avaient reçu, au moment de l'enquête, tous les vaccins de base. En revanche, le pourcentage d'enfants qui n'ont reçu aucun des vaccins du Programme Elargi de Vaccination (PEV) est de 2 % (**Tableau 10.3** et **Graphique 10.1**).

Tendances : La comparaison des résultats avec la première phase de l'EDS-C (2012-2013) montre une légère augmentation de la couverture vaccinale des enfants de 12-23 mois ayant reçu tous les vaccins de base à n'importe quel moment avant l'enquête (70 % contre 77 %) (**Graphique 10.2**). On note une augmentation plus légère de la couverture de la polio, le pourcentage d'enfants ayant reçu la troisième dose étant passée de 83 % en 2012-2013 à 85 % en 2018.

Variations par caractéristique


- Le pourcentage d'enfants de 12-23 mois qui ont reçu tous les vaccins appropriés pour le groupe d'âges est de 52 % (**Tableau 10.3**).
- La quasi-totalité des enfants de 12-23 mois ont reçu le BCG (95 %).
- Les taux de vaccination pour le Pentavalent sont très élevés. Ils sont estimés à 96 % pour la première dose, à 95 % pour la deuxième dose et à 93 % pour la troisième. En ce qui concerne la polio, les résultats montrent aussi des niveaux élevés de vaccination bien que la couverture pour la troisième dose soit un peu plus faible que pour les précédentes (85 % contre 96 % pour la première dose) (**Graphique 10.1**). Pour le vaccin contre la rougeole / rubéole 86 % des enfants âgés de 12-23 mois ont reçu la dose.
- La couverture vaccinale de base est la même en milieu urbain qu'en milieu rural (77 %) (**Tableau 10.3**).
- La proportion d'enfants ayant reçu tous les vaccins appropriés pour le groupe d'âges est légèrement plus faible en milieu rural qu'en milieu urbain (50 % contre 54 %).
- C'est dans la région Ouest que la couverture vaccinale des enfants est la meilleure (81 %). A l'opposé, c'est dans la région Nord qu'elle est la plus faible (70 %)
- La couverture vaccinale de base est meilleure parmi les enfants du quintile le plus élevé que parmi ceux du quintile le plus bas (84 % contre 72 %).

Graphique 10.1 Vaccinations infantiles



Graphique 10.2 Tendances de la couverture vaccinale

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu tous les vaccins de base à n'importe quel moment avant l'enquête



Possession et disponibilité d'un carnet de vaccination

Le carnet de vaccination est un document important pour s'assurer que l'enfant a bien reçu tous les vaccins recommandés. Au Sénégal, 98 % des enfants de 12-23 mois et 97 % de ceux de 24-35 mois ont déjà eu un carnet de vaccination. Cependant, au moment de l'enquête, seulement 80 % des enfants de 12-23 mois et 63 % de ceux de 24-35 mois avaient un carnet de vaccination qui a été observé (**Tableau 10.4**).

Variations par caractéristique

Sauf dans la région Nord (74 %), dans les autres trois grandes régions, les pourcentages d'enfants de 12 à 23 mois ayant un carnet de vaccination qui a été vu dépassent 80 %.

Sauf dans la région du Sud (54 %), au moins 60 % des enfants âgés de 24 à 35 mois disposent d'un carnet de vaccination qui a été observé au moment de l'enquête.

10.3 SYMPTÔMES D'INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS

Les infections respiratoires aiguës (IRA), et particulièrement la pneumonie, constituent l'une des premières causes de mortalité des enfants dans les pays en développement. Pour évaluer la prévalence de ces infections chez les enfants, on a demandé aux enquêtées si leurs enfants avaient souffert de la toux pendant les deux semaines ayant précédé l'interview. Dans le cas d'une réponse positive, on a demandé si cette toux avait été accompagnée d'une respiration courte et rapide, et si ces difficultés respiratoires étaient dues à un problème de bronches (symptômes caractéristiques d'IRA). Pour les enfants qui avaient présenté des symptômes d'IRA au cours de cette période, on a demandé s'ils avaient été conduits en consultation ou si des conseils ou un traitement avaient été recherchés.

Traitement des infections respiratoires aiguës (IRA)

Enfants avec des symptômes d'IRA pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement. Les symptômes d'IRA comprennent une respiration courte et rapide associée à des problèmes dans la poitrine, et/ou de difficultés respiratoires associées à des problèmes dans la poitrine.

Échantillon : Enfants de moins de cinq ans ayant présenté des symptômes d'IRA au cours des deux semaines ayant précédé l'interview

Parmi les enfants de moins de cinq ans, 5 % avaient présenté des symptômes d'IRA au cours des deux semaines ayant précédé l'interview. Parmi ces enfants, des conseils ou un traitement auprès d'un établissement ou d'un prestataire de santé ont été recherchés pour 59 % d'entre eux et, dans 29% des cas, les enfants ont bénéficié de traitement ou de conseils le jour même ou le jour suivant (**Tableau 10.5**). C'est dans le secteur public, en majorité dans les postes de santé du gouvernement (54 %), que l'on a recherché le plus fréquemment un traitement ou des conseils pour traiter les IRA des enfants (77 %) (**Tableau 10.6**).

Variations par caractéristique

En milieu urbain, la proportion d'enfants pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement le jour même ou le jour suivant auprès d'un établissement de santé ou d'un prestataire de santé est plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural (36 % contre 24 %).

10.4 FIÈVRE

Traitement de la fièvre

Enfants avec de la fièvre pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement.

Échantillon : Enfants de moins de cinq ans ayant eu de la fièvre au cours des deux semaines ayant précédé l'interview.

Pour estimer la prévalence de la fièvre, on a demandé aux mères si leurs enfants de moins de cinq ans avaient eu de la fièvre au cours des deux semaines ayant précédé l'interview. Au Sénégal, 20 % des enfants de moins de cinq ans avaient eu de la fièvre durant cette période (**Tableau 10.7**). Pour 53 % des enfants ayant eu de la fièvre, on a recherché un traitement ou des conseils. Près d'un tiers des enfants avec de la fièvre ont été traités rapidement, c'est-à-dire le jour même ou le suivant l'apparition de la fièvre (32 %).

Variations par caractéristique

La recherche de conseils ou de traitement pour les enfants de moins de cinq ans ayant eu de la fièvre varie de manière importante avec le quintile de bien-être du ménage. En effet, plus le niveau de bien-être économique est élevé, plus le recours aux soins pour l'enfant est fréquent : de 38 % dans le quintile de bien-être économique le plus bas, le pourcentage d'enfants dont la fièvre a été traitée passe à 64 % dans le quatrième quintile et à 61 % dans le quintile le plus élevé.

10.5 MALADIES DIARRHÉIQUES

10.5.1 Prévalence de la diarrhée

Au Sénégal, 17 % des enfants de moins de cinq ans ont eu au moins un épisode de diarrhée au cours des deux semaines ayant précédé l'interview. Un traitement ou des conseils auprès d'un établissement ou d'un prestataire de santé ont été recherchés pour 46 % de ces enfants (**Tableau 10.8**).


Variations par caractéristique

C'est dans les groupes d'âges 6-11 mois et 12-23 mois que la prévalence de la diarrhée demeure la plus élevée (27 % pour le groupe d'âges 6-11 et 26 % pour les 12-23 mois). Elle diminue ensuite pour toucher 8 % des enfants du groupe d'âges 48-59 mois (**Graphique 10.3**).

- La prévalence de la diarrhée est près de deux fois plus élevée dans la région Sud que dans la région Nord (23 % contre 13 %) (**Tableau 10.8**).
- C'est dans le quintile de bien-être économique le plus élevé que la prévalence de la diarrhée est la plus faible (14 %) et le recours aux soins le plus fréquent (56 %).
- Le pourcentage d'enfants pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés varie de 40 % dans les régions Nord et Centre à 55 % dans la région Ouest.

Graphique 10.3 Prévalence de la diarrhée par âge

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines avant l'enquête



10.5.2 Pratiques alimentaires durant la diarrhée

Pratiques alimentaires appropriées


Enfants avec diarrhée à qui on a donné plus de liquides que d'habitude et la même quantité de nourriture ou plus que d'habitude.

Échantillon : Enfants de moins de cinq ans ayant eu la diarrhée au cours des deux semaines ayant précédé l'interview.

Le **Tableau 10.9** présente les résultats concernant les pratiques alimentaires suivies pendant la diarrhée de l'enfant. Au cours des épisodes diarrhéiques, il est recommandé de donner plus de liquides et d'aliments à l'enfant. Cependant, les résultats montrent que 38 % des enfants ayant eu la diarrhée ont reçu la même quantité de liquides qu'en temps normal et que 19 % des enfants malades ont reçu des quantités de liquides réduites. Enfin, 1 % des enfants n'ont pas reçu de liquides (**Graphique 10.4**).

Graphique 10.4 Pratiques alimentaires pendant la diarrhée

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines avant l'enquête



La proportion d'enfants ayant eu la diarrhée nourris conformément aux recommandations est de 40 %. Ces enfants ont reçu la même quantité de nourriture (40 %). Par contre, dans 44 % des cas, les enfants en ont reçu moins.

Variations par caractéristique

C'est dans la région Nord (13 %) que l'on note le pourcentage le plus faible d'enfants ayant reçu davantage de liquides. En revanche, la région Sud enregistre la proportion la plus élevée (57 %).

10.5.3 Thérapie de réhydratation par voie orale (TRO) et autres traitements de la diarrhée

Thérapie de réhydratation par voie orale

Enfants avec diarrhée à qui on a augmenté les quantités de liquides ou à qui on a donné des liquides préparés à partir de sachets spéciaux de sels de réhydratation orale (SRO) ou des liquides préparés à partir de solution maison recommandée par le gouvernement (SMR).

Échantillon : Enfants de moins de cinq ans ayant eu la diarrhée au cours des deux semaines ayant précédé l'interview.

Le **Tableau 10.10** présente les pourcentages d'enfants à qui on a donné divers traitements pour traiter la diarrhée. Dans 58 % des cas, on a administré aux enfants malades une TRO, soit des SRO, des SMR, ou une augmentation des liquides. En outre, 28 % des enfants ayant eu la diarrhée ont reçu du zinc seulement. Et 28 % des enfants ayant eu la diarrhée au cours des deux semaines avant l'interview n'ont eu aucun traitement (**Graphique 10.5**).

Variations par caractéristique

- Les résultats montrent que c'est dans la région Nord que le pourcentage d'enfants qui n'ont pas été traités pour la diarrhée est le plus élevé (40 %). Par contre, la zone Sud enregistre la proportion la plus faible (19 %) (**Tableau 10.10**).

10.5.4 Source des conseils ou traitements

Le **Tableau 10.11** présente les pourcentages d'enfants de moins de cinq ans ayant eu la diarrhée pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement en fonction de la source des conseils /traitements. Ces résultats sont présentés pour trois catégories d'enfants : les enfants ayant eu la diarrhée, ceux ayant eu la diarrhée et pour lesquels on a recherché des conseils ou traitements et ceux ayant eu la diarrhée et qui ont reçu des SRO.


C'est au secteur public que se sont adressés les enquêtés pour obtenir des conseils ou traitements pour soigner les enfants ayant eu la diarrhée, quelle que soit la catégorie d'enfants. Ce sont les postes de santé du gouvernement qui jouent le rôle le plus important.

10.5.5 Connaissance des sachets de SRO

Au Sénégal, 77 % des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête connaissent les sachets de SRO ou les liquides SRO préconditionnés pour le traitement de la diarrhée (**Tableau 10.12**). La connaissance augmente avec l'âge de la femme. Dans les régions, c'est dans celle de l'Ouest que la proportion de femmes connaissant les sachets de SRO ou les liquides SRO pour le traitement de la diarrhée est le plus faible (75 % contre 79 % dans le Nord et le Sud).

Graphique 10.5 Traitement de la diarrhée


Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines avant l'interview



10.5.6 Traitement des maladies infantiles

Au Sénégal, les résultats de l'EDS Continue 2018 montrent que la fièvre (20 %) et la diarrhée (17 %) sont les maladies qui ont le plus affecté les enfants de moins de cinq ans au cours des deux semaines ayant précédé l'interview contre 5 % pour les IRA. Néanmoins, c'est pour les enfants ayant souffert d'IRA que l'on a le plus fréquemment recherché des conseils ou un traitement (59 % contre 53 % dans le cas de fièvre et 46 % pour la diarrhée) (Graphique 10.6).

Graphique 10.6 Prévalence et traitement des maladies infantiles



10.6 ÉVACUATION DES SELLES DES ENFANTS

Évacuation appropriée des selles des enfants

Les selles de l'enfant le plus jeune ont été jetées ou rincées dans les toilettes ou les latrines, ou enterrées, ou l'enfant a utilisé les toilettes ou les latrines.

Échantillon : le plus jeune enfant de moins de 2 ans vivant avec sa mère

Le **Tableau 10.13** montre que pour 63 % des enfants, on s'est débarrassé des selles des enfants de manière hygiénique. En effet, dans la majeure partie des cas (61 %), les selles des enfants ont été jetées ou rincées dans les toilettes ou latrines et, dans moins de 2 % des cas, les enfants ont utilisé les toilettes/latrines ou leurs selles ont été enterrées. S'agissant des pratiques non hygiéniques, les résultats révèlent que dans 34 % des cas, les selles des enfants ont été jetées aux ordures.

Variations par caractéristique

- Le pourcentage d'enfants pour lesquels on s'est débarrassé des selles de manière hygiénique est plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain (65 % contre 59 %).
- Les résultats selon les régions montrent que c'est dans la région Sud que les pratiques hygiéniques pour se débarrasser des selles des enfants sont les mieux respectées (79 % contre 55 % dans la région Ouest)
- C'est dans le quintile de bien-être économique le plus élevé qu'on note le plus faible pourcentage d'enfants dont les selles ont été évacuées de manière hygiénique, avec une proportion de 41 % contre 74 % dans les quintile second et moyen.

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur le faible poids à la naissance, les vaccinations, les maladies infantiles et l'évacuation des selles des enfants, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 10.1** **Taille et poids de l'enfant à la naissance**
- **Tableau 10.2** **Vaccination par source d'information**
- **Tableau 10.3** **Vaccinations par caractéristique sociodémographique**
- **Tableau 10.4** **Possession et observation des carnets de vaccination, selon certaines caractéristiques sociodémographiques**
- **Tableau 10.5** **Prévalence et traitement des symptômes d'IRA**
- **Tableau 10.6** **Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant présenté des symptômes d'IRA**
- **Tableau 10.7** **Prévalence et traitement de la fièvre**
- **Tableau 10.8** **Prévalence et traitement de la diarrhée**
- **Tableau 10.9** **Pratiques alimentaires durant la diarrhée**
- **Tableau 10.10** **Thérapie de Réhydratation par voie orale, supplémentation en zinc et administration d'autres traitements contre la diarrhée**
- **Tableau 10.11** **Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant eu la diarrhée**
- **Tableau 10.12** **Connaissance des sachets SRO ou des liquides SRO préconditionnés**
- **Tableau 10.13** **Évaluation des selles des enfants**

Tableau 10.1. Taille et poids de l'enfant à la naissance

Répartition (en %) des naissances vivantes ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête selon l'estimation, par la mère, de la grosseur de l'enfant à la naissance, pourcentage des naissances vivantes des 5 années ayant précédé l'enquête pour lesquelles un poids à la naissance a été déclaré et parmi les naissances vivantes ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête dont on connaît le poids à la naissance, pourcentage qui pèse moins de 2,5 kg, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Répartition (%) des naissances dont le poids à la naissance a été déclaré			Moyen ou plus gros que la moyenne	Ne sait pas/manquant	Total	Pourcentage de toutes les naissances dont le poids à la naissance a été déclaré ¹		Répartition (en %) de toutes les naissances vivantes par grosseur de l'enfant à la naissance ¹	
	Très petit	Plus petit que la moyenne	Moyen ou plus gros que la moyenne				Effectif de naissances	Pourcentage pesant moins de 2,5 kg	Effectif d'enfants	Pourcentage pesant moins de 2,5 kg
Âge de la mère à la naissance										
<20	15,9	21,4	62,0	0,7	100,0	56,6	702	14,8	397	
20-34	13,6	19,2	66,2	1,0	100,0	64,8	4 301	10,5	2 786	
35-49	14,5	18,6	66,2	0,7	100,0	60,5	1 061	15,7	642	
Rang de naissance										
1	16,6	23,0	59,6	0,8	100,0	73,2	1 425	14,6	1 044	
2-3	14,3	18,5	66,2	0,9	100,0	66,0	2 150	11,2	1 420	
4-5	12,2	16,4	70,2	1,3	100,0	58,3	1 328	9,8	775	
6+	12,4	19,9	67,1	0,6	100,0	50,5	1 161	10,8	586	
Consommation de tabac/cigarettes par la mère										
Ne fume pas	14,0	19,4	65,7	0,9	100,0	63,1	6 064	11,8	3 825	
Résidence										
Urbain	16,1	17,2	66,0	0,7	100,0	79,4	2 293	12,2	1 822	
Rural	12,7	20,7	65,5	1,1	100,0	53,1	3 771	11,5	2 003	
Région										
Nord	15,1	18,7	66,2	0,0	100,0	51,8	997	9,6	516	
Ouest	20,0	17,2	62,2	0,6	100,0	78,7	1 899	12,3	1 495	
Centre	11,7	25,3	62,2	0,8	100,0	59,0	2 175	12,4	1 283	
Sud	6,6	11,2	79,6	2,7	100,0	53,4	993	11,1	530	
Niveau d'instruction de la mère										
Pas d'instruction	13,7	20,0	65,3	1,0	100,0	53,3	3 782	10,9	2 014	
Primaire	13,9	18,6	66,9	0,6	100,0	71,9	1 230	13,4	884	
Moyen/Secondaire ou plus	15,3	18,1	65,7	0,9	100,0	88,0	1 053	12,2	927	
Quintiles de bien-être économique										
Le plus bas	13,0	16,5	68,9	1,7	100,0	37,6	1 422	11,9	535	
Second	13,5	23,1	62,5	1,0	100,0	57,0	1 332	12,2	759	
Moyen	12,6	22,3	64,3	0,7	100,0	68,2	1 197	9,9	817	
Quatrième	16,6	17,4	65,5	0,5	100,0	75,2	1 069	11,1	804	
Le plus élevé	15,0	17,1	67,4	0,5	100,0	87,3	1 044	13,7	911	
Ensemble	14,0	19,4	65,7	0,9	100,0	63,1	6 064	11,8	3 825	

¹ Basé soit sur un enregistrement écrit, soit sur la déclaration de la mère.

Tableau 10.2 Vaccinations par source d'information

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois et d'enfants de 24-35 mois qui ont reçu certains vaccins à n'importe quel moment avant l'enquête, par source d'information (carnet de vaccination ou déclaration de la mère) et pourcentage qui ont reçu certains vaccins à l'âge approprié Sénégal 2018

Vaccin	Enfants de 12-23 mois				Enfants de 24-35 mois			
	Carnet de vaccination ¹	Déclaration de la mère	Les deux sources	Vacciné à l'âge approprié ^{2,3}	Carnet de vaccination ¹	Déclaration de la mère	Les deux sources	Vacciné à l'âge approprié ^{2,3}
BCG	78,1	17,2	95,3	95,1	60,8	34,0	94,8	94,2
HepB (dose à la naissance)¹	59,9	13,9	73,8	73,4	30,9	26,3	57,2	56,5
Dans le jour qui a suivi la naissance	31,6	na	na	na	11,8	na	na	na
1 jour après la naissance	22,7	na	na	na	14,1	na	na	na
Pentavalent								
1	79,6	16,8	96,4	96,3	61,7	34,1	95,8	95,1
2	78,6	16,8	95,4	95,1	61,0	33,6	94,6	93,8
3	76,4	16,2	92,6	91,6	60,1	32,7	92,8	89,0
Vaccin contre la polio²								
0 (dose naissance)	63,3	15,0	78,3	78,2	42,3	28,9	71,1	70,8
1	79,7	16,0	95,7	95,6	61,7	32,7	94,5	93,6
2	78,7	15,8	94,5	94,0	61,1	31,8	92,9	91,7
3	76,5	8,5	85,0	83,3	60,2	16,7	76,9	73,2
Pneumocoque								
1	79,6	16,5	96,1	96,0	61,7	33,6	95,3	94,6
2	78,6	16,5	95,1	94,6	60,8	33,1	93,9	93,1
3	76,4	15,9	92,3	90,9	59,8	32,2	92,0	88,4
Rotavirus								
1	78,3	16,2	94,5	94,4	60,2	32,4	92,6	91,9
2	77,3	15,9	93,3	92,7	59,1	31,8	90,9	89,0
Vaccin contenant un antigène contre la rougeole								
1	70,3	15,1	85,5	78,2	58,8	32,0	90,8	78,7
2	na	na	na	na	41,8	19,1	60,9	59,7
Tous les vaccins de base³	69,0	7,5	76,6	69,3	56,6	15,8	72,4	62,8
Tous les vaccins appropriés pour le groupe d'âges⁴	46,8	5,1	51,8	46,9	17,9	7,0	24,9	23,1
Aucun vaccin	0,0	2,4	2,4	na	0,1	3,0	3,1	na
Effectif d'enfants	980	247	1 227	1 227	684	408	1 092	1 092

na = Non applicable

BCG = Bacille Calmette-Guérin

DTC = Diphthérie-Tétanos-coqueluche

HepB = Hépatite B

Hib = Haemophilus influenzae type b

¹ Carnet, carte de vaccination, livret ou autre enregistrement écrit

² Reçu avant l'Age de 12 mois

³ Pour les enfants dont les informations sur la vaccination sont basées sur la déclaration de la mère, la date de la vaccination n'est pas collectée. On considère que les proportions de vaccins données au cours de la première et de la deuxième année sont les mêmes que pour les enfants possédant un enregistrement écrit des vaccins.

⁴ reçus avant l'Age de 12 mois pour tous les vaccins sauf pour contre la rougeole 2, qui devrait être reçu avant l'Age de 24 mois.

⁵ En ce qui concerne les enfants dont les informations sur la vaccination sont basées sur la déclaration de la mère, on considère que ceux pour lesquels on a déclaré qu'ils avaient reçu l'hépatite B (dose naissance) ont reçu ce vaccin dans les 24 heures suivant la naissance. En ce qui concerne les enfants dont les informations sur la vaccination sont basées sur un enregistrement écrit, on considère qu'ils ont reçu l'hépatite B (dose naissance) si ce vaccin est enregistré sur leur carnet, sans tenir compte du moment où la dose a été administrée.

⁶ BCG, trois doses de DTC-HEPB-HIB, trois doses du vaccin oral contre la polio (non compris le vaccin contre la polio donnée à la naissance) et une dose de vaccin contre la rougeole

⁷ Pour les enfants de 12-23 mois : BCG, hépatite B (dose naissance), trois doses de DTC-HEPB-HIB, trois doses du vaccin oral contre la polio, trois doses du vaccin contre le pneumocoque, deux doses du vaccin contre le rotavirus et une dose de vaccin contre la rougeole. Pour les enfants de 24-35 mois, tous ces vaccins plus une seconde dose du vaccin contre la rougeole.

Tableau 10.3 Vaccinations par caractéristique sociodémographique

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois et de 24-35 mois qui ont reçu certains vaccins à n'importe quel moment avant l'enquête (selon le carnet de vaccination ou la déclaration de la mère) pourcentage ayant reçu tous les vaccins de base et pourcentage ayant reçu tous les vaccins appropriés pour le groupe d'âges, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Vaccin contre la Polio ²						Pneumocoque			Rotavirus		Enfants âgés de 25-35 mois :								
	Pentavalent			0 (dose nais- sance) ¹			1	2	3	1	2	Tous les vaccins de base d'âges ⁴	Tous les vaccins appropriés pour le groupe d'âges ⁴	Rougeole/ Rubéole (RR1 ou ROR1)	Effectif d'enfants	Rougeole/ Rubéole (RR2 ou ROR2)	Effectif d'enfants	Tous les vaccins appropriés pour le groupe d'âges ⁵		
	HepB (dose nais- sance) ¹	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	Aucun vaccin	Effectif d'enfants	Aucun vaccin	Effectif d'enfants	Tous les vaccins appropriés pour le groupe d'âges ⁵			
Sexe																				
Masculin	95,6	97,2	95,7	93,4	79,5	96,7	95,0	84,3	96,9	95,5	93,2	95,5	94,0	86,0	76,2	50,0	582	61,7	25,8	596
Féminin	95,0	95,7	95,2	91,8	77,2	94,7	94,0	85,6	95,3	94,7	91,5	93,6	92,6	85,0	76,9	53,5	645	59,9	23,9	496
Rang de naissance																				
1	97,4	98,5	98,5	97,2	82,8	96,8	96,5	89,1	98,3	98,3	96,9	96,8	96,3	90,4	81,8	54,5	300	67,0	31,5	219
2-3	95,6	96,5	95,9	93,3	79,7	95,7	94,7	86,1	96,2	95,7	93,3	95,3	94,6	84,9	76,3	53,1	422	61,5	24,8	411
4-5	94,0	95,5	94,8	90,2	73,2	95,1	94,3	82,7	95,3	94,5	89,9	92,0	91,3	84,0	74,7	45,2	272	56,4	21,2	252
6+	93,5	94,6	91,4	88,2	75,9	94,9	91,6	80,4	93,8	90,6	87,2	93,0	89,3	81,8	72,5	53,9	232	58,6	22,7	210
Résidence																				
Urbain	98,4	98,3	97,8	94,5	85,7	97,0	96,2	85,3	98,1	97,6	94,3	95,9	95,4	86,0	76,6	54,2	468	61,7	30,9	390
Rural	93,4	95,2	93,9	91,4	73,7	94,9	93,4	84,8	94,8	93,5	91,0	93,7	91,9	85,1	76,6	50,4	758	60,4	21,6	702
Région																				
Nord	97,0	97,7	96,4	93,1	70,1	94,9	93,6	76,4	97,7	96,4	93,5	97,3	96,0	87,4	70,2	41,2	203	49,9	10,2	178
Ouest	98,7	99,0	99,0	97,1	85,4	98,3	98,3	90,9	99,0	99,0	97,1	96,7	96,7	87,5	80,8	54,6	385	67,9	35,4	325
Centre	93,4	95,0	93,6	91,2	80,4	94,8	93,4	84,9	94,8	93,4	91,0	93,5	92,1	85,3	77,7	56,4	433	67,0	27,8	422
Sud	91,3	93,1	91,6	86,6	68,6	93,4	90,6	82,6	91,4	89,9	84,7	90,0	86,5	80,1	72,5	47,5	206	43,2	13,1	166
Niveau d'instruction de la mère																				
Pas d'instruction	93,4	95,0	93,9	90,2	74,5	94,6	93,2	83,1	94,5	93,4	89,7	92,8	91,1	81,5	72,5	47,8	740	57,9	20,9	709
Primaire	96,8	97,4	96,0	94,6	81,5	96,2	94,8	90,2	97,3	95,9	94,5	96,4	95,4	90,6	84,1	59,4	255	58,6	23,3	210
Moyen/Secondaire ou plus	99,5	99,7	99,7	98,0	86,7	98,6	98,1	85,5	99,6	99,6	97,9	98,1	97,8	92,4	81,5	56,3	232	75,7	43,3	172
Quintiles de bien-être économique																				
Le plus bas	91,5	94,6	92,1	88,5	65,9	94,7	91,8	81,3	93,8	91,2	87,7	92,1	88,9	80,8	71,6	42,0	284	51,4	16,6	263
Second	95,1	96,2	95,4	92,0	77,9	95,5	94,6	84,0	96,0	95,3	91,9	95,3	94,0	85,8	76,7	53,8	282	60,4	22,7	243
Moyen	92,5	93,1	92,0	90,4	75,7	92,6	91,2	85,7	92,7	91,6	89,8	91,7	90,4	82,8	74,2	51,0	243	61,9	21,4	221
Quatrième	99,4	99,4	99,4	96,9	86,1	97,6	97,2	88,2	99,1	99,1	97,0	99,1	99,1	85,4	78,0	56,0	202	61,1	29,4	194
Le plus élevé	99,7	100,0	100,0	97,1	90,6	99,0	99,0	87,4	100,0	100,0	97,1	95,8	95,8	94,3	84,3	59,1	216	74,6	40,1	171
Ensemble	95,3	96,4	95,4	92,6	78,3	95,7	94,5	85,0	96,1	95,1	92,3	94,5	93,3	85,5	76,6	51,8	1 227	60,9	24,9	1 092

Note : On considère que les enfants ont reçu le vaccin si le vaccin est enregistré sur le carnet de vaccination ou si la mère a déclaré que l'enfant l'avait reçu. Pour les enfants dont les informations sont basées sur la déclaration de la mère, la date de la vaccination n'est pas collectée. On suppose que les proportions de vaccinations données pendant la première et la deuxième année sont les mêmes que pour les enfants possédant un enregistrement écrit des vaccinations.

BCG = Bacille Calmette-Guérin

DTC = Diphthérie-tétanos-coqueluche

HepB = Hépatite B

Hib = Haemophilus influenzae type b

¹ Concernant les enfants dont les informations sur la vaccination sont basées sur la déclaration de la mère, on considère que ceux pour lesquels on a déclaré qu'ils avaient reçu l'hépatite B (dose naissance) ont reçu ce vaccin dans les 24 heures suivant la naissance. En ce qui concerne les enfants dont les informations sur la vaccination sont basées sur un enregistrement écrit, on considère qu'ils ont reçu l'hépatite B (dose naissance) si leur vaccin est enregistré dans leur carnet, sans tenir compte du moment où la dose a été administrée.

² Polio 0 est le vaccin contre la polio donné à la naissance.

³ BCG, trois doses de DTC-HEPB-HIB, trois doses du vaccin oral contre la polio (non compris le vaccin contre la polio donné à la naissance) et une dose de vaccin contre la rougeole

⁴ BCG, hépatite B (dose naissance), trois doses de DTC-HEPB-HIB, trois doses du vaccin oral contre la polio, trois doses du vaccin contre le pneumocoque, deux doses du vaccin contre le rotavirus et une dose de vaccin contre la rougeole

⁵ BCG, Hépatite B (dose naissance), trois doses de DTC-HEPB-HIB (Pentavalent), trois doses du vaccin oral contre la polio, trois doses du vaccin contre le pneumocoque, deux doses du vaccin contre le rotavirus et deux doses du vaccin contre la rougeole

Tableau 10.4 Possession et observation des carnets de vaccination, selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois et d'enfants de 24-35 mois qui ont déjà eu un carnet de vaccination et pourcentage avec un carnet de vaccination qui a été vu, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Enfants de 12-23 mois			Enfants de 24-35 mois		
	Pourcentage ayant déjà eu un carnet de vaccination ¹	Pourcentage avec un carnet de vaccination qui a été vu ¹	Effectif d'enfants	Pourcentage ayant déjà eu un carnet de vaccination ¹	Pourcentage avec un carnet de vaccination qui a été vu ¹	Effectif d'enfants
Sexe						
Masculin	98,7	78,9	582	97,1	62,0	596
Féminin	96,9	80,8	645	96,3	63,5	496
Rang de naissance						
1	99,4	80,9	300	97,7	54,2	219
2-3	97,8	79,2	422	97,7	61,0	411
4-5	96,4	83,8	272	97,3	67,6	252
6+	97,1	75,1	232	93,1	68,6	210
Résidence						
Urbain	99,0	79,2	468	98,9	61,8	390
Rural	97,0	80,3	758	95,5	63,1	702
Région						
Nord	98,9	73,7	203	97,3	62,9	178
Ouest	99,0	80,5	285	99,9	67,3	325
Centre	96,7	81,1	433	97,2	62,3	422
Sud	96,5	82,3	206	98,8	54,2	166
Niveau d'instruction de la mère						
Pas d'instruction	97,1	80,4	740	95,8	62,5	709
Primaire	97,9	79,4	255	98,9	67,0	210
Moyen/Secondaire ou plus	99,9	78,6	232	97,9	57,8	172
Manquant	*	*	0	*	*	0
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	96,1	79,8	284	91,6	61,8	263
Second	98,6	80,9	282	95,7	63,9	243
Moyen	94,9	78,4	243	99,1	62,1	221
Quatrième	100,0	77,2	202	99,4	65,8	194
Le plus élevé	100,0	82,8	216	100,0	59,2	171
Ensemble	97,8	79,9	1 227	96,7	62,6	1 092

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Carnet, carte de vaccination, livret ou autre enregistrement écrit

Tableau 10.5 Prévalence et traitement des symptômes d'IRA

Parmi les enfants de moins de 5 ans, pourcentage ayant eu des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA) au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview ; parmi les enfants ayant présenté des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Parmi les enfants de moins de 5 ans :		Parmi les enfants de moins de 5 ans avec des symptômes d'IRA :		
	Pourcentage avec des symptômes d'IRA ¹	Effectif d'enfants	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés ²	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés le jour même ou le jour suivant	Effectif d'enfants
Âge en mois					
<6	5,5	541	(60,6)	(34,2)	30
6-11	7,3	666	(56,1)	(19,9)	49
12-23	6,0	1 227	62,8	31,6	74
24-35	5,6	1 092	55,5	30,3	61
36-47	3,7	1 106	(60,7)	(21,6)	41
48-59	3,0	1 189	(55,3)	(36,3)	36
Sexe					
Masculin	4,9	2 937	57,3	33,5	145
Féminin	5,1	2 883	60,1	24,1	146
Consommation de tabac/cigarettes par la mère					
Ne fume pas	5,0	5 820	58,7	28,8	291
Combustible utilisé pour cuisiner					
Électricité ou gaz	5,3	1 342	(65,5)	(32,7)	72
Charbon/lignite	4,8	3 231	50,9	22,7	156
Charbon de bois	4,8	1 193	(67,7)	(36,9)	57
Excréments d'animaux	(10,7)	38	*	*	4
Autre combustible	*	2	*	*	0
Pas de repas préparé dans le ménage	*	14	*	*	2
Résidence					
Urbain	5,1	2 210	72,6	35,6	113
Rural	4,9	3 610	49,8	24,4	178
Région					
Nord	4,0	952	(45,7)	(7,6)	38
Ouest	5,2	1 828	(76,1)	(37,0)	95
Centre	6,5	2 097	51,2	29,8	137
Sud	2,3	943	(52,3)	(23,4)	22
Niveau d'instruction de la mère					
Pas d'instruction	4,3	3 622	49,6	20,5	155
Primaire	5,2	1 184	78,9	42,9	62
Moyen/Secondaire ou plus	7,3	1 014	60,7	34,3	74
Quintiles de bien-être économique					
Le plus bas	3,8	1 352	40,3	19,4	51
Second	4,8	1 281	54,8	21,9	62
Moyen	5,8	1 156	61,4	34,7	67
Quatrième	4,4	1 011	(65,1)	(39,8)	45
Le plus élevé	6,5	1 020	(69,3)	(29,1)	66
Ensemble	5,0	5 820	58,7	28,8	291

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Les symptômes d'IRA incluent une respiration courte et rapide associé à des problèmes de congestion dans la poitrine et/ou des difficultés respiratoires associés à des problèmes de congestion dans la poitrine.

² Sont inclus les conseils ou traitements fournis par : secteur public, secteur médical privé boutique, marché et vendeur de médicaments ambulants. Ne sont pas pris en compte ici les conseils ou traitements fournis par un praticien traditionnel.

³ Y compris l'herbe, les arbustes et les résidus agricoles.

Tableau 10.6 Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant présenté des symptômes d'IRA

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant présenté des symptômes d'IRA au cours des deux semaines ayant précédé l'interview pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques ; parmi les enfants de moins de 5 ans ayant présenté des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques, Sénégal 2018

Source	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été demandés auprès de chaque source :	
	Parmi les enfants avec des symptômes d'IRA ¹	Parmi les enfants avec des symptômes de IRA pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés ¹
Secteur public	45,1	76,8
Hôpital du gouvernement	2,3	3,9
Centre de santé du gouvernement	8,9	15,2
Poste de santé du gouvernement	31,9	54,4
Agent de santé/agent communautaire	0,3	0,4
Autre secteur public	3,0	5,2
Secteur privé	12,0	20,4
Hôpital/clinique privé	1,4	2,4
Pharmacie	10,2	17,4
Autre secteur médical privé	0,4	0,7
Autre secteur privé	1,5	2,5
Boutique	0,2	0,3
Marché	1,3	2,1
Autre	0,8	1,3
Effectif d'enfants	291	171

ASC = Agent de santé communautaire

¹ Les symptômes d'IRA incluent une respiration courte et rapide associé à des problèmes de congestion dans la poitrine et/ou des difficultés respiratoires associés à des problèmes de congestion dans la poitrine.

Tableau 10.7 Prévalence et traitement de la fièvre

Parmi les enfants de moins de 5 ans, pourcentage ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview ; parmi les enfants ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés et pourcentage ayant reçu des antibiotiques comme traitement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Parmi les enfants de moins de 5 ans :		Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre :			
	Pourcentage ayant eu de la fièvre	Effectif d'enfants	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement été recherchés ¹	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés le jour même ou le jour suivant	Pourcentage qui ont pris des antibiotiques	Effectif d'enfants
Âge en mois						
<6	19,6	541	50,0	32,2	23,5	106
6-11	29,8	666	56,5	28,8	30,0	199
12-23	26,9	1 227	54,1	32,1	29,8	330
24-35	20,1	1 092	48,7	31,5	22,4	220
36-47	13,5	1 106	48,8	29,4	26,5	149
48-59	11,8	1 189	57,4	40,7	27,5	140
Sexe						
Masculin	20,3	2 937	52,1	35,1	28,4	597
Féminin	19,0	2 883	53,6	28,9	25,7	547
Résidence						
Urbain	19,7	2 210	62,5	39,8	23,2	435
Rural	19,6	3 610	46,9	27,4	29,5	709
Région						
Nord	16,3	952	39,2	12,9	31,2	155
Ouest	18,0	1 828	71,7	43,4	21,7	329
Centre	21,2	2 097	45,3	28,4	30,7	445
Sud	22,9	943	49,3	36,3	25,0	215
Niveau d'instruction de la mère						
Pas d'instruction	18,9	3 622	46,0	26,7	26,4	686
Primaire	20,4	1 184	63,4	41,2	29,8	242
Moyen/Secondaire ou plus	21,3	1 014	62,6	39,1	26,5	216
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	17,7	1 352	37,8	22,8	17,7	239
Second	20,5	1 281	49,7	26,5	32,8	262
Moyen	18,8	1 156	54,6	36,2	31,1	217
Quatrième	18,5	1 011	63,8	45,6	35,2	187
Le plus élevé	23,4	1 020	61,1	33,3	20,4	239
Ensemble	19,7	5 820	52,8	32,1	27,1	1 144

¹ Sont inclus les conseils ou traitement des sources suivantes : secteur public, secteur médical privé, boutique, marché et vendeur de médicaments ambulants. Non compris les conseils ou traitements fournis par un praticien traditionnel.

Tableau 10.8 Prévalence et traitement de la diarrhée

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview ; parmi les enfants ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant eu la diarrhée	Effectif d'enfants	Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée :	
			Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés ¹	Effectif d'enfants ayant eu la diarrhée
Âge en mois				
<6	11,7	541	37,6	64
6-11	27,1	666	41,2	180
12-23	26,1	1 227	51,2	320
24-35	18,5	1 092	45,7	201
36-47	12,2	1 106	46,6	135
48-59	8,3	1 189	39,0	98
Sexe				
Masculin	17,8	2 937	46,0	523
Féminin	16,5	2 883	45,2	475
Source d'approvisionnement en eau de boisson²				
Source améliorée	16,3	4 541	46,2	742
Non améliorée	20,0	1 279	43,9	256
Type de toilettes/latrines³				
Toilettes améliorées	17,0	3 446	48,1	587
Toilettes non améliorée	17,3	2 374	42,1	411
Toilettes partagées ⁴	17,3	859	44,3	148
Toilettes non améliorée	18,6	816	48,9	152
Défécation en plein air	15,8	699	29,8	111
Résidence				
Urbain	16,4	2 210	50,0	363
Rural	17,6	3 610	43,1	635
Région				
Nord	13,0	952	39,5	123
Ouest	14,8	1 828	55,1	270
Centre	18,6	2 097	39,5	390
Sud	22,7	943	48,2	214
Niveau d'instruction de la mère				
Pas d'instruction	16,6	3 622	41,9	601
Primaire	19,6	1 184	55,3	232
Moyen/Secondaire ou plus	16,2	1 014	45,6	165
Quintiles de bien-être économique				
Le plus bas	17,4	1 352	40,3	235
Second	19,9	1 281	40,7	255
Moyen	17,1	1 156	47,2	198
Quatrième	17,1	1 011	50,2	173
Le plus élevé	13,5	1 020	55,7	138
Ensemble	17,1	5 820	45,6	998

¹ Sont inclus les conseils ou traitement des sources suivantes : secteur public, secteur médical privé, boutique, marché et vendeur de médicaments ambulants. Non compris les conseils ou traitements fournis par un praticien traditionnel.

² Se référer Tableau 2.1 pour la définition des catégories

³ Se référer Tableau 2.3 pour la définition des catégories

⁴ Toilettes qui seraient considérées comme améliorées si elles n'étaient pas partagées par deux ménages ou plus.

Tableau 10.9. Pratiques alimentaires durant la diarrhée

Répartition (en %) des enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des deux semaines ayant précédé l'interview par quantité de liquides et d'aliments donnée par rapport aux quantités habituelles, selon certaines caractéristiques sociodémographiques Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Quantité de liquide donnée					Quantité de nourriture donnée					Effectif d'enfants avec la diarrhée					
	Davantage	Même que d'habitude	Un peu moins	Beaucoup moins	Aucune	Ne sait pas/manquant	Total	Davantage	Même que d'habitude	Un peu moins		Beaucoup moins	Aucune	Ne mange pas encore	Ne sait pas/manquant	Total
Âge en mois																
<6	22,7	49,7	12,5	1,8	13,3	0,0	100,0	2,2	24,8	20,1	0,0	2,0	50,9	0,0	100,0	64
6-11	36,6	42,0	18,1	2,5	0,4	0,4	100,0	1,5	37,9	34,1	7,7	3,4	15,3	0,0	100,0	180
12-23	45,9	34,0	17,0	2,9	0,2	0,0	100,0	6,1	36,6	37,2	10,0	6,1	3,3	0,7	100,0	320
24-35	50,5	31,8	15,6	2,1	0,0	0,0	100,0	4,8	47,8	33,8	9,2	2,5	1,9	0,0	100,0	201
36-47	31,8	44,0	15,2	1,6	0,0	7,3	100,0	3,3	43,9	37,8	10,5	0,0	0,0	4,5	100,0	135
48-59	40,0	41,9	16,0	1,4	0,0	0,7	100,0	8,0	45,3	38,3	6,6	1,1	0,0	0,7	100,0	98
Sexe																
Masculin	42,8	39,5	13,9	3,1	0,5	0,1	100,0	4,1	41,0	33,6	11,4	2,9	6,6	0,5	100,0	523
Féminin	39,4	36,6	18,9	1,4	1,5	2,2	100,0	5,2	39,3	36,7	5,4	3,7	8,3	1,4	100,0	475
Allaitement																
Allaite	37,3	40,6	16,6	3,1	2,3	0,2	100,0	2,9	35,7	32,5	8,0	5,3	15,6	0,0	100,0	446
N'allait pas	44,3	36,1	16,0	1,6	0,0	1,9	100,0	6,0	43,8	37,2	8,9	1,7	0,8	1,6	100,0	552
Résidence																
Urbain	42,8	35,4	15,3	3,2	0,4	2,9	100,0	7,2	40,3	37,9	8,0	1,2	3,6	1,9	100,0	363
Rural	40,3	39,7	16,8	1,8	1,4	0,1	100,0	3,1	40,1	33,5	8,8	4,5	9,6	0,4	100,0	635
Région																
Nord	13,3	44,5	37,0	2,7	1,9	0,5	100,0	1,2	56,1	29,6	4,7	0,5	7,8	0,0	100,0	123
Ouest	47,2	29,4	17,2	2,8	0,0	3,4	100,0	9,3	30,5	43,7	10,3	0,0	4,0	2,2	100,0	270
Centre	37,0	45,4	15,4	1,1	1,1	0,0	100,0	1,4	37,5	37,7	6,9	4,8	11,1	0,6	100,0	390
Sud	57,2	32,1	4,9	3,6	1,5	0,6	100,0	6,4	48,2	22,5	11,4	6,3	4,8	0,3	100,0	214
Niveau d'instruction de la mère																
Pas d'instruction	37,5	40,7	19,1	1,3	1,3	0,2	100,0	4,0	42,2	34,9	6,1	3,1	9,5	0,1	100,0	601
Primaire	48,3	29,8	16,0	1,5	0,2	4,2	100,0	5,0	35,8	36,4	13,5	3,2	3,5	2,6	100,0	232
Moyen/Secondaire ou plus	44,9	40,5	6,5	6,9	1,3	0,0	100,0	5,9	38,9	33,9	10,2	4,2	5,4	1,4	100,0	165
Quintiles de bien-être économique																
Le plus bas	37,6	40,7	16,6	3,1	1,8	0,3	100,0	3,7	42,6	29,9	10,5	5,0	8,3	0,0	100,0	235
Second	40,4	38,8	18,2	1,1	1,4	0,0	100,0	4,3	39,2	30,0	9,2	5,1	11,4	0,9	100,0	255
Moyen	43,5	40,2	14,1	1,3	0,5	0,4	100,0	2,6	47,3	34,2	6,3	1,7	7,6	0,4	100,0	198
Quatrième	45,9	35,6	13,3	1,1	0,3	3,9	100,0	9,8	29,0	41,3	9,9	2,6	3,8	3,5	100,0	173
Le plus élevé	39,6	32,6	19,0	5,9	0,5	2,3	100,0	2,9	41,8	46,8	5,3	0,2	3,0	0,0	100,0	138
Total	41,2	38,1	16,3	2,3	1,0	1,1	100,0	4,6	40,2	35,1	8,5	3,3	7,4	0,9	100,0	998

Note : Il est recommandé, pendant les épisodes diarrhéiques, de donner davantage de liquides à l'enfant et de ne pas réduire les rations alimentaires.

Tableau 10.10. Thérapie de Réhydratation par voie orale, supplémentation en zinc et administration d'autres traitements contre la diarrhée

Parmi les enfants de moins de cinq ans ayant eu la diarrhée au cours des deux semaines ayant précédé l'interview, pourcentage à qui on a donné une solution d'un sachet SRO ou des liquides SRO préconditionnés, une solution maison (SMR), soit une SRO ou une SMR, du zinc, une SRO ou l'augmentation des quantités de liquides, une thérapie de réhydratation par voie orale (TRO), la poursuite de l'alimentation et une TRO, et d'autres traitements et pourcentage à qui on n'a donné aucun traitement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'enfants ayant eu la diarrhée à qui on a donné :														
	Une solution d'un sachet SRO ou des liquides SRO préconditionnés	Solution Maison Recommandée (SMR)	Soit SRO ou SMR	Zinc	SRO et zinc	SRO ou augmentation des liquides	TRO (SRO, SMR, ou augmentation des liquides)	Poursuite de l'alimentation et TRO ¹	Antibiotiques	Médicaments antimotilité	Solution intraveineuse	Remède maison/autre	Manquant	Pourcentage à qui on n'a donné aucun traitement	Effectif d'enfants avec la diarrhée
Âge en mois															
<6	10,0	3,4	10,0	17,9	6,1	29,5	29,5	16,3	9,8	0,0	0,0	3,7	0,6	56,6	64
6-11	29,5	2,9	30,0	30,5	21,1	52,6	53,0	37,5	15,8	0,0	0,0	5,5	1,9	32,0	180
12-23	33,7	7,3	35,9	35,9	23,5	61,1	63,3	47,1	23,3	0,0	0,2	5,4	2,1	22,4	320
24-35	32,8	6,5	34,3	20,0	15,3	67,4	68,7	56,7	16,5	1,6	0,0	1,3	2,1	21,3	201
36-47	31,7	5,2	34,0	24,9	18,1	51,8	52,7	43,8	14,5	0,0	0,0	7,8	2,1	28,6	135
48-59	26,5	10,2	30,2	29,2	20,7	55,9	57,2	50,5	13,2	1,2	0,0	1,6	3,8	30,5	98
Sexe															
Masculin	32,0	5,3	33,5	27,5	19,1	58,7	59,7	43,8	17,5	0,0	0,1	2,6	1,6	27,6	523
Féminin	28,3	7,0	30,5	29,4	19,5	55,3	56,8	46,7	17,6	0,9	0,0	6,5	2,7	27,8	475
Résidence															
Urbain	30,2	5,8	32,2	28,5	18,1	57,4	58,1	48,3	22,1	1,1	0,2	7,2	0,3	28,6	363
Rural	30,3	6,3	32,0	28,4	19,9	56,9	58,4	43,4	15,0	0,1	0,0	2,8	3,2	27,2	635
Région															
Nord	24,8	3,3	27,6	23,7	18,9	37,7	40,6	32,7	18,3	0,9	0,0	1,3	5,1	40,1	123
Ouest	32,1	1,6	33,6	27,1	17,1	60,0	60,0	48,1	22,9	1,2	0,0	10,5	0,0	26,2	270
Centre	25,8	4,8	28,1	28,7	17,0	51,3	53,4	40,3	14,8	0,0	0,0	2,9	2,5	29,7	390
Sud	39,3	15,8	39,7	32,4	26,3	75,0	75,4	57,7	15,3	0,0	0,3	1,4	2,6	18,9	214
Niveau d'instruction de la mère															
Pas d'instruction	27,7	6,4	29,9	27,7	18,1	53,2	54,6	43,0	15,9	0,7	0,0	3,4	2,5	30,8	601
Primaire	35,6	5,7	37,3	30,5	23,1	63,4	65,1	47,6	22,0	0,0	0,0	5,9	1,0	22,5	232
Moyen/Secondaire ou plus	32,4	5,6	32,4	28,1	18,3	62,3	62,4	49,8	17,2	0,0	0,4	6,1	2,4	23,6	165
Quintiles de bien-être économique															
Le plus bas	27,8	9,9	29,1	24,4	16,1	54,7	55,9	40,7	14,1	0,0	0,0	1,8	2,5	31,4	235
Second	27,0	3,6	27,9	28,2	19,8	54,8	55,4	38,8	16,3	0,0	0,0	6,3	3,6	28,8	255
Moyen	34,1	9,6	38,3	29,5	20,7	62,6	65,6	53,7	15,1	0,2	0,0	2,5	2,3	22,8	198
Quatrième	30,4	3,2	31,5	34,2	21,4	60,1	60,1	47,4	18,6	0,4	0,4	8,0	1,0	23,9	173
Le plus élevé	34,7	2,8	36,4	26,9	19,0	53,7	55,3	49,6	28,0	2,3	0,0	3,8	0,0	31,2	138
Ensemble	30,3	6,1	32,0	28,4	19,3	57,1	58,3	45,2	17,6	0,4	0,1	4,4	2,1	27,7	998

SRO = Sels de réhydratation par voie orale

¹ Par poursuite de l'alimentation, on entend ici les enfants à qui on a donné davantage de nourriture que d'habitude, la même quantité ou un peu moins que d'habitude pendant les épisodes diarrhéiques.

Tableau 10.11 Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant eu la diarrhée

Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans ayant eu la diarrhée au cours des deux semaines ayant précédé l'interview pour lesquels des conseils ont un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques ; parmi les enfants ayant eu la diarrhée au cours des deux semaines ayant précédé l'interview pour lesquels des conseils ont un traitement ont été recherchés, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques et parmi les enfants ayant eu la diarrhée qui ont reçu des SRO, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques, Sénégal 2018

Source	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été demandés auprès de chaque source :		
	Parmi les enfants ayant eu la diarrhée	Parmi les enfants ayant eu la diarrhée pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement	Parmi les enfants ayant eu la diarrhée qui ont reçu SRO ¹
Secteur public	35,9	76,4	75,7
Hôpital du gouvernement	2,4	5,1	4,3
Centre de santé du gouvernement	4,6	9,8	6,9
Poste de santé du gouvernement	28,6	61,0	63,4
Agent de santé/agent communautaire	0,5	1,0	1,6
Autre secteur public	0,0	0,1	0,1
Secteur privé	6,3	13,3	9,5
Hôpital/clinique privé	1,0	2,1	2,8
Pharmacie	4,8	10,3	5,2
Médecin privé	0,4	0,9	1,4
Agent de santé/agent communautaire	0,1	0,1	0,2
Autre secteur privé	2,1	4,6	0,0
Boutique	0,4	0,9	0,0
Praticien traditionnel	1,4	2,9	0,0
Marché	0,2	0,5	0,0
Agent communautaire	0,1	0,3	0,0
Autre	2,9	6,1	5,5
Effectif d'enfants	998	469	302

ASC = Agent de santé communautaire

SRO = Sels de réhydratation par voie orale

¹ Liquides de sachets SRO ou de sachets SRO préconditionnés

Tableau 10.12 Connaissance des sachets SRO ou des liquides SRO préconditionnés

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 5 années ayant précédé l'enquête qui connaissent les sachets de SRO ou les liquides SRO préconditionnés pour le traitement de la diarrhée, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes qui connaissent les sachets de SRO préconditionnés	Effectif de femmes
Groupe d'âges		
15-19	52,8	229
20-24	69,8	744
25-34	80,1	2 070
35-49	81,8	1 309
Résidence		
Urbain	76,1	1 763
Rural	78,2	2 589
Région		
Nord	79,2	720
Ouest	75,2	1 457
Centre	78,0	1 486
Sud	78,9	689
Niveau d'instruction		
Pas d'instruction	77,1	2 563
Primaire	80,6	958
Moyen/Secondaire ou plus	74,7	832
Quintiles de bien-être économique		
Le plus bas	73,6	915
Second	75,6	921
Moyen	79,1	874
Quatrième	81,9	825
Le plus élevé	77,3	817
Ensemble	77,4	4 353

SRO = Sels de réhydratation par voie orale.

Tableau 10.13 Évaluation des selles des enfants

Répartition (en %) des enfants les plus jeunes de moins de deux ans vivant avec la mère par moyen d'évacuation des dernières matières fécales de l'enfant et pourcentage d'enfants dont les matières fécales ont été évacuées de façon hygiénique, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Moyen d'évacuation des matières fécales										Effectif d'enfants	
	L'enfant a utilisé les toilettes ou latrines	Jetées/rincées dans toilettes ou latrines	Enterrées	Jetées/rincées dans égouts ou caniveaux	Jetées aux ordures	Laissées à l'air libre	Autre	Total	Pourcentage d'enfants dont on s'est débarrassé des selles de manière hygiénique ¹			
Âge de l'enfant en mois												
0-1	0,3	37,1	1,5	0,6	55,1	0,5	4,9	100,0	38,9	195		
2-3	0,7	48,6	1,5	0,5	43,5	2,6	2,7	100,0	50,7	170		
4-5	0,0	51,8	1,7	0,9	43,3	0,5	1,8	100,0	53,5	168		
6-8	0,2	61,3	1,1	0,5	36,1	0,4	0,3	100,0	62,7	306		
9-11	0,7	64,1	1,0	1,5	30,6	0,2	1,9	100,0	65,8	346		
12-17	0,4	63,2	1,7	1,8	31,6	1,2	0,0	100,0	65,4	581		
18-23	0,0	70,7	1,3	3,3	23,0	1,5	0,2	100,0	72,0	586		
6-23	0,3	65,5	1,3	2,0	29,4	1,0	0,5	100,0	67,1	1 819		
Type de toilettes/latrines³												
Toilettes améliorées	0,2	64,9	0,6	1,5	31,4	0,2	1,2	100,0	65,7	1 425		
Toilettes non améliorée	0,4	54,9	2,7	2,0	36,8	2,3	1,0	100,0	58,0	928		
Toilettes partagées ⁴	0,1	66,6	0,2	1,3	30,7	0,4	0,7	100,0	67,0	336		
Toilettes non améliorée	0,4	69,6	1,9	3,5	22,6	1,0	1,0	100,0	71,9	323		
Défecation en plein air	0,7	22,7	6,6	0,9	61,4	6,2	1,5	100,0	30,0	269		
Résidence												
Urbain	0,2	58,1	0,2	1,5	38,8	0,0	1,2	100,0	58,6	880		
Rural	0,4	62,6	2,1	1,8	30,4	1,7	1,1	100,0	65,0	1 473		
Région												
Nord	0,0	55,2	0,8	1,2	38,8	1,5	2,4	100,0	56,1	393		
Ouest	0,0	53,9	1,1	1,0	42,9	0,2	1,0	100,0	54,9	724		
Centre	0,5	61,9	2,5	0,7	32,1	1,7	0,6	100,0	64,9	862		
Sud	0,7	78,2	0,2	5,9	13,1	0,7	1,1	100,0	79,1	374		
Niveau d'instruction de la mère												
Pas d'instruction	0,3	63,4	2,0	1,4	30,4	1,6	1,0	100,0	65,7	1 414		
Primaire	0,4	63,8	0,4	1,4	32,9	0,5	0,7	100,0	64,6	460		
Moyen/Secondaire ou plus	0,3	50,9	0,6	2,9	43,4	0,0	1,9	100,0	51,8	479		
Quintiles de bien-être économique												
Le plus bas	0,6	50,1	4,0	2,6	38,0	3,4	1,2	100,0	54,8	531		
Second	0,4	71,1	2,1	1,9	22,1	1,1	1,3	100,0	73,5	547		
Moyen	0,3	74,1	0,0	1,1	23,9	0,0	0,6	100,0	74,4	476		
Quatrième	0,0	65,9	0,0	0,9	32,6	0,0	0,7	100,0	65,9	390		
Le plus élevé	0,0	41,4	0,0	1,7	55,1	0,0	1,8	100,0	41,4	408		
Ensemble	0,3	60,9	1,4	1,7	33,5	1,0	1,1	100,0	62,6	2 353		

¹ On considère que les matières fécales des enfants sont évacuées de manière hygiénique si l'enfant utilise les toilettes ou les latrines, si les matières fécales sont jetées ou rincées dans des toilettes ou des latrines ou si elles sont enterrées.

² Se référer au tableau 23 pour la définition des catégories.

³ Toilettes qui seraient considérées comme améliorées si elles n'étaient pas partagées par deux ménages ou plus.

Résultats clés

- **Etat nutritionnel des enfants :** Parmi les enfants de moins de cinq ans, 19 % souffrent d'un retard de croissance, 8 % sont émaciés et 15 % présentent une insuffisance pondérale.
- **Allaitement maternel :** La quasi-totalité des enfants (98 %) sont allaités. Cependant, seulement 46 % des nourrissons de moins de six mois sont exclusivement allaités au sein. Seuls 30 % des nouveau-nés sont mis au sein dans l'heure qui suit la naissance.
- **Apport alimentaire minimum acceptable :** Parmi tous les enfants de 6-23 mois, seulement 11 % sont nourris conformément aux trois pratiques optimales de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant.
- **Disponibilité de sel iodé dans les ménages :** Parmi les ménages dans lesquels le sel a été testé, seulement 71 % disposaient de sel iodé.

Ce chapitre porte sur l'état nutritionnel des enfants et des adultes. Il présente l'état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans et les pratiques alimentaires du nourrisson et du jeune enfant, y compris l'allaitement et l'alimentation avec de la nourriture solide/semi solide. Ce chapitre porte aussi sur la diversité alimentaire et sur la fréquence des repas. En outre, les résultats sur les micronutriments, en particulier la supplémentation et l'enrichissement des aliments en certains micronutriments y sont également présentés. Enfin, ce chapitre aborde certains aspects pertinents de l'état nutritionnel des femmes de 15-49 ans.

11.1 ÉTAT NUTRITIONNEL DES ENFANTS

Au Sénégal, la Cellule de Lutte contre la Malnutrition (CLM) est chargée d'assister le gouvernement dans la définition et le suivi de la politique de nutrition et de promouvoir l'approche multisectorielle pour une amélioration du statut nutritionnel des populations. Elle assure aussi la coordination de la mise en œuvre de projets et programmes dont le Programme de Renforcement de la Nutrition (PRN). Le PRN est un programme national de nutrition à assise communautaire. L'objectif du PRN est d'améliorer la croissance des enfants de 0 à 5 ans, vivant dans les zones urbaines ou rurales pauvres du Sénégal. Les cibles du programme sont les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent et la communauté. Les interventions du PRN sont menées à travers un paquet de services qui comprend : le Suivi Promotion de la Croissance des enfants de 0 à 23 mois, le suivi d'entretien avec la mère ou gardienne, le dépistage actif de la Malnutrition Aiguë, la fortification à domicile des aliments destinés aux enfants de moins de deux ans, le développement d'activités d'éveil et de stimulation du jeune enfant, la prise en charge des enfants atteints de malnutrition aiguë modérée au niveau communautaire et la référence des cas sévères au niveau des structures sanitaires, la communication pour l'adoption de comportements favorables à une bonne nutrition et à des pratiques familiales essentielles.

Les données anthropométriques collectées au cours de l'EDS continue 2018 permettent de mesurer et d'évaluer l'état nutritionnel des nourrissons et des jeunes enfants en utilisant les indices anthropométriques.

Cette évaluation permet d'identifier les sous-groupes de la population infantile qui présentent un retard de croissance avec comme conséquence une perturbation du développement mental, une malnutrition aiguë avec un risque de décès important et une insuffisance pondérale qui est due à une malnutrition aiguë et un retard de croissance.

11.1.1 Mesure de l'état nutritionnel des jeunes enfants

L'EDS Continue 2018, a collecté les données concernant l'état nutritionnel en demandant des informations sur l'âge des enfants et ensuite en mesurant le poids et la taille des enfants de moins de cinq ans dans tous les ménages de l'échantillon. Le poids a été mesuré avec une balance électronique à double pesée (type SECA). La taille a été mesurée avec une toise. Les enfants de moins de deux ans ont été mesurés en position couchée sur la toise, tandis que ceux âgés de plus de deux ans ont été mesurés debout. L'âge des enfants a été recueilli à partir d'un document administratif ou calculé sur la base du calendrier des événements spéciaux.

Les données sur la taille/longueur des enfants, le poids et l'âge ont été utilisées pour calculer trois indices : la taille-pour-âge, le poids-pour-taille et le poids-pour-âge. Chacun de ces indices fournit des informations différentes sur la croissance et la composition corporelle et permettent d'évaluer l'état nutritionnel. Comme indiqué dans l'encadré ci-dessous, le retard de croissance ou une taille trop petite par rapport à l'âge est un signe de sous-nutrition chronique, conséquence d'une alimentation inadéquate pendant une longue période. Le retard de croissance peut aussi être influencé par des maladies récurrentes et chroniques. L'émaciation ou un faible poids-pour-taille indique une sous-nutrition aiguë et est la conséquence d'une alimentation inadéquate pendant une période récente (par exemple juste avant l'enquête). L'émaciation peut résulter d'une alimentation inadéquate ou d'un épisode récent de maladie qui a eu pour conséquence une perte de poids. Le surpoids (un poids trop important par rapport à la taille), indique une surnutrition. Le poids-pour-âge est un indice combiné du poids-pour-taille et de la taille-pour-âge. Par conséquent, il englobe la sous-nutrition aiguë (émaciation) et la sous nutrition chronique (retard de croissance) et constitue un indice de la sous-nutrition globale.

Retard de croissance (évalué au moyen de la taille-pour-âge)

La taille-pour-âge est une mesure du retard de croissance linéaire et des effets cumulés de déficit de la croissance. Les enfants dont le Z-score pour la taille pour-âge se situe en dessous de moins deux écarts type (-2ET) de la médiane de la population de référence sont considérés comme trop petits par rapport à leur âge (retard de croissance) ou atteints de sous-nutrition chronique. Les enfants en dessous de moins trois écart type (-3ET) sont considérés comme atteints de retard de croissance sévère.

Échantillon : Enfants de moins de cinq ans

Émaciation (évaluée au moyen du poids-pour-taille)

L'indice poids-pour-taille mesure la masse corporelle en relation avec la taille ou longueur et décrit l'état nutritionnel actuel. Les enfants dont le Z-score pour le poids-pour-taille se situe en dessous de moins deux écarts-type (-2ET) de la médiane de la population de référence sont considérés comme maigres (émaciés) ou atteints de sous-nutrition aiguë. Les enfants dont le Z score pour le poids-pour-taille se situe en dessous de moins trois écarts type (-3ET) de la médiane de la population de référence sont considérés comme sévèrement émaciés.

Échantillon : Enfants de moins de cinq ans

Insuffisance pondérale (évaluée au moyen du poids-pour-âge)

Le poids-pour-âge est un indice combiné de la taille-pour-âge et du poids-pour-taille. Il prend en compte, à la fois, la sous-nutrition aiguë et chronique. Les enfants dont le Z score pour le poids-pour-âge se situe en dessous de moins deux écarts type (-2 ET) de la médiane de la population de référence sont considérés comme présentant une insuffisance pondérale. Les enfants dont le Z score pour le poids-pour-âge se situe en dessous de moins trois écarts type (-3ET) de la médiane sont considérés comme présentant une insuffisance pondérale sévère.

Échantillon : Enfants de moins de cinq ans

Enfants présentant un surpoids

Les enfants dont le Z score pour le poids-pour-taille est supérieur à deux écarts type (+2ET) au-dessus de la médiane de la population de référence sont considérés en surpoids.

Échantillon : Enfants de moins de cinq ans

Les moyennes des z-scores pour la taille-pour-âge, le poids-pour taille et le poids-pour-âge sont aussi calculées comme une statistique résumée représentant l'état nutritionnel des enfants dans une population. Ces scores moyens décrivent l'état nutritionnel de toute la population des enfants sans l'utilisation d'un seuil. Un Z-score moyen de moins de 0 (c'est-à-dire, une valeur moyenne négative pour le retard de croissance, l'émaciation ou l'insuffisance pondérale) suggère un décalage vers le bas de l'état nutritionnel de toute la population de l'échantillon par rapport à la population de référence. Plus les scores moyens sont éloignés de 0, plus la prévalence de la sous-nutrition est élevée.

11.1.2 Collecte des données

Au total, 6097 enfants de moins de cinq ans étaient éligibles pour la prise des mesures anthropométriques (taille et poids).

11.1.3 Niveaux de sous-nutrition des enfants


Au Sénégal, les résultats de l'EDS Continue 2018 montrent que 19 % des enfants de moins de cinq ans ont un retard de croissance ou sont atteints de malnutrition chronique (ils sont trop petits pour leur âge) et 5 % ont un retard de croissance sévère. Huit pour cent sont émaciés ou souffrent de malnutrition aiguë (ils sont trop maigres par rapport à leur taille) et 1 % sont sévèrement émaciés (**Tableau 11.1**).

Quinze pour cent des enfants de moins de cinq ans présentent une insuffisance pondérale (ils sont trop maigres par rapport à leur âge) et 3 % présentent une insuffisance pondérale sévère. Le pourcentage d'enfants présentant un excès pondéral est très faible (1 %).

Tendances : Entre 2012 et 2018, on ne note pas de variations importantes des niveaux des indicateurs de l'état nutritionnel des enfants (**Graphique 11.1**).

Graphique 11.1 Tendances de l'état nutritionnel des enfants

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans atteints de malnutrition




Variations par caractéristique

- La prévalence du retard de croissance augmente avec l'âge, de 12 % pour les moins de 6 mois à 27 % pour les enfants de 24-35 mois puis elle diminue ensuite pour se situer à 20 % parmi les enfants de 36-47 mois et à 17 % à 48-49 mois.
- L'intervalle intergénérisique influence de manière importante l'état nutritionnel des enfants. Quand l'intervalle est inférieur à 24 mois, 27 % des enfants sont atteints d'un retard de croissance contre 14 % quand cet intervalle est de 48 mois ou plus.
- La prévalence du retard de croissance est nettement plus importante en milieu rural (23 %) qu'en milieu urbain (13 %).
- La prévalence du retard de croissance diminue avec le niveau d'instruction de la mère: plus il est élevé, plus la prévalence du retard de croissance est faible.
- Le retard de croissance diminue avec le quintile de bien-être économique du ménage. Il varie de 29 % parmi les enfants des ménages classés dans le quintile le plus bas à 9 % parmi ceux dont le ménage est classé dans le quintile le plus élevé (**Graphique 11.2**).
- La prévalence du retard de croissance est plus importante dans les régions Sud (24 %) et Centre (23 %) que dans les régions de la zone Ouest (13 %).

Graphique 11.2 Retard de croissance chez les enfants par niveau de bien-être économique du ménage

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui présentent un retard de croissance



11.2 ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT

Les pratiques alimentaires appropriées du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) comprennent l'allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois, l'allaitement prolongé jusqu'à l'âge de deux ans, l'introduction d'aliments solides et semi-solides à l'âge de six mois et l'augmentation graduelle des quantités de nourriture et de la fréquence des repas au fur et à mesure que l'enfant grandit. Il est aussi important que

l'enfant reçoive une alimentation variée, c'est-à-dire qu'il mange des aliments de différents groupes alimentaires pour satisfaire ses besoins croissants en macronutriments et micronutriments (OMS 2008).

11.2.1 Allaitement

Initiation de l'allaitement

L'initiation précoce de l'allaitement est important pour la mère et pour l'enfant. Le premier lait contient le colostrum, qui est très riche d'un point de vue nutritionnel et qui contient les anticorps qui protègent le nouveau-né des maladies. L'initiation précoce de l'allaitement encourage aussi le lien affectif entre la mère et son nouveau-né, ce qui facilite la production de lait régulière. Il est donc recommandé que l'enfant soit immédiatement mis au sein dès qu'il naît ou dans l'heure qui suit la naissance ; par contre, la pratique consistant à donner à l'enfant des aliments avant d'être allaité (c'est-à-dire donner au nouveau-né autre chose que le lait maternel avant qu'il ne soit régulièrement allaité) doit être découragé.

Allaitement précoce

Initiation de l'allaitement dans l'heure qui suit la naissance

Échantillon : Enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu deux ans avant l'enquête.

Au Sénégal, 98 % des enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des deux années ayant précédé l'enquête ont été allaités, 30 % ont été allaités dans l'heure qui a suivi la naissance et 88 % ont commencé à être allaités le jour qui a suivi la naissance. Plus de la moitié des enfants ayant été allaités (58 %) ont reçu des aliments avant d'être allaités (**Tableau 11.2**).

Tendances : Entre 2012-2013 et 2018, le pourcentage d'enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des deux années ayant précédé l'enquête qui ont été allaités dans l'heure qui a suivi la naissance a peu varié, oscillant autour de 30 % (**Graphique 11.3**).

Graphique 11.3 Tendances de l'allaitement initial

Pourcentage d'enfants derniers nés dont la naissance a eu lieu au cours des deux années ayant précédé l'enquête, ayant commencé l'allaitement dans l'heure ayant suivi la naissance



Variations par caractéristique


- Le pourcentage d'enfants allaités dans l'heure qui a suivi la naissance varie en fonction de la catégorie de prestataire qui a assisté l'accouchement, il passe de 31 % quand le prestataire est classé dans le personnel de santé à 13 % quand il s'agit d'une accoucheuse traditionnelle.
- Le pourcentage d'enfants allaités dans l'heure qui a suivi la naissance varie en fonction du lieu de l'accouchement, il passe de 32 % quand la naissance a eu lieu dans un établissement de santé à 16 % quand l'accouchement a eu lieu à la maison.

11.2.2 Allaitement exclusif

Le lait maternel contient tous les nutriments nécessaires à l'enfant pendant les six premiers mois et il constitue une source de nutrition non contaminée. Il est recommandé que les enfants soient exclusivement allaités pendant les six premiers mois, c'est-à-dire qu'ils ne doivent recevoir rien d'autre que le lait maternel. Donner des aliments de complément avant l'âge de six mois n'est pas nécessaire et cette pratique ne doit pas être encouragée parce que les risques de contamination et de maladies diarrhéiques qui peuvent en résulter sont élevés. En outre, l'introduction précoce d'aliments de complément réduit aussi la production de lait, celle-ci étant stimulée par la fréquence et l'intensité de la succion.


Les résultats concernant les pratiques d'allaitement des enfants selon l'âge sont présentés au **Tableau 11.3** et au **Graphique 11.4**. Dans l'ensemble, 46 % des enfants de moins six mois sont exclusivement allaités au sein. Cependant, contrairement aux recommandations en la matière, on constate que 35 % des enfants de moins de six mois reçoivent, en plus du lait maternel, de l'eau seulement et 10 % des aliments de complément. En outre, 6 % des enfants de 0-23 mois sont nourris au biberon (**Tableau 11.4**).

Graphique 11.4 Pratiques d'allaitement par âge



Tendance : Entre 2010-2011 et 2018, le pourcentage d'enfants exclusivement allaités a globalement augmenté, en particulier à partir de 2014, passant de 32 % en 2014 à 46 % en 2018 (**Graphique 11.5**).

Graphique 11.5 Tendances de l'allaitement exclusif




11.2.3 Durée médiane de l'allaitement

Au Sénégal, la durée médiane de l'allaitement maternel est de 20,7 mois pour les enfants de moins de 36 mois. La durée médiane de l'allaitement maternel exclusif, c'est-à-dire le moment auquel la moitié des enfants ont arrêté d'être allaités exclusivement est estimé à 2,6 mois et celle de l'allaitement prédominant à 5,5 mois (**Tableau 11.5**).

Tendances : Entre 2012-2013 et 2018, on ne constate pas de changement important, que ce soit de la durée médiane de l'allaitement exclusif ou de celle de l'allaitement prédominant ; en effet, concernant l'allaitement exclusif, la durée médiane est passée de 1,3 mois à 2,6 mois et celle de l'allaitement prédominant de 5,7 mois à 5,5 mois (**Graphique 11.6**).

Graphique 11.6 Tendances de la durée médiane d'allaitement



Variations selon certaines caractéristiques

- La durée médiane de l'allaitement maternel diminue avec le niveau d'instruction de la mère, passant de 20,6 mois quand la mère n'a aucun niveau d'instruction à 19,6 mois quand elle a le niveau moyen/secondaire ou plus.

- La durée médiane de l'allaitement exclusif est plus longue en milieu urbain qu'en milieu rural (3,1 mois contre 2,3 mois). Par contre, la durée médiane de l'allaitement prédominant est plus longue en milieu rural qu'en milieu urbain (6,0 mois contre 4,6 mois).

11.2.4 Aliments de complément

Après l'âge de six mois, le lait maternel n'est plus suffisant pour couvrir les besoins nutritionnels des enfants. Des aliments de complément doivent donc être ajoutés dans l'alimentation de l'enfant. L'alimentation de complément fait référence à la période de transition de l'allaitement exclusif à une alimentation diversifiée familiale. C'est la période la plus critique pour les enfants car, durant cette transition, les enfants sont très exposés à la sous-alimentation. Les aliments de complément doivent être introduits en temps opportun, c'est-à-dire que les enfants doivent commencer à recevoir des aliments en plus du lait maternel dès l'âge de six mois.

Une alimentation de complément appropriée doit être variée pour satisfaire tous les besoins en nutriments de l'enfant. Les fruits et les légumes riches en vitamine A doivent être consommés quotidiennement. Manger des fruits et des légumes, en plus de ceux qui sont riches en vitamine A, est tout aussi important. Des études ont montré qu'une alimentation de complément qui ne comprendrait que des plantes est insuffisante pour couvrir les besoins en certains micronutriments. Par conséquent, il est recommandé que la viande, les volailles, le poisson ou les œufs fassent partie de l'alimentation quotidienne, aussi souvent que possible (OMS 1998).

Le **Tableau 11.6** présente les résultats concernant les divers types d'aliments et de liquides reçus par les enfants le jour ou la nuit ayant précédé l'interview. Précisons que le tableau porte sur les enfants de moins de deux ans vivant avec leur mère. En outre, ces résultats sont présentés selon l'âge pour les enfants allaités et ceux qui ne le sont pas. Globalement, les aliments les plus fréquemment donnés aux enfants de 6-23 mois sont les aliments à base de céréales (78 % chez les enfants allaités et 96 % chez ceux non allaités), et les aliments riches en vitamine A (43 % chez les enfants allaités et 63 % chez ceux non allaités).

Variations selon certaines caractéristiques

- La consommation des différents types d'aliments est plus élevée chez les enfants de 6-23 mois non allaités que chez les enfants allaités du même groupe d'âge.
- Plus d'un tiers des enfants de 6 à 23 mois allaités (39 %) ont consommé une préparation à base de viande, poisson et volaille le jour ou la nuit avant l'interview contre près de deux tiers (65 %) chez ceux non allaités.
- Près de neuf enfants de 6-23 mois allaités (89 %) sur dix contre la quasi-totalité de ceux qui ne sont pas allaités (99 %) avaient reçu, le jour ou la nuit avant l'interview, une préparation solide ou semi solide, y compris des collations sucrées ou des collations salées.

11.2.5 Apport alimentaire minimum acceptable

Les nouveau-nés et les jeunes enfants doivent recevoir un apport alimentaire minimum acceptable pour leur garantir une croissance et un développement optimal. Si l'alimentation des enfants n'est pas diversifiée et s'ils ne sont pas nourris à une certaine fréquence, ils sont vulnérables à la sous-nutrition, en particulier au retard de croissance et aux carences en micronutriments et ils sont exposés à des risques de morbidité et de mortalité plus élevés. La recommandation de l'OMS concernant le minimum alimentaire acceptable, qui est une combinaison de diversité alimentaire minimum et de fréquence minimum des repas, est différente selon que l'enfant est allaité ou non. La définition de cet indicateur combiné du minimum alimentaire acceptable pour les enfants de 6-23 mois figure dans l'encadré ci-dessous.

La diversité alimentaire est un indicateur indirect de la densité adéquate en micronutriments des aliments. La diversité alimentaire minimum signifie que l'enfant est nourri avec des aliments appartenant à, au moins, quatre groupes alimentaires distincts. Le seuil de quatre groupes est associé à un meilleur régime alimentaire, que ce soit pour les enfants allaités ou pour ceux qui ne le sont pas. La consommation d'aliments appartenant à, au moins, quatre groupes signifie que l'enfant a une plus grande probabilité de manger au moins un aliment d'origine animale et au moins un fruit ou légume, en plus d'un aliment de base (céréales, racines ou tubercules (OMS 2008). Les quatre groupes d'aliments doivent provenir d'une liste de sept groupes d'aliments : céréales, racines et tubercules ; légumineuses et noix ; produits laitiers (lait, yaourt, fromage) ; produits carnés (viande, volaille, abats et poisson) ; œufs ; fruits et légumes riches en vitamine A ; autres fruits et légumes.

La fréquence minimum des repas est un indicateur indirect de la consommation énergétique de l'enfant. Pour les nourrissons et les jeunes enfants, l'indicateur est basé sur la quantité d'énergie dont l'enfant a besoin et, si l'enfant est allaité, la quantité d'énergie nécessaire qui n'est pas satisfaite par le lait maternel. On considère que les enfants allaités reçoivent un nombre minimum de repas s'ils reçoivent des aliments solides, semi-solides, ou mous au moins deux fois par jour pour les enfants de 6-8 mois et, au moins, trois fois par jour pour les enfants de 9-23 mois. On considère que les enfants non allaités de 6-23 mois reçoivent un nombre minimum de repas s'ils reçoivent des aliments solides, semi-solides, ou mous, au moins, quatre fois par jour.

Minimum alimentaire acceptable

Proportion d'enfants de 6–23 mois qui ont reçu l'apport alimentaire minimum acceptable. Cet indicateur est un indicateur combiné, calculé à partir des groupes suivants :

Enfants allaités de 6–23 mois qui ont reçu, au moins, la diversification alimentaire minimum, le nombre minimum de fois le jour précédent

Enfants allaités de 6–23 mois

et

Enfants non allaités de 6–23 mois ayant reçu, au moins, deux fois du lait et, au moins, la diversité alimentaire minimum (en dehors des aliments lactés) et le nombre minimum de repas le jour précédent


Enfants non allaités de 6–23 mois

Échantillon : Enfants derniers-nés de 6-23 mois vivant avec leur mère

Au Sénégal, 11 % des enfants de 6-23 mois sont nourris conformément aux trois pratiques optimales de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant qui incluent l'allaitement, le nombre de groupes d'aliments et la fréquence des repas (**Tableau 11.8** et **Graphique 11.7**).

Parmi les enfants de 6-23 mois allaités, moins d'un quart reçoivent une alimentation variée (22 %), et un plus d'un tiers (35 %) ont été nourris un nombre minimum de fois de manière appropriée pour leur âge.

Graphique 11.7 Indicateurs ANJE sur l'apport alimentaire minimum acceptable



Tendance : Le pourcentage d'enfants âgés de 6 à 23 mois allaités ayant reçu un apport alimentaire minimum acceptable est de 12 % et de 10 % chez les enfants non allaités. Pour l'ensemble des enfants de ce groupe d'âges, il est de 11 % (**Graphique 11.7**).

Variations par caractéristique

- Le pourcentage d'enfants ayant reçu un apport alimentaire minimum acceptable varie selon l'âge, en passant de 7 % parmi ceux de 6-8 mois à 14 % parmi ceux de 12-17 mois.
- Le pourcentage d'enfants de 6 à 23 mois nourris selon les recommandations ANJE est deux fois plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural (16 % contre 8 %).
- Les résultats selon les régions montrent que c'est dans celle du Sud que le pourcentage d'enfants de 6-23 mois nourris selon les trois pratiques ANJE est le plus faible (7 %). À l'opposé, celle de l'Ouest enregistre le pourcentage le plus élevé (17 %).
- Le pourcentage d'enfants ayant reçu un apport alimentaire minimum acceptable est plus élevé parmi ceux dont la mère a le niveau d'instruction moyen/secondaire ou plus que parmi ceux dont la mère n'a aucun niveau d'instruction (19 % contre 9 %).
- Le pourcentage d'enfants de 6-23 mois ayant reçu un apport alimentaire minimum acceptable augmente avec le quintile de bien-être économique, passant de 6 % parmi les enfants des ménages du quintile le plus bas à 21 % parmi ceux des ménages du quintile le plus élevé.

11.3 PRÉSENCE DE SEL IODÉ DANS LES MÉNAGES

L'iode est un micronutriment essentiel et la consommation de sel iodé prévient les Troubles Dus à la carence en Iode parmi les enfants et les adultes. Au Sénégal, l'iodation du sel est rendue obligatoire par le gouvernement et l'application de la réglementation en la matière est confiée au Ministère du Commerce. L'objectif du programme d'iodation du sel mis en place par le gouvernement est d'amener 90 % des ménages à consommer du sel iodé. En accord avec la réglementation, le sel consommé par les ménages doit être iodé à une teneur supérieure à 15 parties par million (ppm).

Au Sénégal, parmi les ménages dans lesquels le sel a été testé, 71 % disposaient de sel iodé (**Tableau 11.9**).

Variations par caractéristique

- La disponibilité de sel iodé est plus importante en milieu urbain qu'en milieu rural (84 % contre 60 %).
- C'est dans la région Ouest que la disponibilité de sel iodé parmi les ménages dont le sel a été testé est la plus importante : 84 % contre 55 % dans le Centre qui enregistre le pourcentage le plus faible.

Tendance : Entre 2010 et 2018, le pourcentage de ménages disposant de sel iodé a augmenté, passant de 47 % à 71 %.

11.4 CONSOMMATION DE MICRONUTRIMENTS ET SUPPLÉMENTATION PARMIS LES ENFANTS

La carence en micronutriments est un des facteurs de risques importants de la morbidité et de la mortalité infantile. Les micronutriments sont disponibles dans la nourriture et peuvent aussi être fournis directement par la supplémentation. Allaiter les enfants les fait bénéficier des suppléments donnés à la mère.

Les informations collectées sur la consommation d'aliments parmi les plus jeunes enfants de moins de deux ans sont utiles pour savoir dans quelle mesure les enfants consomment des aliments de groupes riches en deux micronutriments clés—vitamine A et fer—dans leur alimentation quotidienne. La carence en fer est l'une des causes principales de l'anémie qui a des conséquences graves, que ce soit sur l'état de santé des

femmes comme sur celle des enfants. La vitamine A est un micronutriment essentiel pour le système immunitaire et elle joue un rôle important sur le maintien du tissu épithélial. Une carence sévère en vitamine A peut causer des lésions oculaires et elle est l'une des causes les plus importantes de cécité pendant l'enfance. La carence en vitamine A a augmenté aussi la gravité des infections comme la rougeole et les maladies diarrhéiques et ralentit la guérison des maladies. La carence en vitamine A est plus répandue dans les environnements secs où les fruits et légumes ne sont pas facilement disponibles.

Parmi les enfants derniers-nés de 6-23 mois vivant avec leur mère, 58 % avaient consommé des aliments riches en vitamine A dans les dernières 24 heures, 46 % avaient consommé des aliments riches en fer. Parmi l'ensemble des enfants de 6-23 mois, seulement 2 % avaient reçu un mélange en poudre de micronutriments dans les sept derniers jours. Parmi tous les enfants de 6-59 mois, seulement 2 % avaient reçu des suppléments de fer au cours des sept derniers jours, par contre, près de six sur dix (57 %) avaient reçu des suppléments de vitamine A dans les 6 derniers mois et 43 % avaient été traités avec des vermifuges dans cette période. En outre, dans 66 % des cas, les enfants de 6-59 mois vivent dans un ménage disposant de sel iodé (**Tableau 11.10**).

Tendance : Dans l'ensemble, entre 2015 et 2018, on note une baisse des pourcentages d'enfants ayant reçu des micronutriments et des médicaments pour le déparasitage : le pourcentage d'enfants de 6-59 mois ayant reçu des suppléments de vitamine A au cours des six derniers mois est passé de 88 % à 57 %. Le pourcentage d'enfants de 6-59 mois ayant reçu des suppléments de fer dans les sept derniers jours a peu varié, puisqu'il est passé de 3 % en 2015 à 2 % en 2018. Quant au pourcentage d'enfants de 6-59 mois ayant été traités dans les six derniers mois avec des vermifuges, il a aussi diminué, passant de 74 % à 43 %.

Variations selon certaines caractéristiques

- Les pourcentages d'enfants de 6-23 mois ayant consommé des aliments riches en vitamine A augmentent avec l'âge, passant respectivement de 28 % à 6-8 mois à 75 % à 18-23 mois. Les pourcentages d'enfants de 6-23 mois ayant consommé des aliments riches en fer augmentent aussi avec l'âge, passant respectivement de 14 % à 6-8 mois à 63 % à 18-23 mois.
- Concernant le traitement avec des vermifuges chez les enfants de 6-59 mois, on constate également une tendance à la hausse en fonction de l'âge passant de 8 % à 6-8 mois à 53 % à 48-59 mois.
- La consommation d'aliments riches en Vitamine A est plus importante chez les enfants non allaités (80 %) que les enfants allaités (53 %). Il en est de même des aliments riches en fer (68 % contre 40 %).
- En milieu urbain, plus des deux tiers des enfants de 6-23 mois (68 %) avaient consommé au cours des dernières 24 heures des aliments riches en Vitamine A contre 52 % en milieu rural. De même, le pourcentage d'enfants de 6-59 mois qui ont consommé des aliments riches en fer est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural (61 % contre 37 %).
- Le pourcentage d'enfants de 6-59 mois ayant reçu des suppléments de vitamine A dans les six derniers mois est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural (63 % contre 54 %).

Aliments thérapeutiques et compléments alimentaires

Au cours de l'EDS Continue 2018, les enquêteurs ont demandé si les enfants avaient reçu, au cours des sept derniers jours, des compléments alimentaires comme Plumpy'Nut ou Plumpy'Doz

La consommation du Plumpy'Nut ou Plumpy'Doz chez les enfants de 6-35 mois dans les 7 jours ayant précédés l'enquête est très faible avec respectivement 1 % et 0,4 %. Parmi les enfants souffrant de malnutrition, qu'elle soit aiguë ou modérée, la consommation de ce type d'aliments est nettement plus élevée : 11 % pour le Plumpy'Nut et 1 % pour le Plumpy'Doz. Parmi ceux souffrant de malnutrition aiguë modérée les consommations sont respectivement de 4 % et de 2 % (**Tableau 11.11**)

11.5 CONSOMMATION DE MICRONUTRIMENTS PARMİ LES MÈRES

L'éducation nutritionnelle en vue de la diversification alimentaire est importante. Elle doit être intégrée dans les interventions sur la nutrition par le biais de la promotion de la consommation d'aliments riches en micronutriments.

Une alimentation équilibrée en micronutriments, en particulier, l'iode, le fer, la vitamine A est, non seulement, essentielle pour le développement de l'enfant mais aussi pour la santé des femmes. Au cours de l'EDS Continue 2018, des questions ont été posées aux femmes pour savoir si leur consommation de micronutriments était adéquate. Les résultats sont présentés dans le **Tableau 11.12**.

Précisons que les données portent sur les femmes de 15-49 ans qui ont eu un enfant au cours des cinq années ayant précédé l'enquête.

- Au Sénégal, plus de deux tiers des femmes de 15 à 49 ans (69 %) ont pris du fer sous forme de comprimés ou de sirop pendant au moins 90 jours au cours de la grossesse de leur dernière naissance.
- Seulement 4 % des femmes n'ont pas pris de fer.
- Deux femmes sur cinq (45 %) ont pris des vermifuges pendant la grossesse de leur dernière naissance.
- Environ sept femmes sur dix (68 %) vivent dans un ménage disposant de sel iodé.

Tendances : Entre 2015 et 2018, le pourcentage de femmes ayant pris du fer pendant au moins 90 jours au cours de leur dernière grossesse a augmenté passant de 47 % à 69 %. De même, dans la même période, le pourcentage de femmes traitées avec des vermifuges pendant la grossesse a augmenté, passant de 31 % à 45 %.

Variations selon certaines caractéristiques

- L'administration de fer pendant au moins 90 jours au cours de la grossesse est plus fréquente en milieu urbain qu'en milieu rural (75 % contre 65 %).
- L'administration de fer pendant au moins 90 jours au cours de la grossesse varie selon les régions. Elle est plus élevée dans l'Ouest et le Centre (respectivement 81 % et 73 %) que dans le Nord et le Sud (53 % dans les deux cas).
- Le pourcentage des femmes en cours de grossesse ayant pris du fer sous forme de sirop ou de comprimés pendant au moins 90 jours, augmente avec le niveau d'instruction, passant de 65 % parmi celles sans aucun niveau d'instruction à 72 % parmi celles ayant le niveau primaire et 79 % parmi celles ayant le niveau moyen/secondaire ou plus.
- Du quintile le plus bas au plus élevé, le pourcentage de femmes ayant pris du fer pendant la grossesse augmente, passant de 51 % à 79 %.

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'information sur l'état nutritionnel des enfants et des adultes, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 11.1** État nutritionnel des enfants
- **Tableau 11.2** Allaitement initial
- **Tableau 11.3** Type d'allaitement selon l'âge de l'enfant
- **Tableau 11.4** Indicateurs de l'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) concernant l'allaitement
- **Tableau 11.5** Durée médiane de l'allaitement
- **Tableau 11.6** Aliments et liquides reçus par les enfants le jour ou la nuit ayant précédé l'interview
- **Tableau 11.7** Consommation de collations sucrées, collations salées et boissons gazeuses par les enfants âgés de 6 à 23 mois le jour ou la nuit ayant précédé l'interview
- **Tableau 11.8** Apport alimentaire minimum acceptable
- **Tableau 11.9** Présence de sel iodé dans le ménage
- **Tableau 11.10** Consommation de micronutriments par les enfants
- **Tableau 11.11** Aliments thérapeutiques et compléments alimentaires
- **Tableau 11.12** Consommation de micronutriments par les mères

Tableau 11.1. État nutritionnel des enfants

Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans considérés comme atteints de malnutrition selon les trois indices anthropométriques de mesure de l'état nutritionnel : la taille-pour-âge, le poids-pour-taille et le poids-pour-âge, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Taille-pour-Âge ¹				Poids-pour-Faible				Poids-pour-Âge					
	Score centré réduit moyen (ET)	Pourcentage en dessous de -2 ET ²	Pourcentage en dessous de -1 ET	Effectif d'enfants	Score centré réduit moyen (ET)	Pourcentage en dessous de -2 ET ²	Pourcentage en dessous de -1 ET	Effectif d'enfants	Score centré réduit moyen (ET)	Pourcentage en dessous de -2 ET ²	Pourcentage en dessous de -1 ET	Effectif d'enfants		
Âge de l'enfant en mois														
<6		12,4	-0,6	549	1,0	7,3	7,1	0,0	538	3,4	10,6	2,2	-0,5	551
6-8	3,3	13,1	-0,6	316	1,0	8,2	3,3	-0,3	317	4,0	11,7	3,7	-0,6	320
9-11	5,3	11,9	-0,7	367	1,9	11,4	0,7	-0,6	368	4,8	14,1	0,7	-0,8	367
12-17	5,6	15,9	-0,9	606	2,4	11,7	1,4	-0,6	608	3,5	17,7	0,7	-0,8	610
18-23	5,1	22,3	-1,0	638	2,3	9,0	2,0	-0,6	646	4,4	15,6	3,3	-0,9	645
24-35	5,8	26,8	-1,2	1 154	0,7	5,3	0,5	-0,5	1 159	2,2	16,4	0,7	-1,0	1 159
36-47	4,5	19,6	-1,1	1 184	1,1	6,3	0,6	-0,6	1 197	2,3	16,3	0,0	-1,1	1 185
48-59	3,3	16,7	-0,9	1 258	0,7	8,1	0,4	-0,8	1 275	1,9	14,6	0,4	-1,0	1 259
Sexe														
Masculin	5,6	21,7	-1,0	3 071	1,4	8,1	1,6	-0,6	3 076	2,9	16,8	0,9	-1,0	3 075
Féminin	3,7	15,9	-0,9	3 003	1,0	7,5	1,3	-0,5	3 031	2,8	13,4	1,2	-0,8	3 022
Intervalle intergénérisique en mois³														
Première naissance ⁴	3,0	14,8	-0,8	1 259	0,7	7,6	1,5	-0,5	1 256	1,8	12,5	1,1	-0,8	1 262
<24	6,7	26,7	-1,2	592	1,5	8,1	1,2	-0,5	597	2,9	18,8	0,1	-1,0	595
24-47	5,5	20,8	-1,0	2 583	1,4	8,6	1,1	-0,6	2 583	3,5	16,7	0,6	-1,0	2 592
48+	3,0	13,7	-0,7	1 108	1,2	6,4	3,0	-0,5	1 113	2,5	12,4	3,0	-0,7	1 115
Grosseur à la naissance³														
Très petit	9,8	28,0	-1,3	749	2,6	15,4	0,4	-0,9	744	7,2	27,6	0,2	-1,4	756
Petit	5,7	22,4	-1,2	1 085	1,1	9,7	1,1	-0,7	1 086	3,8	20,1	0,6	-1,2	1 088
Moyen ou plus gros que la moyenne	3,1	15,5	-0,8	3 667	1,0	5,9	2,0	-0,4	3 674	1,7	11,0	1,5	-0,7	3 679
Manquant	14,1	31,7	-1,4	40	1,4	5,0	2,6	-0,2	45	3,0	20,7	1,0	-0,9	41
Interview de la mère														
Interviewée	4,6	18,7	-0,9	5 542	1,2	7,9	1,6	-0,5	5 549	2,8	15,1	1,2	-0,9	5 563
Mère non interviewée mais vivant dans le ménage	5,1	18,4	-0,9	154	0,5	8,9	0,1	-0,6	159	3,6	11,3	0,4	-1,0	156
Mère non interviewée et ne vivant pas dans le ménage ⁵	5,6	21,6	-1,1	378	1,4	5,9	0,4	-0,6	399	3,0	17,0	0,2	-1,0	378

À suivre ...

Tableau 11.1—Suite

Caractéristique sociodémographique	Taille-pour-Âge ¹				Poids-pour-Faïlle				Poids-pour-Âge					
	Pourcent- age en dessous de -3 ET	Pourcent- age en dessous de -2 ET ²	Score centré réduit moyen (ET)	Effectif d'enfants	Pourcent- age en dessous de -3 ET	Pourcent- age en dessous de -2 ET ²	Pourcent- age au- dessus de +2 ET	Score centré réduit moyen (ET)	Effectif d'enfants	Pourcent- age en dessous de -3 ET	Pourcent- age en dessous de -2 ET ²	Pourcent- age au- dessus de +2 ET	Score centré réduit moyen (ET)	Effectif d'enfants
Résidence														
Urbain	3,1	12,7	-0,6	2 266	1,0	6,4	2,0	-0,5	2 272	2,2	11,3	1,9	-0,7	2 278
Rural	5,6	22,5	-1,1	3 808	1,3	8,6	1,2	-0,6	3 835	3,3	17,4	0,6	-1,1	3 819
Region														
Nord	3,9	17,4	-0,9	1 012	1,9	11,1	1,1	-0,8	1 010	3,5	18,9	0,5	-1,1	1 012
Ouest	2,8	12,5	-0,6	1 862	1,1	6,3	1,9	-0,5	1 863	2,5	10,2	2,2	-0,6	1 874
Centre	5,5	22,6	-1,1	2 198	0,9	6,9	1,3	-0,5	2 199	2,5	16,0	0,5	-1,0	2 201
Sud	7,0	23,8	-1,1	1 002	1,4	9,3	1,6	-0,6	1 035	3,8	18,6	1,0	-1,0	1 009
Niveau d'instruction de la mère														
Pas d'instruction	5,7	20,9	-1,1	3 591	1,5	8,4	1,2	-0,6	3 598	3,4	17,2	0,7	-1,0	3 602
Primaire	2,3	15,9	-0,8	1 132	0,8	7,4	1,4	-0,6	1 142	1,9	12,5	2,5	-0,8	1 140
Moyen/Secondaire ou plus	3,0	13,3	-0,6	971	0,6	6,8	2,9	-0,3	966	2,3	9,8	1,1	-0,6	975
NSP/Manquant	*	*	*	3	*	*	*	*	3	*	*	*	*	3
Quintiles de bien-être économique														
Le plus bas	8,1	28,6	-1,3	1 436	1,5	9,9	0,8	-0,7	1 458	3,9	22,2	0,3	-1,2	1 442
Second	4,9	21,8	-1,1	1 355	1,8	8,9	1,1	-0,6	1 363	3,7	17,3	0,5	-1,0	1 360
Moyen	4,0	16,6	-0,9	1 224	1,3	7,3	1,5	-0,6	1 229	2,5	15,0	1,4	-0,9	1 227
Quatrième	2,4	13,7	-0,7	1 024	0,6	5,2	2,3	-0,5	1 021	1,7	9,5	1,2	-0,7	1 027
Le plus élevé	2,5	9,0	-0,4	1 034	0,5	6,6	2,1	-0,4	1 038	1,9	8,2	2,5	-0,5	1 041
Ensemble	4,7	18,8	-0,9	6 074	1,2	7,8	1,5	-0,5	6 108	2,9	15,1	1,1	-0,9	6 097

Note : Chaque indice est exprimé en termes d'unités d'écart type (ET) par rapport à la médiane des Normes OMS de la croissance de l'enfant. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Les enfants de moins de 2 ans sont mesurés en position allongé alors que tous les autres enfants sont mesurés en position debout.

² Y compris les enfants qui se situent en-dessous de -3 ET de la médiane des Normes OMS de la croissance de l'enfant.

³ Non compris les enfants dont la mère n'a pas été interviewée.

⁴ Les premières naissances multiples -jumeaux, triplés- etc. sont comptés comme première naissance parce qu'elles n'ont pas d'intervalle avec la naissance précédente.

⁵ Y compris les enfants dont la mère est décédée.

⁶ Non compris les enfants dont la mère n'a pas été pesé et mesuré, les enfants dont la mère n'a pas été interviewé et les enfants dont la mère est enceinte ou a donné naissance à un enfant dans les deux mois précédentes. L'état nutritionnel de la mère, basé sur l'IMC (Indice de Masse Corporelle), est présenté au Tableau 11.10.1.

⁷ Pour les femmes qui n'ont pas été interviewées, l'information provient du questionnaire ménage. Non compris les enfants dont la mère n'est pas listé dans le questionnaire ménage.

Tableau 11.2 Allaitement initial

Parmi les enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des deux années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant été allaités, pourcentage qui ont commencé à être allaités dans l'heure qui a suivi la naissance et pourcentage qui ont commencé à être allaités le jour qui a suivi leur naissance et parmi les derniers nés dont la naissance a eu lieu au cours des deux années ayant précédé l'enquête qui ont été allaités, pourcentage ayant reçu des aliments avant d'être allaités, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Parmi les enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des deux années ayant précédé l'enquête :			Effectif d'enfants derniers-nés	Parmi les enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des deux dernières années et qui ont été allaités :	
	Pourcentage ayant été allaité	Pourcentage ayant commencé à être allaité dans l'heure qui a suivi la naissance	Pourcentage ayant commencé à être allaité le jour qui a suivi la naissance ¹		Pourcentage ayant reçu des aliments avant d'être allaités ²	Effectif d'enfants derniers-nés ayant été allaités
Sexe						
Masculin	98,3	28,0	86,6	1 175	59,6	1 155
Féminin	98,3	30,9	89,8	1 260	56,9	1 238
Assistance à l'accouchement						
Personnel de santé ³	98,1	31,4	86,5	1 878	58,2	1 843
Sage-femme traditionnelle	99,1	13,3	96,2	104	69,9	103
Autre	98,9	26,2	94,3	387	54,6	382
Personne	97,9	20,8	89,4	66	62,1	65
Lieu de l'accouchement						
Établissement de santé	98,2	31,9	87,5	2 056	58,3	2 020
Maison	98,7	16,3	93,0	364	59,0	359
Autre	*	*	*	14	*	14
Résidence						
Urbain	98,0	29,3	82,1	912	55,0	894
Rural	98,4	29,7	91,9	1 523	60,2	1 500
Région						
Nord	98,7	38,3	93,9	406	62,3	400
Ouest	97,8	27,1	79,9	750	55,3	733
Centre	98,7	22,0	91,1	885	73,8	873
Sud	97,9	42,1	91,9	395	24,2	386
Niveau d'instruction de la mère						
Pas d'instruction	99,0	29,6	92,2	1 459	62,3	1 444
Primaire	97,6	32,7	89,2	476	53,8	465
Moyen/Secondaire ou plus	96,8	26,2	75,8	500	50,2	484
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	98,3	33,6	93,3	549	52,9	540
Second	99,0	30,9	93,8	565	62,8	559
Moyen	98,4	29,8	90,7	495	58,8	487
Quatrième	97,6	31,7	90,0	409	55,2	399
Le plus élevé	98,0	19,8	69,3	416	61,3	408
Ensemble	98,3	29,5	88,2	2 435	58,2	2 393

Note : Le tableau est basé sur les enfants derniers-nés, dont la naissance a eu lieu au cours des deux années ayant précédé l'enquête, cela qu'ils soient en vie ou décédés au moment de l'enquête. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Y compris les enfants qui ont commencé à être allaités dans l'heure qui a suivi la naissance.

² C'est-à-dire les enfants à qui on a donné autre chose que le lait maternel pendant les trois premiers jours.

³ Médecin, infirmière/sage-femme ou infirmière auxiliaire/sage-femme.

Tableau 11.3 Type d'allaitement selon l'âge de l'enfant

Répartition (en %) des enfants derniers-nés de moins de deux ans vivant avec leur mère par type d'allaitement, pourcentage actuellement allaité ; pourcentage de tous les enfants de moins de deux ans utilisant un biberon, selon l'âge en mois, Sénégal 2018

Âge en mois	Allaitement et consommant :						Total	Pourcentage actuellement allaité	Effectif des derniers-nés de deux ans vivant avec leur mère	Pourcentage utilisant un biberon	Effectif d'enfants de moins de deux ans
	Non allaité	Exclusive-ment allaité	Allaité et eau seulement	Allaité et liquides non lactés ¹	Allaités et autres laits	Allaités et aliments de complément					
0-1	1,1	75,0	17,2	1,5	3,7	1,5	100,0	98,9	195	6,2	199
2-3	0,0	38,7	45,3	2,3	8,9	4,8	100,0	100,0	170	11,9	172
4-5	0,9	19,1	46,6	1,2	5,8	26,5	100,0	99,1	168	8,8	170
6-8	0,6	2,0	21,8	2,2	3,5	69,9	100,0	99,4	306	11,0	309
9-11	0,3	0,0	6,9	1,2	0,9	90,7	100,0	99,7	346	7,9	357
12-17	7,8	0,0	4,6	0,4	0,4	86,8	100,0	92,2	581	6,7	595
18-23	54,2	0,4	0,7	0,0	0,7	44,0	100,0	45,8	586	0,9	632
0-3	0,6	58,1	30,3	1,8	6,2	3,1	100,0	99,4	366	8,8	371
0-5	0,7	45,8	35,4	1,6	6,0	10,4	100,0	99,3	534	8,8	541
6-9	0,5	1,4	17,7	1,9	2,8	75,7	100,0	99,5	431	11,9	441
12-15	4,7	0,0	5,4	0,3	0,4	89,2	100,0	95,3	394	6,7	403
12-23	31,1	0,2	2,7	0,2	0,5	65,3	100,0	68,9	1 167	3,7	1 227
20-23	66,1	0,6	0,5	0,0	0,2	32,5	100,0	33,9	394	1,2	427

Note : Les données sur l'allaitement se rapportent à une période de 24 heures (hier et la nuit dernière). Les enfants classés dans la catégorie « Allaitement et eau seulement » ne reçoivent aucun complément liquide ou solide. Les catégories « Non allaité », « Allaité exclusivement », « Allaité et eau seulement », « Jus/liquides non lactés », et « Aliments de complément » (solides et semi solides) sont hiérarchiques et mutuellement exclusives et la somme des pourcentages égale 100 %. Ainsi, les enfants qui sont allaités et qui reçoivent des liquides non lactés et qui ne reçoivent pas d'autres laits et qui ne reçoivent pas d'aliments de complément sont classés dans la catégorie « Liquides non lactés » même s'ils reçoivent également de l'eau. Tout enfant qui reçoit des aliments de complément est classé dans cette catégorie tant qu'il est toujours allaité.

¹ Les liquides non lactés comprennent les jus, les boissons à base de jus, les bouillons et les autres liquides.

Tableau 11.4 Indicateurs de l'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) concernant l'allaitement

Pourcentage d'enfants nourris selon les différentes pratiques alimentaires de l'ANJE, Sénégal 2018

Indicateur	Pourcentage	Effectif
Allaitement exclusif du nourrisson à moins de 6 mois	45,8	534
Allaitement exclusif à 4-5 mois	19,1	168
Allaitement prolongé à 1 an	95,3	394
Introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous (6-8 mois)	70,4	306
Allaitement prolongé à 2 ans	33,9	394
Allaitement à l'âge approprié ¹ (0-23 mois)	65,2	2 353
Allaitement prédominant ² (0-5 mois)	82,8	534
Nourri au biberon (0-23 mois)	6,4	2 434

¹ Pour les enfants de 0-5 mois : exclusivement allaités ; pour les enfants de 6-23 mois : lait maternel et aliments de complément.

² Soit exclusivement allaités ou allaité et eau seulement et/ou liquides non lactés seulement.

Tableau 11.5 Durée médiane de l'allaitement

Durée médiane de l'allaitement, de l'allaitement exclusif et de l'allaitement prédominant des enfants nés au cours des trois années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Durée médiane (en mois) de l'allaitement parmi les enfants nés au cours des trois dernières années ¹		
	Allaitement	Allaitement exclusif	Allaitement prédominant ²
Sexe			
Masculin	20,1	2,5	5,4
Féminin	20,4	2,7	5,5
Résidence			
Urbain	19,7	3,1	4,6
Rural	20,6	2,3	6,0
Région			
Nord	19,8	(2,4)	6,0
Ouest	19,5	3,4	4,6
Centre	20,7	1,8	5,9
Sud	21,2	3,1	6,0
Niveau d'instruction de la mère			
Pas d'instruction	20,6	2,5	5,8
Primaire	20,9	(2,7)	5,6
Moyen/Secondaire ou plus	18,6	2,9	4,6
Quintiles de bien-être économique			
Le plus bas	21,4	2,2	5,9
Second	20,9	2,2	5,8
Moyen	20,1	(2,3)	5,8
Quatrième	20,4	3,3	4,7
Le plus élevé	(18,3)	(3,2)	(4,9)
Ensemble	20,2	2,6	5,5
Moyenne pour tous les enfants	20,7	3,9	7,0

Note : Les durées médiane et moyenne de l'allaitement sont basées sur le statut d'allaitement de l'enfant au moment de l'enquête (statut actuel). Y compris les enfants vivants et décédés. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

¹ Pour les enfants derniers-nés de moins de 24 mois vivant avec leur mère et qui sont allaités, l'information pour déterminer si l'allaitement est exclusif et prédominant est basée sur le rappel des aliments consommés pendant une période de 24 heures. On suppose que les derniers-nés de 24 mois ou plus qui vivent avec leur mère et qui sont allaités ne reçoivent ni un allaitement exclusif, ni un allaitement prédominant. On suppose que les enfants derniers-nés qui ne vivent pas actuellement avec leur mère et tous les enfants qui ne sont pas des derniers-nés ne sont pas actuellement allaités.

² Soit exclusivement allaités ou qui ont reçu le lait maternel, de l'eau et/ou des liquides non lactés seulement.

Tableau 11.6 Aliments et liquides reçus par les enfants le jour ou la nuit ayant précédé l'interview

Pourcentage d'enfants derniers-nés de moins de deux ans vivant avec leur mère, par type d'aliments consommés le jour ou la nuit ayant précédé l'interview, selon qu'ils sont, ou non, allaités et selon l'âge, Sénégal 2018

Âge en mois	Liquides			Aliments solides ou semi solides										Effectif d'enfants
	Lait en poudre pour enfant	Autres laits ¹	Autres liquides ²	Aliments enrichis pour bébé	Aliments à base de céréales ³	Fruits et légumes riches en vitamine A ⁴	Autres fruits et légumes	Préparations à base de racines et de tubercules	Préparations à base de légumineuses et de noix	Viande, poisson, volaille	Oeufs	Fromage, yaourt, autres produits laitiers	Préparations solides ou semi-solides	
ENFANTS ALLAITÉS														
0-1	3,8	0,0	2,3	0,0	0,7	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,6	193
2-3	7,5	2,3	3,4	0,7	1,7	0,4	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	4,8	170
4-5	4,4	5,0	5,4	9,8	22,9	3,6	0,4	4,0	1,2	3,1	0,0	1,5	26,7	167
6-8	6,6	11,7	12,5	19,3	52,6	22,8	3,3	16,7	1,3	13,9	0,1	15,6	70,2	304
9-11	3,4	19,2	20,5	18,3	73,8	37,7	8,5	25,5	8,1	31,7	1,6	15,6	90,9	345
12-17	3,4	22,6	27,6	16,5	88,5	53,3	10,8	24,0	9,4	49,8	5,1	15,2	94,1	535
18-23	2,0	25,0	27,2	15,9	92,9	52,2	12,2	23,8	15,4	56,5	5,9	14,1	96,1	268
6-23	3,8	19,9	22,7	17,4	78,3	43,0	8,9	22,8	8,5	39,2	3,4	15,2	88,7	1 453
Total	4,2	15,2	17,6	13,6	59,5	31,9	6,6	17,1	6,3	29,0	2,5	11,3	67,8	1 984
ENFANTS NON ALLAITÉS														
0-1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2
2-3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
4-5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2
6-8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2
9-11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1
12-17	(34,7)	(41,2)	(52,5)	(34,4)	(97,8)	(63,9)	(30,6)	(40,7)	(14,6)	(77,6)	(16,2)	(45,9)	(99,7)	45
18-23	3,8	37,9	39,8	17,2	95,4	63,6	19,2	30,7	13,4	63,9	14,6	26,4	98,8	318
6-23	7,7	38,2	41,3	19,2	95,7	63,3	20,5	31,9	13,4	65,3	14,7	28,6	98,9	366
Total	7,7	37,8	40,9	19,0	94,7	62,7	20,3	31,6	13,3	64,7	14,5	28,4	97,9	369

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. Les données sur l'allaitement et sur les aliments consommés se rapportent à la période de « 24 heures » (hier et la nuit dernière).

¹ Les Autres Laits comprennent le lait d'animal, qu'il soit frais, en boîte, ou en poudre.

² N'inclut pas l'eau plate. Inclut les jus, les boissons à base de jus, les bouillons clairs ou d'autres liquides non lactés

³ Inclut les aliments enrichis pour bébés

⁴ Comprend les citrouilles, les ignames ou les courges rouges ou jaunes, les carottes, les pommes de terre douces rouges, les légumes à feuilles vert foncé, les mangues mûres et d'autres fruits et légumes produits localement qui sont riches en vitamine A.

Tableau 11.7 Consommation de collations sucrées, collations salées et boissons gazeuses par les enfants âgés de 6 à 23 mois le jour ou la nuit ayant précédé l'interview

Pourcentage d'enfants âgés de 6 à 23 mois vivant avec leur mère par type de collations consommées le jour ou la nuit ayant précédé l'interview, selon qu'ils sont, ou non, allaités et selon le milieu de résidence et par région, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Collations sucrées ¹	Collations salées ²	Boissons gazeuses ³	Nombre total d'enfants âgés de 6-23 mois
ENFANTS ALLAITÉS				
Âge en mois 6-11				
Résidence				
Urbain	12,6	21,3	3,3	250
Rural	8,2	14,7	1,1	400
Région				
Nord	10,2	19,3	2,0	109
Ouest	12,8	26,7	3,3	201
Centre	8,8	12,4	1,0	249
Sud	6,2	7,1	1,8	91
Âge en mois 12-23				
Résidence				
Urbain	33,0	42,7	4,0	287
Rural	19,0	23,1	4,5	517
Région				
Nord	21,0	31,8	2,7	124
Ouest	36,3	44,1	4,2	230
Centre	18,9	21,8	5,2	301
Sud	17,6	23,9	4,3	149
ENFANTS NON ALLAITÉS				
Âge en mois 6-11				
Résidence				
Urbain	*	*	*	0
Rural	*	*	*	2
Région				
Nord	*	*	*	2
Ouest	*	*	*	0
Centre	*	*	*	0
Sud	*	*	*	1
Âge en mois 12-23				
Résidence				
Urbain	58,1	48,0	16,2	160
Rural	24,5	28,5	3,8	203
Région				
Nord	30,3	35,4	5,8	68
Ouest	55,4	41,2	14,5	138
Centre	31,6	35,1	5,6	111
Sud	22,9	32,3	7,7	46

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Les collations sucrées : Il s'agit notamment des biscuits et cookies des pâtisseries. Ex : Ikram, Biskrem, Tempo, Today, gâteaux, muns, beignets, cakes, madeleines et les sucettes, bonbons, chocolats comme Kinder, Haribo, Tengel, Bégüé.

² Les collations salées : Il s'agit notamment des chips comme Crax, Lays ou Pringles et les biscuits salés.

³ Les boissons gazeuses : Elle incluent les boissons gazeuses comme Coca, Fanta, Top, Sprite...

Tableau 11.8 Apport alimentaire minimum acceptable

Pourcentage d'enfants demiers-nés de 6-23 mois vivant avec leur mère qui ont reçu un apport alimentaire minimum acceptable basé sur l'allaitement, le nombre de groupes d'aliments et le nombre de fois qu'ils ont été nourris durant le jour ou la nuit ayant précédé l'interview selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Parmi les enfants allaités de 6-23 mois, pourcentage ayant reçu :				Parmi les enfants non allaités de 6-23 mois, pourcentage ayant reçu :					Parmi tous les enfants de 6-23 mois, pourcentage ayant reçu :				
	Diversité alimentaire minimum ¹	Fréquence minimum des repas ²	Apport alimentaire minimum acceptable ³	Effectif de 6-23 mois allaités	Lait ou produits laitiers ⁴	Diversité alimentaire minimum ¹	Fréquence minimum des repas ⁵	Apport alimentaire minimum acceptable	Effectif de 6-23 mois non allaités	Lait maternel ou produits laitiers ⁷	Diversité alimentaire minimum ¹	Fréquence minimum des repas ⁸	Apport alimentaire minimum acceptable ⁹	Effectif de tous les enfants de 6-23 mois
Âge en mois														
6-8	6,6	42,6	6,5	304	*	*	*	*	2	99,6	6,7	42,6	6,5	306
9-11	21,6	24,2	13,2	345	*	*	*	*	1	99,7	21,5	24,1	13,1	346
12-17	26,8	33,7	12,6	535	(53,7)	(53,3)	(62,9)	(27,1)	45	96,4	28,8	35,9	13,7	581
18-23	30,6	40,1	13,4	268	23,6	39,9	47,4	7,7	318	58,6	35,6	44,1	10,3	586
Sexe														
Masculin	20,5	35,1	11,7	688	30,2	42,0	50,3	11,2	177	85,7	24,9	38,2	11,6	865
Féminin	23,4	33,9	11,5	766	24,6	40,8	47,9	9,0	189	85,1	26,8	36,7	11,0	954
Résidence														
Urbain	33,8	33,0	15,7	537	38,0	61,9	54,8	18,7	161	85,7	40,3	38,0	16,4	698
Rural	15,1	35,3	9,2	916	19,0	25,3	44,6	3,3	205	85,2	17,0	37,0	8,1	1 122
Région														
Nord	17,2	33,2	11,4	233	31,7	25,9	49,2	4,8	69	84,3	19,2	36,9	9,9	302
Ouest	37,9	30,2	15,8	431	36,1	63,4	51,9	19,3	138	84,5	44,1	35,4	16,6	569
Centre	15,6	39,1	10,3	550	15,9	29,9	47,2	3,2	111	85,8	18,0	40,5	9,1	661
Sud	12,8	32,9	7,3	240	22,2	27,1	45,2	7,0	47	87,2	15,2	34,9	7,2	287
Niveau d'instruction de la mère														
Pas d'instruction	17,8	32,4	9,7	894	15,0	29,3	39,2	2,7	196	84,7	19,9	33,7	8,5	1 090
Primaire	29,4	33,6	11,8	314	29,5	51,3	63,8	14,8	63	88,2	33,1	38,6	12,3	377
Moyen/Secondaire ou plus	27,8	43,1	18,1	246	48,6	57,7	58,6	20,8	106	84,5	36,8	47,7	18,9	353
Quintiles de bien-être économique														
Le plus bas	11,8	34,2	7,2	333	13,2	13,6	36,1	1,0	66	85,6	12,1	34,6	6,2	398
Second	15,4	30,5	7,0	355	17,5	22,0	40,2	4,6	67	86,8	16,4	32,1	6,6	423
Moyen	21,6	39,3	13,1	281	26,9	46,5	59,5	8,0	76	84,4	26,9	43,6	12,0	357
Quatrième	31,9	34,7	15,5	257	28,1	43,6	57,1	5,3	57	87,0	34,0	38,8	13,7	314
Le plus élevé	36,7	34,7	18,9	227	(43,2)	(67,6)	(51,2)	(24,0)	100	82,7	46,2	39,7	20,5	327
Total	22,0	34,5	11,6	1 453	27,3	41,4	49,1	10,1	366	85,4	25,9	37,4	11,3	1 819

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Enfants ayant reçu des aliments d'au moins quatre groupes contenant les aliments suivants : a. préparation commerciale pour bébés, lait autre que le lait maternel, fromage ou yaourt ou autres produits laitiers ; b. préparations à base de céréales, de racines ou de tubercules et les préparations enrichies pour bébés à base de céréales ; c. fruits et légumes riches en vitamine A- et huile de palme rouge ; d. autres fruits et légumes ; e. œufs viande, poisson et coquillage (et abats) ; et f. légumes et noix.

² Pour les enfants allaités, la fréquence minimum des repas consiste à recevoir des aliments solides ou semi-solides au moins deux fois par jour pour les enfants de 6-8 mois et au moins trois fois par jour pour ceux de 9-23 mois.

³ On considère que les enfants allaités de 6-23 mois reçoivent un apport alimentaire minimum acceptable s'ils sont nourris selon la diversité minimum alimentaire telle que décrite dans la note 1 et la fréquence minimum des repas telle que défini dans la note 2.

⁴ Y compris au moins deux repas comptant une préparation commerciale pour bébés, du lait d'animal frais, en boîte en poudre et du yaourt.

⁵ Pour les enfants de 6-23 mois non allaités, on considère que la fréquence minimum des repas est de recevoir des aliments solides ou semi-solides ou des préparations à base de lait au moins quatre fois par jour.

⁶ On considère que les enfants non allaités de 6-23 mois ont un apport alimentaire minimum acceptable s'ils reçoivent d'autres laits ou des produits laitiers au moins deux fois par jour, s'ils sont nourris selon la fréquence minimum des repas telle que définie à la note 5 et s'ils reçoivent des aliments solides ou semi-solides provenant d'au moins quatre groupes d'aliments, non compris le groupe d'aliments comprenant le lait ou les produits laitiers.

⁷ Lait maternel ou pas de lait maternel et recevant au moins deux repas de préparations commerciales pour bébés, de lait d'animal frais, en boîte ou en poudre et de yaourt.

⁸ Les enfants nourris le nombre minimum de fois recommandé par jour selon leur âge et selon qu'ils sont allaités ou non comme décrit aux notes 2 et 5.

⁹ On considère que les enfants de 6-23 mois ont un apport alimentaire minimum acceptable s'ils reçoivent le lait maternel, d'autres laits ou des produits laitiers comme décrit à la note 7, s'ils sont nourris selon la diversité alimentaire minimum comme décrit à la note 1 et selon la fréquence minimum des repas comme décrit aux notes 2 et 5.

Tableau 11.9 Présence de sel iodé dans le ménage

Parmi tous les ménages, pourcentage dont le sel a été testé pour la présence d'iode, pourcentage disposant de sel mais dont le sel n'a pas été testé et pourcentage ne disposant pas de sel dans le ménage et, parmi les ménages dont le sel a été testé, pourcentage ayant du sel iodé selon certaines caractéristiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Parmi tous les ménages, pourcentage :			Effectif de ménages	Parmi les ménages dont le sel a été testé :	
	Dont le sel a été testé	Dont le sel n'a pas été testé ¹	Ne disposant pas de sel		Pourcentage disposant de sel iodé	Effectif de ménages
Résidence						
Urbain	88,0	0,0	12,0	2 318	83,6	2 039
Rural	94,5	0,1	5,4	2 274	59,7	2 149
Région						
Nord	92,5	0,0	7,5	740	70,2	685
Ouest	89,0	0,0	11,0	1 920	84,4	1 708
Centre	92,9	0,2	6,9	1 178	54,6	1 095
Sud	92,8	0,1	7,0	754	66,9	700
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	96,0	0,2	3,8	858	65,5	824
Second	92,0	0,2	7,9	843	53,5	775
Moyen	87,9	0,0	12,1	820	64,9	721
Quatrième	85,5	0,1	14,5	1 004	79,4	858
Le plus élevé	94,6	0,0	5,4	1 068	87,5	1 010
Total	91,2	0,1	8,7	4 592	71,3	4 188

¹ Y compris les ménages dans lesquels le sel n'a pas pu être testé pour des raisons techniques ou logistiques incluant la disponibilité de kits de tests.

Tableau 11.10 Consommation de micronutriments par les enfants

Parmi les plus jeunes enfants de 6-23 mois vivant avec leur mère, pourcentages qui ont consommé des aliments riches en vitamine A et des aliments riches en fer au cours des 24h ayant précédé l'interview ; parmi tous les enfants de 6-23 mois pourcentage à qui on a donné [POUDRE DE MICRONUTRIMENTS MULTIPLES] dans les sept jours ayant précédé l'interview ; parmi tous les enfants de 6-59 mois, pourcentage à qui on a donné des suppléments de vitamine A dans les six mois ayant précédé l'interview, pourcentage à qui on a donné des suppléments de fer dans les sept jours ayant précédé l'interview et pourcentage à qui on a donné des vermifuges dans les 6 mois ayant précédé l'interview ; et parmi tous les enfants de 6-59 mois qui vivent dans un ménage dans lequel le sel a été testé pour la présence d'iode, pourcentage vivant dans un ménage qui disposait de sel iodé, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Parmi les derniers-nés de 6-23 mois vivant avec leur mère :			Parmi tous les enfants de 6-23 mois :		Parmi tous les enfants de 6-59 mois :			Parmi les enfants de 6-59 mois vivant dans un ménage dans lequel le sel a été testé :		
	Pourcentage ayant consommé des aliments riches en vitamine A au cours des 24 dernières heures ¹	Pourcentage ayant consommé des aliments riches en fer au cours des 24 dernières heures ²	Effectif d'enfants	Pourcentage à qui on a donné un mélange en poudre de micronutriments multiples au cours des sept derniers jours	Effectif d'enfants	Pourcentage à qui on a donné des suppléments de fer au cours des 7 derniers jours ³	Pourcentage à qui on a donné des suppléments de vitamine A au cours des 6 derniers mois ⁴	Pourcentage à qui on a donné des vermifuges au cours des 6 derniers mois ³	Effectif d'enfants	Pourcentage disposant de sel iodé ⁶	Effectif de ménages
Âge de l'enfant en mois											
6-8	28,4	14,1	306	1,4	309	1,1	47,5	7,9	309	64,4	302
9-11	43,4	31,9	346	1,2	357	1,1	59,3	16,9	357	68,0	347
12-17	66,4	53,3	581	2,6	595	2,6	67,5	33,0	595	67,5	574
18-23	75,1	63,3	586	0,9	632	3,2	61,1	41,9	632	62,0	621
24-35	na	na	na	na	na	1,7	56,7	48,6	1 092	65,8	1 052
36-47	na	na	na	na	na	2,1	55,7	51,8	1 106	66,8	1 087
48-59	na	na	na	na	na	2,2	54,2	52,7	1 189	68,6	1 158
Sexe											
Masculin	58,7	45,8	865	1,3	908	2,3	57,5	44,0	2 667	65,7	2 606
Féminin	58,2	46,0	954	1,8	984	1,9	57,1	42,2	2 611	67,3	2 535
Allaitement											
Allaite	53,1	40,2	1 453	1,3	1 486	1,7	60,2	24,6	1 534	65,2	1 491
N'allait pas	79,8	68,3	366	2,5	407	2,2	56,1	50,7	3 745	67,0	3 650
Âge de la mère à la naissance											
15-19	45,9	36,4	129	1,2	135	1,4	51,5	24,4	184	69,0	183
20-29	57,7	46,1	872	0,7	907	1,9	55,7	39,9	2 269	67,0	2 205
30-39	60,5	45,9	665	2,9	691	2,5	57,7	45,7	2 212	65,7	2 152
40-49	64,4	52,1	153	1,1	159	1,7	63,4	51,1	614	66,2	602
Résidence											
Urbain	68,3	60,5	698	1,7	725	2,9	63,0	49,2	2 024	79,2	1 956
Rural	52,3	36,7	1 122	1,5	1 167	1,6	53,8	39,3	3 255	58,6	3 185
Région											
Nord	53,9	39,0	302	2,3	314	5,6	70,6	52,1	861	70,2	842
Ouest	75,8	67,6	569	1,3	590	1,6	63,5	48,5	1 673	78,5	1 620
Centre	51,6	36,8	661	0,9	688	0,6	46,9	34,7	1 891	52,7	1 836
Sud	44,6	30,9	287	2,8	301	2,7	55,0	41,8	855	69,6	843
Niveau d'instruction de la mère											
Pas d'instruction	53,4	40,8	1 090	1,5	1 138	1,3	54,3	40,4	3 291	62,4	3 190
Primaire	64,1	51,3	377	0,4	388	2,0	62,5	47,5	1 100	71,0	1 084
Moyen/Secondaire ou plus	68,1	55,7	353	3,2	366	5,2	62,1	47,4	887	75,6	867
Quintiles de bien-être économique											
Le plus bas	44,6	29,9	398	2,0	414	1,3	49,8	36,8	1 218	67,8	1 195
Second	54,5	40,2	423	1,0	441	1,8	51,5	35,8	1 154	51,0	1 121
Moyen	63,6	49,3	357	1,7	370	2,0	59,8	45,3	1 035	63,7	1 002
Quatrième	64,3	53,0	314	1,0	326	2,0	64,8	54,2	933	70,4	903
Le plus élevé	69,2	62,1	327	2,1	342	3,6	64,2	46,7	939	82,6	920
Ensemble	58,4	45,9	1 819	1,6	1 892	2,1	57,3	43,1	5 279	66,4	5 141

na = Non applicable

¹ Y compris la viande (et abats), poisson, volaille, oeufs, citrouilles, ignames ou courges rouges ou jaunes, carottes, pommes de terre douces rouges, les légumes à feuilles vert foncé, les mangues mûres, papayes mûres et autres fruits et légumes produits localement qui sont riches en vitamine A, et l'huile de palme rouge

² Y compris la viande (et les abats), le poisson, la volaille et oeufs.

³ Basé sur le souvenir de la mère.

⁴ Basé sur le souvenir de la mère et le carnet de vaccination (quand il est disponible).

⁵ Les vermifuges contre les parasites intestinaux sont couramment donnés pour traiter les helminthes et les schistosomias.

⁶ Sont exclus les enfants vivant dans un ménage dans lesquels le sel n'a pas été testé.

Tableau 11.11 Aliments thérapeutiques et compléments alimentaires

Parmi les enfants de 6-35 mois, pourcentage qui ont reçu [PLUMPY'NUT] et [PLUMPY'DOZ] dans les 7 jours ayant précédé l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant reçu PLUMPY' NUT dans les 7 derniers jours	Pourcentage ayant reçu PLUMPY' DOZ dans les 7 derniers jours	Effectif d'enfants
Âge de l'enfant en mois			
6-8	1,3	0,4	309
9-11	1,0	0,0	357
12-17	1,2	0,4	595
18-23	0,9	0,4	632
24-35	1,1	0,5	1 092
Sexe			
Masculin	1,0	0,3	1 505
Féminin	1,2	0,5	1 480
Allaitement			
Allaité	1,0	0,3	1 520
Non allaité	1,2	0,5	1 465
État d'émaciation¹			
Malnutrition aiguë sévère ²	10,9	0,7	44
Malnutrition aiguë modérée ³	4,0	1,6	197
Non émacié	0,7	0,3	2 641
Âge de la mère à la naissance			
15-19	1,1	1,1	162
20-29	0,9	0,4	1 424
30-39	1,1	0,3	1 132
40-49	1,6	0,5	266
Résidence			
Urbain	0,3	0,2	1 115
Rural	1,5	0,5	1 869
Région			
Nord	1,8	0,2	493
Ouest	0,2	0,0	916
Centre	1,0	0,2	1 109
Sud	2,2	1,8	467
Niveau d'instruction de la mère			
Pas d'instruction	1,3	0,5	1 847
Primaire	0,0	0,1	598
Moyen/Secondaire ou plus	1,3	0,5	538
Quintiles de bien-être économique			
Le plus bas	2,0	1,2	677
Second	0,6	0,4	684
Moyen	1,1	0,2	592
Quatrième	0,8	0,0	519
Le plus élevé	0,6	0,0	513
Ensemble	1,1	0,4	2 984

¹ Limité aux enfants pour lesquels les données sur le poids et la taille sont valides

² La malnutrition aiguë sévère (MAS) est définie par un rapport poids-pour-taille inférieur de -3 écart type par rapport à la médiane des normes OMS de la croissance de l'enfant.

³ La malnutrition aiguë modérée (MAM) est définie par un rapport poids-pour-taille inférieur de -3 écart type à -2 écart type par rapport à la médiane des normes OMS de la croissance de l'enfant.

⁴ Enfants dont le rapport poids-pour-taille est inférieur de -2 écart-type par rapport à la médiane des normes OMS de la croissance de l'enfant.

Tableau 11.12 Consommation de micronutriments par les mères

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu un enfant au cours des cinq années ayant précédé l'enquête, répartition (en %) par nombre de jours pendant lesquels elles ont pris du fer, sous forme de comprimés ou de sirop, pendant la grossesse de leur dernier enfant et pourcentage qui ont pris des vermifuges au cours de la grossesse de leur dernier enfant et parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu un enfant au cours des 5 années ayant précédé l'enquête et qui vivent dans un ménage dans lequel le sel a été testé pour la présence d'iode, pourcentage vivant dans un ménage disposant de sel iodé, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Nombre de jours pendant lesquels elles ont pris du fer, en comprimés ou en sirop, au cours de la grossesse de leur dernière naissance						Ne sait pas/ manquant	Total	Pourcentage de femmes ayant pris des vermifuges durant la grossesse de la dernière naissance	Effectif de femmes	Parmi les femmes ayant eu un enfant au cours des cinq années ayant précédé l'enquête et qui vivent dans un ménage dont le sel a été testé pour l'iode :	
	Aucun	<60	60-89	90+	Effectif de femmes	Pourcentage vivant dans un ménage avec du sel iodé ¹					Effectif de femmes	
Groupe d'âges												
15-19	2,5	15,9	12,5	66,3	2,7	100,0	39,2	229	69,8	228		
20-29	3,2	11,8	7,5	70,8	6,7	100,0	43,9	1 836	67,7	1 791		
30-39	3,8	12,0	8,7	68,6	6,9	100,0	47,7	1 752	68,1	1 703		
40-49	3,9	15,1	7,6	66,5	6,9	100,0	40,5	536	66,5	528		
Résidence												
Urbain	1,7	8,5	5,5	75,3	9,0	100,0	51,0	1 763	80,3	1 709		
Rural	4,7	15,2	10,1	65,0	5,0	100,0	40,6	2 589	59,4	2 541		
Région												
Nord	4,2	23,2	15,1	53,1	4,4	100,0	26,1	720	70,8	704		
Ouest	0,9	4,4	3,9	81,2	9,6	100,0	50,8	1 457	80,2	1 417		
Centre	4,2	11,1	9,1	72,6	3,0	100,0	44,4	1 486	53,5	1 448		
Sud	6,7	21,4	8,5	52,9	10,5	100,0	52,5	689	69,5	681		
Niveau d'instruction												
Pas d'instruction	4,8	14,7	9,6	64,9	6,0	100,0	40,7	2 563	62,9	2 494		
Primaire	2,1	11,2	8,0	71,8	7,0	100,0	48,7	958	73,1	944		
Moyen/Secondaire ou plus	1,0	7,1	4,4	79,3	8,1	100,0	52,8	832	76,9	812		
Quintiles de bien-être économique												
Le plus bas	8,5	21,7	13,2	50,8	5,9	100,0	33,3	915	68,3	899		
Second	4,1	13,8	9,2	67,9	4,9	100,0	43,7	921	52,9	899		
Moyen	2,7	11,0	8,5	72,2	5,6	100,0	44,9	874	63,6	853		
Quatrième	1,3	7,1	5,3	77,7	8,5	100,0	50,1	825	73,0	799		
Le plus élevé	0,3	7,8	4,3	79,2	8,5	100,0	53,3	817	83,4	800		
Ensemble	3,5	12,5	8,2	69,1	6,6	100,0	44,8	4 353	67,8	4 250		

¹ Non compris les femmes des ménages dans lesquels le sel n'a pas été testé.

Résultats clés

- **Possession de MII** : 77 % des ménages possèdent au moins une MII : 84 % en milieu rural et 70 % en milieu urbain.
- **Accès à une MII** : 62 % de la population des ménages ont accès à une MII ; ce pourcentage varie de 68 % en milieu rural à 55 % en milieu urbain.
- **Utilisation de MII** : La nuit avant l'interview, 52 % de la population des ménages avaient dormi sous une MII ; ce pourcentage est de 60 % en milieu rural et de 41 % en milieu urbain
- **Utilisation du TPI** : Pendant leur dernière grossesse, 64 % des femmes enceintes ont reçu au moins deux doses de SP et 22 % en ont reçu au moins trois dont une au cours d'une visite prénatale.
- **Prise en charge du paludisme** : Parmi les enfants de moins de cinq ans ayant eu de la fièvre au cours des deux semaines avant l'interview, on a recherché des conseils ou un traitement pour 53 % d'entre eux ; Pour 32 % d'entre eux on a recherché des conseils ou un traitement le même jour ou le jour d'après. En outre, pour 14 % des enfants ayant eu de la fièvre, on a effectué un prélèvement de sang au doigt ou au talon pour être testé.

Ce chapitre présente les données utiles pour évaluer l'efficacité des stratégies de contrôle du paludisme qui ont été mises en place, stratégies qui comprennent la disponibilité et l'utilisation de moustiquaires, l'utilisation prophylactique et thérapeutique d'antipaludiques, le test de diagnostic des enfants avec de la fièvre ainsi que le délai de recours aux soins.

12.1 POSSESSION DE MOUSTIQUAIRES IMPRÉGNÉES D'INSECTICIDE

Possession de moustiquaires imprégnées d'insecticide

Ménages qui ont, au moins, une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII). Une MII est définie comme une moustiquaire imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire.

Échantillon : Ménages

Couverture complète en MII dans les ménages

Pourcentage de ménages avec, au moins, une MII pour deux personnes.

Échantillon : Ménages

Au Sénégal, moins de huit ménages sur 10 (77 %) possèdent au moins une MII. En moyenne, un ménage dispose de 3,2 MII et 39 % des ménages ont au moins, une MII pour deux personnes qui ont passé la nuit dans le ménage avant l'interview. Une campagne universelle de distribution de moustiquaire avait été

organisée en 2016. Il y a aussi la distribution de routine à travers les structures sanitaires, la communauté et le marketing social (**Tableau 12.1**).

Tendances : Le pourcentage de ménages possédant au moins un MII a augmenté entre 2012-2013 et 2017, passant de 73 % à 84 %. Cependant, cette tendance à l'augmentation ne s'est pas poursuivie puisqu'entre 2017 et 2018 le pourcentage a légèrement diminué, passant de 84 % à 77 % que de 77 % (**Graphique 12.1**). Par contre, dans la même période, le nombre moyen de moustiquaires par ménage a augmenté, passant de 2,8 MII en 2012-2013 à 3,2 en 2018. Cette tendance à la hausse a eu lieu

Graphique 12.1 Possession de MII dans les ménages : tendance

Pourcentage de ménages qui possèdent au moins une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)



EDS-C 2012-2013	EDS-C 2014	EDS-C 2015	EDS-C 2016	EDS-C 2017	EDS-C 2018
-----------------	------------	------------	------------	------------	------------

dans le contexte de l'organisation régulière de campagne nationale de distribution de moustiquaires depuis 2010. Ces campagnes se faisaient de façon séquentielle avec des groupes de régions et non sur l'ensemble du territoire national pour une année donnée. En 2016, pour la première fois, la campagne s'est tenue sur une année pour l'ensemble des régions du Sénégal.

Variations par caractéristique

- La possession de MII varie selon le milieu de résidence. En effet, 84 % des ménages en milieu rural possèdent au moins une MII contre 70 % en milieu urbain. Ce résultat pourrait s'expliquer, en partie, par la difficulté d'organisation des campagnes de distribution des moustiquaires dans les grandes villes.
- La possession de MII présente des disparités entre les régions. En effet, c'est dans la région Ouest que l'on observe le plus faible pourcentage de ménages disposant d'au moins une MII (70 %). À l'opposé, la région Centre enregistre le pourcentage le plus élevé (91 % des ménages).

Source d'obtention des moustiquaires

- Les résultats montrent que plus des trois quarts des MII possédées par les ménages ont été obtenues lors des campagnes de distribution de masse (76 %). Dans 9 % des cas, les ménages ont obtenu leurs moustiquaires dans un établissement de santé du gouvernement et dans 4 % des cas, par des parents/voisins/amis. Notons enfin que les pharmacies ont approvisionné 3 % des ménages (**Tableau 12.2**).

12.2 ACCÈS ET UTILISATION DES MII DANS LES MÉNAGES

Accès à une MII

Pourcentage de la population qui aurait pu dormir sous une MII si chaque MII du ménage était utilisée par deux personnes au maximum.

Échantillon : Population de fait des ménages

Utilisation des MII

Pourcentage de la population qui a dormi sous une MII la nuit avant l'interview

Échantillon : Population de fait des ménages


Des campagnes de communication pour l'utilisation des moustiquaires sont régulièrement mise en œuvre par le programme national de lutte contre le paludisme. Les campagnes de distribution de masse des MII sont également des périodes d'intensification de la communication à travers une communication de masse et de proximité.

L'accès aux MII est mesuré par le pourcentage de la population qui aurait pu dormir sous une MII si chaque MII du ménage était utilisée par deux personnes au maximum. La comparaison de cet indicateur avec ceux concernant l'utilisation peut aider les programmes à identifier les obstacles empêchant l'utilisation des MII, à orienter ou réorienter les stratégies et à mettre en place les interventions appropriées. L'enquête montre que 62 % de la population des ménages ont accès à une MII (**Tableau 12.3**) et que 52 % de la population des ménages ont dormi sous une MII la nuit précédant le passage de l'enquêteur (**Tableau 12.5**). Il y a donc un écart de 10 points de pourcentage entre l'accès et l'utilisation, ce qui montre la nécessité de renforcer la sensibilisation sur l'utilisation des MII. Dans les ménages qui possèdent au moins une MII, 64 % de la population ont dormi sous MII. En outre, 75 % des MII existantes ont été utilisées la nuit précédant l'interview (**Tableau 12.6**).

Tendances : Entre 2012 et 2018, on note une amélioration de l'accès aux MII et de leur utilisation. En effet, le pourcentage de la population ayant accès à une MII est passé de 57 % à 62 % et celui de la population ayant dormi sous une MII est passé de 41 % à 52 %. C'est en 2016 que ces pourcentages ont atteint son niveau le plus élevé (respectivement 76 % et 63 %) (**Graphique 12.2**) du fait de la campagne de distribution de masse de MII.

Graphique 12.2 Accès et utilisation des MII : tendances

Pourcentage de la population des ménages ayant accès à une MII et ayant dormi sous une MII la nuit avant l'interview



EDS-C	EDS-C	EDS-C	EDS-C	EDS-C	EDS-C
2012-2013	2014	2015	2016	2017	2018

Variations par caractéristique

- En milieu rural, 68% de la population ont accès à une MII contre 55 % en milieu urbain (**Tableau 12.4**). L'utilisation de MII est également plus fréquente en milieu rural (60 %) par rapport au milieu urbain (41 %) (**Tableau 12.5**).
- Les populations qui ont un accès le plus important aux MII sont celles des régions du Centre et du Nord avec respectivement 76 % et 64 %. Par contre, il est plus faible dans la région sud (46 %). En ce qui concerne l'utilisation des MII par les ménages, on constate que c'est dans les régions Centre (68%), et Nord (57 %) que l'on note les taux les plus élevés. Par contre, l'Ouest (40 %), enregistre le taux d'utilisation le plus faible.
- C'est dans le quintile de bien-être le plus élevé que l'utilisation de MII est la plus faible (35 %).

12.3 UTILISATION DES MII PAR LES ENFANTS ET LES FEMMES ENCEINTES

Dans les zones de paludisme stable, les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans constituent des cibles particulièrement vulnérables, d'où la nécessité de développer des stratégies particulières pour leur protection. Cependant, depuis l'adoption de la couverture universelle, il est recommandé de rendre disponibles et accessibles à toute la population les services de lutte antipaludiques.

Au Sénégal, les femmes enceintes bénéficient d'une moustiquaire gratuite lors de leurs consultations prénatales (CPN) dans les structures sanitaires publiques. Au cours de ces CPN, une communication

interpersonnelle sur les dangers du paludisme et l'utilisation de la moustiquaire est assurée par les prestataires de soins de santé.

Dans l'ensemble, 56 % des enfants de moins de cinq ans ont dormi sous une MII la nuit précédant l'interview. Dans les ménages qui possèdent au moins une MII, ce pourcentage est de 68 % (**Tableau 12.7**).

Le **Tableau 12.8** qui présente le taux d'utilisation des moustiquaires par les femmes enceintes montre que 56 % ont dormi sous une MII la nuit précédant l'interview. Dans les ménages avec au moins une MII, ce pourcentage est un peu plus élevé (68 %).

Tendances : Entre 2012-2013 et 2018, les pourcentages d'utilisation des MII par les enfants de moins de cinq ans et par les femmes enceintes ont augmenté passant, pour les enfants de 46 % à 56 % et, pour les femmes enceintes, de 43 % à 56 %. C'est en 2016, que les pourcentages d'utilisation sont les plus élevés (respectivement 67 % et 69 %). Ces niveaux d'utilisation et d'accès plus élevés qu'en 2017 pourraient s'expliquer par la campagne de distribution de moustiquaires qui a eu lieu en 2016.

Variations par caractéristique

- Comme pour la population générale, l'utilisation des MII par les enfants et les femmes enceintes est plus élevée en milieu rural (respectivement 62 % et 61%) qu'en milieu urbain (respectivement 47 % et 48 %).
- L'utilisation des MII par les enfants et les femmes enceintes présente des disparités selon la région. En effet, c'est dans la région Centre que les proportions d'enfants et de femmes enceintes qui ont dormi sous une MII la nuit précédant l'interview sont les plus élevées (respectivement 71 % et 75 %). À l'opposé, la région Sud est celle qui enregistre les proportions les plus faibles (42 % pour les enfants et 40 % pour les femmes enceintes).

12.4 PALUDISME PENDANT LA GROSSESSE

Traitement Préventif Intermittent (TPIg) pendant la grossesse

Pourcentage de femmes qui ont pris, au moins, trois doses de SP/Fansidar au cours de leur dernière grossesse.

Échantillon : Femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des deux années ayant précédé l'enquête.

L'infection palustre durant la grossesse est un problème majeur de santé publique au Sénégal comportant des risques importants pour la mère, le fœtus et le nouveau-né. Le traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse (TPIg) est un protocole thérapeutique complet d'antipaludiques administrés aux femmes enceintes au cours de visites prénatales de routine pour prévenir le paludisme. Le TPIg permet de prévenir les épisodes de paludisme chez la mère, l'anémie maternelle et fœtale, la parasitémie placentaire, le faible poids à la naissance et la mortalité néonatale.

L'Organisation Mondiale de la santé (OMS) recommande une approche à trois volets pour réduire les conséquences négatives sur la santé associées au paludisme pendant la grossesse (PPG) : diagnostic et traitement rapide de l'infection confirmée, utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide et TPIg (OMS 2004).

La Sulfadoxine-pyriméthamine (SP), appelée aussi Fansidar, est le médicament recommandé pour le TPIg au Sénégal. Depuis plus de dix ans, le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a mis en place le TPIg, consistant en l'administration d'au moins deux doses de sulfadoxine-pyriméthamine (SP)/Fansidar durant les visites prénatales de routine au second et troisième trimestre de grossesse (TPIg2+) pour protéger la mère et l'enfant du paludisme. En 2013, le programme national de contrôle du paludisme a adopté la recommandation de l'OMS 2012 (effective en 2015) consistant à administrer une dose de SP/Fansidar lors de chaque visite prénatale après le premier trimestre, en respectant un intervalle d'au moins un mois entre

les doses (OMS 2012a ; OMS 2012b). L'indicateur de l'enquête utilisé pour mesurer la couverture de cette intervention est le pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des deux années ayant précédé l'enquête qui ont reçu trois doses ou plus de SP/Fansidar pour prévenir le paludisme au cours de leur grossesse la plus récente (TPIg3+).

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des deux années ayant précédé l'enquête, 64 % ont déclaré avoir reçu deux doses ou plus de SP/Fansidar et seulement 22 % ont déclaré en avoir reçu trois doses ou plus (**Tableau 12.9**).


Tendances : Depuis l'effectivité de la mise en œuvre de la recommandation de l'OMS (OMS, 2012) en 2015, le pourcentage de femmes qui ont suivi un TPIg3+, à savoir la prise de trois doses ou plus de SP/Fansidar dont au moins une a été reçue lors d'une visite prénatale a doublé passant de 11 % en 2015 à 22 % en 2018 (**Graphique 12.3**).

Variations par caractéristiques

- Le pourcentage de femmes ayant pris trois doses ou plus de SP/Fansidar et qui en ont reçu au moins une au cours d'une visite prénatale, varie légèrement selon le milieu de résidence (24 % en milieu urbain contre 22 % en milieu rural).
- La couverture du TPIg3+ présente des disparités entre les régions. La région Sud (27 %), qui a développé des initiatives communautaires de soutien au TPIg et la région Nord (28%) ont les couvertures les plus élevées. Avec 19 %, la région Centre enregistre une couverture du TPIg3+ plus faible.

Graphique 12.3 Utilisation du TPIg par les femmes enceintes : tendances

Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années précédant l'enquête qui ont reçu au moins 1, 2, ou 3 doses de SP/Fansidar



12.5 PRISE EN CHARGE DU PALUDISME CHEZ LES ENFANTS

Recherche de soins pour les enfants de moins de cinq ans avec de la fièvre

Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans ayant eu de la fièvre dans les deux semaines ayant précédé l'interview pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement auprès d'un prestataire de santé, d'un établissement de santé ou d'une pharmacie.

Échantillon : Enfants de moins de cinq ans ayant eu de la fièvre dans les deux semaines avant l'interview.

Diagnostic du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans avec de la fièvre

Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans ayant eu de la fièvre au cours des deux semaines ayant précédé l'interview à qui on a prélevé du sang au doigt ou au talon pour être testé. C'est une mesure indirecte du test de diagnostic du paludisme.

Échantillon : Enfants de moins de cinq ans ayant eu de la fièvre au cours des deux semaines ayant précédé l'interview.

Combinaison thérapeutique à base d'Artémisinine (CTA) pour les enfants de moins de cinq ans avec de la fièvre

Parmi les enfants de moins de cinq ans ayant eu de la fièvre au cours des deux semaines ayant précédé l'interview qui ont pris des antipaludiques, pourcentage ayant pris une combinaison thérapeutique à base d'Artémisinine (CTA).

Échantillon : Enfants de moins de cinq ans ayant eu de la fièvre au cours des deux semaines ayant précédé l'interview.

Selon les directives nationales de Prise En Charge (PEC) du paludisme, tous les enfants fébriles doivent bénéficier dans les 24h d'un TDR pour le paludisme et en cas de paludisme confirmé recevoir une CTA pour les cas simples. La prise en charge du paludisme simple est gratuite (TDR et CTA) au Sénégal et, par le biais de la couverture médicale universelle, les enfants de moins de cinq ans bénéficient de la gratuité des soins (consultations, examen complémentaire et médicaments).

Au cours de l'année 2018, pour 53 % des enfants qui ont eu de la fièvre dans les quinze derniers jours, une recherche de traitement a été effectuée et, dans la majorité des cas, la démarche a été effectuée rapidement (32 % des cas). Parmi les enfants fébriles 14 % ont eu un prélèvement au doigt ou au talon (**Tableau 12.10**).

Au cours de l'enquête, les agents de collecte ont, non seulement, demandé aux mères dont l'enfant avait eu de la fièvre au cours des deux semaines avant l'interview si un traitement ou des conseils avaient été recherchés mais aussi l'endroit où l'on s'était adressé. C'est principalement dans le secteur public que les enquêtés ont recherché des conseils ou un traitement contre la fièvre. En effet, pour 77 % des enfants ayant eu de la fièvre et pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés, on s'est adressé au secteur public, en majorité dans un poste de santé du gouvernement (58 %) (**Tableau 12.11**). Dans seulement 20, % des cas, les enquêtés se sont orientés vers le secteur privé pour obtenir des conseils ou un traitement, en majorité dans une pharmacie (16 %).

Pour la période des deux semaines ayant précédé l'enquête, les données de l'EDS C de 2018 donnent des effectifs très faibles pour les enfants ayant eu de la fièvre et ayant pris des antipaludiques (**Tableau 12.11**). C'est la raison pour laquelle dans ce rapport ce tableau ne sera pas présenté.

Tendances : Entre 2012-2013 et 2018, le pourcentage d'enfants fébriles pour lesquels un traitement ou des soins ont été recherchés est resté pratiquement stable, passant de 52 % à 53 %. Par contre, le pourcentage d'enfants ayant eu de la fièvre et à qui on a prélevé du sang pour être testé a doublé, est passé de 8 % à 14 %. Cependant, malgré ce bon résultat, l'objectif fixé par les directives nationales n'est pas atteint puisque, selon ces directives, tous les enfants présentant de la fièvre doivent être testés.

Variations par caractéristique

- Le recours aux soins est nettement plus élevé dans la région Ouest (72 %), en particulier par rapport à la région Nord qui enregistre le pourcentage le plus faible d'enfants pour lesquels on a recherché des soins pour traiter la fièvre (39 %).
- Le recours aux soins augmente avec le quintile de bien-être économique (38 % dans les ménages du quintile le plus bas à 61 % dans ceux du quintile le plus élevé).
- La région du Nord (5 %) enregistre le pourcentage le plus faible d'enfants à qui on a prélevé du sang pour être testé alors qu'il est de 20 % dans la région Sud.

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur le paludisme, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 12.1 Possession de moustiquaires par les ménages**
- **Tableau 12.2 Source d'obtention des moustiquaires**
- **Tableau 12.3 Accès à une Moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)**
- **Tableau 12.4 Accès à une MII**
- **Tableau 12.5 Utilisation des moustiquaires par la population des ménages**
- **Tableau 12.6 Utilisation des MII existantes**
- **Tableau 12.7 Utilisation des moustiquaires par les enfants**
- **Tableau 12.8 Utilisation des moustiquaires par les femmes enceintes**
- **Tableau 12.9 Utilisation du traitement préventif intermittent (TPIg) par les femmes pendant la grossesse**
- **Tableau 12.10 Prévalence, diagnostic et traitement précoce des enfants avec de la fièvre**
- **Tableau 12.11 Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant de la fièvre**

Tableau 12.1 Possession de moustiquaires par les ménages

Pourcentage de ménages qui possèdent, au moins, une moustiquaire (traitée ou non traitée) et une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) ; nombre moyen de moustiquaires et de MII par ménage ; et pourcentage de ménages qui possèdent, au moins, une moustiquaire et une MII pour deux personnes qui ont passé la nuit avant l'interview dans le ménage, selon certaines caractéristiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de ménages ayant, au moins, une moustiquaire		Nombre moyen de moustiquaires par ménage		Effectif de ménages	Pourcentage de ménages ayant, au moins, une moustiquaire pour deux personnes qui ont passé la nuit avant l'interview dans le ménage		Effectif de ménages avec au moins une personne qui a passé la nuit dernière dans le ménage
	N'importe quel type de mousti- quaire	Mousti- quaire pré imprégnée d'insecticide (MII) ¹	N'importe quel type de mousti- quaire	Mousti- quaire pré imprégnée d'insecticide (MII) ¹		N'importe quel type de mousti- quaire	Mousti- quaire pré imprégnée d'insecticide (MII) ¹	
Résidence								
Urbain	75,0	69,5	2,8	2,5	2 318	40,6	34,9	2 318
Rural	91,6	83,8	4,6	4,0	2 274	52,2	43,3	2 273
Région								
Nord	90,1	84,4	4,0	3,4	740	48,5	40,3	739
Ouest	73,2	69,9	2,7	2,5	1 920	38,4	35,3	1 920
Centre	92,9	91,1	5,1	4,9	1 178	54,3	50,5	1 178
Sud	86,8	63,0	3,8	2,3	754	51,9	29,3	754
Quintiles de bien-être économique								
Le plus bas	89,1	77,6	3,8	3,0	858	42,9	31,1	857
Second	92,8	85,0	4,5	3,9	843	57,6	47,5	843
Moyen	89,0	81,5	4,6	4,0	820	52,3	44,8	820
Quatrième	78,0	73,9	3,3	3,0	1 004	45,1	40,3	1 004
Le plus élevé	71,3	67,6	2,7	2,5	1 068	36,7	33,0	1 068
Total	83,2	76,6	3,7	3,2	4 592	46,3	39,0	4 591

¹ Une Moustiquaire imprégnée d'Insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Dans le 2017, c'était connu sous le nom de Moustiquaire imprégné à Longue Durée d'Action (MILDA).

Tableau 12.2. Source d'obtention des moustiquaires

Répartition (en %) des moustiquaires par source d'obtention, selon certaines caractéristiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Campagne de distribution massive	Établissement de santé du gouvernement					Agent de santé communautaire		Point Distribution Campagne	Parent/ Voisin/Ami	OCB/ Asso-ciation	Autre	Ne sait pas/ manquant	Total	Effectif de moustiquaires
		Visite prénatale	Visite de vaccination	Établissement privé	Pharmacie	Boutique/ marché	Institution religieuse	École							
Type of net															
MII ¹	75,6	3,2	0,1	9,6	0,7	3,1	3,2	0,1	3,5	0,0	0,3	0,2	100,0	14 897	
Autre ²	80,9	1,5	0,0	8,1	0,5	1,5	3,5	0,2	3,3	0,1	0,1	0,1	100,0	2 180	
Résidence															
Urbain	72,1	2,8	0,1	9,6	0,5	5,6	3,3	0,1	4,6	0,1	0,4	0,3	100,0	6 532	
Rural	78,8	3,1	0,1	9,4	0,7	1,2	3,2	0,1	2,8	0,0	0,2	0,2	100,0	10 544	
Région															
Nord	85,3	1,6	0,2	3,1	0,2	2,3	5,1	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	100,0	2 930	
Ouest	66,5	2,7	0,1	15,6	0,1	5,5	2,1	0,0	5,4	0,1	0,6	0,6	100,0	5 257	
Centre	77,0	4,4	0,1	7,5	1,3	1,6	4,0	0,0	3,6	0,0	0,2	0,1	100,0	6 058	
Sud	83,2	1,9	0,2	8,8	0,7	1,2	1,8	0,0	1,6	0,0	0,2	0,1	100,0	2 832	
Quintiles de bien-être économique															
Le plus bas	81,7	3,4	0,1	8,3	0,6	0,5	2,9	0,1	2,3	0,0	0,0	0,1	100,0	3 271	
Second	77,9	3,0	0,2	10,0	0,7	1,4	3,1	0,1	3,3	0,0	0,2	0,1	100,0	3 832	
Moyen	76,0	2,6	0,2	11,3	0,7	1,4	4,4	0,1	2,6	0,0	0,3	0,1	100,0	3 767	
Quatrième	75,5	3,3	0,0	9,0	0,4	4,1	2,9	0,1	3,5	0,0	0,3	0,1	100,0	3 316	
Le plus élevé	69,1	2,6	0,1	8,1	0,8	8,2	2,8	0,0	6,3	0,2	0,8	0,8	100,0	2 891	
Total	76,2	3,0	0,1	9,4	0,6	2,9	3,3	0,1	3,5	0,0	0,3	0,2	100,0	17 077	

¹ Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire qui a action imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire ² Tout réseau qui n'est pas un ITN.

² N'importe quelle moustiquaire qui n'est pas une MII.

Tableau 12.3 Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)

Répartition (en %) de la population de fait des ménages par nombre de MII que possède le ménage, et pourcentage ayant accès à une MII selon le nombre de personnes qui ont passé la nuit avant l'interview dans le ménage, Sénégal 2018

Nombre de MII ¹	Nombre de personnes qui ont passé la nuit dans le ménage avant l'interview								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8+	
Nombre d'ITNs¹									
0	43,8	53,3	39,3	32,8	31,5	16,7	19,6	15,9	18,7
1	44,9	23,8	17,4	13,7	9,9	10,9	9,2	6,3	7,8
2	9,4	14,5	24,0	24,1	18,1	20,2	13,6	6,4	9,5
3	1,5	6,1	8,5	20,7	21,8	22,1	22,7	8,9	11,7
4	0,3	0,9	8,3	7,7	11,7	17,3	16,3	10,2	10,9
5	0,0	1,0	1,6	0,7	3,8	5,6	9,9	9,9	8,7
6	0,0	0,0	0,5	0,1	2,1	4,5	3,1	8,1	6,7
7	0,2	0,3	0,0	0,3	0,5	1,7	2,5	8,3	6,5
8+	0,0	0,0	0,3	0,0	0,6	0,9	3,1	25,9	19,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	223	405	830	1 305	2 327	2 652	2 800	29 991	40 533
Pourcentage ayant accès à une MII ¹	56,2	46,7	54,9	60,4	58,9	69,3	64,7	62,1	62,2

¹ Pourcentage de la population de fait des ménage qui aurait pu dormir sous une MII si chaque MII du ménage était utilisé par deux personnes au maximum.

Tableau 12.4 Accès à une MII

Pourcentage de la population de fait des ménages qui ont accès à une MII dans le ménage, selon certaines caractéristiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant accès à une MII ¹
Résidence	
Urbain	55,4
Rural	67,5
Région	
Nord	63,9
Ouest	56,9
Centre	75,7
Sud	46,4
Quintiles de bien-être économique	
Le plus bas	57,8
Second	68,5
Moyen	68,7
Quatrième	61,9
Le plus élevé	54,2
Total	62,2

¹ Pourcentage de la population de fait des ménage qui aurait pu dormir sous une MII si chaque MII du ménage a été utilisé par deux personnes au maximum.

Tableau 12.5 Utilisation des moustiquaires par les ménages

Pourcentage de la population de fait des ménages qui, la nuit avant l'interview, a dormi sous une moustiquaire (traitée ou non) et sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) ; et parmi la population de fait des ménages avec, au moins, une MII, pourcentage qui a dormi sous une MII la nuit avant l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Population des ménages			Population des ménages avec au moins une MII ¹	
	Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire quelconque la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit dernière	Effectif	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit dernière	Effectif
Age					
<5	64,8	56,4	6 274	67,9	5 214
5-14	58,6	50,9	11 407	61,7	9 415
15-34	55,8	48,7	12 435	60,4	10 016
35-49	59,5	52,9	4 963	66,0	3 975
50+	61,2	53,2	5 449	66,8	4 339
DK/Manquant	*	*	5	*	5
Sexe					
Masculin	57,4	50,0	18 658	61,5	15 177
Féminin	60,6	53,0	21 875	65,2	17 788
Résidence					
Urbain	46,5	40,9	17 602	53,9	13 361
Rural	68,8	59,9	22 931	70,0	19 603
Région					
Nord	65,4	57,3	6 921	67,1	5 917
Ouest	42,3	39,8	14 494	51,7	11 152
Centre	71,5	68,2	12 594	73,9	11 611
Sud	65,9	40,0	6 523	60,9	4 284
Quintiles de bien-être économique					
Le plus bas	63,8	50,8	8 011	63,2	6 440
Second	72,8	62,7	8 123	73,5	6 933
Moyen	68,2	60,0	8 086	69,9	6 943
Quatrième	53,6	49,8	8 098	60,5	6 658
Le plus élevé	37,6	35,1	8 214	48,1	5 991
Total	59,1	51,6	40 533	63,5	32 964

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégné industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Dans le 2017, c'était connu sous le nom de Moustiquaire imprégné à Longue Durée d'Action (MILDA).

Tableau 12.6 Utilisation des MII existantes

Pourcentage de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) qui ont été utilisées par une personne la nuit ayant précédé l'interview, selon certaines caractéristiques, Sénégal 2018

Caractéristique	Pourcentage de MII existantes ¹ utilisées la nuit dernière	Effectif de MII ¹
Résidence		
Urbain	67,3	5 717
Rural	79,1	9 180
Région		
Nord	83,6	2 520
Ouest	63,0	4 872
Centre	78,8	5 770
Sud	79,6	1 734
Quintiles de bien-être économique		
Le plus bas	79,4	2 613
Second	81,5	3 297
Moyen	78,9	3 303
Quatrième	71,5	3 013
Le plus élevé	59,4	2 671
Total	74,5	14 897

¹ Une Moustiquaire imprégnée d'Insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Dans le 2017, c'était connu sous le nom de Moustiquaire imprégné à Longue Durée d'Action (MILDA).

Tableau 12.7 Utilisation des moustiquaires par les enfants

Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans qui, la nuit avant l'interview, ont dormi sous une moustiquaire (traitée ou non) et sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MI) ; et parmi les enfants de moins de cinq ans des ménages avec, au moins, une MI, pourcentage qui ont dormi sous une MI la nuit avant l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Pays Enquête 2018

Caractéristique sociodémographique	Enfants de moins de 5 ans dans tous les ménages				Enfants de moins de 5 ans dans les ménages ayant au moins une MI ¹	
	Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire quelconque la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MI ¹ la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MI ¹ la nuit dernière où dans un logement ayant eu une PID2 dans les 12 derniers mois	Effectif d'enfants	Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire MI ¹ la nuit dernière	Effectif d'enfants
Age en mois						
<12	68,9	59,3	59,6	1 259	71,8	1 040
12-23	65,6	57,8	58,0	1 292	66,6	1 120
24-35	65,4	56,4	56,8	1 180	68,5	971
36-47	63,9	56,0	56,2	1 221	68,0	1 005
48-59	60,4	52,7	53,0	1 323	64,7	1 079
Sexe						
Masculin	64,7	55,9	56,2	3 150	67,4	2 612
Féminin	64,9	56,9	57,1	3 124	68,3	2 601
Résidence						
Urbain	53,5	47,2	47,2	2 343	60,3	1 833
Rural	71,5	61,9	62,3	3 931	71,9	3 381
Région						
Nord	67,1	58,8	58,8	1 042	69,8	877
Ouest	49,8	46,4	46,7	1 922	57,6	1 548
Centre	74,7	70,5	70,6	2 245	76,0	2 085
Sud	68,7	42,2	43,3	1 065	63,9	704
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	66,8	52,8	53,2	1 500	65,3	1 212
Second	76,7	67,3	67,8	1 390	77,6	1 205
Moyen	71,2	62,8	63,3	1 250	72,4	1 086
Quatrième	60,0	55,7	55,7	1 060	65,9	896
Le plus élevé	43,8	40,4	40,4	1 073	53,2	816
Total	64,8	56,4	56,7	6 274	67,9	5 214

¹ Une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MI) est une moustiquaire qui a été imprégné industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Dans le 2017, c'était connu sous le nom de Moustiquaire imprégné à Longue Durée d'Action (MILDA).

Tableau 12.8 Utilisation des moustiquaires par les femmes enceintes

Pourcentage de femmes de 15-49 ans enceintes qui, la nuit avant l'interview, ont dormi sous une moustiquaire (traitée ou non) et sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) ; et parmi les femmes de 15-49 ans enceintes des ménages avec, au moins, une MII, pourcentage qui ont dormi sous une MII la nuit avant l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Parmi les femmes de 15-49 ans enceintes dans tous les ménages				Parmi les femmes de 15-49 ans enceintes dans les ménages ayant au moins une MII ¹	
	Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire quelconque la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit dernière où dans un logement ayant eu une PID2 dans les 12 derniers mois	Effectif de femmes enceintes	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit dernière	Effectif de femmes enceintes
Résidence						
Urbain	53,3	47,6	47,7	296	60,6	233
Rural	71,1	61,0	61,5	455	72,1	385
Région						
Nord	63,7	54,3	54,3	124	64,6	104
Ouest	49,7	45,7	45,8	251	56,0	205
Centre	78,7	74,8	74,8	248	81,4	228
Sud	64,4	39,9	41,6	128	63,3	81
Niveau d'instruction						
Pas d'instruction	61,2	54,0	54,4	418	65,8	343
Primaire	68,2	59,2	59,4	161	73,2	130
Moyen/Secondaire ou plus	67,4	56,5	57,0	172	67,4	144
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	66,9	57,7	58,7	164	71,2	133
Second	71,3	60,6	61,0	148	72,8	124
Moyen	75,9	63,1	63,3	151	71,4	134
Quatrième	56,6	50,3	50,3	175	63,6	138
Le plus élevé	46,1	44,8	44,8	112	56,5	89
Total	64,1	55,7	56,1	751	67,8	618

¹ Une Moustiquaire imprégnée d'Insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégné industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Dans le 2017, c'était connu sous le nom de Moustiquaire imprégné à Longue Durée d'Action (MILDA).

Tableau 12.9 Utilisation du traitement préventif intermittent (TPIg) par les femmes pendant la grossesse

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des deux années ayant précédé l'enquête qui, pendant la grossesse de la dernière naissance vivante, ont reçu une dose ou plus de SP/Fansidar, ont reçu deux doses ou plus de SP/Fansidar, et qui ont reçu trois doses ou plus de SP/Fansidar, selon certaines caractéristiques, Sénégal 2018

Caractéristique	Pourcentage ayant reçu 1e dose ou plus de la SP/Fansidar	Pourcentage ayant pris 2 doses ou plus de SP/Fansidar	Pourcentage ayant pris 3 doses ou plus de SP/Fansidar	Effectif de femmes ayant eu une naissance au cours des deux dernières années
Résidence				
Urbain	94,4	70,7	23,9	912
Rural	92,3	60,7	21,5	1 523
Région				
Nord	92,5	69,5	27,6	406
Ouest	94,3	68,7	21,3	750
Centre	94,4	58,2	18,7	885
Sud	88,7	65,0	27,3	395
Niveau d'instruction				
Pas d'instruction	92,4	62,6	20,7	1 459
Primaire	94,9	66,2	26,4	476
Moyen/Secondaire ou plus	93,3	68,1	23,5	500
Quintiles de bien-être économique				
Le plus bas	86,1	56,2	18,5	549
Second	94,5	62,3	20,8	565
Moyen	96,3	64,7	26,6	495
Quatrième	93,3	69,0	26,2	409
Le plus élevé	96,5	73,2	20,9	416
Total	93,1	64,4	22,4	2 435

Tableau 12.10 Prévalence, diagnostic et traitement précoce des enfants avec de la fièvre

Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans qui ont eu de la fièvre au cours des deux semaines ayant précédé l'interview ; parmi les enfants de moins de cinq ans ayant eu la fièvre, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés le jour même ou le jour suivant le début de la fièvre et pourcentage pour lesquels on a effectué un prélèvement de sang au doigt ou au talon pour être testé, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Enfants de moins de 5 ans		Enfants de moins de 5 ans avec de la fièvre			Effectif d'enfants
	Pourcentage d'enfants avec de la fièvre au cours des deux semaines précédant l'enquête	Effectif d'enfants	Pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement ¹	Pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement le même jour ou le jour après	Pourcentage à qui on a prélevé du sang au doigt ou au talon pour être testé	
Age en mois						
<12	25,3	1 207	54,2	30,0	9,5	305
12-23	26,9	1 227	54,1	32,1	13,0	330
24-35	20,1	1 092	48,7	31,2	14,9	220
36-47	13,5	1 106	48,8	29,4	15,6	149
48-59	11,8	1 189	57,4	40,7	21,0	140
Sexe						
Masculin	20,3	2 937	52,1	35,0	14,0	597
Féminin	19,0	2 883	53,6	28,9	13,5	547
Résidence						
Urbain	19,7	2 210	62,5	39,8	13,5	435
Rural	19,6	3 610	46,9	27,3	13,9	709
Région						
Nord	16,3	952	39,2	12,9	5,3	155
Ouest	18,0	1 828	71,7	43,4	14,0	329
Centre	21,2	2 097	45,3	28,4	13,7	445
Sud	22,9	943	49,3	36,0	19,7	215
Niveau d'instruction de la mère						
Pas d'instruction	18,9	3 622	46,0	26,6	11,4	686
Primaire	20,4	1 184	63,4	41,2	15,9	242
Moyen/Secondaire ou plus	21,3	1 014	62,6	39,1	18,7	216
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	17,7	1 352	37,8	22,5	14,1	239
Second	20,5	1 281	49,7	26,5	14,5	262
Moyen	18,8	1 156	54,6	36,2	9,2	217
Quatrième	18,5	1 011	63,8	45,6	20,2	187
Le plus élevé	23,4	1 020	61,1	33,3	11,6	239
Total	19,7	5 820	52,8	32,1	13,8	1 144

¹ Sont inclus les conseils ou les traitements des sources suivantes : Secteur Public, Secteur Médical Privé, Boutique, Marché et Vendeur ambulant de médicaments. Sont exclus les conseils ou traitements d'un praticien traditionnel.

Tableau 12.11 Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant de la fièvre

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des deux semaines ayant précédé l'interview pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques et parmi les enfants de moins de cinq ans ayant eu de la fièvre au cours des deux semaines ayant précédé l'interview pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques, Sénégal 2018

Source	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de chacune des sources :	
	Parmi les enfants ayant de la fièvre	Parmi les enfants ayant de la fièvre dont un traitement ou conseil a été recherché
Secteur public	40,9	77,2
Hôpital du gouvernement	2,0	3,7
Centre de santé du gouvernement	5,8	11,0
Poste de santé du gouvernement	30,8	58,1
Clinique mobile	0,0	0,1
Agent de santé/agent communautaire	0,7	1,3
Autre secteur public	1,7	3,3
Secteur privé	10,8	20,4
Hôpital/clinique privé	1,7	3,2
Pharmacie	8,4	15,9
Médecin privé	0,6	1,2
Autre secteur médical privé	0,1	0,2
Autre secteur privé	0,7	1,3
Boutique	0,2	0,4
Praticien traditionnel	0,1	0,2
Marché	0,3	0,6
Autre	1,0	2,0
Effectif d'enfants	1 144	606

ASC = agent de santé communautaire

Résultats clés

- **Enregistrement des naissances** : La proportion d'enfants de moins de cinq ans dont la naissance a été enregistrée à l'état civil est de 77 % ; 69 % des enfants ont un acte de naissance et 8 % n'en disposent pas.
- **Éducation de la petite enfance** : Un peu plus d'enfant de 36-59 mois sur quatre (26 %) fréquente un programme d'éducation préscolaire.
- **Encadrement inapproprié des enfants** : Au cours de la semaine ayant précédé l'interview, 22 % des enfants de moins de cinq ans ont été laissés sans soins appropriés pendant au moins une heure.
- **Développement du jeune enfant** : Près de deux enfants de 36-59 mois sur trois (64 %) sont en bonne voie de développement.

Au cours de l'EDS Continue 2018, des informations permettant de calculer les indicateurs sur la protection et le développement de l'enfant ont été collectées. Elles concernent l'enregistrement des naissances à l'état civil, l'état de survie des parents biologiques et le développement du jeune enfant.

13.1 ENREGISTREMENT DES NAISSANCES A L'ÉTAT CIVIL

Enregistrement des naissances à l'état civil

Enfants de moins de cinq ans dont la naissance est enregistrée à l'état civil.


Échantillon : Enfants de moins de cinq ans (population de droit)

La déclaration et l'enregistrement des naissances ainsi que l'inscription officielle dans les registres d'état civil constituent la première reconnaissance officielle de l'existence d'un enfant. Un acte de naissance est un document officiel qui peut faciliter l'accès à des services essentiels comme ceux de la santé et de l'éducation. Il s'agit donc d'une démarche qui vise à protéger l'enfant. Au cours de l'enquête, les enquêteurs ont demandé aux personnes interviewées si la naissance des enfants les plus jeunes (moins de cinq ans) avait été déclarée à l'état civil.

Au Sénégal, plus de sept enfants de moins de 5 ans sur dix (77 %) sont enregistrés à l'état civil. Les enfants enregistrés et possédant un acte d'état civil sont de 69 % alors que ceux enregistrés et ne disposant pas d'acte de naissance représentent 8 % des enfants de moins de 5 ans (**Tableau 13.1**).

Tendances : Entre 2010 et 2015, le pourcentage de naissances enregistrées a légèrement diminué, passant de 75 % à 68 %. Par contre, depuis 2015, la tendance s'est inversée et ce pourcentage est passé de 68 % à 77 %. Dans la même période, le pourcentage d'enfants ayant un acte de naissance a aussi augmenté, de 52 % à 68 % et celui des enfants sans acte de naissance a diminué de moitié (de 16 % à 8 %) (Graphique 13.1).


Graphique 13.1 Enregistrement des naissances d'enfants de moins de 5 ans auprès des autorités civiles : tendances



Variations par caractéristique

- Le pourcentage d'enfants dont la naissance est enregistrée à l'état civil est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural (91 % contre 68 %).
- L'enregistrement des naissances à l'état civil des enfants de moins de cinq ans est plus faible dans les régions du Centre (67 %) et du Nord (68 %) où le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans enregistrés à l'état civil est en deçà de celui constaté au niveau national (77 %). Il est plus important dans les régions de l'Ouest et du Sud où respectivement 93 % et 78 % des enfants âgés de moins de 5 ans sont enregistrés à l'état civil.

Graphique 13.2 Enregistrement des naissances d'enfants de moins de 5 ans auprès des autorités civiles par quintile de bien-être économique du ménage



- Du quintile le plus bas au plus élevé, le pourcentage d'enfants dont la naissance est enregistrée augmente, passe de 58 % à 94 % (Graphique 13.2).

13.2 ENFANTS ORPHELINS ET RÉSIDENCE AVEC LES PARENTS

Enfants orphelins d'un ou des deux parents

Comprend les enfants dont le père est décédé, ceux dont la mère est décédée, ceux dont les deux parents sont décédés et ceux dont un seul parent est décédé et dont l'information sur l'état de survie de l'autre est manquante.

Échantillon : Enfants de moins de cinq ans (population de droit)

La famille constitue le principal soutien des enfants et ceux qui vivent sans leurs parents biologiques courent souvent des risques de ne pas recevoir les soins nécessaires à un bon développement. Toute stratégie visant à protéger les enfants doit, en priorité, permettre d'identifier les enfants qui sont orphelins et ceux qui ne vivent pas avec leurs parents biologiques.

L'EDS Continue 2018 a collecté une série d'informations sur l'état de survie des parents et la résidence des enfants de 0-17 ans. Elles ont permis d'obtenir les pourcentages d'enfants orphelins des deux parents et de ceux qui vivent avec un seul parent biologique, que l'autre parent soit en vie ou décédé.

Globalement, 53 % des enfants de moins de 18 ans et 54 % des enfants de moins de 15 ans vivent avec leurs deux parents biologiques (**Tableau 13.2**). Toutefois, il ressort que 14 % des enfants de moins de 18 ans ne vivent avec aucun de leur parent biologique, bien que pour 11 % ces enfants les deux parents soient en vie.

Tendances : Entre 2010-2011 et 2018, on ne note pas de changement important, le pourcentage d'enfants de moins de 18 ans vivant avec leurs deux parents se situant entre 51 % et 55 %.

Variations par caractéristiques

- Le pourcentage d'enfants ne vivant avec aucun parent biologique est plus élevé chez les filles que chez les garçons (16 % contre 11 %).
- Les résultats selon la région laissent entrevoir des écarts. Le pourcentage d'enfants de moins de 18 ans ne vivant avec aucun parent biologique est de 17 % dans la région du Sud alors qu'au Nord, il est de 12 % soit un écart de 4 points de pourcentage.
- Le pourcentage d'enfants qui ne vivent avec aucun parent biologique est légèrement plus faible dans les ménages classés dans le quintile le plus bas que dans les autres ménages (11 % par rapport à 14 %) (**Tableau 13.2**).

13.3 DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT

Au cours de l'EDS Continue 2018, des questions du Module de l'UNICEF ont été posées concernant le développement du plus jeune enfant dans les ménages qui comprenaient au moins, un enfant de 0-4 ans avec sa mère. Ces questions concernaient la fréquentation d'une classe d'éveil, le soutien à l'apprentissage ainsi que le matériel d'apprentissage.

En fonction des indicateurs recherchés, les questions ont été posées pour des enfants de groupes d'âges différents. Certaines questions ont été posées à propos des enfants de 36-59 mois alors que celles concernant le matériel d'apprentissage et l'encadrement inapproprié des enfants s'adressaient aux enfants de moins de cinq ans.

13.3.1 Éducation de la petite enfance

Au Sénégal, un peu plus d'un enfant de 36-59 mois sur quatre (26 %) fréquente un programme d'éducation préscolaire (**Tableau 13.3**). Dans la majorité des cas, les enfants suivent en enseignement préscolaire dans un établissement coranique (Daara, Coran Arabe) (14 %) et 10 % fréquentent un jardin d'enfants. Les pourcentages d'enfants fréquentant un autre type d'établissement préscolaire sont très faibles.


Variations par caractéristique

- La fréquentation d'un programme d'éducation préscolaire est plus courante en milieu urbain qu'en milieu rural (43 % contre 15 %).
- Le pourcentage d'enfants de 36-59 mois ayant fréquenté un programme d'apprentissage est de 44 % dans la région de l'Ouest. Dans les régions du Sud et du Nord, les pourcentages enregistrés sont de 16 % et de 18 % pour la zone Centre (**Tableau 13.3**).

- La fréquentation d'un programme d'éducation préscolaire augmente avec le niveau d'instruction de la mère, passant de 16 % pour les enfants dont la mère n'a aucun niveau d'instruction à 61 % parmi ceux dont la mère a un niveau moyen/secondaire ou plus (**Graphique 13.3**).
- La fréquentation d'un programme d'éducation préscolaire varie avec le niveau de bien-être économique du ménage. Seulement 6 % des enfants de 36-59 mois, dont le ménage est classé dans le quintile le plus bas suivent un programme d'apprentissage préscolaire contre 51 % parmi ceux dont le ménage est classé dans le quintile le plus élevé.

Graphique 13.3 Enfants qui fréquentent un programme d'éducation préscolaire par niveau d'instruction de la mère

Pourcentage d'enfants de 36-59 mois



13.3.2 Soutien à l'apprentissage

Soutien à l'apprentissage

Pourcentage d'enfants qui ont participé, au cours des trois derniers jours, avec un membre adulte du ménage (âgé de 15 ans ou plus) à au moins quatre activités parmi les suivantes favoriser l'apprentissage et la préparation à l'école :

- Lire des livres ou regarder des livres illustrés ;
- Raconter des histoires à l'enfant ;
- Chanter des chansons à l'enfant ou avec l'enfant (y compris des berceuses) ;
- Emmener l'enfant en promenade en dehors de la maison, de la cour ou de l'enceinte ;
- Jouer avec l'enfant ;
- Nommer, compter et/ou dessiner des choses pour ou avec l'enfant.

Échantillon : Enfants de 3-4 ans (36-59 mois)

Au Sénégal, le pourcentage d'enfants de 36-59 mois ayant bénéficié du soutien d'un membre adulte, au moins dans quatre activités d'apprentissage est de 25 %. En revanche, seuls 14 % des enfants ont suivi au moins une activité avec leur père. Le nombre moyen d'activités avec un membre adulte quelconque du ménage est de 2,2. Quand cet adulte est le père biologique, le nombre moyen n'est que de 0,2 (**Tableau 13.4**).


Variations par caractéristique

- Le pourcentage d'enfant ayant participé à au moins quatre activités avec un membre adulte du ménage est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural (37 % contre 18 %).
- La participation d'un membre adulte du ménage dans des activités d'apprentissage avec l'enfant est plus fréquente dans les régions de l'Ouest (38 %) et du Sud (34 %) Elle est beaucoup moins fréquente dans la région Nord (8 %).

- Les enfants dont la mère a un niveau secondaire ou plus ont davantage participé à des activités d'apprentissage avec un membre adulte du ménage (51 %) que les enfants dont la mère n'a aucun niveau d'instruction (17 %).

Graphique 13.4 Soutien à l'apprentissage par quintile de bien-être économique

Pourcentage d'enfants de 3-4 ans ayant participé au cours des trois derniers jours à des activités d'apprentissage avec un membre adulte du ménage



- La participation d'un adulte du ménage dans des activités d'apprentissage avec l'enfant augmente avec le bien-être du ménage. Dans les ménages du quintile le plus élevé, 50 % des enfants de 36-59 mois ont eu le soutien d'un membre adulte du ménage dans au moins quatre activités. Ce pourcentage est de 16 % pour les enfants résidents dans des ménages du quintile le plus bas et 15 % pour ceux dont les ménages sont du second quintile (**Graphique 13.4**).

13.3.3 Matériel d'apprentissage

Matériel d'apprentissage

Au cours de l'EDS Continue 2018, des questions ont été posées sur la disponibilité de livres d'enfants ou de livres d'images ainsi que sur les objets utilisés par l'enfant pour jouer, que ces jouets soient fabriqués à la maison, qu'ils proviennent d'un magasin ou d'un fabricant ou que les jouets soient des objets du ménage.

Échantillon : Enfants de moins de cinq ans

Le pourcentage d'enfants dont le ménage dispose de trois livres ou plus est faible (1 %). Environ un enfant de moins de cinq ans sur deux (51 %) joue avec des objets du ménage trouvés dehors, 36 % ont des jouets provenant d'un magasin et 10 % jouent avec des jouets fabriqués à la maison. Un peu plus d'un quart des enfants de moins de 5 ans (26 %) disposent de deux types de jouets ou plus (**Tableau 13.5**).


Variations par caractéristique

- Le pourcentage d'enfants de moins de cinq ans qui disposent de deux types de jouets augmente avec l'âge : de 21 % des enfants âgés de 0-23 mois, le pourcentage passe à 32 % dans le groupe d'âges 24-59 mois.
- La disponibilité de deux types de jouet est plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural (31 % contre 23 %).
- Le pourcentage d'enfants de moins de cinq ans qui disposent de deux types de jouets est légèrement plus élevé dans le Centre que dans les autres régions (28 % contre 25-26 %).

- La disponibilité de deux types de jouets augmente avec le niveau d'instruction de la mère, passant de 22 % parmi les enfants dont la mère n'a aucun niveau d'instruction à 35 % parmi ceux dont elle a le niveau moyen/secondaire ou plus.
- Le pourcentage d'enfants moins de cinq ans qui disposent de deux types de jouets augmente avec le quintile de bien-être économique, passant de 13 % dans le plus bas à 33 % dans le plus élevé (**Graphique 13.5**).

Graphique 13.5 Utilisation d'au moins deux types de jouets

Pourcentage d'enfants moins de 5 ans qui ont, au moins, deux types de jouets, par quintile de bien-être



13.4 ENCADREMENT INAPPROPRIÉ DES JEUNES ENFANTS

Encadrement inapproprié des jeunes enfants

Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans laissés seuls ou à la garde d'un enfant de moins de dix ans pendant plus d'une heure une fois au cours de la semaine ayant précédé l'interview.

Échantillon : Enfants de moins de cinq ans

Un enfant livré à lui-même ou confié à un autre enfant est exposé à un risque accru d'accident, de négligence et de mauvais traitement. Au cours de l'EDS Continue 2018, on a demandé à la mère combien de jours l'enfant avait été laissé seul ou à la garde d'un autre enfant de moins de dix ans pendant plus d'une heure au cours de la semaine avant l'enquête.

Au Sénégal, 19 % des enfants de moins de cinq ans ont été laissés seuls pendant plus d'une heure au cours de la semaine précédant l'enquête et 11 % ont été laissés à la garde d'un autre enfant de moins de 10 ans pendant plus d'une heure. Globalement 22 % sont restés sans encadrement approprié pendant plus d'une heure au cours de la semaine qui a précédé l'enquête (**Tableau 13.6**).

Variations par caractéristiques

- Le pourcentage d'enfants laissés sans soins appropriés est plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain (26 % contre 17 %).
- Le pourcentage d'enfants laissés seuls ou à la garde d'un autre enfant (sans soins appropriés) varie de 47 % dans la région Sud à 7 % dans celle de l'Ouest (**Tableau 13.6**).

13.5 INDICE DE DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT

Indice de développement du jeune enfant

L'indice de développement du jeune enfant correspond au pourcentage d'enfants qui sont en bonne voie de développement dans, au moins, deux des quatre domaines suivants :

Alphabétisation et calcul : l'enfant est considéré comme étant en bonne voie de développement dans ce domaine s'il réunit au moins deux des conditions suivantes :

- L'enfant peut citer au moins dix lettres de l'alphabet ;
- L'enfant peut lire au moins quatre mots simples, courants ;
- L'enfant peut citer et reconnaître tous les chiffres de 1 à 10.

Physique : l'enfant est considéré comme étant en bonne voie de développement dans ce domaine s'il réunit au moins une des conditions suivantes :

- L'enfant peut attraper par terre avec deux doigts un petit objet comme un bâton ou un caillou ;
- L'enfant n'est pas parfois trop malade pour jouer.

Social/émotionnel : l'enfant est considéré comme étant en bonne voie de développement dans ce domaine s'il réunit au moins deux des conditions suivantes :

- L'enfant s'entend bien avec les autres enfants ;
- L'enfant ne donne pas de coup de pied, ne mord pas ou ne frappe pas les autres enfants ;
- L'enfant n'est pas facilement distrait.

Apprentissage : l'enfant est considéré comme étant en bonne voie de développement dans ce domaine s'il réunit au moins une des conditions suivantes :

- L'enfant est capable de suivre de simples instructions pour faire quelque chose correctement ;
- Quand on donne quelque chose à faire à l'enfant, il est capable de le faire de manière indépendante.

Échantillon : Enfants de 36-59 mois

Au Sénégal, l'indice de développement du jeune enfant est de 64 %, ce qui signifie que plus de six enfants de 36-59 mois sur dix sont en bonne voie de développement dans au moins trois des quatre domaines suivants : alphabétisation/calcul, développement physique, social/émotionnel et apprentissage (**Tableau 13.7**).

C'est dans le domaine de l'alphabétisation/calcul que les résultats sont les moins bons : seulement 4 % des enfants sont considérés comme étant en bonne voie de développement dans ce domaine. Par contre, la quasi-totalité des enfants de 36-59 mois sont en bonne voie de développement dans le domaine physique (95 %), de l'apprentissage (86 %) et social/émotionnel (75 %).

Variations par caractéristique

- L'indice de développement du jeune enfant est plus élevé chez les filles que chez les garçons (70 % contre 58 %).
- L'indice de développement des jeunes enfants est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural (74 % contre 57 %).
- L'indice de développement des jeunes enfants augmente avec le niveau d'instruction de la mère, passant de 59 % quand la mère n'a aucun niveau d'instruction à 77 % quand elle a le niveau moyen/secondaire ou plus.

- L'indice de développement du jeune enfant varie avec le niveau de bien-être économique du ménage. Il est de 80 % quand les enfants vivent dans un ménage du quintile le plus élevé et varie entre 58 % et 63 % dans les autres quintiles (**Tableau 13.7**).
- L'indice de développement du jeune enfant varie selon la région. Les valeurs les plus faibles sont enregistrées au Centre (47 %) et au Nord (60 %).

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'information sur la situation de l'enfant, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 13.1** Enregistrement à l'état civil des naissances d'enfants de moins de cinq ans
- **Tableau 13.2** Enfants orphelins et résidence avec les parents
- **Tableau 13.3** Education de la petite enfance
- **Tableau 13.4** Soutien à l'apprentissage
- **Tableau 13.5** Matériel d'apprentissage
- **Tableau 13.6** Encadrement inapproprié des enfants
- **Tableau 13.7** Index de développement du jeune enfant

Tableau 13.1 Enregistrement à l'état civil des naissances d'enfants de moins de 5 ans

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans (population de droit) dont la naissance a été enregistrée à l'état civil selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'enfants dont la naissance a été enregistrée et qui :		Pourcentage total dont la naissance a été enregistrée	Effectif d'enfants
	Ont un acte de naissance	N'ont pas d'acte de naissance		
Âge				
<2	67,9	8,6	76,6	2 491
2-4	70,0	6,9	76,9	3 682
Sexe				
Masculin	70,0	8,0	78,0	3 103
Féminin	68,3	7,2	75,6	3 070
Résidence				
Urbain	86,1	5,3	91,4	2 281
Rural	59,2	9,0	68,2	3 893
Région				
Nord	51,5	16,9	68,4	1 039
Ouest	88,9	3,9	92,8	1 863
Centre	60,6	6,1	66,7	2 231
Sud	69,7	8,2	77,9	1 041
Quintiles de bien-être économique				
Le plus bas	47,7	9,9	57,7	1 495
Second	64,7	5,9	70,6	1 374
Moyen	69,0	11,0	80,0	1 236
Quatrième	84,6	7,3	92,0	1 040
Le plus élevé	90,9	2,7	93,6	1 028
Ensemble	69,2	7,6	76,8	6 173

Tableau 13.2 Enfants orphelins et résidence avec les parents

Répartition (en %) de la population de droit des enfants de moins de 18 ans par état de survie des parents et résidence avec les parents, pourcentage d'enfants ne vivant avec aucun parent biologique et pourcentage d'enfants dont l'un ou les deux parents sont décédés, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Vit avec les deux parents	Vit avec la mère mais pas avec le père		Vit avec le père mais pas avec la mère		Ne vit avec aucun des deux parents					Total	Pourcentage ne vivant avec aucun parent biologique	Pourcentage avec un ou les deux parents décédés ¹	Effectif d'enfants	
		Père en vie	Père décédé	Mère en vie	Mère décédée	Les deux sont vivants	Seul le père est vivant	Seule la mère est vivante	Les deux décédés	Information manquante sur père/mère					
Âge															
0-4	57,0	35,7	1,1	0,7	0,1	4,9	0,3	0,2	0,0	0,0	100,0	5,4	1,6	6 173	
<2	58,8	39,0	0,7	0,1	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1,4	0,8	2 491	
2-4	55,9	33,4	1,3	1,2	0,1	7,4	0,5	0,3	0,0	0,0	100,0	8,2	2,2	3 682	
5-9	54,5	26,6	3,1	2,0	0,5	12,0	0,5	0,6	0,2	0,0	100,0	13,3	4,8	6 083	
10-14	50,5	22,4	4,7	3,1	0,9	14,9	1,2	1,7	0,4	0,1	100,0	18,2	9,0	5 318	
15-17	43,7	21,4	6,7	2,5	1,4	17,7	1,8	3,6	1,1	0,1	100,0	24,2	14,6	2 476	
Sexe															
Masculin	54,2	28,1	3,2	2,4	0,8	9,4	0,6	1,0	0,3	0,1	100,0	11,3	5,9	9 861	
Féminin	51,6	27,2	3,4	1,6	0,4	13,1	1,0	1,2	0,4	0,0	100,0	15,7	6,4	10 190	
Résidence															
Urbain	49,2	30,7	3,3	2,2	0,4	11,9	0,8	1,2	0,4	0,0	100,0	14,2	6,1	7 545	
Rural	55,1	25,8	3,3	1,9	0,7	10,9	0,8	1,0	0,3	0,1	100,0	13,1	6,2	12 506	
Région															
Nord	53,9	28,8	3,4	1,3	0,9	10,1	0,6	0,4	0,5	0,1	100,0	11,6	5,8	3 685	
Ouest	50,9	30,8	3,2	2,0	0,1	10,7	0,7	1,2	0,3	0,0	100,0	12,9	5,6	6 111	
Centre	52,1	29,6	2,9	1,2	0,6	11,4	0,9	1,1	0,1	0,1	100,0	13,6	5,6	6 789	
Sud	56,8	17,0	4,4	4,1	1,1	13,2	0,9	1,8	0,5	0,1	100,0	16,5	8,8	3 466	
Quintiles de bien-être économique															
Le plus bas	64,6	17,1	3,9	2,2	1,1	9,0	0,7	0,9	0,3	0,1	100,0	10,9	6,9	4 609	
Second	54,2	25,4	3,3	2,0	0,6	12,2	0,9	1,1	0,2	0,0	100,0	14,5	6,1	4 413	
Moyen	47,9	31,3	4,0	1,8	0,6	12,2	0,8	1,1	0,4	0,0	100,0	14,4	6,9	4 083	
Quatrième	45,8	34,2	3,2	2,2	0,4	12,2	0,4	1,1	0,5	0,1	100,0	14,2	5,5	3 722	
Le plus élevé	48,8	33,5	1,9	1,7	0,1	11,0	1,2	1,5	0,2	0,0	100,0	13,9	4,9	3 224	
Ensemble <15	54,2	28,5	2,9	1,9	0,5	10,4	0,6	0,8	0,2	0,0	100,0	12,0	5,0	17 574	
Ensemble <18	52,9	27,6	3,3	2,0	0,6	11,3	0,8	1,1	0,3	0,0	100,0	13,5	6,2	20 051	

Note : Le tableau est basé sur la population de droit des ménages, c'est-à-dire les résidents habituels.

¹ Comprend les enfants dont le père est décédé, la mère est décédée, les deux parents sont décédés et ceux dont un seul parent est décédé et dont l'information sur l'état de survie de l'autre parent est manquante.

Tableau 13.3 Éducation de la petite enfance

Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui fréquentent un programme d'éducation préscolaire, une classe d'éveil, un jardin d'enfants ou une garderie communautaire, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	École maternelle	Jardin d'enfants	Daara, Coran, Arabe	Case des Tout Petits	Autre	Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui fréquentent un programme d'éducation préscolaire	Effectif d'enfants de 36-59 mois
Sexe							
Masculin	1,0	7,4	15,1	0,6	0,1	24,1	1 288
Féminin	1,1	13,2	12,0	1,0	0,1	27,4	1 272
Âge en mois							
36-47 mois	0,2	8,7	8,6	0,3	0,0	17,8	1 230
48-59 mois	1,8	11,7	18,1	1,3	0,1	33,1	1 330
Résidence							
Urbain	2,6	19,1	19,7	1,2	0,0	42,5	1 010
Rural	0,0	4,5	9,6	0,6	0,1	14,9	1 550
Région							
Nord	0,8	4,5	10,0	0,6	0,1	16,0	421
Ouest	2,3	18,4	22,2	0,7	0,1	43,7	835
Centre	0,2	4,6	13,2	0,5	0,0	18,4	850
Sud	0,5	11,4	1,8	1,8	0,2	15,7	453
Niveau d'instruction de la mère							
Aucun	0,0	4,2	11,1	0,4	0,1	15,9	1 487
Primaire	1,6	13,7	17,2	1,8	0,0	34,3	457
Secondaire ou plus	5,5	33,7	19,7	1,4	0,2	60,5	325
Mère ne vit pas dans le ménage	0,4	10,0	13,9	0,6	0,2	25,0	273
NSP/manquant	*	*	*	*	*	*	18
Quintiles de bien-être économique							
Le plus bas	0,0	2,4	2,4	0,7	0,2	5,7	624
Second	0,1	4,4	9,0	0,2	0,0	13,8	532
Moyen	0,3	8,8	19,4	1,1	0,2	29,7	497
Quatrième	0,5	12,2	24,3	0,7	0,1	37,8	451
Le plus élevé	4,9	27,4	17,1	1,5	0,0	50,9	457
Ensemble	1,0	10,3	13,6	0,8	0,1	25,8	2 560

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 13.4 Soutien à l'apprentissage

Pourcentage d'enfants de 36-59 mois avec qui un membre adulte du ménage a des activités qui favorisent l'apprentissage et la préparation à l'école, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'enfants de 36-59 mois :		Nombre moyen d'activités		Pourcentage d'enfants ne vivant pas avec leur père biologique	Effectif des plus jeunes enfants de 36-59 mois vivant avec leur mère
	Avec qui un membre adulte du ménage a eu quatre activités ou plus ¹	Avec qui le père a eu une activité ou plus ²	Dans lesquelles n'importe quel membre adulte du ménage est engagé avec l'enfant	Dans lesquelles le père est engagé avec l'enfant		
Sexe						
Masculin	25,9	15,8	2,2	0,3	34,0	1 067
Féminin	25,1	11,5	2,2	0,2	36,6	1 013
Âge en mois						
36-47 mois	23,0	11,9	2,1	0,2	37,4	1 014
48-59 mois	27,8	15,4	2,3	0,2	33,2	1 066
Résidence						
Urbain	37,4	19,3	2,8	0,3	37,5	827
Rural	17,6	10,0	1,8	0,1	33,8	1 253
Région						
Nord	7,8	5,6	1,1	0,1	40,1	339
Ouest	37,7	19,2	2,8	0,3	37,0	690
Centre	17,7	16,5	2,1	0,3	35,4	704
Sud	34,2	4,8	2,3	0,1	26,9	347
Niveau d'instruction de la mère						
Aucun	17,0	11,1	1,8	0,2	30,2	1 327
Primaire	33,0	15,5	2,5	0,2	41,5	439
Secondaire ou plus	50,8	22,2	3,3	0,3	48,1	314
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	16,3	6,8	1,6	0,1	27,6	498
Second	14,9	10,7	1,8	0,2	33,4	422
Moyen	21,7	9,8	2,2	0,2	39,6	414
Quatrième	29,9	14,7	2,4	0,2	44,0	376
Le plus élevé	49,7	29,6	3,4	0,4	33,9	370
Ensemble	25,5	13,7	2,2	0,2	35,3	2 081

¹ Mère, père ou autre

² Lire des livres, raconter des histoires, chanter des chansons, promener, jouer ou nommer/compter

Tableau 13.5 Matériel d'apprentissage

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans selon le nombre de livre d'enfants disponibles dans le ménage et selon les objets avec lesquels l'enfant joue, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'enfants vivant dans un ménage qui a :		Pourcentage d'enfants qui jouent avec :				Effectif d'enfants de moins de 5 ans
	3 livres d'enfants ou plus	10 livres d'enfants ou plus	Jouets fabriqués à la maison	Jouets de magasin	Objets du ménage ou trouvés dehors	Deux types de jouets ou plus	
Sexe							
Masculin	0,8	0,2	10,6	37,3	51,4	26,1	2 085
Féminin	1,0	0,0	9,5	35,5	50,3	26,1	2 064
Age							
0-23 mois	0,3	0,2	7,5	31,7	43,6	21,4	2 353
24-59 mois	1,7	0,0	13,3	42,6	60,4	32,2	1 796
Résidence							
Urbain	2,1	0,2	11,0	54,4	42,4	31,2	1 677
Rural	0,1	0,0	9,4	24,2	56,6	22,6	2 472
Région							
Nord	0,2	0,0	12,6	27,5	49,8	24,9	687
Ouest	2,1	0,3	7,3	50,8	34,5	24,7	1 385
Centre	0,1	0,0	9,2	31,7	59,3	28,1	1 424
Sud	0,7	0,0	15,1	25,6	68,4	25,9	652
Niveau d'instruction de la mère							
Aucun	0,1	0,0	9,1	25,2	53,5	22,2	2 456
Primaire	0,8	0,0	10,7	45,5	49,0	28,7	900
Secondaire ou plus	3,4	0,5	12,3	60,9	44,9	35,2	792
Ensemble	0,9	0,1	10,0	36,4	50,9	26,1	4 149
Quintiles de bien-être économique							
Le plus bas	0,1	0,0	7,6	11,0	55,2	12,6	881
Second	0,5	0,0	10,1	18,6	55,3	19,3	878
Moyen	0,2	0,0	12,0	39,8	57,6	34,6	844
Quatrième	0,3	0,0	9,8	54,5	44,2	33,0	768
Le plus élevé	3,7	0,5	10,9	63,6	40,3	32,8	779
Total	0,9	0,1	10,0	36,4	50,9	26,1	4 149

Tableau 13.6 Encadrement inapproprié des enfants

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans laissés seuls ou laissés à la garde d'un autre enfant de moins de 10 ans pendant plus d'une heure au moins une fois au cours de la semaine avant l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans :			Effectif d'enfants le plus jeune de moins de 5 ans vivant avec sa mère
	Laissés seuls au cours de la semaine avant l'enquête	Laissés à la garde d'un autre enfant de moins de 10 ans au cours de la semaine avant l'enquête	Laissés sans soins appropriés au cours de la semaine avant l'enquête ¹	
Sexe				
Masculin	19,3	11,2	23,0	2 085
Féminin	17,9	10,2	21,8	2 064
Âge				
0-23 mois	15,6	8,1	19,0	2 353
24-59 mois	22,6	14,2	26,9	1 796
Résidence				
Urbain	14,8	8,2	16,9	1 677
Rural	21,2	12,4	26,1	2 472
Région				
Nord	28,5	7,3	29,8	687
Ouest	6,4	4,4	7,4	1 385
Centre	15,1	10,8	22,3	1 424
Sud	41,9	27,5	46,5	652
Niveau d'instruction de la mère				
Aucun	19,3	11,6	24,2	2 456
Primaire	16,0	9,2	18,2	900
Secondaire ou plus	19,6	9,5	21,7	792
Quintiles de bien-être économique				
Le plus bas	23,6	15,9	29,5	881
Second	22,4	12,6	26,7	878
Moyen	18,5	10,0	22,0	844
Quatrième	15,7	8,4	18,9	768
Le plus élevé	11,7	5,8	13,4	779
Ensemble	18,6	10,7	22,4	4 149

¹ Sont considérés comme ayant été laissés sans encadrement approprié les enfants laissés seuls ou sous la garde d'un autre enfant de moins de 10 ans pendant plus d'une heure au moins une fois la semaine avant l'enquête.

Tableau 13.7 Index de développement du jeune enfant

Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui sont en bonne voie de développement dans les domaines de l'alphabétisation/calcul, physique, social/émotionnel, et dans le domaine de l'apprentissage, et score de l'indice de développement des jeunes enfants, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, 2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'enfants de 36-59 mois en bonne voie de développement dans les domaines de :				Score de l'indice de développement des jeunes enfants ⁵	Effectif d'enfants de 36-59 mois
	Alphabétisation/calcul ¹	Physique ²	Social-émotionnel ³	Apprentissage ⁴		
Sexe						
Masculin	2,1	94,1	71,2	84,8	58,0	1 067
Féminin	5,3	95,8	78,0	87,8	69,5	1 013
Âge en mois						
36-47 mois	1,4	92,7	75,1	81,4	59,4	1 014
48-59 mois	5,8	97,0	74,0	90,9	67,7	1 066
Résidence						
Urbain	7,6	97,0	81,9	90,0	73,8	827
Rural	1,1	93,6	69,6	83,8	56,9	1 253
Région						
Nord	1,7	98,5	75,9	81,4	59,8	339
Ouest	8,0	96,8	88,1	89,8	79,0	690
Centre	0,7	90,7	59,0	83,5	47,0	704
Sud	3,0	96,2	77,7	89,6	70,4	347
Niveau d'instruction de la mère						
Aucun	1,3	93,6	71,6	85,1	59,0	1 327
Primaire	3,4	96,7	79,7	87,1	68,0	439
Secondaire ou plus	14,1	98,3	79,5	90,3	76,9	314
Quintiles de bien-être économique						
Le plus bas	0,7	93,6	70,8	82,8	57,6	498
Second	0,9	94,3	70,4	84,8	59,2	422
Moyen	1,1	95,3	73,1	86,8	61,1	414
Quatrième	6,2	94,2	79,4	83,1	62,9	376
Le plus élevé	11,1	97,7	80,8	95,2	80,3	370
Ensemble	3,7	94,9	74,5	86,3	63,6	2 081

¹ la bonne voie de développement en alphabétisation/calcul comprend au moins deux de ces conditions : a) l'enfant peut citer au moins dix lettres de l'alphabet ; b) l'enfant peut lire au moins quatre mots simples, courants ; c) l'enfant peut citer et reconnaître tous les chiffres de 1 à 10.

² la bonne voie de développement physique comprend au moins une de ces conditions : a) l'enfant peut attraper par terre avec deux doigts un petit objet, comme un bâton ou un caillou ; et b) l'enfant n'est pas parfois trop malade pour jouer.

³ la bonne voie de développement social/émotionnel comprend au moins deux de ces conditions : a) l'enfant s'entend bien avec les autres enfants ; b) l'enfant ne donne pas de coups de pieds, ne mord pas, et ne frappe pas les autres enfants ; c) l'enfant n'est pas facilement distrait.

⁴ la bonne voie de développement en matière d'apprentissage comprend au moins une de ces conditions : a) l'enfant est capable de suivre de simples instructions pour faire quelque chose correctement ; b) quand on donne quelque chose à faire à l'enfant, il est capable de le faire de manière indépendante.

⁵ l'indicateur MICS 6.6 (indice de développement des jeunes enfants) est le pourcentage d'enfants qui sont en bonne voie de développement dans au moins trois des quatre domaines (alphabétisation/calcul, physique, social/émotionnel, et apprentissage)

Résultats clés

- **Connaissance de l'excision** : Dans l'ensemble, 92 % des femmes et 83 % des hommes ont déclaré connaître l'excision.
- **Prévalence de l'excision des femmes** : Parmi les femmes de 15-49 ans, 23 % ont été excisées.
- **Prévalence de l'excision chez les filles** : Parmi les filles de 0-14 ans, 14 % ont été excisées ; environ 9 % ont subi l'excision avant 1 an et 5 % entre 1 an et 4 ans.
- **Opinions sur l'excision** : Parmi les femmes qui ont entendu parler de l'excision, 12 % pensent que l'excision est une pratique exigée par la religion et 15 % sont favorables au maintien de cette pratique. Chez les hommes, ces pourcentages sont de 12 % dans chaque cas.

Les mutilations génitales féminines constituent une violation des droits humains. Selon l'OMS, on distingue plusieurs formes :

- **Type I** : ablation partielle ou totale du clitoris (clitoridectomie) ;
- **Type II** : ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans mutilation des grandes lèvres ;
- **Type III** : rétrécissement de l'orifice vaginal avec recouvrement par l'ablation et l'accolement des petites lèvres et/ou des grandes lèvres, avec ou sans mutilation du clitoris (infibulation) ; et
- **Type IV** : toutes les autres interventions nocives pratiquées sur les organes génitaux féminins à des fins non thérapeutiques, telles que la ponction, le percement, l'incision, la scarification et la cautérisation.

Au Sénégal, de nombreuses mesures ont été prises pour accélérer l'abandon total de la pratique de l'excision comme la loi 99-05 qui interdit et réprime cette pratique ; les différents plans d'action nationaux pour l'accélération de l'abandon de l'excision 2000-2005, 2010-2015 et le nouveau en cours d'élaboration, sont des mécanismes nationaux, des cadres de références qui traduisent l'engagement et la volonté de l'état à mettre fin à ces pratiques. La mise en œuvre de ces plans d'action a choisi l'approche holistique et multisectorielle basée sur les droits humains, la responsabilisation des communautés, des activités transfrontalières, un plaidoyer au niveau national et international. Des mécanismes de suivi et d'évaluation efficaces ainsi que l'amélioration de la coordination a contribué à renforcer la synergie dans les interventions et entre les intervenants. Cependant, il reste des défis à relever pour venir à bout de ces pratiques qui ont des conséquences sur la santé et le bien-être des femmes et des jeunes filles.

Une étude sur l'état de l'application de la loi publiée en 2011 révèle que sa mise en œuvre demeure limitée car la loi a instauré la peur des sanctions pénales et, par conséquent a favorisé, l'installation de la pratique dans la clandestinité et, dans certains cas, sa médicalisation.

De même que dans les EDS-Continue précédentes, on a collecté dans l'enquête actuelle des données sur la pratique de l'excision. Ces données ont permis d'évaluer la prévalence de l'excision dans l'ensemble des femmes de 15-49 ans et parmi les filles de 0-14 ans, les types d'excisions pratiqués ainsi que l'âge à l'excision. On a également posé des questions aux femmes et aux hommes pour connaître leur opinion sur cette pratique.

14.1 CONNAISSANCE DE L'EXCISION

Connaissance

On a demandé aux hommes et aux femmes s'ils avaient déjà entendu parler de l'excision

Échantillon : Femmes de 15-49 ans et hommes de 15-59 ans

Les résultats de l'enquête montrent que la quasi-totalité des femmes et des hommes interrogés ont déclaré connaître l'excision. La connaissance de l'excision est plus élevée chez les femmes (92 %) que chez les hommes (83 %) (**Tableau 14.1**).

14.2 PRÉVALENCE ET ÂGE À L'EXCISION

14.2.1 Prévalence et type de l'excision

Prévalence de l'excision

On a demandé aux femmes si elles avaient été excisées

Échantillon : Femmes de 15-49 ans

Type d'excision et âge à l'excision

On a posé des questions aux femmes sur :

- Le type d'excision (entaille pas de chairs enlevées, entaille chairs enlevées, vagin cousu)
- L'âge à l'excision


Échantillon : Femmes de 15-49 ans ayant déclaré avoir été excisées

Parmi les femmes âgées de 15-49 ans, 23 % ont déclaré avoir été excisées. Dans plus de la majorité des cas (58 %), de la chair a été enlevée ou on a pratiqué une entaille et pour 9 %, on a pratiqué une entaille sans enlever de la chair. Il convient de souligner la proportion importante de femmes qui n'ont pas été en mesure de donner une réponse ou une réponse précise sur le type d'excision (26 %), probablement parce qu'elles étaient trop jeunes au moment de l'excision (**Graphique 14.1**).

Tendances : La comparaison des résultats de l'enquête avec ceux des enquêtes précédentes ne met pas en évidence de modification importante de la prévalence de l'excision, le pourcentage de femmes excisées variant de 26 % en 2010-2011 à 23 % en 2018.

Graphique 14.1 Type d'excision

Pourcentage parmi les femmes de 15-49 ans excisées



Variations par caractéristique

- La pratique de l'excision est très influencée par l'appartenance ethnique. Les résultats montrent que c'est dans les ethnies Mandingue/Socé (67 %), Soninké (64 %) et Poular (52 %) que la pratique de l'excision est la plus répandue. Cette pratique est presque inexistante dans les ethnies Wolof et Serer (moins de 1 %). Il faut aussi mentionner aussi que quelle que soit l'ethnie, pour plus de la majorité des femmes excisées, on a enlevé des chairs ou pratiqué une entaillée (**Tableau 14.2**).
- La pratique de l'excision varie de manière importante selon la région. La région du Sud (73 %) enregistre la proportion de femmes de 15-49 ans excisées la plus élevée suivie de la région du Nord (32 %).

14.2.2 Âge à l'excision

Les résultats de l'enquête montrent que dans la quasi-totalité des cas, l'excision est pratiquée à des âges très jeunes. En effet, neuf femmes excisées sur dix (92 %) ont déclaré qu'elles l'avaient été avant l'âge de 10 ans, en grande partie avant leur cinquième anniversaire (83 %). Quelles que soient les caractéristiques de la femme, l'excision a été pratiquée avant l'âge de dix ans, en majorité avant cinq ans (**Tableau 14.3**).

14.3 PRÉVALENCE ET ÂGE DES FILLES À L'EXCISION

Prévalence parmi les filles de 0-14 ans

On a demandé aux femmes si leur fille de 0-14 ans était excisée


Échantillon : Filles de 0-14 ans

Au Sénégal, 14 % des filles âgées de 0-14 ans ont été excisées. Neuf pour cent (9%) ont subi l'excision avant 1 an et 5 % entre 1-4 ans. Globalement, l'excision se pratique essentiellement avant cinq ans (13 %) (**Tableau 14.4**).

La prévalence de l'excision des filles a connu une diminution entre 2012 et 2014. En effet, elle est passée de 18 % en 2012 à 13 % en 2014. Néanmoins, entre les trois dernières années (2016, 2017 et 2018), elle s'est stabilisée à 14 % (**Graphique 14.2**).

Graphique 14.2 Tendances d'excision des filles

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui sont excisées




EDS-C 2012-2013 EDS-C 2014 EDS-C 2015 EDS-C 2016 EDS-C 2017 EDS-C 2018

Le **Graphique 14.3** présente le pourcentage de femmes de 15-49 ans déjà excisées en atteignant certains âges exacts entre 5 et 14 ans, selon l'âge déclaré à l'excision et le pourcentage de filles de chaque âge entre 0 et 14 ans qui sont excisées. L'intérêt de ce graphique est de permettre de comparer directement le pourcentage de femmes de 15-49 ans excisées à chaque âge selon leur déclaration et le pourcentage de filles excisées (statut actuel), à chaque âge. On constate qu'à chaque âge, le pourcentage de filles excisées est inférieur à celui des femmes de 15-49 ans. Par exemple, à l'âge de dix ans, 20 % des filles sont excisées contre 22 % des femmes de 15-49 ans. De même, à l'âge de 12 ans, 16 % contre 22 % des femmes sont excisées. Ces résultats semblent donc montrer une tendance à la baisse de la pratique de l'excision.

Graphique 14.3 Âge à l'excision parmi les femmes et les filles

Pourcentage de femmes de 15-49 ans et de filles de 0-14 ans qui sont excisées



Variations par caractéristique

- L'excision est plus fréquemment pratiquée chez les filles dont la mère est musulmane que chez les filles dont la mère est chrétienne (14 % contre 3 %).
- En outre, les résultats montrent que la prévalence de l'excision chez les filles de 0-14 ans est plus élevée quand la mère appartient aux ethnies dans lesquelles l'excision est une pratique particulièrement ancrée, à savoir les Mandingues/Socé (36 %), Poular (33 %) et Soninké (26 %). Par contre, quand la mère appartient aux ethnies Sérère ou Wolof, la prévalence de l'excision n'atteint même pas 1 %. L'analyse selon l'âge actuel des filles montre que chez les Mandingues/Socé, la moitié des filles âgées de 10-14 ans (50 %) sont excisées.
- Les résultats selon le milieu de résidence laissent entrevoir une nette différence entre le milieu urbain et le milieu rural. En effet, 17 % des filles âgées de 0-14 ans sont excisées dans le milieu rural contre 9 % en milieu urbain.
- La prévalence de l'excision varie aussi selon la région. Dans la région du Sud, 43 %, des filles âgées de 0-14 ans sont excisées. À l'opposé, dans la région du Centre, le pourcentage de filles de 0-14 ans excisées est de 1 % et il est de 5 % dans la région Ouest.
- L'instruction de la mère influence la pratique de l'excision de la fille. Plus la mère est instruite, moins la fille est exposée au risque d'être excisée. En effet, la prévalence de l'excision passe de 17 % chez les filles dont la mère n'a aucun niveau d'instruction à 6 % chez les filles dont la mère a un niveau moyen/secondaire ou plus.
- De même, la prévalence de l'excision diminue avec le bien-être économique du ménage. Parmi les filles de 0-14 ans vivant dans un ménage du quintile de bien-être le plus élevé, 3 % sont excisées alors que parmi celles du quintile le plus bas, ce pourcentage atteint 28 %.

14.4 OPINIONS SUR L'EXCISION

Pour mieux comprendre les raisons qui expliquent que la pratique de l'excision perdure, on a demandé aux femmes et aux hommes s'il pensait d'une part que cette pratique était exigée par leur religion et d'autre part s'ils pensaient eux-mêmes qu'il fallait maintenir cette pratique.

Le **Tableau 14.6** montre que 81 % des femmes et 66 % des hommes ayant entendu parler de l'excision ne pensent pas que c'est une pratique exigée par la religion.

Le **Tableau 14.7** présente les opinions des enquêtés par rapport à la poursuite ou l'abandon de l'excision. La grande majorité des femmes (81 %) et des hommes (78 %) se sont prononcés pour l'abandon de la pratique de l'excision. À l'opposé, 15 % des femmes et 12 % des hommes y sont toujours favorables.


Tendances : La proportion de femmes qui pensent que la pratique est liée à la religion a légèrement diminué, passant de 17 % en 2005 à 12 % en 2018. Chez les hommes, le pourcentage de ceux qui pensent que la pratique de l'excision est exigée par la religion n'a pratiquement pas varié (12 %).

Depuis 2005, la proportion de femmes favorables au maintien de la pratique de l'excision a légèrement diminué, passant de 18 % à 15 %. Chez les hommes, le pourcentage en faveur du maintien de cette pratique a aussi très légèrement diminué, passant de 14 % à 12 %.

Variations par caractéristique

- L'opinion selon laquelle l'excision est une pratique exigée par la religion varie selon que la femme est excisée ou non. En effet, 41 % des femmes qui ont été excisées pensent que c'est une nécessité religieuse contre seulement 2 % parmi celles qui ne le sont pas. De même, 56 % des femmes excisées sont favorables au maintien de cette pratique contre 2 % parmi celles qui n'ont pas subi cette pratique. Ces variations sont similaires à celles observées lors des précédentes enquêtes.
- L'opinion selon laquelle l'excision est une pratique exigée par la religion est plus répandue chez les femmes et les hommes musulmans (12 % des femmes et 12 % des hommes contre 1 % parmi les femmes chrétiennes). De même 16 % de musulmanes et 12 % de musulmans sont favorables au maintien de la pratique contre respectivement 5 % et 1 % parmi les chrétiens.
- En outre, c'est dans les ethnies où la prévalence de l'excision est la plus élevée que l'opinion selon laquelle la pratique de l'excision est une exigence religieuse est la plus répandue : les Mandingues/Socés (30 % chez les femmes et 26 % chez les hommes), les Poulars (26 % chez les femmes et 25 % chez les hommes), les Soninkés (33 % chez les femmes et 25 % chez les hommes) et les Diolas (10 % chez les femmes et 4 % chez les hommes) (**Tableaux 14.6 et 14.7 et Graphique 14.4**).

Graphique 14.4 Opinion sur l'excision par ethnie



- Les résultats dans les régions sont très influencés par la composition ethnique.
- Enfin, l'opinion selon laquelle l'excision est exigée par la religion et l'opinion selon laquelle il faut maintenir la pratique sont plus fréquemment partagées par les populations résidant en milieu rural, celles qui n'ont pas de niveau d'instruction mais également celles dont le ménage est classé dans le quintile le plus bas.

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'information sur la pratique de l'excision, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 14.1** Connaissance de l'excision
- **Tableau 14.2** Prévalence de l'excision
- **Tableau 14.3** Âge à l'excision
- **Tableau 14.4** Prévalence de l'excision et âge à l'excision : Filles de 0-14 ans
- **Tableau 14.5** Excision des filles de 0-14 ans selon les caractéristiques sociodémographiques de la mère
- **Tableau 14.6** Opinion des femmes et des hommes sur l'excision, en tant que nécessité religieuse
- **Tableau 14.7** Opinion des femmes et des hommes sur la poursuite ou non de la pratique de l'excision

Tableau 14.1 Connaissance de l'excision

Pourcentage de femmes de 15-49 ans et d'hommes de 15-59 ans qui ont entendu parler de l'excision, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Femmes		Hommes	
	Ont entendu parler de l'excision	Effectif	Ont entendu parler de l'excision	Effectif
Âge				
15-19	83,2	2 056	60,0	861
20-24	92,0	1 686	83,0	604
25-29	94,2	1 591	91,7	469
30-34	95,5	1 387	90,3	452
35-39	96,1	1 153	95,6	405
40-44	95,2	868	96,8	351
45-49	97,2	673	98,5	245
Religion				
Musulmane	92,1	9 053	83,2	3 259
Chrétienne	92,5	360	87,9	127
Ethnie				
Wolof	90,1	3 931	83,4	1 363
Poular	93,5	2 342	81,5	833
Serer	90,5	1 362	79,9	517
Mandingue/Socé	95,3	468	88,6	138
Diola	97,9	408	87,7	123
Soninké	96,4	193	87,6	157
Autre/non Sénégalais	95,0	710	89,0	256
Résidence				
Urbain	96,7	4 518	91,8	1 659
Rural	87,9	4 896	75,3	1 728
Région				
Nord	91,9	1 565	79,2	553
Ouest	96,6	3 725	94,3	1 340
Centre	85,4	2 870	71,7	971
Sud	94,7	1 254	81,6	523
Niveau d'instruction				
Pas d'instruction	89,6	4 304	77,9	1 250
Primaire	92,8	2 070	80,9	855
Moyen/Secondaire ou plus	95,3	3 040	90,4	1 282
Quintiles de bien-être économique				
Le plus bas	84,2	1 508	69,7	588
Second	86,8	1 659	74,5	611
Moyen	92,4	1 908	83,9	680
Quatrième	96,3	2 065	91,7	812
Le plus élevé	97,2	2 273	92,5	696
Ensemble 15-49	92,1	9 414	83,4	3 387
50-59	na	na	98,6	375
Ensemble 15-59	na	na	84,9	3 762

na = non applicable

Tableau 14.2 Prévalence de l'excision

Pourcentage de femmes de 15-49 ans excisées et répartition (en %) des femmes par type d'excision, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes excisées	Effectif de femmes	Type d'excision				Total	Effectif de femmes excisées
			Entaille, pas de chair enlevée	Entaille, chair enlevée	Vagin cousu	NSP/manquant		
Âge								
15-19	21,4	2 056	10,7	48,5	3,9	36,9	100,0	439
20-24	21,9	1 686	6,4	56,8	8,0	28,8	100,0	369
25-29	25,1	1 591	7,5	60,2	7,2	25,1	100,0	399
30-34	25,4	1 387	7,7	60,2	8,4	23,8	100,0	353
35-39	22,9	1 153	7,8	65,0	8,0	19,2	100,0	265
40-44	23,8	868	11,5	57,9	7,3	23,3	100,0	207
45-49	24,5	673	9,0	68,4	5,9	16,8	100,0	165
Religion								
Musulmane	24,1	9 053	8,5	58,3	6,9	26,3	100,0	2 178
Chrétienne	4,6	360	(5,7)	(53,6)	(1,0)	(39,6)	100,0	17
Sans religion	*	1	*	*	*	*	100,0	1
Autre	*	0	*	*	*	*	100,0	0
Ethnie								
Wolof	0,6	3 931	(22,7)	(35,1)	(9,9)	(32,3)	100,0	25
Poular	52,1	2 342	11,8	53,3	8,0	26,9	100,0	1 221
Serer	0,5	1 362	*	*	*	*	100,0	6
Mandingue/Socé	67,2	468	2,3	73,8	3,5	20,4	100,0	315
Diola	48,7	408	3,6	57,6	6,2	32,6	100,0	199
Soninké	64,3	193	11,6	57,9	4,5	26,0	100,0	124
Autre/non Sénégalais	43,0	710	2,5	64,3	7,2	26,0	100,0	305
Résidence								
Urbain	22,6	4 518	4,4	68,0	5,7	21,8	100,0	1 020
Rural	24,0	4 896	12,0	49,8	7,9	30,3	100,0	1 176
Région								
Nord	31,5	1 565	30,6	26,0	12,0	31,4	100,0	494
Ouest	17,0	3 725	0,8	79,4	4,8	15,0	100,0	633
Centre	5,4	2 870	3,0	66,2	10,4	20,5	100,0	154
Sud	73,0	1 254	2,9	59,7	5,0	32,4	100,0	916
Ensemble	23,3	9 414	8,5	58,3	6,9	26,4	100,0	2 196

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 14.3 Âge à l'excision

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans qui ont été excisées par âge à l'excision selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Âge à l'excision				NSP/ Manquant	Total	Effectif de femmes excisées
	<5 ¹	5-9	10-14	15+			
Âge							
15-19	86,6	7,7	1,7	0,1	3,9	100,0	439
20-24	84,8	8,0	2,6	0,9	3,8	100,0	369
25-29	80,5	10,1	6,1	0,0	3,3	100,0	399
30-34	76,7	12,3	3,4	0,7	7,0	100,0	353
35-39	84,0	7,2	7,0	0,4	1,3	100,0	265
40-44	80,1	13,2	4,4	0,0	2,3	100,0	207
45-49	86,2	11,0	1,7	0,8	0,3	100,0	165
Religion							
Musulmane	82,9	9,5	3,7	0,4	3,5	100,0	2 178
Chrétienne	50,7	20,5	23,4	1,0	4,3	100,0	17
Sans religion	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1
Autre	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0
Ethnie							
Wolof	97,0	0,0	0,0	0,0	3,0	100,0	25
Poular	87,1	7,1	2,4	0,3	3,1	100,0	1 221
Serer	71,2	6,7	6,7	0,0	15,4	100,0	6
Mandingue/Socé	79,0	14,7	4,2	0,2	1,9	100,0	315
Diola	59,5	23,8	10,0	1,0	5,7	100,0	199
Soninké	96,7	1,9	0,5	0,0	0,9	100,0	124
Autre/non Sénégalais	77,1	9,5	6,5	0,6	6,4	100,0	305
Résidence							
Urbain	80,3	11,0	5,5	0,1	3,1	100,0	1 020
Rural	84,7	8,4	2,4	0,6	3,9	100,0	1 176
Région							
Nord	99,1	0,6	0,2	0,0	0,1	100,0	494
Ouest	76,1	13,5	7,5	0,0	3,0	100,0	633
Centre	88,6	7,9	1,8	0,5	1,2	100,0	154
Sud	77,3	12,1	3,6	0,8	6,1	100,0	916
Ensemble	82,7	9,6	3,8	0,4	3,5	100,0	2 196

¹ Inclut les femmes qui ont répondu qu'elles avaient été excisées dans la petite enfance, sans être en mesure de donner un âge précis**Tableau 14.4 Prévalence de l'excision et âge à l'excision : Filles de 0-14 ans**

Répartition (en %) des filles de 0-14 ans par âge à l'excision et pourcentage des filles excisées selon l'âge actuel, Sénégal 2018

Âge actuel	Âge à l'excision				NSP/ Manquant	Pourcentage non excisé	Total	Effectif de filles	Pourcentage de filles excisées
	<1	1-4	5-9	10-14					
Âge actuel									
0-4	7,3	2,3	na	na	0,0	90,3	100,0	2 860	9,7
5-9	9,1	5,9	0,8	na	0,1	84,1	100,0	2 651	15,9
10-14	9,2	6,7	1,7	0,1	0,2	82,1	100,0	2 086	17,9
Ensemble	8,5	4,8	0,7	0,0	0,1	85,9	100,0	7 598	14,1

Note : L'information sur l'excision de la fille est basée sur la déclaration de la mère.
na = non applicable pour cause de troncature

Tableau 14.5 Excision des filles de 0-14 ans selon les caractéristiques sociodémographiques de la mère

Pourcentage de filles de 0-14 ans qui sont excisées, selon l'âge et les caractéristiques sociodémographiques de la mère, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Âge actuel			Ensemble des filles de 0-14 ans
	0-4	5-9	10-14	
Religion				
Musulmane	9,9	16,2	18,4	14,4
Chrétienne	1,1	3,4	3,3	2,5
Ethnie				
Wolof	0,0	0,3	0,5	0,2
Poular	25,4	36,3	38,4	33,0
Serer	0,1	0,2	0,0	0,1
Mandingue/Socé	20,6	40,8	50,0	35,6
Diola	6,5	31,5	(41,8)	22,3
Soninké	22,4	20,7	36,1	26,1
Autre/non Sénégalais	12,4	24,2	29,6	20,6
Résidence				
Urbain	5,0	11,5	13,6	9,4
Rural	12,6	18,5	20,2	16,8
Région				
Nord	27,2	29,8	32,7	29,8
Ouest	2,0	7,0	7,1	5,0
Centre	0,6	2,0	1,8	1,4
Sud	26,2	49,6	57,8	42,5
Niveau d'instruction de la mère				
Pas d'instruction	11,9	18,0	20,2	16,5
Primaire	7,1	12,4	12,4	10,5
Moyen/Secondaire ou plus	4,5	9,1	8,6	6,4
Excision de la mère				
Excisée	32,7	57,2	61,5	49,0
Non excisée	0,4	0,4	0,5	0,4
Quintiles de bien-être économique				
Le plus bas	21,0	31,3	33,2	28,0
Second	11,2	17,7	19,8	15,9
Moyen	7,5	11,4	16,1	11,2
Quatrième	3,9	9,0	8,5	7,0
Le plus élevé	0,6	4,2	2,9	2,5
Ensemble	9,7	15,9	17,9	14,1

Note : L'information sur l'excision de la fille est basée sur la déclaration de la mère. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Tableau 14.6 Opinion des femmes et des hommes sur l'excision, en tant que nécessité religieuse

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans et des hommes de 15-59 ans qui ont entendu parler de l'excision, selon qu'ils pensent ou non que l'excision est une exigence religieuse, en fonction de certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Femmes				Effectif de femmes ayant entendu parler de l'excision	Hommes				Effectif d'hommes ayant entendu parler de l'excision
	Exigée	Non exigée	Ne sait pas/ manquant	Total		Exigée	Non exigée	Ne sait pas/ manquant	Total	
Excision										
Excisée	41,2	51,7	7,1	100,0	2 196	na	na	na	na	na
Non excisée	1,5	91,5	7,1	100,0	6 477	na	na	na	na	na
Âge										
15-19	11,6	76,7	11,7	100,0	1 711	7,2	66,1	26,7	100,0	517
20-24	10,7	81,2	8,0	100,0	1 551	12,6	62,1	25,3	100,0	501
25-29	12,2	82,0	5,9	100,0	1 498	12,1	69,9	18,0	100,0	430
30-34	13,2	81,5	5,3	100,0	1 324	10,0	66,0	24,0	100,0	408
35-39	10,7	84,7	4,6	100,0	1 108	15,7	66,1	18,2	100,0	387
40-44	10,6	84,1	5,2	100,0	827	15,1	69,0	15,9	100,0	340
45-49	11,1	83,5	5,4	100,0	654	13,5	65,1	21,4	100,0	241
Religion										
Musulmane	11,9	81,1	7,0	100,0	8 338	12,4	65,1	22,5	100,0	2 711
Chrétienne	1,1	89,7	9,2	100,0	333	0,0	93,3	6,7	100,0	112
Animiste	*	*	*	0,0	0	*	*	*	100,0	1
Sans religion	*	*	*	100,0	1	*	*	*	0,0	0
Autre	*	*	*	100,0	0	*	*	*	0,0	0
Ethnie										
Wolof	1,1	92,3	6,6	100,0	3 543	4,6	73,3	22,2	100,0	1 137
Poular	26,1	65,9	8,1	100,0	2 191	25,4	51,4	23,2	100,0	679
Serer	1,1	94,1	4,8	100,0	1 232	0,9	73,2	25,9	100,0	413
Mandingue/Socé	29,6	63,4	7,0	100,0	446	25,5	51,5	23,0	100,0	122
Diola	9,8	77,7	12,6	100,0	400	4,2	79,9	15,9	100,0	108
Soninké	33,4	62,0	4,6	100,0	186	25,3	56,1	18,6	100,0	137
Autre / non Sénégalais	21,2	71,0	7,8	100,0	674	17,3	69,9	12,9	100,0	228
Résidence										
Urbain	9,5	84,0	6,5	100,0	4 368	10,4	68,8	20,8	100,0	1 523
Rural	13,6	78,8	7,6	100,0	4 304	13,8	63,2	23,0	100,0	1 301
Région										
Nord	24,2	67,3	8,4	100,0	1 438	20,3	61,1	18,6	100,0	439
Ouest	6,9	86,3	6,8	100,0	3 596	8,1	70,8	21,1	100,0	1 263
Centre	2,2	91,4	6,4	100,0	2 451	6,3	66,1	27,6	100,0	696
Sud	29,3	63,1	7,6	100,0	1 188	24,0	58,2	17,9	100,0	426
Niveau d'instruction										
Pas d'instruction	14,9	77,7	7,4	100,0	3 856	18,7	58,2	23,1	100,0	973
Primaire	11,0	81,6	7,4	100,0	1 920	9,8	68,4	21,9	100,0	692
Moyen/Secondaire ou plus	7,4	86,2	6,4	100,0	2 896	7,6	71,7	20,7	100,0	1 159
Quintiles de bien-être économique										
Le plus bas	23,6	67,0	9,3	100,0	1 271	22,7	53,6	23,6	100,0	410
Second	14,4	77,0	8,6	100,0	1 439	13,0	65,2	21,8	100,0	455
Moyen	12,4	82,3	5,3	100,0	1 763	10,6	66,6	22,9	100,0	571
Quatrième	9,6	82,7	7,6	100,0	1 989	10,4	66,5	23,1	100,0	745
Le plus élevé	3,7	90,6	5,7	100,0	2 210	7,4	74,4	18,2	100,0	643
Ensemble 15-49	11,5	81,4	7,1	100,0	8 672	12,0	66,2	21,8	100,0	2 824
50-59	na	na	na	na	na	15,3	67,7	17,0	100,0	370
Ensemble 15-59	na	na	na	na	na	12,3	66,4	21,3	100,0	3 194

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée
na = non applicable

Tableau 14.7 Opinion des femmes et des hommes concernant le maintien ou non de cette pratique

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans et des hommes de 15-59 ans qui ont entendu parler de l'excision selon qu'ils pensent que cette pratique doit continuer ou non, par certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2018

Caractéristique sociodémographique	Femmes				Effectif des enquêté(e)s	Hommes				Effectif des enquêté(e)s
	Doit continuer	Ne doit pas continuer	NSP/ manquant/ ça dépend ends	Total		Doit continuer	Ne doit pas continuer	NSP/ manquant/ ça dépend ends	Total	
Excision										
Excisée	55,7	39,5	4,8	100,0	2 196	na	na	na	na	na
Non excisée	1,7	94,5	3,8	100,0	6 477	na	na	na	na	na
Âge										
15-19	17,7	77,3	5,0	100,0	1 711	8,2	84,9	7,0	100,0	517
20-24	15,0	80,8	4,2	100,0	1 551	13,3	79,6	7,2	100,0	501
25-29	15,0	80,9	4,0	100,0	1 498	11,5	78,7	9,8	100,0	430
30-34	17,6	79,3	3,1	100,0	1 324	12,3	76,5	11,2	100,0	408
35-39	12,7	84,2	3,1	100,0	1 108	11,8	69,8	18,4	100,0	387
40-44	13,6	81,8	4,6	100,0	827	15,4	77,3	7,3	100,0	340
45-49	13,5	82,7	3,8	100,0	654	11,6	73,3	15,1	100,0	241
Religion										
Musulmane	15,8	80,1	4,1	100,0	8 338	12,3	77,0	10,7	100,0	2 711
Chrétienne	5,2	92,2	2,5	100,0	333	0,5	97,3	2,2	100,0	112
Animiste	*	*	*	0,0	0	*	*	*	100,0	1
Sans religion	*	*	*	100,0	1	*	*	*	0,0	0
Autre	*	*	*	100,0	0	*	*	*	0,0	0
Ethnie										
Wolof	1,4	95,1	3,5	100,0	3 543	2,2	88,3	9,5	100,0	1 137
Poular	32,5	62,0	5,5	100,0	2 191	29,5	57,1	13,4	100,0	679
Serer	1,6	95,4	3,0	100,0	1 232	1,0	88,3	10,6	100,0	413
Mandingue/Socé	46,9	50,2	2,9	100,0	446	28,4	66,5	5,0	100,0	122
Diola	22,5	72,5	5,0	100,0	400	7,2	89,8	3,0	100,0	108
Soninké	29,1	69,1	1,7	100,0	186	21,2	66,1	12,7	100,0	137
Autre/non Sénégalais	29,6	65,9	4,5	100,0	674	14,7	75,4	9,9	100,0	228
Résidence										
Urbain	11,3	85,6	3,0	100,0	4 368	9,8	79,9	10,4	100,0	1 523
Rural	19,5	75,5	5,0	100,0	4 304	14,3	75,4	10,3	100,0	1 301
Région										
Nord	24,9	68,8	6,3	100,0	1 438	22,9	72,3	4,8	100,0	439
Ouest	7,9	89,2	2,9	100,0	3 596	7,4	82,8	9,8	100,0	1 263
Centre	4,9	90,5	4,6	100,0	2 451	3,1	81,3	15,6	100,0	696
Sud	48,0	48,4	3,6	100,0	1 188	27,9	63,0	9,1	100,0	426
Niveau d'instruction										
Pas d'instruction	20,6	74,4	5,1	100,0	3 856	18,6	66,5	15,0	100,0	973
Primaire	13,8	82,2	3,9	100,0	1 920	9,9	80,2	9,9	100,0	692
Moyen/Secondaire ou plus	9,5	87,8	2,7	100,0	2 896	7,4	85,9	6,7	100,0	1 159
Quintiles de bien-être économique										
Le plus bas	35,4	57,6	7,0	100,0	1 271	24,3	64,9	10,7	100,0	410
Second	21,1	73,1	5,8	100,0	1 439	15,7	74,5	9,8	100,0	455
Moyen	13,2	83,6	3,2	100,0	1 763	10,0	78,3	11,7	100,0	571
Quatrième	11,1	85,2	3,7	100,0	1 989	8,9	80,4	10,7	100,0	745
Le plus élevé	5,7	92,1	2,1	100,0	2 210	6,1	84,9	9,0	100,0	643
Ensemble 15-49	15,4	80,6	4,0	100,0	8 672	11,8	77,8	10,3	100,0	2 824
50-59	na	na	na	na	na	13,0	72,7	14,3	100,0	370
Ensemble 15-59	na	na	na	na	na	12,0	77,2	10,8	100,0	3 194

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée
na = non applicable

RÉFÉRENCES

Graham, W., W. Brass, and R. W. Snow. 1989. "Indirect Estimation of Maternal Mortality: The Sisterhood Method." *Studies in Family Planning* 20(3):125-135.

Korenromp, E. L., J. Armstrong-Schellenberg, B. Williams, B. Nahlen, and R. W. Snow. Impact of Malaria Control on Childhood Anemia in Africa – A Quantitative Review. *Trop Med Int Health*. 2004; 9(10):1050-1065.

Roll Back Malaria Partnership. 2003. *Monitoring and Evaluation Reference Group Anemia Task Force Meeting Minutes*. Presented at WHO Headquarters. Geneva: 2003 Oct 27-28.

Rutenberg, N., and J. Sullivan. August 5-7, 1991. *Direct and Indirect Estimates of Maternal Mortality from the Sisterhood Method*. Paper presented at the Demographic and Health Surveys World Conference, Washington, DC.

Stanton, C., N. Abderrahim, and K. Hill. 1997. *DHS Maternal Mortality Indicators: an Assessment of Data Quality and Implications for Data Use*. DHS Analytical Report No. 4. Calverton, MD, USA: Macro International Inc.

World Health Organization. 2004. *A Strategic Framework for Malaria Prevention and Control during Pregnancy in the African Region*. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization (WHO). 2008. *Indicators for Assessing Infant and Young Child Feeding Practices*. Part I: Definitions. Geneva, Switzerland: World Health Organization.

A.1 OBJECTIFS

L'Enquête EDS Continue Sénégal 2018 est la sixième version de l'Enquête Démographique et de Santé Continue (EDS Continue) réalisée au Sénégal entre 2012 et 2018. Autres enquêtes EDS ont été réalisées en 1986, 1992-93, 1997, 2005 et 2010. Cette sixième version a utilisé un échantillon représentatif national de 214 grappes et 4 708 ménages, avec un nombre attendu de 8 845 femmes âgées de 15 à 49 ans enquêtées avec succès. Toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans qui sont des membres de ménages ou qui ont passés la nuit précédant le jour de l'enquête dans les ménages sélectionnés sont éligibles pour l'enquête. Comme les enquêtes EDS précédentes, l'Enquête EDS Continue 2018 a pour objectif principal de recueillir des informations sur la santé des femmes et de leurs jeunes enfants ; sur la fécondité ; sur la connaissance et l'utilisation des méthodes contraceptives ; sur la connaissance et les attitudes vis-à-vis des maladies sexuellement transmissibles et le sida. Les résultats de l'enquête sont représentatifs pour le Sénégal, pour le milieu urbain ensemble et le milieu rural ensemble séparément, et pour quatre zones géographiques/écologiques, c'est-à-dire, l'Ouest, le Centre, le Nord et le Sud.

Une enquête auprès des hommes était également menée au moment de l'enquête auprès des femmes. Parmi les ménages sélectionnés pour l'enquête auprès des femmes, un ménage sur deux était sélectionné pour l'enquête auprès des hommes. Tous les hommes âgés de 15 à 59 ans qui sont des membres du ménage ou qui ont passé la nuit précédant le jour de l'enquête dans les ménages sélectionnés pour l'enquête auprès des hommes sont éligibles pour l'enquête, avec nombre attendu de 3 382 hommes 15 à 59 ans enquêtés avec succès. L'objectif principal de l'enquête auprès des hommes est de recueillir des informations sur leur connaissance et l'utilisation de la contraception ; leur connaissance et attitude vis-à-vis des maladies sexuellement transmissibles et le sida.

Dans tous les ménages sélectionnés, tous les enfants de moins de 5 ans sont éligibles pour être mesurés et pesé pour déterminer leur état nutritionnel.

A.2 BASE DE SONDAGE

L'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) dispose d'un fichier informatique des Districts de Recensement (DR) créés à l'issue du Recensement Général de la Population et de l'Habitat, de l'Agriculture et de l'Elevage de 2013 (RGPHAE-2013). Dans ce fichier, il y a 17 148 DR ; chaque DR apparaît avec tous ses identifiants (région, département, commune/arrondissement et code d'identification), sa taille en ménage et son type de milieu de résidence (urbain ou rural). Tous les DR du RGPHAE-2013 ont des limites clairement identifiables et sont présentables sous forme de carte. Parmi les 17 148 DR que compte le pays, 8 060 se trouvent dans le milieu urbain, et 9 088 se trouvent dans le milieu rural. La taille moyenne de DR est de 105 ménages dans le milieu urbain, et de 82 ménages dans le milieu rural, avec une taille moyenne globale de 93 ménages. La répartition des DR par régions et par type de résidence est donnée dans le **Tableau A.1**. La répartition de ménage par région et par type de résidence est donnée dans le **Tableau A.2**. Au Sénégal, il y a quatorze régions administratives ; chaque région est subdivisée en départements ; il y a 45 départements ; chaque département est subdivisé en arrondissements et ces derniers en commune et, etc. Au Sénégal, 53,1 % de ménages vivent dans le milieu urbain, dont 30,9 % entre eux se trouvent dans la région de Dakar. Au niveau régional, les tailles de régions en ménages représentent une grande variation, varient de 1,2 % pour la région de Kédougou à 30,9 % pour la région de Dakar.

Tableau A.1 Répartition de nombres de DR et la taille moyenne de DR en ménages par région et selon le milieu de résidence (RGPH-2013)

Région	Nombre de DR			Taille moyenne de DR en ménage		
	Urbain	Rural	Total	Urbain	Rural	Total
Dakar	4 057	132	4 189	118	103	118
Diourbel	286	1 641	1 927	89	79	81
Fatick	131	670	801	100	88	90
Kaffrine	103	532	635	87	84	85
Kaolack	409	717	1 126	98	76	84
Kédougou	59	166	225	91	82	84
Kolda	235	566	801	96	85	88
Louga	240	849	1 089	91	88	89
Matam	138	533	671	80	80	80
Saint-Louis	494	662	1 156	103	89	95
Sédhiou	103	405	508	83	79	80
Tambacounda	242	721	963	87	67	72
Thiès	1 228	1 093	2 321	86	80	83
Ziguinchor	335	401	736	103	103	103
Sénégal	8 060	9 088	17 148	105	82	93

Tableau A.2 Répartition de ménage par région et selon le milieu de résidence (RGPH-2013)

Région	Répartition de ménages			Pourcentage	
	Urbain	Rural	Total	Urbain	Rural
Dakar	482 457	13 669	496 126	97,2	30,9
Diourbel	25 619	130 920	156 539	16,4	9,7
Fatick	13 172	59 217	72 389	18,2	4,5
Kaffrine	9 058	44 922	53 980	16,8	3,4
Kaolack	40 112	55 136	95 248	42,1	5,9
Kédougou	5 374	13 662	19 036	28,2	1,2
Kolda	22 604	48 306	70 910	31,9	4,4
Louga	22 006	75 355	97 361	22,6	6,1
Matam	11 152	42 759	53 911	20,7	3,4
Saint-Louis	51 126	59 037	110 163	46,4	6,9
Sédhiou	8 576	32 275	40 851	21,0	2,5
Tambacounda	21 291	48 984	70 275	30,3	4,4
Thiès	106 232	88 465	194 697	54,6	12,1
Ziguinchor	34 604	41 347	75 951	45,6	4,7
Sénégal	853 383	754 054	1 607 437	53,1	100,0

A.3 PROCÉDURE DE TIRAGE ET LA RÉPARTITION DE L'ÉCHANTILLON

L'échantillon de l'EDS Continue 2018 est un échantillon aléatoire, stratifié et tiré à 2 degrés. L'unité primaire de sondage est le DR tel que défini pour le recensement en 2013. Chaque région était séparée en parties urbaine et rurale pour former les strates d'échantillonnage et l'échantillon était tiré indépendamment dans chaque strate d'échantillonnage. En total vingt-huit strates d'échantillonnage ont été créées. A l'intérieur de chaque strate, avant le tirage de DR, les DR étaient triés selon les unités administratives en dessous de la région, c'est-à-dire, les départements et les arrondissements/communes, etc. Cette opération avait introduit une stratification implicite au niveau de toutes les unités administratives en dessous de la région avec une allocation de l'échantillon proportionnelle à la taille de l'unité.

Au premier degré, 214 DR étaient tirés avec une probabilité proportionnelle à leur taille, la taille étant le nombre de ménages résidents dans le DR. Un dénombrement des ménages et une mise à jour de la carte étaient effectués dans chaque DR sélectionné avant l'enquête principale. Cette opération avait permis d'obtenir une liste de ménages complète dans chaque DR tiré et qui avait servi de base de sondage pour le tirage de ménages au deuxième degré. Avant le dénombrement des ménages, chaque grand DR ayant plus de 200 ménages était divisée en segments dont un seul était retenu dans l'échantillon. Cette dernière étape n'est pas considérée comme un degré de tirage car la segmentation a pour seul objectif de réduire le travail de dénombrement à l'intérieur du DR.

Au second degré, dans chacun des DR sélectionnés au premier degré, un nombre fixé de 22 ménages avaient été sélectionnés avec un tirage systématique à probabilité égale, à partir des listes nouvellement établies au moment du dénombrement. Les tirages de ménages étaient effectués au bureau central. Seuls les ménages tirés sont interviewés. Des remplacements de ménages présélectionnés ne sont pas autorisés sur le champ, même pour les ménages non répondants, pour éviter des biais.

Le **Tableau A.3** donne la répartition de l'échantillon grappes entre les régions et par milieu de résidence. Parmi les 214 DR sélectionnés, 84 sont en milieu urbain et 130 en milieu rural. Pour les ménages, 4 708 ménages ont été sélectionnés au total, dont 1 848 dans le milieu urbain et 2 860 dans le milieu rural.

Le **Tableau A.4** donne la répartition des nombres attendus de femmes 15-49 enquêtées avec succès. L'enquête attendait en total 8 845 femmes 15-49 ans enquêtées avec succès, dont 3 360 dans le milieu urbain, et 5 485 dans le milieu rural. Pour l'enquête auprès des hommes, l'enquête attendait en total 6 711 hommes 15-59 ans enquêtés avec succès, dont 3 276 dans le milieu urbain, et 3 435 dans le milieu rural.

Tableau A.3 Répartition de l'échantillon grappes et de l'échantillon ménages par région et par type de résidence, EDS Continue Sénégal 2018

Région	Allocation de DR			Allocation de ménages		
	Urbain	Rural	Total	Urbain	Rural	Total
Dakar	16	4	20	352	88	440
Diourbel	6	10	16	132	220	352
Fatick	4	10	14	88	220	308
Kaffrine	4	10	14	88	220	308
Kaolack	6	10	16	132	220	352
Kédougou	4	10	14	88	220	308
Kolda	6	10	16	132	220	352
Louga	4	10	14	88	220	308
Matam	4	10	14	88	220	308
Saint-Louis	8	8	16	176	176	352
Sédhiou	4	10	14	88	220	308
Tambacounda	4	10	14	88	220	308
Thiès	8	10	18	176	220	396
Ziguinchor	6	8	14	132	176	308
Sénégal	84	130	214	1 848	2 860	4 708

Tableau A.4 Répartition de nombres attendus de femmes et hommes enquêtés avec succès par région et par type de résidence, EDS Continue Sénégal 2018

Région	Femmes 15-49			Hommes 15-59		
	Urbain	Rural	Total	Urbain	Rural	Total
Dakar	640	169	809	248	64	312
Diourbel	240	422	662	93	160	253
Fatick	160	422	582	62	160	222
Kaffrine	160	422	582	62	160	222
Kaolack	240	422	662	93	160	253
Kédougou	160	422	582	62	160	222
Kolda	240	422	662	93	160	253
Louga	160	422	582	62	160	222
Matam	160	422	582	62	160	222
Saint-Louis	320	337	657	124	128	252
Sédhiou	160	422	582	62	160	222
Tambacounda	160	422	582	62	160	222
Thiès	320	422	742	124	160	284
Ziguinchor	240	337	577	93	128	221
Sénégal	3 360	5 485	8 845	1 302	2 080	3 382

A.4 CALCUL DES PROBABILITÉS DE TIRAGE

A cause de la répartition non proportionnelle de l'échantillon parmi les strates et les taux différents de réponse à l'enquête par strate, des poids de sondage doivent être utilisés dans toutes les analyses en utilisant les données de l'EDS Continue 2018 pour assurer la représentativité actuelle de l'échantillon au niveau national et au niveau des grandes régions. Pour faciliter le calcul des poids de sondage, les probabilités de

sondage pour chaque degré de tirage sont calculées par strate et pour chacune de grappe. Pour la $i^{\text{ème}}$ grappe de la strate h , les notations sont les suivantes :

- P_{1hi} : probabilité de sondage au premier degré de la $i^{\text{ème}}$ grappe de la strate h
- P_{2hi} : probabilité de sondage au deuxième degré de la $i^{\text{ème}}$ grappe de la strate h

Soient a_h le nombre de grappes tirées dans la strate h , M_{hi} le nombre d'habitants dans la grappe i de la strate h , et t_{hij} la taille estimée en proportion du segment j choisi pour la grappe i de la strate h . Notons que $t_{hij} = 1$ si la grappe n'a pas été segmentée et la somme des t_{hij} est égale à 1.

La probabilité de sondage au premier degré de la $i^{\text{ème}}$ grappe de la strate h est donnée par :

$$P_{1hi} = \frac{a_h \times M_i}{\sum_i M_i} \times t_{hij}$$

Au deuxième degré, un nombre b_{hi} de ménages sont tirés à partir des L_{hi} ménages nouvellement dénombrés par l'équipe de l'EDS Continue 2018 dans la $i^{\text{ème}}$ grappe de la strate h lors de l'opération de dénombrement des ménages et mise à jour des cartes. Donc :

$$P_{2hi} = \frac{b_{hi}}{L_{hi}}$$

La probabilité globale pour tirer un ménage dans la grappe i de la strate h est alors :

$$P_{hi} = P_{1hi} \times P_{2hi}$$

La composante principale du poids de sondage est l'inverse du produit des probabilités de sondage aux 2 degrés. Il est calculé pour chaque grappe selon la formule suivante :

$$W_{hi} = \frac{1}{P_{hi}}$$

Les poids de sondage étaient ajustés pour la correction de la non-réponse au niveau de ménage et au niveau d'individu. Plusieurs ensembles de poids étaient calculés et cela comme suit :

- Pour l'enquête femmes : un ensemble pour les ménages ; un ensemble pour les femmes enquêtées ;
- Pour l'enquête hommes : un ensemble pour les ménages ; un ensemble pour les hommes enquêtés ;
- Pour le module de violence domestique : un ensemble pour les femmes enquêtées ;

Le calcul des poids de ménages étaient basé sur les poids de sondage avec la correction de non-réponse des ménages. Les poids pour les femmes enquêtées étaient calculés à partir des poids de ménages pour l'enquête femmes et avec la correction de non-réponse à l'enquête individuelle de femmes. Les poids pour les hommes enquêtés étaient calculés à partir des poids de ménages pour l'enquête hommes et avec la correction de non-réponse à l'enquête individuelle d'hommes. Les poids pour la violence domestique étaient calculés à partir des poids de ménages pour l'enquête hommes selon le nombre de femmes éligibles dans les ménages avec la correction de non-réponse pour au module sur la violence domestique. Toutes les corrections de non-réponse étaient faites au niveau de strate d'échantillonnage.

Les poids finaux étaient normalisés au niveau national pour que le nombre de cas pondérés soit égal au nombre de cas non pondérés, pour les ménages enquêtés, pour les femmes enquêtées et pour les hommes enquêtés, respectivement. Les poids normalisés sont des poids relatifs et donc ne sont valides que pour calculer des indicateurs comme la moyenne, le ratio et la proportion, mais ils ne sont pas valides pour calculer

des indicateurs comme total. Les poids normalisés ne sont pas valides pour des données combinées issues des enquêtes différentes.

A.5 RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

Les **Tableaux A.5** et **A.6** présentent les résultats détaillés des interviews auprès des ménages, des femmes et des hommes. À la suite du classement des ménages selon les différents codes résultat, le taux net de réponse pour l'enquête ménage (TRM) est calculé comme suit :

$$\frac{100 * R}{R + MP + D + REF + LNT}$$

où : R : nombre de ménages remplis ; MP : nombre de ménages présents mais pas d'enquêté compétent à la maison ; D : nombre de ménages différés ; REF : nombre de ménages refusés et LNT : nombre de logements non trouvés ;

De la même manière, les taux nets de réponse des femmes et celui des hommes sont calculés de la manière suivante :

$$\frac{100 (1)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5)}$$

Le taux net de réponse global des femmes est le produit du taux net de réponse des enquêtes ménage et du taux net de réponse des femmes. Le taux net de réponse global des hommes est le produit du taux net de réponse des ménages sélectionnés pour l'enquête homme et du taux net de réponse des hommes. Les taux nets de réponse des femmes et des hommes éligibles sont équivalents au pourcentage d'interviews complétées.

Tableau A.5 Résultats de l'enquête : Femme

Répartition (en %) des ménages et des femmes éligibles par résultat de l'enquête ménage et individuelle, taux de réponse des ménages, des femmes éligibles et taux de réponse global des femmes, selon la région et le milieu de résidence, (non pondéré), EDS-Continue, Sénégal 2018

Résultat	Résidence		Région				Total
	Urbain	Rural	Nord	Ouest	Centre	Sud	
Ménages sélectionnés							
Rempli (R)	96,6	98,1	96,1	98,7	97,7	97,4	97,5
Ménage présent mais pas d'enquêteur compétent à la maison (MP) enquêté compétent à la maison, au moment de la visite	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Refusé (REF)	0,7	0,2	0,7	0,0	0,9	0,9	0,4
Logement non trouvé (LNT)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ménage absent (MA)	1,0	0,7	0,7	0,6	0,6	1,4	0,8
Logement vide/pas de logement à l'adresse (LV)	1,3	0,8	2,0	0,6	0,9	0,3	1,0
Logement détruit (LD)	0,1	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1
Autre (A)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de ménages sélectionnés	1 804	2 904	440	308	352	352	4 708
Taux de réponse des ménages (TRM) ¹	99,0	99,7	99,3	100,0	99,1	99,1	99,4
Femmes éligibles							
Rempli (FER)	97,3	97,4	96,1	98,0	97,3	97,4	97,3
Pas à la maison (FPM)	1,4	1,3	2,2	1,3	0,6	1,4	1,4
Refusé (FR)	0,6	0,2	1,0	0,0	1,0	0,3	0,3
Partiellement rempli (FPR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Incapacité (FI)	0,6	1,0	0,8	0,7	0,9	0,7	0,8
Autre (FA)	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,3	0,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes	3 605	6 067	836	452	883	729	9 672
Taux de réponse des femmes éligibles (TRFE) ²	97,3	97,4	96,1	98,0	97,3	97,4	97,3
Taux de réponse global des femmes (TRGF) ³	96,3	97,1	95,4	98,0	96,4	96,5	96,8

¹ En utilisant les différents codes résultats utilisés pour classer les ménages selon les catégories de réponse, le taux de réponse pour l'Enquête Ménage (TRM) est calculé comme suit :

$$100 * R$$

$$R + MP + D + R + LNT$$

² Le taux de réponse des femmes éligibles (TRFE) est équivalent au pourcentage d'interviews complétées (FER).

³ Le taux de réponse global des femmes est calculé comme suit (TRGF) :

$$TRGF = TRM * TRFE/100$$

Tableau A.6 Résultats de l'enquête : Homme

Répartition (en %) des ménages et des hommes éligibles par résultat de l'enquête ménage et individuelle, taux de réponse des ménages, des hommes éligibles et taux de réponse global des hommes, selon la région et le milieu de résidence, (non pondéré), EDS-Continue, Sénégal 2018

Résultat des interviews	Résidence		Région				Total
	Urbain	Rural	Nord	Ouest	Centre	Sud	
Ménages sélectionnés							
Rempli (R)	95,6	97,7	95,0	98,1	96,6	96,0	96,9
Ménage présent mais pas d'enquêté compétent à la maison (MP) enquêté compétent à la maison, au moment de la visite	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Refusé (REF)	0,9	0,1	0,9	0,0	0,6	1,1	0,4
Logement non trouvé (LNT)	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ménage absent (MA)	1,6	0,8	0,9	1,3	1,1	2,3	1,1
Logement vide/pas de logement à l'adresse (LV)	1,7	1,2	2,3	0,6	1,7	0,6	1,4
Logement détruit (LD)	0,2	0,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de ménages sélectionnés	902	1 452	220	154	176	176	2 354
Taux de réponse des ménages (TRM) ¹	99,0	99,8	99,1	100,0	99,4	98,8	99,5
Hommes éligibles							
Rempli (HER)	93,5	94,3	94,6	96,0	91,5	90,9	94,0
Pas à la maison (HPM)	4,0	3,2	4,5	2,4	4,1	4,9	3,5
Refusé (HR)	0,9	0,5	0,0	0,0	3,1	0,6	0,6
Partiellement rempli (HPR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Incapacité (HI)	1,1	1,6	0,6	1,2	1,0	1,9	1,4
Autre (HA)	0,5	0,3	0,3	0,4	0,0	1,6	0,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif d'hommes	1 527	2 475	335	251	293	308	4 002
Taux de réponse des hommes éligibles (TRHE) ²	93,5	94,3	94,6	96,0	91,5	90,9	94,0
Taux de réponse global des hommes (TRGH) ³	92,6	94,1	93,7	96,0	90,9	89,8	93,5

¹ En utilisant les différents codes résultats utilisés pour classer les ménages selon les catégories de réponse, le taux de réponse pour l'Enquête Ménage (TRM) est calculé comme suit :

$$100 * R$$

$$\frac{100 * R}{C + HP + P + R + LNT}$$

² Le taux de réponse des hommes éligibles (TRHE) est équivalent au pourcentage d'interviews complétées(HER).

³ Le taux de réponse global des hommes est calculé comme suit (TRGH) :

$$TRGH = TRM * TRHE/100$$

Les estimations obtenues à partir d'une enquête par sondage sont sujettes à deux types d'erreurs : les erreurs de mesure et les erreurs de sondage. Les erreurs de mesure sont celles associées à la mise en œuvre de la collecte et de l'exploitation des données telles que l'omission de ménages sélectionnés, la mauvaise interprétation des questions de la part de l'enquêtrice ou de l'enquêtée, ou les erreurs de saisie des données. Bien que tout le possible ait été fait pour minimiser ce type d'erreur pendant la mise en œuvre de l'EDS Continue 2018, il est difficile d'éviter et d'évaluer toutes les erreurs de mesure.

Par contre, les erreurs de sondage peuvent être évaluées statistiquement. L'échantillon sélectionné pour l'EDS Continue 2018 n'est qu'un parmi un grand nombre d'échantillons de même taille qui peuvent être sélectionnés dans la même population avec le même plan de sondage. Chacun de ces échantillons peut produire des résultats peu différents de ceux obtenus avec l'échantillon actuellement choisi. L'erreur de sondage est une mesure de cette variabilité entre tous les échantillons possibles. Bien que cette variabilité ne puisse pas être mesurée exactement, elle peut être estimée à partir des données collectées.

L'*erreur-type (ET)* est un indice particulièrement utile pour mesurer l'erreur de sondage d'un paramètre (moyenne, proportion ou taux), elle est la racine carrée de la variance du paramètre. L'erreur-type peut être utilisée pour calculer des intervalles de confiance dans lesquels nous considérons que la vraie valeur du paramètre avec un certain niveau de confiance se trouve. Par exemple, la vraie valeur d'un paramètre se trouve dans les limites de sa valeur estimée plus ou moins deux fois son erreur-type, avec un niveau de confiance de 95 %.

Si l'échantillon avait été tiré à partir d'un plan de sondage aléatoire simple, il aurait été possible d'utiliser des formules simples pour calculer les erreurs de sondage. Cependant, l'échantillon de l'EDS Continue 2018 étant un échantillon stratifié et tiré à deux degrés, des formules plus complexes ont été utilisées. Une procédure en SAS a été utilisée pour calculer les erreurs de sondage suivant une méthodologie statistique appropriée. Cette procédure utilise la méthode de linéarisation (Taylor) pour des estimations telles que les moyennes ou proportions, et la méthode de Jackknife pour des estimations plus complexes telles que l'indice synthétique de fécondité et les quotients de mortalité.

La méthode de linéarisation traite chaque proportion ou moyenne comme étant une estimation de ratio, $r = y/x$, avec y la valeur du paramètre pour l'échantillon total, et x le nombre total de cas dans l'ensemble (ou sous-ensemble) de l'échantillon. La variance de r est estimée par :

$$ET^2(r) = var(r) = \frac{1-f}{x^2} \sum_{h=1}^H \left[\frac{m_h}{m_h - 1} \left(\sum_{i=1}^{m_h} z_{hi}^2 - \frac{z_h^2}{m_h} \right) \right]$$

dans laquelle

$$z_{hi} = y_{hi} - rx_{hi}, \text{ et } z_h = y_h - rx_h$$

- où
- h représente la strate qui va de 1 à H,
 - mh est le nombre total de grappes tirées dans la strate h,
 - yhi est la somme des valeurs pondérées du paramètre y dans la grappe i de la strate h,
 - xhi est la somme des nombres pondérés de cas dans la grappe i de la strate h, et
 - f est le taux global de sondage qui est négligeable.

La méthode de Jackknife dérive les estimations des taux complexes à partir de chacun des sous-échantillons de l'échantillon principal, et calcule les variances de ces estimations avec des formules simples. Chaque sous-échantillon exclut une grappe dans les calculs des estimations. Ainsi, des sous-échantillons pseudo-indépendants ont été créés. Dans l'EDS Continue 2018, il y a 214 grappes non-vides. Par conséquent, 214 sous-échantillons ont été créés. La variance d'un taux r est calculée de la façon suivante :

$$ET^2(r) = var(r) = \frac{1}{k(k-1)} \sum_{i=1}^k (r_i - r)^2$$

dans laquelle

$$r_i = kr - (k-1)r_{(i)}$$

où r est l'estimation calculée à partir de l'échantillon principal de 214 grappes,
 $r_{(i)}$ est l'estimation calculée à partir de l'échantillon réduit de 213 grappes ($i^{\text{ème}}$ grappe exclue),
 k est le nombre total de grappes.

Il existe un deuxième indice très utile qui est la racine carrée de l'effet du plan de sondage (DEFT) ou effet de grappe : c'est le rapport de l'erreur-type observée sur l'erreur-type qu'on aurait obtenue si un sondage aléatoire simple avait été utilisé. Cet indice révèle dans quelle mesure le plan de sondage qui a été choisi se rapproche d'un échantillon aléatoire simple de même taille : la valeur 1 de la DEFT indique que le plan de sondage est aussi efficace qu'un échantillon aléatoire simple, alors qu'une valeur supérieure à 1 indique un accroissement de l'erreur de sondage dû à un plan de sondage plus complexe et moins efficace du point de vue statistique. Le logiciel calcule aussi l'erreur relative et l'intervalle de confiance pour chaque estimation.

Les erreurs de sondage pour l'EDS Continue 2018 ont été calculées pour certaines des variables les plus intéressantes. Les résultats de l'enquête sont présentés dans cette annexe pour le Sénégal, pour le milieu urbain et le milieu rural, et pour chacune des 4 zones géographiques. Pour chaque variable, le type de statistique (moyenne, proportion) et la population de base sont présentés dans le tableau B.1. Les tableaux B.2 à B.18 présentent la valeur de la statistique (M), l'erreur-type (ET), le nombre de cas non-pondérés (N) et pondérés (N'), la racine carrée de l'effet du plan de sondage (DEFT), l'erreur relative (ET/M), et l'intervalle de confiance à 95 % ($M \pm 2ET$) pour chaque variable. L'effet du plan de sondage (DEFT) est non-défini quand l'écart type sous l'échantillon aléatoire simple est zéro (quand l'estimation est proche de 0 ou 1).

L'intervalle de confiance est interprété de la manière suivante : pour la variable Enfants nés vivants, l'EDS Continue 2018 a donné un nombre moyen d'enfants nés vivants de 2,323 pour l'ensemble des femmes, auquel correspond une erreur-type de 0,050 enfants. Dans 95 % des échantillons de taille et de caractéristiques identiques, la valeur réelle du nombre moyen d'enfants nés vivants des femmes âgées de 15 à 49 ans se trouve entre $2,323 - 2 \times 0,050$ et $2,323 + 2 \times 0,050$, soit 2,224 et 2,422.

Pour l'échantillon national de femmes, la moyenne de la racine carrée de l'effet du plan de sondage (DEFT) calculée pour l'ensemble des estimations est de 1,753 ce qui veut dire que, par rapport à un échantillon aléatoire simple, l'erreur de sondage est multipliée en moyenne par un facteur de 1,753 parce qu'on utilise un plan de sondage complexe (par grappes et à plusieurs degrés) et moins efficace.

Tableau B.1 Erreurs de sondage : Échantillon Total, EDS Continue Sénégal 2018

Variables	Estimation	Population de base
FEMME		
Milieu urbain	Proportion	Toutes les femmes 15-49 ans
Alphabétisation	Proportion	Toutes les femmes 15-49 ans
Aucune instruction	Proportion	Toutes les femmes 15-49 ans
Niveau secondaire ou plus	Proportion	Toutes les femmes 15-49 ans
Jamais mariée/jamais en union	Proportion	Toutes les femmes 15-49 ans
Actuellement mariée/en union	Proportion	Toutes les femmes 15-49 ans
Actuellement enceinte	Proportion	Toutes les femmes 15-49 ans
Mariée/en union avant l'âge de 20 ans	Proportion	Femmes 25-49 ans
Enfants nés vivants	Moyenne	Toutes les femmes 15-49 ans
Enfants survivants	Moyenne	Toutes les femmes 15-49 ans
Enfants nés vivants des femmes de 40-49ans	Proportion	Femmes 40-49 ans
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	Proportion	Femmes 20-49 ans
Connait une méthode contraceptive	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Connait une méthode moderne	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise une méthode au moment quelconque	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement une méthode	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement une méthode moderne	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement la pilule	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement le DIU	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement des injectables	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement Norplan	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement des condoms masculins	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement la stérilisation féminine	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement la méthode du rythme	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement le retrait	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
A utilisé une source du secteur public	Proportion	Utilisatrice de méthodes modernes
Ne veut plus d'enfant	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Veut espacer la prochaine naissance de 2ans	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Nombre idéal d'enfants	Moyenne	Toutes les femmes 15-49 ans
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	Proportion	Naissances dans les 5 dernières années
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	Proportion	Enfants de moins de 5 ans
Traités avec des SRO	Proportion	Enfants avec diarrhée les 2 dernières semaines
Traitement médical recherché	Proportion	Enfants avec diarrhée les 2 dernières semaines
Carnet de vaccination montré	Proportion	Enfants âgés de 12-23 mois
A reçu le vaccin du BCG	Proportion	Enfants âgés de 12-23 mois
A reçu le vaccin du HepB à la naissance	Proportion	Enfants âgés de 12-23 mois
A reçu le vaccin du DPT HepB-Hib (3 doses)	Proportion	Enfants âgés de 12-23 mois
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	Proportion	Enfants âgés de 12-23 mois
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	Proportion	Enfants âgés de 12-23 mois
A reçu le vaccin contre le pneumococcal (3 doses)	Proportion	Enfants âgés de 12-23 mois
A reçu le vaccin contre le rotavirus (2 doses)	Proportion	Enfants âgés de 12-23 mois
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12-23)	Proportion	Enfants âgés de 12-23 mois
A reçu tous les vaccins de base	Proportion	Enfants âgés de 12-23 mois
Retard de croissance (-2ET)	Proportion	Enfants de moins de 5 ans
Insuffisance pondérale (-2ET)	Proportion	Enfants de moins de 5 ans
Emaciation (-2ET)	Proportion	Enfants de moins de 5 ans
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	Taux	Femmes-années d'exposition au risque de grossesse
Quotient de mortalité néonatale ¹	Taux	Nombre d'enfants exposés au décès
Quotient de mortalité post-néonatale ¹	Taux	Nombre d'enfants exposés au décès
Quotient de mortalité infantile ¹	Taux	Nombre d'enfants exposés au décès
Quotient de mortalité juvénile ¹	Taux	Nombre d'enfants exposés au décès
Quotient de mortalité infanto-juvénile ¹	Taux	Nombre d'enfants exposés au décès
HOMME		
Milieu urbain	Proportion	Tous les hommes 15-49ans
Aucune instruction	Proportion	Tous les hommes 15-49ans
Niveau secondaire ou plus	Proportion	Tous les hommes 15-49ans
Jamais mariée/jamais en union	Proportion	Tous les hommes 15-49ans
Actuellement marié/en union	Proportion	Tous les hommes 15-49ans
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	Proportion	Hommes 20-49ans
Ne veut plus d'enfant	Proportion	Hommes actuellement mariés (en union) 15-49ans
Veut espacer la prochaine naissance de 2ans	Proportion	Hommes actuellement mariés (en union) 15-49ans
Nombre idéal d'enfants	Moyenne	Tous les hommes 15-49ans

¹ 5 dernières années pour le taux national, et 10 dernières années pour le taux régional.

Tableau B.2 Erreurs de sondage : Échantillon Total, EDS Continue Sénégal 2018

Variable	Valeur (M)	Erreur Type (ET)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance		Effet du plan (DEFT)	Effectif	
				Plus bas (M-2ET)	Supérieur (M+2ET)		Pondéré	Non pondéré
FEMME								
Milieu urbain	0,480	0,017	0,035	0,447	0,513	3,245	9414	9414
Alphabétisation	0,487	0,015	0,030	0,459	0,516	2,822	9414	9414
Aucune instruction	0,457	0,016	0,034	0,427	0,488	3,022	9414	9414
Niveau secondaire ou plus	0,323	0,014	0,045	0,294	0,351	2,996	9414	9414
Jamais mariée/jamais en union	0,305	0,010	0,033	0,285	0,325	2,130	9414	9414
Actuellement mariée/en union	0,639	0,012	0,019	0,615	0,662	2,418	9414	9414
Actuellement enceinte	0,079	0,004	0,054	0,070	0,087	1,535	9414	9414
Mariée/en union avant l'âge de 20 ans	0,457	0,012	0,026	0,433	0,481	2,059	7358	7206
Enfants nés vivants	2,323	0,050	0,022	2,224	2,422	1,886	9414	9414
Enfants survivants	2,140	0,045	0,021	2,051	2,230	1,869	9414	9414
Enfants nés vivants des femmes de 40-49ans	5,271	0,101	0,019	5,073	5,470	1,413	1542	1509
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,338	0,010	0,030	0,318	0,358	1,808	7358	7206
Connait une méthode contraceptive	0,973	0,003	0,003	0,967	0,979	1,517	6013	6381
Connait une méthode moderne	0,973	0,003	0,003	0,967	0,979	1,518	6013	6381
Utilise une méthode au moment quelconque	0,494	0,012	0,024	0,471	0,518	1,917	6013	6381
Utilise actuellement une méthode	0,271	0,009	0,035	0,253	0,290	1,699	6013	6381
Utilise actuellement une méthode moderne	0,254	0,009	0,037	0,236	0,273	1,703	6013	6381
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,017	0,003	0,156	0,012	0,022	1,641	6013	6381
Utilise actuellement la pilule	0,042	0,004	0,091	0,034	0,049	1,510	6013	6381
Utilise actuellement le DIU	0,023	0,004	0,153	0,016	0,030	1,875	6013	6381
Utilise actuellement des injectables	0,087	0,006	0,064	0,076	0,098	1,573	6013	6381
Utilise actuellement Norplan	0,088	0,006	0,068	0,076	0,100	1,698	6013	6381
Utilise actuellement des condoms masculins	0,005	0,001	0,285	0,002	0,008	1,594	6013	6381
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,005	0,001	0,264	0,002	0,007	1,424	6013	6381
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,008	0,002	0,258	0,004	0,012	1,839	6013	6381
Utilise actuellement le retrait	0,001	0,001	0,410	0,000	0,003	1,234	6013	6381
A utilisé une source du secteur public	0,889	0,012	0,013	0,866	0,912	1,497	1709	1591
Ne veut plus d'enfant	0,196	0,007	0,038	0,181	0,211	1,504	6013	6381
Veut espacer la prochaine naissance de 2ans	0,417	0,008	0,019	0,401	0,433	1,284	6013	6381
Nombre idéal d'enfants	5,398	0,058	0,011	5,283	5,512	2,508	8050	7696
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,742	0,014	0,019	0,714	0,770	2,623	6064	6719
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,171	0,009	0,053	0,154	0,189	1,932	5820	6445
Traités avec des SRO	0,303	0,019	0,064	0,264	0,341	1,436	998	1154
Traitement médical recherché	0,456	0,023	0,050	0,411	0,501	1,542	998	1155
Carnet de vaccination montré	0,799	0,014	0,018	0,770	0,827	1,320	1227	1337
A reçu le vaccin du BCG	0,953	0,008	0,008	0,937	0,969	1,379	1227	1337
A reçu le vaccin du HepB à la naissance	0,738	0,018	0,024	0,703	0,773	1,467	1227	1337
A reçu le vaccin du DPT HepB-Hib (3 doses)	0,926	0,010	0,011	0,906	0,945	1,382	1227	1337
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,783	0,017	0,022	0,749	0,817	1,539	1227	1337
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,850	0,016	0,019	0,819	0,881	1,627	1227	1337
A reçu le vaccin contre le pneumococcal (3 doses)	0,923	0,010	0,011	0,903	0,943	1,369	1227	1337
A reçu le vaccin contre le rotavirus (2 doses)	0,933	0,010	0,010	0,913	0,952	1,387	1227	1337
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12-23)	0,855	0,014	0,016	0,828	0,881	1,408	1227	1337
A reçu tous les vaccins de base	0,766	0,020	0,027	0,726	0,806	1,755	1227	1337
Retard de croissance (-2ET)	0,188	0,011	0,058	0,167	0,210	2,278	6074	6670
Insuffisance pondérale (-2ET)	0,150	0,009	0,059	0,133	0,168	2,023	6071	6666
Emaciation (-2ET)	0,078	0,005	0,064	0,069	0,088	1,522	6053	6644
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	4,357	0,166	0,038	4,024	4,689	1,596	26301	26187
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-4 ans)	23,408	2,368	0,101	18,672	28,144	1,119	6057	6729
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-4 ans)	13,398	2,365	0,177	8,668	18,128	1,521	6028	6700
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-4 ans)	36,806	3,235	0,088	30,335	43,277	1,231	6061	6735
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-4 ans)	14,643	1,966	0,134	10,711	18,574	1,231	5967	6587
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-4 ans)	50,910	3,777	0,074	43,356	58,463	1,224	6104	6791
HOMME								
Milieu urbain	0,490	0,023	0,047	0,444	0,535	2,663	3389	3396
Aucune instruction	0,369	0,024	0,066	0,321	0,418	2,949	3389	3396
Niveau secondaire ou plus	0,378	0,025	0,066	0,329	0,427	2,986	3389	3396
Jamais mariée/jamais en union	0,595	0,011	0,018	0,574	0,616	1,267	3389	3396
Actuellement marié/en union	0,389	0,012	0,030	0,366	0,413	1,416	3389	3396
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,134	0,007	0,054	0,120	0,149	1,061	2526	2467
Ne veut plus d'enfant	0,036	0,007	0,185	0,023	0,049	1,308	1319	1353
Veut espacer la prochaine naissance de 2ans	0,433	0,019	0,045	0,395	0,471	1,438	1319	1353
Nombre idéal d'enfants	6,503	0,164	0,025	6,179	6,827	1,766	2365	2323

Tableau B.3 Erreurs de sondage : Échantillon Urbain, EDS Continue Sénégal 2018

Variable	Valeur (M)	Erreur Type (ET)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance		Effet du plan (DEFT)	Effectif	
				Plus bas (M-2ET)	Supérieur (M+2ET)		Pondéré	Non pondéré
FEMME								
Milieu urbain	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	na	4518	3506
Alphabétisation	0,656	0,022	0,033	0,613	0,698	3,065	4518	3506
Aucune instruction	0,272	0,020	0,073	0,233	0,311	3,006	4518	3506
Niveau secondaire ou plus	0,456	0,024	0,052	0,409	0,503	3,218	4518	3506
Jamais mariée/jamais en union	0,373	0,017	0,046	0,340	0,407	2,379	4518	3506
Actuellement mariée/en union	0,544	0,021	0,038	0,504	0,585	2,786	4518	3506
Actuellement enceinte	0,065	0,007	0,114	0,051	0,080	2,017	4518	3506
Mariée/en union avant l'âge de 20 ans	0,310	0,018	0,058	0,274	0,345	2,314	3652	2734
Enfants nés vivants	1,784	0,077	0,043	1,632	1,935	2,430	4518	3506
Enfants survivants	1,684	0,070	0,042	1,546	1,823	2,359	4518	3506
Enfants nés vivants des femmes de 40-49ans	4,085	0,148	0,036	3,794	4,376	1,632	739	567
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,233	0,015	0,064	0,204	0,263	2,109	3652	2734
Connait une méthode contraceptive	0,995	0,001	0,001	0,993	0,997	,811	2460	2048
Connait une méthode moderne	0,995	0,001	0,001	0,993	0,997	,811	2460	2048
Utilise une méthode au moment quelconque	0,633	0,017	0,027	0,599	0,667	1,820	2460	2048
Utilise actuellement une méthode	0,354	0,017	0,047	0,321	0,387	1,772	2460	2048
Utilise actuellement une méthode moderne	0,334	0,015	0,045	0,305	0,364	1,621	2460	2048
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,020	0,005	0,273	0,009	0,030	1,980	2460	2048
Utilise actuellement la pilule	0,065	0,008	0,125	0,049	0,081	1,675	2460	2048
Utilise actuellement le DIU	0,032	0,007	0,208	0,019	0,045	1,937	2460	2048
Utilise actuellement des injectables	0,110	0,011	0,101	0,088	0,131	1,814	2460	2048
Utilise actuellement Norplan	0,103	0,012	0,113	0,080	0,126	1,958	2460	2048
Utilise actuellement des condoms masculins	0,009	0,003	0,355	0,003	0,016	1,773	2460	2048
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,006	0,003	0,401	0,001	0,012	1,650	2460	2048
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,014	0,005	0,348	0,004	0,024	2,117	2460	2048
Utilise actuellement le retrait	0,002	0,001	0,498	0,000	0,005	1,249	2460	2048
A utilisé une source du secteur public	0,833	0,019	0,023	0,795	0,870	1,506	962	691
Ne veut plus d'enfant	0,206	0,015	0,075	0,175	0,236	1,946	2460	2048
Veut espacer la prochaine naissance de 2ans	0,409	0,014	0,034	0,382	0,437	1,460	2460	2048
Nombre idéal d'enfants	4,719	0,072	0,015	4,578	4,861	2,675	4034	2994
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,923	0,011	0,012	0,901	0,945	2,138	2293	1964
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,164	0,020	0,124	0,124	0,204	2,712	2210	1903
Traités avec des SRO	0,302	0,036	0,118	0,232	0,373	1,596	363	356
Traitement médical recherché	0,500	0,044	0,088	0,413	0,587	1,804	363	356
Carnet de vaccination montré	0,792	0,027	0,034	0,740	0,845	1,485	468	390
A reçu le vaccin du BCG	0,984	0,008	0,009	0,967	1,001	1,538	468	390
A reçu le vaccin du HepB à la naissance	0,777	0,031	0,040	0,715	0,838	1,696	468	390
A reçu le vaccin du DPT HepB-Hib (3 doses)	0,945	0,016	0,017	0,914	0,976	1,552	468	390
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,857	0,026	0,031	0,806	0,909	1,694	468	390
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,853	0,032	0,037	0,791	0,916	2,026	468	390
A reçu le vaccin contre le pneumococcal (3 doses)	0,943	0,016	0,017	0,912	0,974	1,532	468	390
A reçu le vaccin contre le rotavirus (2 doses)	0,954	0,016	0,017	0,921	0,987	1,516	468	390
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12-23)	0,860	0,027	0,032	0,806	0,915	1,790	468	390
A reçu tous les vaccins de base	0,766	0,043	0,056	0,682	0,850	2,273	468	390
Retard de croissance (-2ET)	0,127	0,024	0,190	0,079	0,174	3,611	2266	1946
Insuffisance pondérale (-2ET)	0,113	0,019	0,165	0,076	0,149	2,936	2265	1944
Emaciation (-2ET)	0,064	0,007	0,108	0,051	0,078	1,407	2257	1938
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	3,207	0,139	0,043	2,928	3,486	1,287	12738	9811
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-4 ans)	19,912	4,425	0,222	11,062	28,763	1,163	2282	1963
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-4 ans)	12,115	5,672	0,468	0,771	23,458	1,786	2270	1956
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-4 ans)	32,027	6,941	0,217	18,145	45,908	1,430	2282	1964
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-4 ans)	9,404	3,597	0,382	2,211	16,598	1,565	2265	1899
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-4 ans)	41,130	7,443	0,181	26,243	56,017	1,388	2290	1973
HOMME								
Milieu urbain	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	na	1839	1428
Aucune instruction	0,227	0,034	0,148	0,161	0,294	3,446	1839	1428
Niveau secondaire ou plus	0,497	0,043	0,086	0,413	0,581	3,647	1839	1428
Jamais mariée/jamais en union	0,558	0,016	0,029	0,527	0,590	1,376	1839	1428
Actuellement marié/en union	0,408	0,018	0,045	0,372	0,445	1,613	1839	1428
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,142	0,010	0,067	0,124	0,161	1,038	1483	1097
Ne veut plus d'enfant	0,083	0,019	0,225	0,046	0,120	1,873	751	554
Veut espacer la prochaine naissance de 2ans	0,381	0,031	0,082	0,319	0,443	1,787	751	554
Nombre idéal d'enfants	5,805	0,230	0,040	5,353	6,258	1,987	1412	1075

Tableau B.4 Erreurs de sondage : Échantillon Rural, EDS Continue Sénégal 2018

Variable	Valeur (M)	Erreur Type (ET)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance		Effet du plan (DEFT)	Effectif	
				Plus bas (M-2ET)	Supérieur (M+2ET)		Pondéré	Non pondéré
FEMME								
Milieu urbain	0,000	0,000	na	0,000	0,000	na	4896	5908
Alphabétisation	0,332	0,015	0,044	0,303	0,361	2,190	4896	5908
Aucune instruction	0,628	0,018	0,029	0,592	0,664	2,630	4896	5908
Niveau secondaire ou plus	0,200	0,012	0,062	0,175	0,225	2,185	4896	5908
Jamais mariée/jamais en union	0,242	0,011	0,044	0,221	0,263	1,738	4896	5908
Actuellement mariée/en union	0,726	0,011	0,015	0,705	0,747	1,682	4896	5908
Actuellement enceinte	0,091	0,004	0,046	0,083	0,100	1,025	4896	5908
Mariée/en union avant l'âge de 20 ans	0,603	0,013	0,021	0,577	0,628	1,593	3705	4472
Enfants nés vivants	2,820	0,057	0,020	2,707	2,934	1,412	4896	5908
Enfants survivants	2,561	0,052	0,020	2,458	2,664	1,419	4896	5908
Enfants nés vivants des femmes de 40-49ans	6,364	0,111	0,017	6,145	6,584	1,201	802	942
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,442	0,014	0,032	0,413	0,470	1,729	3705	4472
Connait une méthode contraceptive	0,957	0,005	0,005	0,947	0,967	1,542	3553	4333
Connait une méthode moderne	0,957	0,005	0,005	0,947	0,967	1,544	3553	4333
Utilise une méthode au moment quelconque	0,398	0,016	0,039	0,367	0,429	1,957	3553	4333
Utilise actuellement une méthode	0,214	0,010	0,049	0,194	0,235	1,560	3553	4333
Utilise actuellement une méthode moderne	0,199	0,011	0,055	0,178	0,220	1,669	3553	4333
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,015	0,003	0,168	0,010	0,020	1,283	3553	4333
Utilise actuellement la pilule	0,026	0,004	0,136	0,019	0,033	1,358	3553	4333
Utilise actuellement le DIU	0,017	0,004	0,217	0,010	0,024	1,744	3553	4333
Utilise actuellement des injectables	0,072	0,005	0,071	0,062	0,082	1,210	3553	4333
Utilise actuellement Norplan	0,078	0,006	0,076	0,066	0,090	1,360	3553	4333
Utilise actuellement des condoms masculins	0,002	0,001	0,317	0,001	0,003	,797	3553	4333
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,003	0,001	0,313	0,001	0,005	1,092	3553	4333
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,004	0,001	0,226	0,002	0,005	,849	3553	4333
Utilise actuellement le retrait	0,001	0,001	0,719	0,000	0,002	1,197	3553	4333
A utilisé une source du secteur public	0,962	0,008	0,009	0,945	0,978	1,150	747	900
Ne veut plus d'enfant	0,189	0,007	0,035	0,176	0,202	1,037	3553	4333
Veut espacer la prochaine naissance de 2ans	0,422	0,009	0,022	0,404	0,441	1,154	3553	4333
Nombre idéal d'enfants	6,080	0,066	0,011	5,948	6,211	1,936	4016	4702
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,632	0,019	0,029	0,595	0,669	2,490	3771	4755
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,176	0,008	0,044	0,161	0,191	1,292	3610	4542
Traités avec des SRO	0,303	0,023	0,075	0,258	0,348	1,337	635	798
Traitement médical recherché	0,431	0,024	0,057	0,383	0,479	1,333	635	799
Carnet de vaccination montré	0,803	0,017	0,021	0,770	0,836	1,204	758	947
A reçu le vaccin du BCG	0,934	0,012	0,013	0,910	0,957	1,351	758	947
A reçu le vaccin du HepB à la naissance	0,714	0,021	0,030	0,672	0,757	1,366	758	947
A reçu le vaccin du DPT HepB-Hib (3 doses)	0,914	0,013	0,014	0,889	0,939	1,303	758	947
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,737	0,022	0,030	0,694	0,780	1,426	758	947
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,848	0,017	0,020	0,815	0,880	1,328	758	947
A reçu le vaccin contre le pneumococcal (3 doses)	0,910	0,013	0,014	0,885	0,936	1,292	758	947
A reçu le vaccin contre le rotavirus (2 doses)	0,919	0,012	0,013	0,896	0,943	1,334	758	947
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12-23)	0,851	0,014	0,016	0,824	0,878	1,120	758	947
A reçu tous les vaccins de base	0,766	0,020	0,026	0,727	0,805	1,340	758	947
Retard de croissance (-2ET)	0,225	0,011	0,048	0,204	0,246	1,673	3808	4724
Insuffisance pondérale (-2ET)	0,173	0,009	0,054	0,154	0,191	1,609	3806	4722
Emaciation (-2ET)	0,087	0,007	0,080	0,073	0,101	1,600	3796	4706
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	5,461	0,162	0,030	5,137	5,786	1,807	13564	16377
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-4 ans)	25,521	2,726	0,107	20,069	30,973	1,099	3776	4766
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-4 ans)	14,174	1,728	0,122	10,718	17,629	1,003	3758	4744
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-4 ans)	39,695	3,116	0,078	33,463	45,926	1,012	3779	4771
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-4 ans)	17,847	2,278	0,128	13,292	22,402	1,067	3702	4688
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-4 ans)	56,833	4,066	0,072	48,701	64,965	1,078	3814	4818
HOMME								
Milieu urbain	0,000	0,000	na	0,000	0,000	na	1925	2336
Aucune instruction	0,540	0,025	0,046	0,492	0,589	2,166	1925	2336
Niveau secondaire ou plus	0,245	0,016	0,066	0,213	0,277	1,660	1925	2336
Jamais mariée/jamais en union	0,516	0,011	0,021	0,494	0,537	,959	1925	2336
Actuellement marié/en union	0,477	0,011	0,023	0,455	0,499	,967	1925	2336
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,123	0,010	0,080	0,104	0,143	1,115	1418	1738
Ne veut plus d'enfant	0,061	0,009	0,155	0,042	0,079	1,207	918	1146
Veut espacer la prochaine naissance de 2ans	0,380	0,019	0,049	0,344	0,417	1,173	918	1146
Nombre idéal d'enfants	7,681	0,164	0,021	7,357	8,005	1,173	1188	1478

Tableau B.5 Erreurs de sondage : Échantillon Nord, EDS Continue Sénégal 2018

Variables	Valeur (M)	Erreur Type (ET)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance		Effet du plan (DEFT)	Effectif	
				Plus bas (M-2ET)	Supérieur (M+2ET)		Pondéré	Non pondéré
FEMME								
Milieu urbain	0,306	0,030	0,098	0,246	0,365	2,581	1565	1994
Alphabétisation	0,394	0,020	0,051	0,354	0,433	1,620	1565	1994
Aucune instruction	0,546	0,023	0,042	0,501	0,591	1,806	1565	1994
Niveau secondaire ou plus	0,229	0,017	0,074	0,196	0,262	1,589	1565	1994
Jamais mariée/jamais en union	0,268	0,015	0,056	0,238	0,298	1,349	1565	1994
Actuellement mariée/en union	0,687	0,014	0,021	0,659	0,716	1,224	1565	1994
Actuellement enceinte	0,078	0,007	0,085	0,065	0,091	0,980	1565	1994
Mariée/en union avant l'âge de 20 ans	0,538	0,025	0,047	0,488	0,587	1,708	1175	1502
Enfants nés vivants	2,473	0,093	0,038	2,289	2,656	1,398	1565	1994
Enfants survivants	2,319	0,086	0,037	2,149	2,490	1,388	1565	1994
Enfants nés vivants des femmes de 40-49ans	5,410	0,167	0,031	5,081	5,739	1,041	267	349
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,367	0,025	0,068	0,318	0,416	1,759	1175	1502
Connaît une méthode contraceptive	0,984	0,004	0,004	0,976	0,992	1,032	1076	1355
Connaît une méthode moderne	0,983	0,004	0,004	0,975	0,991	1,069	1076	1355
Utilise une méthode au moment quelconque	0,440	0,029	0,066	0,383	0,497	1,964	1076	1355
Utilise actuellement une méthode	0,233	0,021	0,092	0,191	0,275	1,714	1076	1355
Utilise actuellement une méthode moderne	0,228	0,021	0,092	0,186	0,269	1,693	1076	1355
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,005	0,002	0,425	0,001	0,009	1,024	1076	1355
Utilise actuellement la pilule	0,055	0,008	0,141	0,040	0,070	1,152	1076	1355
Utilise actuellement le DIU	0,015	0,004	0,239	0,008	0,022	0,996	1076	1355
Utilise actuellement des injectables	0,088	0,012	0,132	0,065	0,111	1,385	1076	1355
Utilise actuellement Norplan	0,062	0,008	0,136	0,045	0,078	1,179	1076	1355
Utilise actuellement des condoms masculins	0,001	0,001	0,742	-0,001	0,003	0,873	1076	1355
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,005	0,002	0,399	0,001	0,009	0,947	1076	1355
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,002	0,001	0,515	0,000	0,005	0,867	1076	1355
Utilise actuellement le retrait	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1076	1355	1355
A utilisé une source du secteur public	0,957	0,010	0,010	0,938	0,976	0,728	249	297
Ne veut plus d'enfant	0,164	0,011	0,070	0,141	0,186	1,046	1076	1355
Veut espacer la prochaine naissance de 2ans	0,386	0,015	0,039	0,356	0,416	1,056	1076	1355
Nombre idéal d'enfants	5,458	0,084	0,015	5,293	5,623	1,330	1165	1468
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,665	0,038	0,058	0,589	0,740	2,699	997	1279
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,130	0,013	0,097	0,105	0,154	1,214	952	1223
Traités avec des SRO	0,248	0,030	0,122	0,188	0,307	0,833	123	159
Traitement médical recherché	0,395	0,043	0,109	0,310	0,480	1,053	123	159
Carnet de vaccination montré	0,737	0,030	0,040	0,678	0,795	1,005	203	255
A reçu le vaccin du BCG	0,970	0,011	0,012	0,947	0,993	0,999	203	255
A reçu le vaccin du HepB à la naissance	0,788	0,031	0,039	0,727	0,850	1,133	203	255
A reçu le vaccin du DPT HepB-Hib (3 doses)	0,931	0,019	0,021	0,893	0,969	1,123	203	255
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,701	0,050	0,071	0,602	0,800	1,622	203	255
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,764	0,032	0,041	0,701	0,826	1,109	203	255
A reçu le vaccin contre le pneumococcal (3 doses)	0,935	0,020	0,021	0,896	0,974	1,179	203	255
A reçu le vaccin contre le rotavirus (2 doses)	0,960	0,015	0,015	0,930	0,989	1,212	203	255
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12-23)	0,874	0,027	0,031	0,821	0,927	1,206	203	255
A reçu tous les vaccins de base	0,702	0,032	0,046	0,638	0,766	1,055	203	255
Retard de croissance (-2ET)	0,174	0,016	0,092	0,142	0,205	1,401	1012	1278
Insuffisance pondérale (-2ET)	0,187	0,017	0,091	0,154	0,221	1,461	1011	1276
Emaciation (-2ET)	0,110	0,015	0,135	0,081	0,139	1,581	1008	1272
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	4,545	0,289	0,064	3,967	5,124	2,135	4308	5503
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-4 ans)	25,112	3,448	0,137	18,216	32,007	1,006	2067	2643
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-4 ans)	15,393	2,638	0,171	10,117	20,669	1,067	2068	2645
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-4 ans)	40,505	4,935	0,122	30,634	50,375	1,154	2067	2644
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-4 ans)	13,915	2,959	0,213	7,997	19,834	1,143	2049	2627
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-4 ans)	53,856	6,302	0,117	41,252	66,460	1,299	2073	2651
HOMME								
Milieu urbain	0,318	0,032	0,102	0,254	0,382	1,738	624	766
Aucune instruction	0,483	0,033	0,068	0,418	0,547	1,635	624	766
Niveau secondaire ou plus	0,265	0,024	0,091	0,217	0,313	1,367	624	766
Jamais mariée/jamais en union	0,531	0,019	0,037	0,492	0,569	0,972	624	766
Actuellement marié/en union	0,458	0,019	0,043	0,419	0,496	0,978	624	766
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 &ns	0,154	0,019	0,126	0,116	0,192	1,145	465	569
Ne veut plus d'enfant	0,071	0,013	0,178	0,046	0,096	0,837	286	340
Veut espacer la prochaine naissance de 2ans	0,466	0,033	0,071	0,400	0,532	1,138	286	340
Nombre idéal d'enfants	7,183	0,249	0,035	6,692	7,675	1,170	466	572

Tableau B.6 Erreurs de sondage : Échantillon Ouest, EDS Continue Sénégal 2018

Variables	Valeur (M)	Erreur Type (ET)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance		Effet du plan (DEFT)	Effectif	
				Plus bas (M-2ET)	Supérieur (M+2ET)		Pondéré	Non pondéré
FEMME								
Milieu urbain	0,824	0,016	0,019	0,793	0,855	2,506	3725	1643
Alphabétisation	0,656	0,027	0,041	0,603	0,710	3,478	3725	1643
Aucune instruction	0,270	0,025	0,094	0,220	0,320	3,477	3725	1643
Niveau secondaire ou plus	0,459	0,029	0,063	0,402	0,516	3,524	3725	1643
Jamais mariée/jamais en union	0,379	0,021	0,056	0,337	0,421	2,688	3725	1643
Actuellement mariée/en union	0,539	0,026	0,047	0,488	0,589	3,130	3725	1643
Actuellement enceinte	0,067	0,009	0,134	0,050	0,085	2,193	3725	1643
Mariée/en union avant l'âge de 20 ans	0,291	0,021	0,072	0,250	0,332	2,519	3050	1312
Enfants nés vivants	1,796	0,094	0,052	1,611	1,981	2,634	3725	1643
Enfants survivants	1,703	0,085	0,050	1,534	1,872	2,551	3725	1643
Enfants nés vivants des femmes de 40-49ans	4,246	0,176	0,041	3,900	4,593	1,704	613	272
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,220	0,018	0,081	0,185	0,255	2,344	3050	1312
Connait une méthode contraceptive	0,998	0,001	0,001	0,997	1,000	0,981	2007	946
Connait une méthode moderne	0,998	0,001	0,001	0,997	1,000	0,981	2007	946
Utilise une méthode au moment quelconque	0,650	0,021	0,033	0,608	0,692	2,060	2007	946
Utilise actuellement une méthode	0,370	0,020	0,054	0,331	0,410	1,904	2007	946
Utilise actuellement une méthode moderne	0,348	0,018	0,050	0,313	0,382	1,700	2007	946
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,023	0,006	0,282	0,010	0,035	1,983	2007	946
Utilise actuellement la pilule	0,066	0,010	0,150	0,047	0,086	1,848	2007	946
Utilise actuellement le DIU	0,034	0,008	0,236	0,018	0,050	2,056	2007	946
Utilise actuellement des injectables	0,120	0,013	0,108	0,095	0,146	1,837	2007	946
Utilise actuellement Norplan	0,101	0,014	0,142	0,073	0,129	2,196	2007	946
Utilise actuellement des condoms masculins	0,010	0,004	0,396	0,002	0,018	1,865	2007	946
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,006	0,003	0,530	0,000	0,012	1,862	2007	946
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,018	0,006	0,330	0,006	0,030	2,074	2007	946
Utilise actuellement le retrait	0,001	0,001	0,840	-0,001	0,003	1,328	2007	946
A utilisé une source du secteur public	0,834	0,021	0,026	0,792	0,876	1,593	823	373
Ne veut plus d'enfant	0,221	0,018	0,082	0,186	0,257	2,009	2007	946
Veut espacer la prochaine naissance de 2ans	0,421	0,016	0,039	0,389	0,453	1,531	2007	946
Nombre idéal d'enfants	4,772	0,087	0,018	4,601	4,944	2,919	3438	1524
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,920	0,015	0,016	0,890	0,949	2,512	1899	900
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,148	0,025	0,168	0,099	0,197	3,145	1828	870
Traités avec des SRO	0,321	0,047	0,146	0,229	0,413	1,767	270	127
Traitement médical recherché	0,551	0,057	0,103	0,440	0,663	2,014	270	127
Carnet de vaccination montré	0,805	0,031	0,038	0,744	0,865	1,588	385	178
A reçu le vaccin du BCG	0,987	0,010	0,010	0,967	1,007	1,832	385	178
A reçu le vaccin du HepB à la naissance	0,737	0,039	0,053	0,660	0,813	1,806	385	178
A reçu le vaccin du DPT HepB-Hib (3 doses)	0,971	0,017	0,018	0,937	1,005	2,098	385	178
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,854	0,033	0,038	0,789	0,919	1,899	385	178
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,909	0,035	0,039	0,839	0,978	2,510	385	178
A reçu le vaccin contre le pneumococcal (3 doses)	0,971	0,017	0,018	0,937	1,005	2,098	385	178
A reçu le vaccin contre le rotavirus (2 doses)	0,967	0,018	0,019	0,930	1,004	1,349	385	178
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12-23)	0,875	0,031	0,036	0,813	0,936	1,928	385	178
A reçu tous les vaccins de base	0,808	0,049	0,061	0,712	0,905	2,555	385	178
Retard de croissance (-2ET)	0,125	0,029	0,236	0,067	0,183	4,033	1862	888
Insuffisance pondérale (-2ET)	0,103	0,023	0,224	0,057	0,148	3,427	1862	888
Emaciation (-2ET)	0,063	0,008	0,125	0,047	0,078	1,459	1854	883
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	3,155	0,181	0,057	2,793	3,516	1,066	10543	4630
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-4 ans)	18,591	4,138	0,223	10,315	26,867	1,116	3704	1764
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-4 ans)	13,652	3,482	0,255	6,687	20,616	1,027	3688	1758
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-4 ans)	32,242	6,251	0,194	19,741	44,744	1,257	3704	1764
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-4 ans)	6,825	2,676	0,392	1,472	12,178	1,250	3656	1738
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-4 ans)	38,847	6,991	0,180	24,865	52,830	1,304	3709	1768
HOMME								
Milieu urbain	0,829	0,021	0,026	0,787	0,871	2,175	1480	646
Aucune instruction	0,224	0,042	0,187	0,141	0,307	3,868	1480	646
Niveau secondaire ou plus	0,498	0,053	0,106	0,394	0,601	4,046	1480	646
Jamais mariée/jamais en union	0,549	0,019	0,035	0,512	0,587	1,468	1480	646
Actuellement marié/en union	0,416	0,022	0,054	0,372	0,460	1,744	1480	646
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,148	0,012	0,078	0,125	0,171	1,120	1204	509
Ne veut plus d'enfant	0,086	0,024	0,280	0,039	0,133	2,150	616	266
Veut espacer la prochaine naissance de 2ans	0,406	0,039	0,095	0,330	0,483	1,973	616	266
Nombre idéal d'enfants	5,913	0,286	0,048	5,349	6,477	2,150	1156	505

Tableau B.7 Erreurs de sondage : Échantillon Centre, EDS Continue Sénégal 2018

Variables	Valeur (M)	Erreur Type (ET)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance		Effet du plan (DEFT)	Effectif	
				Plus bas (M-2ET)	Supérieur (M+2ET)		Pondéré	Non pondéré
FEMME								
Milieu urbain	0,205	0,015	0,072	0,176	0,234	1,956	2870	3199
Alphabétisation	0,333	0,019	0,057	0,296	0,371	2,145	2870	3199
Aucune instruction	0,644	0,025	0,038	0,595	0,693	2,768	2870	3199
Niveau secondaire ou plus	0,203	0,017	0,083	0,170	0,237	2,244	2870	3199
Jamais mariée/jamais en union	0,237	0,013	0,056	0,211	0,263	1,673	2870	3199
Actuellement mariée/en union	0,729	0,014	0,019	0,702	0,756	1,667	2870	3199
Actuellement enceinte	0,085	0,006	0,067	0,074	0,096	1,097	2870	3199
Mariée/en union avant l'âge de 20 ans	0,591	0,015	0,025	0,561	0,621	1,416	2189	2443
Enfants nés vivants	2,752	0,074	0,027	2,606	2,898	1,401	2870	3199
Enfants survivants	2,492	0,067	0,027	2,360	2,624	1,421	2870	3199
Enfants nés vivants des femmes de 40-49ans	6,175	0,148	0,024	5,883	6,467	1,227	490	533
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,410	0,017	0,043	0,375	0,444	1,644	2189	2443
Connait une méthode contraceptive	0,958	0,007	0,008	0,944	0,973	1,763	2092	2316
Connait une méthode moderne	0,958	0,007	0,008	0,944	0,973	1,763	2092	2316
Utilise une méthode au moment quelconque	0,418	0,021	0,051	0,376	0,460	2,036	2092	2316
Utilise actuellement une méthode	0,227	0,014	0,062	0,200	0,255	1,586	2092	2316
Utilise actuellement une méthode moderne	0,207	0,015	0,075	0,176	0,237	1,795	2092	2316
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,021	0,004	0,207	0,012	0,029	1,412	2092	2316
Utilise actuellement la pilule	0,024	0,004	0,163	0,016	0,032	1,203	2092	2316
Utilise actuellement le DIU	0,021	0,006	0,283	0,009	0,032	1,931	2092	2316
Utilise actuellement des injectables	0,072	0,006	0,088	0,060	0,085	1,162	2092	2316
Utilise actuellement Norplan	0,082	0,008	0,100	0,066	0,098	1,412	2092	2316
Utilise actuellement des condoms masculins	0,002	0,001	0,455	0,000	0,003	0,856	2092	2316
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,004	0,001	0,380	0,001	0,007	1,121	2092	2316
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,004	0,001	0,372	0,001	0,006	1,040	2092	2316
Utilise actuellement le retrait	0,002	0,001	0,548	0,000	0,005	1,272	2092	2316
A utilisé une source du secteur public	0,940	0,014	0,015	0,912	0,969	1,239	443	539
Ne veut plus d'enfant	0,203	0,010	0,047	0,184	0,222	1,127	2092	2316
Veut espacer la prochaine naissance de 2ans	0,423	0,013	0,031	0,397	0,449	1,261	2092	2316
Nombre idéal d'enfants	6,129	0,089	0,015	5,953	6,304	2,062	2486	2762
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,701	0,023	0,033	0,655	0,747	2,507	2175	2432
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,186	0,011	0,058	0,165	0,207	1,343	2097	2348
Traités avec des SRO	0,258	0,030	0,115	0,200	0,317	1,436	390	446
Traitement médical recherché	0,395	0,034	0,086	0,328	0,462	1,472	390	446
Carnet de vaccination montré	0,811	0,024	0,030	0,763	0,858	1,335	433	480
A reçu le vaccin du BCG	0,934	0,018	0,019	0,898	0,969	1,558	433	480
A reçu le vaccin du HepB à la naissance	0,732	0,030	0,041	0,674	0,791	1,454	433	480
A reçu le vaccin du DPT HepB-Hib (3 doses)	0,912	0,018	0,020	0,876	0,948	1,403	433	480
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,804	0,025	0,031	0,755	0,854	1,369	433	480
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,849	0,024	0,029	0,802	0,897	1,470	433	480
A reçu le vaccin contre le pneumococcal (3 doses)	0,910	0,018	0,020	0,874	0,947	1,396	433	480
A reçu le vaccin contre le rotavirus (2 doses)	0,921	0,017	0,019	0,887	0,956	1,407	433	480
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12-23)	0,853	0,018	0,022	0,817	0,890	1,131	433	480
A reçu tous les vaccins de base	0,777	0,030	0,038	0,718	0,836	1,560	433	480
Retard de croissance (-2ET)	0,226	0,016	0,072	0,194	0,258	1,920	2198	2409
Insuffisance pondérale (-2ET)	0,158	0,014	0,086	0,132	0,185	1,826	2197	2407
Emaciation (-2ET)	0,069	0,009	0,136	0,051	0,088	1,822	2192	2400
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	5,516	0,195	0,035	5,125	5,907	1,531	7961	8883
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-4 ans)	27,913	3,104	0,111	21,705	34,121	,961	4274	4695
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-4 ans)	13,380	1,861	0,139	9,658	17,102	1,118	4255	4673
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-4 ans)	41,293	3,977	0,096	33,338	49,248	1,112	4276	4698
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-4 ans)	21,538	2,745	0,127	16,048	27,028	1,137	4185	4590
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-4 ans)	61,941	5,686	0,092	50,569	73,313	1,376	4294	4716
HOMME								
Milieu urbain	0,192	0,014	0,072	0,165	0,219	1,143	1069	1177
Aucune instruction	0,588	0,037	0,062	0,516	0,661	2,425	1069	1177
Niveau secondaire ou plus	0,228	0,024	0,105	0,181	0,276	1,867	1069	1177
Jamais mariée/jamais en union	0,527	0,015	0,029	0,497	0,557	0,998	1069	1177
Actuellement marié/en union	0,466	0,015	0,033	0,435	0,496	1,005	1069	1177
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,076	0,011	0,141	0,055	0,098	1,121	781	859
Ne veut plus d'enfant	0,050	0,011	0,215	0,029	0,071	1,111	498	546
Veut espacer la prochaine naissance de 2ans	0,295	0,024	0,083	0,246	0,343	1,209	498	546
Nombre idéal d'enfants	7,801	0,299	0,038	7,211	8,391	1,132	480	541

Tableau B.8 Erreurs de sondage : Échantillon Sud, EDS Continue Sénégal 2018

Variables	Valeur (M)	Erreur Type (ET)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance		Effet du plan (DEFT)	Effectif	
				Plus bas (M-2ET)	Supérieur (M+2ET)		Pondéré	Non pondéré
FEMME								
Milieu urbain	0,305	0,017	0,055	0,271	0,338	1,297	1254	2578
Alphabétisation	0,456	0,018	0,039	0,420	0,491	1,268	1254	2578
Aucune instruction	0,475	0,017	0,037	0,441	0,510	1,239	1254	2578
Niveau secondaire ou plus	0,310	0,017	0,055	0,276	0,343	1,294	1254	2578
Jamais mariée/jamais en union	0,289	0,012	0,043	0,264	0,313	0,972	1254	2578
Actuellement mariée/en union	0,668	0,012	0,018	0,644	0,692	0,917	1254	2578
Actuellement enceinte	0,101	0,006	0,059	0,089	0,112	0,698	1254	2578
Mariée/en union avant l'âge de 20 ans	0,583	0,016	0,028	0,551	0,615	0,996	944	1949
Enfants nés vivants	2,716	0,061	0,023	2,595	2,836	0,782	1254	2578
Enfants survivants	2,409	0,055	0,023	2,300	2,518	0,799	1254	2578
Enfants nés vivants des femmes de 40-49ans	6,139	0,173	0,028	5,798	6,480	0,763	171	355
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,518	0,015	0,029	0,488	0,547	0,918	944	1949
Connait une méthode contraceptive	0,933	0,009	0,010	0,915	0,952	1,125	838	1764
Connait une méthode moderne	0,933	0,009	0,010	0,915	0,952	1,125	838	1764
Utilise une méthode au moment quelconque	0,383	0,017	0,043	0,350	0,416	1,017	838	1764
Utilise actuellement une méthode	0,194	0,012	0,060	0,171	0,217	0,882	838	1764
Utilise actuellement une méthode moderne	0,184	0,012	0,065	0,160	0,207	0,916	838	1764
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,010	0,003	0,324	0,004	0,017	0,979	838	1764
Utilise actuellement la pilule	0,010	0,003	0,325	0,004	0,017	0,983	838	1764
Utilise actuellement le DIU	0,013	0,004	0,290	0,005	0,020	0,983	838	1764
Utilise actuellement des injectables	0,045	0,007	0,151	0,032	0,058	0,975	838	1764
Utilise actuellement Norplan	0,107	0,010	0,092	0,087	0,126	0,951	838	1764
Utilise actuellement des condoms masculins	0,005	0,002	0,350	0,001	0,008	0,719	838	1764
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,003	0,001	0,482	0,000	0,005	0,748	838	1764
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,001	0,001	0,733	-0,001	0,003	0,787	838	1764
Utilise actuellement le retrait	0,001	0,001	0,728	-0,001	0,003	0,785	838	1764
A utilisé une source du secteur public	0,917	0,018	0,019	0,882	0,953	0,871	194	382
Ne veut plus d'enfant	0,158	0,011	0,073	0,135	0,180	0,937	838	1764
Veut espacer la prochaine naissance de 2ans	0,433	0,014	0,033	0,405	0,461	0,856	838	1764
Nombre idéal d'enfants	5,673	0,094	0,017	5,488	5,858	1,358	961	1942
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,570	0,029	0,050	0,513	0,626	1,916	993	2108
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,227	0,010	0,045	0,207	0,247	0,797	943	2004
Traités avec des SRO	0,393	0,033	0,085	0,327	0,459	1,078	214	422
Traitement médical recherché	0,482	0,031	0,064	0,421	0,543	0,972	214	423
Carnet de vaccination montré	0,823	0,025	0,031	0,773	0,873	1,000	206	424
A reçu le vaccin du BCG	0,913	0,018	0,019	0,878	0,947	0,932	206	424
A reçu le vaccin du HepB à la naissance	0,703	0,029	0,041	0,645	0,760	0,956	206	424
A reçu le vaccin du DPT HepB-Hib (3 doses)	0,866	0,023	0,027	0,820	0,911	1,015	206	424
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,686	0,031	0,045	0,625	0,746	0,991	206	424
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,826	0,026	0,032	0,774	0,878	1,035	206	424
A reçu le vaccin contre le pneumococcal (3 doses)	0,847	0,024	0,028	0,800	0,894	0,991	206	424
A reçu le vaccin contre le rotavirus (2 doses)	0,865	0,024	0,027	0,818	0,913	1,432	206	424
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12-23)	0,801	0,028	0,034	0,747	0,855	1,036	206	424
A reçu tous les vaccins de base	0,725	0,031	0,043	0,663	0,787	1,055	206	424
Retard de croissance (-2ET)	0,238	0,011	0,046	0,217	0,260	0,858	1002	2095
Insuffisance pondérale (-2ET)	0,184	0,009	0,049	0,166	0,202	0,775	1002	2095
Emaciation (-2ET)	0,095	0,008	0,084	0,079	0,111	0,898	999	2089
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	5,211	0,213	0,041	4,785	5,636	1,348	3489	7172
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-4 ans)	31,578	3,113	0,099	25,353	37,803	,961	1923	4055
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-4 ans)	23,665	2,676	0,113	18,314	29,017	1,123	1923	4046
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-4 ans)	55,243	4,043	0,073	47,156	63,330	,982	1924	4058
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-4 ans)	35,600	4,464	0,125	26,672	44,527	1,184	1915	4001
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-4 ans)	88,876	5,832	0,066	77,211	100,541	1,025	1944	4098
HOMME								
Milieu urbain	0,353	0,025	0,071	0,303	0,402	1,276	591	1175
Aucune instruction	0,332	0,022	0,067	0,289	0,376	1,140	591	1175
Niveau secondaire ou plus	0,404	0,020	0,051	0,363	0,444	1,011	591	1175
Jamais mariée/jamais en union	0,528	0,018	0,034	0,492	0,564	0,876	591	1175
Actuellement marié/en union	0,455	0,018	0,039	0,420	0,490	0,867	591	1175
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 &ns	0,170	0,013	0,074	0,145	0,195	0,702	452	898
Ne veut plus d'enfant	0,074	0,013	0,171	0,049	0,100	0,801	268	548
Veut espacer la prochaine naissance de 2ans	0,389	0,023	0,059	0,344	0,435	0,781	268	548
Nombre idéal d'enfants	6,818	0,168	0,025	6,486	7,151	1,120	497	935

TABLEAUX POUR L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES

Tableau C.1 Répartition par âge de la population des ménages

Répartition de la population (de fait) des ménages par année d'âge selon le sexe (pondéré), EDS Continue Sénégal 2018

Age	Femme		Homme		Age	Femme		Homme	
	Effectif	Pourcentage	Effectif	Pourcentage		Effectif	Pourcentage	Effectif	Pourcentage
0	627	2,9	622	3,3	36	262	1,2	204	1,1
1	674	3,1	602	3,2	37	195	0,9	139	0,7
2	525	2,4	612	3,3	38	267	1,2	143	0,8
3	633	2,9	627	3,4	39	132	0,6	146	0,8
4	649	3,0	670	3,6	40	262	1,2	207	1,1
5	567	2,6	563	3,0	41	148	0,7	136	0,7
6	674	3,1	780	4,2	42	182	0,8	140	0,8
7	631	2,9	616	3,3	43	153	0,7	128	0,7
8	605	2,8	636	3,4	44	160	0,7	104	0,6
9	542	2,5	493	2,6	45	186	0,9	154	0,8
10	553	2,5	586	3,1	46	162	0,7	128	0,7
11	507	2,3	522	2,8	47	104	0,5	96	0,5
12	613	2,8	516	2,8	48	148	0,7	100	0,5
13	645	3,0	483	2,6	49	94	0,4	70	0,4
14	492	2,2	416	2,2	50	166	0,8	130	0,7
15	465	2,1	437	2,3	51	192	0,9	61	0,3
16	476	2,2	388	2,1	52	216	1,0	136	0,7
17	375	1,7	350	1,9	53	183	0,8	72	0,4
18	505	2,3	445	2,4	54	145	0,7	58	0,3
19	352	1,6	278	1,5	55	207	0,9	104	0,6
20	458	2,1	361	1,9	56	138	0,6	89	0,5
21	314	1,4	273	1,5	57	79	0,4	60	0,3
22	351	1,6	284	1,5	58	138	0,6	94	0,5
23	327	1,5	252	1,4	59	94	0,4	50	0,3
24	307	1,4	223	1,2	60	130	0,6	157	0,8
25	450	2,1	283	1,5	61	74	0,3	107	0,6
26	283	1,3	219	1,2	62	90	0,4	105	0,6
27	270	1,2	206	1,1	63	109	0,5	116	0,6
28	381	1,7	209	1,1	64	65	0,3	80	0,4
29	268	1,2	185	1,0	65	135	0,6	107	0,6
30	431	2,0	300	1,6	66	108	0,5	66	0,4
31	248	1,1	175	0,9	67	80	0,4	61	0,3
32	300	1,4	243	1,3	68	78	0,4	74	0,4
33	231	1,1	159	0,9	69	36	0,2	26	0,1
34	235	1,1	175	0,9	70+	650	3,0	583	3,1
35	336	1,5	230	1,2					
					Ne sait pas/ manquant	3	0,0	2	0,0
					Total	21 875	100,0	18 658	100,0

Note : La population de fait comprend tous les résidents et les non-résidents qui ont dormi dans le ménage la nuit ayant précédé l'interview.

Tableau C.2.1 Répartition par âge des femmes éligibles et interviewées

Population (de fait) des femmes de 10-54 ans, effectif et répartition (en %) par groupe d'âges des femmes interviewées de 15-49 ans et pourcentage des femmes éligibles qui ont été interviewées (pondéré), EDS-Continue, Sénégal 2018

Groupe d'âges	Population de ménage des femmes d'âge 10-54 ans	Femmes enquêtées âge 15-49		Pourcentage de femmes éligibles interviewées
		Effectif	Pourcentage	
10-14	2 810	-	-	-
15-19	2 174	2 104	22,1	96,8
20-24	1 757	1 708	17,9	97,2
25-29	1 653	1 616	17,0	97,7
30-34	1 446	1 394	14,7	96,4
35-39	1 191	1 145	12,0	96,1
40-44	906	883	9,3	97,5
45-49	694	666	7,0	96,0
50-54	902	-	-	-
15-49	9 821	9 515	100,0	96,9

Note : La population de fait comprend tous les résidents et les non-résidents qui ont dormi dans le ménage la nuit ayant précédé l'enquête. Les pondérations utilisées sont celles de l'enquête ménage. L'âge est basé sur le Tableau de Ménage.
na = Non applicable.

Tableau C.2.2 Répartition par âge des hommes éligibles et interviewés

Population (de fait) des hommes de 10-59[64] ans, effectif et répartition (en %) par groupe d'âges des hommes interviewés de 15-49 ans et pourcentage d'hommes éligibles qui ont été interviewés (pondéré), EDS-Continue, Sénégal 2018

Groupe d'âges	Population des ménage d'âge 10-64 ans	Hommes enquêtés âge 15-59		Pourcentage d'hommes éligibles interviewés
		Effectif	Pourcentage	
10-14	1 290	-	-	-
15-19	886	845	22,9	95,4
20-24	616	585	15,8	95,0
25-29	481	446	12,1	92,7
30-34	518	478	12,9	92,3
35-39	422	393	10,6	93,1
40-44	368	348	9,4	94,7
45-49	243	228	6,2	93,7
50-54	222	207	5,6	93,5
55-59	173	165	4,5	95,1
60-64	292	-	-	-
15-59	3 929	3 696	100,0	94,1

Note : La population de fait comprend tous les résidents et les non-résidents qui ont dormi dans le ménage la nuit ayant précédé l'enquête. Les pondérations utilisées sont celles de l'enquête ménage. L'âge est basé sur le Tableau de Ménage.
na = Non applicable.

Tableau C.3 Complétude de l'enregistrement

Pourcentage d'observations manquantes pour certaines questions démographiques et de santé (pondéré), EDS-Continue, Sénégal 2018

Type d'information	Pourcentage avec information manquante	Nombre de cas
Jour seulement (Naissances au cours des 15 années précédant l'enquête)	20,20	16 558
Jour et mois (Naissances au cours des 15 années précédant l'enquête)	1,89	16 558
Jour, mois et année (Naissances au cours des 15 années précédant l'enquête)	0,01	16 558
Âge au décès (Décès d'enfants nés dans les 15 années avant l'enquête)	0,06	984
Âge/date à la première union1 (Femmes en union de 15-49 ans)	0,00	6 541
Âge/date à la première union1 (Hommes en union de 15-54[59])	0,00	1 744
Niveau d'instruction de l'enquêté (Femmes de 15-49 ans)	0,00	9 414
Niveau d'instruction de l'enquêté (Hommes de 15-54[59] ans)	0,00	3 762
Diarrhée dans les 2 dernières semaines (Enfants vivants de 0-59 mois)	2,36	5 820
Taille (Enfants vivants de 0-59 mois du Questionnaire Biomarqueur)	2,20	6 273
Poids (Enfants vivants de 0-59 mois du Questionnaire Biomarqueur)	2,17	6 273
Taille ou poids (Enfants vivants de 0-59 mois du Questionnaire Biomarqueur)	2,23	6 273
Anémie Enfants (Enfants vivants de 0-59 mois du Questionnaire Biomarqueur)	100,00	5 755

¹ L'année et l'âge sont manquants

Tableau C.4 Naissances par année de naissance

Nombre de naissances, pourcentage de naissances avec une date de naissance complète, rapport de masculinité à la naissance et rapport de naissances annuelles pour les enfants survivants, les enfants décédés et le total des enfants (pondéré), EDS-Continue, Sénégal 2018

Années	Effectif de naissances			Pourcentage avec une année et mois de naissance			Rapport de masculinité à la naissance ²			Rapport de naissances annuelles ³		
	Survivants	Décédés	Total	Survivants	Décédés	Total	Survivants	Décédés	Total	Survivants	Décédés	Total
2018	700	18	718	100,0	96,0	99,9	98,0	62,4	97,0	-	-	-
2017	1 266	48	1 314	100,0	100,0	100,0	87,9	147,7	89,5	-	-	-
2016	1 104	39	1 143	99,9	98,6	99,8	112,2	172,5	113,8	92,5	70,0	91,5
2015	1 119	64	1 184	99,6	97,2	99,4	109,5	168,1	112,0	99,0	151,7	100,9
2014	1 157	46	1 202	99,4	97,3	99,3	101,1	125,7	101,9	105,2	67,4	103,0
2013	1 080	71	1 151	99,5	96,9	99,3	103,6	213,6	108,2	88,6	99,5	89,2
2012	1 283	97	1 380	98,5	97,9	98,5	113,4	163,0	116,3	114,5	140,9	116,1
2011	1 160	67	1 227	97,8	99,1	97,9	113,0	130,8	113,9	96,9	79,1	95,7
2010	1 112	72	1 184	97,3	89,6	96,8	108,8	123,8	109,7	102,6	94,9	102,1
2009	1 006	85	1 091	98,1	91,9	97,6	107,2	109,6	107,4	95,4	132,0	97,5
2014 - 2018	5 347	214	5 561	99,8	98,0	99,7	101,2	141,7	102,5	-	-	-
2007 - 2013	5 642	392	6 035	98,2	95,1	98,0	109,4	143,0	111,3	-	-	-
2002 - 2006	4 313	348	4 661	96,9	89,1	96,3	102,9	132,6	104,9	-	-	-
1997 - 2001	2 803	343	3 146	97,2	92,7	96,7	97,6	95,9	97,4	-	-	-
<1997	2 043	420	2 463	92,6	89,7	92,1	108,1	144,4	113,5	-	-	-
All	20 147	1 718	21 866	97,6	92,4	97,2	104,0	130,1	105,8	-	-	-

na = Non applicable.

¹ $(Nm/Nf) \times 100$, o— Nm est le nombre de naissances masculines et Nf le nombre de naissances féminines.

² $[2Nx / (Nx - 1 + Nx + 1)] \times 100$, o— Nx est le nombre de naissance de l'année x.

Tableau C.5 Enregistrement de l'âge au décès en jours

Répartition des décès survenus, d'après les déclarations, à moins de 1 mois selon l'âge au décès en jours et pourcentage de décès néonataux survenus, d'après les déclarations, aux âges de 0-6 jours, par période de cinq ans précédant l'enquête, EDS-Continue, Sénégal 2018

Âge au décès en jours	Nombre d'années ayant précédé l'enquête				Total 0-19
	0-4	5-9	10-14	15-19	
<1	29	26	15	10	80
1	35	30	36	19	120
2	15	16	4	10	46
3	20	24	16	13	73
4	5	3	8	4	20
5	6	6	2	6	21
6	6	14	3	12	36
7	2	11	7	5	24
8	1	8	8	4	21
9	1	2	2	1	6
10	4	3	0	2	9
11	0	2	0	1	2
12	1	0	0	0	1
13	1	3	0	2	5
14	3	1	6	1	11
15	5	3	6	1	15
16	0	2	0	2	5
17	0	1	0	0	1
18	1	0	0	0	1
19	0	1	0	0	1
20	0	2	1	1	4
21	2	2	1	0	5
22	0	0	1	0	1
23	0	1	0	0	1
25	1	0	0	0	1
26	1	0	0	0	1
28	0	0	1	1	2
30	0	0	6	0	6
Total 0-30	140	159	122	96	516
Pourcentage néonatal précoce ¹	83,3	75,1	69,0	77,8	76,4

¹ 0-6 jours / 0-30 jours

Tableau C.6 Enregistrement de l'âge au décès en mois

Répartition des décès survenus, d'après les déclarations, à moins de 2 ans, selon l'âge au décès en mois, et pourcentage de décès survenus, d'après les déclarations, à moins de 1 mois, par période de cinq ans précédant l'enquête (pondéré), EDS-Continue, Sénégal 2018

Age au décès en mois	Nombre d'années ayant précédé l'enquête				Total 0-19
	0-4	5-9	10-14	15-19	
<1	140	159	122	96	516
1	20	21	14	7	61
2	9	11	4	5	30
3	7	13	12	4	36
4	10	4	5	8	26
5	4	7	6	2	19
6	15	11	10	8	43
7	1	10	7	9	27
8	1	5	9	6	21
9	5	17	8	10	40
10	0	1	1	2	5
11	2	5	4	9	20
12	0	3	4	7	14
13	2	7	5	8	21
14	0	6	3	2	11
15	1	6	7	1	15
16	0	1	3	2	6
17	3	2	1	2	8
18	3	18	19	15	55
19	2	1	0	1	4
20	1	1	4	2	8
21	2	1	1	3	6
22	1	2	1	4	8
23	2	1	1	6	10
Total 0-11	215	263	201	165	844
Pourcentage neonatal ¹	65,0	60,5	60,6	57,9	61,2

^a Y compris les décès survenus à moins d'un mois, déclarés en jours.

¹ Moins d'un mois/moins d'un an.

DIRECTEUR GENERAL

Babacar NDIR
Directeur Général ANSD

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT

Alle Nar DIOP, Directeur Général Adjoint ANSD

DIRECTEUR TECHNIQUE

Papa Ibrahima Sylmang SENE, Directeur des Statistiques Démographiques et Sociales

COORDONNATEUR DU PROJET

Samba NDIAYE, Chef de la Division du Recensement et des Statistiques Démographiques

RESPONSABLE DES OPERATIONS DE TERRAIN

Papa Mabèye DIOP, Chef du Bureau Collecte et Supervision

COORDONNATEUR DU VOLET MENAGE

AWA CISSOKO FAYE, Chef du Bureau Conception et Méthodes d'Analyses Sociodémographiques

RESPONSABLE MESURES ANTHROPOMÉTRIQUES

Dr Ndeye Khady TOURE, Conseillère en Micronutriments chez Cellule de Lutte contre la Malnutrition

TRAITEMENT INFORMATIQUE DE DONNÉES

Abdou SARR et Sokhna Maimouna NDIAYE

GESTIONNAIRE

Aminata NDIAYE

RESPONSABLE DE LA LOGISTIQUE

Ibrahima BASSE

RESPONSABLE DES ACHATS

El Hadji Alassane DIOP

SUPERVISEUR MEDICAL

Dr Aboubacry DRAME

ÉQUIPE DE PILOTAGE ET D'ENCADREMENT TECHNIQUE

Papa Ibrahima Sylmang SENE
Samba NDIAYE
Awa Cissoko FAYE
Papa Mabeye DIOP
Ndeye Lala Travare TAMBOURA
Yaya LY
Cheikh Ibrahima DIOP
Abdou SARR
Khadidiatou Aw HANNE (USAID)
Papa Madiop DIOP (UNFPA)
Diatta Camara (UNFPA)
Dr Mouhamadou FALL (UNICEF)
Mamadou DIOUF (NUTRITION INTERNATIONAL)
Dr Abdoulaye DIAW (DPRS)
Papa Ibrahima NDOUR (DPRS)
Dr Aboubacry DRAME
Papa Momath THIAM (CLM)
Ndeye Yaga SY (HKI)
Dr Moustapha Barro

REDACTEURS DU RAPPORT

Papa Ibrahima SYLMANG SENE (ANSD)
Samba NDIAYE (ANSD)
Awa Cissoko FAYE (ANSD)
Amy Cole Cisse DIOP (ANSD)
Papa Mabeye DIOP (ANSD)
Boubacar DIOUF (ANSD)
Cheikh Ibrahima DIOP (ANSD)
Djiby DIOP (ANSD)
El hadji Yaya LY (ANSD)
Fatimatou SY (ANSD)
Khady Ba FAYE (ANSD)
Pape Ibrahima NDOUR
Ndèye Lala Travare TAMBOURA(ANSD)
Jean Pierre Diamane BAHOU (ANSD)
Dr Aboubacry DRAME (ANSD)
Dr Abdoulaye DIAW (MSAS)
Dr Abdoulaye DIALLO (MSAS)
Abou BA (DDCH)
Oumy LAYE, (ANSD)
Khoudia WADE (ANSD)
Maguette SARR (ANSD)
Mahmouh DIOUF(ANSD)
Mamadou DIOUF (NI)
Maguette DIACK (MFEG)
Amadou YOUM (ANSD)

CARTOGRAPHIE

CHEFS D'ÉQUIPES DE LA CARTOGRAPHIE

Pape Maty FAYE
EL Malick COLY
Cheikh Tidiane DIOP (Diaganiao)
Youssou SECK
Yaya SANE
Cheikh Tidiane SAGNA
Lamine SARR

AGENTS CARTOGRAPHES

Adama SANE
Amadi Barro DIOUF
Mor NDIAYE
Mouhamadou Moustapha KONTE
Mamadou DIALLO
Yaya NDIAYE
Serigne Amidoune DIAGNE
Cheikh Issa GUEYE
Aly SEGNANE
Leyti DIAGNE
Hassimiou BA
Bacary BA
Hawa SANE
Mamadou Saliou KEITA
Babacar Clément BARAYE
Abdoul Aziz WADE
Abdoulaye BADIANE
Abdoulaye HANE
Boubacar DABO
Amadou THIAM
Ndeye Ndiapaly GAYE

COLLECTE DES DONNÉES

SUPERVISEURS DE LA COLLECTE

El Hadji Yaya LY
Cheick Ibrahima DIOP
Amadou YOUM
Dr Aboubacry DRAME

CHEFS D'ÉQUIPES DE LA COLLECTE

Ousmane MBENGUE
Arona DIAGNE
Mamadou Lamine JANTEY
Mamadou MAR
Aliou NGOM

AGENTS ENQUETRICES

Mame Thiongane SALANE
Fatou CISSE
Ndeye Fary FALL
Ndeye Amy FALL
Tabaski DIOUF
Christiane FAYE
Mareme DIEYE
Assietou BEYE
Mafoudya CAMARA
Touty NDAO
Ndeye Yacine SAGNA
Aminata Sall DIEYE
COUMBA SOW
Sokhna Rokhaya KANDJI
Clara SADIO
Ramatoulaye CISSE
Fatoumata DIEME
Fatou NIANG
Aissatou HANE
Ndeye Meta DANFA

CHAUFFEURS

Mbaye WADE DIAGNE
Madieng KEBE
Sérigne TINE
Aliou DIENE
Sarakh DIOP
Mamadou SAMB
Daouda NGOM

AGENT REPROGRAPHIE

Saliou FAYE

PERSONNEL D'APPUI

Mbaye NDIAYE
Motar BACOUM

PERSONNEL D'ICF

Jose Miguel Guzman
Michelle Winner
Keith Purvis
Albert Themme
Ruilin Ren
Traore Metahan
Christopher Gramer
Joan Wardell
Natalie Shattuck
Tom Fish
Monique Barrere

**ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ CONTINUE (EDS-2018)
QUESTIONNAIRE MÉNAGE**

République du Sénégal
Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan
Ministère de la Santé et de l'Action Sociale

IDENTIFICATION				
NOM DE LA LOCALITÉ	_____			
NOM ET NUMÉRO DU CHEF DE MÉNAGE	_____			
NUMÉRO DE CONCESSION	_____	_____	_____	_____
NUMÉRO DE GRAPPE	_____	_____	_____	_____
RÉGION	_____	_____	_____	_____
DEPARTEMENT	_____	_____	_____	_____
DISTRICT SANITAIRE	_____	_____	_____	_____
URBAIN/RURAL (URBAIN=1, RURAL=2)	_____	_____	_____	_____
DAKAR/CAPITALE RÉGIONALE/AUTRE VILLE/RURAL (DAKAR=1, CAPITALE RÉGIONALE=2, AUTRE VILLE=3, RURAL=4)	_____	_____	_____	_____
MÉNAGE SÉLECTIONNÉ POUR L'ENQUÊTE HOMME ? (1=OUI, 2=NON)	_____	_____	_____	_____
MÉNAGE SÉLECTIONNÉ POUR LE MODULE VIOLENCE DOMESTIQUE (VD) ? (1=OUI, 2=NON)	_____	_____	_____	_____
VISITES D'ENQUÊTEURS				
	1	2	3	VISITE FINALE
DATE	_____	_____	_____	JOUR _____ MOIS _____ ANNÉE 2 0 1 _____ No ENQUÊT _____
NOM DE L'ENQUÊTEUR/ ENQUÊTRICE	_____	_____	_____	RÉSULTAT* _____
PROCHAINE DATE VISITE	_____	_____	_____	NOMBRE TOTAL DE VISITES _____
HEURE	_____	_____	_____	
*CODES RÉSULTAT :				TOTAL DE PERSONNES DANS LE MÉNAGE _____
1	REPLI			TOTAL DE FEMMES ÉLIGIBLES _____
2	PAS DE MEMBRE DU MÉNAGE À LA MAISON OU PAS D'ENQUÊTÉ COMPÉTENT À LA MAISON, AU MOMENT DE LA VISITE			TOTAL D'HOMMES ÉLIGIBLES _____
3	MÉNAGE TOTALEMENT ABSENT POUR UNE LONGUE PÉRIODE			No DE LIGNE DE L'ENQUÊTÉ POUR LE QUESTION- NAIRE MÉNAGE _____
4	DIFFÉRÉ			
5	REFUSÉ			
6	LOGEMENT VACANT OU PAS DE LOGEMENT À L'ADRESSE			
7	LOGEMENT DÉTRUIT			
8	LOGEMENT NON TROUVÉ			
9	AUTRE _____ (PRÉCISEZ)			

LANGUE DU QUESTIONNAIRE**	0	1	LANGUE DE L'INTERVIEW**	<input type="text"/>	<input type="text"/>	LANGUE MATERNELLE DE L'ENQUÊTÉ**	<input type="text"/>	<input type="text"/>	TRADUCTEUR (OUI = 1, NON = 2)	<input type="text"/>
LANGUE DU QUESTIONNAIRE**	FRANÇAIS		**CODES LANGUES : 01 FRANÇAIS 03 POULAR 05 MANDINGUE 7 AUTRES 02 WOLOF 04 SERER 06 DIOLA							
CHEF D'ÉQUIPE										
_____			<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				_____			
NOM			NUMÉRO				DATE			

CETTE PAGE EST LAISSÉE BLANCHE INTENTIONNELLEMENT

PRÉSENTATION ET DEMANDE DE CONSENTEMENT

Bonjour. Je m'appelle _____. Je travaille pour l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie en collaboration avec le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale. Nous effectuons une enquête nationale sur la santé au Sénégal. Les informations que nous collectons aideront votre gouvernement à améliorer les services de santé. Votre ménage a été sélectionné pour cette enquête. Nous voudrions vous poser quelques questions sur votre ménage. Les questions prennent habituellement entre 15 et 20 minutes. Toutes les informations que vous nous donnerez sont strictement confidentielles et elles ne seront transmises à personne d'autres que les membres de l'équipe d'enquête. Vous n'êtes pas obligé de participer à cette enquête, mais nous espérons que vous accepterez d'y participer car votre opinion est très importante. S'il arrivait que je pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, dites-le moi et je passerai à la question suivante ; vous pouvez également interrompre l'interview à n'importe quel moment. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'enquête, vous pouvez contacter les personnes figurant sur cette carte.

DONNEZ LA CARTE AVEC LES INFORMATIONS POUR CONTACTER CES PERSONNES

Avez-vous des questions à me poser ?
Puis-je commencer l'interview maintenant ?

SIGNATURE DE L'ENQUÊTEUR _____ DATE _____

L'ENQUÊTÉ ACCEPTE
D'ÊTRE INTERVIEWÉ ... 1
↓

L'ENQUÊTÉ REFUSE
D'ÊTRE INTERVIEWÉ ... 2 → FIN

100	NOTEZ L'HEURE.	HEURES	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>				
		MINUTES	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>				

TABLEAU MÉNAGE

No LIGNE	RÉSIDENTS HABITUELS ET VISITEURS	LIEN AVEC LE CHEF DE MÉNAGE	SEXE	RÉSIDENTE		ÂGE	SI 15 ANS OU PLUS	ÉLIGIBILITÉ		
				ÉTAT MATRIMONIAL	9		10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	S'il vous plaît, donnez-moi les noms des personnes qui vivent habituellement dans votre ménage et des visiteurs qui ont passé la nuit dernière ici, en commençant par le chef de ménage. APRÈS AVOIR LISTÉ LES NOMS ET ENREGISTRÉ LE LIEN DE PARENTÉ ET LE SEXE POUR CHAQUE PERSONNE, POSEZ LES QUESTIONS 2A-2C POUR VOUS ASSURER QUE LA LISTE EST COMPLÈTE. POSEZ ENSUITE LES QUESTIONS APPROPRIÉES DES COLONNES 5-20 POUR CHAQUE PERSONNE.	Quel est le lien de parenté de (NOM) avec le chef de ménage ? VOIR CODES CI-DESSOUS.	(NOM) est-il de sexe masculin ou féminin ?	(NOM) vit-il/elle ici habituellement ?	(NOM) a-t-il/elle passé la nuit dernière ici ?	Quel âge a (NOM) ? SI 95 OU PLUS, NOTEZ '95'.	Quel est l'état matrimonial actuel de (NOM) ? 1 = MARIÉ OU VIVANT ENSEMBLE 2 = DIVORCÉ/ SÉPARÉ 3 = VEUF 4 = JAMAIS MARIÉ ET N'A JAMAIS VÉCU AVEC QUELQU'UN	ENCERCLEZ LE No DE LIGNE DE TOUTES LES FEMMES DE 15-49 ANS	SI MÉNAGE SÉLECTIONNÉ POUR ENQUÊTE HOMME ENCERCLEZ LE No DE LIGNE DE TOUS LES HOMMES DE 15-59 ANS	ENCERCLEZ LE No DE LIGNE DE TOUTES LES ENFANTS DE 0-5 ANS
01		<input type="text"/>	M F 1 2	O N 1 2	O N 1 2	EN ANNÉES <input type="text"/>	<input type="text"/>	01	01	01
02		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	02	02	02
03		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	03	03	03
04		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	04	04	04
05		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	05	05	05
06		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	06	06	06
07		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	07	07	07
08		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	08	08	08
09		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	09	09	09
10		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	10	10	10

2A) Juste pour être sûre que j'ai une liste complète : y a-t-il d'autres personnes comme des petits enfants ou des nourrissons que nous n'avons pas listés ? OUI → AJOUTEZ AU TABLEAU NON

2B) Y a-t-il d'autres personnes qui ne sont peut-être pas membres de votre famille, comme des domestiques, locataires ou amis qui vivent habituellement ici ? OUI → AJOUTEZ AU TABLEAU NON

2C) Avez-vous des invités ou des visiteurs temporaires qui sont chez vous, ou d'autres personnes qui ont dormi ici la nuit dernière et qui n'ont pas été listés ? OUI → AJOUTEZ AU TABLEAU NON

CODES POUR Q. 3: LIEN DE PARENTÉ AVEC CHEF DE MÉNAGE

- 01 = CHEF DE MÉNAGE
- 02 = FEMME OU MARI
- 03 = FILS OU FILLE
- 04 = GENDRE OU BELLE-FILLE
- 05 = PETIT FILS/FILLE
- 06 = PÈRE/MÈRE
- 07 = BEAU-PARENT
- 08 = FRÈRE OU SOEUR
- 09 = CO-ÉPOUSE
- 10 = AUTRE PARENT
- 11 = ADOPTÉ/EN GARDE/ ENFANT DE LA FEMME/MARI
- 12 = SANS PARENTÉ
- 98 = NE SAIT PAS

TABLEAU MÉNAGE

No LIGNE	SI 0-17 ANS				SI 5 ANS OU PLUS		SI 5-24 ANS				SI 0-4 ANS	
	ÉTAT DE SURVIE ET RÉSIDENCE DES PARENTS BIOLOGIQUES				A FRÉQUENTÉ L'ÉCOLE		FRÉQUENTATION SCOLAIRE ACTUELLE/RÉCENTE		FRÉQUENTATION SCOLAIRE ANNÉE PRÉCÉDENTE			ENREGISTREMENT DES NAISSANCES
	12	13	14	15	16	17	18	19	19A	19B		
	La mère biologique de (NOM) est-elle en vie ?	La mère biologique de (NOM) vit-elle habituellement dans ce ménage ou était-elle en visite ici la nuit dernière ?	Le père biologique de (NOM) est-il en vie ?	Le père biologique de (NOM) vit-il habituellement dans ce ménage ou était-il en visite ici la nuit dernière ?	(NOM) a-t-il/elle déjà fréquenté l'école ?	Quel est le plus haut niveau d'études que (NOM) a atteint ? Quelle est la dernière classe que (NOM) a achevée à ce niveau ?	(Nom) a-t-il/elle fréquenté l'école à n'importe quel moment durant l'année scolaire [2017-2018] ?	Au cours de cette année scolaire, à quel niveau et en quelle classe est/était (NOM) ?	Au cours de l'année scolaire précédente, (NOM) a-t-il/elle fréquenté l'école à un certain moment ?	Durant l'année scolaire précédente, à quel niveau et dans quelle classe était (NOM) ?	(NOM) a-t-il/elle un certificat de naissance ? SI NON, INSISTEZ : La naissance de (NOM) a-t-elle été enregistrée à l'état civil ?	
	SI OUI : Quel est son nom ? NOTEZ LE No DE LIGNE DE LA MÈRE. SI NON, NOTEZ '00'.		SI OUI : Quel est son nom ? NOTEZ LE No DE LIGNE DU PÈRE. SI NON, NOTEZ '00'.		VOIR CODES CI-DESSOUS.		VOIR CODES CI-DESSOUS.				1 = A UN CERTIFICAT 2 = ENREGISTRÉE 3 = NI L'UN, NI L'AUTRE 8 = NE SAIT PAS	
01	O N NSP 1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	O N NSP 1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>	O N 1 2 ↓ 20FA	NIVEAU CLASSE <input type="text"/>	O N 1 2 ↓ 19A	NIVEAU CLASSE <input type="text"/>	O N 1 2 ↓ 20FA	NIVEAU CLASSE <input type="text"/>	<input type="text"/>	
02	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	1 2 ↓ 19A	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
03	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	1 2 ↓ 19A	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
04	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	1 2 ↓ 19A	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
05	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	1 2 ↓ 19A	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
06	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	1 2 ↓ 19A	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
07	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	1 2 ↓ 19A	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
08	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	1 2 ↓ 19A	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
09	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	1 2 ↓ 19A	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
10	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	1 2 ↓ 19A	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

CODES POUR QUESTIONS 17 ET 19: NIVEAU D'INSTRUCTION

NIVEAU	1=ELEMENTAIRE	2=MOYEN	3=SECONDAIRE	4=SUPERIEUR=4	5=PRÉSCOLAIRE	NSP=8
	00* = MOINS D'1 ANNÉE ACHÈVÉE EN CI	00* = MOINS D'1 ANNÉE ACHÈVÉE EN 6 ^{ÈME}	00* = MOINS D'1 ANNÉE ACHÈVÉE EN 2 ND	00* = MOINS D'1 ANNÉE ACHÈVÉE EN 1 ^{ÈRE} ANNÉE	00* = MOINS D'1 AN. ACHÈV. EN P.SECT.	
CLASSE	01 = CI	01 = 6 ^{ÈME}	01 = 2 ND	01 = 1 ^{ÈRE} ANNÉE	01 = Petite section	
	02 = CP	02 = 5 ^{ÈME}	02 = 1 ^{ÈRE}	02 = 2 ^{ÈME} ANNÉE	02 = Moyenne section	
	03 = CE1	03 = 4 ^{ÈME}	03 = TERMINALE	03 = 3 ^{ÈME} ANNÉE	03 = Grande section	
	04 = CE2	04 = 3 ^{ÈME}		04 = 4 ^{ÈME} ANNÉE		
	05 = CM1			05 = 5 ^{ÈME} ANNÉE		
	06 = CM2			06 = 6 ^{ÈME} ANNÉE		
	98 = NE SAIT PAS	98 = NE SAIT PAS	98 = NE SAIT PAS	98 = NE SAIT PAS	98 = NE SAIT PAS	

* : UTILISEZ '00' POUR Q. 17 SEULEMENT. CE CODE N'EST PAS AUTORISÉ POUR Q.19

TABLEAU MÉNAGE

No LIGNE	RÉSIDENTS HABITUELS ET VISITEURS	LIEN AVEC LE CHEF DE MÉNAGE	SEXE	RÉSIDENCE		ÂGE	SI 15 ANS OU PLUS	ÉLIGIBILITÉ		
				ÉTAT MATRIMONIAL	9		10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	S'il vous plaît, donnez-moi les noms des personnes qui vivent habituellement dans votre ménage et des visiteurs qui ont passé la nuit dernière ici, en commençant par le chef de ménage. APRÈS AVOIR LISTÉ LES NOMS ET ENREGISTRÉ LE LIEN DE PARENTÉ ET LE SEXE POUR CHAQUE PERSONNE, POSEZ LES QUESTIONS 2A-2C POUR VOUS ASSURER QUE LA LISTE EST COMPLÈTE. POSEZ ENSUITE LES QUESTIONS APPROPRIÉES DES COLONNES 5-20 POUR CHAQUE PERSONNE.	Quel est le lien de parenté de (NOM) avec le chef de ménage ? VOIR CODES CI-DESSOUS.	(NOM) est-il de sexe masculin ou féminin ?	(NOM) vit-il/elle ici habituellement ?	(NOM) a-t-il/elle passé la nuit dernière ici ?	Quel âge a (NOM) ? SI 95 OU PLUS, NOTEZ '95'.	Quel est l'état matrimonial actuel de (NOM) ? 1 = MARIÉ OU VIVANT ENSEMBLE 2 = DIVORCÉ/ SÉPARÉ 3 = VEUF 4 = JAMAIS MARIÉ ET N'A JAMAIS VÉCU AVEC QUELQU'UN	ENCERCLEZ LE No DE LIGNE DE TOUTES LES FEMMES DE 15-49 ANS	SI MÉNAGE SÉLECTIONNÉ POUR ENQUÊTE HOMME ENCERCLEZ LE No DE LIGNE DE TOUS LES HOMMES DE 15-59 ANS	ENCERCLEZ LE No DE LIGNE DE TOUTES LES ENFANTS DE 0-5 ANS
11		<input type="text"/>	M F 1 2	O N 1 2	O N 1 2	EN ANNÉES <input type="text"/>	<input type="text"/>	11	11	11
12		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	12	12	12
13		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	13	13	13
14		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	14	14	14
15		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	15	15	15
16		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	16	16	16
17		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	17	17	17
18		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	18	18	18
19		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	19	19	19
20		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	20	20	20

COCHÉZ ICI SI UNE AUTRE FEUILLE EST UTILISÉE

CODES POUR Q. 3: LIEN DE PARENTÉ AVEC CHEF DE MÉNAGE

- | | |
|----------------------------|---|
| 01 = CHEF DE MÉNAGE | 07 = BEAU-PARENT |
| 02 = FEMME OU MARI | 08 = FRÈRE OU SOEUR |
| 03 = FILS OU FILLE | 09 = CO-ÉPOUSE |
| 04 = GENDRE OU BELLE-FILLE | 10 = SANS PARENTÉ |
| 05 = PETIT FILS/FILLE | 11 = ADOPTÉ/EN GARDE/ ENFANT DE LA FEMME/MARI |
| 06 = PÈRE/MÈRE | 12 = SANS PARENTÉ |
| | 98 = NE SAIT PAS |

TABLEAU MÉNAGE

No LIGNE	SI 0-17 ANS				SI 5 ANS OU PLUS		SI 5-24 ANS				SI 0-4 ANS	
	ÉTAT DE SURVIE ET RÉSIDENCE DES PARENTS BIOLOGIQUES				A FRÉQUENTÉ L'ÉCOLE		FRÉQUENTATION SCOLAIRE ACTUELLE/RÉCENTE		FRÉQUENTATION SCOLAIRE ANNÉE PRÉCÉDENTE			ENREGISTREMENT DES NAISSANCES
	12	13	14	15	16	17	18	19	19A	19B		
	La mère biologique de (NOM) est-elle en vie ?	La mère biologique de (NOM) vit-elle habituellement dans ce ménage ou était-elle en visite ici la nuit dernière ? SI OUI : Quel est son nom ? NOTEZ LE No DE LIGNE DE LA MÈRE. SI NON, NOTEZ '00'.	Le père biologique de (NOM) est-il en vie ?	Le père biologique de (NOM) vit-il habituellement dans ce ménage ou était-il en visite ici la nuit dernière ? SI OUI : Quel est son nom ? NOTEZ LE No DE LIGNE DU PÈRE. SI NON, NOTEZ '00'.	(NOM) a-t-il/elle déjà fréquenté l'école ?	Quel est le plus haut niveau d'études que (NOM) a atteint ? Quelle est la dernière classe que (NOM) a achevée à ce niveau ? VOIR CODES CI-DESSOUS.	(Nom) a-t-il/elle fréquenté l'école à n'importe quel moment durant l'année scolaire [2017-2018] ?	Au cours de cette année scolaire, à quel niveau et en quelle classe est/était (NOM) ? VOIR CODES CI-DESSOUS.	Au cours de l'année scolaire précédente, (NOM) a-t-il/elle fréquenté l'école à un certain moment ?	Durant l'année scolaire précédente, à quel niveau et dans quelle classe était (NOM) ?	(NOM) a-t-il/elle un certificat de naissance ? SI NON, INSISTEZ : La naissance de (NOM) a-t-elle été enregistrée à l'état civil ? 1 = A UN CERTIFICAT 2 = ENREGISTRÉE 3 = NI L'UN, NI L'AUTRE 8 = NE SAIT PAS	
11	O N NSP 1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	O N NSP 1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>	O N 1 2 ↓ 20FA	NIVEAU CLASSE <input type="text"/>	O N 1 2 ↓ 19A	NIVEAU CLASSE <input type="text"/>	O N 1 2 ↓ 20FA	NIVEAU CLASSE <input type="text"/>	<input type="text"/>	
12	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	1 2 ↓ 19A	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
13	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	1 2 ↓ 19A	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
14	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	1 2 ↓ 19A	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
15	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	1 2 ↓ 19A	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
16	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	1 2 ↓ 19A	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
17	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	1 2 ↓ 19A	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
18	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	1 2 ↓ 19A	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
19	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	1 2 ↓ 19A	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
20	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	1 2 ↓ 19A	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

CODES POUR QUESTIONS 17 ET 19: NIVEAU D'INSTRUCTION

NIVEAU	1=ELEMENTAIRE	2=MOYEN	3=SECONDAIRE	4=SUPERIEUR=4	5=PRÉSCOLAIRE	NSP=8
	00* = MOINS D'1 ANNÉE ACHEVEE EN CI	00* = MOINS D'1 ANNÉE ACHEV/FF FN 6 ^{EME}	00* = MOINS D'1 ANNÉE ACH VFF FN 2 ND	00* = MOINS D'1 ANNÉE A- CHEV/FF FN 1 ^{ERE} ANNÉE	00* = MOINS D'1 AN. ACHEV. EN P. SECT.	
CLASSE	01 = CI 02 = CP 03 = CE1 04 = CE2 05 = CM1 06 = CM2	01 = 6 ^{EME} 02 = 5 ^{EME} 03 = 4 ^{EME} 04 = 3 ^{EME}	01 = 2 ND 02 = 1 ^{ERE} 03 = TERMINALE	01 = 1 ^{ERE} ANNÉE 02 = 2 ^{ME} ANNÉE 03 = 3 ^{ME} ANNÉE 04 = 4 ^{ME} ANNÉE 05 = 5 ^{ME} ANNÉE 06 = 6 ^{ME} ANNÉE 07 = 7 ^{ME} ANNÉE 08 = 8 ^{ME} ANNÉE OU PLUS	01 = Petite section 02 = Moyenne section 03 = Grande section	
	98 = NE SAIT PAS	98 = NE SAIT PAS	98 = NE SAIT PAS	98 = NE SAIT PAS	98 = NE SAIT PAS	

* : UTILISEZ '00' POUR Q. 17 SEULEMENT. CE CODE N'EST PAS AUTORISÉ POUR Q.19

TABLEAU MÉNAGE

N° LIGNE	PRISE EN CHARGE DES ENFANTS DE 3 - 5 ANS			COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE À TOUS LES MEMBRES DU MÉNAGE				
	20D	20E	20F	20FA	20FB	20FC	20FD	20FE
	Au cours de cette année scolaire, (NOM) fréquente-t-il/elle un lieu d'encadrement en dehors de la maison tel qu'une école maternelle, une Casé des Tout Petits, un centre communautaire	Quel établissement (NOM) fréquente-t-il/elle ? 01= ECOLE MATERNELLE 02= JARDIN D'ENFANT 03= CASE DE TP 04= ECOLE ELEMENTAIRE 05= DAARA, CORAN, ARABE 06= CENTRE COMMUNAUTAIRE 96= AUTRE INSCRIRE LE CODE APPROPRIE	Depuis combien d'années ? 1= ANNEE EN COURS 2= ANNEE DERNIERE 3= ANNEE D'AVANT 7= AUTRE INSCRIRE LE CODE APPROPRIE	Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur la Couverture Maladie universelle Est-ce que (NOM) bénéficie d'un régime de couverture maladie et quel type ? MUTUELLE DE SANTÉ COM. A MUTUELLE DE SANTÉ PROF. B MUTUELLE DE SANTÉ COMPL. C IPM D IMPUTATION BUDGETAIRE E ASSURANCE PRIVÉE F ASSUR. MALADIE RETRAITÉ (PRES) G → 20FC ASSUR. MALADIE RETRAITÉ (FNR) H GRATUITÉ SOINS ENFANT 0-4 ANS I PLAN SÉSAME (60 ANS ET +) J AUCUNE Y	Qui, principalement, a payé la cotisation à la mutuelle de santé ? (NOM) - MÊME ADHERANT 1 (NOM) - MÊME Personne en charge 2 MEMBRE MENAGE 3 AUTRE PARENT (HORS MENAGE) 4 PTF/ONG/PRIVÉ 5 ETAT: Bource de sécurité familiale 6 ETAT: Carte égalité de chance 7 COLLECTIVITE LOCALE 8 AUTRE 9	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que (NOM) a eu recours à une consultation ? OUI .. 1 NON 2 → 20GA	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous (ou quelqu'un dans le ménage a-t-il) payé pour la dernière consultation de (NOM) ? OUI... 1 NON . 2→101A	Qui a payé pour cette dernière consultation de (NOM) et comment ? TOTALLEMENT PAYÉ REGIME COUV... 1 TOTALLEMENT PAYÉ PAR (NOM) / PAR MENAGE 2 PARTIELLEMENT PAR MUTUELLE SANTÉ COMPL..... 3 PARTIELLEMENT PAYÉ PAR (NOM) / PAR MENAGE 4 NSP 8
	(20D)	(20E)	(20F)	(20FA)	(20FB)	(20FC)	(20FD)	(20FE)
01	O N NSP 1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

15	1 2 ↓ 8 ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>						
16	1 2 ↓ 8 ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>						
17	1 2 ↓ 8 ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>						
18	1 2 ↓ 8 ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>						
19	1 2 ↓ 8 ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>						
20	1 2 ↓ 8 ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>						

TABLEAU MÉNAGE

SI ÂGÉ DE 5 ANS OU PLUS						
No LIGNE	HANDICAP					
	20GA	20GB	20GC	20GD	20GE	20GF
	Est-ce que (NOM) porte des lunettes ou des lentilles de contact pour voir ?	Je voudrais savoir si (NOM) a des difficultés pour voir même quand il/elle porte des lunettes ou des lentilles de contact. Diriez-vous que (NOM) n'a aucune difficulté pour voir, quelques difficultés, beaucoup de difficulté ou qu'il/elle ne peut pas voir du tout ? 1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR VOIR 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3 = BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS VOIR DU TOUT 8 = NE SAIT PAS	Je voudrais savoir si (NOM) a des difficultés pour voir. Diriez-vous que (NOM) n'a aucune difficulté pour voir, quelques difficultés, beaucoup de difficulté ou qu'il/elle ne peut pas voir du tout ? 1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR VOIR 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3 = BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS VOIR DU TOUT 8 = NE SAIT PAS	Est-ce que (NOM) porte un appareil auditif ?	Je voudrais savoir si (NOM) a des difficultés pour entendre même quand il/elle porte un appareil auditif. Diriez-vous que (NOM) n'a aucune difficulté pour entendre, quelques difficultés, beaucoup de difficulté ou qu'il/elle ne peut pas entendre du tout ? 1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR ENTENDRE 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3 = BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS ENTENDRE DU TOUT 8 = NE SAIT PAS	Je voudrais savoir si (NOM) a des difficultés pour entendre. Diriez-vous que (NOM) n'a aucune difficulté pour entendre, quelques difficultés, beaucoup de difficulté ou qu'il/elle ne peut pas entendre du tout ? 1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR ENTENDRE 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3 = BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS ENTENDRE DU TOUT 8 = NE SAIT PAS
1	O N 1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	O N 1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
2	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
3	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
4	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
5	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
6	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
7	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
9	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
10	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8

TABLEAU MÉNAGE

	SI ÂGÉ DE 5 ANS OU PLUS			
No LIGNE	HANDICAP			
	20GG	20GH	20GI	20GJ
	<p>Je voudrais savoir si (NOM) a des difficultés pour communiquer dans sa langue habituelle. Diriez-vous que (NOM) n'a aucune difficulté pour comprendre ou être compris, quelques difficultés, beaucoup de difficulté ou qu'il/elle ne peut pas communiquer du tout ?</p> <p>1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR COMMUNIQUER 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3 = BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS COMMUNIQUER DU TOUT 8 = NE SAIT PAS</p>	<p>Je voudrais savoir si (NOM) a des difficultés pour se rappeler ou se concentrer. Diriez-vous que (NOM) n'a aucune difficulté pour se rappeler ou se concentrer, quelques difficultés, beaucoup de difficulté ou qu'il/elle ne peut pas se rappeler ou se concentrer du tout ?</p> <p>1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR SE RAPPELER OU POUR SE CONCENTRER 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3=BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS SE RAPPELER/SE CONCENTRER DU TOUT 8 = NE SAIT PAS</p>	<p>Je voudrais savoir si (NOM) a des difficultés pour marcher ou monter des marches. Diriez-vous que (NOM) n'a aucune difficulté pour marcher ou monter des marches, quelques difficultés, beaucoup de difficulté ou qu'il/elle ne peut pas marcher ou monter des marches du tout ?</p> <p>1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR MARCHER OU GRIMPER 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3=BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS MARCHER OU GRIMPER DU TOUT 8 = NE SAIT PAS</p>	<p>Je voudrais savoir si (NOM) a des difficultés pour se laver ou s'habiller. Diriez-vous que (NOM) n'a aucune difficulté pour se laver ou s'habiller, quelques difficultés, beaucoup de difficulté ou qu'il/elle ne peut pas se laver ou s'habiller du tout ?</p> <p>1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR SE LAVER OU S'HABILLER 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3=BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS SE LAVER OU S'HABILLER DU TOUT 8 = NE SAIT PAS</p>
1	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
2	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
3	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
4	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
5	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
6	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
7	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
9	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
10	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8

TABLEAU MÉNAGE

SI ÂGÉ DE 5 ANS OU PLUS						
No LIGNE	HANDICAP					
	20GA	20GB	20GC	20GD	20GE	20GF
	Est-ce que (NOM) porte des lunettes ou des lentilles de contact pour voir ?	Je voudrais savoir si (NOM) a des difficultés pour voir même quand il/elle porte des lunettes ou des lentilles de contact. Diriez-vous que (NOM) n'a aucune difficulté pour voir, quelques difficultés, beaucoup de difficulté ou qu'il/elle ne peut pas voir du tout ? 1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR VOIR 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3 = BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS VOIR DU TOUT 8 = NE SAIT PAS	Je voudrais savoir si (NOM) a des difficultés pour voir. Diriez-vous que (NOM) n'a aucune difficulté pour voir, quelques difficultés, beaucoup de difficulté ou qu'il/elle ne peut pas voir du tout ? 1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR VOIR 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3 = BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS VOIR DU TOUT 8 = NE SAIT PAS	Est-ce que (NOM) porte un appareil auditif ?	Je voudrais savoir si (NOM) a des difficultés pour entendre même quand il/elle porte un appareil auditif. Diriez-vous que (NOM) n'a aucune difficulté pour entendre, quelques difficultés, beaucoup de difficulté ou qu'il/elle ne peut pas entendre du tout ? 1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR ENTENDRE 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3 = BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS ENTENDRE DU TOUT 8 = NE SAIT PAS	Je voudrais savoir si (NOM) a des difficultés pour entendre. Diriez-vous que (NOM) n'a aucune difficulté pour entendre, quelques difficultés, beaucoup de difficulté ou qu'il/elle ne peut pas entendre du tout ? 1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR ENTENDRE 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3 = BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS ENTENDRE DU TOUT 8 = NE SAIT PAS
11	O N 1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	O N 1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
12	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
13	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
14	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
15	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
16	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
17	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
18	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
19	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
20	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8

TABLEAU MÉNAGE

		SI ÂGÉ DE 5 ANS OU PLUS																		
No LIGNE	HANDICAP																			
	20GG				20GH				20GI				20GJ							
	Je voudrais savoir si (NOM) a des difficultés pour communiquer dans sa langue habituelle. Diriez-vous que (NOM) n'a aucune difficulté pour comprendre ou être compris, quelques difficultés, beaucoup de difficulté ou qu'il/elle ne peut pas communiquer du tout ?				Je voudrais savoir si (NOM) a des difficultés pour se rappeler ou se concentrer. Diriez-vous que (NOM) n'a aucune difficulté pour se rappeler ou se concentrer, quelques difficultés, beaucoup de difficulté ou qu'il/elle ne peut pas se rappeler ou se concentrer du tout ?				Je voudrais savoir si (NOM) a des difficultés pour marcher ou monter des marches. Diriez-vous que (NOM) n'a aucune difficulté pour marcher ou monter des marches, quelques difficultés, beaucoup de difficulté ou qu'il/elle ne peut pas marcher ou monter des marches du tout ?				Je voudrais savoir si (NOM) a des difficultés pour se laver ou s'habiller. Diriez-vous que (NOM) n'a aucune difficulté pour se laver ou s'habiller, quelques difficultés, beaucoup de difficulté ou qu'il/elle ne peut pas se laver ou s'habiller du tout ?							
	1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR COMMUNIQUER 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3 = BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS COMMUNIQUER DU TOUT 8 = NE SAIT PAS				1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR SE RAPPELER OU POUR SE CONCENTRER 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3=BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS SE RAPPELER/SE CONCENTRER DU TOUT 8 = NE SAIT PAS				1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR MARCHER OU GRIMPER 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3=BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS MARCHER OU GRIMPER DU TOUT 8 = NE SAIT PAS				1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR SE LAVER OU S'HABILLER 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3=BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS SE LAVER OU S'HABILLER DU TOUT 8 = NE SAIT PAS							
11	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
12	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
13	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
14	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
15	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
16	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
17	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
18	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
19	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8
20	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8	1	2	3	4	8

CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
101A	Quel est le statut d'occupation du logement de votre ménage ?	PROPRIÉTAIRE 01 COPROPRIÉTAIRE 02 LOCATAIRE-ACHETEUR 03 LOCATAIRE SIMPLE 04 COLOCATAIRE 05 SOUS-LOCATAIRE 06 LOGÉ PAR L'EMPLOYEUR 07 LOGÉ GRATUITEMENT PAR UN PARENT OU AMI 08	
101	D'où provient principalement l'eau que boivent les membres de votre ménage ?	EAU DU ROBINET ROBINET DANS LOGEMENT 11 ROBINET DANS COUR/PARCELLE 12 ROBINET CHEZ UN VOISIN 13 ROBINET PUBLIC/BORNE FONTAINE 14 PUIITS À POMPE OU FORAGE 21 PUITS CREUSÉ PUIITS PROTÉGÉ 31 PUIITS NON PROTÉGÉ 32 EAU DE SOURCE SOURCE PROTÉGÉE 41 SOURCE NON PROTÉGÉE 42 EAU DE PLUIE 51 CAMION CITERNE 61 CHARRETTE AVEC PETITE CITERNE/ BIDON OU CHAMBRE A AIR/TONNEAU 71 EAU DE SURFACE (RIVIÈRE/BARRAGE/LAC/ MARE/FLEUVE/CANAL/ CANAL D'IRRIGATION) 81 EAU EN BOUTEILLE / SACHET INDUSTRIALISÉ 91 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	→ 106 → 103 → 103
102	D'où provient principalement l'eau utilisée par votre ménage à d'autres fins comme pour faire la cuisine et se laver les mains ?	EAU DU ROBINET ROBINET DANS LOGEMENT 11 ROBINET DANS COUR/PARCELLE 12 ROBINET CHEZ UN VOISIN 13 ROBINET PUBLIC/BORNE FONTAINE 14 PUIITS À POMPE OU FORAGE 21 PUITS CREUSÉ PUIITS PROTÉGÉ 31 PUIITS NON PROTÉGÉ 32 EAU DE SOURCE SOURCE PROTÉGÉE 41 SOURCE NON PROTÉGÉE 42 EAU DE PLUIE 51 CAMION CITERNE 61 CHARRETTE AVEC PETITE CITERNE/ BIDON OU CHAMBRE A AIR/TONNEAU 71 EAU DE SURFACE (RIVIÈRE/BARRAGE/LAC/ MARE/FLEUVE/CANAL/ CANAL D'IRRIGATION) 81 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	→ 106
103	Où est située cette source d'approvisionnement de l'eau ?	DANS VOTRE LOGEMENT 1 DANS VOTRE COUR/PARCELLE 2 AILLEURS 3	→ 105
104	Combien de temps faut-il pour s'y rendre, prendre l'eau et revenir ?	MINUTES <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 998	
104A	Qui se rend habituellement à cette source d'approvisionnement pour prendre l'eau pour votre ménage ?	FEMME ADULTE (15 ANS OU PLUS) 1 HOMME ADULTE (15 ANS OU PLUS) 2 JEUNE FILLE (MOINS DE 15 ANS) 3 JEUNE GARÇON (MOINS DE 15 ANS) 4 NSP 8	

CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
105	VÉRIFIEZ 101 ET 102 : CODE '14' OU '21' ENCERCLÉ OUI <input data-bbox="651 286 679 315" type="checkbox"/> ↓	NON <input data-bbox="938 286 967 315" type="checkbox"/> →	107

CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
106	Est-ce qu'au cours des deux dernières semaines, il est arrivé qu'à cet endroit, l'eau n'ait pas été disponible pendant au moins toute une journée ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
107	Faites-vous quelque chose pour rendre l'eau plus saine à boire ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 109
108	Habituellement, que faites-vous pour rendre l'eau que vous buvez plus saine ? Quelque chose d'autre ? ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	LA FAIRE BOUILLIR A AJOUTER EAU DE JAVEL/CHLORE/AQUATAB B LA FILTRER À TRAVERS UN LINGE C UTILISER UN FILTRE (CÉRAMIQUE/ SABLE/COMPOSITE/ETC.) D DÉSINFECTION SOLAIRE E LA LAISSER REPOSER F AUTRE X (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS Z	
109	Quel type de toilettes les membres de votre ménage utilisent-ils habituellement ? S'IL N'EST PAS POSSIBLE DE DÉTERMINER LE TYPE DE TOILETTES, DEMANDEZ LA PERMISSION DE VOIR L'INSTALLATION.	CHASSE D'EAU/CHASSE MANUELLE CHASSE D'EAU CONNECTÉE À UN SYSTÈME D'ÉGOUT 11 À UNE FOSSE SEPTIQUE 12 À UNE FOSSE D'AISANCES 13 À QUELQUE CHOSE D'AUTRE 14 À NE SAIT PAS OÙ 15 FOSSE D'AISANCES FOSSES D'AISANCES AMÉLIORÉE AUTO-AÉRÉE 21 FOSSES D'AISANCES AVEC DALLE 22 FOSSES D'AISANCES SANS DALLE TROU OUVERT 23 TOILETTES À COMPOSTAGE 31 SEAU/TINETTE 41 TOILETTES/LATRINES SUSPENDUES 51 PAS DE TOILETTES/NATURE 61 AUTRE 96 (PRÉCISEZ)	→ 112A
110	Partagez-vous ces toilettes avec d'autres ménages ?	OUI 1 NON 2	→ 112
111	En comptant votre propre ménage, combien de ménages utilisent ces toilettes ?	NOMBRE DE MÉNAGES SI MOINS DE 10 <input type="text" value="0"/> <input type="text"/> 10 MÉNAGES OU PLUS 95 NE SAIT PAS 98	
112	Où se trouvent ces toilettes ?	DANS VOTRE LOGEMENT 1 DANS VOTRE COUR/PARCELLE 2 AILLEURS 3	
112A	Quelle source d'éclairage votre ménage utilise-t-il principalement ?	ELECTRICITE (SENELEC) 01 GROUPE ELECTROGENE 02 SOLAIRE 03 LAMPE TORCHE 04 LAMPE A GAZ 05 LAMPE TEMPET 06 LAMPE A PETROLE ARTISANALE 07 BOUGIE 08 BOIS 09 AUTRE 96 (PRÉCISEZ)	

CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
113	Quel type de combustible votre ménage utilise-t-il principalement pour cuisiner ?	ÉLECTRICITÉ 01 GAZ EN BOUTEILLE 02 CHARBON DE BOIS 03 BOIS À BRÛLER, PAILLE 04 RÉSIDUS AGRICOLES 05 BOUS 06 PAS DE REPAS PRÉPARÉ DANS LE MÉNAGE . 95 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	→ 116
114	Est-ce que la cuisine est faite habituellement dans la maison, dans un bâtiment séparé ou à l'extérieur ?	DANS LA MAISON 1 DANS UN BÂTIMENT SÉPARÉ 2 À L'EXTÉRIEUR 3 AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ)	→ 116
115	Avez-vous une pièce séparée que vous utilisez comme cuisine ?	OUI 1 NON 2	
116	Dans ce ménage, combien de pièces utilisez-vous pour dormir ?	NOMBRE DE PIÈCES <input type="text"/>	
117	Est-ce que votre ménage possède du bétail, des troupeaux, d'autres animaux de ferme ou de la volaille ?	OUI 1 NON 2	→ 119
118	Parmi les animaux suivants, combien votre ménage en possède-t-il ? SI AUCUN, NOTEZ '00'. SI 95 OU PLUS, NOTEZ '95'. SI NE SAIT PAS, NOTEZ '98'. a) Vaches laitières ou taureaux ? b) Chameaux ? c) Chevaux, ânes ou mules ? d) Chèvres ? e) Moutons ? f) Poulets ou autre volaille ? g) Porcs ?	a) VACHES/TAUREAUX <input type="text"/> b) CHAMEAUX <input type="text"/> c) CHEVAUX/ANES/MULES <input type="text"/> d) CHÈVRES <input type="text"/> e) MOUTONS <input type="text"/> f) POULETS/AUTRE VOLAILLE <input type="text"/> g) PORCS <input type="text"/>	
119	Est-ce qu'un membre de votre ménage possède des	OUI 1 NON 2	→ 121
	Combien d'hectares de terres cultivables les membres du ménage possèdent-ils ? SI 95 OU PLUS, ENCERCLEZ '950'.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 95 HECTARES OU PLUS 950 NE SAIT PAS 998	
121	Dans ce ménage, avez-vous :	OUI NON ÉLECTRICITÉ 1 2 RADIO 1 2 TÉLÉVISION 1 2 ANTENNE TV5 1 2 CANAL 1 2 TÉLÉPHONE 1 2 TÉLÉP-CEL 1 2 MACHINE À LAVER 1 2 RÉFRIGÉRATEUR 1 2 RÉCHAUD/CUISINIÈRE 1 2 FOYER AMÉLIORÉ 1 2 VIDÉO/CD/DVD 1 2 CLIMATISEUR 1 2 ORDINATEUR 1 2 INTERNET 1 2	
122	Est-ce qu'un membre de votre ménage possède :	OUI NON BICYCLETTE 1 2 MOBYLETTE/MOTOCYCLETTE 1 2 VOITURE PERSONNELLE 1 2	

CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
	d) Voiture ou Camion à titre commercial ? e) Charrette ? f) Charrue ? g) Pirogue/Filet de pêche ?	VOITURE/CAMIC 1 2 CHARRE 1 2 CHARRUE 1 2 PIROGUE/FILET 1 2	
123	Est-ce qu'un membre de votre ménage a un compte en banque ou dans une autres institution financière ?	OUI 1 NON 2	
123A	Est-ce qu'un membre de votre ménage participe à une tontine ?	OUI 1 NON 2 NSP 8	
123B	Avez-vous (ou un membre du ménage) envoyé des fonds à destination du Sénégal ou de l'international ?	SÉNÉGAL 1 INTERNATIONAL 2 NON 3 NSP 8	
123C	Avez-vous (ou un membre du ménage) reçu des fonds au Sénégal ou à l'international ?	SÉNÉGAL 1 INTERNATIONAL 2 NON 3 NSP 8	→ 124
124	Est-ce qu'il arrive que quelqu'un fume dans votre maison ? Diriez-vous que cela arrive tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois, moins d'une fois par mois ou jamais ?	TOUS LES JOURS 1 UNE FOIS PAR SEMAINE 2 UNE FOIS PAR MOIS 3 MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS 4 JAMAIS 5	
125	Est-ce qu'à n'importe quel moment au cours des 12 derniers mois, quelqu'un est venu dans votre logement pour pulvériser les murs intérieurs contre les moustiques ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 126 A
126	Qui a pulvérisé les murs du logement ?	EMPLOYÉ/PROGRAMME GOUVERNEMENT A SOCIÉTÉ PRIVÉE B ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE (ONG) C AUTRE _____ X (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS Z	

CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
126A	Les fenêtres des pièces à usage d'habitation sont-elles dotées de grillages pour empêcher aux moustiques d'entrer?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
126B	Les portes des pièces à usage d'habitation sont-elles dotées de grillages ou rideaux pour empêcher aux moustiques d'entrer?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
127	Est-ce que votre ménage a des moustiquaires qui peuvent être utilisées pour dormir ?	OUI 1 NON 2	→ 128D
128	Combien de moustiquaires votre ménage a-t-il ? SI 7 MOUSTIQUAIRES OU PLUS, NOTEZ '7'.	NOMBRE DE MOUSTIQUAIRES <input type="text"/>	
128A	Utilisez-vous les moustiquaires en dehors des chambres: par exemple dans la cour, sous les arbres?	OUI 1 NON 2	
128B	Les membres de votre ménage dorment-ils sous une moustiquaire de façon continue toute l'année ?	OUI 1 NON 2 NSP/NE SE SOUVIENT PAS 8	→ 129
128C	Pourquoi les membres de votre ménage ne dorment-ils pas sous une moustiquaire de façon continue toute l'année?	PAS BEAUCOUP DE MOUSTIQUES 1 À CAUSE DE LA CHALEUR 2 N'AIME PAS 3 PAR OUBLI/NÉGLIGENCE 4 AUTRE 6 (PRÉCISER) NSP/NE SE SOUVIENT PAS 8	→ 129
128D	Pourquoi n'y a-t-il pas de moustiquaires qui peuvent être utilisées dans votre ménage?	FAUTE DE MOYENS A PAS NÉCESSAIRE B UTILISE AUTRE CHOSE C N'ONT PAS DE MOUSTIQUES D N'AIMENT PAS E AUTRE X (PRÉCISER) NE SAIT PAS Y	→ 139

MOUSTIQUAIRES

		MOUSTIQUAIRE #1	MOUSTIQUAIRE #2	MOUSTIQUAIRE #3
129	DEMANDEZ À L'ENQUÊTÉ DE VOUS MONTRER TOUTES LES MOUSTIQUAIRES DU MÉNAGE. SI PLUS DE 3 MOUSTIQUAIRES, UTILISEZ UN/DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES.	OBSERVÉE 1 NON OBSERVÉE 2	OBSERVÉE 1 NON OBSERVÉE 2	OBSERVÉE 1 NON OBSERVÉE 2
130	Cela fait combien de mois que votre ménage a la moustiquaire ? SI MOINS D'UN MOIS, NOTEZ '00'.	IL Y A MOIS <input type="text"/> PLUS DE 36 MOIS 95 PAS SÛR 98	IL Y A MOIS <input type="text"/> PLUS DE 36 MOIS 95 PAS SÛR 98	IL Y A MOIS <input type="text"/> PLUS DE 36 MOIS 95 PAS SÛR 98
131	OBSERVEZ OU DEMANDEZ LA MARQUE/TYPE DE LA MOUSTIQUAIRE. SI LA MARQUE N'EST PAS CONNUE ET SI VOUS NE POUVEZ PAS VOIR LA MOUSTIQUAIRE, MONTREZ À L'ENQUÊTÉ DES PHOTOS DE MARQUES ET DE TYPES COURANTS DE MOUSTIQUAIRE.	MOUSTIQUAIRE DE LONGUE DURÉE (MILDA) : PERMANET 11 OLYSET-NET 12 DAWA PLUS 13 ICONLIFE 14 INTERCEPTOR 15 AUTRE 16 (PRÉCISER) (PASSER À 134) AUTRE MOUST. TRAITÉE K-ONET 21 NETTO 22 SENTINELLE 23 AUTRE 26 (PRÉCISER) (PASSER À 132) CONFECTIONNÉ PAR UN TAILLEUR 30 AUTRE 31 (PRÉCISER) NSP/PAS SÛR 98	MOUSTIQUAIRE DE LONGUE DURÉE (MILDA) : PERMANET 11 OLYSET-NET 12 DAWA PLUS 13 ICONLIFE 14 INTERCEPTOR 15 AUTRE 16 (PRÉCISER) (PASSER À 134) AUTRE MOUST. TRAITÉE K-ONET 21 NETTO 22 SENTINELLE 23 AUTRE 26 (PRÉCISER) (PASSER À 132) CONFECTIONNÉ PAR UN TAILLEUR 30 AUTRE 31 (PRÉCISER) NSP/PAS SÛR 98	MOUSTIQUAIRE DE LONGUE DURÉE (MILDA) : PERMANET 11 OLYSET-NET 12 DAWA PLUS 13 ICONLIFE 14 INTERCEPTOR 15 AUTRE 16 (PRÉCISER) (PASSER À 134) AUTRE MOUST. TRAITÉE K-ONET 21 NETTO 22 SENTINELLE 23 AUTRE 26 (PRÉCISER) (PASSER À 132) CONFECTIONNÉ PAR UN TAILLEUR 30 AUTRE 31 (PRÉCISER) NSP/PAS SÛR 98
131A	Quand vous avez obtenu cette moustiquaire, était-elle déjà traitée par le fabricant avec un insecticide qui tue ou éloigne les moustiques ?	OUI 1 NON 2 PAS SÛR/NSP 8	OUI 1 NON 2 PAS SÛR/NSP 8	OUI 1 NON 2 PAS SÛR/NSP 8
132	Depuis que vous avez la moustiquaire, a-t-elle été trempée ou plongée dans un liquide pour tuer ou éloigner les moustiques ?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 134) PAS SÛR 8	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 134) PAS SÛR 8	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 134) PAS SÛR 8
133	Cela fait combien de mois que la moustiquaire a été trempée ou plongée pour la dernière fois ? S'IL Y A MOINS D'UN MOIS, INSCRIVEZ '00'.	IL Y A MOIS <input type="text"/> IL Y A PLUS DE 24 MOIS 95 PAS SÛR 98	IL Y A MOIS <input type="text"/> IL Y A PLUS DE 24 MOIS 95 PAS SÛR 98	IL Y A MOIS <input type="text"/> IL Y A PLUS DE 24 MOIS 95 PAS SÛR 98
134	Avez-vous obtenu la moustiquaire à l'occasion [NOM LOCAL D'UNE CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DE MASSE], durant une visite prénatale ou au cours d'une visite pour une vaccination ?	OUI, [NOM DE LA CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DE MASSE] 1 OUI, PRÉNATALE 2 OUI, VISITE POUR VACCINATION 3 (ALLEZ À 136) NON 4	OUI, [NOM DE LA CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DE MASSE] 1 OUI, PRÉNATALE 2 OUI, VISITE POUR VACCINATION 3 (ALLEZ À 136) NON 4	OUI, [NOM DE LA CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DE MASSE] 1 OUI, PRÉNATALE 2 OUI, VISITE POUR VACCINATION 3 (ALLEZ À 136) NON 4
135	Où avez-vous obtenu la moustiquaire ?	ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DU GOV 01 ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ PRIVÉ 02 PHARMACIE 03 BOUTIQUE/MARCH 04 AGENT SANTÉ COMMUN 05 INSTITUTION RELIGIEUSE 06 ÉCOLE 07 POINT DIST. CAMPAGNE 08 PARENT/VOISIN/AMI 09 OCB/ASSOCIAT 10 AUTRE 96 NE SAIT PAS 98	ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DU GOV 01 ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ PRIVÉ 02 PHARMACIE 03 BOUTIQUE/MARCH 04 AGENT SANTÉ COMMUN 05 INSTITUTION RELIGIEUSE 06 ÉCOLE 07 POINT DIST. CAMPAGNE 08 PARENT/VOISIN/AMI 09 OCB/ASSOCIAT 10 AUTRE 96 NE SAIT PAS 98	ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DU GOV 01 ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ PRIVÉ 02 PHARMACIE 03 BOUTIQUE/MARCH 04 AGENT SANTÉ COMMUN 05 INSTITUTION RELIGIEUSE 06 ÉCOLE 07 POINT DIST. CAMPAGNE 08 PARENT/VOISIN/AMI 09 OCB/ASSOCIAT 10 AUTRE 96 NE SAIT PAS 98

MOUSTIQUAIRES

		MOUSTIQUAIRE #1	MOUSTIQUAIRE #2	MOUSTIQUAIRE #3
136	Est-ce que, la nuit dernière, quelqu'un a dormi sous cette moustiquaire ?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 137B) ← PAS SÛR 8	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 137B) ← PAS SÛR 8	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 137B) ← PAS SÛR 8
137	Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière ? INSCRIVEZ LE NOM DE LA PERSONNE ET SON NUMÉRO DE LIGNE DU TABLEAU MÉNAGE.	NOM _____ No DE [][] LIGNE [][] ----- NOM _____ No DE [][] LIGNE [][] ----- NOM _____ No DE [][] LIGNE [][] ----- NOM _____ No DE [][] LIGNE [][]	NOM _____ No DE [][] LIGNE [][] ----- NOM _____ No DE [][] LIGNE [][] ----- NOM _____ No DE [][] LIGNE [][] ----- NOM _____ No DE [][] LIGNE [][]	NOM _____ No DE [][] LIGNE [][] ----- NOM _____ No DE [][] LIGNE [][] ----- NOM _____ No DE [][] LIGNE [][] ----- NOM _____ No DE [][] LIGNE [][]
137A	Est-ce que cette moustiquaire a été modifiée après avoir été acquise?	OUI 1 NON 2 NSP 8	OUI 1 NON 2 NSP 8	OUI 1 NON 2 NSP 8
137B	VERIFIER 136 :	OUI 1 (ALLER À 137D) ↙ NON/NSP 2	OUI 1 (ALLER À 137D) ↙ P 2	OUI 1 (ALLER À 137D) ↙ NON/NSP 2
137C	Pourquoi, la nuit dernière, personne n'a dormi sous cette moustiquaire? SI PLUSIEURS RAISONS SONT MENTIONNÉES, DEMANDER ET ENREGISTRER LA PRINCIPALE.	PAS MOUSTIQUES 1 CHALEUR 2 DECHIRE 3 N'EST PLUS EFFICACE 4 AUTRE 6 (PRÉCISER) NE SAIT PAS 8	PAS MOUSTIQUES 1 CHALEUR 2 DECHIRE 3 N'EST PLUS EFFICACE 4 AUTRE 6 (PRÉCISER) NE SAIT PAS 8	PAS MOUSTIQUES 1 CHALEUR 2 DECHIRE 3 N'EST PLUS EFFICACE 4 AUTRE 6 (PRÉCISER) NE SAIT PAS 8
137D	Combien d'argent avez-vous effectivement payé pour acquérir la moustiquaire? NOTER EN FRANCS CFA.	Prix [][][][][] NE SAIT PAS 9998	Prix [][][][][] NE SAIT PAS 9998	Prix [][][][][] NE SAIT PAS 9998
137E	VÉRIFIER 131 ET 132: MILDA OU AUTRES TYPES DE MOUSTIQUAIRES.	Q131 : MILDA : (ALLER À 137F a-) ↙ Q132 : CODE 1 : (ALLER À 137F b-) ↙ Q132 : CODES 2 OU 8 : (ALLER À 137F a-) ↙	Q131 : MILDA : (ALLER À 137F a-) ↙ Q132 : CODE 1 : (ALLER À 137F b-) ↙ Q132 : CODES 2 OU 8 : (ALLER À 137F a-) ↙	Q131 : MILDA : (ALLER À 137F a-) ↙ Q132 : CODE 1 : (ALLER À 137F b-) ↙ Q132 : CODES 2 OU 8 : (ALLER À 137F a-) ↙
137F	a) Cette moustiquaire a-t-elle été lavée depuis que vous l'avez acquise? b) Cette moustiquaire a-t-elle été lavée depuis qu'elle a été trempée la dernière fois?	OUI 1 NON 2 (ALLER À 137H) ← PAS SÛR/NSP 8	OUI 1 NON 2 (ALLER À 137H) ← PAS SÛR/NSP 8	OUI 1 NON 2 (ALLER À 137H) ← PAS SÛR/NSP 8
137G	Combien de fois cette moustiquaire a-t-elle été lavée au cours des 12 derniers mois ?	N. LAVAGES .. [][] NSP/PAS SÛR 98	N. LAVAGES .. [][] NSP/PAS SÛR 98	N. LAVAGES .. [][] NSP/PAS SÛR 98
137H	Avez-vous jamais utilisé cette moustiquaire à d'autres fins que l'utiliser pour dormir?	OUI 1 NON 2 (ALLER À 137J) ← PAS SÛR/NSP 8	OUI 1 NON 2 (ALLER À 137J) ← PAS SÛR/NSP 8	OUI 1 NON 2 (ALLER À 137J) ← PAS SÛR/NSP 8
137I	Quelles sont ces autres fins ?	POUR PROTÉGER LA RÉCOLTE/PLANTES .. A POUR LA PÊCHE B SUR LE MATELAS POUR SE PROTÉGER CONTRE LES PUNAISES DE LIT .. C HABILLEMENT D AUTRE X (PRÉCISER)	POUR PROTÉGER LA RÉCOLTE/PLANTES .. A POUR LA PÊCHE B SUR LE MATELAS POUR SE PROTÉGER CONTRE LES PUNAISES DE LIT .. C HABILLEMENT D AUTRE X (PRÉCISER)	POUR PROTÉGER LA RÉCOLTE/PLANTES A POUR LA PÊCHE B SUR LE MATELAS POUR SE PROTÉGER CONTRE LES PUNAISES DE LIT .. C HABILLEMENT D AUTRE X (PRÉCISER)
137J	Avez-vous jamais essayé de réparer un trou dans cette moustiquaire ?	OUI 1 NON 2 NSP/PAS SÛR 8	OUI 1 NON 2 NSP/PAS SÛR 8	OUI 1 NON 2 NSP/PAS SÛR 8
138		RETOURNEZ À 129 POUR LA MOUSTIQUAIRE SUIVANTE; S'IL N'Y A PLUS DE MOUSTIQUAIRE, ALLEZ À Q.138A.	RETOURNEZ À 129 POUR LA MOUSTIQUAIRE SUIVANTE; S'IL N'Y A PLUS DE MOUSTIQUAIRE, ALLEZ À Q.138A.	ALLEZ À 129, PREMIÈRE COL. D'UN NOUVEAU QUESTIONNAIRE; SI PLUS DE MOUSTIQUAIRE, ALLEZ À Q.138A.

MOUSTIQUAIRES

		MOUSTIQUAIRE #1	MOUSTIQUAIRE #2	MOUSTIQUAIRE #3
No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES		ALLEZ À
138A	Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'il y avait des moustiquaires dans le ménage et qui n'y sont plus maintenant?	OUI	1	
		NON	2	
		(ALLER À 139*)	1	
		PAS SÛR/NSP	8	
138B	Combien ?	NOMBRE	<input type="text"/>	

AUTRES CARACTÉRISTIQUES DU LOGEMENT

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
139	Nous voudrions connaître l'endroit utilisé par les membres du ménage pour se laver les mains. Pouvez-vous me montrer, s'il vous plait, où les membres du ménage se lavent les mains ?	OBSERVÉ, ENDROIT FIXE 1 OBSERVÉ, NON FIXE 2 NON OBSERVÉ, PAS DANS LOGEMENT /COUR/PARCELLE .. 3 NON OBSERVÉ, PERMISSION DE VOIR NON OBTENUE 4 NON OBSERVÉ, AUTRE RAISON 5	} 142
139A	A quel moment les membres du ménage se lavent, le plus souvent, les mains ?	A LA SORTIE DES TOILET A AVANT DE MANGER B AVANT DE PREPARER LES REPAS C AVANT DE S'OCCUPER DES ENFANTS D APRES AVOIR NETTOYÉ LES ENFANTS E	
140	OBSERVEZ LA PRÉSENCE D'EAU À L'ENDROIT UTILISÉ POUR SE LAVER LES MAINS. NOTEZ L'OBSERVATION.	EAU DISPONIBLE 1 EAU NON DISPONIBLE 2	
141	OBSERVEZ LA PRÉSENCE DE SAVON, DE DÉTERGENT OU D'AUTRES PRODUITS NETTOYANTS À L'ENDROIT UTILISÉ POUR SE LAVER LES MAINS NOTEZ L'OBSERVATION.	SAVON OU DÉTERGENT (EN MORCEAU, LIQUIDE, POUDRE, PÂTE) A CENDRE, BOUE, SABLE B AUCUN Y	
142	OBSERVEZ LE MATÉRIAU PRINCIPAL DU SOL DU LOGEMENT. NOTEZ L'OBSERVATION	MATÉRIAU NATUREL TERRE/SABLE 11 BOUSE 12 MATÉRIAU RUDIMENTAIRE PLANCHES EN BOIS 21 PALMES/BAMBOU 22 MATÉRIAU ÉLABORÉ PARQUET OU BOIS CIRÉ 31 BANDES DE VINYLE/ASPHALTE 32 CARRELAGE 33 CIMENT 34 MOQUETTE 35 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
143	OBSERVEZ LE MATÉRIAU PRINCIPAL DU TOIT DU LOGEMENT. NOTEZ L'OBSERVATION.	MATÉRIAU NATUREL PAS DE TOIT 11 CHAUME/PALMES/FEUILLES 12 MOTTES DE TERRE 13 MATÉRIAU RUDIMENTAIRE NATTE 21 PALMES/BAMBOU 22 PLANCHES EN BOIS 23 CARTON 24 MATÉRIAU ÉLABORÉ TÔLE 31 BOIS 32 ZINC/FIBRE DE CIMENT 33 TUILES 34 CIMENT 35 SHINGLES 36 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	

AUTRES CARACTÉRISTIQUES DU LOGEMENT

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
144	OBSERVEZ LE MATÉRIAU PRINCIPAL DES MURS EXTÉRIEURS DU LOGEMENT. NOTEZ L'OBSERVATION.	MATÉRIAU NATUREL PAS DE MUR 11 BAMBOU/CANE/PALME/TRONC 12 TERRE 13 MATÉRIAU RUDIMENTAIRE BAMBOU AVEC BOUE 21 PIERRES AVEC BOUE 22 ADOBE NON RECOUVERT 23 CONTRE-PLAQUÉ 24 CARTON 25 BOIS DE RÉCUPÉRATION 26 MATÉRIAU ÉLABORÉ CIMENT 31 PIERRES AVEC CHAUX/CIMENT 32 BRIQUES 33 BLOCS DE CIMENT 34 ADOBE RECOUVERT 35 PLANCHE EN BOIS/SHINGLES 36 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
145	Je voudrais vérifier si le sel utilisé dans votre ménage est iodé. Puis-je avoir un peu de sel qui est utilisé pour cuisiner dans votre ménage ? TEST DU SEL POUR L'IODE	PRÉSENCE D'IODE 1 PAS D'IODE 2 PAS DE SEL DANS LE MÉNAGE 3 SEL NON TESTÉ _____ 6 (PRÉCISEZ LA RAISON)	
145A	Au cours des trois dernières années, est-il survenu dans votre ménage un quelconque choc?	OUI 1 NON 2	→ 150
145B	Quel a été le principal choc subi par votre ménage ?	MALADIE 01 DÉCÈS 02 PERTE D'EMPLOI/CHÔMAGE 03 BAISSÉ DE REVENU/TRANSFERTS REÇUS 04 INONDATIONS/SÉCHERESSE/PORTE DE RÉCOLT 05 CONFLIT/INSÉCURITÉ/VOL OU PERTE DE BÉTAIL 06 INCENDIE 07 PERTE D'ARGENT 08 AUTRE _____ 96 (PRÉCISER)	

TRANSFERTS SOCIAUX

	TYPE DE SUPPORT	BOURSE DE SÉCURITÉ FAMILIALE [A]	BOURSE D'ÉTUDE [B]	AUTRE TRANSFERT DE L'ÉTAT [C]	PROGRAMME DE STRUCTURE PRIVÉE/ONG [D]	TOUT AUTRE PROGRAMME DE SUPPORT EXTERIEUR [E] (À PRÉCISER)
150	Je voudrais vous poser des questions sur divers programmes d'aide économique extérieure fournie aux ménages. Par aide extérieure, je veux dire un soutien qui vient du gouvernement ou d'organisations non gouvernementales telles que les organisations religieuses, caritatives ou communautaires. Cela exclut le soutien de la famille, d'autres parents d'amis ou de voisins.					
151	Connaissez-vous (NOM DU PROGRAMME)?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 151 À LA COLONNE SUIVANTE)	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 151 À LA COLONNE SUIVANTE)	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 151 À LA COLONNE SUIVANTE)	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 151 À LA COLONNE SUIVANTE)	OUI 1 NON 2 ALLER À 155 ←
152	Est-ce votre ménage ou n'importe quel membre de votre ménage a reçu un support à travers (NOM DU PROGRAMME)?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 151 À LA COLONNE SUIVANTE)	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 151 À LA COLONNE SUIVANTE)	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 151 À LA COLONNE SUIVANTE)	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 151 À LA COLONNE SUIVANTE)	OUI 1 NON 2 ALLER À 155 ←
153	Il y a combien de temps que vous ou quelqu'un de votre ménage avez/à reçu le support de (NOM DU PROGRAMME)? Si moins d'1 mois, entourer '1' et enregistrer '00' dans mois. Si moins de 12 mois, entourer '1' et enregistrer en mois Si 1 an/12 mois ou plus, entourer '2' et enregistrer en années.	MOIS 1 [] ANNÉES 2 [] NSP 998	MOIS 1 [] ANNÉES 2 [] NSP 998	MOIS 1 [] ANNÉES 2 [] NSP 998	MOIS 1 [] ANNÉES 2 [] NSP 998	MOIS 1 [] ANNÉES 2 [] NSP 998
154		RETOURNEZ À 151 À LA COLONNE SUIVANTE.	ALLEZ À 155			
155	NOTEZ L'HEURE	HEURES MINUTES				

Tableau de sélection de la femme pour "violences domestiques"

155A	VÉRIFIEZ LA PAGE DE COUVERTURE DU QUESTIONNAIRE MÉNAGE : MÉNAGE SÉLECTIONNÉ <input type="checkbox"/> MÉNAGE PAS SÉLECTIONNÉ <input type="checkbox"/> POUR VIOLENCE DOMESTIQUE POUR VIOLENCE DOMESTIQUE
------	---

156	VÉRIFIER COLONNE (9) DU TABLEAU DE MÉNAGE : NOMBRE DE FEMMES ÉLIGIBLES 2 FEMMES ÉLIGIBLES OU PLUS <input type="checkbox"/> 1 FEMME ÉLIGIBLE <input type="checkbox"/> → 157A PAS DE FEMME ÉLIGIBLE <input type="checkbox"/> → FIN
-----	--

TABLEAU 1 : FEMMES ÂGÉES DE 15-49 ANS ÉLIGIBLES POUR LES QUESTIONS SUR LES VIOLENCES DOMESTIQUES

ENREGISTRER CHAQUE FEMME ÂGÉE DE 15-49 ANS DU TABLEAU MÉNAGE DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS DANS L'ORDRE SELON SON NUMÉRO DE LIGNE (Q.1) DU TABLEAU MÉNAGE. NE PAS INCLURE LES AUTRES MEMBRES DU MÉNAGE QUI NE SONT PAS DES FEMMES ÂGÉES DE 15-49 ANS. ENREGISTRER LE NOM, L'ÂGE ET LE NUMÉRO DE LIGNE DE CHAQUE FEMME. PUIS ENREGISTRER LE NOMBRE TOTAL DES FEMMES ÂGÉES DE 15-49 ANS À LA CASE RÉSERVÉE (Q.157)

N° DE RANG	NOM DE LA FEMME DE Q.2	ÂGE DE Q.7	N° LIGNE
1 ^{ÈRE}	_____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2 ^{ÈME}	_____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3 ^{ÈME}	_____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4 ^{ÈME}	_____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5 ^{ÈME}	_____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6 ^{ÈME}	_____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7 ^{ÈME}	_____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8 ^{ÈME}	_____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9 ^{ÈME}	_____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10 ^{ÈME}	_____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
157	TOTAL FEMMES ÂGÉES DE 15-49 ANS DANS LE MÉNAGE	<input type="text"/>	<input type="text"/>

TABLEAU 2 : SÉLECTION ALÉATOIRE POUR LES QUESTIONS SUR LES VIOLENCES DOMESTIQUES

UTILISER CE TABLEAU POUR SÉLECTIONNER UNE DES FEMMES ÂGÉES DE 15-49 ANS, S'IL Y EN A PLUSIEURS DANS LE MÉNAGE

- a) PRENEZ LE DERNIER CHIFFRE DU NUMÉRO DE MÉNAGE INSCRIT SUR LA PAGE DE COUVERTURE DU QUESTIONNAIRE.
- b) CE CHIFFRE EST CELUI DE LA LIGNE À SÉLECTIONNER.
- c) VÉRIFIER LE NOMBRE TOTAL DE FEMMES ÉLIGIBLES À Q.157
- d) CE NOMBRE EST CELUI DE LA COLONNE À SÉLECTIONNER.
- e) TROUVER LA CASE QUI CORRESPOND À L'INTERSECTION DE LA LIGNE ET DE LA COLONNE IDENTIFIÉES ET ENCERCLER LE CHIFFRE QUI Y FIGURE.
- f) CE CHIFFRE CORRESPOND AU RANG QU'OCCUPE LA FEMME QUI SERA SÉLECTIONNÉE POUR LES "VIOLENCES DOMESTIQUES" (LA 1^{ÈRE}, 2^{ÈME}, 3^{ÈME}, ETC.)

EXEMPLE:

LE NUMÉRO DE MÉNAGE EST 36 : SÉLECTIONNER LA LIGNE 6.

IL Y A 3 FEMMES ÉLIGIBLES DANS CE MÉNAGE, SÉLECTIONNER LA COLONNE 3.

LA CASE À L'INTERSECTION DE LA LIGNE 6 ET DE LA COLONNE 3 CONTIENT LE CHIFFRE 2 : LA 2^{ÈME} FEMME ÉLIGIBLE LISTÉE DANS LE TABLEAU MÉNAGE SERA SÉLECTIONNÉE. SI LE NUMÉRO DE LIGNE DES 3 FEMMES ÉLIGIBLES EST : '03', '06' ET '10', LA FEMME SÉLECTIONNÉE EST LA 2^{ÈME} FEMME LISTÉE, SOIT CELLE DU NUMÉRO DE LIGNE '06'.

DERNIER CHIFFRE DU N° DE MÉNAGE	NOMBRE TOTAL DE FEMMES ÉLIGIBLES DANS LE MÉNAGE							
	1	2	3	4	5	6	7	8+
0	1	2	3	4	3	6	5	4
1	1	1	3	1	4	1	6	5
2	1	2	1	2	5	2	7	6
3	1	1	2	3	1	3	1	7
4	1	2	3	4	2	4	2	8
5	1	1	1	1	3	5	3	1
6	1	2	2	2	4	6	4	2
7	1	1	3	3	5	1	5	3
8	1	2	1	4	1	2	6	4
9	1	1	2	1	2	3	7	5

157A	NOM DE LA FEMME SÉLECTIONNÉE _____ NUMÉRO DE LIGNE DE LA FEMME SÉLECTIONNÉE DANS LE TABLEAU MÉNAGE <input type="text"/>
------	--

OBSERVATIONS DE L'ENQUÊTEUR/ENQUÊTRICE

À REMPLIR, UNE FOIS L'INTERVIEW TERMINÉE

COMMENTAIRES CONCERNANT L'INTERVIEW :

COMMENTAIRES SUR DES QUESTIONS PARTICULIÈRES :

AUTRES COMMENTAIRES :

OBSERVATIONS DU CHEF D'ÉQUIPE

OBSERVATIONS DE LA CONTRÔLEUSE

MÉNAGE: NOTES

- (1) Cette section doit être adaptée selon le plan de l'enquête spécifique au pays.
- (2) Augmenter la durée de l'interview déclarée aux enquêtés si des modules sont ajoutés au questionnaire.
- (3) À Q.18, il s'agit de l'année scolaire en cours au moment où l'enquête commence. Si l'enquête commence entre deux années scolaires, c'est l'année scolaire qui vient juste de se finir qui doit être prise en compte.
- (4) Les pays qui utilisent des sachets d'eau (petit sac en plastique rempli d'eau) comme source d'approvisionnement de l'eau de boisson doivent ajouter la catégorie séparée SACHET D'EAU après EAU EN BOUTEILLE et suivre la même instruction de passage que pour les ménages qui utilisent L'EAU EN BOUTEILLE (posez Q. 102, provenance de l'eau à d'autres fins). De même, les pays qui ont des kiosques à eau doivent ajouter une catégorie séparée KIOSQUE À EAU et suivre la même instruction de passage que pour les ménages qui utilisent de L'EAU EN BOUTEILLE.
- (5) Les codes doivent être développés localement; Cependant, les grandes catégories doivent être maintenues.
- (6) Ajouter tout autre animal spécifique au pays comme les zébus, buffles, chameaux, lamas, alpagas, porcs, canards, oies ou éléphants.
- (7) Chaque pays doit ajouter au moins 5 types de meubles à la liste (comme une table, une chaise, un canapé, un lit, une armoire ou un placard). De plus, chaque pays doit ajouter, au moins, 4 appareils électro-ménagers de telle sorte que la liste comprenne, au moins 3 équipements que même un ménage pauvre peut posséder, 3 équipements qu'un ménage à revenu moyen peut posséder et, au moins, 3 équipements qu'un ménage à revenu élevé peut posséder. À titre indicatif, on peut ajouter les équipements suivants : un réveil/pendule, une pompe à eau, un moulin à grain, un ventilateur, un mixeur, un chauffe-eau, un générateur, une machine à laver le linge, un four micro-onde, un appareil DVD, un appareil à cassettes ou CD, une caméra, l'air conditionné ou un climatiseur, ou une machine à coudre.
- (8) La question doit être supprimée dans les pays où il n'y a pas de programme organisé de pulvérisation d'insecticide pour prévenir la transmission du paludisme.
- (9) La question doit être supprimée dans les pays qui ne sont pas affectés par le paludisme.
- (10) La question doit être adaptée localement en utilisant le nom de la campagne de distribution de masse.
- (11) Différents kits de test pour l'iode sont disponibles. Le kit de test approprié doit être choisi dans chaque pays en fonction du type d'iode fortifiant utilisé dans le pays (iodate de potassium iodate ou iodure de potassium). Si les deux types de fortifiants sont utilisés, alors les deux kits de test peuvent être utilisés.

**ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ CONTINUE (EDS 2018)
QUESTIONNAIRE FEMME**

République du Sénégal
Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan
Ministère de la Santé et de l'Action Sociale

IDENTIFICATION				
NOM DE LA LOCALITÉ _____				
NOM ET NUMÉRO DU CHEF DE MÉNAGE _____				
NUMÉRO DE CONCESSION				
NUMÉRO DE GRAPPE				
RÉGION				
DEPARTEMENT				
DISTRICT SANITAIRE				
URBAIN/RURAL (URBAIN=1, RURAL=2)				
DAKAR/CAPITALE RÉGIONALE/AUTRE VILLE/RURAL (DAKAR=1, CAPITALE RÉGIONALE=2, AUTRE VILLE=3, RURAL=4)				
NOM ET NUMÉRO DE LIGNE DE LA FEMME _____				
VÉRIFIEZ LA PAGE DE COUVERTURE DU QUESTIONNAIRE MÉNAGE : MÉNAGE SÉLECTIONNÉ POUR LE MODULE VIOLENCE DOMESTIQUE (VD)? (1=OUI, 2=NON)				
VISITES D'ENQUÊTRICES				
	1	2	3	VISITE FINALE
DATE	_____	_____	_____	JOUR _____ MOIS _____ ANNÉE No ENQUÊT 2 0 1 _____ RÉSULTAT* _____
NOM DE L'ENQUÊTRICE	_____	_____	_____	
PROCHAINE DATE VISITE	_____	_____		NOMBRE TOTAL DE VISITES _____
HEURE	_____	_____		
*CODES RÉSULTAT : 1 COMPLÉTÉ 4 REFUSÉ 5 PARTIELLEMENT COMPLÉTÉ 7 AUTRE _____ (PRÉCISEZ) 2 PAS À LA MAISON 3 DIFFÉRÉ 6 INCAPACITÉ				
LANGUE DU QUESTIONNAIRE**	0 1	LANGUE DE L'INTERVIEW**	_____	LANGUE MATERNELLE DE L'ENQUÊTÉE**
				TRADUCTEUR (OUI = 1, NON = 2) _____
LANGUE DU QUESTIONNAIRE**	FRANÇAIS		**CODES LANGUES : 01 FRANÇAIS 03 POULAR 05 MANDINGUE 07 AUTRES 02 WOLOF 04 SERER 06 DIOLA	
CHEF D'ÉQUIPE				
_____		_____	_____	_____
NOM		NUMÉRO		DATE

PRÉSENTATION ET DEMANDE DE CONSENTEMENT

Bonjour. Je m'appelle _____ . Je travaille pour l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie en collaboration avec le Ministère de la Santé et l'Action Sociale. Nous effectuons une enquête nationale sur la santé au SENEGAL. Les informations que nous collectons aideront votre gouvernement à améliorer les services de santé. Votre ménage a été sélectionné pour cette enquête. Les questions prennent habituellement entre 30 et 60 minutes. Toutes les informations que vous nous donnez sont strictement confidentielles et elles ne seront transmises à personne d'autre que les membres de l'équipe d'enquête. Vous n'êtes pas obligée de participer à cette enquête mais nous espérons que vous accepterez d'y participer car votre opinion est très importante. S'il arrivait que je pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, dites-le moi et je passerai à la question suivante ; vous pouvez également interrompre l'interview à n'importe quel moment. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'enquête, vous pouvez contacter la personne dont le nom figure sur la carte qui a déjà été donnée à votre ménage.

Avez-vous des questions à me poser ?
 Puis-je commencer l'interview maintenant ?

SIGNATURE DE L'ENQUÊTRICE : _____ DATE _____

L'ENQUÊTÉE ACCEPTE
 D'ÊTRE INTERVIEWÉE .. 1

L'ENQUÊTÉE REFUSE D'ÊTRE
 INTERVIEWÉE .. 2 → FIN

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTÉE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
101	INSCRIVEZ L'HEURE.	HEURES <input type="text"/> <input type="text"/> MINUTES <input type="text"/> <input type="text"/>	
105	En quel mois et en quelle année êtes-vous née ?	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> NE CONNAIT PAS LE MOIS 98 ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NE CONNAIT PAS L'ANNÉE9998	
106	Quel âge aviez-vous à votre dernier anniversaire ? COMPAREZ ET CORRIGEZ 105 ET/OU106 SI INCOHÉRENT.	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES <input type="text"/> <input type="text"/>	
107	Êtes-vous allée à l'école ?	OUI 1 NON 2	→ 111
108	Quel est le plus haut niveau d'études que vous avez atteint : primaire, secondaire ou supérieur ?	ELEMENTAIRE 1 MOYEN 2 SECONDAIRE 3 SUPÉRIEUR 4 AUTRE 6 (PRÉCISER)	

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTÉE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
109	Quelle est [L'ANNÉE/CLASSE] la plus élevée que vous avez achevée à ce niveau ? SI MOINS D'UNE ANNÉE A ÉTÉ ACHEVÉE À CE NIVEAU, INSCRIVEZ '00'.	[ANNÉE/CLASSE] <input type="text"/> <input type="text"/>	
110	VÉRIFIEZ 108: PRIMAIRE OU <input type="checkbox"/> SECONDAIRE ↓	SUPÉRIEUR <input type="checkbox"/> →	113
111	Je voudrais maintenant que vous me lisiez cette phrase. MONTREZ LA CARTE À L'ENQUÊTÉE. SI L'ENQUÊTÉE NE PEUT LIRE TOUTE LA PHRASE, INSISTEZ : Pouvez-vous lire une partie de la phrase ?	NE PEUT PAS LIRE DU TOUT 1 PEUT SEULEMENT LIRE UNE PARTIE DE LA PHRASE 2 PEUT LIRE TOUTE LA PHRASE 3 PAS DE CARTE DANS LA LANGUE DEMANDÉE 4 (PRÉCISEZ LA LANGUE) AVEUGLE/PROBLÈMES DE VUE 5	
111A	Avez-vous déjà participé à un programme d'alphabétisation ou à un autre programme qui comprenait l'apprentissage de la lecture et de l'écriture (non compris l'école primaire)	OUI 1 NON 2	→ 112
111B	Dans quelles langues étaient donnés les programmes d'alphabétisation auxquels vous avez participé ? INSISTER : Aucun autre ? ENREGISTRER TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	ARABE A WOLOF B POULAR C SERER D DIOLA E MANDINGUE F SONINKE G AUTRE X (PRÉCISEZ LANGUE)	
112	VÉRIFIEZ 111: CODE '2', '3' OU '4' <input type="checkbox"/> ENCERCLÉ ↓	CODE '1' OU '5' <input type="checkbox"/> ENCERCLÉ	→ 114
113	Lisez-vous un journal ou un magazine au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?	AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE 1 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE 2 PAS DU TOUT 3	
114	Écoutez-vous la radio au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?	AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE 1 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE 2 PAS DU TOUT 3	
115	Regardez-vous la télévision au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?	AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE 1 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE 2 PAS DU TOUT 3	
116	Est-ce que vous possédez un téléphone portable ?	OUI 1 NON 2	→ 118
117	Est-ce que vous utilisez votre téléphone portable pour faire des opérations financières ?	OUI 1 NON 2	
118	Avez-vous un compte dans une banque ou dans une autre institution financière que vous pouvez utiliser vous-	OUI 1 NON 2	
119	Avez-vous déjà utilisé internet ?	OUI 1 NON 2	→ 122
120	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé internet ? SI NÉCESSAIRE, INSISTEZ POUR L'UTILISATION À PARTIR DE N'IMPORTE QUEL ENDROIT AVEC N'IMPORTE QUEL APPAREIL.	OUI 1 NON 2	→ 122

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTÉE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
121	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous utilisé internet: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?	PRESQUE CHAQUE JOUR 1 AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE 2 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE 3 PAS DU TOUT 4	
122	Quelle est votre religion?	MUSULMANE 1 CHRÉTIENNE 2 ANIMISTE 3 SANS RÉLIGION 4 AUTRE 6 (PRÉCISEZ)	
122A	Etes-vous Sénégalaise ?	OUI 1 NON 2	→ 201
123	Quelle est votre ethnie?	WOLOF 01 POULAR 02 SERER 03 MANDINGUE 04 DIOLA 05 SONINKÉ 06 AUTRE 96 (PRÉCISEZ)	

SECTION 2. REPRODUCTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À								
201	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur toutes les naissances que vous avez eues durant votre vie. Avez-vous déjà donné naissance à des enfants ?	OUI 1 NON 2	→ 206								
202	Avez-vous des fils ou des filles à qui vous avez donné naissance et qui vivent actuellement avec vous ?	OUI 1 NON 2	→ 204								
203	a) Combien de fils vivent avec vous ? b) Et combien de filles vivent avec vous ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'.	a) FILS À LA MAISON <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> b) FILLES À LA MAISON <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>									
204	Avez-vous des fils ou filles à qui vous avez donné naissance qui sont toujours en vie mais qui ne vivent pas avec vous ?	OUI 1 NON 2	→ 206								
205	a) Combien de fils sont vivants mais qui ne vivent pas avec vous ? b) Et combien de filles sont vivantes mais qui ne vivent pas avec vous ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'.	a) FILS AILLEURS <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> b) FILLES AILLEURS <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>									
206	Avez-vous déjà donné naissance à un garçon ou à une fille qui est né vivant mais qui est décédé par la suite ? SI NON, INSISTEZ : Aucun bébé qui a crié ou fait un mouvement, qui a émis un son ou essayé de respirer ou qui a montré d'autres signes de vie pendant un très court moment ?	OUI 1 NON 2	→ 208								
207	a) Combien de garçons sont décédés ? b) Et combien de filles sont décédés ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'.	a) GARÇONS DÉCÉDÉS <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> b) FILLES DÉCÉDÉES <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>									
208	FAITES LA SOMME DES RÉPONSES À 203, 205, ET 207, ET INSCRIVEZ LE TOTAL. SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'.	TOTAL NAISSANCES <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>									
209	VÉRIFIEZ 208: Je voudrais être sûre d'avoir bien compris: vous avez eu au TOTAL ____ naissances durant votre vie. Est-ce bien exact ? OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> INSISTEZ ET CORRIGEZ 201-208 COMME IL SE DOIT.										
210	VÉRIFIEZ 208: UNE NAISSANCE <input type="checkbox"/> OU PLUS ↓ AUCUNE <input type="checkbox"/>		→ 226								

SECTION 2. REPRODUCTION

211 Je voudrais maintenant faire la liste de toutes vos naissances, qu'elles soient encore en vie ou non, en commençant par la première. INSCRIVEZ LE NOM DE TOUTES LES NAISSANCES À 212. INSCRIVEZ LES JUMEAUX/TRIPLÉS SUR DES LIGNES SÉPARÉES. S'IL Y A PLUS DE 10 NAISSANCES, UTILISEZ UN QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE, EN COMMENÇANT À LA SECONDE LIGNE .									
212	213	214	215	216	217	218	219	220	221
Quel nom a été donné à votre (premier enfant/ enfant suivant) ? INSCRIVEZ LE NOM. NO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES.	(NOM) est-il un garçon ou une fille ?	Parmi ces naissances, y avait-il des jumeaux ?	Quel jour, quel mois et quelle année (NOM) est-il/elle né(e) ?	(NOM) est-il/elle encore en vie ?	Quel âge avait (NOM) à son dernier anniversaire ? INSCRIVEZ L'ÂGE EN ANNÉE RÉVOLUTIONNAIRE.	SI EN VIE: (NOM) vit-il/elle avec vous ?	SI EN VIE: INSCRIVEZ LE NO DE LIGNE DE L'ENFANT DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ '00' SI L'ENFANT N'EST PAS LISTÉ DANS LE MÉNAGE.	SI DÉCÉDÉ: Quel âge avait (NOM) quand (il/elle) est décédé ? SI '12 MOIS' OU '1 AN', DEMANDEZ: Est-ce que (NOM) avait eu son premier anniversaire ? PUIS DEMANDEZ: Exactement combien de mois avait (NOM) quand (il/elle) est décédé ? INSCRIVEZ EN JOURS SI L'ENFANT A MOINS D'1 MOIS; EN MOIS, SI L'ENFANT A MOINS DE 2 ANS; OU EN ANNÉES.	Y a-t-il eu d'autres naissances vivantes entre (NOM DE LA NAISSANCE PRÉCÉDENTE) et (NOM), y compris des enfants qui sont décédés après la naissance ?
01	GAR. 1 FILLE 2	SIMP. 1 MULT 2	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 220)	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2	NO LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> (NAISSANCE SUIVANTE)	JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/>	
02	GAR. 1 FILLE 2	SIMP. 1 MULT 2	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 220)	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2	NO LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 221)	JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 (AJOUT . NAIS.) NON 2 (NAIS SUIV.)
03	GAR. 1 FILLE 2	SIMP. 1 MULT 2	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 220)	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2	NO LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 221)	JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 (AJOUT . NAIS.) NON 2 (NAIS SUIV.)
04	GAR. 1 FILLE 2	SIMP. 1 MULT 2	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	YES 1 NON 2 (ALLEZ À 220)	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2	NO LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 221)	JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 (AJOUT . NAIS.) NON 2 (NAIS SUIV.)
05	GAR. 1 FILLE 2	SIMP. 1 MULT 2	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 220)	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2	NO LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 221)	JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 (AJOUT . NAIS.) NON 2 (NAIS SUIV.)

212	213	214	215	216	217	218	219	220	221
Quel nom a été donné à votre (premier enfant/ enfant suivant) ?	(NOM) est-il un garçon ou une fille ?	Parmi ces naissances, y avait-il des jumeaux ?	Quel jour, quel mois et quelle année (NOM) est-il/elle né(e) ?	(NOM) est-il/elle encore en vie ?	Quel âge avait (NOM) à son dernier anniversaire ?	(NOM) vit-il/elle avec vous ?	INSCRIVEZ LE No DE LIGNE DE L'ENFANT DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ '00' SI L'ENFANT N'EST PAS LISTÉ DANS LE MÉNAGE.	Quel âge avait (NOM) quand (il/elle) est décédé ? SI '12 MOIS' OU '1 AN', DEMANDEZ: Est-ce que (NOM) avait eu son premier anniversaire ? PUIS DEMANDEZ: Exactement combien de mois avait (NOM) quand (il/elle) est décédé ? INSCRIVEZ EN JOURS SI L'ENFANT A MOINS D'1 MOIS; EN MOIS, SI L'ENFANT A MOINS DE 2 ANS; OU EN ANNÉES.	Y a-t-il eu d'autres naissances vivantes entre (NOM DE LA NAISSANCE PRÉCÉDENTE) et (NOM), y compris des enfants qui sont décédés après la naissance ?
INSCRIVEZ LE NOM. NO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES.					INSCRIVEZ L'ÂGE EN ANNÉE RÉVOLUTIONNAIRE.				

06	GAR. 1 FILLE 2	SIMP. 1 MULT. 2	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2 ↓ (ALLEZ À 220)	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2	NO LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> ↓ (ALLEZ À 221)	JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 (AJOUTÉ . NAIS.) NON 2 (NAIS SUIV.)
07	GAR. 1 FILLE 2	SIMP. 1 MULT. 2	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2 ↓ (ALLEZ À 220)	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2	NO LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> ↓ (ALLEZ À 221)	JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 (AJOUTÉ . NAIS.) NON 2 (NAIS SUIV.)
08	GAR. 1 FILLE 2	SIMP. 1 MULT. 2	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2 ↓ (ALLEZ À 220)	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2	NO LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> ↓ (ALLEZ À 221)	JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 (AJOUTÉ . NAIS.) NON 2 (NAIS SUIV.)
09	GAR. 1 FILLE 2	SIMP. 1 MULT. 2	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2 ↓ (ALLEZ À 220)	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2	NO LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> ↓ (ALLEZ À 221)	JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 (AJOUTÉ . NAIS.) NON 2 (NAIS SUIV.)
10	GAR. 1 FILLE 2	SIMP. 1 MULT. 2	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2 ↓ (ALLEZ À 220)	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2	NO LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> ↓ (ALLEZ À 221)	JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 (AJOUTÉ . NAIS.) NON 2 (NAIS SUIV.)

SECTION 2. REPRODUCTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
222	Avez-vous eu d'autres naissances vivantes depuis la naissance de (NOM DE LA DERNIÈRE NAISSANCE) ?	OUI 1 (INSCRIVEZ LA/LES NAISS. DANS LE TABLEAU) NON 2	
223	COMPAREZ 208 AVEC LE NOMBRE DE NAISSANCES DANS LE TABLEAU DES NAISSANCES NOMBRES SONT ÉGAUX <input type="checkbox"/> NOMBRES SONT DIFFÉRENTS <input type="checkbox"/> (INSISTEZ ET CORRIGEZ)		
224	VÉRIFIEZ 215: INSCRIVEZ LE NOMBRE DE NAISSANCES DANS 2013-2018	NOMBRE DE NAISSANCES <input type="text"/> AUCUNE 0	→ 226
225	C POUR CHAQUE NAISSANCE DANS 2013-2018, INSCRIVEZ 'N' AU MOIS DE NAISSANCE DANS LE CALENDRIER. INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENFANT À GAUCHE DU CODE 'N'. POUR CHAQUE NAISSANCE, DEMANDEZ LE NOMBRE DE MOIS RÉVOLUS QUE LA GROSSESSE A DURÉ ET INSCRIVEZ 'G' À CHACUN DES MOIS PRÉCÉDENTS SELON LA DURÉE DE LA GROSSESSE. (NOTE: LE NOMBRE DE 'G' DOIT ÊTRE INFÉRIEUR DE 1 AU NOMBRE DE MOIS QUE LA GROSSESSE A DURÉ.)		
226	Êtes-vous actuellement enceinte ?	OUI 1 NON 2 PAS SÛRE 8	→ 230
227	Depuis combien de mois êtes-vous enceinte ? ENREGISTREZ LE NOMBRE DE MOIS RÉVOLUS. C INSCRIVEZ 'G' DANS LE CALENDRIER, EN COMMENÇANT PAR LE MOIS DE L'ENQUÊTE ET POUR LE NOMBRE TOTAL DE MOIS RÉVOLUS.	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/>	
228	Quand vous êtes tombée enceinte, vouliez-vous être enceinte à ce moment-là ?	OUI 1 NON 2	→ 230
229	VÉRIFIEZ 208: NOMBRE TOTAL DE NAISSANCES UNE OU PLUS <input type="checkbox"/> AUCUNE <input type="checkbox"/> a) Est-ce que vous vouliez avoir un enfant plus tard ou est-ce que vous ne vouliez plus d'enfant ? b) Est-ce que vous vouliez avoir un enfant plus tard ou est-ce que vous ne vouliez pas avoir d'enfant ?	PLUS TARD 1 PLUS/AUCUN 2	
230	Avez-vous déjà eu une grossesse qui s'est terminée par une fausse-couche, un avortement ou un mort-né ?	OUI 1 NON 2	→ 239
231	Quand la dernière grossesse de ce genre s'est-elle terminée ?	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

SECTION 2. REPRODUCTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
232	VÉRIFIEZ 231: DERNIÈRE GROSSESSE TERMINÉE EN 2013-2018 <input type="checkbox"/>		→ 234
		DERNIÈRE GROSSESSE TERMINÉE EN 2012 OU PLUS TÔT <input type="checkbox"/>	→ 239
LINE NO.	233 En quel mois et en quelle année la dernière grossesse de ce genre s'est-elle terminée ?	234 De combien de mois étiez-vous enceinte quand la dernière grossesse de ce genre s'est terminée ?	235 Depuis janvier 2013, avez-vous eu d'autres grossesses qui n'ont pas abouti à une naissance vivante ?
01		<input type="text"/> <input type="text"/> NOMBRE DE MOIS	OUI 1 → LIG SUIV. NON 2 → 236
02	<input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE	<input type="text"/> <input type="text"/> NOMBRE DE MOIS	OUI 1 → LIG SUIV. NON 2 → 236
03	<input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE	<input type="text"/> <input type="text"/> NOMBRE DE MOIS	OUI 1 → LIG SUIV. NON 2 → 236
04	<input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE	<input type="text"/> <input type="text"/> NOMBRE DE MOIS	OUI 1 } → 236 NON 2 }
236	<p>C POUR CHAQUE GROSSESSE QUI NE S'EST PAS TERMINÉE PAR UNE NAISSANCE VIVANTE EN 2013-2018 OU PLUS TARD, INSCRIVEZ 'F' DANS LE CALENDRIER AU MOIS OÙ LA GROSSESSE S'EST TERMINÉE ET 'G' POUR LE NOMBRE RESTANT DE MOIS RÉVOLUS.</p> <p>S'IL Y A PLUS DE QUATRE GROSSESSES QUI NE SE SONT PAS TERMINÉES PAR UNE NAISSANCE VIVANTE, UTILISEZ DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES EN COMMENÇANT À LA SECONDE LIGNE.</p>		
237	Avez-vous eu une grossesse qui a pris fin avant 2013 et qui s'est terminée par une fausse-couche, un avortement ou un mort-né ?	OUI 1 NON 2	→ 239
238	Quand la dernière grossesse de ce genre s'est-elle terminée avant 2013 ?	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

SECTION 2. REPRODUCTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À								
239	Quand vos dernières règles ont-elles commencé ? _____ (DATE, SI DONNÉE)	IL Y A JOURS 1 IL Y A SEMAINES 2 IL Y A MOIS 3 IL Y A ANNÉES 4 EN MÉNOPAUSE/ A EU UNE HYSTÉRECTOMIE 994 AVANT LA DERNIÈRE NAISSANCE 995 JAMAIS EU DE RÉGLES 996	<table border="1" style="width: 40px; height: 40px; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>								
239A	VÉRIFIEZ 239: MOINS D'UNE ANNÉES/ MOINS DE <input type="checkbox"/> 12 MOIS UNE ANNÉE/ 12 MOIS OU PLUS <input type="checkbox"/>		→ 239B → 240								
239B	Est-ce qu'il y a eu des activités sociales ou des journées de travail auxquelles vous n'avez pas pu participer à cause de vos dernières règles ?	OUI 1 NON 2 NSP/PAS SURE/ PAS DE TELLE ACTIVITÉS 8									
239C	Durant vos dernières règles, avez-vous pu vous laver et vous changer en privé pendant que vous étiez chez vous ?	OUI 1 NON 2 NSP 8									
239D	Avez-vous utilisé des produits tels que des serviettes hygiéniques, des tampons ou des morceaux de tissus ?	OUI 1 NON 2 NSP 8	→ 240								
239E	Est-ce que les produits étaient réutilisables ?	OUI 1 NON 2 NSP 8									
240	Entre la période des règles et les règles suivantes, est-ce qu'il y a une période où les femmes ont plus de chances de tomber enceintes ?	OUI 1 NON 2 PAS SÛRE 8	→ 242								
241	Est-ce que cette période se situe juste avant que les règles ne commencent, pendant la période des règles, juste après que les règles soient terminées ou bien au milieu de deux périodes de règles ?	JUSTE AVANT QUE LES RÉGLES COMMENCENT 1 PENDANT LES RÉGLES 2 JUSTE APRÈS LA FIN DES RÉGLES 3 AU MILIEU, ENTRE DEUX PÉRIODES DE RÉGLES 4 AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 8									
242	Après la naissance d'un enfant, est-ce qu'une femme peut tomber enceinte avant que ses règles soient revenues ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8									

SECTION 3. CONTRACEPTION

301	Je voudrais maintenant que nous parlions de planification familiale, c'est-à-dire les différents moyens ou méthodes qu'un couple peut utiliser pour retarder ou éviter une grossesse. Avez-vous déjà entendu parler d'une (MÉTHODE) ?		
01	Stérilisation féminine. INSISTEZ : Les femmes peuvent avoir une opération pour ne plus avoir d'enfants.	OUI 1 NON 2	
02	Stérilisation masculine. INSISTEZ : Les hommes peuvent avoir une opération pour ne plus avoir d'enfants.	OUI 1 NON 2	
03	DIU. INSISTEZ : Les femmes peuvent avoir un stérilet qu'un médecin ou une infirmière leur place dans l'utérus pour leur éviter une grossesse pendant un ou plusieurs mois.	OUI 1 NON 2	
04	Injectables. INSISTEZ : Les femmes peuvent avoir une injection faite par du personnel de santé pour leur éviter une grossesse pendant un mois ou plus.	OUI 1 NON 2	
05	Implants. INSISTEZ : Les femmes peuvent se faire insérer par un médecin ou une infirmière un bâtonnet ou plus sous la peau du haut du bras pour leur éviter une grossesse, pendant une année ou plus.	OUI 1 NON 2	
06	Pilule. INSISTEZ : Les femmes peuvent prendre une pilule chaque jour pour éviter une grossesse.	OUI 1 NON 2	
07	Condom. INSISTEZ : Les hommes peuvent mettre une capote en caoutchouc sur leur pénis avant les rapports sexuels.	OUI 1 NON 2	
08	Condom féminin. INSISTEZ : Les femmes peuvent placer un fourreau dans leur vagin avant les rapports sexuels.	OUI 1 NON 2	
09	Pilule du lendemain. INSISTEZ : Les femmes peuvent prendre pendant trois jours après des rapports sexuels non protégés des pilules spéciales qui les empêchent de tomber enceintes.	OUI 1 NON 2	

SECTION 3. CONTRACEPTION

10	Méthode des jours fixes (Méthode du collier). INSISTEZ : Les femmes utilisent un collier de perles de couleur différente pour connaître les jours où elles peuvent tomber enceintes. Durant ces jours où elles peuvent tomber enceintes, elles utilisent un condom ou elles s'abstiennent de rapports sexuels.	OUI 1 NON 2
11	Méthode de l'aménorrhée et de l'allaitement maternel (MAMA). INSISTEZ : Pendant six mois après la naissance d'un enfant, avant que les règles ne soient revenues, les femmes utilisent une méthode qui nécessite d'allaiter fréquemment le jour et la nuit.	OUI 1 NON 2
12	Méthode du rythme (Calendrier/Glaire cervicale/Température). INSISTEZ : Pour éviter une grossesse, les femmes n'ont pas de rapports sexuels les jours où elles pensent qu'elles peuvent tomber enceintes.	OUI 1 NON 2
13	Retrait. INSISTEZ : Les hommes peuvent faire attention et se retirer avant l'éjaculation.	OUI 1 NON 2
14	Avez-vous entendu parler d'autres moyens ou méthodes qu'une femme ou un homme peut utiliser pour éviter une grossesse ?	OUI, MÉTHODE MODERNE _____ A (PRÉCISEZ) OUI, MÉTHODE TRADITIONNELLE _____ B (PRÉCISEZ) NON Y

SECTION 3. CONTRACEPTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
302	VÉRIFIEZ 226: PAS ENCEINTE <input type="checkbox"/> OU PAS SÛRE ↓	ENCEINTE <input type="checkbox"/>	→ 312
303	Est-ce que vous, ou votre partenaire, faites actuellement quelque chose ou est-ce que vous utilisez actuellement une méthode pour retarder ou éviter une grossesse ?	OUI 1 NON 2	→ 312
303A	Pourquoi n'utilisez-vous pas quelque chose ou une méthode contraceptive pour retarder ou éviter une grossesse?	RAPPORTS SEX. PEU FRÉQUENTS/MARI ABSEN 01 TOMBÉE ENCEINTE ALORS QU'ELLE UTILISAIT 02 SOUHAITAIT TOMBER ENCEINTE 03 MARI/PARTENAIRE/FAMILLE DÉSAAPPROUVE 04 PEUR DES EFFETS SECONDAIRES 05 MANQUE D'ACCESSIBILITÉ/TROP ÉLOIGNÉ 06 COÛTE TROP CHER 07 PAS PRATIQUE À UTILISER 08 FATALISTE 09 DIFFICULTÉS POUR TOMBER ENCEINTE/MÉNOP 10 DISSOLUTION DU MARIAGE/SÉPARATION 11 CELIBATAIRE 12 ABSTINENCE 13 AUTRE 96 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 98	→ 311
304	Quelle méthode utilisez-vous ? ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ. SI PLUS D'UNE MÉTHODE EST MENTIONNÉE, SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE PASSAGE DE LA PREMIÈRE MÉTHODE DE LA LISTE.	STÉRILISATION FÉMININE A STÉRILISATION MASCULINE B DIU C INJECTABLES D IMPLANTS E PILULE F CONDOM G CONDOM FÉMININ H PILULE DIU LENDEMAIN I MÉTHODE DES JOURS FIXES J MAMA K MÉTHODE DU RYTHME L RETRAIT M AUTRE MÉTHODE MODERNE X AUTRE MÉTHODE TRADITIONNELLE Y	→ 307 → 309 → 306 → 309
305	Quelle est la marque de pilule que vous utilisez actuellement ? SI LA MARQUE N'EST PAS CONNUE, DEMANDEZ À VOIR LA BOÎTE.	PLANYL 01 PLANOR 02 OVRETTE 03 LO FEMENAL 04 MINIDRIL 05 MINIPHASE 06 STEDIRIL 07 MICROVAL 08 ADEPAL 09 MICROGYNC 10 NÉOGYNON 11 DIANE 35 12 TRINORDIOL 13 SECURIL 14 LUSIAF 15 MICROLUT 16 AUTRE 96 NSP 98	→ 309
306	Quelle est la marque de condom que vous utilisez actuellement ?	PROTEC 01 FAGAROU 02 VISA 03 MANIX 04 PRESA 05 KAMA SUTR 06 PROTEX 07 INNOTEX 08 CASANOVA 09	

SECTION 3. CONTRACEPTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
		INTIMY	10
		CONTEX	11
		STAR	12
		TROJAM	13
		FEMIDON	14
		KISS	15

309

SECTION 3. CONTRACEPTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À																				
	SI LA MARQUE N'EST PAS CONNUE, DEMANDEZ À VOIR LA BOITE.	AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 98																					
307 (5)	Dans quel établissement a été effectuée la stérilisation ? INSISTEZ POUR DÉTERMINEZ LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ PAS DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, _____ (NOM DE L'ENDROIT)	SECTEUR PUBLIC HÔPITAL DU GOUVERNEMENT 11 CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. 12 CENTRE DE PLANIFICATION FAMILIALE .. 13 STRAT. AVANCÉE/EQU. MOBILE 14 AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ 16 (PRÉCISEZ) SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ 21 CABINET MÉDICAL PRIVÉ 22 CLINIQUE MOBILE 23 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ 26 (PRÉCISEZ) AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 98																					
308	En quel mois et en quelle année la stérilisation a-t-elle été effectuée ?	MOIS <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> ANNÉE <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																					→ 310
309	Depuis quel mois et quelle année utilisez-vous (MÉTHODE ACTUELLE) sans interruption ? INSISTEZ : Depuis combien de temps utilisez-vous (MÉTHODE ACTUELLE) sans interruption ?	MOIS <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> ANNÉE <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																					
310	VÉRIFIEZ 308 ET 309, 215 ET 231: AUCUNE NAISSANCE OU GROSSESSE TERMINÉE APRÈS MOIS ET ANNÉE DE DÉBUT D'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION À 308 OU 309 NON <input type="checkbox"/> ↓ OUI <input type="checkbox"/> ← RETOURNEZ À 308 OU 309, INSISTEZ ET INSCRIVEZ LE MOIS ET L'ANNÉE DE DÉBUT D'UTILISATION CONTINUE DE LA MÉTHODE ACTUELLE (QUI DOIT SE SITUER APRÈS LA DERNIÈRE NAISSANCE OU LA FIN DE LA DERNIÈRE GROSSESSE).																						

SECTION 3. CONTRACEPTION (OPTION CAPI)

311	<p>VÉRIFIEZ 308 ET 309:</p> <p>ANNÉE EST 2013-2018</p> <p>C INSCRIVEZ DANS LE CALENDRIER LE CODE POUR LA MÉTHODE UTILISÉE LE MOIS DE L'INTERVIEW ET POUR CHAQUE MOIS JUSQU'À LA DATE DE DÉBUT D'UTILISATION .</p> <p>ENSUITE CONTINUEZ</p>	<p>ANNÉE EST 2012 OU PLUS TÔT</p> <p>C INSCRIVEZ DANS LE CALENDRIER LE CODE POUR LA MÉTHODE UTILISÉE LE MOIS DE L'INTERVIEW ET POUR CHAQUE MOIS JUSQU'À JANVIER 2013 .</p> <p>ENSUITE (ALLEZ À 324)</p>		
312	<p>Je voudrais maintenant vous poser des questions sur les périodes où, durant ces dernières années, vous ou votre partenaire, avez utilisé une méthode pour éviter une grossesse.</p> <p>C UTILISEZ LE CALENDRIER POUR VÉRIFIER LES PÉRIODES ANTÉRIEURES D'UTILISATION ET DE NON UTILISATION, EN COMMENÇANT PAR L'UTILISATION LA PLUS RÉCENTE, EN PARTANT DE JANVIER 2013. UTILISEZ LES NOMS DES ENFANTS, DATES DE NAISSANCE ET PÉRIODES DE GROSSESSE COMME DES POINTS DE RÉFÉRENCE.</p>			
		COLONNE 1	COLONNE 2	COLONNE 3
312A	MOIS ET ANNÉE DU DÉBUT DE L'INTERVALLE D'UTILISATION OU DE NON UTILISATION.	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE
312B	Entre (ÉVÈNEMENT) en (MOIS/ANNÉE) et (ÉVÈNEMENT) en (MOIS/ANNÉE), avez-vous ou votre partenaire utilisé une méthode de contraception ?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 312I)	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 312I)	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 312I)
312C	Quelle était cette méthode ?	CODE MÉTHODE .. <input type="text"/>	CODE MÉTHODE .. <input type="text"/>	CODE MÉTHODE .. <input type="text"/>
312D	Combien de mois après (ÉVÈNEMENT) en (MOIS/ANNÉE) avez-vous commencé à utiliser (MÉTHODE) ? ENCERCLEZ '95' SI L'ENQUÊTÉE DONNE LA DATE DE DÉBUT D'UTILISATION DE LA	IMMÉDIATEMENT 00 MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 312F) DATE DONNÉE 95	IMMÉDIATEMENT 00 MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 312F) DATE DONNÉE 95	IMMÉDIATEMENT 00 MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 312F) DATE DONNÉE 95

		COLONNE 1	COLONNE 2	COLONNE 3
312E	INSCRIVEZ LE MOIS ET L'ANNÉE OÙ L'ENQUÊTÉE A COMMENCÉ À UTILISER LA MÉTHODE.	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE
312F	Pendant combien de mois avez-vous utilisé (MÉTHODE) ? ENCERCLEZ '95' SI L'ENQUÊTÉE DONNE LA DATE DE FIN	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 312H) ← DATE DONNÉE 95	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 312H) ← DATE DONNÉE 95	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 312H) ← DATE DONNÉE 95
312G	INSCRIVEZ LE MOIS ET L'ANNÉE OÙ L'ENQUÊTÉE A ARRÊTÉ D'UTILISER LA MÉTHODE.	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE
312H	Pourquoi avez-vous arrêté d'utiliser (MÉTHODE) ?	RAISON POUR AVOIR ARRÊTÉ <input type="text"/>	RAISON POUR AVOIR ARRÊTÉ <input type="text"/>	RAISON POUR AVOIR ARRÊTÉ <input type="text"/>
312I		RETOURNEZ À 312A À LA COLONNE SUIVANTE; OU, SI PLUS D'INTERRUPTIONS, ALLEZ À 313.	RETOURNEZ À 312A À LA COLONNE SUIVANTE; OU, SI PLUS D'INTERRUPTIONS, ALLEZ À 313.	RETOURNEZ À 312A DANS LE NOUVEAU QUESTIONNAIRE; OU, SI PLUS D'INTERRUPTIONS, ALLEZ À 313.

SECTION 3. CONTRACEPTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
313	VÉRIFIEZ LE CALENDRIER POUR L'UTILISATION D'UNE MÉTHODE CONTRACEPTIVE À N'IMPORTE QUEL MOIS AUCUNE MÉTHODE UTILISÉE <input type="checkbox"/> UNE MÉTHODE UTILISÉE <input type="checkbox"/>		→ 315
314	Avez-vous déjà utilisé quelque chose ou essayé par divers moyens de retarder ou d'éviter une grossesse ?	OUI 1 NON 2	→ 326
315	VÉRIFIEZ 304: ENCERCLEZ LE CODE DE LA MÉTHODE: SI PLUS D'UN CODE MÉTHODE ENCERCLÉ À 304, ENCERCLEZ LE CODE DE LA PREMIÈRE MÉTHODE DE LA LISTE.	PAS DE CODE ENCERCLÉ 00 STÉRILISATION FÉMININE 01 STÉRILISATION MASCULINE 02 DIU 03 INJECTABLES 04 IMPLANTS 05 PILULE 06 CONDOM 07 CONDOM FÉMININ 08 PILULE DU LENDEMAIN 09 MÉTHODE DES JOURS FIXES 10 MAMA 11 MÉTHODE DU RYTHME 12 RETRAIT 13 AUTRE MÉTHODE MODERNE 95 AUTRE MÉTHODE TRADITIONNELLE 96	→ 326 → 319 → 327 → 323
316 (5)	Vous avez commencé à utiliser (MÉTHODE ACTUELLE) en (DATE À 309). Où l'avez-vous obtenue à ce moment-là ? INSISTEZ POUR IDENTIFIER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT. _____ (NOM DE L'ENDROIT)	SECTEUR PUBLIC HÔPITAL GOUV. 11 CENTRE SANTÉ GOUV. 12 POSTE SANTÉ 13 CENTRE DE PF GOUV. 14 MATERNITÉ RURALE 15 CASE DE SANTÉ 16 PHARMACIE COMMUNAUTAIRE 17 STRAT. AVANCÉE/EQU. MOBILE 18 AUTRE PUBLIC 19 _____ (PRÉCISEZ) SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE/CABINET 21 PRIVÉ 22 PHARMACIE 23 MÉDECIN PRIVÉ 24 DISPENSARE RELIG 25 AUTRE MEDICAL PRIVÉ 26 _____ (PRÉCISEZ) AUTRE SOURCE BOUTIQUE 31 ÉGLISE 32 PARENTS/AMIS 33 BAR 34 AUTRE 96 _____ (PRÉCISEZ)	
317	VÉRIFIEZ 304: ENCERCLEZ LE CODE DE LA MÉTHODE: SI PLUS D'UN CODE MÉTHODE ENCERCLÉ À 304, ENCERCLEZ LE CODE DE LA PREMIÈRE MÉTHODE DE LA LISTE.	DIU 03 INJECTABLES 04 IMPLANTS 05 PILULE 06 CONDOM 07 CONDOM FÉMININ 08 PILULE DU LENDEMAIN 09 MÉTHODE DES JOURS FIXES 10 AUTRE MÉTHODE MODERNE 95 AUTRE MÉTHODE TRADITIONNELLE 96	→ 323 → 322 → 323

SECTION 3. CONTRACEPTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
318	À ce moment-là, vous a-t-on parlé d'effets secondaires que vous pourriez avoir en utilisant cette méthode ?	OUI 1 NON 2	→ 321 → 320
319	Quand vous avez été stérilisée, vous a-t-on parlé d'effets secondaires ou de problèmes que vous pourriez avoir à cause de la méthode ?	OUI 1 NON 2	→ 321
320	Est-ce qu'un agent de santé ou de planification familiale vous a parlé des effets secondaires ou des problèmes que vous pourriez avoir à cause de l'utilisation de la méthode ?	OUI 1 NON 2	→ 322
321	Vous a-t-on dit ce qu'il fallait faire si vous aviez ces effets secondaires ou ces problèmes ?	OUI 1 NON 2	
322	VÉRIFIEZ 318 ET 319: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> UN <input type="checkbox"/> OUI ↓ </div> <div style="border-left: 1px dashed black; padding-left: 10px; text-align: center;"> AUTRE <input type="checkbox"/> ↓ </div> </div> <p>a) À ce moment-là, vous a-t-on parlé d'autres méthodes de planification familiale que vous pourriez utiliser ?</p> <p>b) Quand vous avez obtenu (MÉTHODE ACTUELLE DE 315) de (ENDROIT DE 307 OU 316), vous a-t-on parlé d'autres méthodes de PF que vous pouviez utiliser ?</p>	OUI 1 NON 2	→ 324
323	Est-ce qu'un agent de santé ou de planification familiale vous a parlé d'autres méthodes de planification familiale que vous pouviez utiliser ?	OUI 1 NON 2	
324	VÉRIFIEZ 304: ENCERCLEZ LE CODE DE LA MÉTHODE: SI PLUS D'UN CODE MÉTHODE ENCERCLÉ À 304, ENCERCLEZ LE CODE DE LA PREMIÈRE MÉTHODE DE LA LISTE.	STÉRILISATION FÉMININE 01 STÉRILISATION MASCULINE 02 DIU 03 INJECTABLES 04 IMPLANTS 05 PILULE 06 CONDOM 07 CONDOM FÉMININ 08 PILULE DU LENDEMAIN 09 MÉTHODE DES JOURS FIXES 10 MAMA 11 MÉTHODE DU RYTHME 12 RETRAIT 13 AUTRE MÉTHODE MODERNE 95 AUTRE MÉTHODE TRADITIONNELLE 96	→ 327 → 327 → 327

SECTION 3. CONTRACEPTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
325	<p>Où avez-vous obtenu (MÉTHODE ACTUELLE) la dernière fois ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____</p> <p>(NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL GOUV. 11</p> <p>CENTRE SANTÉ GOUV. 12</p> <p>POSTE SANTÉ 13</p> <p>CENTRE DE PF GOUV. 14</p> <p>MATERNITÉ RURALE 15</p> <p>CASE DE SANTÉ 16</p> <p>PHARMACIE COMMUNAUTAIRE 17</p> <p>STRAT. AVANCÉE/EQU. MOBILE 18</p> <p>AUTRE PUBLIC 19</p> <p>_____</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE/CABINET 21</p> <p>PRIVÉ 22</p> <p>PHARMACIE 23</p> <p>MÉDECIN PRIVÉ 24</p> <p>DISPENSAIRE RELIG 25</p> <p>AUTRE MEDICAL PRIVÉ 26</p> <p>_____</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE SOURCE</p> <p>BOUTIQUE 31</p> <p>ÉGLISE 32</p> <p>PARENTS/AMIS 33</p> <p>BAR 34</p> <p>AUTRE 96</p> <p>_____</p> <p>(PRÉCISEZ)</p>	<p>→ 327</p>
326	<p>Connaissez-vous un endroit où vous pouvez vous procurer une méthode de planification familiale ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p>	<p>→ 327</p>
326A	<p>Où est cet endroit ?</p> <p>Pas d'autre endroit ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER CHAQUE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____</p> <p>(NOM DE L'ENDROIT/NOM DES ENDROITS)</p>	<p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL GOUV. A</p> <p>CENTRE SANTÉ GOUV. B</p> <p>POSTE SANTÉ C</p> <p>CENTRE DE PF GOUV. D</p> <p>MATERNITÉ RURALE E</p> <p>CASE DE SANTÉ F</p> <p>PHARMACIE COMMUNAUTAIRE G</p> <p>STRAT. AVANCÉE/EQU. MOBILE H</p> <p>AUTRE PUBLIC I</p> <p>_____</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE/CABINET J</p> <p>PRIVÉ K</p> <p>PHARMACIE L</p> <p>MÉDECIN PRIVÉ M</p> <p>DISPENSAIRE RELIG N</p> <p>AUTRE MEDICAL PRIVÉ N</p> <p>_____</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE SOURCE</p> <p>BOUTIQUE O</p> <p>ÉGLISE P</p> <p>PARENTS/AMIS Q</p> <p>BAR R</p> <p>AUTRE X</p> <p>_____</p> <p>(PRÉCISEZ)</p>	

SECTION 3. CONTRACEPTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
327	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez reçu la visite d'un agent de santé ?	OUI 1 NON 2	→ 329
328	Est-ce que l'agent de santé vous a parlé de planification familiale ?	OUI 1 NON 2	
329	VÉRIFIEZ 202: ENFANT VIVANT <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>OUI <input type="checkbox"/></p> <p>↓</p> <p>a) Au cours des 12 derniers mois, êtes-vous allée dans un établissement de santé pour recevoir des soins pour vous-même ou pour vos enfants ?</p> </div> <div style="border-left: 1px dashed black; padding-left: 10px; text-align: center;"> <p>NON <input type="checkbox"/></p> <p>↓</p> <p>b) Au cours des 12 derniers mois, êtes-vous allée dans un établissement de santé pour recevoir des soins pour vous-même ?</p> </div> </div>	OUI 1 NON 2	→ 401
330	Est-ce qu'un membre du personnel de l'établissement de santé vous a parlé de méthodes de planification familiale ?	OUI 1 NON 2	

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

401	VÉRIFIEZ 224: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">UNE NAISSANCE OU PLUS EN 2013-2018</div> <input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">AUCUNE NAISSANCE EN 2013-2018</div> <div style="margin-left: 20px;">→ 648</div> </div>		
402	VÉRIFIEZ 215: INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES À 403 ET LE NOM ET L'ÉTAT DE SURVIE À 404 POUR CHAQUE NAISSANCE EN 2013-2018. POSEZ LES QUESTIONS SUR TOUTES CES NAISSANCES. COMMENCEZ PAR LA DERNIÈRE NAISSANCE. S'IL Y A PLUS DE 2 NAISSANCES, UTILISEZ LA DERNIÈRE COLONNE D'UN/DES QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE. Je voudrais maintenant vous poser des questions sur vos enfants nés dans les cinq dernières années. (Nous parlerons d'un enfant à la fois).		
403	NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES DE 212 DANS L'HISTORIQUE DES NAISSANCES.	DERNIÈRE NAISSANCE NUMÉRO HISTORIQUE NAISSANCE <input type="text"/> <input type="text"/>	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NUMÉRO HISTORIQUE NAISSANCE <input type="text"/> <input type="text"/>
404	À PARTIR DES QUESTIONS 212 ET 216:	NOM _____ VIVANT <input type="checkbox"/> DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/>	NOM _____ VIVANT <input type="checkbox"/> DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/>
405	Quand vous êtes tombée enceinte de (NOM), voulez-vous être enceinte à ce moment-là ?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 408) ←	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 426) ←
406	VÉRIFIEZ 208: <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">SEULEMENT UNE NAISSANCE <input type="checkbox"/></div> <div style="text-align: center;">PLUS D'UNE NAISSANCE <input type="checkbox"/></div> </div> <p>a) Est-ce que vous vouliez avoir un enfant plus tard, ou est-ce que vous ne vouliez pas d'enfant ?</p> <p>b) Est-ce que vous vouliez avoir un enfant plus tard, ou est-ce que vous ne vouliez plus d'enfant ?</p>	PLUS TARD 1 PLUS/AUCUN 2 (ALLEZ À 408) ←	PLUS TARD 1 PLUS/AUCUN 2 (ALLEZ À 426) ←
407	Combien de temps de plus voulez-vous attendre ?	MOIS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 998	MOIS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 998
408	Avez-vous vu quelqu'un pour des soins prénatals pour cette grossesse ?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 414) ←	
409	Qui avez-vous vu ? Quelqu'un d'autre ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER CHAQUE TYPE DE PERSONNE ET ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	PROF. DE LA SANTÉ MÉDECIN A SAGE-FEMME B INFIRMIÈRE/ICP C AUTRE PERSONNEL MATRONE D ACCOCHEUSE TRADITIONNELLE .. E AUTRE X (PRÉCISEZ) PERSONNE Y	

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE		AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE	
		NOM _____		NOM _____	
410	<p>Où avez-vous reçu les soins prénatals pour cette naissance ?</p> <p>Pas d'autre endroit ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____ (NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL GOUVT. A</p> <p>CENTRE DE SANTÉ GOUVT. B</p> <p>POSTE DE SANTÉ GOUVT. C</p> <p>CASE DE SANTÉ D</p> <p>CLINIQUE MOBILE E</p> <p>AGENT DE SANTÉ F</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC .. G</p> <p>_____ (PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ H</p> <p>PHARMACIE I</p> <p>MÉDECIN PRIVÉ J</p> <p>CLINIQUE MOBILE K</p> <p>AGENT DE SANTÉ L</p> <p>AUTRE SECTEUR MED. PRIVÉ .. M</p> <p>_____ (PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE ENDROIT</p> <p>BOUTIQUE N</p> <p>PRATICIEN O</p> <p>TRADITIONNEL P</p> <p>MARCHÉ P</p> <p>AGENT COMMUNAUT. Q</p> <p>AUTRE .. X</p> <p>_____ (PRÉCISEZ)</p>			
411	De combien de mois étiez-vous enceinte quand vous avez reçu vos premiers soins prénatals pour cette grossesse ?	MOIS	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
		NE SAIT PAS			98
412	Durant cette grossesse, combien de fois avez-vous reçu des soins prénatals ?	NOMBRE DE FOIS	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
		NE SAIT PAS			98
413	Est-ce qu'au cours des visites prénatales durant cette grossesse, les examens suivants ont été effectués au moins une fois :		OUI	NON	
	a) Vous a-t-on pris la tension ?	a) TENSION	1	2	
	b) Vous a-t-on prélevé de l'urine ?	b) URINE	1	2	
	c) Vous a-t-on prélevé du sang ?	c) SANG	1	2	
413A	Au cours de l'une de ces visites prénatales, vous a-t-on parlé de choses qui peuvent être le signe de problèmes de la grossesse ?	OUI	1		
		NON	2		
		NE SAIT PAS	8		

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE		AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE	
		NOM _____		NOM _____	
414	Durant cette grossesse, vous a-t-on fait une injection dans le bras pour éviter au bébé d'avoir le tétanos, c'est-à-dire des convulsions après la naissance ?	OUI	1	NON	2
		(ALLEZ À 417) ←		NE SAIT PAS	8
415	Durant cette grossesse, combien de fois vous a-t-on fait une injection contre le tétanos ?	NOMBRE DE FOIS	<input type="text"/>	NE SAIT PAS	8
416	VÉRIFIEZ 415: INJECTIONS ANTITÉTANIQUES	2 FOIS OU PLUS <input type="checkbox"/>	AUTRE <input type="checkbox"/>	(ALLEZ À 420) ←	
417	À n'importe quel moment avant cette grossesse, vous a-t-on fait des injections contre le tétanos ?	OUI	1	NON	2
		(ALLEZ À 420) ←		NE SAIT PAS	8
418	Avant cette grossesse, combien de fois avez-vous eu des injections contre le tétanos ? SI 7 FOIS OU PLUS INSCRIVEZ '7'.	NOMBRE DE FOIS	<input type="text"/>	NE SAIT PAS	8
419	VÉRIFIEZ 418: SEULEMENT UNE FOIS <input type="checkbox"/> a) Il y a combien d'années que vous avez reçu cette injection contre le tétanos ? PLUS D'UNE FOIS <input type="checkbox"/> b) Il y a combien d'années que vous avez reçu la dernière injection contre le tétanos avant	IL Y A ANNÉES	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
420	Durant cette grossesse, vous a-t-on donné ou avez-vous acheté des comprimés de fer ou du sirop contenant du fer ? MONTREZ LES COMPRIMÉS/SIROP.	OUI	1	NON	2
		(ALLEZ À 422) ←		NE SAIT PAS	8
420A	Où les comprimés de fer ou du sirop contenant du fer ont été achetés ou donnés? INSISTEZ POUR DÉTERMINER LES TYPES D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT. _____ (NOM DE L'ENDROIT/ NOM DES ENDROITS)	SECTEUR PUBLIC HÔPITAL GOUVT. A CENTRE DE SANTÉ GOUVT. B POSTE DE SANTÉ GOUVT. C CASE DE SANTÉ D CLINIQUE MOBILE E AGENT DE SANTÉ F AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ (PRÉCISEZ) G SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ H PHARMACIE I MÉDECIN PRIVÉ J CLINIQUE MOBILE K AGENT DE SANTÉ L AUTRE SECTEUR MED. PRIVÉ _____ (PRÉCISEZ) M AUTRE ENDROIT BOUTIQUE N PRATICIEN TRADITIONNEL O MARCHÉ P AGENT COMMUNAUT. Q AUTRE _____ X			

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____ (PRÉCISEZ)	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE
		NOM _____	NOM _____
421	Durant toute la grossesse, pendant combien de jours avez-vous pris des comprimés ou du sirop ? SI LA RÉPONSE N'EST PAS NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UN NOMBRE APPROXIMATIF	JOURS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 998	
421A	Pouvez-vous nous décrire les avantages de la prise quotidienne des suppléments de fer/acide folique ? LAISSEZ LA DECRIRE ET ENCERCLEZ LA/LES REPONSE (S)	PREVIENT L'ANÉMIE A PROTEGE LE BÉBÉ B PROTEGE LA GROSSESSE .. C PROTEGE LA MERE D PREVIENT LE FAIBLE E POIDS DU BÉBÉ F AUTRE _____ X A PRÉCISER NSP 9 (PASSEZ À 422) ←	
421B	D'où tenez-vous cette information ?	LORS D'UNE CPN A MEDIAS B PARENTS/VOI C AGENT DE SANTE D COMMUNAUTAIRE D AUTRE _____ X (PRÉCISEZ)	
422	Durant cette grossesse, avez-vous pris des médicaments contre les vers intestinaux ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
423	Durant cette grossesse, avez-vous pris de la SP/Fansidar pour éviter le paludisme ?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 425A) ← NE SAIT PAS 8	
424	Durant cette grossesse, combien de fois avez-vous pris de la SP/Fansidar ?	NOMBRE DE FOIS .. <input type="text"/> <input type="text"/>	
425	Vous a-t-on donné la SP/Fansidar durant une visite prénatale, durant une autre visite dans un établissement de santé ou l'avez-vous obtenue ailleurs ? SI PLUS D'UNE SOURCE, INSCRIVEZ LA PREMIÈRE SOURCE DE LA LISTE.	VISITE PRÉNATALE 1 AUTRE ÉTABLIS. DE SANTÉ .. 2 AILLEURS 6	
425A	Est-ce que, pendant cette grossesse, vous avez reçu une moustiquaire gratuitement	OUI 1 NON 2 (PASSEZ À 426) ←	
425B	De combien de mois étiez-vous enceinte quand vous avez reçu cette moustiquaire gratuitement ?	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98	

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE
		NOM _____	NOM _____
426	Quand (NOM) est né, était-il/elle très gros, plus gros que la moyenne, moyen, plus petit que la moyenne ou très petit ?	TRÈS GROS 1 PLUS GROS QUE LA MOYENNE 2 MOYEN 3 PLUS PETIT QUE LA MOYENNE 4 TRÈS PETIT 5 NE SAIT PAS 8	TRÈS GROS 1 PLUS GROS QUE LA MOYENNE 2 MOYEN 3 PLUS PETIT QUE LA MOYENNE 4 TRÈS PETIT 5 NE SAIT PAS 8
427	(NOM) a t-il /elle été pesé à la naissance ?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 429) ← NE SAIT PAS 8	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 429) ← NE SAIT PAS 8
428	Combien (NOM) pesait-il/elle ? INSCRIVEZ LE POIDS EN KILOGRAMMES À PARTIR DU CARNET DE SANTÉ, SI DISPONIBLE.	KG DU CARNET 1 <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> KG DE MÉMOIRE 2 <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 99998	KG DU CARNET 1 <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> KG DE MÉMOIRE 2 <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 99998
428A	(Nom)a-t-il/elle un certificat/acte de naissance ? Si oui, demander <i>Puis-voir</i> ?	OUI, VU 1 (PASSEZ À 429) ← OUI, NON VU 2 NON 3 NE SAIT PAS 8	OUI, VU 1 (PASSEZ À 429) ← OUI, NON VU 2 NON 3 NE SAIT PAS 8
428B	La naissance de (NOM) a t-elle été enregistrée/déclarée auprès de l'autorité civile (chef de quartier/chef de village ou officier de l'état civil) ?	OUI 1 (PASSEZ À 429) ← NON 2 NE SAIT PAS 8	OUI 1 (PASSEZ À 429) ← NON 2 NE SAIT PAS 8
428C	Savez-vous comment faire enregistrer la naissance de (NOM) ?	OUI 1 NON 2	OUI 1 NON 2
429	Qui vous a assisté durant l'accouchement de (NOM) ? Quelqu'un d'autre ? INSISTEZ POUR LE/LES TYPES DE PERSONNE ET ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ. SI L'ENQUÊTÉE DÉCLARE QUE PERSONNE N'A ASSISTÉ L'ACCOUCHEMENT, INSISTEZ POUR DÉTERMINER SI DES ADULTES ÉTAIENT PRÉSENTS À	PROF. DE LA SANTÉ MÉDECIN A SAGE-FEMME B INFIRMIÈRE/ICP C AUTRE PERSONNEL MATRONE D ACCOCHEUSE TRADITIONNELLE .. E AUTRE X (PRÉCISEZ) PERSONNE Y	PROF. DE LA SANTÉ MÉDECIN A SAGE-FEMME B INFIRMIÈRE/ICP C AUTRE PERSONNEL MATRONE D ACCOCHEUSE TRADITIONNELLE .. E AUTRE X (PRÉCISEZ) PERSONNE Y

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____						
430	<p>Où avez-vous accouché de (NOM) ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____ (NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p>MAISON</p> <p>SA MAISON 11</p> <p>(PASSEZ À 434) ←</p> <p>AUTRE MAISON 12</p> <p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL GOUVT. A</p> <p>CENTRE DE SANTÉ / MATERNITÉ B</p> <p>POSTE DE SANTÉ GOUVT. C</p> <p>CASE DE SANTÉ D</p> <p>CLINIQUE MOBILE E</p> <p>AGENT DE SANTÉ F</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC G</p> <p>_____ (PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ H</p> <p>PHARMACIE I</p> <p>MÉDECIN PRIVÉ J</p> <p>CLINIQUE MOBILE K</p> <p>AGENT DE SANTÉ L</p> <p>AUTRE SECTEUR MED. PRIVÉ M</p> <p>_____ (PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE ENDROIT</p> <p>BOUTIQUE N</p> <p>PRATICIEN TRADITIONNEL O</p> <p>MARCHÉ P</p> <p>AGENT COMMUNAUT. Q</p> <p>AUTRE X</p> <p>_____ (PRÉCISEZ)</p> <p>PASSEZ A 434 ←</p>	<p>MAISON</p> <p>SA MAISON 11</p> <p>(PASSEZ À 434) ←</p> <p>AUTRE MAISON 12</p> <p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL GOUVT. A</p> <p>CENTRE DE SANTÉ / MATERNITÉ B</p> <p>POSTE DE SANTÉ GOUVT. C</p> <p>CASE DE SANTÉ D</p> <p>CLINIQUE MOBILE E</p> <p>AGENT DE SANTÉ F</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC G</p> <p>_____ (PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ H</p> <p>PHARMACIE I</p> <p>MÉDECIN PRIVÉ J</p> <p>CLINIQUE MOBILE K</p> <p>AGENT DE SANTÉ L</p> <p>AUTRE SECTEUR MED. PRIVÉ M</p> <p>_____ (PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE ENDROIT</p> <p>BOUTIQUE N</p> <p>PRATICIEN TRADITIONNEL O</p> <p>MARCHÉ P</p> <p>AGENT COMMUNAUT. Q</p> <p>AUTRE X</p> <p>_____ (PRÉCISEZ)</p> <p>PASSEZ A 434 ←</p>						
431	<p>Combien de temps après l'accouchement de (NOM) êtes-vous restée là ?</p> <p>SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS.</p>	<p>HEURES 1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table></p> <p>JOURS 2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table></p> <p>SEMAINES 3 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table></p> <p>NE SAIT PAS 998</p>							
432	<p>Avez-vous accouché de (NOM) par césarienne, c'est-à-dire que l'on vous a ouvert le ventre pour faire sortir le bébé ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>(ALLEZ À 434) ←</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>(ALLEZ À 434) ←</p>						
433	<p>Quand la décision de pratiquer une césarienne a-t-elle été prise ? Était-ce avant ou après le début des douleurs ?</p>	<p>AVANT 1</p> <p>APRÈS 2</p>	<p>AVANT 1</p> <p>APRÈS 2</p>						
434	<p>Est-ce que (NOM) a été posé sur votre poitrine, immédiatement après sa naissance ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>(ALLEZ À 434B) ←</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>(ALLEZ À 459) ←</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>						
434A	<p>Est-ce que la peau de (NOM) était en contact avec votre peau ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>						
434B	<p>VÉRIFIEZ 430: LIEU D'ACCOUCHEMENT</p>	<p>CODE 11, 12, OR 96 ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/></p> <p>(ALLEZ À 449) ←</p>							

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE
		NOM _____	NOM _____
435	Je voudrais vous parler de contrôle de votre santé après l'accouchement, par exemple quelqu'un qui vous a posé des questions sur votre santé ou vous a examinée. Est-ce que quelqu'un a vérifié votre état de santé pendant que vous étiez dans l'établissement ?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 438) ←	
436	Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier examen ? SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS.	HEURES 1 JOURS 2 SEMAINES 3 NE SAIT PAS 998	
437	Qui a examiné votre état de santé à ce moment-là ? INSISTEZ POUR OBTENIR LA PERSONNE LA PLUS QUALIFIÉE.	PROF. DE LA SANTÉ MÉDECIN A SAGE-FEMME B INFIRMIÈRE/ICP C AUTRE PERSONNEL MATRONE D ACCOCHEUSE TRADITIONNELLE .. E AUTRE _____ X (PRÉCISEZ) PERSONNE Y	
438	Je voudrais maintenant vous parler d'exams de la santé de (NOM) après la naissance – par exemple, quelqu'un qui a examiné (NOM), qui a vérifié le cordon ombilical ou qui s'est assuré que (NOM) allait bien. Est-ce que quelqu'un a vérifié l'état de santé de (NOM) pendant que vous étiez encore dans l'établissement ?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 441) ← NE SAIT PAS 8	
439	Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier examen de (NOM) ? SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS.	HEURES 1 JOURS 2 SEMAINES 3 NE SAIT PAS 998	

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE												
		NOM _____	NOM _____												
440	<p>Qui a examiné l'état de santé de (NOM) à ce moment-là ?</p> <p>INSISTEZ POUR OBTENIR LA PERSONNE LA PLUS QUALIFIÉE</p>	<p>PROF. DE LA SANTÉ MÉDECIN A SAGE-FEMME B INFIRMIÈRE/ICP C</p> <p>AUTRE PERSONNEL MATRONE D ACCOCHEUSE TRADITIONNELLE .. E AUTRE _____ X (PRÉCISEZ) PERSONNE Y</p>													
441	<p>Je voudrais maintenant parler de ce qui s'est passé après que vous ayez quitté l'établissement. Est-ce que quelqu'un a examiné votre état de santé après que vous ayez quitté l'établissement ?</p>	<p>OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 445) ←</p>													
442	<p>Combien de temps après l'accouchement a eu lieu cet examen ?</p> <p>SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS.</p>	<p>HEURES 1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table></p> <p>JOURS 2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table></p> <p>SEMAINES 3 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table></p> <p>NE SAIT PAS 998</p>													
443	<p>Qui a examiné votre état de santé à ce moment-là ?</p> <p>INSISTEZ POUR OBTENIR LA PERSONNE LA PLUS QUALIFIÉE.</p>	<p>PROF. DE LA SANTÉ MÉDECIN A SAGE-FEMME B INFIRMIÈRE/ICP C</p> <p>AUTRE PERSONNEL MATRONE D ACCOCHEUSE TRADITIONNELLE .. E AUTRE _____ X (PRÉCISEZ) PERSONNE Y</p>													

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE						
		NOM _____	NOM _____						
444	<p>Où a eu lieu l'examen ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____ (NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p>MAISON</p> <p>SA MAISON 11</p> <p>AUTRE MAISON 12</p> <p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL GOUVERNEMEN... 21</p> <p>CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. 22</p> <p>POSTE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. 23</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC</p> <p>_____ 26</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ 31</p> <p>AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>_____ 36</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE _____ 96</p> <p>(PRÉCISEZ)</p>							
445	<p>Je voudrais parler des examens de l'état de santé de (NOM) après votre départ de (ÉTABLISSEMENT À 430). Est-ce-qu'un prestataire de santé ou une accoucheuse traditionnelle a vérifié l'état de santé de (NOM) dans les deux mois après votre départ de (ÉTABLISSEMENT À 430) ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>(ALLEZ À 457) ←</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>							
446	<p>Combien d'heures, de jours ou de semaines après la naissance de (NOM), cet examen a-t-il eu lieu ?</p> <p>SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS.</p>	<p>HEURES 1</p> <p>JOURS 2</p> <p>SEMAINES 3</p> <p>NE SAIT PAS 998</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>						
447	<p>Qui a examiné l'état de santé de (NOM) à ce moment-là ?</p> <p>INSISTEZ POUR OBTENIR LA PERSONNE LA PLUS QUALIFIÉE.</p>	<p>PROF. DE LA SANTÉ</p> <p>MÉDECIN A</p> <p>SAGE-FEMME B</p> <p>INFIRMIÈRE/ICP C</p> <p>AUTRE PERSONNEL</p> <p>MATRONE D</p> <p>ACCOCHEUSE TRADITIONNELLE .. E</p> <p>AUTRE X</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>PERSONNE Y</p>							

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE						
		NOM _____	NOM _____						
448	<p>Où a eu lieu l'examen de (NOM) ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____ (NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p>MAISON</p> <p>SA MAISON 11</p> <p>AUTRE MAISON 12</p> <p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL GOUVERNEMEN... 21</p> <p>CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. 22</p> <p>POSTE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. 23</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC</p> <p>_____ 26</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ 31</p> <p>AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>_____ 36</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE _____ 96</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>(ALLEZ À 457) ←</p>							
449	<p>Je voudrais vous parler de contrôle de votre santé après l'accouchement, par exemple quelqu'un qui vous a posé des questions sur votre santé ou vous a examinée. Est-ce que quelqu'un a vérifié votre état de santé après la naissance de (NOM) ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>(ALLEZ À 453) ←</p>							
450	<p>Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier examen ?</p> <p>SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS.</p>	<p>HEURES 1</p> <p>JOURS 2</p> <p>SEMAINES 3</p> <p>NE SAIT PAS 998</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>						
451	<p>Qui a examiné votre état de santé à ce moment-là ?</p> <p>INSISTEZ POUR OBTENIR LA PERSONNE LA PLUS QUALIFIÉE.</p>	<p>PROF. DE LA SANTÉ</p> <p>MÉDECIN A</p> <p>SAGE-FEMME B</p> <p>INFIRMIÈRE/ICP C</p> <p>AUTRE PERSONNEL</p> <p>MATRONE D</p> <p>ACCOCHEUSE TRADITIONNELLE .. E</p> <p>AUTRE X</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>PERSONNE Y</p>							

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE						
		NOM _____	NOM _____						
452	<p>Où a eu lieu ce premier examen ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT</p> <p>_____ (NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p>MAISON</p> <p>SA MAISON 11</p> <p>AUTRE MAISON 12</p> <p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL GOUVERNEMENT... 21</p> <p>CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. 22</p> <p>POSTE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. 23</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC</p> <p>_____ 26</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ 31</p> <p>AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>_____ 36</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE _____ 96</p> <p>(PRÉCISEZ)</p>							
453	<p>Je voudrais vous parler des examens qui ont été faits pour vérifier l'état de santé de (NOM) après l'accouchement – par exemple, est-ce que quelqu'un a examiné (NOM), vérifié le cordon ou s'est assuré que (NOM) allait bien. Dans les deux mois après la naissance de (NOM), est-ce qu'un professionnel de santé ou une accoucheuse traditionnelle a vérifié l'état de santé de (NOM) ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>(ALLEZ À 457) ←</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>							
454	<p>Combien d'heures, de jours ou de semaines après la naissance de (NOM), ce premier examen a-t-il eu lieu ?</p> <p>SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES;</p> <p>SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS.</p>	<p>HEURES APRÈS</p> <p>NAISSANCE .. 1</p> <p>JOURS APRÈS</p> <p>NAISSANCE .. 2</p> <p>SEMAINES APRÈS</p> <p>NAISSANCE .. 3</p> <p>NE SAIT PAS 998</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>						
455	<p>Qui a examiné l'état de santé de (NOM) à ce moment-là ?</p> <p>INSISTEZ POUR OBTENIR LA PERSONNE LA PLUS QUALIFIÉE.</p>	<p>PROF. DE LA SANTÉ</p> <p>MÉDECIN A</p> <p>SAGE-FEMME B</p> <p>INFIRMIÈRE/ICP C</p> <p>AUTRE PERSONNEL</p> <p>MATRONE D</p> <p>ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE .. E</p> <p>AUTRE X</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>PERSONNE Y</p>							

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE		AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE																									
		NOM _____		NOM _____																									
456	<p>Où a eu lieu le premier examen de (NOM) ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____ (NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p>MAISON</p> <p>SA MAISON 11</p> <p>AUTRE MAISON 12</p> <p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL GOUVERNEMENT . 21</p> <p>CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. 22</p> <p>POSTE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. 23</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ 26</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ 31</p> <p>AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ 36</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE _____ 96</p> <p>(PRÉCISEZ)</p>																											
457	<p>Au cours des deux jours suivant la naissance de (NOM), est-ce qu'un prestataire de santé a fait l'une des choses suivantes ?</p> <p>a) Examiné le cordon ?</p> <p>b) Vérifié la température de (NOM) ?</p> <p>c) Vous a conseillé sur les signes de danger chez les nouveau-nés ?</p> <p>d) Vous a conseillé sur l'allaitement ?</p> <p>e) Observé (NOM) en train d'être allaité ?</p>	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>OUI</th> <th>NON</th> <th>NSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) CORDON</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>b) TEMP.</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>c) SIGNES</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>d) CONSEIL ALLAI-TEMENT ..</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>e) OBSERVÉ ALLAI-TEMENT ..</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		OUI	NON	NSP	a) CORDON	1	2	8	b) TEMP.	1	2	8	c) SIGNES	1	2	8	d) CONSEIL ALLAI-TEMENT ..	1	2	8	e) OBSERVÉ ALLAI-TEMENT ..	1	2	8			
	OUI	NON	NSP																										
a) CORDON	1	2	8																										
b) TEMP.	1	2	8																										
c) SIGNES	1	2	8																										
d) CONSEIL ALLAI-TEMENT ..	1	2	8																										
e) OBSERVÉ ALLAI-TEMENT ..	1	2	8																										
458	<p>Vos règles sont-elles revenues depuis la naissance de (NOM) ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>(ALLEZ À 460) ←</p> <p>NON 2</p> <p>(ALLEZ À 461) ←</p>																											
459	<p>Est-ce que vos règles sont revenues entre la naissance de (NOM) et votre grossesse suivante ?</p>			<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>(ALLEZ À 463) ←</p>																									
460	<p>Pendant combien de mois après la naissance de (NOM) n'avez-vous pas eu vos règles ?</p>	<p>MOIS <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NE SAIT PAS 98</p>		<p>MOIS <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NE SAIT PAS 98</p>																									
461	<p>VÉRIFIEZ 226: L'ENQUÊTÉE EST-ELLE ENCEINTE ?</p>	<p>PAS ENCEINTE <input type="checkbox"/></p> <p>ENCEINTE OU PAS SÛRE <input type="checkbox"/></p> <p>(ALLEZ À 463) ←</p>																											

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE		AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE	
		NOM _____		NOM _____	
462	Avez-vous eu des rapports sexuels depuis la naissance de (NOM) ?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 464) ←			
463	Pendant combien de mois après la naissance de (NOM) n'avez-vous pas eu de rapports sexuels ?	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98		MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98	
464	Avez-vous allaité (NOM) ?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 466) ←		OUI 1 NON 2	
465	VÉRIFIEZ 404: L'ENFANT EST-IL VIVANT ?	VIVANT <input type="checkbox"/> DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 470) ← (ALLEZ À 471) ←			
466	Combien de temps après la naissance avez-vous mis (NOM) au sein pour la première fois ? SI MOINS D'1 HEURE, INSCRIVEZ '00' HEURE; SI MOINS DE 24 HEURES, INSCRIVEZ EN HEURES; SINON, EN JOURS.	IMMÉDIATEMENT 000 HEURES 1 <input type="text"/> <input type="text"/> JOURS 2 <input type="text"/> <input type="text"/>			
466A	Est ce que (NOM) a reçu un autre chose que le lait maternel entre la naissance et la première tétée?	OUI 1 NON 2			
467	Dans les trois premiers jours après la naissance, est-ce que (NOM) a reçu autre chose à boire que le lait maternel ?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 468) ←			
467A	Qu'a t-on donné à boire à (NOM) ? Rien d'autre ? ENREGISTREZ TOUS LES LIQUIDES MENTIONNÉS.	LAIT (AUTRE QUE LE LAIT MATERNEL) A EAU BÉNITE B EAU C EAU SUCRÉE OU EAU GLUCOSÉE D INFUSION CALMANTE POUR COLIQUES E SOLUTION D'EAU SALÉE SUCRÉE F JUS DE FRUIT G LAIT EN POUDRE POUR BÉBÉ H THÉ/INFUSIONS I MIEL J AUTRE X (PRÉCISEZ)			
468	VÉRIFIEZ 404: L'ENFANT EST-IL VIVANT ?	VIVANT <input type="checkbox"/> DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/> ↓ (ALLEZ À 471) ←		VIVANT <input type="checkbox"/> DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/> ↓ (ALLEZ À 471) ←	
469	Allaitez-vous encore (NOM) ?	OUI 1 → 470 NON 2		OUI 1 → 470 NON 2	
469A	Pendant combien de mois avez-vous allaité (NOM) ?	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98		MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98	
470	(NOM) a-t-il bu quelque chose au biberon hier ou la nuit dernière ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8		OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
471		RETOURNEZ À 405 À LA COLONNE SUIVANTE ; OU, S'IL N'Y A PLUS DE NAISSANCES, ALLEZ À 501A.		RETOURNEZ À 405 À L'AVANT-DERNIÈRE COLONNE DU NOUVEAU QUESTIONNAIRE ; OU, S'IL N'Y A PLUS DE NAISSANCES, ALLEZ À 501A.	

SECTION 5A. VACCINATION DES ENFANTS (DERNIÈRE NAISSANCE)

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
501A	VÉRIFIEZ 215 DANS L'HISTORIQUE DES NAISSANCES : UNE NAISSANCE EN 2015-2018? UNE NAISSANCE OU PLUS EN <input type="checkbox"/> 2015-2018	AUCUNE NAISSANCE <input type="checkbox"/> EN 2015-2018	→ 601
502A	INSCRIVEZ LE NOM ET LE NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES DE 212 DU DERNIER ENFANT NÉ EN 2015-2018. NOM DE LA DERNIÈRE NAISSANCE _____ NUMÉRO HISTORIQUE DES NAISSANCES <input type="text"/> <input type="text"/>		
503A	VÉRIFIEZ 216 POUR ENFANT: VIVANT <input type="checkbox"/> ↓	DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/>	→ 501B
504A	Avez-vous un carnet ou un autre document où les vaccinations de (NOM) sont inscrites ?	OUI, A SEULEMENT UN CARNET 1 OUI, A SEULEMENT UN AUTRE DOCUMENT .. 2 OUI, A UN CARNET ET UN AUTRE DOCUMENT .. 3 NON, PAS DE CARNET ET PAS D'AUTRE DOCUMENT 4	→ 507A → 507A
505A	Avez-vous déjà eu un carnet de vaccination pour (NOM) ?	OUI 1 NON 2	
506A	VÉRIFIEZ 504A: CODE '2' EN CERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓	CODE '4' EN CERCLÉ <input type="checkbox"/>	→ 511A
507A	Puis-je voir le carnet ou un autre document sur lequel les vaccinations de (NOM) sont inscrites ?	OUI, SEULEMENT CARNET VU 1 OUI, SEULEMENT AUTRE DOCUMENT VU 2 OUI, CARNET ET AUTRE DOCUMENT VUS 3 NI CARNET NI AUTRE DOCUMENT VUS 4	→ 511A

SECTION 5A. VACCINATION DES ENFANTS (DERNIÈRE NAISSANCE)

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
	NOM DE LA DERNIÈRE NAISSANCE _____	NUMÉRO HISTORIQUE DES NAISSANCES <input type="text"/> <input type="text"/>	
511A	(NOM) a-t-il/elle reçu des vaccins pour éviter de contracter des maladies, y compris des vaccins reçus au cours de campagnes ou de journées de vaccination ou de journées de la santé de l'enfant ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 525A
512A	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin du BCG contre la tuberculose, c'est-à-dire une injection dans le bras ou à l'épaule qui laisse habituellement une cicatrice ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
513A	Est-ce que dans les 24 heures après la naissance, (NOM) a reçu le vaccin de l'hépatite B, c'est-à-dire une injection dans la cuisse pour éviter l'hépatite B ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
514A	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin oral contre la polio, c'est-à-dire deux gouttes dans la bouche pour éviter la polio ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 517A
515A	Est-ce que (NOM) a reçu le premier vaccin oral contre la polio dans les deux premières semaines après sa naissance ou plus tard ?	DEUX PREMIÈRES SEMAINES 1 PLUS TARD 2	
516A	Combien de fois (NOM) a-t-il/elle reçu le vaccin oral contre la polio ?	NOMBRE DE FOIS <input type="text"/>	
517A	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin Pentavalent c'est-à-dire une injection dans la cuisse, donné parfois en même temps que les gouttes du vaccin contre la polio ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 519A
518A	Combien de fois (NOM) a-t-il/elle reçu le vaccin Pentavalent ?	NOMBRE DE FOIS <input type="text"/>	

SECTION 5A. VACCINATION DES ENFANTS (DERNIÈRE NAISSANCE)

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
	NOM DE LA DERNIÈRE NAISSANCE _____	NUMÉRO HISTORIQUE DES NAISSANCES <input type="text"/> <input type="text"/>	
519A	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin contre le pneumocoque, c'est-à-dire une injection dans la cuisse pour éviter la pneumonie ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 521A
520A	Combien de fois (NOM) a-t-il/elle reçu le vaccin contre le pneumocoque ?	NOMBRE DE FOIS <input type="text"/>	
521A	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin contre le rotavirus, c'est-à-dire un liquide dans la bouche pour éviter la diarrhée ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 523A
522A	Combien de fois (NOM) a-t-il/elle reçu le vaccin contre le rotavirus ?	NOMBRE DE FOIS <input type="text"/>	
523A	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin contre la rougeole, c'est-à-dire une injection dans le bras pour lui éviter la rougeole ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 525A
524A	Combien de fois (NOM) a-t-il/elle reçu le vaccin contre la rougeole ?	NOMBRE DE FOIS <input type="text"/>	
525A	Au cours des sept derniers jours, a-t-on donné à (NOM) : a) UN MÉLANGE EN POUDRE DE MICRONUTRIMENTS ? b) PLUMPY'NUTS ? c) PLUMPY'DOZ ?	OUI NON NSP a) POUDRE 1 2 8 b) PLUMPY NUTS 1 2 8 c) PLUMPY DOZ 1 2 8	
526A	CONTINUEZ AVEC 501B.		

SECTION 5B. VACCINATION DES ENFANTS (AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE)

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
501B	VÉRIFIEZ 215 DANS L'HISTORIQUE DES NAISSANCES: D'AUTRES NAISSANCES EN 2015-2018? D'AUTRES NAISSANCES EN 2015-2018 <input type="checkbox"/>	PLUS DE NAISSANCE EN 2015-2018 <input type="checkbox"/>	601
502B	INSCRIVEZ LE NOM ET LE NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES DE 212 DE L'AVANT-DERNIER ENFANT NÉ EN 2015-2018. NOM DE L'AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE _____ NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES <input type="text"/> <input type="text"/>		
503B	VÉRIFIEZ 216 POUR ENFANT ENFANT: VIVANT <input type="checkbox"/>	DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/>	→ 526B
504B	Avez-vous un carnet ou un autre document où les vaccinations de (NOM) sont inscrites ?	OUI, A SEULEMENT UN CARNET 1 OUI, A SEULEMENT UN AUTRE DOCUMENT .. 2 OUI, A UN CARNET ET UN AUTRE DOCUMENT .. 3 NON, PAS DE CARNET ET PAS D'AUTRE DOCUMENT 4	→ 507B → 507B
505B	Avez-vous déjà eu un carnet de vaccination pour (NOM) ?	OUI 1 NON 2	
506B	VÉRIFIEZ 504B: CODE '2' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/>	CODE '4' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/>	→ 511B
507B	Puis-je voir le carnet ou un autre document sur lequel les vaccinations de (NOM) sont inscrites ?	OUI, SEULEMENT CARNET VU 1 OUI, SEULEMENT AUTRE DOCUMENT VU 2 OUI, CARNET ET AUTRE DOCUMENT VUS 3 NI CARNET NI AUTRE DOCUMENT VUS 4	→ 511B

SECTION 5B. VACCINATION DES ENFANTS (AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE)

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
	NOM DE L'AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE _____	NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES <input type="text"/> <input type="text"/>	
511B	(NOM) a-t-il/elle reçu des vaccins pour éviter de contracter des maladies, y compris des vaccins reçus au cours de campagnes ou de journées de vaccination ou de journées de la santé de l'enfant ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 525B
512B	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin du BCG contre la tuberculose, c'est-à-dire une injection dans le bras ou à l'épaule qui laisse habituellement une cicatrice ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
513B	Est-ce que dans les 24 heures après la naissance, (NOM) a reçu le vaccin de l'hépatite B, c'est-à-dire une injection dans la cuisse pour éviter l'hépatite B ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
514B	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin oral contre la polio, c'est-à-dire deux gouttes dans la bouche pour éviter la polio ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 517B
515B	Est-ce que (NOM) a reçu le premier vaccin oral contre la polio dans les deux premières semaines après sa naissance ou plus tard ?	DEUX PREMIÈRES SEMAINES 1 PLUS TARD 2	
516B	Combien de fois (NOM) a-t-il/elle reçu le vaccin oral contre la polio ?	NOMBRE DE FOIS <input type="text"/>	
517B	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin Pentavalent c'est-à-dire une injection dans la cuisse, donné parfois en même temps que les gouttes du vaccin contre la polio ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 519B
518B	Combien de fois (NOM) a-t-il/elle reçu le vaccin Pentavalent ?	NOMBRE DE FOIS <input type="text"/>	

SECTION 5B. VACCINATION DES ENFANTS (AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE)

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
	NOM DE L'AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE _____	NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES <input type="text"/> <input type="text"/>	
519B	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin contre le pneumocoque, c'est-à-dire une injection dans la cuisse pour éviter la pneumonie ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 521B
520B	Combien de fois (NOM) a-t-il/elle reçu le vaccin contre le pneumocoque ?	NOMBRE DE FOIS <input type="text"/>	
521B	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin contre le rotavirus, c'est-à-dire un liquide dans la bouche pour éviter la diarrhée ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 523B
522B	Combien de fois (NOM) a-t-il/elle reçu le vaccin contre le rotavirus ?	NOMBRE DE FOIS <input type="text"/>	
523B	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin contre la rougeole, c'est-à-dire une injection dans le bras pour lui éviter la rougeole ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 525B
524B	Combien de fois (NOM) a-t-il/elle reçu le vaccin contre la rougeole ?	NOMBRE DE FOIS <input type="text"/>	
525B	Au cours des sept derniers jours, a-t-on donné à (NOM) a) UN MÉLANGE EN POUDRE DE MICRONUTRIMENTS ? b) PLUMPY'NUTS ? c) PLUMPY'DOZ ?	OUI NON NSP a) POUDRE 1 2 8 b) PLUMPY NUTS 1 2 8 c) PLUMPY DOZ 1 2 8	
526B	VÉRIFIEZ 215 DANS L'HISTORIQUE DES NAISSANCES: D'AUTRES NAISSANCES EN 2015-2018? <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>AUTRES NAISSANCES EN 2015-2018 <input type="checkbox"/></p> <p>(ALLEZ À 502B DANS UN QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE) ←</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>PAS D'AUTRES NAISSANCES EN 2015-2018 <input type="checkbox"/></p> </div> </div>		→ 601

SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

601	VÉRIFIEZ 224: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> UNE NAISSANCE OU PLUS EN 2013-2018 <input type="checkbox"/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> AUCUNE NAISSANCE EN 2013-2018 <input type="checkbox"/> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">→ 648</div>		
602	VÉRIFIEZ 215: INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES À 603 ET LE NOM ET L'ÉTAT DE SURVIE À 604 POUR CHAQUE NAISSANCE EN 2013-2018. POSEZ LES QUESTIONS SUR TOUTES CES NAISSANCES. COMMENCEZ PAR LA DERNIÈRE NAISSANCE. S'IL Y A PLUS DE NAISSANCES, UTILISEZ LA DERNIÈRE COLONNE D'UN/DES QUESTIONNAIRES ADDITIONNEL(S). Je voudrais maintenant vous poser des questions sur vos enfants nés dans les cinq dernières années. (Nous parlerons d'un enfant à la fois).		
603	NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES DE 212 DANS L'HISTORIQUE DES NAISSANCES	DERNIÈRES NAISSANCE NUMÉRO L'HISTORIQUE DES NAISSANCES <input type="text"/> <input type="text"/>	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NUMÉRO L'HISTORIQUE DES NAISSANCES <input type="text"/> <input type="text"/>
604	DE 212 ET 216:	NOM _____ VIVANT <input type="checkbox"/> DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 646) ←	NOM _____ VIVANT <input type="checkbox"/> DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 646) ←
605	Au cours des six derniers mois, a-t-on donné à (NOM) une dose de vitamine A comme [celle-ci/l'une de celles-ci] ? MONTREZ DES MODÈLES COURANTS AMPOULES/GÉLULES/SIROP.	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8
606	Au cours des sept derniers jours, a-t-on donné à (NOM) des comprimés de fer, des granules ou du sirop contenant du fer comme [celui-ci/l'un de ceux-ci] ? MONTREZ DES MODÈLES COURANTS DE COMPRIMÉS, GRANULES OU	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8
607	Au cours des six derniers mois, a-t-on donné à (NOM) des médicaments contre les vers intestinaux ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8
608	(NOM) a-t-il eu la diarrhée au cours des deux dernières semaines ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 (ALLEZ À 618) ←	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 (ALLEZ À 618)

SECTION 6.SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE		AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE	
		NOM _____		NOM _____	
609	<p>VÉRIFIEZ 469: ALLAITÉ ACTUELLEMENT</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON/ <input type="checkbox"/> PAS POSÉ </p> <p>a) Je voudrais maintenant savoir quelle quantité de liquides a été donnée à (NOM) pendant la diarrhée, y compris le lait maternel. Lui a-t-on donné à boire moins que d'habitude, environ la même quantité ou plus que d'habitude ?</p> <p>SI MOINS, INSISTEZ : Lui a-t-on donné à boire beaucoup moins que d'habitude ou un peu moins ?</p>	<p>b) Je voudrais maintenant savoir quelle quantité de liquides a été donnée à (NOM) pendant la diarrhée. Lui a-t-on donné à boire moins que d'habitude, environ la même quantité ou plus que d'habitude ?</p> <p>SI MOINS, INSISTEZ : Lui a-t-on donné à boire beaucoup moins que d'habitude ou un peu moins ?</p>	<p>BEAUCOUP MOINS 1</p> <p>UN PEU MOINS 2</p> <p>ENVIRON LA MÊME QUANTITÉ .. 3</p> <p>PLUS 4</p> <p>RIEN À BOIRE 5</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>	<p>BEAUCOUP MOINS 1</p> <p>UN PEU MOINS 2</p> <p>ENVIRON LA MÊME QUANTITÉ .. 3</p> <p>PLUS 4</p> <p>RIEN À BOIRE 5</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>	
610	<p>Quand (NOM) avait la diarrhée, lui a-t-on donné à manger moins que d'habitude, environ la même quantité, plus que d'habitude ou rien à manger ?</p> <p>SI MOINS, INSISTEZ : Lui a-t-on donné à manger beaucoup moins que d'habitude ou un peu moins ?</p>	<p>BEAUCOUP MOINS 1</p> <p>UN PEU MOINS 2</p> <p>ENVIRON LA MÊME QUANTITÉ .. 3</p> <p>PLUS 4</p> <p>A ARRÊTÉ LA NOURRITURE .. 5</p> <p>N'A JAMAIS DONNÉ À MANGER 6</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>	<p>BEAUCOUP MOINS 1</p> <p>UN PEU MOINS 2</p> <p>ENVIRON LA MÊME QUANTITÉ .. 3</p> <p>PLUS 4</p> <p>A ARRÊTÉ LA NOURRITURE 5</p> <p>N'A JAMAIS DONNÉ À MANGER 6</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>		
611	<p>Avez-vous recherché des conseils ou un traitement pour la diarrhée ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p style="text-align: right;">(ALLEZ À 615) ←</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p style="text-align: right;">(ALLEZ À 615) ←</p>		

SECTION 6.SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____		
612	<p>Où êtes-vous allée pour rechercher des conseils ou un traitement ?</p> <p>Quelque part ailleurs ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____</p> <p>(NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL DU GOUVERNEMENT A</p> <p>CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT B</p> <p>POSTE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT C</p> <p>CLINIQUE MOBILE D</p> <p>AGENT DE SANTÉ E</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ F</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ G</p> <p>PHARMACIE H</p> <p>MÉDECIN PRIVÉ I</p> <p>CLINIQUE MOBILE J</p> <p>AGENT DE SANTÉ K</p> <p>AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ L</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE SOURCE</p> <p>BOUTIQUE M</p> <p>PRATICIEN TRADITIONNEL N</p> <p>MARCHÉ O</p> <p>VENDEUR DE MÉDICAMENTS ITINÉRANTS P</p> <p>AUTRE _____ X</p> <p>(PRÉCISEZ)</p>	<p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL DU GOUVERNEMENT A</p> <p>CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT B</p> <p>POSTE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT C</p> <p>CLINIQUE MOBILE D</p> <p>AGENT DE SANTÉ E</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ F</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ G</p> <p>PHARMACIE H</p> <p>MÉDECIN PRIVÉ I</p> <p>CLINIQUE MOBILE J</p> <p>AGENT DE SANTÉ K</p> <p>AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ L</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE SOURCE</p> <p>BOUTIQUE M</p> <p>PRATICIEN TRADITIONNEL N</p> <p>MARCHÉ O</p> <p>VENDEUR DE MÉDICAMENTS ITINÉRANTS P</p> <p>AUTRE _____ X</p> <p>(PRÉCISEZ)</p>		
613	VÉRIFIEZ 612:	<p>DEUX CODES OU PLUS ENCERCLÉ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>↓</p>	<p>SEULEMENT UN CODE ENCERCLÉ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>←</p> <p>(ALLEZ À 615)</p>	<p>DEUX CODES OU PLUS ENCERCLÉS</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>↓</p>	<p>SEULEMENT UN CODE ENCERCLÉ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>←</p> <p>(ALLEZ À 615)</p>
614	<p>Où êtes-vous allée en premier pour rechercher des conseils ou un traitement ?</p> <p>UTILISEZ LES CODES LETTRES DE 612.</p>	<p>PREMIER ENDROIT <input type="checkbox"/></p>	<p>PREMIER ENDROIT <input type="checkbox"/></p>		

SECTION 6.SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE			AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE				
		NOM _____			NOM _____				
615	<p>Avez-vous donné à (NOM) les choses suivantes à n'importe quel moment dès qu'il/elle a commencé à avoir la diarrhée :</p> <p>a) Un liquide préparé à partir d'un sachet SRO ?</p> <p>b) Un liquide SRO préconditionné ?</p> <p>c) Un liquide maison recommandé par le gouvernement ?</p> <p>d) Du zinc, en comprimés ou en sirop ?</p>	<p>a) LIQUIDE SACHET SRO ... 1 2 8</p> <p>b) LIQUIDE SRO ... 1 2 8</p> <p>c) LIQUIDE MAISON ... 1 2 8</p> <p>d) ZINC 1 2 8</p>	OUI	NON	NSP	<p>a) LIQUIDE SACHET SRO 1 2 8</p> <p>b) LIQUIDE SRO 1 2 8</p> <p>c) LIQUIDE MAISON 1 2 8</p> <p>d) ZINC 1 2 8</p>	OUI	NON	NSP
616	<p>VÉRIFIEZ 615:</p> <p>UN 'OUI' <input type="checkbox"/> TOUT 'NON' OU 'NSP' <input type="checkbox"/></p> <p>a) A-t-on donné quelque chose d'autre pour traiter la diarrhée ?</p> <p>b) A-t-on donné quelque chose pour traiter la diarrhée ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p> <p>(ALLEZ À 618) ←</p>				<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p> <p>(ALLEZ À 618) ←</p>			
617	<p>VÉRIFIEZ 615:</p> <p>UN 'OUI' <input type="checkbox"/> TOUT 'NO' OU 'NSP' <input type="checkbox"/></p> <p>a) Qu'a t-on donné d'autre pour traiter la diarrhée ?</p> <p>b) Qu'a t-on donné pour traiter la diarrhée ?</p> <p>Rien d'autre ?</p> <p>ENREGISTREZ TOUS LES</p>	<p>COMPRIMÉ OU SIROP</p> <p>ANTIBIOTIQUE A</p> <p>ANTIMOTILITÉ B</p> <p>ANTIPARASITAIRE C</p> <p>AUTRE (NON ANTIBIOTIQUE OU ANTIMOTILITÉ) D</p> <p>COMPRIMÉ OU SIROP INCONNU E</p> <p>INJECTION</p> <p>ANTIBIOTIQUE F</p> <p>NON-ANTIBIOTIQUE G</p> <p>INJECTION INCONNUE H</p> <p>(IV) INTRAVEINEUSE I</p> <p>REMÈDE MAISON/ HERBES MÉDICINALES J</p> <p>AUTRE _____ X</p> <p>(PRÉCISEZ)</p>				<p>COMPRIMÉ OU SIROP</p> <p>ANTIBIOTIQUE A</p> <p>ANTIMOTILITÉ B</p> <p>ANTIPARASITAIRE C</p> <p>AUTRE (NON ANTIBIOTIQUE OU ANTIMOTILITÉ) D</p> <p>COMPRIMÉ OU SIROP INCONNU E</p> <p>INJECTION</p> <p>ANTIBIOTIQUE F</p> <p>NON-ANTIBIOTIQUE G</p> <p>INJECTION INCONNUE H</p> <p>(IV) INTRAVEINEUSE I</p> <p>REMÈDE MAISON/ HERBES MÉDICINALES J</p> <p>AUTRE _____ X</p> <p>(PRÉCISEZ)</p>			
618	<p>Est-ce que (NOM) a eu de la fièvre à n'importe quel moment au cours des 2 dernières semaines ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p> <p>(ALLEZ À 620) ←</p>				<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p> <p>(ALLEZ À 620) ←</p>			
619	<p>À n'importe quel moment au cours de sa maladie, est-ce qu'on a pris à (NOM) du sang de son doigt ou de son talon ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>				<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>			
620	<p>Est-ce que (NOM) a eu de la toux à n'importe quel moment au cours des 2 dernières semaines ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>				<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>			
621	<p>Est-ce que (NOM) a eu un souffle court et rapide ou avait-il/elle des difficultés pour respirer à n'importe quel moment au cours des 2 dernières semaines ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p> <p>(ALLEZ À 623) ←</p>				<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p> <p>(ALLEZ À 623) ←</p>			

SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE		AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE	
		NOM _____		NOM _____	
622	Est-ce que ce souffle rapide ou ces difficultés pour respirer étaient dus à un problème de bronche ou à un nez bouché ou qui coulait ?	BRANCHE SEULEMENT 1 NEZ SEULEMENT 2 LES DEUX 3 AUTRE 6 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 8 (ALLEZ À 624) ←		BRANCHE SEULEMENT 1 NEZ SEULEMENT 2 LES DEUX 3 AUTRE 6 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 8 (ALLEZ À 624) ←	
623	VÉRIFIEZ 618: A EU DE LA FIÈVRE ?	OUI <input type="checkbox"/> NON OU NSP <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 646) ←		OUI <input type="checkbox"/> NON OU NSP <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 646) ←	
624	Avez-vous recherché des conseils ou un traitement pour la maladie ?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 629) ←		OUI 1 NON 2 (ALLEZ À TO 629) ←	
625	Où êtes-vous allée pour rechercher des conseils ou un traitement ? Quelque part ailleurs ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT. _____ (NOM DE L'ENDROIT)	SECTEUR PUBLIC HÔPITAL DU GOUVT. GOUVERNEMENT A CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. B POSTE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. C CLINIQUE MOBILE D AGENT DE SANTÉ/ AGENT COMMUNAUTAIRE .. E AUTRE SECTEUR PUBLIC F (PRÉCISEZ) SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ G PHARMACIE H MÉDECIN PRIVÉ I CLINIQUE MOBILE J AGENT DE SANTÉ/ COMMUNAUTAIRE K AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ L (PRÉCISEZ) AUTRE SOURCE BOUTIQUE M PRATICIEN TRADITIONNEL N MARCHÉ O VENDEUR DE MÉDICAMENTS ITINÉRANTS P AUTRE X (PRÉCISEZ)		SECTEUR PUBLIC HÔPITAL DU GOUVT. GOUVERNEMENT A CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. B POSTE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. C CLINIQUE MOBILE D AGENT DE SANTÉ/ AGENT COMMUNAUTAIRE .. E AUTRE SECTEUR PUBLIC F (PRÉCISEZ) SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ G PHARMACIE H MÉDECIN PRIVÉ I CLINIQUE MOBILE J AGENT DE SANTÉ/ COMMUNAUTAIRE K AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ L (PRÉCISEZ) OTHER SOURCE BOUTIQUE M PRATICIEN TRADITIONNEL N MARCHÉ O VENDEUR DE MÉDICAMENTS ITINÉRANTS P AUTRE X (PRÉCISEZ)	
626	VÉRIFIEZ 625:	DEUX CODES OU PLUS ENCERCLÉS <input type="checkbox"/> ↓ SEULEMENT UN CODE ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 628) ←		DEUX CODES OU PLUS ENCERCLÉS <input type="checkbox"/> ↓ SEULEMENT UN CODE ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 628) ←	

SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE		AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE	
		NOM _____		NOM _____	
627	Où êtes-vous allée en premier pour rechercher des conseils ou un traitement ? UTILISEZ LES CODES LETTRES DE 625.	PREMIER ENDROIT <input type="text"/>		PREMIER ENDROIT <input type="text"/>	
628	Combien de jours après le début de la maladie, avez-vous recherché des conseils ou un traitement pour (NOM) ? SI MÊME JOUR, INSCRIRE '00'.	JOURS <input type="text"/> <input type="text"/>		JOURS <input type="text"/> <input type="text"/>	
629	Est-ce qu'à n'importe quel moment au cours de la maladie, (NOM) a pris des médicaments pour la maladie ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 (ALLEZ À 646) ←		OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8 (ALLEZ À 646) ←	
630	Quels médicaments (NOM) a-t-il/elle pris ? Aucun autre médicament ? INSCRIVEZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	ANTIPALUDIQUES COMBINAISON THÉRAPEUTIQUE À BASE D'ARTÉMISININE (CTA) .. A CHLOROQUINE B COMPRIMÉS QUININE C INJECTION/IV D ARTESUNATE VOIE RECTALE E INJECTION/IV F AUTRE ANTIPALUDIQUE G _____ (PRÉCISEZ) ANTIBIOTIQUES COMPRIMÉS/SIROP H INJECTION/IV I AUTRES MÉDICAMENTS ASPIRINE J ACETAMINOPHEN K IBUPROFEN L AUTRE X _____ (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS Z		ANTIPALUDIQUES COMBINAISON THÉRAPEUTIQUE À BASE D'ARTÉMISININE (CTA) .. A CHLOROQUINE B COMPRIMÉS QUININE C INJECTION/IV D ARTESUNATE VOIE RECTALE E INJECTION/IV F AUTRE ANTIPALUDIQUE G _____ (PRÉCISEZ) ANTIBIOTIQUES COMPRIMÉS/SIROP H INJECTION/IV I AUTRES MÉDICAMENTS ASPIRINE J ACETAMINOPHEN K IBUPROFEN L AUTRE X _____ (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS Z	
631	VÉRIFIEZ 630: Y A-T-IL UN CODE A-I ENCELRÉ?	OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 646) ←		OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 646) ←	

SECTION 6.SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE		AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE	
		NOM _____	NOM _____	NOM _____	NOM _____
632	VÉRIFIEZ 630: COMBINAISON THÉRAPEUTIQUE À BASE D'ARTÉMISININE ('A') DONNÉE	CODE 'A' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓	CODE 'A' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓ (ALLEZ À 636) ←	CODE 'A' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓	CODE 'A' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓ (ALLEZ À 636) ←
633	Combien de temps après le début de la fièvre, (NOM) a-t-il/elle commencé à prendre une combinaison à base d'artémisinine ?	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8
636	VÉRIFIEZ 630: CHLOROQUINE ('C') DONNÉE	CODE 'B' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓	CODE 'B' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓ (ALLEZ À 640) ←	CODE 'B' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓	CODE 'B' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓ (ALLEZ À 640) ←
637	Combien de temps après le début de la fièvre, (NOM) a-t-il/elle commencé à prendre de la Chloroquine ?	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8

SECTION 6.SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE		AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE	
		NOM _____		NOM _____	
640	VÉRIFIEZ 630: QUININE ('C' OU 'D') DONNÉE	CODE 'C' OU 'D' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/>	CODE 'C' OU 'D' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 642) ←	CODE 'C' OU 'D' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/>	CODE 'C' OU 'D' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 642) ←
641	Combien de temps après le début de la fièvre, (NOM) a-t-il/elle commencé à prendre de la quinine ?	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8
642	VÉRIFIEZ 630: ARTESUNATE ('E' OU 'F') DONNÉ	CODE 'E' OU 'F' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/>	CODE 'E' OU 'F' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 644) ←	CODE 'E' OU 'F' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/>	CODE 'E' OU 'F' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 644) ←
643	Combien de temps après le début de la fièvre, (NOM) a-t-il/elle commencé à prendre de l'artésunate ?	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8
644	VÉRIFIEZ 630: AUTRE ANTIPALUDIQUE ('G') DONNÉ	CODE 'G' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/>	CODE 'G' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 646) ←	CODE 'G' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/>	CODE 'G' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 646) ←
645	Combien de temps après le début de la fièvre, (NOM) a-t-il/elle commencé à prendre un (AUTRE ANTIPALUDIQUE) ?	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	MÊME JOUR 0 JOUR SUIVANT 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8
646		RETOURNEZ À 604 À LA COLONNE SUIVANTE; OU S'IL N'Y A PLUS DE NAISSANCES, ALLEZ À 647.		RETOURNEZ À 604 À L'AVANT-DERNIÈRE COLONNE DU NOUVEAU QUESTIONNAIRE; OU S'IL N'Y A PLUS DE NAISSANCES, ALLEZ À 647.	

SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT NUTRITION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
647	VÉRIFIEZ 615(a) ET 615(b), TOUTES LES AUCUN ENFANT <input type="checkbox"/> N'A REÇU DE LIQUIDE DE SACHET SRO OU DE LIQUIDE SRO PRÉCONDITIONNÉ	UN ENFANT <input type="checkbox"/> A REÇU DU LIQUIDE D'UN SACHET SRO OU DU LIQUIDE SRO PRÉCONDITIONNÉ	→ 649
648	Avez-vous entendu parler d'un produit spécial DES SACHETS SRO OU DES LIQUIDES SRO PRÉCONDITIONNÉS que vous pouvez obtenir pour le traitement de la diarrhée ?	OUI 1 NON 2	
649	VÉRIFIEZ 215 ET 218, TOUTES LES LIGNES: NOMBRE D'ENFANTS NÉS EN 2016-2018 VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉE UN OU PLUS <input type="checkbox"/> ↓ (NOM DU PLUS JEUNE ENFANT VIVANT AVEC ELLE) ↓	AUCUN <input type="checkbox"/>	→ 701

SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT NUTRITION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES			ALLEZ À	
650	<p>Je voudrais maintenant vous poser des questions sur les liquides et aliments que (NOM DE 649) a consommés hier pendant le jour ou la nuit. J'aimerais, en particulier, savoir si votre enfant a reçu le liquide ou l'aliment que je vais citer, même s'il était mélangé avec d'autres nourritures.</p>		OUI	NON	NSP	
	a) De l'eau ?	a)	1	2	8	
	b) Des jus ou des boissons à base de jus ?	b)	1	2	8	
	c) Du bouillon ?	c)	1	2	8	
	<p>d) Du lait tel que du lait en boîte, en poudre ou du lait frais d'animal ? SI OUI : Combien de fois (NOM) a -t-il/elle bu du SI 7 FOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '7'.</p>	d)	1	2	8	
	<p>e) Du lait en poudre pour bébé ? SI OUI : Combien de fois (NOM) a -t-il/elle bu du lait en poudre pour bébé ? SI 7 FOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '7'.</p>	e)	1	2	8	
	f) D'autres liquides ?	f)	1	2	8	
	<p>g) Du yaourt ? SI OUI : Combien de fois (NOM) a-t-il/elle mangé du yaourt ? SI 7 FOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '7'.</p>	g)	1	2	8	
	h) Une préparation (nourriture fortifiée pour bébé) comme Cerelac, Farigalia, Babylac, Nutrilac, Bledine, etc. ?	h)	1	2	8	
	i) Du pain, du riz, des pâtes, bouillie d'avoine ou autres préparations à base de céréales ?	i)	1	2	8	
	j) Des citrouilles, carottes, courges ou pommes de terre douces qui sont jaunes ou oranges à l'intérieur ?	j)	1	2	8	
	k) Des pommes de terre blanches, ignames blanches, manioc, cassava, ou préparations à base de tubercules ?	k)	1	2	8	
	l) Des légumes à feuilles vert foncé ?	l)	1	2	8	

SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT NUTRITION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
	m) Des mangues, papayes mûres, jujube, ou soumpou ?	m) 1 2 8	
	n) D'autres fruits ou légumes ?	n) 1 2 8	
	o) Du foie, rognons, coeur ou autres abats ?	o) 1 2 8	
	p) De la viande, de boeuf, de porc, d'agneau, de chèvre, du poulet ou du canard ?	p) 1 2 8	
	q) Des oeufs ?	q) 1 2 8	
	r) Du poisson frais ou séché ou des crustacés ?	r) 1 2 8	
	s) N'importe quelle préparation à base de haricots, pois, lentilles ou noix ?	s) 1 2 8	
	t) Du fromage ou d'autres produits laitiers ?	t) 1 2 8	
	ta) Des collations sucrées (chocolats, bonbons, gâteaux, pâtisseries, sucettes ou biscuits sucrés) ?	ta) 1 2 8	
	tb) Des boissons gazeuses ?	tb) 1 2 8	
	tc) Des collations salées (chips ou biscuits salés) ?	tb) 1 2 8	
	u) N'importe quelle préparation à base d'aliments solides, semi solides, ou mous ?	u) 1 2 8	
651	VÉRIFIEZ 650 (CATÉGORIES 'g' À 'u'): PAS UN SEUL 'OUI' <input type="checkbox"/> AU MOINS UN 'OUI' <input type="checkbox"/>		→ 653
652	Est-ce que hier durant le jour ou la nuit (NOM DE 649) a mangé des aliments solides, semi solides ou mous ? SI 'OUI' INSISTEZ : Quel type d'aliments solide, semi solide ou mou (NOM) a-t-il/elle mangé ?	OUI 1 (RETOURNEZ À 650 POUR INSCRIRE LES ALIMENTS (PUIS CONTINUEZ AVEC 653) NON 2	→ 654
653	Combien de fois (NOM DE 649) a-t-il/elle mangé des aliments solides, semi solides ou mous hier durant le jour ou la nuit ? SI 7 FOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '7'.	NOMBRE DE FOIS <input type="text"/> NE SAIT PAS 8	
654	La dernière fois que (NOM DE 649) est allé aux toilettes, qu'avez-vous fait des excréments ?	ENFANT A UTILISÉ TOILETTES OU LATRIN 01 A JETÉ/RINSÉ DANS TOILETTES OU LATRINES 02 A JETÉ/RINSÉ DANS ÉGOUT OU CANIVEAU 03 A JETÉ AUX ORDURES 04 A ENTERRÉ 05 A LAISSÉ À L'AIR LIBRE 06 AUTRE 96 (PRÉCISEZ)	

SECTION 7. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
701	Êtes-vous actuellement mariée ou vivez-vous avec un homme comme si vous étiez mariée ?	OUI, ACTUELLEMENT MARIÉ..... 1 OUI, VIT AVEC UN HOMME 2 NON, PAS EN UNION 3	→ 704
702	Avez-vous déjà été mariée ou avez-vous déjà vécu avec un homme comme si vous étiez mariée ?	OUI, A ÉTÉ MARIÉE..... 1 OUI, A VÉCU AVEC UN HOMME 2 NON 3	→ 712
703	Quel est votre état matrimonial actuel : êtes-vous veuve, divorcée ou séparée ?	VEUVE 1 DIVORCÉE 2 SÉPARÉE 3	→ 709
704	Est-ce que votre (mari/partenaire) vit actuellement avec vous ou vit-il ailleurs ?	VIT AVEC ELLE 1 VIT AILLEURS 2	
705	ENREGISTREZ LE NOM ET No DE LIGNE DU MARI/PARTENAIRE DU QUESTIONNAIRE MÉNAGE. S'IL N'EST PAS LISTÉ DANS LE QUESTIONNAIRE MÉNAGE, INSCRIVEZ '00'.	NOM _____ No LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/>	
706	Est-ce que votre (mari/partenaire) a d'autres épouses ou vit-il avec d'autres femmes comme s'il était marié ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 709
707	En tout, y compris vous-même, combien a-t-il d'épouses ou de partenaires avec qui il vit comme s'il était marié ?	NOMBRE TOTAL D'ÉPOUSES ET DE FEMMES AVEC QUI IL VIT COMME MARIÉ <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98	
708	Êtes-vous la première, deuxième, ... épouse ?	RANG <input type="text"/> <input type="text"/>	
709	Avez-vous été mariée ou avez-vous vécu avec un homme une seule fois ou plus d'une fois ?	SEULEMENT UNE FOIS..... 1 PLUS D'UNE FOIS 2	
710	VÉRIFIEZ 709: MARIÉE/ A VÉCU AVEC UN HOMME SEULEMENT <input type="checkbox"/> UNE FOIS ↓ a) En quel mois et quelle année avez-vous commencé à vivre avec votre (mari/partenaire) ? MARIÉE/ A VÉCU AVEC UN HOMME PLUS <input type="checkbox"/> D'UNE FOIS ↓ b) Je voudrais maintenant vous parler de votre premier (mari/partenaire). En quel mois et quelle année avez-vous commencé à vivre avec lui ?	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> NE CONNAÎT PAS LE MOIS 98 ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NE CONNAÎT PAS L'ANNÉE 9998	→ 712
711	Quel âge aviez-vous quand vous avez commencé à vivre avec lui pour la première fois ?	ÂGE <input type="text"/> <input type="text"/>	

SECTION 7. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
712	VÉRIFIEZ LA PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES. AVANT DE CONTINUER, FAITES TOUT VOTRE POSSIBLE POUR VOUS TROUVER EN PRIVÉ.		
713	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur votre activité sexuelle pour mieux comprendre certains aspects importants de la vie. Je voudrais vous assurer de nouveau que vos réponses sont absolument confidentielles et qu'elles ne seront divulguées à personne. S'il arrivait que je pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, dites-le moi et je passerai à la question suivante. Quel âge aviez-vous quand vous avez eu, pour la première fois, des rapports sexuels ?	N'A JAMAIS EU DE RAPPORTS SEXUELS 00 ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/>	→ 731
713A	Quel âge avait votre partenaire?	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98	
713B	Aviez-vous utilisé un préservatif (masculin ou féminin)?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
714	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur votre activité sexuelle récente. Quand avez-vous eu des rapports sexuels pour la dernière fois ? SI MOINS DE 12 MOIS, LA RÉPONSE DOIT ÊTRE ENREGISTRÉE EN JOURS, SEMAINES OU MOIS. SI 12 MOIS (UNE ANNÉE) OU PLUS, LA RÉPONSE DOIT ÊTRE ENREGISTRÉE EN ANNÉES.	IL Y A DES JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A DES SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A DES MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A DES ANNÉES 4 <input type="text"/> <input type="text"/>	→ 716 → 727

SECTION 7. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

		DERNIER PARTENAIRE SEXUEL	AVANT-DERNIER PARTENAIRE SEXUEL	AVANT-AVANT-DERNIER PARTENAIRE SEXUEL
715	Quand avez-vous eu des rapports sexuels avec cette personne pour la dernière fois ?		IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINE 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/>	IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINE 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/>
716	La dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels avec cette personne, un condom a-t-il été utilisé ?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 718) ←	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 718) ←	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 718) ←
717	Un condom a-t-il été utilisé chaque fois que vous avez eu des rapports sexuels avec cette personne au cours des 12 derniers mois ?	OUI 1 NON 2	OUI 1 NON 2	OUI 1 NON 2
718	Quelle était votre relation avec cette personne avec qui vous avez eu des rapports sexuels ? SI PETIT AMI : Viviez-vous ensemble comme si vous étiez mariés ? SI OUI, ENCERCLEZ '2' SI NON, ENCERCLEZ '3'	MARI 1 PARTENAIRE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉE .. 2 PETIT AMI NE VIVANT PAS AVEC L'ENQUÊTÉE 3 RENCONTRE OCCASIONNELLE .. 4 CLIENT/PROSTITUÉE .. 5 AUTRE 6 (PRÉCISEZ)	MARI 1 PARTENAIRE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉE .. 2 PETIT AMI NE VIVANT PAS AVEC L'ENQUÊTÉE 3 RENCONTRE OCCASIONNELLE .. 4 CLIENT/PROSTITUÉE .. 5 AUTRE 6 (PRÉCISEZ)	MARI 1 PARTENAIRE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉE .. 2 PETIT AMI NE VIVANT PAS AVEC L'ENQUÊTÉE 3 RENCONTRE OCCASIONNELLE .. 4 CLIENT/PROSTITUÉE .. 5 AUTRE 6 (PRÉCISEZ)
719	Il y a combien de temps que vous avez eu vos premiers rapports sexuels avec cette personne ?	IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A ANNÉES 4 <input type="text"/> <input type="text"/>	IL Y A JOURS . 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A ANNÉES 4 <input type="text"/> <input type="text"/>	IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A ANNÉES 4 <input type="text"/> <input type="text"/>

SECTION 7. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

		DERNIER PARTENAIRE SEXUEL	AVANT-DERNIER PARTENAIRE SEXUEL	AVANT-AVANT-DERNIER PARTENAIRE SEXUEL
720	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous eu des rapports sexuels avec cette personne ? DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION. SI LE NOMBRE DE FOIS EST 95 OU PLUS, INSCRIVEZ '95'.	NOMBRE DE FOIS <input type="text"/> <input type="text"/>	NOMBRE DE FOIS <input type="text"/> <input type="text"/>	NOMBRE DE FOIS <input type="text"/>
721	Quel âge a cette personne ?	ÂGE DU PARTENAIRE <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98	ÂGE DU PARTENAIRE <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98	ÂGE DU PARTENAIRE <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98
722	À part cette personne, avez-vous eu des rapports sexuels avec une autre personne au cours des 12 derniers mois ?	OUI 1 (RETOURNEZ À 715 À COL. SUIVANTE) NON 2 (ALLEZ À 724)	OUI 1 (RETOURNEZ À 715 À COL. SUIVANTE) NON 2 (ALLEZ À 724)	
723	En tout, avec combien de personnes différentes avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois ? DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION. SI LE NOMBRE DE FOIS EST 95 OU PLUS, INSCRIVEZ '95'.			NOMBRE DE PARTENAIRE DANS LES 12 DERNIERS MOIS .. <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98

SECTION 7. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
724	VÉRIFIEZ 106: ÂGE 15-24 <input type="checkbox"/>	ÂGE 25-49 <input type="checkbox"/>	→ 727
725	VÉRIFIEZ 701: PAS EN UNION <input type="checkbox"/>	ACTUELLEMENT MARIÉE/ VIT AVEC UN HOMME <input type="checkbox"/>	→ 727
726	Au cours des 12 derniers mois avez-vous eu des rapports sexuels avec quelqu'un ou une relation sexuelle suivie avec quelqu'un parce qu'il vous a donné ou vous a dit qu'il vous donnerait des cadeaux, de l'argent, ou autre chose ?	OUI 1 NON 2	
727	En tout, durant votre vie, avec combien de personnes différentes avez-vous eu des rapports sexuels ? DANS LE CAS D'UNE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION. SI LE NOMBRE DE PARTENAIRES EST 95 OU PLUS, INSCRIVEZ '95'.	NOMBRE DE PARTENAIRES DANS LA VIE <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98	
728	VÉRIFIEZ 716, PARTENAIRE LE PLUS RÉCENT (PREMIÈRE COLONNE): OUI, <input type="checkbox"/> CONDOM A ÉTÉ UTILISÉ ↓	NON, <input type="checkbox"/> CONDOM N'A PAS ÉTÉ UTILISÉ QUESTION <input type="checkbox"/> NON POSÉE	→ 731 → 731
729	Vous avez dit que la dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels, un condom avait été utilisé. Quelle était la marque du condom utilisée cette fois là ? SI LA MARQUE N'EST PAS CONNUE, DEMANDEZ À VOIR L'EMBALLAGE.	PROTEC 01 FAGAROU 02 VISA 03 MANIX 04 PRESA 05 KAMA SUTR/ 06 PROTEX 07 INNOTEX 08 CASANOVA 09 INTIMY 10 CONTEX 11 STAR 12 TROJAM 13 FEMIDON 14 AUTRE 96 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 98	

SECTION 7. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
730	<p>Où vous étiez-vous procuré le condom la dernière fois ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____</p> <p>(NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL GOUV. 11</p> <p>CENTRE SANTÉ GOUV. 12</p> <p>POSTE SANTÉ 13</p> <p>CENTRE DE PF GOUV. 14</p> <p>MATERNITÉ RURALE 15</p> <p>CASE DE SANTÉ 16</p> <p>PHARMACIE COMMUNAUTAIRE 17</p> <p>STRAT. AVANCÉE/EQU. MOBILE 18</p> <p>AUTRE PUBLIC 19</p> <p>_____</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE/CABINET 21</p> <p>PRIVÉ 22</p> <p>PHARMACIE 23</p> <p>MÉDECIN PRIVÉ 24</p> <p>DISPENSARE RELIG 25</p> <p>AUTRE MEDICAL PRIVÉ 26</p> <p>_____</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE SOURCE</p> <p>BOUTIQUE 31</p> <p>ÉGLISE 32</p> <p>PARENTS/AMIS 33</p> <p>BAR 34</p> <p>AUTRE 96</p> <p>_____</p> <p>(PRÉCISEZ)</p>	
730A	<p>Au cours des 12 derniers mois, vous a-t-on donné des préservatifs ? (ex: lors d'une campagne d'information, dans un centre d'accueil ou un établissement de santé ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p>	
731	<p>PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES DANS CETTE SECTION</p>	<p>..... OUI NON</p> <p>ENFANTS <10 1 2</p> <p>HOMMES ADULTES 1 2</p> <p>FEMMES ADULTES 1 2</p>	

SECTION 8. PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
801	VÉRIFIEZ 304: NI LUI, NI ELLE <input type="checkbox"/> STÉRILISÉ ↓	IL OU ELLE <input type="checkbox"/> STÉRILISÉ	→ 813
802	VÉRIFIEZ 226: ENCEINTE <input type="checkbox"/> ↓	PAS ENCEINTE <input type="checkbox"/> OU PAS SÛRE	→ 804
803	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Après l'enfant que vous attendez maintenant, souhaiteriez-vous un autre enfant ou préféreriez-vous ne plus en avoir ?	AVOIR UN AUTRE ENFANT' 1 N'EN VEUT PAS D'AUTRE 2 INDÉCISE/NE SAIT PAS 8	→ 805 → 812
804	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Voudriez-vous avoir (un/un autre) enfant ou préféreriez-vous ne pas (plus) avoir d'enfant ?	AVOIR (UN/UN AUTRE) ENFANT 1 PAS D'AUTRE/AUCUN 2 DIT QU'ELLE NE PEUT PAS TOMBER ENCEINTE' .. 3 INDÉCISE/NE SAIT PAS 8	→ 807 → 813 → 811
805	VÉRIFIEZ 226: PAS ENCEINTE <input type="checkbox"/> OU PAS SÛRE ↓ ENCEINTE <input type="checkbox"/> ↓ a) Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissance (d'un/un autre) enfant ? b) Après la naissance de l'enfant que vous attendez, combien de temps voudriez-vous attendre avant la naissance d'un autre enfant ?	MOIS 1 ANNÉES 2 BIENTÔT/MAINTENANT' 993 DIT QU'ELLE NE PEUT PAS TOMBER ENCEINTE' .. 994 APRÈS LE MARIAG 995 AUTRE 996 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 998	→ 811 → 813 → 811
806	VÉRIFIEZ 226: PAS ENCEINTE <input type="checkbox"/> OU PAS SÛRE ↓	ENCEINTE <input type="checkbox"/>	→ 812
807	VÉRIFIEZ 303: UTILISE UNE MÉTHODE CONTRACEPTIVE? N'UTILISE PAS <input type="checkbox"/> ACTUELLEMENT ↓	UTILISE ACTUELLEMENT <input type="checkbox"/>	→ 813
808	VÉRIFIEZ 805: '24' MOIS OU PLUS <input type="checkbox"/> OU '02' ANNÉES OU PLUS ↓ PAS POSÉE <input type="checkbox"/> ↓ '00-23' MOIS <input type="checkbox"/> OU '00-01' ANNÉE		→ 812
809	VÉRIFIEZ 714: IL Y A DES JOURS, SEMAINES OU MOIS ↓	IL Y A DES ANNÉES <input type="checkbox"/> PAS POSÉE <input type="checkbox"/>	→ 811 → 811

SECTION 8. PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
810	<p>VÉRIFIEZ 804:</p> <p>VEUT AVOIR UN/ UN AUTRE ENFANT <input type="checkbox"/></p> <p>a) Vous avez dit que dans l'immédiat, vous ne souhaitiez pas (un/un autre) enfant. Pouvez-vous me dire pourquoi vous n'utilisez pas une méthode pour éviter une grossesse ?</p> <p>PAS D'AUTRE/ AUCUN <input type="checkbox"/></p> <p>b) Vous avez dit que vous ne souhaitiez pas (plus) d'enfant. Pouvez-vous me dire pourquoi vous n'utilisez pas une méthode pour éviter une grossesse ?</p> <p>REGISTREZ TOUTES LES RAISONS MENTIONNÉES</p>	<p>PAS MARIÉE A</p> <p>RAISONS RELATIVES À LA FÉCONDITÉ</p> <p>PAS DE RAPPORTS SEXUELS B</p> <p>RAP. SEXUELS PEU FRÉQUENTS C</p> <p>MÉNOPAUSEL/HYSTÉRECTOMIE D</p> <p>NE PEUT PAS TOMBER ENCEINTE E</p> <p>PAS DE RÉGLES DEPUIS DERNIÈRE NAISSANCE F</p> <p>ALLAITE G</p> <p>FATALISTE H</p> <p>OPPOSITION À L'UTILISATION</p> <p>ENQUÊTÉE OPPOSÉE I</p> <p>MARI/PARTENAIRE OPPOSÉ J</p> <p>AUTRES OPPOSÉS K</p> <p>INTERDITS RELIGIEUX L</p> <p>MANQUE DE CONNAISSANCE</p> <p>NE CONNAÎT AUCUNE MÉTHODE M</p> <p>NE CONNAÎT AUCUN ENDROIT N</p> <p>RAISONS LIÉES À LA MÉTHODE</p> <p>EFFETS SECONDAIRES/ PROBLÈMES DE SANTÉ O</p> <p>PAS ACCESSIBLE/TROP ÉLOIGNÉ P</p> <p>TROP CHER Q</p> <p>MÉTHODE PRÉFÉRÉE NON DISPONIBLE R</p> <p>AUCUNE MÉTHODE DISPONIBLE S</p> <p>PAS PRATIQUE À UTILISER T</p> <p>INTERFÈRE AVEC LES FONCTIONS NORMALES DU CORPS U</p> <p>AUTRE _____ X (PRÉCISEZ)</p> <p>NE SAIT PAS Z</p>	
811	<p>VÉRIFIEZ 303: UTILISE UNE MÉTHODE CONTRACEPTIVE ?</p> <p>PAS <input type="checkbox"/> NON, N'UTILISE <input type="checkbox"/> POSÉE PAS ACTUELLEMENT UTILISE ACTUELLEMENT</p> <p>OUI, <input type="checkbox"/> → 813</p>		
812	<p>Pensez-vous que vous utiliserez, à un certain moment dans le futur, une méthode contraceptive pour retarder ou éviter une grossesse ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>	
813	<p>VÉRIFIEZ 216:</p> <p>A DES ENFANTS <input type="checkbox"/> VIVANTS</p> <p>a) Si vous pouviez revenir à l'époque où vous n'aviez pas d'enfant et que vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien auriez-vous voulu en avoir ?</p> <p>AUCUN ENFANT <input type="checkbox"/> VIVANT</p> <p>b) Si vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien en voudriez-vous ?</p> <p>INSISTEZ POUR OBTENIR UNE RÉPONSE NUMÉRIQUE</p>	<p>AUCUN 00 → 815</p> <p>NOMBRE <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>AUTRE _____ 96 → 815 (PRÉCISEZ)</p>	
814	<p>Parmi ces enfants, combien souhaiteriez-vous de garçons, combien souhaiteriez-vous de filles et pour combien d'entre eux, le sexe n'aurait-il pas d'importance ?</p>	<p>GARÇONS FILLES PEU IMPORTE</p> <p>NOMBRE .. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)</p>	

SECTION 8. PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
815	Au cours des derniers mois, avez-vous : a) Entendu parler de la planification familiale à la radio ? b) Vu quelque chose sur la planification familiale à la télévision ? c) Lu quelque chose sur la planification familiale dans un journal ou magazine ? d) Reçu un message vocal ou un texte sur la planification familiale sur votre portable ?	OUI NON a) RADIO 1 2 b) TÉLÉVISION 1 2 c) JOURNAL OU MAGAZINE 1 2 d) TÉLÉPHONE PORTABLE 1 2	
816	Au cours des derniers mois, avez-vous entendu parler de la planification familiale lors des campagnes Moytou Neff?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
817	VÉRIFIEZ 701: OUI, ACTUELLEMENT MARIÉE <input type="checkbox"/> OUI, VIT AVEC UN HOMME <input type="checkbox"/> NON, PAS EN UNION <input type="checkbox"/>		→ 901
818	VÉRIFIEZ 303: UTILISE UNE MÉTHODE CONTRACEPTIVE ? UTILISE ACTUELLEMENT <input type="checkbox"/> N'UTILISE PAS ACTUELLEMENT <input type="checkbox"/> PAS POSÉE <input type="checkbox"/>		→ 820 → 822
819	Diriez-vous que l'utilisation de la contraception est principalement votre décision, principalement celle de votre (mari/partenaire) ou est-ce une décision commune que vous avez prise ensemble ?	DÉCISION DE L'ENQUÊTÉ 1 DÉCISION DU MARI/PARTENAIRE 2 DÉCISION COMMUNE 3 AUTRE 6 (PRÉCISEZ)	→ 821
820	Diriez-vous que le fait de ne pas utiliser la contraception est principalement votre décision, principalement celle de votre (mari/partenaire) ou est-ce une décision commune que vous avez prise ensemble ?	DÉCISION DE L'ENQUÊTÉ 1 DÉCISION DU MARI/PARTENAIRE 2 DÉCISION COMMUNE 3 AUTRE 6 (PRÉCISEZ)	
821	VÉRIFIEZ 304: NI LUI, NI ELLE STÉRILISÉ <input type="checkbox"/> IL OU ELLE STÉRILISÉ <input type="checkbox"/>		→ 901
822	Est-ce que votre (mari/partenaire) veut le même nombre d'enfants que vous ou en veut-il plus ou moins que vous ?	MÊME NOMBRE 1 PLUS D'ENFANTS 2 MOINS D'ENFANTS 3 NE SAIT PAS 8	

SECTION 9. CARACTÉRISTIQUES DU MARI ET TRAVAIL DE LA FEMME

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
901	VÉRIFIEZ 701: ACTUELLEMENT MARIÉE/ <input type="checkbox"/> VIT AVEC UN HOMME <input type="checkbox"/>	PAS EN UNION <input type="checkbox"/>	→ 909
902	Quel âge avait votre (mari/partenaire) à son dernier anniversaire ?	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES <input type="text"/>	
903	Est-ce que votre (mari/partenaire) a fréquenté l'école ?	OUI 1 NON 2	→ 906
904 (1)	Quel est le plus haut niveau d'étude qu'il a atteint: primaire, secondaire ou supérieur ?	PRIMAIRE 1 MOYEN 2 SECONDAIRE 3 SUPÉRIEUR 4 NE SAIT PAS 8	→ 906
905 (1)	Quelle est la [CLASSE/ANNÉE] la plus élevée qu'il a achevée à ce niveau ? SI MOINS D'1 CLASSE/ANNÉE A ÉTÉ ACHEVÉE À CE NIVEAU, INSCRIVEZ '00'.	[CLASSE/ANNÉE] <input type="text"/> NE SAIT PAS 98	
906	Est-ce que votre (mari/partenaire) a effectué un travail au cours des 7 derniers jours ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 908
907	Est-ce que votre (mari/partenaire) a effectué un travail au cours des 12 derniers mois ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 909
908	Quelle est l'occupation de votre(mari/ partenaire) ? C'est-à-dire quel genre de travail fait-il principalement ?	_____ _____ _____ <input type="text"/>	
909	En dehors de votre travail domestique, avez-vous travaillé au cours des sept derniers jours ?	OUI 1 NON 2	→ 913
910	Comme vous le savez, certaines femmes font un travail pour lequel elles sont payées en argent ou en nature. Certaines ont un petit commerce ou une petite affaire ou travaillent sur les terres ou dans l'affaire de la famille. Au cours des sept derniers jours, avez-vous fait quelque chose de ce genre ou un autre travail ?	OUI 1 NON 2	→ 913
911	Bien que vous n'ayez pas travaillé au cours des sept derniers jours, est-ce que vous avez un travail ou une affaire dont vous avez dû vous absenter pour vacances, maladie, maternité ou pour une autre raison ?	OUI 1 NON 2	→ 913
912	Avez-vous fait un travail quelconque au cours des 12 derniers mois ?	OUI 1 NON 2	→ 917
913	Quelle est votre occupation? C'est-à-dire quel genre de travail faites-vous principalement ?	_____ _____ _____ <input type="text"/>	

SECTION 9. CARACTÉRISTIQUES DU MARI ET TRAVAIL DE LA FEMME

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
914	Faites-vous ce travail pour un membre de votre famille, pour quelqu'un d'autre ou êtes-vous à votre compte ?	MEMBRE DE LA FAMILLE 1 QUELQU'UN D'AUTRE 2 À SON COMPTE 3	
915	Travaillez-vous habituellement toute l'année, ou de manière saisonnière ou travaillez-vous seulement de temps en temps ?	TOUTE L'ANNÉE 1 SAISONNIER/PARTIE DE L'ANNÉE 2 DE TEMPS EN TEMPS 3	
916	Êtes-vous payée en argent ou en nature pour ce travail ou n'êtes-vous pas payée du tout ?	ARGENT SEULEMENT 1 ARGENT ET NATURE 2 NATURE SEULEMENT 3 PAS PAYÉE 4	
917	VÉRIFIEZ 701: ACTUELLEMENT MARIÉE/VIT AVEC UN HOMME <input type="checkbox"/> ↓	PAS EN UNION <input type="checkbox"/> →	925
918	VÉRIFIEZ 916: CODE '1' OU '2' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓	AUTRE <input type="checkbox"/> →	921
919	Habituellement, qui décide comment l'argent que vous gagnez va être utilisé : c'est vous, votre (mari/partenaire), ou conjointement vous et votre (mari/partenaire) ?	ENQUÊTÉE 1 MARI/PARTENAIRE 2 CONJOINTEMENT ENQUÊTÉE ET MARI/PARTENAIRE 3 AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ)	
920	Diriez-vous que vous gagnez plus que votre (mari/partenaire), moins ou à peu près la même chose ?	PLUS QUE LUI 1 MOINS QUE LUI 2 À PEU PRÈS LA MÊME CHOSE 3 MARI/PARTENAIRE N'A PAS DE REVENUS 4 NE SAIT PAS 8	922
921	Habituellement, qui décide comment l'argent que votre (mari/partenaire) gagne va être utilisé : vous, votre (mari/partenaire), ou conjointement vous et votre (mari/partenaire) ?	ENQUÊTÉE 1 MARI/PARTENAIRE 2 CONJOINTEMENT ENQUÊTÉE ET MARI/PARTENAIRE 3 MARI/PARTENAIRE N'A PAS DE REVENUS 4 AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ)	
922	Habituellement, qui prend les décisions en ce qui concerne vos propres soins de santé : vous, votre (mari/partenaire), conjointement vous et votre (mari/partenaire) ou quelqu'un d'autre ?	ENQUÊTÉE 1 MARI/PARTENAIRE 2 CONJOINTEMENT ENQUÊTÉE ET MARI/PARTENAIRE 3 QUELQU'UN D'AUTRE 4 AUTRE 6	
923	Qui prend habituellement les décisions concernant les achats importants pour le ménage ?	ENQUÊTÉE 1 MARI/PARTENAIRE 2 CONJOINTEMENT ENQUÊTÉE ET MARI/PARTENAIRE 3 QUELQU'UN D'AUTRE 4 AUTRE 6	

SECTION 9. CARACTÉRISTIQUES DU MARI ET TRAVAIL DE LA FEMME

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À																								
924	Qui prend habituellement les décisions concernant les visites à votre famille ou parents ?	ENQUÊTÉE 1 MARI/PARTENAIRE 2 CONJOINTEMENT ENQUÊTÉE ET MARI/PARTENAIRE 3 QUELQU'UN D'AUTRE 4 AUTRE 6																									
925	Est-ce que vous possédez cette maison ou une autre maison seule ou conjointement avec quelqu'un d'autre ?	SEULE SEULEMENT 1 CONJOINTEMENT SEULEMEI..... 2 SEULE ET CONJOINTEMENT 3 N'EN POSSÈDE PAS 4	→ 928																								
926	Avez-vous un acte de propriété pour une maison que vous possédez ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 928																								
927	Est-ce que votre nom figure sur l'acte de propriété ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8																									
928	Est-ce que vous possédez de la terre agricole ou non agricole, seule ou conjointement avec quelqu'un d'autre ?	SEULE SEULEMENT 1 CONJOINTEMENT SEULEMEI..... 2 SEULE ET CONJOINTEMENT 3 N'EN POSSÈDE PAS 4	→ 931																								
929	Avez-vous un acte de propriété pour une terre que vous possédez ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 931																								
930	Est-ce que votre nom figure sur l'acte de propriété ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8																									
931	PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES À CE POINT DE L'INTERVIEW (PERSONNES PRÉSENTES ET QUI ÉCOUTENT, PRÉSENTES MAIS QUI N'ÉCOUTENT PAS OU PAS PRÉSENTES).	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>PRES./ PRES./ N'ÉCOUTE ÉCOUTE.</th> <th>PAS PAS.</th> <th>PAS PRES.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENFANTS < 10</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>MARI</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>AUTRES HOMMES</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>AUTRES FEMMES</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		PRES./ PRES./ N'ÉCOUTE ÉCOUTE.	PAS PAS.	PAS PRES.	ENFANTS < 10	1	2	3	MARI	1	2	3	AUTRES HOMMES	1	2	3	AUTRES FEMMES	1	2	3					
	PRES./ PRES./ N'ÉCOUTE ÉCOUTE.	PAS PAS.	PAS PRES.																								
ENFANTS < 10	1	2	3																								
MARI	1	2	3																								
AUTRES HOMMES	1	2	3																								
AUTRES FEMMES	1	2	3																								
932	<p>Selon vous, est-il justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes :</p> <p>a) Si elle sort sans le lui dire ?</p> <p>b) Si elle néglige les enfants ?</p> <p>c) Si elle argumente avec lui ?</p> <p>d) Si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui ?</p> <p>e) Si elle brûle la nourriture ?</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>OUI</th> <th>NON</th> <th>NSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) SORT SANS LE LUI DIRE</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>b) NÉGLIGE LES ENFANTS</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>c) ARGUMENTE</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>d) REFUSE RAP. SEXUELS</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>e) BRÛLE NOURRITURE</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		OUI	NON	NSP	a) SORT SANS LE LUI DIRE	1	2	8	b) NÉGLIGE LES ENFANTS	1	2	8	c) ARGUMENTE	1	2	8	d) REFUSE RAP. SEXUELS	1	2	8	e) BRÛLE NOURRITURE	1	2	8	
	OUI	NON	NSP																								
a) SORT SANS LE LUI DIRE	1	2	8																								
b) NÉGLIGE LES ENFANTS	1	2	8																								
c) ARGUMENTE	1	2	8																								
d) REFUSE RAP. SEXUELS	1	2	8																								
e) BRÛLE NOURRITURE	1	2	8																								

SECTION 11. AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À															
1101	<p>Je voudrais maintenant vous poser d'autres questions concernant des problèmes de santé. Au cours des 12 derniers mois, vous a-t-on fait une injection pour une raison quelconque ?</p> <p>SI OUI: Combien d'injections avez-vous eu ? SI LE NOMBRE D'INJECTIONS EST DE 90 OU PLUS OU SI LES INJECTIONS ÉTAIENT QUOTIDIENNES PENDANT 3 MOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '90'. DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION.</p>	<p>NOMBRE D'INJECTIONS <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>AUCUNE 00</p>	→ 1108															
1102	<p>Parmi ces injections, combien ont été effectuées par un médecin, une infirmière, un pharmacien, un dentiste ou un autre personnel de santé ?</p> <p>SI LE NOMBRE D'INJECTIONS EST DE 90 OU PLUS OU SI LES INJECTIONS ÉTAIENT QUOTIDIENNES PENDANT 3 MOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '90'. DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION.</p>	<p>NOMBRE D'INJECTIONS <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>AUCUNE 00</p>	→ 1108															
1103	<p>La dernière fois que vous avez eu une injection effectuée du personnel de santé, est-ce qu'il/elle a pris la seringue et l'aiguille d'un emballage neuf qui n'avait pas été ouvert ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>																
1108	<p>Différentes raisons peuvent empêcher les femmes d'obtenir un avis médical ou de se faire soigner. Quand vous êtes malade et que vous voulez un avis médical ou un traitement, est-ce que chacune des raisons suivantes constitue, pour vous, un problème important ou non:</p> <p>a) Obtenir la permission d'aller voir un médecin ?</p> <p>b) Obtenir l'argent nécessaire pour le conseil ou le traitement ?</p> <p>c) La distance pour atteindre l'établissement de santé ?</p> <p>d) Ne pas vouloir y aller seule ?</p>	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>PROBLÈME IMPORTANT</th> <th>PAS UN PROBLÈME IMPORTANT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) PERMISSION</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>b) OBTENIR L'ARGENT.....</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>c) DISTANCE</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>d) ALLER SEULE</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		PROBLÈME IMPORTANT	PAS UN PROBLÈME IMPORTANT	a) PERMISSION	1	2	b) OBTENIR L'ARGENT.....	1	2	c) DISTANCE	1	2	d) ALLER SEULE	1	2	
	PROBLÈME IMPORTANT	PAS UN PROBLÈME IMPORTANT																
a) PERMISSION	1	2																
b) OBTENIR L'ARGENT.....	1	2																
c) DISTANCE	1	2																
d) ALLER SEULE	1	2																
1108A	<p>Les femmes peuvent parfois avoir, en permanence, le jour et la nuit, un problème de pertes urinaires ou fécales par le vagin. Ce problème survient généralement à la suite d'un accouchement difficile, mais il peut aussi se produire après une agression sexuelle ou après une opération du pelvis.</p> <p>Avez-vous déjà eu, en permanence, durant le jour et la nuit, des pertes urinaires ou fécales par le vagin?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p>	→ 1108C															
1108B	<p>A quel âge ce problème a commencé ?</p>	<p>ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES <input type="text"/> <input type="text"/></p>	→ 1201															
1108C	<p>Avez-vous déjà entendu parler de ce problème ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p>																

SECTION 12. EXCISION

N°.	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSEZ À
1201	Avez-vous déjà entendu parler de l'excision ?	OUI 1 NON 2	→ 1203
1202	Dans certains pays, il existe une pratique qui consiste à couper une partie des organes génitaux externes des filles. Avez-vous déjà entendu parler de cette pratique ?	OUI 1 NON 2	→ 1301
1203	Vous-même, avez-vous été excisée ?	OUI 1 NON 2	→ 1209
1204	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur ce qui vous a été fait à ce moment-là. Vous a-t-on retiré des chairs de la zone génitale ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 1206
1205	Vous a-t-on seulement entaillé les parties génitales sans enlever de chairs ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
1206	Vous a-t-on fermé la zone génitale par une couture ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
1207	Quel âge aviez-vous quand on vous a excisée ? SI L'ENQUÊTÉE NE CONNAÎT PAS L'ÂGE EXACT, ESSAYEZ D'EN OBTENIR UNE ESTIMATION.	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES <input type="text"/> <input type="text"/> EN TANT QUE BÉBÉ/ PENDANT L'ENFANCE 95 NE SAIT PAS 98	
1208	Qui a procédé à votre excision ?	EXCISEUSE TRADITIONNELLE ... 11 MATRONE/ACCOUCHEUSE TRAD. 12 AUTRE TRADITIONNEL 16 (PRÉCISEZ)	
1209	VÉRIFIEZ 213, 215 ET 216 : A AU MOINS UNE FILLE VIVANTE <input type="checkbox"/> NÉE EN 2002 OU PLUS TARD ↓ N'A AUCUNE FILLE VIVANTE <input type="checkbox"/> NÉE EN 2002 OU PLUS TARD		→ 1216

<p>VÉRIFIEZ 213, 215 ET 216: INSCRIVEZ DANS LE TABLEAU LE NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES ET LE NOM DE CHAQUE FILLE VIVANTE NÉE EN 2001 OU PLUS TARD. POSEZ LES QUESTIONS POUR TOUTES CES FILLES. COMMENCEZ PAR LA PLUS JEUNE. (S'IL Y A PLUS DE 6 FILLES, UTILISEZ DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES).</p> <p>Je voudrais maintenant vous poser des questions sur (votre/vos filles) .</p>				
1210	<p>NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES ET NOM DE CHAQUE FILLE VIVANTE NÉE EN 2001 OU PLUS TARD.</p>	<p>FILLE VIVANTE LA PLUS JEUNE</p> <p>(1^{ère} FILLE LA PLUS JEUNE)</p> <p>NUMÉRO HISTORIQUE NAISSANCES <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NOM _____</p>	<p>AVANT-DERNIÈRE FILLE VIVANTE LA PLUS JEUNE</p> <p>(2^e FILLE LA PLUS JEUNE)</p> <p>NUMÉRO HISTORIQUE NAISSANCES <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NOM _____</p>	<p>AVANT AVANT-DERNIÈRE FILLE VIVANTE LA PLUS JEUNE (3^e FILLE LA PLUS JEUNE)</p> <p>NUMÉRO HISTORIQUE NAISSANCES <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NOM _____</p>
1211	<p>Est-ce que (NOM DE LA FILLE) est excisée ?</p>	<p>OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 1211 ←) À LA COLONNE SUIVANTE OU SI PLUS DE FILLES ALLEZ À 1216)</p>	<p>OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 1211 ←) À LA COLONNE SUIVANTE OU SI PLUS DE FILLES ALLEZ À 1216)</p>	<p>OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 1211 ←) À LA PREMIÈRE COLONNE DU NOUVEAU QUESTIONNAIRE; OU S'IL N'Y A PLUS DE FILLES ALLEZ À 1216)</p>
1212	<p>Quel âge avait (NOM DE LA FILLE) quand elle a été excisée ?</p> <p>SI L'ENQUÊTÉE NE CONNAÎT PAS L'ÂGE, ESSAYEZ D'EN OBTENIR UNE ESTIMATION.</p>	<p>ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES . <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NE SAIT PAS 98</p>	<p>ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES . <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NE SAIT PAS 98</p>	<p>ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES . <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NE SAIT PAS 98</p>
1213	<p>Lui a-t-on fermé la zone génitale par une couture ?</p> <p>INSISTEZ : la zone génitale a-t-été fermée ?</p>	<p>OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8</p>	<p>OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8</p>	<p>OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8</p>
1214	<p>Qui a procédé à l'excision de votre fille ?</p>	<p>EXCISEUSE TRADITION. . . . 11 MATRONE/ ACCOUCHEUSE TRADITION. . . . 12 AUTRE TRAD. _____ 16 (PRÉCISEZ)</p> <p>NE SAIT PAS 98</p>	<p>EXCISEUSE TRADITION. . . . 11 MATRONE/ ACCOUCHEUSE TRADITION. . . . 12 AUTRE TRAD. _____ 16 (PRÉCISEZ)</p> <p>NE SAIT PAS 98</p>	<p>EXCISEUSE TRADITION. . . . 11 MATRONE/ ACCOUCHEUSE TRADITION. . . . 12 AUTRE TRAD. _____ 16 (PRÉCISEZ)</p> <p>NE SAIT PAS 98</p>
1215		<p>RETOURNEZ À 1211 À LA COLONNE SUIVANTE OU S'IL N'Y A PLUS DE FILLES, ALLEZ À 1216.</p>	<p>RETOURNEZ À 1211 À LA COLONNE SUIVANTE OU S'IL N'Y A PLUS DE FILLES, ALLEZ À 1216.</p>	<p>RETOURNEZ À 1211 À LA COLONNE SUIVANTE DE LA PAGE SUIVANTE OU S'IL N'Y A PLUS DE FILLES, ALLEZ À 1216.</p>
1216	<p>Pensez-vous que l'excision est exigée par votre religion ?</p>		<p>OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8</p>	
1217	<p>Pensez-vous que l'excision est une pratique qui doit continuer ou qui doit être abandonnée ?</p>		<p>CONTINUER 1 ABANDONNER 2 CELA DÉPEND 3 NE SAIT PAS 8</p>	

SECTION 14 DEVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT

NO.	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSER À																
1401	VÉRIFIEZ 217 ET 218 : TOUT ENFANT DE 0-4 ANS VIVANT AVEC SA MÈRE ? OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>		→ 1500																
1402	VÉRIFIEZ 217 ET 218 : SÉLECTIONNEZ L'ENFANT LE PLUS JEUNE DE 0-4 VIVANT AVEC SA MÈRE ET ÉCRIVEZ LE NOM ET LE NUMÉRO DE LIGNE. NOM DE L'ENFANT LE PLUS JEUNE DE Q. 212 _____ NUMÉRO DE LA LIGNE DE L'ENFANT LE PLUS JEUNE DE Q.219 <input type="text"/> <input type="text"/>																		
1403	LISEZ À L'ENQUÊTÉE : Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur (NOM DE L'ENFANT DE 1402), votre enfant le plus jeune de 0-4 ans vivant avec vous.																		
1404	Combien de livres d'enfants ou de livres d'images avez-vous pour (NOM) ?	AUCUN 00 NOMBRE DE LIVRES D'ENFANT <input type="text" value="0"/> <input type="text"/> DIX LIVRES OU PLUS 10																	
1405	Je voudrais savoir quels objets (NOM) utilise pour jouer quand il/elle est à la maison. Est-ce qu'il/elle joue avec : a) Des jouets fabriqués à la maison (comme des poupées, voitures ou autres jouets fabriqués à la maison) ? b) Des jouets d'un magasin ou des jouets d'un fabricant ? c) Objets du ménage (comme des bassines, casseroles), ou des objets trouvés dehors (comme des bâtons, pierres, animaux, coquilles ou feuilles) ? SI L'ENQUÊTÉ(E) DIT "OUI" À UNE DES CATÉGORIES CI-DESSUS, INSISTEZ POUR SAVOIR PRÉCISÉMENT AVEC QUOI L'ENFANT JOUE POUR ÊTRE SÛR DE LA RÉPONSE.	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>OUI</th> <th>NON</th> <th>NSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) JOUETS FABRIQUÉ À LA MAISON</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>b) JOUETS DE MAGASIN</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>c) OBJETS DU MÉNAGE OU OBJETS DU DEHORS</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		OUI	NON	NSP	a) JOUETS FABRIQUÉ À LA MAISON	1	2	8	b) JOUETS DE MAGASIN	1	2	8	c) OBJETS DU MÉNAGE OU OBJETS DU DEHORS	1	2	8	
	OUI	NON	NSP																
a) JOUETS FABRIQUÉ À LA MAISON	1	2	8																
b) JOUETS DE MAGASIN	1	2	8																
c) OBJETS DU MÉNAGE OU OBJETS DU DEHORS	1	2	8																
1406	Parfois les adultes qui s'occupent des enfants doivent quitter la maison pour aller faire des courses, faire la lessive, ou pour d'autres raisons et doivent laisser les jeunes enfants. Au cours de la semaine passée, combien de jours (NOM) a-t-il/elle été : a) Laisse seul(e) pendant plus d'une heure ? b) Laisse à la garde d'un autre enfant c'est-à-dire quelqu'un de moins de 10 ans, pendant plus d'une SI 'JAMAIS', INSCRIRE '0'. SI 'NE SAIT PAS', INSCRIRE '8'	a) NOMBRE DE JOURS LAISSÉ SEUL PENDANT PLUS D'UNE HEURE <input type="text"/> b) NOMBRE DE JOURS LAISSÉ AVEC UN ENFANT PENDANT PLUS D'UNE HEURE <input type="text"/>																	

1407	VÉRIFIEZ 217 : L'ÂGE DE L'ENFANT ENFANT DE 0, 1, <input type="checkbox"/> OU 2 ANS ENFANT DE 3 OU 4 ANS <input type="checkbox"/>	→ 1409																																			
1408	VÉRIFIEZ 217 ET 218 : TOUT ENFANT DE 3-4 ANS VIVANT AVEC SA MÈRE ? OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>	→ 1500																																			
1408A	VÉRIFIEZ 217 ET 218 : SÉLECTIONNEZ L'ENFANT LE PLUS JEUNE DE 3 OU 4 ANS VIVANT AVEC SA MÈRE ET ÉCRIVEZ LE NOM ET LE NUMÉRO DE LA LIGNE. NOM DE L'ENFANT LE PLUS JEUNE DE 3 OU 4 ANS DE Q.212 _____ NUMÉRO DE LA LIGNE DE L'ENFANT LE PLUS JEUNE DE 3 OU 4 ANS DE Q.219 <input type="text"/> <input type="text"/>																																				
1409	(NOM) suit-il/elle un programme d'apprentissage éducatif ou une classe d'éveil, dans un établissement public ou privé, y compris un jardin d'enfants ou une garderie communautaire ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8																																			
1410	Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (NOM) à l'une des activités suivantes : SI OUI, DEMANDEZ : Qui a participé à cette activité avec (NOM) ? ENCERCLEZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ. a) Lire des livres ou regarder des livres illustrés avec (NOM) ? b) Raconter des histoires a (NOM) ? c) Chanter des chansons a (NOM) ou avec (NOM), y compris des berceuses ? d) Emmener (NOM) en promenade en dehors de la maison, de la résidence, de la cour ou de l'enceinte ? e) Jouer avec (NOM) ? f) Nommer, compter, et/ou dessiner des choses pour ou avec (NOM) ?	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MÈRE</th> <th>PÈRE</th> <th>AUTRE</th> <th>PERS SON NE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) LIRE DES LIVRES</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>X</td> <td>Y</td> </tr> <tr> <td>b) RANCONTER DES HISTOIRES</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>X</td> <td>Y</td> </tr> <tr> <td>c) CHANTER DES CHANSONS</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>X</td> <td>Y</td> </tr> <tr> <td>d) PROMENER</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>X</td> <td>Y</td> </tr> <tr> <td>e) JOUER</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>X</td> <td>Y</td> </tr> <tr> <td>f) NOMMER/ COMPTER</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>X</td> <td>Y</td> </tr> </tbody> </table>		MÈRE	PÈRE	AUTRE	PERS SON NE	a) LIRE DES LIVRES	A	B	X	Y	b) RANCONTER DES HISTOIRES	A	B	X	Y	c) CHANTER DES CHANSONS	A	B	X	Y	d) PROMENER	A	B	X	Y	e) JOUER	A	B	X	Y	f) NOMMER/ COMPTER	A	B	X	Y
	MÈRE	PÈRE	AUTRE	PERS SON NE																																	
a) LIRE DES LIVRES	A	B	X	Y																																	
b) RANCONTER DES HISTOIRES	A	B	X	Y																																	
c) CHANTER DES CHANSONS	A	B	X	Y																																	
d) PROMENER	A	B	X	Y																																	
e) JOUER	A	B	X	Y																																	
f) NOMMER/ COMPTER	A	B	X	Y																																	
1411	Je voudrais maintenant vous poser quelques questions sur la sante et le développement de votre enfant. Les enfants ne se développent pas tous de manière identique et ils n'apprennent pas tous à la même vitesse. Certains, par exemple, marchent plus tôt que d'autres. Ces questions portent sur plusieurs aspects du développement de votre enfant. Est-ce que (NOM) connaît ou peut citer au moins dix lettres de l'alphabet ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8																																			
1412	Est-ce que (NOM) peut lire au moins quatre mots simples, courants ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8																																			
1413	Est-ce que (NOM) peut citer et reconnaître tous les chiffres de 1 à 10 ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8																																			
1414	Est-ce que (NOM) peut attraper par terre avec deux doigts un petit objet, comme un bâton ou un caillou ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8																																			
1415	Est-ce que (NOM) est parfois trop malade pour jouer ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8																																			

1416	Est-ce que (NOM) est capable de suivre de simples instructions sur comment faire quelque chose correctement ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
1417	Quand on donne quelque chose à faire à (NOM), est-il/elle capable de le faire de manière indépendante ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
1418	Est-ce que (NOM) s'entend bien avec les autres enfants ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
1419	Est-ce que (NOM) donne des coups de pieds, mord, ou frappe les autres enfants ou les adultes ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
1420	Est-ce que (NOM) est facilement distrait ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	

SECTION 15 VIOLENCE DOMESTIQUE (VD)

No.	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSEZ À
1500	VÉRIFIEZ LA PAGE DE COUVERTURE: MÉNAGE SÉLECTIONNÉE POUR LE MODULE VD ? MÉNAGE SÉLECTIONNÉE <input type="checkbox"/> POUR CETTE SECTION ↓ NON SÉLECTIONNÉE	MÉNAGE <input type="checkbox"/> NON SÉLECTIONNÉE	→ 1534
1501	VÉRIFIEZ LA PAGE DE COUVERTURE: FEMME SÉLECTIONNÉE POUR LE MODULE VD ? FEMME SÉLECTIONNÉE <input type="checkbox"/> POUR CETTE SECTION ↓ NON SÉLECTIONNÉE	FEMME <input type="checkbox"/> NON SÉLECTIONNÉE	→ 1534
1502	VÉRIFIEZ LA PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES: NE PAS CONTINUEZ TANT QUE VOUS N'ÊTES PAS CERTAINE D'ÊTRE EN PRIVÉ. VOUS ÊTES EN PRIVÉ 1 ↓ IMPOSSIBLE D'ÊTRE EN PRIVÉ 2		→ 1533
1502A	LISEZ À L'ENQUÊTÉE : Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions concernant certains autres aspects importants de la vie d'une femme. Vous allez trouver certaines de ces questions très personnelles. Cependant, vos réponses sont très importantes pour nous aider à connaître la condition des femmes au Sénégal. Je vous garantis que vos réponses resteront complètement confidentielles et qu'elles ne seront divulguées à personne. Je tiens aussi à vous assurer que personne d'autre que vous dans votre ménage ne saura que l'on vous a posé ces questions. S'il arrivait que je pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, dites-le moi et je passerai à la question suivante.		
1503	VÉRIFIEZ 701 ET 702: ACTUELLEMENT EN UNION/ VIVANT AVEC UN HOMME <input type="checkbox"/> ↓ PRÉCÉDEMMENT EN UNION/ A VÉCU AVEC UN HOMME (LISEZ AU PASSÉ ET UTILISEZ "DERNIER" AVEC MARI/PARTENAIRE) <input type="checkbox"/> ↓ JAMAIS EN UNION/ JAMAIS VÉCU AVEC UN HOMME <input type="checkbox"/>		→ 1517
1504	Tout d'abord, je vais vous poser des questions sur des situations auxquelles certaines femmes sont confrontées. Dites-moi, s'il vous plaît, si les situations suivantes s'appliquent à vos relations avec votre (dernier) (mari/partenaire) ? a) Il (est/était) jaloux ou en colère si vous (parlez/parliez) à d'autres hommes ? b) Il vous (accuse/accusait) souvent d'être infidèle ? c) Il ne vous (permet/permettait) pas de voir vos amies ? d) Il (essaye/essayait) de limiter vos contacts avec votre famille ? e) Il (insiste/insistait) pour savoir où vous (êtes/étiez) à tous moments ?	OUI NON NSP JALOUX 1 2 8 ACCUSE 1 2 8 VOIR AMIES 1 2 8 VOIR FAMILLE 1 2 8 OÙ VOUS ÊTES 1 2 8	
1505	Maintenant, je voudrais vous poser d'autres questions sur vos relations avec votre (dernier) (mari/partenaire). A. Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre (dernier) (mari/partenaire) : a) Vous dise ou fasse quelque chose pour vous humilier devant d'autres personnes ? b) Vous menace de vous blesser ou de vous faire du mal, vous ou quelqu'un qui vous est proche ? c) Vous insulte ou vous rabaisse ?	B. Combien de fois cela est-il arrivé au cours des 12 derniers mois : souvent, de temps en temps ou pas du tout ? DÉJÀ ARRIVÉ OUI NON ↓ OUI NON ↓ OUI NON ↓ OUI NON ↓	TEMPS EN PAS DANS 12 SOUVENT TEMPS DERNIERS MOIS → 1 2 3 → 1 2 3 → 1 2 3
1506	A. Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre (dernier) (mari/partenaire) vous ait fait l'une des choses suivantes :	B. Combien de fois cela est-il arrivé au cours des 12 derniers mois : souvent, de temps en temps ou pas du tout ?	

		DÉJÀ ARRIVÉ		TEMPS EN PAS DANS 12 TEMPS DERNIERS MOIS		
				SOUVENT		
	a) vous bouscule, secoue ou vous jette quelque chose ?	OUI NON	1 2	→ 1	2	3
	b) vous gifle ?	OUI NON	1 2	→ 1	2	3
	c) vous torde le bras ou vous tire les cheveux ?	OUI NON	1 2	→ 1	2	3
	d) vous frappe à coups de poings ou avec quelque chose qui pouvait vous blesser ?	OUI NON	1 2	→ 1	2	3
	e) vous donne des coups de pieds, vous traîne par terre ou vous batte ?	OUI NON	1 2	→ 1	2	3
	f) essaye de vous étrangler ou de vous brûler avec l'intention de le faire ?	OUI NON	1 2	→ 1	2	3
	g) vous menace ou vous attaque avec un couteau, un fusil ou une autre arme ?	OUI NON	1 2	→ 1	2	3
	h) vous force physiquement à avoir des rapports sexuels avec lui quand vous ne le vouliez pas ?	OUI NON	1 2	→ 1	2	3
	i) vous force physiquement à pratiquer d'autres actes sexuels que vous ne vouliez pas ?	OUI NON	1 2	→ 1	2	3
	j) vous force en vous menaçant ou d'une autre manière à pratiquer des actes sexuels que vous ne vouliez pas ?	OUI NON	1 2	→ 1	2	3
1507	VÉRIFIEZ VD05A (a-j): AU MOINS UN <input type="checkbox"/> 'OUI' PAS UN SEUL <input type="checkbox"/> 'OUI' → 1510					
1508	Combien de temps (après votre mariage/après avoir commencé à vivre) avec (dernier) (mari/partenaire), cet acte s'est-il produit ou ces actes se sont-ils produits pour la première fois ? SI MOINS D'UNE ANNÉE, INSCRIVEZ '00'.			NOMBRE D'ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/>		
				AVANT MARIAGE/AVANT VIVRE ENSEMBLE 95		
1509	Est-ce qu'à la suite d'actes commis envers vous par votre (dernier) (mari/partenaire), il vous est arrivé d'avoir :					
	a) des coupures, des hématomes ou des douleurs ?	OUI NON 1 2			
	b) des hématomes aux yeux, des entorses, des luxations ou des brûlures ?	OUI NON 1 2			
	c) des blessures profondes, des os cassés, des dents cassées ou d'autres blessures graves ?	OUI NON 1 2			
1510	Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de battre, de gifler, de donner des coups de pied ou de faire quelque chose d'autre avec l'intention de blesser physiquement votre (dernier) (mari/partenaire) alors qu'il ne vous battait pas et ne vous faisait pas de mal	OUI NON 1 2	→ 1512		
1511	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois vous est-il arrivé de faire cela à votre (dernier) (mari/partenaire) : souvent, de temps en temps ou pas du tout ?			SOUVENT 1 DE TEMPS EN TEMPS 2 PAS DU TOUT 3		
1512	Est-ce que votre (dernier) (mari/partenaire) boit (buvait) de l'alcool ?	OUI NON 1 2	→ 1514		
1513	Combien de fois lui arrive-t-il (lui est-il arrivé) d'être ivre : souvent, de temps en temps ou jamais ?			SOUVENT 1 DE TEMPS EN TEMPS 2 JAMAIS 3		

1514	Vous est-il arrivé d'avoir peur (d'avoir eu peur) de votre (dernier) (mari/partenaire) : de nombreuses fois, parfois ou jamais ?	DE NOMBREUSES FOIS 1 PARFOIS PEUR 2 JAMAIS PEUR 3		
1515	VÉRIFIEZ 709: MARIÉE PLUS D'UNE FOIS <input type="checkbox"/> MARIÉE SEULEMENT UNE FOIS <input type="checkbox"/>		→ 1517	
1516	A. Jusqu'ici, nous avons parlé du comportement de votre (actuel/dernier) (mari/partenaire). Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur le comportement de votre ou d'un de vos (mari(s)/partenaire(s)) précédent(s) . a) Est-ce qu'il est arrivé qu'un (mari/partenaire) précédent vous batte, vous gifle, vous donne des coups de pieds ou vous fasse quelque chose d'autre pour vous faire mal physiquement ? b) Est-ce qu'il est arrivé qu'un (mari/partenaire) précédent vous force physiquement à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer des actes sexuels contre votre volonté ?	B. Il y a combien de temps que cela s'est produit ? IL Y A 0-11 MOIS IL Y A 12 MOIS OU PLUS SOUVIENT NE SE PAS DÉJÀ ARRIVÉ OUI 1 2 3 NON 2 ↓ OUI 1 2 3 NON 2 ↓		
1517	VÉRIFIEZ 701 ET 702: A DÉJÀ ÉTÉ MARIÉE/ A DÉJÀ VÉCU AVEC UN HOMME <input type="checkbox"/> JAMAIS MARIÉE/ JAMAIS VÉCU AVEC UN HOMME <input type="checkbox"/> a) Depuis l'âge de 15 ans, est-ce que quelqu'un d'autre (votre/un) (mari/partenaire) vous a battu, giflé, donné des coups de pieds ou fait quelque chose pour vous faire mal physiquement ? b) Depuis l'âge de 15 ans, est-ce que quelqu'un vous a battu, giflé ou donné des coups de pieds ou fait quelque chose d'autre pour vous faire mal physiquement ?	OUI 1 NON 2 A REFUSÉ DE RÉPONDRE/ PAS DE RÉPONSE 3	→ 1520	
1518	Qui vous a agressé de cette façon ? Quelqu'un d'autre ? ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	MÈRE/ FEMME DU PÈRE A PÈRE/ MARI DE LA MÈRE B SOEUR/FRÈRE C FILLE/FILS D AUTRE PARENT E PETIT AMI ACTUEL F PETIT AMI PRÉCÉDEN G BELLE-MÈRE H BEAU-PÈRE I AUTRE BEAU-PARENT J ENSEIGNANT K EMPLOYEUR/QUELQU'UN AU TRAVAIL L POLICE/SOLDAT M AUTRE X (PRÉCISEZ)		
1519	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-il arrivé que (cette personne/ces personnes) vous agresse (vous agressent) physiquement : souvent, de temps en temps ou pas du tout ?	SOUVENT 1 DE TEMPS EN TEMPS 2 PAS DU TOUT 3		
1520	VÉRIFIEZ 201, 226 ET 230: A DÉJÀ ÉTÉ ENCEINTE (OUI À 201 OU 226 OU 230) <input type="checkbox"/> N'A JAMAIS ÉTÉ ENCEINTE <input type="checkbox"/>		→ 1523	
1521	Est-ce qu'il est arrivé que quelqu'un vous batte, vous gifle, vous donne des coups de pieds ou vous fasse quelque chose d'autre pour vous faire mal physiquement alors que	OUI 1 NON 2	→ 1523	

1522	<p>Qui a agi ainsi pour vous faire mal physiquement pendant que vous étiez enceinte ?</p> <p>Quelqu'un d'autre ?</p> <p>ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.</p>	MARI/PARTENAIRE ACTUEL A MÈRE/ FEMME DU PÈRE B PÈRE/ MARI DE LA MÈRE C SOEUR/FRÈRE D FILLE/FILS E AUTRE PARENT F ANCIEN MARI/PARTENAIRE G PETIT AMI ACTUEL H ANCIEN PETIT AMI I BELLE-MÈRE J BEAU-PÈRE K AUTRE BEAU-PARENT L ENSEIGNANT M EMPLOYEUR/QUELQU'UN AU TRAVAIL N POLICE/SOLDAT O AUTRE X (SPECIFY)	
1523	<p>VÉRIFIEZ 701 AND 702:</p> <p>A DÉJÀ ÉTÉ MARIÉE/A DÉJÀ VÉCU AVEC UN HOMME <input type="checkbox"/></p> <p>JAMAIS MARIÉE/JAMAIS VÉCU AVEC UN HOMME <input type="checkbox"/></p>		→ 1523B
1523A	<p>Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur des choses qui ont pu vous être faites par quelqu'un d'autre que (votre/un) (mari/partenaire). À n'importe quel moment dans votre vie, quand vous étiez enfant ou adulte, est-ce que quelqu'un vous a forcé à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer d'autres actes sexuels contre votre volonté ?</p>	OUI 1 NON 2 A REFUSÉ DE RÉPONDRE/ PAS DE RÉPONSE 3	→ 1524 → 1525A
1523B	<p>À n'importe quel moment dans votre vie, quand vous étiez enfant ou adulte, est-ce que quelqu'un vous a forcé à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer d'autres actes sexuels contre votre volonté ?</p>	OUI 1 NON 2 A REFUSÉ DE RÉPONDRE/ PAS DE RÉPONSE 3	→ 1527
1524	<p>Quelle est la personne qui vous a forcé la première fois que cela est arrivé?</p>	MARI/PARTENAIRE ACTUEL 01 ANCIEN MARI/PARTENAIRE 02 PETIT AMI ACTUEL/ANCIEN 03 PÈRE/BEAU-PÈRE 04 FRÈRE/BEAU-FRÈRE 05 AUTRE PARENT 06 BEAU-PARENT 07 AMI/RENCONTRE 08 AMI DE LA FAMILLE 09 ENSEIGNANT 10 EMPLOYEUR/QUELQU'UN AU TRAVAIL 11 POLICE/SOLDAT 12 PRÊTRE/RELIGIEUX 13 INCONNU 14 AUTRE 96 (SPECIFY)	
1525	<p>VÉRIFIEZ 701 ET 702:</p> <p>A DÉJÀ ÉTÉ MARIÉE/ A DÉJÀ VÉCU AVEC UN HOMME <input type="checkbox"/></p> <p>JAMAIS MARIÉE/ JAMAIS VÉCU AVEC UN HOMME <input type="checkbox"/></p> <p>a) Au cours des 12 derniers mois, est-ce que quelqu'un, autre que (votre/un) (mari/partenaire) vous a forcé physiquement à avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?</p> <p>b) Au cours des 12 derniers mois, est-ce que quelqu'un vous a forcé physiquement à avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?</p>	OUI 1 NON 2	

1525A	CHECK 1506A (h-j) and 1516A(b):		
	AU MOINS UN <input type="checkbox"/> 'OUI'	PAS UN SEUL <input type="checkbox"/> 'OUI'	→ 1527
1526	VÉRIFIEZ 701 AND 702: A DÉJÀ ÉTÉ MARIÉE/ A DÉJÀ VÉCU AVEC <input type="checkbox"/> UN HOMME JAMAIS MARIÉE/ JAMAIS VÉCU AVEC <input type="checkbox"/> UN HOMME a) Quel âge aviez-vous la première fois que quelqu'un, y compris (votre/un de vos) mari/partenaire, vous a forcé à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer d'autres actes sexuels contre votre volonté ? b) Quel âge aviez-vous la première fois que l'on vous a forcé à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer d'autres actes sexuels contre votre volonté ?		ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98
1527	VÉRIFIEZ 1506A (a-j), 1516A (a,b), 1517, 1521, 1523A ET 1523B:		
	AU MOINS UN <input type="checkbox"/> 'OUI'	PAS UN SEUL <input type="checkbox"/> 'OUI'	→ 1531
1528	Pensez à ce qui vous est arrivé parmi les choses dont nous venons de parler. Vous est-il arrivé de rechercher de l'aide ?	OUI 1 NON 2	→ 1530
1529	Après de qui avez-vous recherché de l'aide ? Personne d'autre ? ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	PROPRE FAMILLE A FAMILLE DU MARI/PARTENAIRE B MARI/PARTENAIRE ACTUEL/ANCIEN C PETIT AMI ACTUEL /ANCIEN D AMI E VOISIN F RELIGIEUX G MÉDECIN/PERSONNEL SANTÉ H POLICE I HOMME DE LOI J SERVICE SOCIAL K AUTRE X (SPECIFY)	→ 1531
1530	Avez-vous parlé de cela à quelqu'un ?	OUI 1 NON 2	
1531	Pour autant que vous le sachiez, est-ce que votre père battait votre mère ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
REMERCIEZ L'ENQUÊTÉE DE SA COOPÉRATION ET RÉAFFIRMEZ-LUI QUE SES RÉPONSES RESTERONT CONFIDENTIELLES. COMPLÉTEZ LES QUESTIONS CI-DESSOUS CONCERNANT LE MODULE SUR LA VIOLENCE DOMESTIQUE SEULEMENT.			
1532	AVEZ-VOUS DÛ INTERROMPRE L'INTERVIEW PARCE QU'UN ADULTE A ESSAYÉ D'ÉCOUTER, EST VENU DANS LA PIÈCE OU A ESSAYÉ D'INTERVENIR D'UNE AUTRE MANIÈRE ?	OUI OUI, PLUS 1 FOIS D'UNE FOIS NON MARI 1 2 3 AUTRE HOMME 1 2 3 ADULTE 1 2 3 FEMME ADULTE 1 2 3	
1533	COMMENTAIRES DE L'ENQUÊTRICE / SI L'ENQUÊTE SUR LA VIOLENCE DOMESTIQUE N'A PU ÊTRE MENÉE, DONNEZ LES RAISONS. _____ _____ _____		
1534	ENREGISTREZ L'HEURE.	HEURES <input type="text"/> <input type="text"/> MINUTES <input type="text"/> <input type="text"/>	

OBSERVATIONS DE L'ENQUÊTEUR
À REMPLIR UNE FOIS L'INTERVIEW TERMINÉE

COMMENTAIRES SUR L'INTERVIEW :

COMMENTAIRES SUR DES QUESTIONS PARTICULIÈRES :

AUTRES COMMENTAIRES :

OBSERVATION DU CHEF D'ÉQUIPE

OBSERVATION DE LA CONTRÔLEUSE

INSTRUCTIONS:

UN SEUL CODE DOIT FIGURER DANS CHAQUE CASE.
UN CODE DOIT ÊTRE INSCRIT À CHAQUE MOIS À LA COLONNE 1.

CODES À UTILISER POUR CHAQUE COLONNE

COLONNE 1: NAISSANCES. GROSSESSES. UTILIS. CONTRACEP. (2)

N NAISSANCES
G GROSSESSES
F FIN DE GROSSESSE

0 AUCUNE MÉTHODE

1 STÉRILISATION FÉMININE
2 STÉRILISATION MASCULINE

3 DIU

4 INJECTABLES

5 IMPLANTS

6 PILULE

7 CONDOM

8 CONDOM FÉMININ

9 PILULE DU LENDEMAIN

J MÉTHODE DES JOURS FIXES

K MÉTHODE DE L'AMÉNORRHÉE ET DE L'ALLAITEMENT MATERNEL

L MÉTHODE DU RYTHME

M RETRAIT

X AUTRE MÉTHODE MODERNE

Y AUTRE MÉTHODE TRADITIONNELLE

COLONNE 2: DISCONTINUATION DE L'UTILISATION CONTRACEPTIVE

0 RAPPORTS SEX. PEU FRÉQUENTS/MARI ABSENT

1 TOMBÉE ENCEINTE ALORS QU'ELLE UTILISAIT

2 SOUHAITAIT TOMBER ENCEINTE

3 MARI/PARTENAIRE DÉSAPPROUVE

4 VOULAIT MÉTHODE PLUS EFFICACE

5 PEUR DES EFFETS SECONDAIRES

6 MANQUE D'ACCESSIBILITÉ/TROP ÉLOIGNÉ

7 COÛTE TROP CHER

8 PAS PRATIQUE À UTILISER

F FATALISTE

A DIFFICULTÉS POUR TOMBER ENCEINTE/MÉNOPAUSE

D DISSOLUTION DU MARIAGE/SÉPARATION

X AUTRE

(PRÉCISEZ)

Z NE SAIT PAS

			COL. 1	COL. 2
	12	DEC	01	
	11	NOV	02	
	10	OCT	03	
2	09	SEP	04	2
	08	AOUT	05	
0	07	JUL	06	0
	06	JUIN	07	
1	05	MAI	08	1
	04	AVRIL	09	
8	03	MARS	10	8
	02	FEVRIER	11	
(1)	01	JAN	12	
<hr/>				
	12	DEC	13	
	11	NOV	14	
	10	OCT	15	
2	09	SEP	16	2
	08	AOUT	17	
0	07	JUL	18	0
	06	JUIN	19	
1	05	MAI	20	1
	04	AVRIL	21	
7	03	MARS	22	7
	02	FEVRIER	23	
	01	JAN	24	
<hr/>				
	12	DEC	25	
	11	NOV	26	
	10	OCT	27	
2	09	SEP	28	2
	08	AOUT	29	
0	07	JUL	30	0
	06	JUIN	31	
1	05	MAI	32	1
	04	AVRIL	33	
6	03	MARS	34	6
	02	FEVRIER	35	
	01	JAN	36	
<hr/>				
	12	DEC	37	
	11	NOV	38	
	10	OCT	39	
2	09	SEP	40	2
	08	AOUT	41	
0	07	JUL	42	0
	06	JUIN	43	
1	05	MAI	44	1
	04	AVRIL	45	
5	03	MARS	46	5
	02	FEVRIER	47	
	01	JAN	48	
<hr/>				
	12	DEC	49	
	11	NOV	50	
	10	OCT	51	
2	09	SEP	52	2
	08	AOUT	53	
0	07	JUL	54	0
	06	JUIN	55	
1	05	MAI	56	1
	04	AVRIL	57	
4	03	MARS	58	4
	02	FEVRIER	59	
	01	JAN	60	
<hr/>				
	12	DEC	61	
	11	NOV	62	
	10	OCT	63	
2	09	SEP	64	2
	08	AOUT	65	
0	07	JUL	66	0
	06	JUIN	67	
1	05	MAI	68	1
	04	AVRIL	69	
3	03	MARS	70	3
	02	FEVRIER	71	
	01	JAN	72	

(1) On suppose que l'année de la collecte est 2018. Pour la collecte commençant en 2019, toutes les références aux années de calendrier doivent être augmentées d'une année ; par exemple, 2012 doit être changé en 2013, 2013 doit être changé en 2014, 2014 doit être changé en 2015, et ainsi de suite pour toutes les années dans tout le questionnaire.

(2) Des codes peuvent être ajoutés pour d'autres méthodes, comme celles basées sur la connaissance de la fécondité.

PRÉSENTATION ET DEMANDE DE CONSENTEMENT

Bonjour. Je m'appelle _____ et je travaille pour l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie en collaboration avec le Ministère de la Santé et l'Action Sociale. Nous effectuons une enquête nationale sur la santé Au SENEGAL. Les informations que nous collectons aideront votre gouvernement à améliorer les services de santé. Votre ménage a été sélectionné pour cette enquête. Les questions prennent habituellement entre 30 et 60 minutes. Toutes les informations que vous nous donnez sont strictement confidentielles et elles ne seront transmises à personne d'autre que les membres de l'équipe d'enquête. Vous n'êtes pas obligée de participer à cette enquête mais nous espérons que vous accepterez d'y participer car votre opinion est très importante. S'il arrivait que je pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, dites-le moi et je passerai à la question suivante ; vous pouvez également interrompre l'interview à n'importe quel moment.

Si vous souhaitez plus d'informations sur l'enquête, vous pouvez contacter la personne dont le nom figure sur la carte qui a déjà été donnée à votre ménage.

Avez-vous des questions à me poser ?

SIGNATURE DE L'ENQUÊTEUR _____ DATE _____

L'ENQUÊTÉ ACCEPTE
D'ÊTRE INTERVIEWÉ .. 1

L'ENQUÊTÉ REFUSE
D'ÊTRE INTERVIEWÉ .. 2 → FIN

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTÉ

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
101	INSCRIVEZ L'HEURE.	HEURES <input type="text"/> <input type="text"/> MINUTES <input type="text"/> <input type="text"/>	
105	En quel mois et en quelle année êtes-vous né ?	MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> NE CONNAIT PAS LE MOIS 98 ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NE CONNAIT PAS L'ANNÉE 9998	
106	Quel âge aviez-vous à votre dernier anniversaire ? COMPAREZ ET CORRIGEZ 105 ET/OU 106 SI INCOHÉRENT.	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES <input type="text"/> <input type="text"/>	
107	Êtes-vous allé à l'école ?	OUI 1 NON 2	→ 111
108	Quel est le plus haut niveau d'études que vous avez atteint : élémentaire (primaire), moyen, secondaire ou supérieur ?	ELEMENTAIRE (PRIMAIRE) 1 MOYEN 2 SECONDAIRE 3 SUPÉRIEUR 4 AUTRE 6 (PRÉCISER)	

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTÉ

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
109	Quelle est [L'ANNÉE/CLASSE] la plus élevée que vous avez atteint à ce niveau ? SI MOINS D'UNE ANNÉE A ÉTÉ ACHEVÉE À CE NIVEAU, INSCRIVEZ '00'.	[ANNÉE/CLASSE] <input type="text"/> <input type="text"/>	
110	VÉRIFIEZ 108: ELEMENTAIRE (PRIMAIRE) <input type="checkbox"/> ↓ MOYEN <input type="checkbox"/> SECONDAIRE OU SUPÉRIEUR		→ 113
111	Je voudrais maintenant que vous me lisiez cette phrase. MONTREZ LA CARTE À L'ENQUÊTÉ. SI L'ENQUÊTÉ NE PEUT LIRE TOUTE LA PHRASE, INSISTEZ : Pouvez-vous lire une partie de la phrase ?	NE PEUT PAS LIRE DU TOUT 1 PEUT LIRE SEULEMENT UNE PARTIE DE LA PHRASE 2 PEUT LIRE TOUTE LA PHRASE 3 PAS DE CARTE DANS LA LANGUE DE L'ENQUÊTÉ 4 (PRÉCISEZ LA LANGUE) AVEUGLE/PROBLÈMES DE VUE 5	
111A	Avez-vous déjà participé à un programme d'alphabétisation ou à un autre programme qui comprenait l'apprentissage de la lecture et de l'écriture (non compris l'école primaire) ?	OUI 1 NON 2	→ 112
111B	Dans quelles langues étaient donnés les programmes d'alphabétisation auxquels vous avez participé ? INSISTER : Aucune autre ? ENREGISTRER TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	ARABE/MEDERSA A WOLOF B POULAR C SERER D DIOLA E MANDINGUE F SONINKE G AUTRE X (PRÉCISEZ LANGUE)	
112	VÉRIFIEZ 111: CODE '2', '3' OU '4' <input type="checkbox"/> ENCERCLÉ ↓ CODE '1' OU '5' <input type="checkbox"/> ENCERCLÉ		→ 114
113	Lisez-vous un journal ou un magazine au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?	AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE 1 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE 2 PAS DU TOUT 3	
114	Écoutez-vous la radio au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?	AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE 1 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE 2 PAS DU TOUT 3	
115	Regardez-vous la télévision au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?	AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE 1 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE 2 PAS DU TOUT 3	
116	Est-ce que vous possédez un téléphone portable ?	OUI 1 NON 2	→ 118
117	Est-ce que vous utilisez votre téléphone portable pour faire des opérations financières ?	OUI 1 NON 2	
118	Avez-vous un compte dans une banque ou dans une autre institution financière que vous pouvez utiliser vous-même ?	OUI 1 NON 2	
119	Avez-vous déjà utilisé internet ?	OUI 1 NON 2	→ 122
120	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé internet ? SI NÉCESSAIRE, INSISTEZ POUR L'UTILISATION DE	OUI 1 NON 2	→ 122

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
	N'IMPORTE QUEL ENDROIT AVEC N'IMPORTE QUEL APPAREIL		
121	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous utilisé internet: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?	PRESQUE CHAQUE JOUR 1 AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE 2 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE 3 PAS DU TOUT 4	

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
122	Quelle est votre religion?	MUSULMAN 1 CHRÉTIEN 2 ANIMISTE 3 SANS RELIGION 4 AUTRE 6 (PRÉCISEZ)	
122A	Etes-vous sénégalais ?	OUI 1 NON 2	→ 201
123	Quelle est votre ethnie?	WOLOF 01 POULAR 02 SERER 03 MANDINGUE/SOCÉ 04 DIOLA 05 SONINKÉ 06 AUTRE 96 (PRÉCISEZ)	

SECTION 2. REPRODUCTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À								
201	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur tous les enfants que vous avez eus durant votre vie. Je m'intéresse à tous vos enfants biologiques, même s'ils ne sont pas légalement les vôtres ou s'ils ne portent pas votre nom. Avez-vous ou avez-vous eu des enfants que vous avez engendrés ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 206								
202	Avez-vous des fils ou des filles dont vous êtes le père et qui vivent actuellement avec vous ?	OUI 1 NON 2	→ 204								
203	a) Combien de fils vivent avec vous ? b) Et combien de filles vivent avec vous ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'.	a) FILS À LA MAISON <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> b) FILLES À LA MAISON <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>									
204	Avez-vous des fils ou filles dont vous êtes le père qui sont toujours en vie mais qui ne vivent pas avec vous ?	OUI 1 NON 2	→ 206								
205	a) Combien de fils sont vivants mais qui ne vivent pas avec vous ? b) Combien de filles sont vivantes mais qui ne vivent pas avec vous ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'.	a) FILS AILLEURS <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> b) FILLES AILLEURS <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>									
206	Avez-vous eu une fille ou un garçon qui est né vivant mais qui est décédé par la suite ? SI NON INSISTEZ : Aucun bébé qui a crié ou fait un mouvement, qui a émis un son ou essayé de respirer ou qui a montré d'autres signes de vie pendant un très court moment ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 208								
207	a) Combien de garçons sont décédés ? b) Combien de filles sont décédées ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'.	a) GARÇONS DÉCÉDÉS <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> b) FILLES DÉCÉDÉES <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>									
208	FAITES LA SOMME DES RÉPONSES À 203, 205, ET 207, ET INSCRIVEZ LE TOTAL. SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'.	TOTAL DES ENFANTS <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>									
209	VÉRIFIEZ 208: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> A EU <input type="checkbox"/> PLUS D'UN ENFANT ↓ </div> <div style="text-align: center;"> A EU <input type="checkbox"/> SEULEMENT UN ENFANT </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> N'A EU AUCUN ENFANT <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> → 211 <input type="checkbox"/> → 301 </div> </div>										
210	Est-ce que tous les enfants dont vous êtes le père ont tous la même mère biologique ?	OUI 1 NON 2									
211	VÉRIFIEZ 208: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> A EU <input type="checkbox"/> PLUS D'UN ENFANT ↓ </div> <div style="text-align: center;"> A EU <input type="checkbox"/> SEULEMENT UN ENFANT ↓ </div> </div> a) Quel âge aviez-vous quand votre premier enfant est né ? b) Quel âge aviez-vous quand votre enfant est né ?	ÂGE EN ANNÉES <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>									
212	VÉRIFIEZ 203 ET 205: AU MOINS UN <input type="checkbox"/> ENFANT VIVANT ↓	AUCUN ENFANT <input type="checkbox"/> VIVANT	→ 301								

SECTION 2. REPRODUCTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
213	VÉRIFIEZ 203 ET 205: PLUS D'UN ENFANT VIVANT <input type="checkbox"/> SEULEMENT UN ENFANT VIVANT <input type="checkbox"/> a) Quel âge a votre plus jeune enfant ? b) Quel âge a votre enfant ?	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/>	
214	VÉRIFIEZ 213: (LE PLUS JEUNE) ENFANT A <input type="checkbox"/> 0-2 ANS (LE PLUS JEUNE) ENFANT A <input type="checkbox"/> 3 ANS OU PLUS		→ 301
215	VÉRIFIEZ 203 ET 205: PLUS D'UN ENFANT VIVANT <input type="checkbox"/> SEULEMENT UN ENFANT VIVANT <input type="checkbox"/> a) Quel est le nom de votre plus jeune enfant ? b) Quel est le nom de votre enfant ?	_____ (NOM DE L'ENFANT (LE PLUS JEUNE))	
216	Quand la mère de (NOM) était enceinte de (NOM), a-t-elle eu des examens prénatals ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 218
217	Est-ce que vous étiez présent pendant l'un de ces examens prénatals ?	PRÉSENT 1 PAS PRÉSENT 2	
218	Est-ce que (NOM) est né dans un hôpital ou un établissement de santé ?	HÔPITAL/ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ 1 AUTRE 2	
219	Quand un enfant a la diarrhée, quelle quantité de liquides doit-on lui donné à boire : plus que d'habitude, environ la même quantité que d'habitude, moins que d'habitude ou rien à boire du tout ?	PLUS QUE D'HABITUDE 1 ENVIRON MÊME QUANTITÉ 2 MOINS QUE D'HABITUDE 3 RIEN À BOIRE 4 NE SAIT PAS 8	

SECTION 3. CONTRACEPTION

301	Je voudrais maintenant que nous parlions de planification familiale, c'est-à-dire les différents moyens ou méthodes qu'un couple peut utiliser pour retarder ou éviter une grossesse. Avez-vous déjà entendu parler de (MÉTHODE) ?		
01	Stérilisation féminine. INSISTEZ : Les femmes peuvent avoir une opération pour ne plus avoir d'enfants.	OUI 1 NON 2	
02	Stérilisation masculine. INSISTEZ : Les hommes peuvent avoir une opération pour ne plus avoir d'enfants.	OUI 1 NON 2	
03	DIU. INSISTEZ : Les femmes peuvent avoir un stérilet qu'un médecin ou une infirmière leur place dans l'utérus pour leur éviter une grossesse pendant un ou plusieurs mois.	OUI 1 NON 2	
04	Injectables. INSISTEZ : Les femmes peuvent avoir une injection faite par du personnel de santé pour leur éviter une grossesse pendant un mois ou plus.	OUI 1 NON 2	
05	Implants. INSISTEZ : Les femmes peuvent se faire insérer par un médecin ou une infirmière un batonnet ou plus sous la peau du haut du bras pour leur éviter une grossesse, pendant une année ou plus.	OUI 1 NON 2	
06	Pilule. INSISTEZ : Les femmes peuvent prendre une pilule chaque jour pour éviter une grossesse.	OUI 1 NON 2	
07	Condom. INSISTEZ : Les hommes peuvent mettre une capote en caoutchouc sur leur pénis avant les rapports sexuels.	OUI 1 NON 2	
08	Condom féminin. INSISTEZ : Les femmes peuvent placer un fourreau dans leur vagin avant les rapports sexuels.	OUI 1 NON 2	
09	Pilule du lendemain. INSISTEZ : Les femmes peuvent prendre pendant trois jours après des rapports sexuels non protégés des pilules spéciales qui les empêchent de tomber enceintes.	OUI 1 NON 2	

SECTION 3. CONTRACEPTION

10	Méthode des jours fixes. INSISTEZ : Les femmes utilisent un collier de perles de couleur différente pour connaître les jours où elles peuvent tomber enceintes. Durant ces jours où elles peuvent tomber enceintes, elles utilisent un condom ou elles s'abstiennent de rapports sexuels.	OUI 1 NON 2
11	Méthode de l'aménorrhée et de l'allaitement maternel (MAMA). INSISTEZ : Pendant six mois après la naissance d'un enfant, avant que les règles ne soient revenues, les femmes utilisent une méthode qui nécessite d'allaiter fréquemment le jour et la nuit.	OUI 1 NON 2
12	Méthode du rythme. INSISTEZ : Pour éviter une grossesse, les femmes n'ont pas de rapports sexuels les jours où elles pensent qu'elles peuvent tomber enceintes.	OUI 1 NON 2
13	Retrait. INSISTEZ : Les hommes peuvent faire attention et se retirer avant l'éjaculation.	OUI 1 NON 2
14	Avez-vous entendu parler d'autres moyens ou méthodes qu'une femme ou un homme peut utiliser pour éviter une grossesse ?	OUI, MÉTHODE MODERNE _____ A (PRÉCISEZ) OUI, MÉTHODE TRADITIONNELLE _____ B (PRÉCISEZ) NON Y

SECTION 3. CONTRACEPTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
302	Au cours des derniers mois, avez-vous : a) Entendu à la radio un message sur la planification familiale ? b) Vu à la télévision quelque chose sur la planification familiale ? c) Lu dans un journal ou un magazine quelque chose sur la planification familiale ? d) Reçu un message vocal ou un texte sur la planification familiale sur un téléphone portable ? e) Vu ou Lu quelque chose sur la planification familiale sur une affiche ou un panneau ?	OUI NON a) RADIO 1 2 b) TÉLÉVISION 1 2 c) JOURNAL OU MAGAZINE 1 2 d) PORTABLE 1 2 e) AFFICHE / PANNEAU 1 2	
303	Au cours des derniers mois, avez-vous parlé de planification familiale avec un agent de santé ou un professionnel de santé ?	OUI 1 NON 2	
304	Je voudrais maintenant vous parler des risques de tomber enceintes. Entre la période des règles et les règles suivantes, est-ce qu'il y a une période où les femmes ont plus de chances de tomber enceintes ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 306
305	Est-ce que cette période se situe juste avant que les règles ne commencent, pendant la période des règles, juste après que les règles soient terminées ou bien au milieu de deux périodes de règles ?	JUSTE AVANT QUE LES RÉGLES COMMENCENT 1 PENDANT LES RÉGLES 2 JUSTE APRÈS LA FIN DES RÉGLES 3 AU MILIEU, ENTRE DEUX PÉRIODES 4 AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 8	
306	Après la naissance d'un enfant, est-ce qu'une femme peut tomber enceinte avant que ses règles soient revenues ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	
307	Je vais vous lire maintenant certaines déclarations sur la contraception. Dites-moi, s'il vous plaît, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec chacune de ces déclarations ? a) La contraception est un problème de femme et un homme ne doit pas s'en préoccuper. b) Une femme qui utilise la contraception peut devenir une femme légère.	PAS D'ACCORD D'ACCORD NSP a) CONTRACEPTION PROBLÈME DE FEMME 1 2 8 b) FEMME PEUT DEVENIR LÉGÈRE 1 2 8	
308	VÉRIFIEZ 301 (07) : CONNAÎT CONDOM MASCULIN OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>		→ 312
309	Connaissez-vous un endroit où une personne peut se procurer des condoms ?	OUI 1 NON 2	→ 312
310	Où est-ce ? Pas d'autre endroit ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER CHAQUE TYPE D'ENDROIT SI VOUS NE POUVEZ PAS DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT. _____ (NOM DE L'ENDROIT/ NOM DES ENDROITS)	SECTEUR PUBLIC HÔPITAL GOUV. A CENTRE SANTÉ GOUV. B POSTE SANTÉ C CENTRE DE PF GOUV. D MATERNITÉ RURALE E CASE DE SANTÉ F PHARMACIE COMMUNAUTAIRE G STRAT. AVANCÉE/EQU. MOBILE H AUTRE PUBLIC I _____ (PRÉCISEZ) SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE/CABINET PRIVÉ J PHARMACIE K MÉDECIN PRIVÉ L DISPENSARE RELIG M	

SECTION 3. CONTRACEPTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
		AUTRE MEDICAL PRIVÉ N _____ (PRÉCISEZ) AUTRE SOURCE BOUTIQUE O ÉGLISE P PARENTS/AMIS Q BAR R AUTRE X _____ (PRÉCISEZ)	
311	Est-ce que vous pouvez vous procurer des condoms si vous le souhaitez ?	OUI 1 NON 2	
312	VÉRIFIEZ 301 (08) : CONNAÎT CONDOM FÉMININ OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>		→ 401
313	Connaissez-vous un endroit où une personne peut se procurer des condoms féminins ?	OUI 1 NON 2	→ 401
314	Où est-ce ? Pas d'autre endroit ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER CHAQUE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ PAS DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT _____ (NOM DE L'ENDROIT/ NOM DES ENDROITS)	SECTEUR PUBLIC HÔPITAL GOUV. A CENTRE SANTÉ GOUV. B POSTE SANTÉ C CENTRE DE PF GOUV. D MATERNITÉ RURALE E CASE DE SANTÉ F PHARMACIE COMMUNAUTAIRE G STRAT. AVANCÉE/EQU. MOBILE H AUTRE PUBLIC I _____ (PRÉCISEZ) SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE/CABINET PRIVÉ J PHARMACIE K MÉDECIN PRIVÉ L DISPENSAIRE RELIG M AUTRE MEDICAL PRIVÉ N _____ (PRÉCISEZ) AUTRE SOURCE BOUTIQUE O ÉGLISE P PARENTS/AMIS Q BAR R AUTRE X _____ (PRÉCISEZ)	
315	Est-ce que vous pouvez vous procurer des condoms féminins si vous le souhaitez ?	OUI 1 NON 2	

SECTION 4. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À															
401	Êtes-vous actuellement marié ou vivez-vous avec une femme comme si vous étiez marié ?	OUI, ACTUELLEMENT MARIÉ 1 OUI, VIT AVEC UNE FEMME 2 NON, PAS EN UNION 3	<input type="checkbox"/> → 404															
402	Avez-vous déjà été marié ou avez-vous vécu avec une femme comme si vous étiez marié ?	OUI, A ÉTÉ MARIÉ 1 OUI, A VÉCU AVEC UNE FEMME 2 NON 3	→ 413															
403	Quel est votre état matrimonial actuel : êtes-vous veuf, divorcé ou séparé ?	VEUF 1 DIVORCÉ 2 SÉPARÉ 3	<input type="checkbox"/> → 410															
404	Est-ce que votre (épouse/partenaire) vit actuellement avec vous ou vit-elle ailleurs ?	VIT AVEC LUI 1 VIT AILLEURS 2																
405	Avez-vous d'autres épouses ou vivez-vous avec d'autres femmes comme si vous étiez marié ?	OUI (PLUS D'UNE ÉPOUSE) 1 NON (SEULEMENT UNE ÉPOUSE) 2	→ 407															
406	En tout, combien d'épouses ou de partenaires avec qui vous vivez comme si vous étiez marié avez-vous ?	NOMBRE TOTAL D'ÉPOUSES ET DE FEMMES AVEC QUI IL VIT COMME MARIÉ	<input type="text"/>															
407	VÉRIFIEZ 405: <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>UNE ÉPOUSE/ PARTENAIRE <input type="checkbox"/></p> <p>↓</p> <p>a) Dites-mois, s'il vous plait, le nom de (votre épouse/femme avec qui vous vivez comme si vous étiez marié) ?</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>PLUS D'UNE ÉPOUSE/ PARTENAIRE <input type="checkbox"/></p> <p>↓</p> <p>b) Dites-mois, s'il vous plait, le nom de chacune de vos épouses ou femmes avec qui vous vivez comme si vous étiez marié) ?</p> </div> </div> <p>INSCRIVEZ LE NOM ET LE NUMÉRO DE LIGNE DU TABLEAU MÉNAGE DE CHACUNE DES ÉPOUSES ET DES FEMMES AVEC QUI IL VIT COMME MARIÉ.</p> <p>SI UNE FEMME N'EST PAS LISTÉE DANS LE MÉNAGE, INSCRIVEZ '00'.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">NOM</th> <th style="width: 20%;">NUMÉRO DE LIGNE</th> <th style="width: 50%;">ÂGE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>_____</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	NOM	NUMÉRO DE LIGNE	ÂGE	_____	<input type="text"/>	<input type="text"/>	408 (1) Quel âge avait (NOM) à son dernier anniversaire ?									
NOM	NUMÉRO DE LIGNE	ÂGE																
_____	<input type="text"/>	<input type="text"/>																
_____	<input type="text"/>	<input type="text"/>																
_____	<input type="text"/>	<input type="text"/>																
_____	<input type="text"/>	<input type="text"/>																
408	POSEZ 408 POUR CHAQUE PERSONNE.																	
409	VÉRIFIEZ 407: <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>UNE ÉPOUSE/ PARTENAIRE <input type="checkbox"/></p> <p>↓</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>PLUS D'UNE ÉPOUSE/ PARTENAIRE <input type="checkbox"/></p> </div> </div>		→ 411															
410	Avez-vous été marié ou avez-vous vécu avec une femme une seule fois ou plus d'une fois ?	PLUS D'UNE FOIS 1 UNE SEULE FOIS 2																

SECTION 4. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
411	<p>VÉRIFIEZ 405 ET 410:</p> <p>LES DEUX SONT <input type="checkbox"/> CODE '2'</p> <p>AUTRE <input type="checkbox"/></p> <p>a) En quel mois et quelle année avez-vous commencé à vivre avec votre (épouse/partenaire) ?</p> <p>b) Je voudrais maintenant vous parler de votre première (épouse/partenaire). En quel mois et quelle année avez-vous commencé à vivre avec elle ?</p>	<p>MOIS <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NE CONNAIT PAS LE MOIS 98</p> <p>ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NE CONNAIT PAS L'ANNÉ 9998</p>	→ 413
412	<p>Quel âge aviez-vous quand vous avez commencé à vivre avec elle pour la première fois ?</p>	<p>ÂGE <input type="text"/> <input type="text"/></p>	
413	<p>VÉRIFIEZ LA PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES. AVANT DE CONTINUER, FAITES TOUT VOTRE POSSIBLE POUR ÊTRE EN PRIVÉ.</p>		
414	<p>Je voudrais maintenant vous poser des questions sur votre activité sexuelle pour mieux comprendre certains aspects importants de la vie. Je voudrais vous assurer de nouveau que toutes vos réponses sont absolument confidentielles et qu'elles ne seront divulguées à personne. S'il arrivait que je pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, dites-le moi et je passerai à la question suivante. Quel âge aviez-vous quand vous avez eu, pour la première fois, des rapports sexuels ?</p>	<p>N'A JAMAIS EU DE RAPPORTS SEXUELS 00</p> <p>ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>1^{ère} FOIS EN COMMENÇANT À VIVRE AVEC (PREMIÈRE) FEMME/PARTENAIF 95</p>	→ 501
415	<p>Je voudrais vous poser des questions sur votre activité sexuelle récente. Quand avez-vous eu des rapports sexuels pour la dernière fois ?</p> <p>SI MOINS DE 12 MOIS, LA RÉPONSE DOIT ÊTRE ENREGISTRÉE EN JOURS, SEMAINES OU MOIS. SI 12 MOIS (UNE ANNÉE) OU PLUS, LA RÉPONSE DOIT ÊTRE ENREGISTRÉE EN ANNÉES.</p>	<p>IL Y A DES JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>IL Y A DES SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>IL Y A DES MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>IL Y A DES ANNÉES 4 <input type="text"/> <input type="text"/></p>	→ 417 → 427

SECTION 4. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

		DERNIÈRE PARTENAIRE SEXUELLE	AVANT-DERNIÈRE PARTENAIRE SEXUELLE	AVANT-AVANT DERNIÈRE PARTENAIRE SEXUELLE
416	Quand avez-vous eu des rapports sexuels avec cette personne pour la dernière fois ?		IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/>	IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/>
417	La dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels avec cette personne, un condom a-t-il été utilisé ?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 419) ←	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 419) ←	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 419) ←
418	Un condom a-t-il été utilisé chaque fois que vous avez eu des rapports sexuels avec cette personne au cours des 12 derniers mois ?	OUI 1 NON 2	OUI 1 NON 2	OUI 1 NON 2
419	Quelle était votre relation avec cette personne avec qui vous avez eu des rapports sexuels ? SI PETITE AMIE : Viviez-vous ensemble comme si vous étiez marié ? SI OUI, ENCERCLEZ '2'. SI NON, ENCERCLEZ '3'.	ÉPOUSE 1 PARTENAIRE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉ .. 2 PETITE AMIE NE VIVANT PAS AVEC L'ENQUÊTÉ 3 RENCONTRE OCCASIONNELLE .. 4 PROSTITUÉE/CLIENT .. 5 AUTRE 6 (PRÉCISEZ)	ÉPOUSE 1 PARTENAIRE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉ .. 2 PETITE AMIE NE VIVANT PAS AVEC L'ENQUÊTÉ 3 RENCONTRE OCCASIONNELLE .. 4 PROSTITUÉE/CLIENT .. 5 AUTRE 6 (PRÉCISEZ)	ÉPOUSE 1 PARTENAIRE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉ .. 2 PETITE AMIE NE VIVANT PAS AVEC L'ENQUÊTÉ 3 RENCONTRE OCCASIONNELLE .. 4 PROSTITUÉE/CLIENT .. 5 AUTRE 6 (PRÉCISEZ)
420	Il y a combien de temps que vous avez eu vos premiers rapports sexuels avec cette personne ?	IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A ANNÉES 4 <input type="text"/> <input type="text"/>	IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A ANNÉES 4 <input type="text"/> <input type="text"/>	IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A ANNÉES 4 <input type="text"/> <input type="text"/>
421	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous eu des rapports sexuels avec cette personne ? DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION. SI LE NOMBRE DE FOIS EST 95 OU PLUS, INSCRIVEZ '95'.	NOMBRE DE FOIS <input type="text"/> <input type="text"/>	NOMBRE DE FOIS <input type="text"/> <input type="text"/>	NOMBRE DE FOIS <input type="text"/> <input type="text"/>

SECTION 4. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

		DERNIÈRE PARTENAIRE SEXUELLE	AVANT-DERNIÈRE PARTENAIRE SEXUELLE	AVANT-AVANT DERNIÈRE PARTENAIRE SEXUELLE
422	Quel âge a cette personne ?	ÂGE DE LA PARTENAIRE <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98	ÂGE DE LA PARTENAIRE <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98	ÂGE DE LA PARTENAIRE <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98
423	À part cette personne, avez-vous eu des rapports sexuels avec une autre personne au cours des 12 derniers mois ?	OUI 1 (RETOURNEZ À 416COL. SUIVANTE) NON 2 (ALLEZ À 425)	OUI 1 (RETOURNEZ À 416 COL. SUIVANTE) NON 2 (ALLEZ À 425)	
424	En tout, avec combien de personnes différentes avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois ? DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION. SI LE NOMBRE DE FOIS EST 95 OU PLUS, INSCRIVEZ '95'.			NOMBRE DE PARTENAIRE DANS LES 12 DERNIERS MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS 98

SECTION 4. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
436	<p>Où vous étiez-vous procuré le condom la dernière fois ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____</p> <p>(NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL GOUV. 11</p> <p>CENTRE SANTÉ GOUV. 12</p> <p>POSTE SANTÉ 13</p> <p>CENTRE DE PF GOUV. 14</p> <p>MATERNITÉ RURALE 15</p> <p>CASE DE SANTÉ 16</p> <p>PHARMACIE COMMUNAUTAIRE 17</p> <p>STRAT. AVANCÉE/EQU. MOBILE 18</p> <p>AUTRE PUBLIC 19</p> <p>_____</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE/CABINET</p> <p>PRIVÉ 21</p> <p>PHARMACIE 22</p> <p>MÉDECIN PRIVÉ 23</p> <p>DISPENSARE RELIG 24</p> <p>AUTRE MEDICAL PRIVÉ 26</p> <p>_____</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE SOURCE</p> <p>BOUTIQUE 31</p> <p>ÉGLISE 32</p> <p>PARENTS/AMIS 33</p> <p>BAR 34</p> <p>AUTRE 96</p> <p>_____</p> <p>(PRÉCISEZ)</p>	
437	<p>La dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels, est-ce que vous ou votre partenaire avait utilisé une autre méthode que le condom pour éviter ou retarder une grossesse ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>	<p>→ 439</p> <p>→ 440</p>
438	<p>La dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels, est-ce que vous ou votre partenaire avait utilisé une méthode pour éviter ou retarder une grossesse ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>	<p>→ 440</p>
439	<p>Quelle méthode avez-vous, ou votre partenaire, utilisé ?</p> <p>INSISTEZ: Est-ce que vous ou votre partenaire avait utilisé une autre méthode pour éviter une grossesse ?</p> <p>ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.</p>	<p>STÉRILISATION FÉMININE A</p> <p>STÉRILISATION MASCULINE B</p> <p>DIU C</p> <p>INJECTABLES D</p> <p>IMPLANTS E</p> <p>PILULE F</p> <p>CONDOM G</p> <p>CONDOM FÉMININ H</p> <p>PILULE DIU LENDEMAIN I</p> <p>MÉTHODE DES JOURS FIXES J</p> <p>MAMA K</p> <p>MÉTHODE DU RYTHME L</p> <p>RETRAIT M</p> <p>AUTRE MÉTHODE MODERNE X</p> <p>AUTRE MÉTHODE TRADITIONNELLE Y</p>	<p>→ 501</p>
440	<p>Connaissez-vous un endroit où vous pouvez vous procurer une méthode de planification familiale ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p>	

SECTION 5. PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À								
501	VÉRIFIEZ 401: ACTUELLEMENT MARIÉ OU <input type="checkbox"/> NON MARIÉ ACTUELLEMENT <input type="checkbox"/> VIVANT AVEC UNE PARTENAIRE <input type="checkbox"/> ET NE VIVANT PAS AVEC <input type="checkbox"/> UNE PARTENAIRE		→ 514								
502	VÉRIFIEZ 439: HOMME NON <input type="checkbox"/> STÉRILISÉ <input type="checkbox"/> HOMME <input type="checkbox"/> STÉRILISÉ		→ 514								
503	VÉRIFIEZ 407: UNE ÉPOUSE/ PARTENAIRE <input type="checkbox"/> PLUS D'UNE <input type="checkbox"/> ÉPOUSE/ PARTENAIRE		→ 509								
504	Est-ce que votre (épouse/partenaire) est actuellement enceinte ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 507								
505	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Après l'enfant que vous et votre (épouse/partenaire) attendez maintenant, souhaiteriez-vous un autre enfant ou préféreriez-vous ne plus avoir d'enfants ?	AVOIR UN AUTRE ENFANT 1 PAS D'AUTRE ENFANT 2 INDÉCIS/NE SAIT PAS 8	→ 514								
506	Après la naissance de l'enfant que vous attendez, combien de temps voudriez-vous attendre avant la naissance d'un autre enfant ?	MOIS 1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> ANNÉES 2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> BIENTÔT/MAINTENANT 993 AUTRE 996 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 998									→ 514
507	VÉRIFIEZ 208: A EU <input type="checkbox"/> N'A PAS <input type="checkbox"/> DES ENFANTS <input type="checkbox"/> D'ENFANT <input type="checkbox"/> a) Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Voudriez-vous avoir un autre enfant ou préféreriez-vous ne plus avoir d'enfant ? b) Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Voudriez-vous avoir un enfant ou préféreriez-vous ne pas avoir d'enfant ?	VEUT (UN/UN AUTRE) ENFANT 1 PLUS D'ENFANT/AUCUN 2 DIT QUE LE COUPLE NE PEUT PAS AVOIR D'ENFANT 3 ÉPOUSE/PARTENAIRE STÉRILISÉE 4 INDÉCIS/NE SAIT PAS 8	→ 514								
508	VÉRIFIEZ 208: A <input type="checkbox"/> N'A PAS <input type="checkbox"/> DES ENFANTS <input type="checkbox"/> D'ENFANT <input type="checkbox"/> a) Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissance d'un autre enfant ? b) Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissance d'un enfant ?	MOIS 1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> ANNÉES 2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> BIENTÔT/MAINTENANT 993 DIT QUE LE COUPLE NE PEUT PAS AVOIR D'ENFANT 994 AUTRE 996 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 998									→ 514
509	Est-ce que l'une de vos (épouses/partenaires) est actuellement enceinte ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 512								

SECTION 6. EMPLOI ET RÔLE DES SEXES

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
601	Avez-vous fait un travail quelconque au cours des 7 derniers jours ?	OUI 1 NON 2	→ 604
602	Bien que vous n'ayez pas travaillé au cours des sept derniers jours, est-ce que vous avez un travail ou une affaire dont vous avez dû vous absenter pour vacances, maladie, maternité ou pour une autre raison ?	OUI 1 NON 2	→ 604
603	Avez-vous fait un travail quelconque au cours des 12 derniers mois ?	OUI 1 NON 2	→ 607
604	Quelle est votre occupation ? C'est-à-dire quel genre de travail faites-vous principalement ?	_____ _____ _____	
605	Travaillez-vous habituellement toute l'année, ou de manière saisonnière ou travaillez-vous seulement de temps en temps ?	TOUTE L'ANNÉE 1 SAISONNIER/PARTIE DE L'ANNÉE 2 DE TEMPS EN TEMPS 3	
606	Êtes-vous payé en argent ou en nature pour ce travail ou n'êtes-vous pas payé du tout ?	ARGENT SEULEMENT 1 ARGENT ET NATURE 2 NATURE SEULEMENT 3 PAS PAYÉ 4	
607	VÉRIFIEZ 401: ACTUELLEMENT MARIÉ OU VIVANT AVEC UNE PARTENAIRE <input type="checkbox"/> NON MARIÉ ACTUELLEMENT ET NE VIVANT PAS AVEC UNE PARTENAIRE <input type="checkbox"/>		→ 612
608	VÉRIFIEZ 606: CODE '1' OU '2' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/>		→ 610
609	Habituellement, qui décide comment l'argent que vous gagnez va être utilisé : c'est vous, votre (épouse/partenaire), ou conjointement vous et votre (épouse/partenaire) ?	ENQUÊTÉ 1 ÉPOUSE/PARTENAIRE 2 ENQUÊTÉ ET ÉPOUSE/ PARTENAIRE ENSEMBLE 3 AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ)	
610	Habituellement, qui prend les décisions en ce qui concerne vos propres soins de santé : vous, votre (épouse/partenaire), conjointement vous et votre (épouse/partenaire) ou quelqu'un d'autre ?	ENQUÊTÉ 1 ÉPOUSE/PARTENAIRE 2 ENQUÊTÉ ET ÉPOUSE/ PARTENAIRE ENSEMBLE 3 QUELQU'UN D'AUTRE 4 AUTRE 6	
611	Qui prend habituellement les décisions concernant les achats importants pour le ménage ?	ENQUÊTÉ 1 ÉPOUSE/PARTENAIRE 2 ENQUÊTÉ ET ÉPOUSE/ PARTENAIRE ENSEMBLE 3 QUELQU'UN D'AUTRE 4 AUTRE 6	

SECTION 6. EMPLOI ET RÔLE DES SEXES

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À																								
612	Est-ce que vous possédez cette maison ou une autre maison seul ou conjointement avec quelqu'un d'autre ?	SEUL SEULEMENT 1 CONJOINTEMENT SEULEMENT 2 SEUL ET CONJOINTEMENT 3 N'EN POSSÈDE PAS 4	→ 615																								
613	Avez-vous un acte de propriété pour une maison que vous possédez ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 615																								
614	Est-ce que votre nom figure sur l'acte de propriété ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8																									
615	Est-ce que vous possédez de la terre agricole ou non agricole, seul ou conjointement avec quelqu'un d'autre ?	SEUL SEULEMENT 1 CONJOINTEMENT SEULEMENT 2 SEUL ET CONJOINTEMENT 3 N'EN POSSÈDE PAS 4	→ 618																								
616	Avez-vous un acte de propriété pour une terre que vous possédez ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8	→ 618																								
617	Est-ce que votre nom figure sur l'acte de propriété ?	OUI 1 NON 2 NE SAIT PAS 8																									
618	<p>Selon vous, est-il justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes :</p> <p>a) Si elle sort sans le lui dire ?</p> <p>b) Si elle néglige les enfants ?</p> <p>c) Si elle argumente avec lui ?</p> <p>d) Si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui ?</p> <p>e) Si elle brûle la nourriture ?</p>	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>OUI</th> <th>NON</th> <th>NSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) SORT SANS LE LUI DIRE</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>b) NÉGLIGE LES ENFANTS</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>c) ARGUMENTE</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>d) REFUSE RAP. SEXUELS</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>e) BRÛLE NOURRITURE</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		OUI	NON	NSP	a) SORT SANS LE LUI DIRE	1	2	8	b) NÉGLIGE LES ENFANTS	1	2	8	c) ARGUMENTE	1	2	8	d) REFUSE RAP. SEXUELS	1	2	8	e) BRÛLE NOURRITURE	1	2	8	
	OUI	NON	NSP																								
a) SORT SANS LE LUI DIRE	1	2	8																								
b) NÉGLIGE LES ENFANTS	1	2	8																								
c) ARGUMENTE	1	2	8																								
d) REFUSE RAP. SEXUELS	1	2	8																								
e) BRÛLE NOURRITURE	1	2	8																								

SECTION 8. AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
805	<p>Je voudrais maintenant vous poser d'autres questions concernant des problèmes de santé. Au cours des 12 derniers mois, vous a-t-on fait une injection pour une raison quelconque ?</p> <p>SI OUI: Combien d'injections avez-vous eu ? SI LE NOMBRE D'INJECTIONS EST DE 90 OU PLUS OU SI LES INJECTIONS ÉTAIENT QUOTIDIENNES PENDANT 3 MOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '90'. DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION.</p>	<p>NOMBRE D'INJECTIONS <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>AUCUNE 00</p>	→ 901
806	<p>Parmi ces injections, combien ont été effectuées par un médecin, une infirmière, un pharmacien, un dentiste ou un autre personnel de santé ?</p> <p>SI LE NOMBRE D'INJECTIONS EST DE 90 OU PLUS OU SI LES INJECTIONS ÉTAIENT QUOTIDIENNES PENDANT 3 MOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '90'. DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION.</p>	<p>NOMBRE D'INJECTIONS <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>AUCUNE 00</p>	→ 901
807	<p>La dernière fois que vous avez eu une injection effectuée du personnel de santé, est-ce qu'il/elle a pris la seringue et l'aiguille d'un emballage neuf qui n'avait pas été ouvert ?</p>	<p>OUI 1</p> <p>NON 2</p> <p>NE SAIT PAS 8</p>	

SECTION 9. EXCISION

N°.	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSEZ À								
901	Avez-vous déjà entendu parler de l'excision ?	OUI 1 NON 2	→ 903								
902	Dans certains pays, il existe une pratique qui consiste à couper une partie des organes génitaux externes des filles. Avez-vous	OUI 1 NON 2	→ 905								
903	Pensez-vous que l'excision est exigée par votre religion ?	OUI 1 NON 2 PAS DE RELIGION 3 NE SAIT PAS 8									
904	Pensez-vous que la pratique de l'excision doit continuer ou qu'elle doit être abandonnée ?	CONTINUER 1 ABANDONNER 2 CELA DÉPEND 3 NE SAIT PAS 8									
905	INSCRIVEZ L'HEURE.	HEURE <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> MINUTES <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>									

OBSERVATION DE L'ENQUÊTEUR

À REMPLIR UNE FOIS L'INTERVIEW TERMINÉE

COMMENTAIRES SUR L'INTERVIEW :

COMMENTAIRES SUR DES QUESTIONS PARTICULIÈRES :

AUTRES COMMENTAIRES :

OBSERVATION DU CHEF D'ÉQUIPE

OBSERVATION DU CONTRÔLEUR

**ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ CONTINUE (EDS-CONTINUE 2018)
QUESTIONNAIRE BIOMARQUEUR**

République du Sénégal
Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan
Ministère de la Santé et de l'Action Sociale

IDENTIFICATION							
NOM DE LA LOCALITÉ _____							
NOM ET NUMÉRO DU CHEF DE MÉNAGE _____							
NUMÉRO DE CONCESSION							
NUMÉRO DE GRAPPE							
RÉGION							
DEPARTEMENT							
DISTRICT SANITAIRE							
URBAIN/RURAL (URBAIN=1, RURAL=2)							
DAKAR/CAPITALE RÉGIONALE/AUTRE VILLE/RURAL (DAKAR=1, CAPITALE RÉGIONALE=2, AUTRE VILLE=3, RURAL=4)							
MÉNAGE SÉLECTIONNÉ POUR L'ENQUÊTE HOMME ? (1=OUI, 2=NON)							
VISITES L'AGENT DE TERRAIN							
	1	2	3	VISITE FINALE			
DATE	_____	_____	_____	JOUR _____			
NOM DE L'AGENT DE TERRAIN	_____	_____	_____	MOIS _____			
				ANNÉE _____			
PROCHAINE DATE VISITE	_____	_____		NOMBRE TOTAL DE VISITES _____			
HEURE	_____	_____					
NOTES:	_____ _____ _____ _____			TOTAL DE FEMMES ÉLIGIBLES _____			
				TOTAL D'HOMMES ÉLIGIBLES _____			
				TOTAL D'ENFANTS ÉLIGIBLES _____			
LANGUE DU QUESTIONNAIRE**	0 1	LANGUE DE L'INTERVIEW**	_____	LANGUE MATERNELLE DE L'ENQUÊTÉ**	_____	TRADUCTEUR (OUI = 1, NON = 2)	_____
LANGUE DU QUESTIONNAIRE**	FRANÇAIS	**CODES LANGUES :					
		01 FRANÇAIS	03 POULAR	05 MANDINGUE	07 AUTRES		
		02 WOLOF	04 SERER	06 DIOLA			
CHEF D'ÉQUIPE							
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
NOM	NUMÉRO			DATE			

MESURE DU POIDS ET DE LA TAILLE DES ENFANTS DE 0-5 ANS

101	VÉRIFIEZ COLONNE 11 DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE ET LE NOM DE TOUS LES ENFANTS ÉLIGIBLES DE 0-5 ANS À Q.102; S'IL Y A PLUS DE 6 ENFANTS, UTILISEZ UN/DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES.			
		ENFANT 1	ENFANT 2	ENFANT 3
102	VÉRIFIEZ TABLEAU MÉNAGE : NUMÉRO DE LIGNE DE LA COL.11 . NOM DE LA COL. 2	NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____
103	SI LA MÈRE EST ENQUÊTÉE : COPIEZ LA DATE DE NAISSANCE DE L'ENFANT (JOUR, MOIS ET ANNÉE) DU TABLEAU DES NAISSANCES. SI LA MÈRE N'EST PAS ENQUÊTÉE DEMANDEZ : Quelle est la date de naissance de (NOM) ?	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
104	VÉRIFIEZ 103: ENFANT NÉ EN 2013-2018?	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 114) ←	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 114) ←	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 114) ←
105	POIDS EN KILOGRAMMES.	KG. <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENTE 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996	KG. <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENTE 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996	KG. <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENTE 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996
106	TAILLE EN CENTIMÈTRES.	CM. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENTE 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996 (ALLEZ À 108) ←	CM. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENTE 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996 (ALLEZ À 108) ←	CM. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> ABSENTE 9994 REFUS 9995 AUTRE 9996 (ALLEZ À 108) ←
107	MESURÉ ALLONGÉ OU DEBOUT ?	ALLONGÉ 1 DEBOUT 2	ALLONGÉ 1 DEBOUT 2	ALLONGÉ 1 DEBOUT 2
108	MESUREUR: INSCRIVEZ VOTRE NUMÉRO L'AGENT DE TERRAIN.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> L'AGENT DE TERRAIN

MESURE DU POIDS ET DE LA TAILLE DES ENFANTS DE 0-5 ANS

101	VÉRIFIEZ COLONNE 11 DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE ET LE NOM DE TOUS LES ENFANTS ÉLIGIBLES DE 0-5 ANS À Q.102; S'IL Y A PLUS DE 6 ENFANTS, UTILISEZ UN/DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES.			
		ENFANT 1	ENFANT 2	ENFANT 3
102	VÉRIFIEZ TABLEAU MÉNAGE : NUMÉRO DE LIGNE DE LA COL.11 . NOM DE LA COL. 2	NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> NOM _____
109	VÉRIFIEZ 103: L'ENFANT A 0-5 MOIS, C'EST-À-DIRE QU'IL EST NÉ DURANT LE MOIS DE L'ENQUÊTE OU DANS LES 5 MOIS PRÉCÉDENTS ?	0-5 MOIS 1] (ALLEZ À 114) ←] PLUS ÂGÉ 2	0-5 MOIS 1] (ALLEZ À 114) ←] PLUS ÂGÉ 2	0-5 MOIS 1] (ALLEZ À 114) ←] PLUS ÂGÉ 2
110	NUMÉRO DE LIGNE DU PARENT/AUTRE ADULTE RESPONSABLE DE L'ENFANT DE LA COLONNE 1 DU TABLEAU MÉNAGE .	NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> (INSCRIVEZ '00' SI NON LISTÉ)	NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> (INSCRIVEZ '00' SI NON LISTÉ)	NUMÉRO DE LIGNE <input type="text"/> <input type="text"/> (INSCRIVEZ '00' SI NON LISTÉ)

NOTES POUR LES BIOMARQUEURS

- (1) Cette section doit être adaptée selon le plan de l'enquête spécifique au pays.
- (2) On suppose que l'année de la collecte est 2018. Pour la collecte commençant en 2019, toutes les références aux années de calendrier doivent être augmentées d'une année ; par exemple, 2012 doit être changé en 2013, 2013 doit être changé en 2014, 2014 doit être changé en 2015, et ainsi de suite pour toutes les années dans tout le questionnaire.
- (3) Dans les pays où les balances indiquent le poids avec une seule décimale, gardez seulement une case après la décimale et supprimez le premier '9' des trois autres codes.
- (4) Les questions doivent être supprimées dans les pays où le test du VIH n'est pas inclus dans l'enquête.

AUTRES OUTILS DU PROGRAMME DHS

Le Website du DHS Program – Télécharger gratuitement les rapports DHS, la documentation standard, les données sur les indicateurs clé ainsi que les outils de formation et les annonces.	DHSprogram.com		
STATcompiler – Créer des tableaux, des graphiques et des cartes personnalisés, en utilisant les données de 90 pays et des milliers d'indicateurs.	Statcompiler.com		
Programme DHS pour les appareils mobiles – Accéder aux indicateurs clés DHS pour 90 pays sur votre appareil mobile (Apple, Android, ou Windows).	Recherchez DHS Program dans iTunes ou Google Play Store		
Programme DHS pour utiliser les forum – Poster des questions sur les données DHS et rechercher les FAQ.	userforum.DHSprogram.com		
Vidéos d'animation – Regarder les interviews avec des experts et apprendre les bases de DHS, comme l'échantillonnage et la pondération, télécharger des ensembles de données et apprendre comment lire les tableaux DHS.	www.youtube.com/DHSProgram		
Ensemble de données – Télécharger des ensembles de données pour l'analyse.	DHSprogram.com/Data		
Spatial Data Repository – Télécharger des données démographiques et de santé localisées géographiquement pour les représenter sous forme de carte dans un système d'information géographique (SIG).	spatialdata.DHSprogram.com		
Media sociaux – Suivre le DHS Program et participer aux discussions. Rester en contact par l'intermédiaire de :			
 Facebook www.facebook.com/DHSprogram		 LinkedIn www.linkedin.com/company/dhs-program	
 YouTube www.youtube.com/DHSprogram		 Blog Blog.DHSprogram.com	
 Twitter www.twitter.com/DHSprogram			