


Le VIH/Sida dans l'Enquête Démographique et de Santé à Indicateurs Multiples au Sénégal 2010-11 (EDS-MICS)

Au cours de l'Enquête Démographique et de Santé à Indicateurs Multiples du Sénégal de 2010-11, plus de 5 300 femmes et 4 500 hommes ont été testés pour le VIH. Les résultats montrent que 0,7 % des personnes de 15-49 ans sont infectées par le VIH (VIH-1 et VIH-2).

Prévalence du VIH

■ Femmes de 15-49 ans ■ Hommes de 15-49 ans ■ Ensemble de 15-49 ans

Pourcentage




La prévalence du VIH est supérieure chez les femmes que les hommes : il en résulte un ratio d'infection entre les femmes et les hommes de 1,6 (il y a 160 femmes infectées pour 100 hommes). Il y a des écarts au niveau du milieu de résidence : la prévalence du VIH est deux fois plus élevée parmi les hommes vivant en milieu rural (0,6 %) que les hommes vivant en milieu urbain (0,3 %).

Tendances de la prévalence du VIH

■ EDS-IV 2005 ■ EDS-MICS 2010-11


Pourcentage



Les résultats de l'EDS-MICS montrent qu'il n'y a aucune changement dans la prévalence du VIH au Sénégal. Les petites différences ne représentent pas de changements significatifs.


Prévalence du VIH par âge

◆ Femmes ◆ Hommes



Les femmes sont infectées plus précocement que les hommes. Les taux d'infection des femmes et des hommes augmentent rapidement avec l'âge pour atteindre un maximum à 45-49 ans pour les femmes et à 40-44 ans pour les hommes.


Prévalence du VIH par région



La prévalence du VIH est la plus élevée à Kolda (2,4 %) et Kédougou (1,7 %). Les niveaux de prévalence les plus faibles sont observés à Louga (0,1 %) et Diourbel (0,2 %).

Prévalence du VIH selon le niveau d'instruction


■ Femmes 15-49 ■ Hommes 15-49



Les hommes ayant une instruction primaire sont les moins infectés ; chez les femmes, celles ayant une instruction moyenne/secondaire ou plus sont les moins infectées. La prévalence du VIH est la plus élevée parmi les hommes n'ayant aucune instruction et parmi les femmes ayant une instruction primaire.

Prévalence du VIH selon le statut matrimonial


■ Femmes 15-49 ■ Hommes 15-49



D'importants écarts sont observés selon le statut matrimonial ; les femmes en rupture d'union (4,6 %) ont une prévalence environ six fois plus élevée que celles en union (0,8 %). La prévalence du VIH est la plus faible chez les hommes et les femmes qui sont veufs (<0,1 %).

2010-11 Enquête Démographique et de Santé à Indicateurs Multiples au Sénégal (EDS-MICS)


Prévalence du VIH selon le niveau de bien-être économique du ménage



Il n'y a pas d'association entre la prévalence et le niveau de bien-être économique du ménage.

Parmi les couples vivant dans le même ménage et dont les deux conjoints ont été testés, 1 % des couples sont discordants, ce qui veut dire que seulement un des deux conjoints est séropositif.

Prévalence du VIH parmi les jeunes de 15-24 ans



La prévalence du VIH est trois fois plus élevée parmi les jeunes vivant en milieu rural (0,3 %) que les jeunes vivant en milieu urbain (0,1 %).

Taux de réponse et méthodologie : Les données sur la prévalence du VIH ont été obtenues à partir d'un échantillon de gouttes de sang séché, prélevées volontairement par piqûre au bout du doigt auprès des femmes de 15-49 ans et des hommes de 15-59 ans. Près de 84 % des femmes et 76 % des hommes ont été testés. Dans l'ensemble, 80 % des 12 347 enquêtés ont été testés.

Pour tous renseignements concernant l'EDS-MICS 2010-11, contacter:

Au Sénégal :

L'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)
Rue de Saint Louis x Rue de Diourbel - Point E B.P. 116
Dakar RP (Sénégal)
Téléphone : (221) 33 869 21 40
Fax : (221) 33 824 36 15
E-mail : statsenegal@ansd.sn / statsenegal@yahoo.fr
Site web : www.ansd.sn

Aux États-Unis :

MEASURE DHS, ICF International
11785 Beltsville Drive
Calverton, MD 20705 USA
Telephone : 301-572-0200
Fax : 301-572-0999
Site web : www.measuredhs.com

L'Enquête Démographique et de Santé à Indicateurs Multiples du Sénégal de 2010-11 (EDS-MICS) a été réalisée au Sénégal d'octobre 2010 à avril 2011 par l'ANSD avec l'assistance technique d'ICF International, l'organisme américain en charge du programme international des EDS (Demographic and Health Surveys-DHS) et du Centre de Recherche pour le Développement Humain (CRDH) du Sénégal. L'EDS-MICS a bénéficié de l'appui financier de l'USAID, de l'UNICEF, du Fonds Mondial, de la Cellule de Lutte contre la Malnutrition (CLM) et de l'UNFPA. Le Laboratoire de Bactériologie et de Virologie du CHU Le Dantec a apporté son appui dans la mise en oeuvre du volet portant sur le test du VIH.



VIH/Sida