


## Prévalence du VIH au Burkina Faso : résultats de l'EDSBF-MICS IV


Au cours de l'Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples de 2010, 8 384 femmes et 7 086 hommes ont été testés pour le VIH. Les résultats montrent que 1,0 % des personnes de 15-49 ans sont infectées par le VIH.

### Prévalence du VIH




La prévalence du VIH est plus élevée chez les femmes que chez les hommes : il y a 150 femmes infectées pour 100 hommes. Les écarts au niveau du milieu de résidence sont importants : la prévalence du VIH est près de trois fois plus élevée parmi les hommes vivant en milieu urbain (1,4 %) que parmi ceux vivant en milieu rural (0,5 %) ; chez les femmes, elle est près de quatre fois plus élevée en milieu urbain (2,6 %) qu'en milieu rural (0,7 %).

### Tendances de la prévalence du VIH




Depuis 2003, on a assisté à une baisse significative de la prévalence, en particulier chez les hommes.

### Prévalence du VIH par âge




Les taux d'infection des femmes et des hommes augmentent rapidement avec l'âge pour atteindre un maximum à 30-34 ans pour les femmes et à 40-44 ans pour les hommes.

### Prévalence du VIH par région




C'est dans les régions du Centre (2,0 %), du Centre-Ouest (1,7 %) et dans les Hauts Bassins (1,4 %) que la prévalence est la plus élevée. À l'opposé, c'est dans le Plateau Central (0,2 %), le Sahel (0,3 %) et l'Est (0,4 %) qu'elle est la plus faible.

### Prévalence du VIH selon le niveau d'instruction



C'est parmi les hommes et les femmes sans instruction que la prévalence est la plus faible et parmi ceux qui ont, au moins, un niveau secondaire qu'elle est la plus élevée.

### Prévalence du VIH selon le statut matrimonial




\*Trop peu de cas.

D'importants écarts sont observés selon le statut matrimonial des femmes : celles en rupture d'union (8,1 %) ont une prévalence environ sept fois plus élevée que celles en union (1,1 %). Chez les hommes, les variations sont très faibles.

# Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples du Burkina Faso (EDSBF-MICS IV) 2010


## Prévalence du VIH selon le niveau de bien-être économique du ménage



De façon générale, la prévalence du VIH a tendance à augmenter des ménages du quintile le plus pauvre au quintile le plus riche, passant de 0,7 % à 2,5 % chez les femmes, et de 0,7 % à 1,4 % chez les hommes.

Parmi les couples vivant dans le même ménage et dont les deux conjoints ont été testés, 1,2 % sont discordants, ce qui signifie que seulement un des deux conjoints est séropositif. Dans 0,2 % des couples, les deux conjoints ont été testés positifs.

## Prévalence du VIH parmi les jeunes de 15-24 ans



La prévalence du VIH est huit fois plus élevée parmi les jeunes vivant en milieu urbain (0,8 %) que parmi les jeunes vivant en milieu rural (0,1 %).

*Taux de réponse et méthodologie : Les données sur la prévalence du VIH ont été obtenues à partir d'un échantillon de gouttes de sang séché, prélevées volontairement par piqûre au bout du doigt auprès des femmes de 15-49 ans et des hommes de 15-59 ans. Près de 96 % des femmes et 94 % des hommes ont été testés. Dans l'ensemble, 95 % des 16 176 enquêtés ont été testés.*

Pour tous renseignements concernant l'EDSBF-MICS IV 2010, contacter:

### Au Burkina Faso :

Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD)  
Avenue Pascal ZAGRE, Ouaga 2000  
01 BP 374 Ouagadougou 01  
Téléphone : (226) 50 37 62 04 ou 50 47 80 51 ou 50 49 85 02  
Fax : (226) 50 37 62 26  
E-mail : insdbf@yahoo.fr/ insd@insd.bf  
Site web : www.insd.bf

### Aux États-Unis :

MEASURE DHS, ICF International  
11785 Beltsville Drive  
Calverton, MD 20705 USA  
Téléphone : 301-572-0200  
Fax : 301-572-0999  
Site web : www.measuredhs.com

L'Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples du Burkina Faso de 2010 (EDSBF-MICS IV) a été réalisée du 20 mai 2010 au 31 décembre 2010 par l'INSD avec l'appui technique d'ICF International, basé aux États-Unis d'Amérique et en charge du programme international des EDS (Demographic and Health Surveys-DHS). L'EDSBF-MICS IV a bénéficié de l'appui financier de la Coopération Néerlandaise (par l'intermédiaire du PADS), de la Banque Mondiale (par l'intermédiaire du SP/CNLS-IST), de l'USAID, de l'UNFPA, de l'UNICEF et de la Coopération suédoise (par l'intermédiaire du projet Statistique Suède (SCB)). Le Laboratoire de Bactériologie et de Virologie du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Ouagadougou (CRTS/O) a réalisé l'analyse des échantillons de sang en vue de déterminer la prévalence du VIH. Le contrôle externe de qualité a été effectué par le Centre Muraz de Bobo-Dioulasso.



## Prévalence du VIH