

Santé Maternelle et Infantile en Haïti

EMMUS-VI 2016-2017 et EPSSS-II 2017-2018


La sixième enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services (EMMUS-VI 2016-2017) a été réalisée en Haïti de novembre 2016 à avril 2017 pour le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) par l'Institut Haïtien de l'Enfance (IHE) en collaboration avec l'Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique (IHSI). L'EMMUS-VI a été réalisée grâce à l'appui financier de l'USAID à travers ICF, du Gouvernement du Canada accordé par l'entremise du MAECD, de l'UNICEF, de l'UNFPA, de la Banque Mondiale à travers le projet PASMISSEI, et du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme, à travers PSI/OHMASS. D'autres institutions ont également apporté leur expertise à la réalisation de cette opération, en particulier, le Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) et les laboratoires GHESKIO pour la réalisation des tests du VIH.

La deuxième Évaluation de la Prestation des Services de Soins de Santé (EPSSS-II 2017-2018), commanditée par le MSPP et réalisée en Haïti de décembre 2017 à mai 2018 par l'IHE. L'EPSSS-II a été réalisée avec l'appui financier de l'USAID, la Banque Mondiale, et le Fonds Mondial. L'EMMUS-VI et l'EPSSS-II ont bénéficié de l'assistance technique d'ICF par le biais du The DHS Program, financé par l'USAID.

EMMUS-VI 2016-2017		
ÉCHANTILLON	EFFECTIF	Taux de Réponse
Ménages	13 405	>99 %
Femmes de 15-49 ans	14 371	99 %
Femmes de 50-64 ans	1 142	99 %
Hommes de 15-64 ans	9 795	98 %
Hommes de 35-64 ans	2 091	98 %

EPSSS-II 2017-2018	
ÉCHANTILLON	EFFECTIF
Hôpital	131
Centre de santé avec lit	163
Centre de santé sans lit	361
Dispensaire/CCS	352
Prestataires interviewés	4 680
Consultations observées	4 833

© Prénant par Andrew McKinley, avec la permission de The Noun Project




2 femmes sur **3**

effectuent au moins 4 visites prénatales.


Consultations observées pour les femmes enceintes venues en consultation prénatale (CPN)

Pourcentage de femmes enceintes venues en CPN (N=1 526) dont les consultations avaient inclus:

EXAMEN PHYSIQUE DE BASE



INTERVENTIONS PRÉVENTIVES




*Enceinte d'au moins 8 mois (N=342)

**Enceinte d'au moins 5 mois (N=935)

Disponibilité des services de santé maternelle


Pourcentage de toutes les institutions (N=1 007) offrant des services de :




1 institution de santé sur **10** offre des services de CPN, accouchement normal et césarienne.

Capacité de diagnostic parmi les institutions offrant des services de CPN

Parmi les institutions offrant les services de CPN (N=922), pourcentage qui ont:





2 naissances sur **5**
ont été assistées par un prestataire
formé.




70 % des femmes enceintes
ont effectué un test du VIH au cours
d'une visite prénatale et ont reçu les
résultats.

Sur 100 000 naissances vivantes, **529** mères haïtiennes meurent
pendant la grossesse, l'accouchement ou les 42 jours suivant.


Directives, personnel formé et équipement dans les services d'accouchement

Parmi les institutions de santé offrant des services
d'accouchement normal (N=361), pourcentage ayant :



Actes de base pour les soins obstétricaux d'urgence


Parmi les institutions de santé offrant des services
d'accouchement normal (N=361), pourcentage qui ont
effectué les actes indiqués au moins une fois
au cours des trois mois précédant l'enquête :



43 % des institutions offrant des
services d'accouchement disposent
de transport d'urgence toujours.

26 % des institutions offrant des
services d'accouchement ont effectué
une césarienne au moins une fois au
cours 3 derniers mois.


41 % d'enfants de 12-23 mois ont reçu tous les 8 vaccins de base.



58 % des institutions offrant des services de vaccination infantile avaient tous les vaccins infantiles de base disponibles le jour de l'enquête.


Disponibilité des vaccins infantiles

Parmi les institutions offrant des services de vaccination infantile et stockant les vaccins (N=537), pourcentage où les vaccins indiqués non périmés ont été observés comme disponibles le jour de l'enquête




Directives, personnel formé et équipement pour les services de suivi de la croissance

Parmi les institutions offrant des soins curatifs ambulatoires pour les enfants malades (N=958), pourcentage disposant de :



1/3 des institutions offrant des soins curatifs infantiles disposent du personnel formé sur le suivi de la croissance.




1 enfant de moins de cinq ans sur **5** est atteint de sous-nutrition chronique (trop court pour son âge).



2 enfants de moins de six mois sur **5** sont exclusivement allaités.

Recherche des conseils ou un traitement pour les maladies infantiles


Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant présenté des symptômes des maladies indiquées au cours des 2 semaines précédant l'enquête, pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement



Des conseils ou un traitement ont été recherchés pour moins de **2** enfants malades sur **5**.

Disponibilité des médicaments essentiels

Parmi les institutions offrant des soins curatifs ambulatoires pour enfants malades (N=958), pourcentage où les médicaments essentiels ont été observés comme disponibles le jour de l'enquête



*en sirop, suspension buvable, comprimé ou effervescent

Plus de **80 %** des institutions offrant des soins curatifs infantiles disposent de mebendazole/albendazole, amoxicilline, cotrimoxazole et chloroquine.

Évaluation, examen médical et conseils essentiels

Parmi les enfants malades dont les consultations par prestataire de santé ont été observées (N=2 166), pourcentage où les éléments indiqués ont été observés :


ÉVALUATION DES SIGNES GÉNÉRAUX DE DANGER




ANTÉCÉDENTS : ÉVALUATION DU SYMPTÔME PRINCIPAL



EXAMEN MÉDICAL



CONSEILS ESSENTIELS POUR LES RESPONSABLES DE L'ENFANT



Tous les signes généraux de danger n'ont été évalués dans **aucune** consultation d'enfants malades.

Tous les 3 symptômes principaux ont été évalués dans **1** consultation sur **5**.

1 enfant haïtien sur **12** n'atteint pas son cinquième anniversaire.