


2021 Enquête sur les Indicateurs du Paludisme au Niger

L'Enquête sur les Indicateurs du Paludisme au Niger (EIPN) 2021 fournit des informations sur le paludisme.

POSSESSION DE MII

Possession de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) par région

Pourcentage de ménages ayant au moins une MII



96 % des ménages possèdent au moins 1 **moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)**.

La possession de MII varie selon la région, de **79 %** à Diffa à **99 %** à Zinder.


UTILISATION DE MII

86 % des enfants de moins de 5 ans et

90 % des femmes enceintes ont dormi sous une MII la nuit avant l'interview, une augmentation énorme par rapport à 2012.

Tendances d'utilisation des MII par les enfants et les femmes enceintes

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans et de femmes enceintes de 15-49 ans ayant utilisé une MII la nuit avant l'interview




Dans les enquêtes EDSN 2006, EDSN 2012, et EIPN 2021 la définition d'une MII incluait les moustiquaires qui ayant été trempées dans une insecticide contre les moustiques au cours des 12 derniers mois.

LA PRÉVALENCE DU PALUDISME

Prévalence du paludisme selon l'âge

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont les résultats du TDR étaient positifs



29 % d'enfants de 6-59 mois ont testés positifs pour le paludisme selon le test diagnostic rapide (TDR).

