




Burkina Faso

La 5ème Enquête Démographique et de Santé (EDSBF-V 2021) au Burkina Faso fournit des données pour effectuer le suivi et l'évaluation de la situation sanitaire au Burkina Faso. Au cours de l'enquête, 17 659 femmes et 7 720 hommes ont été interviewés avec succès.


Eau, Assainissement, Hygiène

6 personnes sur 10 au Burkina Faso utilisent au moins un service élémentaire d'eau de boisson.




Service d'assainissement selon le milieu de résidence

Répartition (en %) de la population des ménages par échelle des services d'assainissement




Tendances des mesures de la croissance de l'enfant

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans atteints de malnutrition



Prévalence d'insécurité alimentaire sévère selon la région


Pourcentage de la population des ménages en situation d'insécurité alimentaire sévère



Nutrition

Tendances de l'utilisation des MII

Pourcentage de la population des ménages, des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes ayant dormi sous une MII la nuit avant l'interview



Paludisme



Plus de **4 ménages sur 5** au Burkina Faso ont au moins une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII).

Note : Une MII est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Dans les EDS précédentes, les MII étaient appelées moustiquaires imprégnées à longue durée d'action (MILDA). Depuis 2014, toutes les MII au Burkina Faso sont presque exclusivement des MILDA.