


COMORES

Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples (EDSC-MICS II) 2012

Fécondité

Le niveau de fécondité a baissé de 5,1 enfants par femme en 1996 à 4,3 enfants par femme en 2012.

Nombre d'enfants par femme pour la période de trois ans avant l'enquête




*Pour la période de cinq années ayant précédé l'enquête.
**Pour la période de trois années ayant précédé l'enquête.

Planification familiale

L'utilisation des méthodes contraceptives modernes a augmenté légèrement depuis 1996 et l'utilisation de méthodes traditionnelles a légèrement baissé.


Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union qui utilisent :



Santé de la mère

Près de la moitié de mères (49 %) ont effectué au moins les quatre visites prénatales recommandées et la grande majorité (82 %) ont reçu l'assistance de personnel formé au cours de leur dernier accouchement.


Pourcentage des :



Nutrition

Trois enfants sur dix (30 %) souffrent de malnutrition chronique et 11 % des enfants souffrent de malnutrition aiguë

Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans selon leur état nutritionnel*



*Selon les Normes OMS de la croissance de l'enfant adoptées en 2006

Le niveau de mortalité des enfants

En 1996, environ un enfant sur dix n'atteignait pas son cinquième anniversaire. En 2012, un enfant sur vingt décède avant l'âge de cinq ans.

Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période de cinq ans ayant précédé l'enquête

