

Dans de nombreux pays, on possède peu de données sur la pratique de l'avortement. Souvent mal considérée du point de vue social et culturel, illégale et interdite sur le plan religieux, comme c'est le cas en Haïti, il est généralement très difficile d'en obtenir une mesure. Pourtant, en Haïti, il est généralement admis que l'avortement n'est pas un phénomène marginal, ce qui n'est peut-être pas surprenant lorsqu'on sait que près d'un tiers des naissances survenues récemment n'étaient pas souhaitées et que deux femmes sur cinq ont des besoins non satisfaits en matière de contraception (voir Chapitre 8 : Préférences en matière de fécondité). Pour essayer de mieux cerner cette pratique, l'EMMUS-III a inclus des questions sur l'avortement dans le cadre des informations relatives aux indicateurs se rapportant à la santé reproductive. Les résultats obtenus fournissent une estimation de la fréquence de l'avortement ; ils permettent de connaître la durée de grossesse au moment de l'avortement et ils fournissent également des informations sur le type de procédure, les complications éventuelles qui ont suivi l'avortement, la personne qui a pris la décision d'avorter, ainsi que sur le rôle des hommes dans cette prise de décision.

5.1 NOMBRE D'AVORTEMENTS

Le tableau 5.1 présente la répartition de l'ensemble des femmes par nombre d'avortements qu'elles ont eus au cours de leur vie, selon certaines caractéristiques socio-démographiques. On constate, en premier lieu, que parmi l'ensemble des femmes, 7 % ont déclaré avoir eu recours à l'avortement, au moins une fois, au cours de leur vie. Comme cela a déjà été souligné précédemment, l'avortement étant illégal en Haïti, interdit par la religion et mal considéré du point de vue social et culturel, on peut penser que, pendant l'enquête, certaines femmes n'ont pas déclaré avoir eu recours à cette pratique. Il faut donc considérer la prévalence déclarée comme étant sous-estimée et comme étant une valeur minimale de la pratique de l'avortement en Haïti.

Cependant, selon l'EMMUS-II de 1994-95, 3 % des femmes ayant déjà eu des rapports sexuels avaient déclaré avoir eu recours à, au moins, un avortement au cours de leur vie. Si on recalcule cette proportion dans la même sous-population de femmes d'après l'EMMUS-III, la proportion correspondante est de 9 %. De même, selon les résultats de l'ENAC effectuée en Haïti en 1989, la proportion de femmes déjà enceintes qui avaient déclaré avoir eu, au moins, un avortement au cours de leur vie était de 6 %. Si on recalcule cette proportion dans la même sous-population de femmes d'après l'EMMUS-III, la proportion correspondante est de 11 %. Ainsi, de 1989 à 2000, la proportion de femmes ayant déclaré avoir eu recours à l'avortement au cours de leur vie est en augmentation. Cela ne signifie pas pour autant que cette augmentation soit le reflet d'une hausse réelle de la pratique de l'avortement en Haïti ; elle peut aussi résulter d'une amélioration du taux de déclaration de l'avortement. Parmi les femmes ayant déclaré avoir avorté, la majorité (4 %) n'y ont eu recours qu'une seule fois.

On constate bien évidemment que la fréquence de l'avortement augmente avec l'âge de la femme et le nombre d'enfants vivants : ainsi, 16 % des femmes de 40-49 ans ont déclaré avoir avorté, au moins, une fois au cours de leur vie contre 4 % à 25-29 ans. De plus, parmi les femmes de 40-49 ans, 10 % ont effectué un seul avortement tandis que 6 % ont déclaré avoir avorté deux fois ou plus.

Tableau 5.1 Nombre d'avortements

Répartition (en %) de l'ensemble des femmes par nombre d'avortements qu'elles ont eus au cours de leur vie, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EMMUS-III Haïti 2000

Caractéristique	Nombre d'avortements					Total ¹	Effectif de femmes
	Aucun	1	2	3	4 ou plus		
Groupe d'âges							
15-19	99,7	0,3	0,0	0,0	0,0	100,0	2 342
20-24	98,0	1,2	0,7	0,0	0,0	100,0	1 918
25-29	95,6	3,3	0,8	0,1	0,1	100,0	1 615
30-39	88,0	7,2	2,8	1,4	0,3	100,0	2 444
40-49	83,7	9,8	4,4	1,5	0,5	100,0	1 839
Nombre d'enfants vivants							
0	98,6	1,1	0,3	0,1	0,0	100,0	3 838
1-2	93,1	4,2	1,5	0,9	0,2	100,0	2 788
3-4	88,4	7,7	2,0	1,3	0,4	100,0	1 857
5 ou plus	85,2	8,3	5,1	0,7	0,4	100,0	1 677
Milieu de résidence							
Aire Métropolitaine	94,0	3,8	1,1	0,9	0,1	100,0	3 464
Autre urbain	93,3	4,7	1,1	0,4	0,3	100,0	1 195
Ensemble urbain	93,8	4,0	1,1	0,8	0,2	100,0	4 660
Rural	92,4	4,6	2,2	0,5	0,2	100,0	5 499
Département							
Aire Métropolitaine	94,0	3,8	1,1	0,9	0,1	100,0	3 464
Nord	93,8	4,6	1,1	0,2	0,1	100,0	852
Nord-Est	94,5	3,7	1,3	0,5	0,0	100,0	357
Nord-Ouest	93,2	4,4	1,6	0,4	0,0	100,0	381
Artibonite	91,2	5,9	2,4	0,2	0,1	100,0	1 507
Centre	91,7	4,4	3,5	0,0	0,4	100,0	704
Ouest	92,9	3,4	2,3	1,2	0,3	100,0	1 195
Sud	93,3	4,2	1,7	0,6	0,2	100,0	688
Sud-Est	93,6	4,6	0,8	0,6	0,1	100,0	500
Grande-Anse	90,8	5,3	2,4	0,7	0,5	100,0	512
Niveau d'instruction							
Aucun	88,4	6,9	3,2	0,9	0,4	100,0	2 496
Alphabét./Primaire	93,5	4,0	1,6	0,6	0,1	100,0	4 806
Secondaire ou plus	96,3	2,6	0,7	0,4	0,1	100,0	2 858
Ensemble des femmes	93,0	4,3	1,7	0,6	0,2	100,0	10 159

¹ Y compris les "non-déterminés"

Par ailleurs, la pratique de l'avortement ne varie qu'assez peu selon les autres caractéristiques socio-démographiques. Cependant, les résultats semblent montrer que la fréquence de l'avortement est légèrement plus élevée en milieu rural (8 %) qu'en milieu urbain (6 %). Du point de vue géographique, on ne constate pas non plus d'écart important; tout au plus, peut-on relever que la fréquence de l'avortement semble être plus élevée dans les départements de la Grande Anse et du Nord-Ouest (9 % dans les 2 cas) et de l'Artibonite (8 %) que dans le reste du pays. Par contre, on constate que les proportions de femmes qui ont avorté varient en fonction du niveau d'instruction, passant d'un maximum de 12 % chez les femmes sans instruction à un minimum de 4 % chez celles ayant un niveau secondaire. Ces écarts doivent néanmoins être interprétés avec prudence dans la mesure où ils peuvent, peut-être, en partie, résulter du simple fait que certaines femmes déclarent plus facilement que d'autres avoir eu recours à l'avortement et non correspondre totalement à une différence réelle de pratique.

5.2 AVORTEMENT AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

Dans le but d'obtenir des informations sur la pratique récente de l'avortement, mais aussi pour éviter d'interroger les femmes sur des événements lointains dont elles se souviennent difficilement, les questions les plus détaillées n'ont été posées que sur le dernier avortement ayant eu lieu depuis 1995.

On constate au tableau 5.2 que moins de 1 % des femmes ont déclaré avoir avorté, au moins, une fois au cours des cinq dernières années et cette proportion ne présente qu'assez peu de variations du point de vue des caractéristiques socio-démographiques. On peut néanmoins souligner que du point de vue de la résidence, la proportion de femmes ayant eu recours à, au moins, un avortement est plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural (1,3 % contre 0,4 %). Du point de vue géographique, la proportion de femmes ayant eu recours à l'avortement dans les cinq dernières années varie d'un maximum de 1,4 % dans l'Aire Métropolitaine à un minimum de 0,2 % dans les départements du Nord-Est, du Nord-Ouest et de la Grande Anse.

Les données présentées aux tableaux suivants ne portent donc que sur le dernier avortement des femmes qui ont avorté, au moins une fois, au cours des cinq dernières années. Le nombre de cas étudiés étant relativement faible, les différentes modalités ont été regroupées. Malgré cela, les écarts constatés selon les différentes caractéristiques socio-démographiques ne sont pas toujours statistiquement représentatifs et doivent être interprétés avec beaucoup de prudence.

Tableau 5.2 Avortement au cours des cinq dernières années

Pourcentage de femmes qui ont avorté au moins une fois au cours des cinq dernières années, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EMMUS-III Haïti 2000

Caractéristique	Pourcentage de femmes ayant avorté au cours des 5 dernières années	Effectif de femmes
Groupe d'âges		
15-19	0,3	2 342
20-24	1,0	1 918
25-29	1,0	1 615
30-39	1,1	2 444
40-49	0,6	1 839
Nombre d'enfants vivants		
0	0,6	3 838
1-2	1,2	2 788
3-4	0,7	1 857
5 ou plus	0,8	1 677
Milieu de résidence		
Aire Métropolitaine	1,4	3 464
Autre urbain	0,9	1 195
Ensemble urbain	1,3	4 660
Rural	0,4	5 499
Département		
Aire Métropolitaine	1,4	3 464
Nord	0,8	852
Nord-Est	0,2	357
Nord-Ouest	0,2	381
Artibonite	0,4	1 507
Centre	0,3	704
Ouest	0,5	1 195
Sud	0,7	688
Sud-Est	0,5	500
Grande-Anse	0,2	512
Niveau d'instruction		
Aucun	0,4	2 496
Alphabét./Primaire	0,5	4 806
Secondaire ou plus	1,6	2 858
Ensemble des femmes	0,8	10 159

Durée de la grossesse au moment de l'avortement

Le tableau 5.3 présente les résultats concernant la durée de grossesse au moment du dernier avortement. On constate que la majorité des femmes ont avorté entre 2 et 4 mois de grossesse (73 %). Pour une femme sur cinq (21 %), l'avortement a eu lieu à un stade très précoce (moins de 2 mois) alors que pour 7 % des femmes, il aurait eu lieu alors que la grossesse était à un stade avancé (5 mois ou plus). De façon générale, il semble que les femmes de l'Aire Métropolitaine et les plus instruites aient recours à l'avortement à un stade plus précoce de la grossesse que les autres.

Tableau 5.3 Durée de la grossesse au moment de l'avortement

Répartition (en %) des femmes qui ont avorté au moins une fois au cours des cinq dernières années selon la durée de la grossesse au moment du dernier avortement, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EMMUS-III Haïti 2000

Caractéristique	Durée de la grossesse au moment du dernier avortement			Total	Effectif de femmes ayant avorté au cours des 5 dernières années
	<2 mois	2-4 mois	5 mois ou plus		
Groupe d'âges					
15-29	(23,6)	(71,6)	(4,8)	100,0	43
30-49	(17,3)	(74,0)	(8,7)	100,0	37
Nombre d'enfants vivants					
0-2	(23,5)	(70,1)	(6,4)	100,0	54
3 ou plus	*	*	*	100,0	26
Milieu de résidence					
Aire Métropolitaine	(27,1)	(67,1)	(5,8)	100,0	50
Autre	(10,1)	(81,9)	(8,0)	100,0	30
Niveau d'instruction					
Aucun/Alphabét./Primaire	(10,3)	(82,9)	(6,8)	100,0	35
Secondaire ou plus	(28,9)	(64,6)	(6,5)	100,0	44
Ensemble des femmes	20,7	72,7	6,6	100,0	80

() Basé sur un faible nombre de cas non-pondérés.

* Basé sur trop peu de cas non-pondérés.

Procédure d'avortement

Aux femmes qui ont déclaré avoir eu recours, au moins une fois, à un avortement au cours des cinq dernières années, on a demandé quelle procédure avait été utilisée (tableau 5.4). Pour près des trois quarts des femmes, la dilatation/curetage (69 %) et l'aspiration (4 %) ont été les méthodes utilisées. Cependant, pour plus d'une femme sur quatre (28 %), l'avortement a été effectué selon des méthodes traditionnelles. On peut noter que le recours aux méthodes traditionnelles est beaucoup plus fréquent chez les femmes résidant en dehors de l'Aire Métropolitaine (45 % contre 17 % dans la capitale) et chez les femmes les moins instruites (45 % contre 14 % chez les femmes de niveau secondaire ou plus).

Tableau 5.4 Procédure d'avortement

Parmi les femmes qui ont avorté au moins une fois au cours des cinq dernières années, pourcentage de celles ayant utilisé différents moyens et/ou procédures pour leur dernier avortement, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EMMUS-III Haïti 2000

Caractéristique	Dilatation/ curetage	Aspira- tion	Méthodes tradition- nelles	Total	Effectif de femmes ayant avorté au cours des 5 dernières années
Groupe d'âges					
15-29	(71,1)	(7,6)	(21,3)	100,0	43
30-49	(65,4)	(0,0)	(34,6)	100,0	37
Milieu de résidence					
Aire Métropolitaine	(80,1)	(2,8)	(17,1)	100,0	50
Autre	(49,4)	(6,1)	(44,5)	100,0	30
Niveau d'instruction					
Aucun/Alphabét./Primaire	(49,9)	(5,2)	(44,9)	100,0	35
Secondaire ou plus	(83,3)	(3,1)	(13,5)	100,0	44
Ensemble des femmes	68,5	4,1	27,5	100,0	80

() Basé sur un faible nombre de cas non-pondérés.

Décision de l'avortement

On a également demandé aux femmes qui ont déclaré avoir avorté, au moins une fois, au cours des cinq dernières années, qui avait pris la décision d'avorter. Dans près des trois quarts des cas, l'enquêtée a déclaré qu'elle avait pris elle-même cette décision (tableau 5.5). Cependant, dans plus d'un cas sur quatre (28 %), c'est une autre personne qui a décidé. On ne constate ici pratiquement aucune variation selon les différentes caractéristiques socio-démographiques.

Tableau 5.5 Décision de l'avortement

Répartition (en %) des femmes qui ont avorté au moins une fois au cours des cinq dernières années selon que l'enquêtée a décidé elle-même ou non de l'avortement, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EMMUS-III Haïti 2000

Caractéristique	L'enquêtée a décidé elle-même d'avorter	Autre personne	Total	Effectif de femmes ayant avorté au cours des 5 dernières années
Groupe d'âges				
15-29	(73,7)	(26,3)	100,0	43
30-49	(71,1)	(28,9)	100,0	37
Milieu de résidence				
Aire Métropolitaine	(76,6)	(23,4)	100,0	50
Autre	(65,7)	(34,3)	100,0	30
Niveau d'instruction				
Aucun/Alphabét./Primaire	(70,7)	(29,3)	100,0	35
Secondaire ou plus	(73,9)	(26,1)	100,0	44
Ensemble des femmes	72,5	27,5	100,0	80

() Basé sur un faible nombre de cas non-pondérés.

Complications après l'avortement

Des questions ont également été posées aux femmes pour savoir si elles avaient eu des complications après le dernier avortement (tableau 5.6). Un tiers des femmes (33 %) ont déclaré avoir eu des complications après le dernier avortement. On peut noter que la proportion de femmes ayant eu des complications est légèrement plus élevée chez les femmes les plus jeunes (37 % à 15-29 ans contre 27 % à 30-49 ans), et chez les femmes les moins instruites (40 % contre 27 % chez celles ayant un niveau secondaire ou plus).

5.3 RÔLE DES HOMMES DANS L'AVORTEMENT

Au cours de l'enquête auprès des hommes, on leur a demandé si, au cours de leur vie, il leur était arrivé que leur (ou une de leurs) femme(s) ou partenaire(s) tombe(nt) enceinte alors qu'ils ne le souhaitaient pas.

Dans le cas de réponse affirmative, on leur a demandé quelle avait été leur réaction la dernière fois que cela était arrivé. Ces questions ont pour but d'essayer de déterminer le niveau d'implication de l'homme dans la décision d'avorter.

Au tableau 5.7, on constate tout d'abord que parmi les hommes ayant déjà eu des rapports sexuels, un sur cinq (21 %) a déclaré qu'au cours de sa vie, il lui était arrivé, au moins une fois, que sa (ou l'une de ses) partenaire(s) était tombée enceinte alors qu'il ne le souhaitait pas. Comme on pouvait s'y attendre, on constate de fortes variations par âge, les proportions passant de moins de 1 % à 15-19 ans et de 13 % à 20-24 ans à près de 40 % à 30-39 ans et 45-49 ans.

Parmi les hommes dont une partenaire était tombée enceinte alors qu'ils ne le souhaitaient pas, la grande majorité (83 %) n'a pris aucune décision la dernière fois que cela est arrivé. Par contre, dans 16 % des cas, l'homme a demandé à sa femme ou partenaire d'avorter. Si l'on considère les résultats selon les caractéristiques socio-démographiques, on relève de fortes variations. Selon l'âge, on constate que les proportions d'hommes qui ont demandé à leur partenaire d'avorter diminuent au fur et à mesure que l'âge augmente, passant de 26 % à 20-29 ans à 3 % à 45-49 ans, pour augmenter à nouveau chez les hommes de 50-54 ans (23 %). Par ailleurs, les hommes du milieu urbain (34 %) et les plus instruits (37 %) ont demandé plus fréquemment que ceux du milieu rural (6 %) et que ceux sans instruction (4 %) à leur partenaire d'avorter. De même, il semble que le comportement des hommes face à l'avortement soit différent d'un département à un autre, les proportions d'hommes ayant demandé à leur partenaire d'avorter variant d'un minimum de 2 % dans l'Ouest à un maximum de 38 % dans l'Aire Métropolitaine.

Tableau 5.6 Complications après l'avortement

Proportion de femmes qui ont avorté au moins une fois au cours des cinq dernières années et qui ont déclaré avoir eu des complications après le dernier avortement, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EMMUS-III Haïti 2000

Caractéristique	Proportion ayant déclaré avoir eu des complications après le dernier avortement	Effectif de femmes ayant avorté au cours des 5 dernières années
Groupe d'âges		
15-29	(37,2)	43
30-49	(27,1)	37
Milieu de résidence		
Aire Métropolitaine	(34,0)	50
Autre	(30,1)	30
Niveau d'instruction		
Aucun/Alphabét./Primaire	(39,6)	35
Secondaire ou plus	(26,9)	44
Ensemble des femmes	32,5	80

() Basé sur un faible nombre de cas non-pondérés.

Tableau 5.7 Rôle des hommes dans l'avortement

Pourcentage d'hommes ayant déjà eu des rapports sexuels et dont la femme/partenaire est tombée au moins une fois enceinte alors qu'ils ne le souhaitaient pas et répartition de ces hommes selon leur réaction par rapport à la grossesse, la dernière fois que cela est arrivé, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EMMUS-III Haïti 2000


Caractéristique	Pourcentage d'hommes ayant eu une femme/partenaire enceinte alors qu'ils ne le voulaient pas	Effectif d'hommes ayant déjà eu des rapports sexuels	Comportement par rapport à la grossesse			Total	Effectif d'hommes avec femme/partenaire enceinte alors qu'ils ne le voulaient pas
			A demandé à sa femme/partenaire d'avorter	N'a rien fait	Autre		
Groupe d'âges							
15-19	0,7	768	*	*	*	100,0	5
20-24	13,4	512	27,1	65,7	7,2	100,0	69
25-29	18,1	448	25,6	74,4	0,0	100,0	81
30-34	38,8	291	18,1	81,4	0,5	100,0	113
35-39	40,1	298	10,1	89,1	0,8	100,0	120
40-44	31,7	282	10,3	89,7	0,0	100,0	89
45-49	40,3	209	3,1	96,9	0,0	100,0	84
50-54	30,4	219	23,1	76,9	0,0	100,0	67
55-59	30,6	143	(17,5)	(82,5)	(0,0)	100,0	44
Milieu de résidence							
Aire Métropolitaine	20,2	811	37,6	62,4	0,0	100,0	164
Autre urbain	22,9	356	25,9	73,5	0,6	100,0	81
Ensemble urbain	21,0	1 166	33,7	66,1	0,2	100,0	245
Rural	21,3	2 005	6,4	92,2	1,4	100,0	427
Département							
Aire Métropolitaine	20,2	811	37,6	62,4	0,0	100,0	164
Nord	24,1	280	14,4	85,6	0,0	100,0	67
Nord-Est	20,7	100	4,2	95,8	0,0	100,0	21
Nord-Ouest	24,7	136	5,4	91,8	2,8	100,0	34
Artibonite	21,1	525	12,0	87,5	0,5	100,0	110
Centre	17,1	245	(5,9)	(94,1)	(0,0)	100,0	42
Ouest	19,7	466	1,9	92,7	5,4	100,0	92
Sud	18,1	241	18,5	81,5	0,0	100,0	44
Sud-Est	23,8	160	14,8	85,2	0,0	100,0	38
Grande-Anse	29,2	207	7,9	92,1	0,0	100,0	61
Niveau d'instruction							
Aucun	22,3	531	4,2	95,0	0,8	100,0	118
Alphabét./Primaire	21,0	1 536	6,3	93,6	0,2	100,0	323
Secondaire ou plus	20,9	1 104	36,7	61,1	2,1	100,0	230
Ensemble des hommes	21,2	3 171	16,4	82,7	1,0	100,0	671

() Basé sur un faible nombre de cas non-pondérés.

* Basé sur trop peu de cas non-pondérés.

Le graphique 5.1 présente les données concernant l'issue de la grossesse pour laquelle l'homme avait demandé à sa partenaire d'avorter. On constate que dans 45 % des cas, la grossesse s'est effectivement terminée par un avortement provoqué alors que, dans la moitié des cas, la grossesse s'est terminée par une naissance vivante. Dans la mesure où l'on ne connaît pas ici l'opinion de la femme quant à l'issue de cette grossesse, il est difficile de conclure quant à l'impact réel de la décision de l'homme.

Graphique 5.1 Issue des grossesses pour lesquelles l'homme avait demandé à la femme d'avorter



EMMUS-III 2000