

*Léopoldine de Souza  
Martin H. Laourou  
Gora Mboup  
Justin Y. Tossou*

Depuis près d'une décennie, la lutte contre les infections sexuellement transmissibles (IST) et le sida est l'un des volets prioritaires de la politique sanitaire du Bénin. Les IST et le sida font actuellement partie des pathologies principales au Bénin. Toutefois, les mesures prises dans le cadre du Programme National de Lutte contre le Sida (PNLS) et la mise au point d'algorithmes pour le traitement et la prévention des IST n'ont pas encore permis de contrôler leur évolution. L'impact des IST sur l'évolution de l'infection par le VIH a conduit le Bénin à réviser, il y a environ un an, l'approche de la prise en charge de ces infections. La diversité des informations recueillies sur ces affections au cours de l'EDSB-II contribuera à cibler davantage les interventions futures pour la lutte contre la propagation de ces maladies. Les informations ainsi collectées concernent :

- la connaissance du sida ;
- la connaissance des moyens de prévention contre le sida ;
- la connaissance, la prévalence et le traitement des IST.

## 11.1 CONNAISSANCE ET ATTITUDE FACE AU SIDA

### 11.1.1 Connaissance du VIH/sida

Le tableau 11.1 présente le pourcentage de femmes et d'hommes qui ont entendu parler du sida et le pourcentage de ceux qui pensent qu'il y a un moyen de l'éviter. Ce tableau indique qu'au Bénin, la connaissance du sida est quasi universelle tant chez les femmes que chez les hommes : 96 % des femmes et 98 % des hommes ont déjà entendu parler du sida. Cependant, la proportion de femmes qui pensent qu'il existe un moyen d'éviter le VIH/sida est encore faible (57 %), et elle est beaucoup plus faible que celle des hommes (80 %).

Chez les femmes comme chez les hommes, la connaissance du VIH/sida est très répandue, quelle que soit la caractéristique socio-démographique considérée. Ce constat montre, entre autres, que les efforts qui ont été fournis dans le département du Borgou semblent avoir porté leurs fruits puisqu'il y a cinq ans, au moment de l'EDSB-I, le niveau de connaissance dans ce département était relativement faible, comparé aux autres départements (le niveau de connaissance était supérieur à 75 % dans tous les autres départements tandis qu'il n'était que de 55 % dans le Borgou). Cependant, chez les femmes, on note une variation assez importante du niveau de connaissance des moyens de prévention du sida par caractéristique socio-démographique. C'est dans la ville de Cotonou que l'on trouve la plus forte proportion de femmes ayant déclaré connaître au moins un moyen de protection contre le sida (67 % contre 61 % dans les autres villes, et 53 % en milieu rural). Au niveau départemental, cette proportion atteint son maximum dans le département du Mono (72 % contre 32 % dans le Borgou et 47 % dans l'Atacora). Dans l'Ouémé et le Zou, cette proportion est estimée respectivement à 56 % et 65 %. Au niveau des hommes, on observe les mêmes variations dans la connaissance des moyens de prévention du VIH/sida.

Tableau 11.1 Connaissance du sida

Pourcentage des femmes et des hommes qui ont entendu parler du VIH/sida et de ceux qui pensent qu'il y a un moyen d'éviter le VIH/sida, selon les caractéristiques socio-démographiques, Bénin 2001

Caractéristique socio-démographique	Femmes			Hommes		
	A entendu parler du VIH/sida	Pense qu'il existe un moyen d'éviter VIH/sida	Effectif des femmes	A entendu parler du VIH/sida	Pense qu'il existe un moyen d'éviter VIH/sida	Effectif des hommes
<b>Âge</b>						
15-19	94,5	54,1	1 233	96,2	75,4	496
20-24	95,2	57,5	1 215	98,0	84,2	409
25-29	96,3	59,4	1 170	98,3	86,0	439
30-39	96,1	59,4	1 611	98,4	83,4	660
40-49	95,3	54,9	990	97,3	76,9	461
50-64	na	na	na	98,4	73,1	244
<b>Statut matrimonial</b>						
Célibataire	96,1	60,1	1 351	96,6	79,0	1 001
A déjà eu des rapports sexuels	98,1	70,5	740	98,7	85,0	700
N'a jamais eu de rapports sexuels	93,6	47,4	611	91,8	65,2	301
En union	95,3	56,2	4 563	98,5	81,6	1 607
Divorcé(e)/séparé(e)/veuf(ve)	96,1	60,1	306	97,3	76,1	101
<b>Milieu de résidence</b>						
Ensemble urbain	97,3	63,2	2 529	98,9	86,3	1 126
Cotonou	99,2	66,6	912	100,0	92,4	437
Autres villes	96,3	61,3	1 617	98,2	82,5	689
Rural	94,3	53,1	3 690	96,9	76,2	1 583
<b>Département</b>						
Atacora	92,0	31,7	694	91,8	71,4	333
Ensemble Atlantique	99,3	64,0	1 501	99,4	88,6	693
Atlantique	99,5	60,1	589	98,4	82,2	257
Cotonou	99,2	66,6	912	100,0	92,4	437
Borgou	86,8	47,2	995	98,0	84,3	440
Mono	99,4	71,5	717	100,0	80,4	280
Ouémé	96,7	56,0	1 106	97,2	72,2	449
Zou	96,6	64,5	1 205	98,4	79,3	513
<b>Niveau d'instruction</b>						
Aucun niveau	93,8	48,7	3 984	96,5	71,3	1 081
Primaire	97,7	62,6	1 371	97,7	79,6	869
Secondaire ou plus	99,8	88,1	864	99,6	94,4	759
Ensemble	95,5	57,2	6 219	97,7	80,4	2 709

na = Non applicable

Le tableau 11.2 présente le pourcentage de femmes et d'hommes qui connaissent différents moyens d'éviter de contracter le VIH/sida. Les moyens les plus fréquemment cités par les femmes sont, par ordre d'importance, la limitation du nombre de partenaires sexuels (40 %), l'utilisation du condom (36 %) et le fait d'éviter de se raser avec une lame ou un rasoir (14 %). Il est encourageant de constater que l'utilisation du condom pour éviter de contracter le sida est un moyen de plus en plus mentionné par

Moyens d'éviter le VIH/sida	Pourcentage de femmes	Pourcentage d'hommes
Ne connaît pas le sida ou ne sait pas s'il peut être évité	26,6	10,8
Pense qu'il n'existe aucun moyen d'éviter le VIH/sida	16,1	8,7
Ne connaît pas un moyen spécifique <sup>1</sup>	0,3	0,2
Abstinence sexuelle	3,6	7,5
Utiliser des condoms	36,4	57,1
Avoir un seul partenaire sexuel/rester fidèle à un seul partenaire	10,0	11,2
Limiter le nombre de partenaires sexuels	39,7	46,1
Éviter rapport sexuel avec les prostituées	8,2	9,2
Éviter rapport sexuel avec des personnes ayant plusieurs partenaires	1,6	1,3
Éviter rapport sexuel avec les homosexuels	0,2	0,1
Éviter rapport sexuel avec les personnes qui s'injectent	0,5	0,4
Éviter les transfusions sanguines	2,0	4,0
Éviter les injections	4,4	5,2
Éviter de se raser avec une lame ou un rasoir	13,9	21,6
Éviter de s'embrasser	0,2	0,3
Éviter les piqûres de moustiques	0,8	0,3
Chercher la protection chez les guérisseurs traditionnels	0,1	0,2
Autre	1,8	1,9
Effectif des enquêtés	6 219	2 709

<sup>1</sup> Pense qu'il existe un moyen d'éviter le VIH/sida, mais ne peut citer spontanément aucun moyen

les femmes. En effet, la proportion de femmes ayant cité ce moyen est plus élevée actuellement qu'en 1996 (36 % contre 30 %). Les autres moyens permettant d'éviter de contracter le sida sont très peu connus des femmes au Bénin. Le tableau 11.2 indique qu'une proportion non négligeable de femmes connaissent le sida, mais ignorent les moyens d'éviter de le contracter (16 %).

On note, par ailleurs, que la proportion d'hommes qui ont pu citer spontanément un moyen d'éviter le sida est plus élevée que celle des femmes (80 % contre 57 %). Cependant, on constate que les trois moyens de protection les plus cités par les femmes aussi sont les plus cités par les hommes, sauf qu'ici le condom vient en tête (57 % contre 46 % et 22 % respectivement pour la limitation du nombre de partenaires et le fait d'éviter de se raser avec une lame ou un rasoir). Par rapport à 1996, on constate également une augmentation sensible de la proportion de femmes qui ont cité le condom (57 % contre 39 %).

Les tableaux 11.3.1 et 11.3.2 présentent la répartition en pourcentage des femmes et des hommes selon leur connaissance des moyens importants, d'un point de vue programmatique (Mboup et Tossou, 1997), qui permettent d'éviter de contracter le VIH/sida (l'utilisation du condom, la limitation du nombre de partenaires et l'abstinence), ainsi que les proportions de enquêtés connaissant certains moyens spécifiques d'éviter de contracter le VIH/sida selon certaines caractéristiques socio-démographiques. Plus de la moitié des femmes (54 %) connaissent deux ou trois moyens importants d'éviter de contracter le sida ; parmi les moyens spécifiques cités, on constate que 54 % ont cité la limitation des partenaires, 50 % l'utilisation du condom et 44 % l'abstinence. Cependant, plus de deux femmes sur cinq (43 %) ont déclaré ne connaître aucun de ces moyens.

Tableau 11.3.1 Connaissance par les femmes de moyens importants (d'un point de vue programmatique) d'éviter de contracter le VIH/sida

Répartition (en %) de l'ensemble des femmes selon leur connaissance des trois moyens importants (d'un point de vue programmatique) d'éviter de contracter le VIH/sida, et pourcentage de celles qui connaissent certains moyens spécifiques d'éviter de contracter le VIH/sida, selon les caractéristiques socio-démographiques, Bénin 2001

Caractéristique socio-démographique	Principaux moyens programmatiques d'éviter le VIH/sida				Moyens spécifiques d'éviter le VIH/sida			Effectif des enquêtés
	Aucun <sup>1</sup>	Un moyen	Deux ou trois moyens	Total	Utiliser le condom	limiter le nombre de partenaires <sup>2</sup>	Abstinence	
<b>Âge</b>								
15-19	46,1	3,6	50,3	100,0	47,6	49,2	41,1	1 233
20-24	42,8	2,5	54,7	100,0	52,8	54,8	43,2	1 215
25-29	40,7	3,7	55,5	100,0	52,9	56,4	46,0	1 170
30-39	40,7	2,9	56,3	100,0	51,0	57,8	46,7	1 611
40-49	45,3	3,7	51,0	100,0	46,2	52,0	42,6	990
<b>Statut matrimonial</b>								
Célibataire	40,3	4,3	55,5	100,0	52,9	54,0	42,1	1 351
A déjà eu des rapports sexuels	30,0	5,3	64,7	100,0	63,7	63,5	46,1	740
N'a jamais eu de rapports sexuels	52,6	3,0	44,4	100,0	39,8	42,5	37,2	611
En union	43,9	2,9	53,1	100,0	49,3	54,1	44,8	4 563
Divorcée/séparée/ veuve	40,2	2,7	57,1	100,0	53,2	58,4	44,5	306
<b>Milieu de résidence</b>								
Ensemble urbain	37,0	5,0	57,9	100,0	56,2	58,8	44,9	2 529
Cotonou	34,0	7,3	58,6	100,0	57,5	60,6	40,6	912
Autres villes	38,7	3,8	57,5	100,0	55,4	57,7	47,3	1 617
Rural	47,0	2,0	51,0	100,0	46,2	51,3	43,7	3 690
<b>Département</b>								
Atacora	68,3	0,5	31,1	100,0	25,9	30,5	28,3	694
Ensemble Atlantique	36,3	5,4	58,2	100,0	55,6	59,7	43,9	1 501
Atlantique	39,9	2,5	57,5	100,0	52,7	58,3	49,0	589
Cotonou	34,0	7,3	58,6	100,0	57,5	60,6	40,6	912
Borgou	53,1	2,5	44,3	100,0	40,5	45,4	37,5	995
Mono	28,6	3,8	67,6	100,0	61,9	68,2	56,7	717
Ouémé	44,1	4,2	51,8	100,0	49,9	52,0	38,9	1 106
Zou	35,5	1,4	63,0	100,0	59,1	62,6	56,5	1 205
<b>Niveau d'instruction</b>								
Aucun niveau	51,4	2,1	46,5	100,0	42,1	47,1	40,4	3 984
Primaire	37,6	4,1	58,3	100,0	55,0	58,4	46,7	1 371
Secondaire ou plus	12,2	7,3	80,6	100,0	80,6	81,0	57,2	864
Ensemble	42,9	3,2	53,8	100,0	50,3	54,3	44,2	6 219

Note : Les moyens importants du point de vue programmatique sont l'abstinence sexuelle, l'utilisation du condom, et la limitation du nombre de partenaires. L'abstinence sexuelle est mesurée seulement à partir d'une réponse spontanée, alors que l'utilisation du condom et la limitation du nombre de partenaires sont mesurées à partir d'une réponse spontanée et d'une réponse après avoir insisté.

<sup>1</sup> Il s'agit de celles qui n'ont pas entendu parler du VIH/sida ou ne connaissent aucun des trois moyens programmatiques d'éviter le VIH/sida.

<sup>2</sup> Il s'agit de la limitation du nombre de partenaires sexuels et de la limitation des rapports sexuels à un seul partenaire/la fidélité à un seul partenaire.

Tableau 11.3.2 Connaissance des hommes de moyens spécifiques d'éviter de contracter le VIH/sida

Répartition (en %) de l'ensemble des hommes selon leur connaissance de moyens corrects d'éviter de contracter le VIH/sida, et pourcentage de ceux qui connaissent certains moyens spécifiques d'éviter de contracter le VIH/sida, selon les caractéristiques socio-démographiques, Bénin 2001

Caractéristique socio-démographique	Principaux moyens programmatiques d'éviter le VIH/sida				Moyens spécifiques d'éviter le VIH/sida			Effectif des enquêtés
	Aucun <sup>1</sup>	Un moyen	Deux ou trois moyens	Total	Utiliser les condoms	Limiter le nombre de partenaires <sup>2</sup>	Abstinence	
<b>Âge</b>								
15-19	24,7	11,0	64,2	100,0	67,9	63,4	41,2	496
20-24	15,7	14,1	69,9	100,0	75,1	71,4	44,2	409
25-29	14,3	14,0	71,8	100,0	73,8	77,0	39,4	439
30-39	16,8	10,8	72,3	100,0	70,6	77,0	42,7	660
40-49	23,2	17,4	59,4	100,0	58,0	69,3	39,4	461
50-64	27,4	16,8	55,8	100,0	52,3	67,5	32,5	244
<b>Statut matrimonial</b>								
Célibataire	21,1	13,4	65,4	100,0	69,6	65,8	41,7	1 001
A déjà eu des rapports sexuels	15,2	13,8	71,0	100,0	76,0	71,1	44,8	700
N'a jamais eu de rapports sexuels	35,0	12,5	52,2	100,0	54,6	53,5	34,5	301
En union	18,5	13,2	68,2	100,0	66,6	75,8	40,4	1 607
Divorcé/séparé/veuf	24,7	19,1	56,2	100,0	61,4	60,2	33,5	101
<b>Milieu de résidence</b>								
Ensemble urbain	13,8	15,3	70,7	100,0	71,9	76,3	40,1	1 126
Cotonou	7,9	23,2	69,0	100,0	71,4	79,2	31,3	437
Autres villes	17,6	10,4	71,8	100,0	72,3	74,4	45,7	689
Rural	23,9	12,2	63,8	100,0	64,3	68,1	41,0	1 583
<b>Département</b>								
Atacora	28,6	7,2	64,0	100,0	60,1	67,0	48,0	333
Ensemble Atlantique	11,6	20,0	68,3	100,0	68,8	76,3	38,9	693
Atlantique	17,8	14,7	67,2	100,0	64,3	71,4	51,8	257
Cotonou	7,9	23,2	69,0	100,0	71,4	79,2	31,3	437
Borgou	15,9	8,3	75,7	100,0	77,1	76,6	53,9	440
Mono	19,6	6,8	73,6	100,0	72,6	77,3	53,4	280
Ouémé	28,1	15,1	56,6	100,0	55,8	63,0	29,2	449
Zou	21,0	15,4	63,6	100,0	69,8	67,7	29,9	513
<b>Niveau d'instruction</b>								
Aucun niveau	28,7	11,6	59,6	100,0	58,4	65,1	41,7	1 081
Primaire	20,8	15,4	63,9	100,0	65,5	70,9	35,2	869
Secondaire ou plus	5,7	14,1	80,0	100,0	82,8	81,3	45,3	759
Ensemble	19,7	13,5	66,7	100,0	67,5	71,5	40,6	2 709

Note : Les moyens importants du point de vue programmatique sont l'abstinence sexuelle, l'utilisation du condom, et la limitation du nombre de partenaires. L'abstinence sexuelle est mesurée seulement à partir d'une réponse spontanée, alors que l'utilisation du condom et la limitation du nombre de partenaires sont mesurées à partir d'une réponse spontanée et d'une réponse après avoir insisté.

<sup>1</sup> Il s'agit de ceux qui n'ont pas entendu parler du sida ou ne connaissent aucun des trois moyens programmatiques d'éviter le VIH/sida.

<sup>2</sup> Il s'agit de la limitation du nombre de partenaires sexuels et de la limitation des rapports sexuels à un seul partenaire/la fidélité à un seul partenaire.

La connaissance de deux ou trois moyens varie peu selon le milieu de résidence. Autrement dit, la connaissance de plusieurs moyens pour éviter de contracter le sida s'observe tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Chez les femmes, le niveau de connaissance le plus élevé s'observe à Cotonou, suivi par les autres villes (respectivement 59 % et 58 % contre 51 % en milieu rural).

D'après les statistiques publiées par le PNLS, c'est le département du Mono qui est l'un des plus touchés par la pandémie du sida. C'est dans ce département que les femmes (68 %) ont été proportionnellement les plus nombreuses à citer deux à trois moyens d'éviter de contracter le sida, et c'est également dans le Mono que l'on observe le pourcentage le plus élevé de femmes (62 %) qui ont cité spécifiquement le condom. À l'opposé, c'est dans le département de l'Atacora que l'on constate la plus faible proportion de femmes (31 %) qui ont pu citer deux à trois moyens importants qui permettent d'éviter de contracter le sida ; ce département se caractérise aussi par la plus faible proportion de femmes qui ont cité spécifiquement le condom comme moyen de protection contre le sida (26 %). On note également que la connaissance d'au moins deux moyens de prévention du sida varie beaucoup selon le niveau d'instruction des femmes : de 47 % chez celles qui n'ont aucun niveau, elle est passée à 81 % chez celles qui ont un niveau secondaire et plus.

Chez les hommes, comme l'indiquent les données du tableau 11.3.2, la proportion de ceux qui ne connaissent aucun moyen est nettement plus faible que chez les femmes (20 % contre 43 %). On observe également que chez les hommes, la proportion de ceux qui ont cité deux à trois moyens d'éviter de contracter le sida est beaucoup plus importante que celle des femmes (67 % contre 54 %). Les moyens les plus cités par les hommes sont les mêmes que ceux cités par les femmes, soit par ordre d'importance, la limitation du nombre de partenaires, l'utilisation du condom et l'abstinence (respectivement, 72 %, 68 % et 41 %).

### 11.1.2 Perception des aspects sociaux liés au VIH/sida

Le tableau 11.4 présente les opinions des femmes et des hommes sur les personnes susceptibles d'être atteintes du VIH/sida, les moyens de contracter le virus et la connaissance personnelle d'une personne porteuse du VIH/sida. Au tableau 11.4, on note qu'environ une femme sur deux (56 %) a déclaré qu'une personne apparemment en bonne santé peut porter le virus du sida. Si les variations selon l'âge sont faibles, on relève par contre des écarts non négligeables selon le département. C'est ainsi que dans l'Atacora, seulement une femme sur quatre, soit 24 %, a déclaré qu'une personne apparemment en bonne santé peut porter le virus, contre sept femmes sur dix (70 %) dans l'Atlantique. Les femmes ayant le niveau secondaire ou plus ont fait la même déclaration dans 83 % des cas. Chez les hommes, on retrouve les mêmes tendances avec cependant des proportions nettement plus élevées, soit 68 % dans l'ensemble qui ont déclaré qu'une personne apparemment en bonne santé peut être atteinte du sida.

S'agissant de la transmission de la mère à l'enfant, les femmes ont déclaré que le VIH peut se contracter pendant l'accouchement (dans 65 % des cas), pendant la grossesse (dans 72 % des cas) ou par l'allaitement au sein (dans 68 % des cas). On relève des écarts non négligeables selon le niveau d'instruction et le département de résidence. Les proportions les plus élevées sont observées chez les femmes ayant le niveau secondaire ou plus (respectivement 80 %, 88 % et 75 % contre respectivement 60 %, 68 % et 65 % chez les femmes sans instruction) et chez les femmes du Mono (respectivement 78 %, 79 % et 79 %), tandis que les proportions les plus faibles sont celles de l'Atacora (respectivement 43 %, 49 % et 43 %) et du Borgou (respectivement 37 %, 51 % et 44 %).

Tableau 11.4 Perception des problèmes reliés au VIH/sida

Répartition (en %) des femmes et des hommes qui ont donné leur opinion sur différents problèmes reliés au VIH/sida, selon les caractéristiques socio-démographiques, Bénin 2001

Caractéristique socio-démographique	Une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le sida	Croit que le VIH/sida peut être transmis de la mère à l'enfant			Connaît une personne ayant le VIH/sida ou morte du sida	Effectif des enquêtés
		Pendant l'accouchement	Pendant la grossesse	Durant l'allaitement maternel		
<b>FEMMES</b>						
<b>Âge</b>						
15-19	53,1	54,4	63,5	59,5	22,1	1 233
20-24	59,4	65,7	72,5	69,2	26,8	1 215
25-29	58,9	68,7	77,2	72,5	24,5	1 170
30-39	57,2	68,8	75,7	70,5	25,2	1 611
40-49	51,2	66,8	72,4	68,2	23,8	990
<b>Statut matrimonial</b>						
Célibataire	60,7	60,8	69,7	63,9	24,8	1 351
A déjà eu des rapports sexuels	69,6	67,6	76,6	69,8	29,7	740
N'a jamais eu de rapports sexuels	49,8	52,6	61,3	56,8	18,9	611
En union	54,6	65,8	72,8	68,9	24,2	4 563
Divorcée/séparée/veuve	59,5	71,8	79,8	74,0	28,9	306
<b>Milieu de résidence</b>						
Ensemble urbain	63,7	69,0	77,6	70,4	26,2	2 529
Cotonou	73,7	76,3	84,1	77,2	31,3	912
Autres villes	58,1	64,8	73,9	66,6	23,3	1 617
Rural	50,9	62,3	68,9	66,4	23,4	3 690
<b>Département</b>						
Atacora	24,2	43,4	48,6	43,4	14,6	694
Ensemble Atlantique	72,2	76,8	85,1	78,9	29,7	1 501
Atlantique	70,0	77,5	86,6	81,5	27,3	589
Cotonou	73,7	76,3	84,1	77,2	31,3	912
Borgou	35,9	37,3	51,0	43,9	12,9	995
Mono	61,8	78,1	79,2	78,6	36,1	717
Ouémé	58,3	68,4	74,4	73,8	23,2	1 106
Zou	65,9	74,7	82,3	77,2	27,7	1 205
<b>Niveau d'instruction</b>						
Aucun niveau	48,4	60,4	67,5	64,9	21,0	3 984
Primaire	61,9	69,1	76,9	73,0	28,5	1 371
Secondaire ou plus	82,7	79,8	88,0	74,9	34,6	864
Ensemble	56,2	65,0	72,4	68,1	24,5	6 219
<b>HOMMES</b>						
<b>Âge</b>						
15-19	67,8	50,9	65,6	53,7	22,2	496
20-24	70,1	61,1	71,7	59,6	24,6	409
25-29	71,1	61,8	70,3	63,3	29,1	439
30-39	69,6	58,0	68,0	58,8	30,4	660
40-49	65,3	58,0	69,7	61,5	30,2	461
50-64	59,4	62,3	65,5	63,2	24,6	244
<b>Statut matrimonial</b>						
Célibataire	69,4	56,0	68,2	55,2	25,2	1 001
A déjà eu des rapports sexuels	73,9	60,9	73,5	58,8	29,5	700
N'a jamais eu de rapports sexuels	58,9	44,4	55,6	47,0	15,2	301
En union	67,2	60,3	69,0	62,2	28,8	1 607
Divorcé/séparé/veuf	64,6	46,4	64,7	60,5	23,2	101
<b>Milieu de résidence</b>						
Ensemble urbain	77,1	58,7	71,3	56,0	29,3	1 126
Cotonou	92,6	57,3	74,2	50,8	38,7	437
Autres villes	67,2	59,6	69,4	59,2	23,4	689
Rural	61,4	57,8	66,6	62,1	25,8	1 583
<b>Département</b>						
Atacora	51,5	46,0	52,7	45,7	12,1	333
Ensemble Atlantique	86,8	60,3	76,0	59,4	35,1	693
Atlantique	76,9	65,5	79,0	74,0	29,1	257
Cotonou	92,6	57,3	74,2	50,8	38,7	437
Borgou	59,1	52,5	60,4	52,1	13,3	440
Mono	71,0	88,5	91,6	83,6	42,6	280
Ouémé	53,9	54,9	65,0	57,4	26,1	449
Zou	71,2	54,4	66,4	64,1	31,1	513
<b>Niveau d'instruction</b>						
Aucun niveau	56,1	52,2	59,6	57,2	20,1	1 081
Primaire	68,1	60,3	69,5	65,4	28,4	869
Secondaire ou plus	84,6	64,3	80,3	56,3	36,2	759
Ensemble	67,9	58,2	68,6	59,6	27,3	2 709

Chez les hommes, les proportions de ceux ayant déclaré que le VIH/sida peut se contracter pendant l'accouchement, pendant la grossesse ou par l'allaitement, sont dans l'ensemble moins élevées que celles observées chez les femmes (respectivement 58 %, 69 % et 60 % contre respectivement 65 %, 72 % et 68 %). Cependant, dans le Mono, on note d'importantes proportions d'hommes qui ont cité ces trois modes de transmission (respectivement 89 %, 92 % et 84 %).

Au sujet de la connaissance personnelle d'une personne porteuse du VIH/sida, seulement 25 % des femmes ont répondu par l'affirmative, avec cependant des écarts importants selon le département. Les proportions les plus faibles sont observées dans les départements du Borgou et de l'Atacora, avec respectivement 13 % et 15 %, tandis que les proportions les plus élevées sont observées dans le Mono (36 %) et chez les femmes ayant le niveau secondaire et plus (35 %). Chez les hommes où la proportion de ceux qui connaissent est de 27 %, on retrouve les mêmes tendances que chez les femmes : en effet, 43 % des hommes du Mono ont déclaré connaître personnellement une personne porteuse du VIH/sida. Ce résultat est cohérent avec la situation du Mono qui est, selon des statistiques disponibles, le département où la prévalence du sida est la plus élevée. Par contre, les départements du nord, l'Atacora et le Borgou, sont relativement peu touchés par la pandémie du VIH/sida.

### **11.1.3 Discussions à propos du VIH/sida avec le partenaire**

Le tableau 11.5 fournit des informations sur les discussions à propos du VIH/sida au sein du couple. Il ressort de ce tableau que moins d'une femme sur trois, soit 29 %, ont déclaré avoir discuté de la prévention du VIH/sida avec leur partenaire. Celles qui en ont le moins discuté avec leur partenaire sont les femmes de 15-19 ans (17 %), celles du Borgou, de l'Atacora et du Zou (respectivement 18 %, 19 % et 22 %). Les femmes qui en ont le plus discuté avec leurs partenaires sont celles du département du Mono (52 %), ainsi que celles ayant le niveau d'instruction secondaire ou plus (65 %). Au niveau des hommes, 53 % ont déclaré avoir discuté du VIH/sida avec leur partenaire. Les hommes âgés de moins de 25 ans, les hommes de 50 ans ou plus et ceux du département de l'Atacora sont ceux qui en ont le moins discuté (respectivement 45 %, 41 % et 38 %). En revanche, les hommes du Mono (64 %) et du Zou (62 %) ainsi que ceux ayant le niveau secondaire ou plus (75 %) sont ceux qui en ont le plus discuté.

### **11.1.4 Discussions à propos du VIH/sida dans les médias**

Le tableau 11.6 présente les proportions de femmes et d'hommes ayant déclaré qu'il était acceptable que des discussions au sujet du VIH/sida aient lieu à la radio, à la télévision et dans les journaux. La quasi-totalité des femmes, soit 98 %, trouvent les discussions au sujet du VIH/sida acceptables aussi bien à la radio et à la télévision que dans les journaux. On relève très peu de variations selon les principales caractéristiques socio-démographiques. Les tendances observées au niveau des hommes sont sensiblement identiques à celles qui prévalent chez les femmes, avec les mêmes proportions d'hommes favorables aux discussions à la radio, à la télévision et dans les journaux.

### **11.1.5 Attitudes vis-à-vis des personnes porteuses du virus**

Le tableau 11.7 fournit des informations sur les opinions des femmes et des hommes vis-à-vis de la séropositivité d'un parent malade, de la prise en charge d'un parent porteur du VIH/sida, de la possibilité d'exercer un emploi par les porteurs du virus et, enfin, de l'enseignement de l'utilisation du condom aux enfants.

Au tableau 11.7, on note que moins d'une femme sur six (soit 16 %) a déclaré qu'elle approuvait le fait qu'une personne atteinte du sida garde son état secret. On relève peu de variations selon l'âge et le statut matrimonial de la femme. En revanche, les écarts entre les départements sont importants, allant d'un maximum de 26 % dans l'Atacora à un minimum de 7 % dans le Mono. Manifestement, les



Tableau 11.5 Discussion à propos du VIH/sida avec le partenaire

Répartition (en %) des femmes et des hommes actuellement en union ou vivant avec un partenaire selon qu'ils ont discuté ou non des moyens de prévention du VIH/sida, avec leur époux/partenaire, selon les caractéristiques socio-démographiques, Bénin 2001

Caractéristique socio-démographique	A discuté des moyens de prévention du VIH/sida	N'a jamais discuté de la prévention du VIH/sida	NSP/ Manquant	N'a jamais entendu parler du VIH/sida	Total	Effectif des enquêtés
<b>FEMMES</b>						
<b>Âge</b>						
15-19	17,0	74,0	0,4	8,7	100,0	287
20-24	27,9	66,8	0,2	5,1	100,0	867
25-29	31,3	64,2	0,7	3,8	100,0	1 069
30-39	32,8	62,9	0,3	4,0	100,0	1 491
40-49	26,1	68,7	0,2	5,0	100,0	848
<b>Milieu de résidence</b>						
Ensemble urbain	37,3	59,3	0,4	3,0	100,0	1 572
Cotonou	44,1	54,3	0,7	0,9	100,0	472
Autres villes	34,4	61,5	0,3	3,8	100,0	1 100
Rural	25,1	69,1	0,3	5,5	100,0	2 990
<b>Département</b>						
Atacora	18,8	73,7	0,2	7,4	100,0	585
Ensemble Atlantique	36,3	62,5	0,5	0,6	100,0	917
Atlantique	28,1	71,2	0,4	0,4	100,0	445
Cotonou	44,1	54,3	0,7	0,9	100,0	472
Borgou	18,1	66,9	0,8	14,3	100,0	798
Mono	51,5	48,0	0,0	0,5	100,0	535
Ouémé	34,7	62,2	0,3	2,9	100,0	769
Zou	21,6	75,7	0,2	2,5	100,0	958
<b>Niveau d'instruction</b>						
Aucun niveau	23,1	70,8	0,3	5,8	100,0	3 294
Primaire	36,6	60,5	0,8	2,2	100,0	883
Secondaire ou plus	65,2	34,0	0,3	0,5	100,0	385
Ensemble	29,3	65,7	0,4	4,6	100,0	4 563
<b>HOMMES</b>						
<b>Âge</b>						
15-19	*	*	*	*	*	5
20-24	44,9	53,8	1,3	0,0	100,0	93
25-29	59,6	39,1	0,3	1,0	100,0	280
30-39	58,6	40,1	0,2	1,2	100,0	575
40-49	50,5	47,2	0,2	2,1	100,0	425
50-64	41,1	57,1	0,0	1,7	100,0	230
<b>Milieu de résidence</b>						
Ensemble urbain	56,8	42,3	0,2	0,7	100,0	598
Cotonou	64,9	35,1	0,0	0,0	100,0	193
Autres villes	53,0	45,6	0,3	1,1	100,0	405
Rural	51,0	47,0	0,3	1,8	100,0	1 010
<b>Département</b>						
Atacora	37,6	56,7	0,9	4,9	100,0	206
Ensemble Atlantique	58,6	40,9	0,2	0,2	100,0	339
Atlantique	50,3	48,6	0,6	0,6	100,0	146
Cotonou	64,9	35,1	0,0	0,0	100,0	193
Borgou	51,2	46,9	0,0	1,9	100,0	307
Mono	64,4	35,6	0,0	0,0	100,0	154
Ouémé	44,1	54,3	0,4	1,2	100,0	284
Zou	62,1	37,2	0,0	0,7	100,0	318
<b>Niveau d'instruction</b>						
Aucun niveau	42,7	54,6	0,2	2,5	100,0	781
Primaire	55,6	43,7	0,2	0,5	100,0	510
Secondaire ou plus	75,0	24,6	0,4	0,0	100,0	317
Ensemble	53,2	45,2	0,2	1,4	100,0	1 607

\* Basé sur moins de 25 cas non pondérés

Tableau 11.6 Discussion à propos du VIH/sida dans les médias

Parmi les femmes et les hommes qui ont entendu parler du VIH/sida, pourcentage de celles/ceux qui pensent que les discussions à propos du VIH/sida dans les médias sont acceptables, selon le type de média et le département, Bénin 2001

Caractéristique socio-démographique	Discussion du VIH/sida est acceptable :							Effectif des enquêtés
	À la radio	À la télévision	Dans les journaux	Dans les affiches	Dans les prospectus	Dans les animations culturelles	Dans les écoles	
FEMMES								
<b>Département</b>								
Atacora	91,8	91,5	91,5	91,5	91,5	91,3	91,1	639
Ensemble Atlantique	99,1	98,9	99,0	99,0	98,9	99,0	98,4	1 490
Atlantique	99,6	99,5	99,2	99,3	99,1	99,2	98,0	585
Cotonou	98,7	98,5	98,8	98,8	98,7	98,8	98,7	905
Borgou	96,1	96,0	96,1	95,7	96,0	96,1	96,2	864
Mono	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1	97,7	713
Ouémé	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,4	99,4	1 070
Zou	99,8	99,7	99,7	99,7	99,7	99,8	98,9	1 164
Ensemble	97,9	97,8	97,8	97,8	97,8	97,9	97,5	5 940
HOMMES								
<b>Département</b>								
Atacora	93,5	92,9	92,3	91,7	92,3	92,6	90,8	306
Ensemble Atlantique	98,7	98,5	98,2	97,8	97,5	98,4	97,4	689
Atlantique	99,4	98,7	98,0	98,0	97,7	97,4	95,7	253
Cotonou	98,3	98,3	98,3	97,6	97,4	99,0	98,3	437
Borgou	98,0	97,3	97,7	97,3	97,7	97,5	97,0	431
Mono	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	280
Ouémé	98,3	98,3	97,8	97,8	97,8	97,7	95,2	437
Zou	99,5	99,5	99,3	99,1	99,1	99,1	99,1	505
Ensemble	98,2	97,9	97,7	97,4	97,5	97,7	96,8	2 648

Tableau 11.7 Aspects sociaux de prévention et prise en charge du VIH/sida

Parmi les femmes et les hommes qui ont entendu parler du sida, pourcentage de ceux qui ont donné des réponses spécifiques aux questions sur les différents aspects sociaux de prévention et de réduction du VIH/sida, selon les caractéristiques socio-démographiques, Bénin 2001

Caractéristique socio-démographique	Une personne avec le VIH/sida devrait pouvoir garder son état secret	Ne souhaite pas s'occuper d'un parent malade du VIH/sida	Personne ayant le sida ne doit être autorisée à travailler	On ne doit pas enseigner l'utilisation du condom aux enfants de 12-16 ans	Effectif des enquêtés
FEMMES					
<b>Âge</b>					
15-19	17,1	51,4	71,2	25,2	1 165
20-24	15,3	51,6	73,4	20,7	1 157
25-29	15,5	55,1	75,1	21,1	1 127
30-39	14,8	53,9	74,5	22,7	1 548
40-49	15,3	48,5	72,2	18,7	943
<b>Statut matrimonial</b>					
Célibataire	17,6	48,1	67,0	26,4	1 297
A déjà eu des rapports sexuels	19,1	46,1	61,5	25,0	726
N'a jamais eu de rapports sexuels	15,8	50,7	74,0	28,2	572
En union	15,0	53,6	75,5	20,5	4 349
Divorcée/séparée/veuve	14,9	51,3	69,8	21,3	294
<b>Milieu de résidence</b>					
Ensemble urbain	17,8	50,0	67,3	24,7	2 461
Cotonou	22,6	46,1	63,0	35,5	905
Autres villes	15,0	52,3	69,8	18,4	1 556
Rural	13,9	53,9	77,7	19,8	3 479
<b>Département</b>					
Atacora	26,0	49,8	72,6	19,7	639
Ensemble Atlantique	17,9	49,5	65,4	32,4	1 490
Atlantique	10,6	54,7	69,1	27,5	585
Cotonou	22,6	46,1	63,0	35,5	905
Borgou	15,3	57,6	74,2	15,7	864
Mono	7,4	53,7	87,6	25,4	713
Ouémé	9,0	59,0	69,7	16,4	1 070
Zou	18,1	46,4	78,1	17,0	1 164
<b>Niveau d'instruction</b>					
Aucun niveau	13,6	55,4	78,5	20,6	3 738
Primaire	16,8	54,7	75,1	25,9	1 340
Secondaire ou plus	22,0	34,9	48,6	21,2	862
Ensemble	15,6	52,3	73,4	21,9	5 940
HOMMES					
<b>Âge</b>					
15-19	19,7	48,0	59,5	25,2	477
20-24	22,1	43,3	57,5	23,3	401
25-29	19,8	49,8	60,5	22,6	431
30-39	21,0	47,1	61,7	27,5	649
40-49	20,1	46,9	60,1	30,8	449
50-64	17,5	46,3	58,5	36,2	241
<b>Statut matrimonial</b>					
Célibataire	22,7	44,2	55,4	24,2	967
A déjà eu des rapports sexuels	23,1	42,9	54,4	22,1	691
N'a jamais eu de rapports sexuels	21,5	47,2	58,0	29,6	276
En union	18,5	49,0	63,6	29,0	1 583
Divorcé/séparé/veuf	25,6	43,5	43,6	21,8	98
<b>Milieu de résidence</b>					
Ensemble urbain	25,5	44,1	46,5	24,8	1 114
Cotonou	36,3	37,5	29,6	17,2	437
Autres villes	18,6	48,4	57,4	29,7	677
Rural	16,5	49,1	69,6	28,6	1 534
<b>Département</b>					
Atacora	17,1	40,1	54,6	17,1	306
Ensemble Atlantique	32,2	45,5	37,7	21,6	689
Atlantique	25,2	59,3	51,6	29,4	253
Cotonou	36,3	37,5	29,6	17,2	437
Borgou	21,2	48,0	66,5	16,7	431
Mono	8,7	41,3	68,4	15,9	280
Ouémé	21,4	56,1	71,2	55,9	437
Zou	10,5	47,8	73,3	30,2	505
<b>Niveau d'instruction</b>					
Aucun niveau	14,5	51,6	70,7	26,7	1 043
Primaire	20,7	54,2	63,7	30,4	849
Secondaire ou plus	27,9	32,6	40,6	23,6	755
Ensemble	20,3	47,0	59,9	27,0	2 648

départements les plus touchés par la pandémie du VIH/sida sont ceux où les femmes approuvent le moins fréquemment que les personnes atteintes du sida gardent leur état secret. Chez les hommes, les tendances observées sont comparables à celles des femmes. Un homme sur cinq (soit 20 %) approuve le fait qu'une personne puisse ne pas divulguer son état.

En ce qui concerne la prise en charge d'un parent porteur du virus, plus d'une femme sur deux, soit 52 %, ont déclaré ne pas vouloir s'occuper d'un parent malade du sida. Cette proportion est particulièrement importante chez les femmes sans instruction et les femmes n'ayant que le niveau d'instruction primaire (52 % en moyenne contre 35 % chez celles ayant le niveau d'instruction secondaire ou plus). Au niveau départemental, les femmes de l'Ouémé et du Borgou sont moins favorables à la prise en charge d'un parent séropositif (respectivement 59 % et 58 % contre 46 % dans le Zou et Cotonou). Au niveau du milieu de résidence on note que les femmes du milieu rural et des autres villes sont plus nombreuses à ne pas souhaiter s'occuper d'un parent séropositif (respectivement 54 % et 52 % contre 46 % à Cotonou).

Les données du tableau 11.7 indiquent également que près des trois quarts des femmes (73 %) et six hommes sur dix (60 %) pensent que les personnes séropositives ne doivent être autorisées à travailler. Chez les femmes, cette proportion varie de 70 % dans le département de l'Ouémé à 88 % dans le Mono ; de 67 % en milieu urbain à 78 % en milieu rural ; et, enfin de 49 % chez les femmes ayant le niveau d'instruction secondaire ou plus à 79 % chez celles sans instruction.

S'agissant de l'enseignement de l'utilisation du condom aux enfants, 22 % des femmes la jugent inacceptable, contre 27 % des hommes. Si la ville de Cotonou se démarque nettement avec une proportion de 36 % de femmes hostiles à l'idée d'enseigner l'utilisation du condom aux enfants, c'est plutôt le département de l'Ouémé qui paraît le moins favorable à cette idée au niveau des hommes (56 % contre 30 % dans le Zou ou moins de 20 % dans les autres départements).

#### **11.1.6 Attitudes vis-à-vis du test de dépistage du VIH**

Les tableaux 11.8.1 et 11.8.2 présentent les proportions de femmes et d'hommes ayant déclaré avoir subi le test et les proportions de ceux n'ayant pas eu le test et qui désirent l'effectuer.

Les résultats montrent que 5 % des femmes ont effectué le test de dépistage du VIH/sida. Les plus fortes proportions de femmes ayant déclaré avoir effectué un test de dépistage sont enregistrées en milieu urbain (10 % contre 2 % en milieu rural) en général, et dans la ville de Cotonou en particulier (16 %). Les femmes ayant le niveau d'instruction secondaire ou plus ont également déclaré en forte proportion avoir subi le test (17 % contre 6 % chez celles ayant le niveau d'instruction primaire et 2 % chez celles sans instruction). Malgré la forte prévalence relative du VIH/sida dans le département du Mono, on y relève l'une des plus faibles proportions de femmes ayant effectué un test de dépistage (2 % contre 5 % dans le Borgou et 16 % à Cotonou).

S'agissant des hommes, on observe que 7 % d'entre eux ont déclaré avoir subi le test, avec des tendances similaires à celles des femmes (respectivement 11 % en milieu urbain, 18 % à Cotonou et 15 % pour les hommes ayant le niveau d'instruction secondaire et plus).

Les résultats des tableaux 11.8.1 et 11.8.2 indiquent, par ailleurs, que quelle que soit la caractéristique socio-démographique des personnes, on note une forte proportion de femmes et d'hommes qui désirent être testés (respectivement 64 % et 62 %).

Tableau 11.8.1 Dépistage du virus du VIH/sida chez les femmes

Pourcentage des femmes qui ont fait le test du VIH/sida, répartition (en %) de celles qui n'ont pas fait le test du VIH/sida selon leur désir de faire le test, répartition (en %) de celles qui ont fait le test du VIH/sida et pourcentage de celles qui n'ont pas fait le test et qui connaissent un endroit pour faire le test, selon les caractéristiques socio-démographiques, Bénin 2001

Caractéristique socio-démographique	A subi le test du VIH/sida	N'a pas subi le test du sida			Total	Effectif de toutes les femmes	N'a pas subi le test du sida mais connaît un endroit pour le test <sup>2</sup>	Effectif des enquêtées non testées <sup>2</sup>
		Désire être testée	Ne veut pas être testée	NSP/ Manquant <sup>1</sup>				
<b>Âge</b>								
15-19	2,6	62,5	26,4	8,5	100,0	1 233	14,4	1 133
20-24	6,6	64,4	21,5	7,6	100,0	1 215	16,6	1 077
25-29	5,9	66,7	20,2	7,2	100,0	1 170	17,1	1 057
30-39	5,9	63,7	21,6	8,8	100,0	1 611	16,1	1 454
40-49	4,3	59,5	26,4	9,9	100,0	990	11,3	901
<b>Statut matrimonial</b>								
Célibataire	5,0	60,0	27,8	7,3	100,0	1 351	20,1	1 230
A déjà eu des rapports sexuels	7,8	61,6	26,0	4,7	100,0	740	23,8	668
N'a jamais eu de rapports sexuels	1,6	58,0	29,9	10,5	100,0	611	15,7	562
En union	5,1	64,6	21,8	8,6	100,0	4 563	13,8	4 116
Divorcée/séparée/veuve	6,2	63,0	20,3	10,5	100,0	306	16,8	275
<b>Milieu de résidence</b>								
Ensemble urbain	9,9	57,5	26,1	6,5	100,0	2 529	23,2	2 212
Cotonou	15,8	41,2	36,9	6,1	100,0	912	27,6	761
Autres villes	6,5	66,7	20,0	6,7	100,0	1 617	20,9	1 451
Rural	1,9	67,6	20,9	9,7	100,0	3 690	10,1	3 410
<b>Département</b>								
Atacora	1,9	74,2	13,2	10,7	100,0	694	6,9	626
Ensemble Atlantique	11,4	52,9	30,5	5,2	100,0	1 501	23,9	1 320
Atlantique	4,6	70,9	20,7	3,9	100,0	589	18,7	559
Cotonou	15,8	41,2	36,9	6,1	100,0	912	27,6	761
Borgou	4,9	62,5	16,2	16,4	100,0	995	15,0	815
Mono	1,9	62,9	28,4	6,9	100,0	717	18,4	699
Ouémé	2,9	66,8	23,3	7,1	100,0	1 106	8,9	1 039
Zou	3,4	68,7	21,5	6,5	100,0	1 205	14,1	1 123
<b>Niveau d'instruction</b>								
Aucun niveau	2,2	65,3	22,2	10,2	100,0	3 984	8,8	3 650
Primaire	6,1	62,8	25,0	6,1	100,0	1 371	18,1	1 257
Secondaire ou plus	17,1	56,0	23,5	3,4	100,0	864	43,4	714
Ensemble	5,1	63,5	23,0	8,4	100,0	6 219	15,3	5 621

<sup>1</sup> Y compris celles qui n'ont pas entendu parler du VIH/sida

<sup>2</sup> Sont exclues celles qui n'ont pas entendu parler du VIH/sida

Tableau 11.8.2 Dépistage du virus du VIH/sida chez les hommes

Pourcentage des hommes qui ont fait le test du VIH/sida, répartition (en %) de ceux qui n'ont pas fait le test du VIH/sida selon leur désir de faire le test, répartition (en %) de ceux qui ont fait le test du VIH/sida par source de tests et pourcentage de ceux qui n'ont pas fait le test et qui connaissent un endroit pour faire le test, selon les caractéristiques socio-démographiques, Bénin 2001

Caractéristique socio-démographique	A subi le test du virus du VIH/sida	N'a pas subi le test du sida			Total	Effectif de tous les hommes	N'a pas subi le test du sida mais connaît un endroit pour le test <sup>2</sup>	Effectif des enquêtés non testés <sup>2</sup>
		Désire être testé	Ne veut pas être testé	NSP/ Manquant <sup>1</sup>				
<b>Âge</b>								
15-19	3,7	64,1	21,3	10,8	100,0	496	28,0	459
20-24	7,2	67,1	19,8	5,9	100,0	409	36,3	371
25-29	8,6	67,9	17,2	6,4	100,0	439	36,2	394
30-39	9,0	61,0	22,6	7,4	100,0	660	36,8	590
40-49	6,9	57,0	27,9	8,2	100,0	461	26,0	417
50-64	3,5	52,3	33,9	10,3	100,0	244	28,3	232
<b>Statut matrimonial</b>								
Célibataire	6,9	63,4	20,1	9,6	100,0	1 001	35,1	898
A déjà eu des rapports sexuels	8,4	65,5	19,9	6,2	100,0	700	39,1	631
N'a jamais eu de rapports sexuels	3,2	58,6	20,6	17,6	100,0	301	25,6	266
En union	6,9	62,0	24,1	7,0	100,0	1 607	30,3	1 472
Divorcé/séparé/veuf	5,2	52,2	33,9	8,7	100,0	101	39,3	93
<b>Milieu de résidence</b>								
Ensemble urbain	10,7	60,3	19,3	9,7	100,0	1 126	46,3	993
Cotonou	17,7	49,2	20,3	12,9	100,0	437	60,6	360
Autres villes	6,3	67,4	18,6	7,7	100,0	689	38,3	633
Rural	4,1	63,4	25,7	6,9	100,0	1 583	22,9	1 470
<b>Département</b>								
Atacora	3,9	64,0	17,9	14,3	100,0	333	25,7	293
Ensemble Atlantique	13,2	52,1	25,8	9,0	100,0	693	44,5	598
Atlantique	5,5	57,0	35,2	2,3	100,0	257	20,2	238
Cotonou	17,7	49,2	20,3	12,9	100,0	437	60,6	360
Borgou	3,7	68,0	19,2	9,1	100,0	440	22,3	415
Mono	6,5	77,3	14,6	1,6	100,0	280	30,5	262
Ouémé	4,5	63,9	24,0	7,6	100,0	449	27,7	417
Zou	5,1	59,7	29,5	5,8	100,0	513	35,0	479
<b>Niveau d'instruction</b>								
Aucun niveau	2,5	62,7	25,2	9,7	100,0	1 081	17,0	1 016
Primaire	4,7	63,8	23,9	7,6	100,0	869	31,9	809
Secondaire ou plus	15,4	59,4	18,9	6,2	100,0	759	57,4	638
Ensemble	6,8	62,1	23,0	8,0	100,0	2 709	32,4	2 463

<sup>1</sup> Y compris ceux qui n'ont pas entendu parler du VIH/sida

<sup>2</sup> Sont exclus ceux qui n'ont pas entendu parler du VIH/sida

## 11.2 LES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

Les informations récentes et fiables sur les IST collectées lors de la deuxième Enquête Démographique et de Santé au Bénin (EDSB-II) permettront certainement de renforcer le contrôle de ces affections. Les informations ainsi collectées sur les IST portent sur :

- La connaissance des symptômes
- La prévalence
- Le traitement
- La prévention
- La connaissance et l'utilisation du condom

### 11.2.1 Connaissance des symptômes des infections sexuellement transmissibles (IST)

Les tableaux 11.9.1 et 11.9.2 présentent les informations recueillies sur la connaissance des hommes et des femmes des symptômes liés aux infections sexuellement transmissibles (IST). Dans ces tableaux, on a distingué les symptômes d'IST chez les hommes de ceux chez les femmes. Dans l'ensemble, les résultats indiquent qu'environ sept femmes sur dix (71 %) ne connaissent aucune IST. Par contre, 16 % connaissent au moins deux symptômes d'IST chez les hommes et 18 % connaissent des symptômes d'IST chez les femmes elles-mêmes. Par contre, les hommes ont un niveau de connaissance très élevé des signes associés aux IST. Parmi eux, seulement 30 % ont déclaré ne connaître aucune IST. En revanche, on remarque que les hommes connaissent mieux les signes liés aux IST chez les hommes eux-mêmes que chez les femmes. Ainsi 46 % des hommes connaissent au moins deux signes liés aux IST chez les hommes contre seulement 25 % pour les femmes.

Selon l'âge, on remarque que les femmes les plus jeunes, âgées de 15-19 ans, sont proportionnellement les plus nombreuses à ne connaître aucune IST (82 % contre 70 % ou moins chez les femmes plus âgées). Selon l'état matrimonial, c'est parmi les femmes n'ayant jamais eu de rapports sexuels (88 %) que figure la proportion la plus élevée de femmes qui ne connaissent aucune IST. Par contre, on note des proportions relativement moins élevées chez les femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (60 %) et chez les femmes divorcées (63 %). Selon le milieu de résidence, on constate que c'est à Cotonou que les femmes sont les moins nombreuses à ne pas connaître une IST (59 % contre 87 % dans le Mono). Au niveau départemental, les écarts notés entre les niveaux de connaissance des IST sont importants et varient d'une région à l'autre. Le Mono affiche le taux le plus élevé de femmes qui ne les connaissent pas, soit 87 %, suivi de 79 % pour l'Atacora, 74 % pour le Borgou et enfin 73 % pour l'Ouémé. Dans les autres départements les proportions paraissent moins importantes et s'établissent à 65 % et 63 % respectivement dans le Zou et l'Atlantique. Le niveau d'instruction semble influencer positivement le niveau de connaissance des IST. Environ quatre femmes sur dix (39 %) d'un niveau d'instruction secondaire ou plus ne connaissent aucune IST, alors qu'on recense les pourcentages les plus élevés, soit 79 % au sein des femmes sans niveau d'instruction, et 70 % chez les femmes d'un niveau d'instruction primaire.

Chez les hommes selon l'âge, on note que les plus jeunes (15-24 ans) sont les plus nombreux, soit environ 44 %, à ne connaître aucune IST. Selon le statut matrimonial, on constate que les hommes en union et les divorcés ont une meilleure connaissance des IST car seulement 24 % et 17 % ont déclaré ne pas en connaître. Les hommes résidant à Cotonou ont un niveau de connaissance assez élevé des IST par rapport à ceux des autres milieux urbain et rural. Au niveau régional, les variations existantes sont assez significatives. Cotonou se distingue des autres avec un faible taux, soit moins d'un homme sur dix, qui ne connaît aucune IST, suivi du département du Mono dont la proportion est de deux hommes sur dix. Dans les autres départements comme l'Atacora (44 %), l'Atlantique (44 %) et l'Ouémé (45 %), les proportions d'hommes qui ne connaissent aucune IST sont assez élevées. Au plan de l'instruction, on constate que les

hommes sans niveau d'instruction (36 %) ou d'un niveau d'instruction primaire (34 %) qui ne connaissent aucun signe sont deux fois plus nombreux que les hommes d'un niveau d'instruction secondaire et plus (17 %).

Tableau 11.9.1 Connaissance par les femmes des symptômes des infections sexuellement transmissibles (IST)

Pourcentage des femmes qui connaissent les signes associés aux infections sexuellement transmissibles (IST) chez l'homme et chez la femme, selon les caractéristiques socio-démographiques, Bénin 2001

Caractéristique socio-démographique	Connaissance des symptômes d'IST chez l'homme					Connaissance des symptômes d'IST chez la femme				Effectif des enquêtées
	Aucune connaissance des IST	Aucun symptôme déclaré	Un symptôme déclaré	Au moins deux symptômes déclarés	Manquant	Aucun symptôme déclaré	Un symptôme déclaré	Au moins deux symptômes déclarés	Manquant	
<b>Âge</b>										
15-19	81,5	6,4	3,6	8,5	0,0	6,0	3,1	9,4	0,0	1 233
20-24	70,3	7,5	6,6	15,5	0,1	6,2	5,6	17,8	0,1	1 215
25-29	68,5	8,7	5,8	16,9	0,1	6,6	3,8	21,0	0,1	1 170
30-39	67,3	8,3	5,2	19,1	0,1	5,9	4,9	21,7	0,1	1 611
40-49	70,2	7,3	4,7	17,8	0,0	3,7	4,2	22,0	0,0	990
<b>Statut matrimonial</b>										
Célibataire	72,4	9,0	5,3	13,3	0,0	7,4	4,7	15,5	0,0	1 351
A déjà eu des rapports sexuels	60,0	12,7	7,1	20,2	0,0	9,7	6,1	24,2	0,0	740
N'a jamais eu de rapports sexuels	87,5	4,5	3,0	5,0	0,0	4,7	2,9	5,0	0,0	611
En union	71,6	7,3	5,1	15,9	0,1	5,3	4,2	18,8	0,1	4 563
Divorcée/séparée/veuve	63,3	7,3	6,9	22,5	0,0	5,1	5,4	26,3	0,0	306
<b>Milieu de résidence</b>										
Ensemble urbain	65,0	10,3	5,8	18,8	0,0	7,4	5,1	22,5	0,0	2 529
Cotonou	58,5	15,9	5,5	19,9	0,1	9,6	4,8	27,0	0,1	912
Autres villes	68,7	7,1	6,0	18,2	0,0	6,1	5,2	20,0	0,0	1 617
Rural	75,7	5,9	4,8	13,5	0,1	4,7	3,9	15,6	0,1	3 690
<b>Département</b>										
Atacora	78,9	3,5	3,2	14,4	0,0	3,9	3,5	13,7	0,0	694
Ensemble Atlantique	62,6	13,3	6,0	18,1	0,1	8,7	4,4	24,4	0,1	1 501
Atlantique	68,8	9,2	6,8	15,2	0,0	7,2	3,6	20,3	0,0	589
Cotonou	58,5	15,9	5,5	19,9	0,1	9,6	4,8	27,0	0,1	912
Borgou	74,0	5,8	8,4	11,8	0,0	5,2	7,6	13,2	0,0	995
Mono	86,6	3,2	2,8	7,4	0,0	2,3	2,3	8,9	0,0	717
Ouémé	73,0	7,0	5,2	14,8	0,0	5,5	5,1	16,4	0,0	1 106
Zou	65,4	8,0	4,1	22,3	0,2	6,0	2,8	25,7	0,2	1 205
<b>Niveau d'instruction</b>										
Aucun niveau	79,1	5,1	4,1	11,7	0,1	3,9	3,2	13,8	0,1	3 984
Primaire	69,7	8,1	5,6	16,5	0,1	6,5	4,5	19,3	0,1	1 371
Secondaire ou plus	38,6	18,9	9,8	32,8	0,0	13,4	9,5	38,6	0,0	864
Ensemble	71,4	7,7	5,2	15,7	0,1	5,8	4,4	18,4	0,1	6 219



Tableau 11.9.2 Connaissance par les hommes des symptômes des infections sexuellement transmissibles (IST)

Pourcentage des hommes qui connaissent les signes associés aux infections sexuellement transmissibles (IST) chez l'homme et chez la femme, selon les caractéristiques socio-démographiques, Bénin 2001

Caractéristique socio-démographique	Connaissance des symptômes d'IST chez l'homme					Connaissance des symptômes d'IST chez la femme					Effectif des enquêtes
	Aucune connaissance des IST	Aucun symptôme déclaré	Un symptôme déclaré	Au moins deux symptômes déclarés	Manquant	Aucun symptôme déclaré	Un symptôme déclaré	Au moins deux symptômes déclarés	Manquant		
<b>Âge</b>											
15-19	56,5	6,6	14,0	22,8	0,2	24,3	8,2	10,9	0,2	496	
20-24	29,8	6,3	17,6	46,0	0,3	35,6	12,1	22,2	0,3	409	
25-29	24,0	6,0	18,6	51,4	0,0	35,7	13,2	27,2	0,0	439	
30-39	21,5	6,3	18,3	53,7	0,1	36,8	14,3	27,2	0,1	660	
40-49	23,5	4,8	18,7	53,0	0,0	28,5	16,1	31,9	0,0	461	
50-64	22,8	4,4	20,9	51,9	0,0	27,4	16,4	33,4	0,0	244	
<b>Statut matrimonial</b>											
Célibataire	41,9	7,4	15,2	35,4	0,1	30,3	10,0	17,8	0,1	1 001	
A déjà eu des rapports sexuels	31,3	8,4	17,3	43,0	0,0	35,1	11,2	22,4	0,0	700	
N'a jamais eu de rapports sexuels	66,4	5,1	10,4	17,7	0,3	19,2	7,1	7,1	0,3	301	
En union	23,5	5,1	19,0	52,3	0,1	32,4	15,0	29,0	0,1	1 607	
Divorcé/séparé/veuf	16,9	4,0	22,5	56,5	0,0	39,6	14,8	28,7	0,0	101	
<b>Milieu de résidence</b>											
Ensemble urbain	21,3	8,9	18,0	51,6	0,1	39,9	14,0	24,7	0,1	1 126	
Cotonou	9,1	12,6	20,0	58,2	0,0	55,4	13,1	22,4	0,0	437	
Autres villes	29,1	6,6	16,7	47,5	0,2	30,1	14,6	26,1	0,2	689	
Rural	36,2	3,7	17,6	42,3	0,1	26,2	12,5	24,9	0,1	1 583	
<b>Département</b>											
Atacora	44,3	4,5	16,3	34,6	0,3	17,1	15,9	22,4	0,3	333	
Ensemble Atlantique	22,1	8,7	20,6	48,5	0,1	47,3	11,4	19,1	0,1	693	
Atlantique	44,2	2,0	21,6	31,9	0,3	33,7	8,4	13,4	0,3	257	
Cotonou	9,1	12,6	20,0	58,2	0,0	55,4	13,1	22,4	0,0	437	
Borgou	23,3	6,1	22,3	48,4	0,0	31,3	19,6	25,8	0,0	440	
Mono	16,2	1,9	12,7	69,2	0,0	35,1	11,5	37,3	0,0	280	
Ouémé	44,7	10,1	12,1	32,9	0,3	36,4	7,5	11,2	0,3	449	
Zou	32,0	1,4	18,7	47,9	0,0	15,4	14,0	38,5	0,0	513	
<b>Niveau d'instruction</b>											
Aucun niveau	36,3	3,4	17,9	42,3	0,2	25,4	13,8	24,3	0,2	1 081	
Primaire	33,8	5,5	16,3	44,4	0,0	32,5	11,0	22,6	0,0	869	
Secondaire ou plus	16,8	9,9	19,2	53,9	0,2	40,4	14,6	28,1	0,2	759	
Ensemble	30,0	5,9	17,8	46,2	0,1	31,9	13,1	24,8	0,1	2 709	

### 11.2.2 Prévalence déclarée des IST et leurs symptômes

Le tableau 11.10 fournit les proportions de femmes et d'hommes ayant eu une infection sexuellement transmissible au cours des 12 derniers mois précédant l'enquête. Au cours des douze derniers mois ayant précédé l'enquête, 1 % des femmes a eu une IST contre 3 % des hommes. Pour les IST dont les symptômes sont apparents, tels que l'écoulement génital ou la plaie, les fréquences sont légèrement plus élevées au niveau des deux sexes, 3 % chez les femmes et 4 % chez les hommes. Les IST sont en général plus faciles à identifier en raison de leurs manifestations apparentes.

Tableau 11.10 Prévalence déclarée des infections sexuellement transmissibles (IST) et leurs symptômes

Pourcentage d'enquêtés ayant déjà eu des rapports sexuels qui ont déclaré avoir eu une infection sexuellement transmissible (IST) et/ou des symptômes associés aux IST au cours des 12 mois précédant l'enquête, selon les caractéristiques socio-démographiques, Bénin 2001

Caractéristique socio-démographique	Pourcentage ayant déclaré avoir eu une IST	Pourcentage avec écoulement génital	Pourcentage avec plaie ou douleur génitale	Pourcentage avec IST/écoulement/douleur ou plaie génitale	Effectif des enquêtés
<b>FEMMES</b>					
<b>Âge</b>					
15-19	0,7	1,8	0,9	2,6	687
20-24	1,1	2,7	1,2	3,5	1 153
25-29	1,5	3,3	0,8	3,8	1 167
30-39	1,6	2,0	0,8	2,6	1 611
40-49	1,2	1,2	0,7	2,1	990
<b>Milieu de résidence</b>					
Ensemble urbain	1,7	3,2	1,3	4,2	2 244
Cotonou	2,1	3,9	1,3	4,8	809
Autres villes	1,6	2,9	1,4	3,8	1 434
Rural	1,0	1,6	0,6	2,1	3 364
<b>Département</b>					
Atacora	1,4	1,1	0,4	1,6	651
Ensemble Atlantique	1,9	3,6	1,3	4,5	1 350
Atlantique	1,6	3,1	1,4	4,0	540
Cotonou	2,1	3,9	1,3	4,8	809
Borgou	2,1	3,2	1,1	4,3	927
Mono	0,6	0,6	0,3	0,9	602
Ouémé	0,9	2,5	0,6	2,8	977
Zou	0,5	1,3	1,1	1,9	1 102
<b>Niveau d'instruction</b>					
Aucun niveau	0,9	1,2	0,7	1,9	3 695
Primaire	1,7	3,1	1,1	3,7	1 193
Secondaire ou plus	2,6	6,2	1,3	6,8	720
Ensemble	1,3	2,3	0,9	2,9	5 608
<b>HOMMES</b>					
<b>Âge</b>					
15-19	0,8	3,8	0,4	4,2	253
20-24	3,6	3,8	2,6	5,6	366
25-29	2,4	2,6	1,7	4,4	426
30-39	3,5	2,4	1,4	4,8	658
40-49	2,2	1,9	1,2	2,9	461
50-64	0,4	0,7	0,0	0,7	244
<b>Milieu de résidence</b>					
Ensemble urbain	4,1	3,4	1,9	5,5	982
Cotonou	6,8	4,9	2,7	8,7	383
Autres villes	2,4	2,4	1,4	3,4	599
Rural	1,3	1,9	1,0	3,0	1 426
<b>Département</b>					
Atacora	1,6	2,9	2,2	4,4	293
Ensemble Atlantique	4,9	3,9	2,7	7,3	605
Atlantique	1,5	2,2	2,6	4,9	223
Cotonou	6,8	4,9	2,7	8,7	383
Borgou	2,3	1,8	0,5	2,7	402
Mono	1,0	1,4	1,0	2,7	255
Ouémé	1,6	1,9	1,3	2,6	403
Zou	1,6	2,4	0,0	2,4	451
<b>Niveau d'instruction</b>					
Aucun niveau	1,2	1,7	1,2	2,7	1 010
Primaire	2,5	2,9	1,1	4,0	762
Secondaire ou plus	4,4	3,4	1,9	6,1	636
Ensemble	2,5	2,5	1,4	4,0	2 408

### 11.2.3 Traitement des IST

Le tableau 11.11 indique que la majorité des femmes et des hommes qui ont souffert d'une IST (y compris l'écoulement génital et la plaie/douleur génitale) au cours des douze derniers mois précédant l'enquête ont cherché un traitement/conseil dans un établissement sanitaire (respectivement 58 % et 55 %). On note cependant que les personnes consultent moins le personnel de santé lorsqu'il s'agit de plaie/douleur génitale ou d'écoulement génital que lorsqu'il s'agit d'autres IST déclarées (au niveau des femmes, respectivement 56 % et 60 % contre 68 %, et au niveau des hommes, 51 % et 52 % contre 71 %). Par ailleurs, on note que près du quart (23 %) des femmes et des hommes ayant souffert d'une IST quelconque n'a cherché aucun traitement ou conseil ni auprès du personnel de santé, ni auprès des guérisseurs traditionnels, des pharmacies ou boutiques, ni auprès des amis.

Tableau 11.11 Source de traitement des infections sexuellement transmissibles (IST)							
Pourcentage des femmes et des hommes qui ont déclaré avoir eu une infection sexuellement transmissible (IST) au cours des 12 mois précédant l'enquête par source de traitement ou de conseil, Bénin 2001							
Type de symptôme	Médecin de clinique/hôpital privé	Guérisseur traditionnel	Conseil ou médicament de boutique/pharmacie	Conseils des ami(e)s/parents	Conseil ou traitement quelconque	Aucun conseil ou traitement	Effectif des enquêtés
FEMMES							
IST déclarée	67,8	15,0	21,1	20,9	84,2	14,5	72
Écoulement génital	59,5	11,3	22,9	20,1	73,6	24,7	127
Plaie/douleur génitale	55,8	15,9	25,1	35,1	85,9	14,1	50
Ensemble	58,1	11,8	22,4	21,5	74,9	23,2	164
HOMMES							
IST déclarée	70,9	23,8	45,0	53,5	85,7	10,9	59
Écoulement génital	52,1	25,9	31,4	53,3	74,4	22,3	61
Plaie/douleur génitale	50,7	14,0	32,1	39,6	70,6	26,2	33
Ensemble	55,3	21,2	36,2	44,8	75,1	22,8	96

### 11.2.4 Prévention des IST

Le tableau 11.12 fournit des informations sur le comportement des femmes ayant eu une IST au cours des douze derniers mois précédant l'enquête, vis-à-vis de leur partenaire. On remarque que plus des trois quarts (77 %) des femmes ayant contracté une IST ont informé leurs partenaires de leur infection. Les fréquences les plus élevées s'observent parmi les femmes ayant développé une IST (82 %), alors que les plus faibles se trouvent parmi celles qui ont eu des symptômes associés, soit 74 % pour les écoulements génitaux et 76 % pour une plaie ou une douleur génitale.

Par rapport aux dispositions prises par les femmes souffrant d'une IST pour empêcher le mari/partenaire d'être infecté, on note que la moitié (50 %) des femmes ont traité leur infection à l'aide de médicament, 43 % se sont abstenus des rapports sexuels avec leur partenaire, et enfin seulement 8 % ont utilisé un condom lors des rapports sexuels. Dans l'ensemble six femmes sur dix (61 %) ont pris au moins l'une de ces précautions pour ne pas infecter leurs partenaires. La tendance ainsi décrite est pratiquement identique au sein de celles qui ont eu des symptômes associés à une IST. Par contre, il faut noter qu'une proportion non négligeable de femmes (31 %) n'ont pris aucune précaution pour éviter de transmettre leur

infection à leur partenaire. On note, par ailleurs, que 5 % des femmes ont déclaré que leur partenaire était déjà infecté.

Tableau 11.12 Protection du mari/partenaire par les femmes qui ont des infections sexuellement transmissibles (IST)

Répartition (en %) des femmes qui ont déjà eu une infection sexuellement transmissible (IST) et/ou des symptômes associés aux IST, au cours des 12 mois précédant l'enquête selon qu'elles ont informé leurs partenaires de leur état et pourcentage de celles qui ont pris des mesures pour ne pas infecter leurs partenaires, selon le type de symptôme, Bénin 2001

Type de symptôme	A informé partenaire(s)				Précautions prises pour protéger partenaire							Effectif des enquêtées
	Oui	Quelque peu, pas du tout	Non	Sans partenaire/ Manquant	Total	A évité rapport sexuel	A utilisé condoms	A utilisé médicament	N'importe quelle précaution	Aucune précaution	Partenaire déjà infecté(e)	
IST déclarée	82,2	0,0	16,4	1,4	100,0	48,3	13,3	55,5	65,4	24,9	8,3	72
Écoulement génital	74,0	0,0	24,4	1,7	100,0	41,6	6,9	46,8	60,8	30,1	5,8	127
Plaie/douleur génitale	76,3	2,4	21,3	0,0	100,0	44,2	8,5	60,1	70,5	21,4	6,0	50
Ensemble	76,6	0,7	20,8	1,9	100,0	42,8	7,8	49,5	61,0	30,8	5,1	164

### 11.2.5 Activités sexuelles des femmes et des hommes

Dans le tableau 11.13 figurent les proportions de femmes et d'hommes actuellement en union qui ont eu des rapports sexuels avec des personnes autres que leurs époux/épouses ou partenaires au cours des douze derniers mois précédant l'enquête. À l'examen du tableau 11.13, on note que la quasi totalité des femmes enquêtées, soit 99 %, n'ont pas eu de rapports sexuels avec une personne autre que leur époux ou partenaire, contre environ 76 % des hommes.

On note, par ailleurs, que les proportions de femmes en union qui n'ont pas eu de rapport sexuel avec une personne autre que leurs époux ou partenaires sont élevées quelle que soit la caractéristique socio-démographique considérée (âge, milieu de résidence, département, niveau d'instruction). Toutefois, on note qu'une proportion non négligeable de femmes ayant le niveau d'instruction secondaire (4 %) ont eu des rapports sexuels avec une personne autre que leur conjoint.

En ce qui concerne les hommes, on observe d'importantes variations de la proportion de ceux qui n'ont pas eu de rapports sexuels avec une personne autre que leur épouse ou partenaire. Cette proportion varie de 57 % chez les hommes de 20-24 ans à 88 % chez ceux de 50-64 ans ; de 61 % dans la ville de Cotonou à 90 % dans le Mono, et à 78 % en milieu rural ; de 62 % chez ceux ayant le niveau d'instruction secondaire ou plus à 83 % chez ceux sans niveau d'instruction (tableau 11.13).

Le tableau 11.14 présente les résultats des enquêtés qui ne sont pas en union, mais qui ont eu des rapports sexuels avec un certain nombre de personnes au cours des 12 derniers mois précédant l'enquête.

Les résultats du tableau 11.14 indiquent qu'un peu plus de la moitié des femmes non en union (58 %) n'a eu aucun rapport sexuel au cours des 12 derniers mois, alors que 39 % ont déclaré en avoir eu avec une seule personne ; seule une faible proportion (3 %) a eu des rapports sexuels avec plus de deux personnes. Les hommes qui ne sont pas en union sont plus nombreux à avoir déclaré avoir eu des rapports sexuels avec une seule personne (37 %) ou avec au moins deux personnes (21 %). Seulement quatre hommes sur dix (42 %) non mariés n'ont pas eu de rapports sexuels au cours des douze derniers mois.

Selon l'âge, on constate qu'à 20-24 ans, 63 % des femmes non mariées ont eu des rapports sexuels au cours des douze derniers mois ; à 20-24 ans, cette proportion est de 52 %. On note également à

Tableau 11.13 Nombre de partenaires sexuels : Femmes et hommes en union

Répartition (en %) des femmes et des hommes actuellement en union par nombre de personnes avec qui ils ont eu des rapports sexuels au cours des 12 mois précédant l'enquête, non-compris les époux ou partenaires qui cohabitent avec eux, selon les caractéristiques socio-démographiques, Bénin 2001

Caractéristique socio-démographique	Nombre de partenaires sexuels en dehors du conjoint(e)				Total	Moyenne	Effectif des enquêtés
	0	1	2 ou plus	NSP/ Manquant			
<b>FEMMES</b>							
<b>Âge</b>							
15-19	98,3	1,3	0,3	0,0	100,0	0,0	287
20-24	97,9	1,8	0,1	0,1	100,0	0,0	867
25-29	98,5	1,2	0,1	0,2	100,0	0,0	1 069
30-39	98,9	0,9	0,1	0,1	100,0	0,0	1 491
40-49	98,9	1,1	0,0	0,0	100,0	0,0	848
<b>Milieu de résidence</b>							
Ensemble urbain	98,0	1,7	0,1	0,1	100,0	0,0	1 572
Cotonou	97,1	2,7	0,0	0,2	100,0	0,0	472
Autres villes	98,4	1,3	0,2	0,1	100,0	0,0	1 100
Rural	98,9	1,0	0,1	0,1	100,0	0,0	2 990
<b>Département</b>							
Atacora	97,9	1,6	0,5	0,0	100,0	0,0	585
Ensemble Atlantique	97,7	2,2	0,0	0,1	100,0	0,0	917
Atlantique	98,4	1,6	0,0	0,0	100,0	0,0	445
Cotonou	97,1	2,7	0,0	0,2	100,0	0,0	472
Borgou	97,7	1,8	0,3	0,3	100,0	0,0	798
Mono	99,7	0,3	0,0	0,0	100,0	0,0	535
Ouémé	99,1	0,9	0,0	0,0	100,0	0,0	769
Zou	99,5	0,4	0,0	0,1	100,0	0,0	958
<b>Niveau d'instruction</b>							
Aucun niveau	98,9	0,9	0,1	0,1	100,0	0,0	3 294
Primaire	98,7	1,2	0,0	0,1	100,0	0,0	883
Secondaire ou plus	95,5	4,3	0,3	0,0	100,0	0,0	385
Ensemble	98,6	1,2	0,1	0,1	100,0	0,0	4 563
<b>HOMMES</b>							
<b>Âge</b>							
20-24	56,9	29,8	12,0	1,3	100,0	0,8	93
25-29	66,1	23,1	9,8	1,0	100,0	0,7	280
30-39	72,2	20,6	5,9	1,2	100,0	0,5	575
40-49	84,5	10,2	4,3	1,0	100,0	0,2	425
50-64	87,9	8,9	1,2	2,0	100,0	0,1	230
<b>Milieu de résidence</b>							
Ensemble urbain	71,4	18,4	8,9	1,3	100,0	0,6	598
Cotonou	61,1	22,2	16,2	0,5	100,0	1,0	193
Autres villes	76,3	16,6	5,5	1,6	100,0	0,4	405
Rural	78,2	16,4	4,2	1,2	100,0	0,3	1 010
<b>Département</b>							
Atacora	77,2	16,1	4,9	1,8	100,0	0,3	206
Ensemble Atlantique	65,0	22,3	12,2	0,5	100,0	0,8	339
Atlantique	70,1	22,5	6,8	0,6	100,0	0,6	146
Cotonou	61,1	22,2	16,2	0,5	100,0	1,0	193
Borgou	80,9	15,6	3,2	0,3	100,0	0,2	307
Mono	89,9	7,3	1,7	1,1	100,0	0,1	154
Ouémé	76,1	16,8	4,4	2,7	100,0	0,4	284
Zou	73,6	19,0	6,3	1,1	100,0	0,4	318
<b>Niveau d'instruction</b>							
Aucun niveau	82,6	13,2	3,2	1,0	100,0	0,3	781
Primaire	73,5	17,9	7,7	1,0	100,0	0,5	510
Secondaire ou plus	62,1	25,7	10,2	2,1	100,0	0,7	317
Ensemble	75,7	17,2	6,0	1,2	100,0	0,4	1 607

Tableau 11.14 Nombre de partenaires sexuels : Femmes et hommes non en union

Répartition (en %) des femmes et des hommes qui ne sont pas en union par nombre de personnes avec qui ils ont eu des rapports sexuels au cours des 12 mois précédant l'enquête, selon les caractéristiques socio-démographiques, Bénin 2001

Caractéristique socio-démographique	Nombre de partenaires sexuels				Total	Moyenne	Effectif des enquêtés
	0	1	2 ou plus	NSP/ Manquant			
<b>FEMMES</b>							
<b>Âge</b>							
15-19	65,8	32,2	2,0	0,0	100,0	0,4	946
20-24	36,9	60,1	3,0	0,0	100,0	0,7	348
25-29	48,4	45,2	6,3	0,0	100,0	0,6	101
30-39	51,2	42,9	6,0	0,0	100,0	0,6	120
40-49	69,4	29,1	0,8	0,8	100,0	0,4	142
<b>Statut matrimonial</b>							
Célibataire	56,3	41,1	2,6	0,0	100,0	0,5	1 351
Divorcée, séparée, veuve	65,0	31,5	3,1	0,4	100,0	0,4	306
<b>Milieu de résidence</b>							
Ensemble urbain	51,1	46,1	2,8	0,0	100,0	0,5	957
Cotonou	44,4	52,5	3,1	0,0	100,0	0,6	440
Autres villes	56,7	40,7	2,6	0,0	100,0	0,5	517
Rural	67,4	30,1	2,4	0,2	100,0	0,4	699
<b>Département</b>							
Atacora	68,3	30,9	0,8	0,0	100,0	0,3	109
Ensemble Atlantique	47,4	49,9	2,7	0,0	100,0	0,6	584
Atlantique	56,7	41,7	1,6	0,0	100,0	0,4	143
Cotonou	44,4	52,5	3,1	0,0	100,0	0,6	440
Borgou	52,9	41,8	5,3	0,0	100,0	0,6	197
Mono	79,2	20,3	0,5	0,0	100,0	0,2	182
Ouémé	64,9	32,6	2,6	0,0	100,0	0,4	337
Zou	57,2	39,5	2,9	0,5	100,0	0,5	247
<b>Niveau d'instruction</b>							
Aucun niveau	67,6	30,4	1,8	0,2	100,0	0,3	689
Primaire	56,4	40,9	2,8	0,0	100,0	0,5	488
Secondaire ou plus	45,6	50,6	3,8	0,0	100,0	0,6	479
Ensemble	57,9	39,3	2,7	0,1	100,0	0,5	1 656
<b>HOMMES</b>							
<b>Âge</b>							
15-19	60,2	29,3	10,5	0,0	100,0	0,6	491
20-24	26,2	42,9	30,6	0,3	100,0	1,4	316
25-29	21,2	46,5	32,3	0,0	100,0	2,0	159
30-39	22,6	51,1	26,3	0,0	100,0	1,4	85
40-49	55,2	23,5	18,8	2,5	100,0	1,0	36
50-64	37,5	42,4	20,0	0,0	100,0	1,6	15
<b>Statut matrimonial</b>							
Célibataire	41,9	37,5	20,5	0,1	100,0	1,1	1 001
Divorcé, séparé, veuf	37,2	35,8	26,1	0,9	100,0	1,4	101
<b>Milieu de résidence</b>							
Ensemble urbain	40,3	33,0	26,7	0,0	100,0	1,3	528
Cotonou	34,2	27,8	38,0	0,0	100,0	1,9	244
Autres villes	45,6	37,5	16,9	0,0	100,0	0,9	285
Rural	42,5	41,4	15,8	0,3	100,0	0,9	573
<b>Département</b>							
Atacora	45,6	39,9	13,8	0,7	100,0	0,8	127
Ensemble Atlantique	37,1	28,7	34,2	0,0	100,0	1,7	355
Atlantique	43,7	30,7	25,6	0,0	100,0	1,3	111
Cotonou	34,2	27,8	38,0	0,0	100,0	1,9	244
Borgou	37,6	48,7	13,8	0,0	100,0	0,8	133
Mono	39,3	47,6	13,1	0,0	100,0	0,8	126
Ouémé	48,3	36,8	14,4	0,6	100,0	0,9	166
Zou	44,9	37,6	17,6	0,0	100,0	0,9	195
<b>Niveau d'instruction</b>							
Aucun niveau	42,2	41,8	15,7	0,3	100,0	0,9	300
Primaire	41,6	39,0	19,1	0,3	100,0	1,1	359
Secondaire ou plus	40,9	33,0	26,2	0,0	100,0	1,3	442
Ensemble	41,5	37,4	21,0	0,2	100,0	1,1	1 102

Cotonou une importante proportion de femmes non mariées ayant eu des rapports sexuels au cours des douze derniers mois (56 % contre 43 % dans les autres villes et 33 % en milieu rural). Au niveau départemental, cette proportion varie de 47 % dans le Borgou à 21 % dans le Mono. On note, par ailleurs, que les femmes non mariées ayant au moins le niveau d'instruction secondaire sont plus nombreuses à avoir eu des rapports sexuels (54 % contre 32 % chez celles sans niveau d'instruction). Par contre, au niveau des hommes non mariés, cette proportion ne varie pratiquement pas selon le niveau d'instruction (58 % chez ceux sans instruction contre 59 % chez ceux ayant le niveau d'instruction secondaire ou plus).

### **11.2.6 Connaissance et utilisation du condom**

Le tableau 11.15 fournit les proportions des enquêtés qui connaissent un endroit où se procurer des condoms et qui peuvent s'en procurer personnellement. À l'examen de ce tableau, on observe un taux assez faible, soit 29 %, pour l'ensemble des femmes enquêtées qui connaissent une source d'approvisionnement du condom masculin et moins de la moitié, soit 13 %, qui peuvent s'en procurer. Par contre, plus de six hommes (62 %) connaissent au moins une source d'approvisionnement du condom et une même proportion a déclaré pouvoir s'en procurer.

Au niveau des femmes, la connaissance d'une source d'approvisionnement du condom varie selon l'âge (20 % chez les femmes de 40-49 ans contre 35 % chez celles de 20-24 ans), selon l'état matrimonial (59 % chez les célibataires sexuellement actives contre 25 % chez les femmes en union), selon le milieu de résidence (63 % à Cotonou contre 34 % dans les autres villes et 19 % en milieu rural) et selon le département (15 % dans l'Atacora et 17 % dans le Mono contre environ le quart dans les autres départements et 63 % à Cotonou). On observe les mêmes variations au niveau des hommes.



Tableau 11.15 Connaissance d'une source d'approvisionnement du condom et accès aux condoms

Pourcentage des femmes et des hommes qui connaissent un endroit où se procurer des condoms, et pourcentage de ceux qui pensent pouvoir se procurer eux-mêmes un condom, selon les caractéristiques socio-démographiques, Bénin 2001

Caractéristique socio-démographique	Femmes		Effectif des femmes	Hommes		Effectif des hommes
	Connaît une source d'approvisionnement du condom masculin	Peut s'approvisionner en condom masculin		Connaît une source d'approvisionnement du condom masculin	Peut s'approvisionner en condom masculin	
<b>Âge</b>						
15-19	30,8	13,0	1 233	70,1	59,4	496
20-24	35,2	16,6	1 215	71,6	70,5	409
25-29	30,6	11,9	1 170	69,4	70,2	439
30-39	28,3	12,7	1 611	63,2	68,7	660
40-49	20,3	7,7	990	50,1	52,8	461
50-64	na	na	na	32,5	32,7	244
<b>Statut matrimonial</b>						
Célibataire	42,2	20,0	1 351	71,7	66,6	1 001
A déjà eu des rapports sexuels	58,8	28,6	740	78,8	77,4	700
N'a jamais eu de rapports sexuels	22,0	9,6	611	55,3	41,6	301
En union	25,2	10,2	4 563	56,0	59,0	1 607
Divorcé(e)/séparé(e)/veuf(ve)	33,5	14,9	306	53,4	52,0	101
<b>Milieu de résidence</b>						
Ensemble urbain	44,3	18,4	2 529	75,8	70,5	1 126
Cotonou	62,6	24,1	912	91,4	76,6	437
Autres villes	34,0	15,3	1 617	65,9	66,6	689
Rural	19,0	8,6	3 690	51,7	55,2	1 583
<b>Département</b>						
Atacora	14,8	6,4	694	47,7	54,9	333
Ensemble Atlantique	49,3	18,9	1 501	79,0	67,1	693
Atlantique	28,7	10,9	589	57,9	51,0	257
Cotonou	62,6	24,1	912	91,4	76,6	437
Borgou	23,0	12,1	995	48,0	64,2	440
Mono	16,7	8,5	717	72,6	65,8	280
Ouémé	26,4	8,5	1 106	57,3	56,6	449
Zou	28,2	14,9	1 205	57,1	58,0	513
<b>Niveau d'instruction</b>						
Aucun niveau	16,7	6,3	3 984	39,1	48,6	1 081
Primaire	37,7	14,9	1 371	65,3	61,5	869
Secondaire ou plus	74,0	38,0	864	89,9	80,0	759
Ensemble	29,3	12,6	6 219	61,7	61,6	2 709
na = Non applicable						

Les tableaux 11.16.1 et 11.16.2 présentent les résultats des personnes enquêtées qui ont eu des rapports sexuels au cours des douze derniers mois précédant l'enquête et qui ont utilisé un condom soit avec leur conjoint ou partenaire cohabitant, soit avec un partenaire non-cohabitant ou enfin avec un partenaire quelconque. On constate en général que, quel que soit le partenaire, 4 % des femmes ont utilisé un condom ; seulement 2 % en ont utilisé un lorsque les derniers rapports ont eu lieu avec le conjoint alors que quand les derniers rapports sexuels ont eu lieu avec un partenaire non cohabitant, cette proportion est de 16 %. Chez les hommes, quelle que soit la partenaire, 15 % ont déclaré avoir utilisé un condom lors des derniers rapports sexuels ; 31 % en ont utilisé un avec une partenaire non cohabitante,

Tableau 11.16.1 Utilisation du condom chez les femmes par type de partenaire

Parmi les femmes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 mois précédant l'enquête, pourcentage de celles qui ont utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels avec leur conjoint ou partenaire cohabitant, avec un partenaire non-cohabitant et avec n'importe quel partenaire, selon les caractéristiques socio-démographiques, Bénin 2001

Caractéristique socio-démographique	Conjoint ou partenaire cohabitant		Partenaire non cohabitant		Un quelconque partenaire	
	Pourcentage	Effectif	Pourcentage	Effectif	Pourcentage	Effectif
<b>Âge</b>						
15-19	1,2	247	17,6	328	10,6	575
20-24	3,1	751	20,3	236	7,3	981
25-29	2,4	919	11,3	66	2,9	979
30-39	0,9	1 267	7,2	74	1,3	1 335
40-49	0,3	699	6,2	51	0,6	747
<b>Statut matrimonial</b>						
Célibataire	na	na	17,8	590	17,8	615
A déjà eu des rapports sexuels	na	na	17,8	590	17,8	615
En union	1,5	3 807	11,9	61	1,6	3 848
Divorcée/séparée/veuve	2,1	51	8,8	106	6,7	155
<b>Milieu de résidence</b>						
Ensemble urbain	2,2	1 379	20,7	498	7,0	1 864
Cotonou	2,9	441	19,6	258	8,8	692
Autres villes	1,8	937	21,9	240	6,0	1 173
Rural	1,3	2 504	7,1	258	1,8	2 753
<b>Département</b>						
Atacora	1,7	393	16,1	47	3,3	435
Ensemble Atlantique	2,0	841	17,0	327	6,1	1 158
Atlantique	1,0	400	7,5	69	2,0	467
Cotonou	2,9	441	19,6	258	8,8	692
Borgou	1,5	610	19,2	109	4,2	717
Mono	1,7	458	17,4	40	2,9	497
Ouémé	1,6	713	16,7	125	3,9	835
Zou	1,2	869	8,9	108	2,1	976
<b>Niveau d'instruction</b>						
Aucun niveau	1,0	2 749	5,1	255	1,4	2 990
Primaire	1,7	779	14,4	223	4,5	997
Secondaire ou plus	5,6	356	27,5	278	15,1	630
Ensemble	1,6	3 883	16,1	756	3,9	4 617

na = Non applicable

Tableau 11.16.2 Utilisation du condom chez les hommes par type de partenaire

Parmi les hommes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 mois précédant l'enquête, pourcentage de ceux qui ont utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels avec leur conjointe ou partenaire cohabitante, avec une partenaire non-cohabitante et avec n'importe quelle partenaire, selon les caractéristiques socio-démographiques, Bénin 2001.

Caractéristique socio-démographique	Conjointe ou partenaire cohabitante		Partenaire non cohabitante		Une quelconque partenaire	
	Pourcentage	Effectif	Pourcentage	Effectif	Pourcentage	Effectif
<b>Âge</b>						
15-19	*	*	34,0	199	34,1	202
20-24	5,9	71	34,7	272	30,2	320
25-29	9,2	238	29,6	219	17,2	391
30-39	4,7	508	31,7	222	9,8	623
40-49	3,4	392	16,1	78	4,6	421
50-64	1,4	206	21,0	31	2,2	217
<b>Statut matrimonial</b>						
Célibataire	na	na	34,7	581	34,5	584
A déjà eu des rapports sexuels	na	na	34,7	581	34,5	584
En union	4,7	1 403	26,5	376	6,6	1 521
Divorcé/séparé/veuf	0,0	13	23,5	63	21,6	69
<b>Milieu de résidence</b>						
Ensemble urbain	5,1	531	36,7	480	19,3	884
Cotonou	6,2	184	36,4	235	23,6	349
Autres villes	4,5	346	37,0	245	16,5	535
Rural	4,5	888	25,9	541	11,4	1 290
<b>Département</b>						
Atacora	9,2	152	34,7	114	18,0	246
Ensemble Atlantique	5,6	321	31,9	340	19,0	554
Atlantique	4,7	137	21,8	105	11,2	205
Cotonou	6,2	184	36,4	235	23,6	349
Borgou	3,7	240	17,4	141	8,4	361
Mono	2,4	146	45,7	91	17,7	225
Ouémé	2,3	271	33,6	146	11,6	362
Zou	5,8	288	28,1	189	13,1	425
<b>Niveau d'instruction</b>						
Aucun niveau	3,8	665	20,2	302	8,0	897
Primaire	5,8	464	22,3	341	12,2	703
Secondaire ou plus	5,2	290	47,5	377	27,8	574
Ensemble	4,7	1 419	31,0	1 021	14,6	2 174

na = Non applicable

\* Basé sur moins de 25 cas non pondérés

mais quand les derniers rapports sexuels ont eu lieu avec l'épouse ou la partenaire cohabitante, cette proportion n'est plus que de 5 %.

Selon les caractéristiques socio-démographiques, l'utilisation du condom est relativement élevée chez les femmes de 15-19 ans et de 20-24 ans (respectivement 11 % et 7 % contre moins de 4 % chez celles de 25 ans ou plus), chez les femmes célibataires (18 % contre 2 % chez les femmes en union et 7 % chez celles en rupture d'union), chez celles du milieu urbain (7 % contre 2 % chez celles du milieu rural)

et, enfin, celles ayant le niveau d'instruction secondaire ou plus (15 % contre 5 % chez celles ayant le niveau d'instruction primaire et 1 % chez celles sans instruction). Cependant, au niveau départemental, à l'exception de Cotonou (9 %), les variations sont faibles (4 % dans le Borgou et l'Ouémé contre 2 % dans le Zou et l'Atlantique). Par contre, chez les hommes l'utilisation du condom varie considérablement selon le département, passant de 8 % dans le Borgou à 18 % dans le Mono et l'Atacora, et à 24 % dans la ville de Cotonou.