Mali



Enquête Démographique et de Santé 2023–2024

RÉPUBLIQUE DU MALI

Enquête Démographique et de Santé du Mali 2023–2024

Institut National de la Statistique (INSTAT)
Bamako, Mali

Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Santé, Développement Social et Promotion de la Famille (CPS/SS-DS-PF)
Bamako, Mali

The DHS Program
ICF
Rockville, Maryland, USA

Septembre 2025

La septième enquête Démographique et de Santé au Mali 2023-2024 (EDSM VII) a été mise en œuvre par l'Institut National de la Statistique (INSTAT) en étroite collaboration avec la Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Santé, Développement Social et Promotion de la Famille (CPS/SS-DS-PF). Le financement de l'EDSM-VII a été assuré par l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), le Fonds mondial, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et le Gates Foundation. ICF a fourni l'assistance technique à l'ensemble du projet par le biais du DHS Program, un projet financé par l'USAID, et dont l'objectif est de fournir un support et une assistance technique pour la réalisation d'enquêtes dans les domaines de la population et de la santé dans de nombreux pays dans le monde.

Des informations supplémentaires sur l'EDSM-VII peuvent être obtenues en s'adressant à l'Institut National de la Statistique (INSTAT), avenue du Mali, Hamdallaye ACI 2000 ; téléphone : (223) 20 22 24 55/(223) 20 22 48 73, fax : (223) 20 22 71 45 – CNPE : 20 23 54 82 ; NIF : 084115843-C ; email : cnpe.mail@afribone.net.ml ; la Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Santé, Développement Social et Promotion de la Famille (CPS/SS-DS-PF) ; B.P. 232, Bamako, Mali, téléphone : (223) 20 73 31 41.

Des informations sur The DHS Program peuvent être obtenues en s'adressant à ICF, 530 Gaither Road, Suite 500, Rockville, MD 20850, USA ; téléphone : +1-301-407-6500 ; fax : +1-301-407-6501 ; email : info@DHSprogram.com ; internet : www.DHSprogram.com.

Le contenu de ce rapport relève de la seule responsabilité de l'Institut National de la Statistique (INSTAT) et de la Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Santé, Développement Social et Promotion de la Famille (CPS/SS-DS-PF) et ne reflète pas nécessairement les opinions de l'USAID, du Gouvernement des États-Unis ou d'autres agences contributrices.

Citation recommandée :

Institut National de la Statistique (INSTAT), Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Santé, Développement Social et Promotion de la Famille (CPS/SS-DS-PF) et ICF. 2025. *Enquête Démographique et de Santé au Mali 2023–2024. Rapport Final*. Bamako, Mali, et Rockville, Maryland, USA : INSTAT, CPS/SS-DS-PF, et ICF.

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES TABLEAUX, GRAPHIQUES, ET CARTES ..... **ix**
PRÉFACE ..... **xxiii**
REMERCIEMENTS ..... **xxv**
ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS ..... **xxvii**
LIRE ET COMPRENDRE LES TABLEAUX DE L'ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ DU MALI (EDSM-VII) 2023–2024 ..... **xxxi**
INDICATEURS SUR LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE, EDSM-VII MALI 2023–2024 ..... **xxxix**
CARTE DE MALI ..... **xlii**

1 PRÉSENTATION ET MÉTHODOLOGIE DE L'ENQUÊTE **1**
1.1 Objectifs de l'enquête 1
1.2 Conception de l'échantillon 1
1.3 Questionnaires 3
1.4 Test de l'iode dans le sel, anthropométrie, dépistage de l'anémie 4
1.5 Formation des formateurs et prétest 5
1.5.1 Formation des formateurs et prétest 5
1.5.2 Formation des agents cartographes, énumérateurs et travaux de terrain 5
1.6 Formation du personnel de terrain 6
1.7 Travail de terrain 6
1.8 Traitement des données 7
1.9 Taux de réponse 8

2 CARACTÉRISTIQUES DU LOGEMENT ET DE LA POPULATION DES MÉNAGES **11**
2.1 Caractéristiques du logement 11
2.1.1 Utilisation de combustibles et d'équipements propres 12
2.1.2 Combustibles de cuisson 12
2.1.3 Combustibles de chauffage et éclairage 12
2.1.4 Dépendance principale aux combustibles et aux équipements propres 13
2.2 Bien-être économique des ménages 13
2.2.1 Biens durables des ménages 13
2.2.2 Indice de bien-être économique 14
2.3 Population et composition des ménages 15
2.4 État de survie des parents et résidence des enfants avec les parents 16
2.5 Enregistrement des naissances 16
2.6 Instruction 18
2.6.1 Niveau d'instruction atteint 18
2.6.2 Fréquentation de l'école aux niveaux primaire et secondaire 19
2.6.3 Taux de participation à l'apprentissage organisé pour les enfants âgés de 6 ans 20
2.7 Handicap 21
2.7.1 Handicap par domaine et âge 21
2.7.2 Handicap parmi les adultes selon d'autres caractéristiques sociodémographiques 21
2.8 Transferts sociaux 22

3 CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES ENQUÊTÉES 45
3.1 Caractéristiques de base des personnes interrogées pour l'enquête 45
3.2 Instruction et alphabétisation 46
3.3 Exposition aux médias de masse et utilisation de l'internet 48
3.3.1 Exposition aux médias de masse 48
3.3.2 Utilisation de l'internet 49
3.4 Emploi 49
3.5 Occupation 50
3.6 Assurance maladie 52
3.7 Usage de tabac 52
3.8 Consommation d'alcool 53
3.9 Lieu de résidence à la naissance et migration récente 53
3.9.1 Type de migration 54
3.9.2 Raison de la migration 54

4 MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE 87
4.1 État Matrimonial 87
4.2 Enregistrement du mariage 88
4.3 Polygamie 89
4.4 Âge à la première union 90
4.5 Âge au premier rapport sexuel 91
4.6 Activité sexuelle récente 93

5 FÉCONDITÉ 105
5.1 Fécondité actuelle 105
5.2 Enfants nés vivants et enfants survivants 108
5.3 Intervalle intergénésique 108
5.4 Insusceptibilité de tomber enceinte 109
5.5 Âge aux premières menstruations 110
5.6 Ménopause 110
5.7 Âge à la première naissance 110
5.8 Grossesse des adolescentes 111
5.9 Résultats de grossesse et taux d'interruption volontaire de grossesse 113
5.10 Rapports sexuels et comportements en matière de santé reproductive avant l'âge de 15 ans 114

6 PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ 127
6.1 Désir d'avoir un autre enfant 127
6.2 Taille idéale de la famille 129
6.3 Planification de la fécondité 130
6.4 Taux de fécondité désirée 131

7 PLANIFICATION FAMILIALE 141
7.1 Connaissance et utilisation de la contraception 142
7.1.1 Utilisation de la contraception d'urgence 145
7.1.2 Connaissance de la période de fécondité 145
7.2 Source des méthodes contraceptives modernes 145
7.3 Choix informé 146
7.4 Discontinuation des méthodes contraceptives 146
7.5 Demande en planification familiale 147
7.5.1 Prise de décision concernant la planification familiale et opinion sur son utilisation 149

7.5.2 Pression exercée pour tomber enceinte et utilisation future de la contraception 150
7.5.3 Exposition aux messages sur la planification familiale 150
7.6 Contact des non-utilisatrices avec des prestataires de planification familiale 150

8 MORTALITÉ INFANTILE ET MORTALITÉ JUVÉNILE 171
8.1 Mortalité infantile et mortalité juvénile 172
8.2 Mortalité périnatale 175
8.3 Comportement procréateur à haut risque 176

9 SANTÉ DES MÈRES ET DES NOUVEAU-NÉS 183
9.1 Couverture sanitaire et contenu spécifique des soins prénatals 186
9.1.1 Prestataires qualifiés 186
9.1.2 Stade de la grossesse et nombre de visites de santé prénatale 187
9.2 Composantes des soins prénatals 188
9.2.1 Prise de vermifuges et supplémentation en fer parmi les femmes enceintes 189
9.2.2 Source des suppléments contenant du fer 190
9.3 Protection contre le tétanos néonatal 190
9.4 Services d'accouchement 191
9.4.1 Accouchements en établissement de santé 191
9.4.2 Accouchement par césarienne 193
9.4.3 Accouchement assisté par du personnel qualifié 194
9.5 Soins postnatals 195
9.5.1 Bilan de santé postnatal des mères 195
9.5.2 Bilan de santé postnatal pour les nouveau-nés 196
9.5.3 Contrôles de santé postnatals pour les mères et les nouveau-nés 197
9.6 Participation des hommes aux soins de santé maternelle 197
9.7 Difficultés d'accès aux soins de santé 198
9.8 Distance et moyens de transport pour se rendre à l'établissement de santé le plus proche 198

10 SANTÉ, DÉVELOPPEMENT ET BIEN-ÊTRE DE L'ENFANT 223
10.1 Taille et poids de l'enfant à la naissance 224
10.2 Vaccination des enfants 224
10.2.1 Possession d'un carnet de vaccination et sa disponibilité 224
10.2.2 Couverture vaccinale de base 225
10.2.3 Couverture vaccinale conformément au calendrier national 227
10.3 Symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA) et comportement de recours aux soins 229
10.4 Fièvre et comportement de recours aux soins 230
10.5 Maladie diarrhéique 231
10.5.1 Diarrhée et comportement de recours aux soins 231
10.5.2 Pratiques alimentaires 232
10.5.3 Thérapie de réhydratation orale, zinc, alimentation continue et autres traitements 232
10.6 Traitement des maladies de l'enfant 234
10.7 Développement de la petite enfance 234
10.7.1 Indice de développement de la petite enfance 2030 234
10.8 Bien-être de l'enfant et structure du ménage 235
10.8.1 Résidence des enfants et survie des parents 235
10.8.2 Personnes s'occupant d'enfants ne vivant pas avec un parent biologique 236
10.8.3 Durée de la séparation parent-enfant 236
10.8.4 Union des parents 237

10.8.5 Fréquence des contacts avec les parents qui vivent ailleurs....237
10.8.6 Lieu de résidence des parents qui vivent ailleurs....238
10.8.7 Flux financiers entre le ménage de l'enfant et les parents qui vivent ailleurs....238

11 NUTRITION DES ENFANTS ET DES ADULTES....267
11.1 État nutritionnel des enfants....268
11.1.1 Mesures de la croissance de l'enfant et malnutrition....269
11.2 Surveillance et soutien de la croissance....272
11.3 Pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant....273
11.3.1 Allaitement maternel, initiation précoce de l'allaitement maternel et allaitement maternel exclusif dans les 2 jours suivant la naissance....273
11.3.2 Allaitement exclusif et alimentation mixte lactée....274
11.3.3 Poursuite de l'allaitement maternel et utilisation du biberon....276
11.3.4 Introduction d'aliments de complément....277
11.3.5 Diversité alimentaire minimale, fréquence minimale des repas, fréquence minimale de l'alimentation lactée mixte, minimum alimentaire acceptable et consommation d'œufs et/ou produits carnés....277
11.3.6 Consommation de boissons sucrées, consommation d'aliments malsains et aucune consommation de légumes ou de fruits chez les enfants....279
11.3.7 Indicateurs (ANJE) de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant....281
11.4 Conseil sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE)....281
11.5 Prévalence de l'anémie chez les enfants....281
11.6 Supplémentation en micronutriments et vermifugation des enfants....282
11.7 État nutritionnel des adultes....284
11.7.1 État nutritionnel des femmes....285
11.8 Pratiques alimentaires des femmes....286
11.9 Prévalence de l'anémie chez les femmes....288
11.10 Présence de sel iodé dans les ménages....290

12 PALUDISME....311
12.1 Possession de moustiquaires imprégnées d'insecticide....312
12.2 Accès et utilisation des MII par les ménages....315
12.3 Utilisation des MII par les enfants et les femmes enceintes....317
12.4 Raisons de non-utilisation des moustiquaires....318
12.5 Paludisme pendant la grossesse....319
12.6 Prise en charge des cas de paludisme des enfants....320

13 CONNAISSANCES, ATTITUDES ET COMPORTEMENTS FACE AU VIH ET AU SIDA....335
13.1 Connaissance et attitudes concernant les médicaments pour le traitement ou la prévention du VIH....336
13.2 Attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH....337
13.3 Multiplicité de partenaires sexuels....338
13.4 Couverture des services de dépistage du VIH....340
13.4.1 Dépistage du VIH chez les femmes enceintes....340
13.4.2 Test de dépistage du VIH antérieur....341
13.5 Révélation, opprobre et stigmatisation des personnes ayant déclaré leur séropositivité....343
13.6 Circoncision....343
13.7 Déclaration volontaire des infections sexuellement transmissibles....345
13.8 Connaissance et comportements des jeunes face au VIH et au SIDA....345
13.8.1 Connaissance de la prévention du VIH....345
13.8.2 Premier rapport sexuel....347

13.8.3 Rapports sexuels avant le mariage 347
13.8.4 Multiplicité des partenaires sexuels 348
13.8.5 Dépistage récent du VIH 348

14 MALADIES CHRONIQUES 371
14.1 Activité physique 372
14.2 Hypertension artérielle 373
14.3 Hyperglycémie 374
14.4 Maladie cardiaque ou affection cardiaque chronique 374
14.5 Maladie pulmonaire et affection pulmonaire chronique 375
14.5.1 Cancer ou tumeur 376
14.5.2 Dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus 376
14.6 Dépression et anxiété 378
14.7 Épilepsie 379
14.8 Arthrite 379
14.9 Vaccin contre la covid-19 379

15 POUVOIR D'ACTION DES FEMMES 395
15.1 Emploi des femmes et des hommes en union 396
15.2 Contrôle de l'utilisation des revenus des femmes 397
15.3 Contrôle sur l'utilisation des revenus des hommes 398
15.4 Possession de biens par les femmes et les hommes 398
15.4.1 Propriété d'une maison ou d'un terrain et documentation des titres de propriété 398
15.4.2 Possession et utilisation de téléphones portables et de comptes bancaires 400
15.5 Participation à la prise de décision 401
15.6 Opinion concernant le fait de battre son épouse/partenaire 403
15.7 Négociation des rapports sexuels 404
15.8 Participation des femmes à la prise de décisions en matière de santé sexuelle et de reproduction 405

16 EAU ET ASSAINISSEMENT DANS LES MÉNAGES 429
16.1 Sources de l'eau de boisson, disponibilité et traitement 429
16.1.1 Échelle des services pour l'eau de boisson 430
16.1.2 Personne chargée de la collecte de l'eau de boisson 432
16.1.3 Disponibilité de l'eau de boisson 433
16.2 Assainissement 434
16.2.1 Échelle des services d'assainissement 434
16.2.2 Enlèvement et évacuation des excréments 435
16.3 Évacuation des selles d'enfants 437
16.4 Lavage des mains 438
16.5 Hygiène menstruelle 438

17 EXCISION 453
17.1 Connaissance des enquêtés sur l'excision 454
17.2 Excision parmi les femmes 454
17.2.1 Prévalence et type d'excision 454
17.2.2 Âge à l'excision parmi les femmes 456
17.3 Excision des filles 456
17.4 Personne qui a effectué l'excision 457
17.5 Excision dans le temps 457
17.6 Opinion concernant l'excision 457

18 VIOLENCE DOMESTIQUE 471
18.1 Mesure de la violence 473
18.2 Expérience en matière de violence physique 474
18.2.1 Auteurs des violences physiques 475
18.2.2 Expérience de violences physiques pendant la grossesse 475
18.3 Expérience de violence sexuelle 476
18.3.1 Prévalence de la violence sexuelle 476
18.3.2 Auteurs des violences sexuelles 477
18.3.3 Expérience de violence sexuelle commise par un partenaire non intime 477
18.3.4 Âge à la première violence sexuelle subie 477
18.4 Expérience de différentes formes de violence 477
18.5 Types de comportements de contrôle et violence exercée entre partenaires intimes 477
18.5.1 Prévalence des comportements de contrôle 478
18.5.2 Prévalence de la violence entre partenaires intimes perpétrée par le conjoint/partenaire intime actuel ou le plus récent 479
18.5.3 Actes de violence entre partenaires intimes au cours des 12 derniers mois, perpétrés par un mari/partenaire intime 481
18.6 Blessures subies par les femmes et les hommes résultant des violences causées par un/une partenaire intime 482
18.7 Violences initiées par les femmes et les hommes contre leurs conjoints/partenaires intimes 482

REFERENCES 515

Annexe A PLAN DE SONDAGE 521
A.1 Introduction 521
A.2 Base de sondage 521
A.3 Plan de sondage et mise en œuvre 523
A.4 Probabilités de sondage et poids de sondage 524
A.5 Résultats de l'enquête 526

Annexe B ESTIMATION DES ERREURS D'ÉCHANTILLONAGE 529

Annexe C TABLEAUX POUR L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES 575

Annexe D PERSONNEL DE LA SEPTIÈME ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ DU MALI DE 2023–2024 593

Annexe E QUESTIONNAIRES 599
Questionnaire ménage 601
Questionnaire femme 625
Questionnaire homme 719
Questionnaire biomarqueur 757
Questionnaire de l'agent de terrain 773
Questionnaire re-mesure 776

LISTE DES TABLEAUX, GRAPHIQUES, ET CARTES

1 PRÉSENTATION ET MÉTHODOLOGIE DE L'ENQUÊTE 1

Tableau 1.1 Résultats des interviews ménage et individuelle 8

Graphique 1.1 Organisation de l'EDSM-VII 2023–2024 2

2 CARACTÉRISTIQUES DU LOGEMENT ET DE LA POPULATION DES MÉNAGES 11

Tableau 2.1 Caractéristiques du ménage: Logement 25
Tableau 2.2 Caractéristiques du ménage : Cuisine 26
Tableau 2.3 Caractéristiques du ménage : Chauffage et éclairage 27
Tableau 2.4 Dépendance principale à l'égard des combustibles et technologies propres 28
Tableau 2.5 Biens possédés par le ménage 29
Tableau 2.6 Quintiles de bien-être économique 30
Tableau 2.7 Population des ménages par âge, sexe et milieu de résidence 31
Tableau 2.8 Composition des ménages 32
Tableau 2.9 Enfants orphelins et résidence des enfants avec les parents 33
Tableau 2.10 Enregistrement à l'état civil des naissances d'enfants de moins de 5 ans 34
Tableau 2.11.1 Niveau d'instruction de la population des ménages : Femme 35
Tableau 2.11.2 Niveau d'instruction de la population des ménages : Homme 36
Tableau 2.12 Taux de fréquentation scolaire 37
Tableau 2.13 Taux de participation dans des activités d'apprentissage organisées 38
Tableau 2.14 Handicap par degré de difficulté selon le type de handicap et selon l'âge 39
Tableau 2.15.1 Handicap parmi les adultes selon certaines caractéristiques sociodémographiques : Femme 40
Tableau 2.15.2 Handicap parmi les adultes selon certaines caractéristiques sociodémographiques : Homme 41
Tableau 2.16 Aide économique extérieure aux ménages 42
Tableau 2.17 Aide économique aux frais de scolarité et fournitures scolaires 43

Graphique 2.1 Dépendance principale aux combustibles et équipements propres 13
Graphique 2.2 Quintiles de bien-être économique des ménages, par résidence 14
Graphique 2.3 Pyramide des âges 15
Graphique 2.4 Orphelins par milieu de résidence 16
Graphique 2.5 Enregistrement des naissances par quintile de bien-être économique des ménages 17
Graphique 2.6 Fréquentation scolaire au niveau secondaire par quintile de bien-être économique des ménages 20

Carte 2.1 Enregistrement des naissances par région 17

3 CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES ENQUÊTÉES 45

Tableau 3.1 Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés 56
Tableau 3.2.1 Niveau d'instruction : Femme 58
Tableau 3.2.2 Niveau d'instruction : Homme 59
Tableau 3.3.1 Alphabétisation : Femme 60
Tableau 3.3.2 Alphabétisation : Homme 61

Tableau 3.4.1 Exposition aux médias : Femme....62
Tableau 3.4.2 Exposition aux médias : Homme....63
Tableau 3.5.1 Utilisation d'internet : Femme....64
Tableau 3.5.2 Utilisation d'internet : Homme....65
Tableau 3.6.1 Emploi : Femme....66
Tableau 3.6.2 Emploi : Homme....67
Tableau 3.7.1 Occupation : Femme....68
Tableau 3.7.2 Occupation : Homme....69
Tableau 3.8 Type d'emploi : Femme....70
Tableau 3.9.1 Couverture médicale : Femme....71
Tableau 3.9.2 Couverture médicale : Homme....72
Tableau 3.10.1 Consommation de tabac à fumer : Femme....73
Tableau 3.10.2 Consommation de tabac à fumer : Homme....74
Tableau 3.11 Nombre moyen de cigarettes fumées par jour : Homme....75
Tableau 3.12 Consommation de tabac non fumé et de tabac sous n'importe quelle forme....76
Tableau 3.13 Consommation de tabac sous n'importe quelle forme, selon certaines caractéristiques sociodémographiques....77
Tableau 3.14.1 Consommation d'alcool : Femme....78
Tableau 3.14.2 Consommation d'alcool : Homme....79
Tableau 3.15.1 Nombre habituel de verres d'alcool consommés : Femme....80
Tableau 3.15.2 Nombre habituel de verres d'alcool consommés : Homme....81
Tableau 3.16.1 Lieu de naissance et migration récente : Femme....82
Tableau 3.16.2 Lieu de naissance et migration récente : Homme....83
Tableau 3.17 Type de migration....84
Tableau 3.18.1 Raison de la migration : Femme....85
Tableau 3.18.2 Raison de la migration : Homme....86

Graphique 3.1 Niveau d'instruction des enquêtés....46
Graphique 3.2 Niveau d'instruction secondaire par niveau de bien-être économique....47
Graphique 3.3 Exposition aux médias....48
Graphique 3.4 Utilisation de l'internet par milieu de résidence....49
Graphique 3.5 Emploi par niveau d'instruction....50
Graphique 3.6 Occupation....51

Carte 3.1 Niveau d'instruction par région....47

4 MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE....87
Tableau 4.1 État matrimonial actuel....94
Tableau 4.2 Enregistrement du mariage....95
Tableau 4.3.1 Nombre de coépouses des femmes....96
Tableau 4.3.2 Nombre d'épouses des hommes....97
Tableau 4.4 Âge à la première union....98
Tableau 4.5 Âge médian à la première union selon certaines caractéristiques....99
Tableau 4.6 Âge aux premiers rapports sexuels....100
Tableau 4.7 Âge médian aux premiers rapports sexuels selon certaines caractéristiques....101
Tableau 4.8.1 Activité sexuelle récente : Femme....102
Tableau 4.8.2 Activité sexuelle récente : Homme....103

Graphique 4.1 Situation matrimoniale....88
Graphique 4.2 Tendances de la polygynie....89

Graphique 4.3 Âge médian des femmes à la première union par résidence 91
Graphique 4.4 Âge médian aux premiers rapports sexuels et à la première union pour les femmes de 25–49 ans 92
Graphique 4.5 Rapports sexuels précoces : tendance 92

Carte 4.1 Polygynie par région 90

5 FÉCONDITÉ 105
Tableau 5.1 Fécondité actuelle 115
Tableau 5.2 Fécondité selon certaines caractéristiques 116
Tableau 5.3.1 Tendances de la fécondité par âge 117
Tableau 5.3.2 Tendance de la fécondité par âge et indice synthétique de fécondité 117
Tableau 5.4 Enfants nés vivants et enfants survivants des femmes 117
Tableau 5.5 Intervalles intergénésiques 118
Tableau 5.6 Aménorrhée, abstinence et insusceptibilité post-partum 119
Tableau 5.7 Durée médiane de l'aménorrhée, de l'abstinence post-partum et de l'insusceptibilité post-partum 120
Tableau 5.8 Âge aux premières règles 120
Tableau 5.9 Ménopause 121
Tableau 5.10 Âge à la première naissance 121
Tableau 5.11 Âge médian à la première naissance 122
Tableau 5.12 Grossesse des adolescentes 123
Tableau 5.13 Résultat de la grossesse par caractéristique sociodémographique 124
Tableau 5.14 Taux d'avortement provoqué 125
Tableau 5.15 Rapports sexuels et comportements en matière de santé reproductive avant l'âge de 15 ans 126

Graphique 5.1 Tendances de la fécondité par résidence 106
Graphique 5.2 Fécondité par quintile de bien-être économique du ménage 106
Graphique 5.3 Tendances de la fécondité par âge 107
Graphique 5.4 Intervalles génésiques 108
Graphique 5.5 Âge médian à la première naissance par niveau d'instruction 111
Graphique 5.6 Grossesse des adolescentes par quintile de bien-être économique du ménage 112
Graphique 5.7 Issue de la grossesse 113
Graphique 5.8 Comportements en matière de sexualité et de santé génésique avant 15 ans 114

Carte 5.1 Fécondité par région 107
Carte 5.2 Grossesse des adolescentes par région 112

6 PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ 127
Tableau 6.1 Préférences en matière de fécondité par nombre d'enfants vivants 133
Tableau 6.2.1 Désir de limiter les naissances : Femme 134
Tableau 6.2.2 Désir de limiter les naissances : Homme 135
Tableau 6.3 Nombre idéal d'enfants selon le nombre d'enfants vivants 136
Tableau 6.4 Nombre idéal d'enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques 137
Tableau 6.5 Planification de la fécondité 138
Tableau 6.6 Taux de fécondité désirée 139

Graphique 6.1 Désir de limiter les naissances par nombre d'enfants vivants : tendances 128
Graphique 6.2 Désir de limiter le nombre d'enfants par nombre d'enfants vivants 128

Graphique 6.3 Taille idéale de la famille 129
Graphique 6.4 Taille idéale de la famille par quintile de bien-être économique du ménage 130
Graphique 6.5 Planification de la fécondité 130
Graphique 6.6 Planification de la fécondité 131
Graphique 6.7 Fécondité désirée et fécondité actuelle : tendances 132

7 PLANIFICATION FAMILIALE 141
Tableau 7.1 Connaissance des méthodes contraceptives 152
Tableau 7.2 Connaissance des méthodes contraceptives selon certaines caractéristiques sociodémographiques 153
Tableau 7.3 Utilisation actuelle de la contraception selon l'âge 154
Tableau 7.4 Utilisation actuelle de la contraception selon certaines caractéristiques sociodémographiques 155
Tableau 7.5 Utilisation de DMPA-SC/Sayana Press 157
Tableau 7.6 Utilisation de la contraception d'urgence 158
Tableau 7.7 Connaissance de la période de fertilité 158
Tableau 7.8 Connaissance de la période de fertilité par âge 159
Tableau 7.9 Source d'approvisionnement des méthodes modernes de contraception 159
Tableau 7.10 Choix informé de la méthode contraceptive 160
Tableau 7.11 Taux de discontinuation des méthodes contraceptives sur 12 mois 161
Tableau 7.12 Raisons de la discontinuation des méthodes contraceptives 162
Tableau 7.13.1 Besoins et demande en matière de planification familiale parmi les femmes actuellement en union 163
Tableau 7.13.2 Besoins et demande en matière de planification familiale pour l'ensemble des femmes et pour les femmes non en union sexuellement actives 164
Tableau 7.14 Prise de décision concernant le recours à la planification familiale 165
Tableau 7.15 Prise de décision concernant la planification familiale selon certaines caractéristiques sociodémographiques 166
Tableau 7.16 Pressions subies pour tomber enceinte 167
Tableau 7.17 Utilisation future de la contraception 168
Tableau 7.18.1 Exposition aux messages sur la planification familiale : Femme 168
Tableau 7.18.2 Exposition aux messages sur la planification familiale : Homme 169
Tableau 7.19 Contact des non utilisatrices de la contraception avec des prestataires en planification familiale 170

Graphique 7.1 Utilisation contraceptive 143
Graphique 7.2 Utilisation contraceptive : tendance 143
Graphique 7.3 Utilisation de méthodes contraceptives modernes par quintile de bien-être économique du ménage 144
Graphique 7.4 Sources d'approvisionnement en méthodes modernes de contraception 146
Graphique 7.5 Taux de discontinuation des méthodes contraceptives 147
Graphique 7.6 Demande en matière de planification familiale 148
Graphique 7.7 Tendances de la demande en matière de planification familiale 148
Graphique 7.8 Besoins non satisfaits en matière de planification familiale par quintile de bien-être économique du ménage 149

Carte 7.1 Utilisation de méthodes contraceptives modernes par région 144
Carte 7.2 Besoins non satisfaits en matière de planification familiale par région 149

8 MORTALITÉ INFANTILE ET MORTALITÉ JUVÉNILE 171

Tableau 8.1 Quotient de mortalité des enfants de moins de 5 ans 178
Tableau 8.2 Quotients de mortalité des enfants sur 5 ans selon certaines caractéristiques démographiques 178
Tableau 8.3 Quotients de mortalité des enfants sur 10 ans selon d'autres caractéristiques 179
Tableau 8.4 Mortalité périnatale 180
Tableau 8.5 Comportement procréateur à hauts risques 181

Graphique 8.1 Tendances de la mortalité des enfants de moins de 5 ans 172
Graphique 8.2 Mortalité infanto-juvénile par quintile de bien-être économique du ménage 174
Graphique 8.3 Mortalité infanto-juvénile selon l'intervalle avec la naissance précédente 175
Graphique 8.4 Mortalité périnatale par quintile de bien-être économique du ménage 176

Carte 8.1 Mortalité infanto-juvénile par région 174

9 SANTÉ DES MÈRES ET DES NOUVEAU-NÉS 183

Tableau 9.1 Soins prénatals 200
Tableau 9.2 Nombre de visites prénatales et stade de la grossesse à la première visite 201
Tableau 9.3.1 Composantes des soins prénatals parmi les femmes ayant reçu des soins prénatals 203
Tableau 9.3.2 Composantes des soins prénatals parmi toutes les femmes 204
Tableau 9.4 Déparasitage et supplémentation contenant du fer pendant la grossesse 205
Tableau 9.5 Source des suppléments contenant du fer 206
Tableau 9.6 Vaccination antitétanique 207
Tableau 9.7 Lieu de l'accouchement 208
Tableau 9.8 Césarienne 209
Tableau 9.9 Assistance au cours de l'accouchement 210
Tableau 9.10 Durée du séjour dans l'établissement de santé après la naissance 212
Tableau 9.11 Moment où le premier examen postnatal a été dispensé à la mère 213
Tableau 9.12 Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal à la mère 214
Tableau 9.13 Contenu des soins postnatals dispensés à la mère 215
Tableau 9.14 Moment où le premier examen postnatal a été dispensé au nouveau-né 216
Tableau 9.15 Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal au nouveau-né 217
Tableau 9.16 Contenu des examens postnatals dispensés aux nouveau-nés 218
Tableau 9.17 Soins postnatals dispensés à la mère et au nouveau-né 219
Tableau 9.18 Implication des hommes dans les soins de santé maternelle 220
Tableau 9.19 Problèmes d'accès aux soins de santé 221
Tableau 9.20 Distance à l'établissement de soins de santé 222

Graphique 9.1 Tendances de la couverture en soins prénatals 187
Graphique 9.2 Composantes des soins prénatals selon l'issue de la grossesse 189
Graphique 9.3 Lieu d'accouchement : tendances 192
Graphique 9.4 Naissances dans un établissement de santé par rang de naissance 192
Graphique 9.5 Accouchement par césarienne par quintile de bien-être économique du ménage 193
Graphique 9.6 Assistance à l'accouchement 194

Graphique 9.7 Assistance à l'accouchement par du personnel qualifié par bien-être économique du ménage 195
Graphique 9.8 Soins postnatals selon le lieu de l'accouchement 196

Carte 9.1 Naissances dans un établissement de santé par région 193

10 SANTÉ, DÉVELOPPEMENT ET BIEN-ÊTRE DE L'ENFANT 223
Tableau 10.1 Taille et poids de l'enfant à la naissance 240
Tableau 10.2 Possession et observation des carnets de vaccination, selon certaines caractéristiques sociodémographiques 241
Tableau 10.3 Vaccinations par source d'information 242
Tableau 10.4 Vaccinations selon certaines caractéristiques sociodémographiques 243
Tableau 10.5 Source où ont été effectuées les vaccinations 245
Tableau 10.6 Enfants avec des symptômes d'IRA et recherche de soins pour traiter les symptômes d'IRA 246
Tableau 10.7 Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant présenté des symptômes d'IRA 247
Tableau 10.8 Enfants avec de la fièvre et recherche de soins pour traiter la fièvre 248
Tableau 10.9 Enfants avec diarrhée et recherche de soins pour traiter la diarrhée 249
Tableau 10.10 Pratiques alimentaires durant la diarrhée 250
Tableau 10.11 Thérapie de réhydratation par voie orale, supplémentation en zinc, poursuite de l'alimentation et administration d'autres traitements contre la diarrhée 251
Tableau 10.12 Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant eu la diarrhée 252
Tableau 10.13 Indice de développement de la petite enfance 2030 253
Tableau 10.14 Résidence des enfants avec les parents et enfants orphelins 254
Tableau 10.15 Personnes s'occupant des enfants qui ne vivent pas avec un parent biologique 255
Tableau 10.16.1 Durée de la séparation parent-enfant 257
Tableau 10.16.2 Durée du double orphelinage 257
Tableau 10.16.3 Durée moyenne de la séparation parent-enfant selon certaines caractéristiques sociodémographiques 258
Tableau 10.17.1 État matrimonial de la mère biologique de l'enfant 259
Tableau 10.17.2 État matrimonial du père biologique de l'enfant 260
Tableau 10.18.1 Fréquence des contacts avec la mère qui vit ailleurs 261
Tableau 10.18.2 Fréquence des contacts avec le père qui vit ailleurs 262
Tableau 10.19.1 Endroit où vivent les mères qui vivent ailleurs 263
Tableau 10.19.2 Endroit où vivent les pères qui vivent ailleurs 264
Tableau 10.20 Flux financiers entre le ménage de l'enfant et les parents qui vivent ailleurs 265

Graphique 10.1 Tendances de la couverture vaccinale des enfants 227
Graphique 10.2 Vaccination des enfants 228
Graphique 10.3 Couverture vaccinale par résidence 229
Graphique 10.4 Prévalence de la diarrhée par âge 231
Graphique 10.5 Pratiques alimentaires pendant la diarrhée 232
Graphique 10.6 Traitement de la diarrhée 233
Graphique 10.7 Symptômes des maladies infantiles et recours aux soins 234
Graphique 10.8 Personnes s'occupant d'enfants ne vivant pas avec un parent biologique 236
Graphique 10.9 Fréquence des contacts avec les parents qui vivent ailleurs 237

Carte 10.1 Couverture vaccinale par région 226

11 NUTRITION DES ENFANTS ET DES ADULTES 267

Tableau 11.1 État nutritionnel des enfants 291
Tableau 11.2 Suivi de la croissance de l'enfant 293
Tableau 11.3 Allaitement initial 294
Tableau 11.4 Allaitement selon l'âge 295
Tableau 11.5 Type d'allaitement selon l'âge 296
Tableau 11.6 Liquides consommés par les enfants le jour ou la nuit ayant précédé l'interview 297
Tableau 11.7 Aliments consommés par les enfants le jour ou la nuit ayant précédé l'interview 298
Tableau 11.8 Diversification alimentaire minimum, nombre minimum de repas et apport alimentaire minimum acceptable parmi les enfants 299
Tableau 11.9 Consommation d'œuf et/ou de produits d'originale animale et pratiques alimentaires malsaines parmi les enfants de 6–23 mois 300
Tableau 11.10 Indicateurs d'évaluation des Pratiques d'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (PANJE) 301
Tableau 11.11 Conseil sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant 302
Tableau 11.12 Prévalence de l'anémie chez les enfants 303
Tableau 11.13 Suppléments en micronutriments et déparasitage parmi les enfants 304
Tableau 11.14.1 État nutritionnel des femmes de 20–49 ans 305
Tableau 11.14.2 État nutritionnel des femmes adolescentes de 15–19 ans 306
Tableau 11.15 Aliments et liquides consommés par les femmes le jour ou la nuit ayant précédé l'interview 307
Tableau 11.16 Diversification alimentaire minimum et consommation d'aliments et de boissons malsaines parmi les femmes 308
Tableau 11.17 Prévalence de l'anémie chez les femmes 309
Tableau 11.18 Présence de sel iodé dans le ménage 310

Graphique 11.1 Indicateurs de mesure de la croissance de l'enfant : tendances 270
Graphique 11.2 Retard de croissance : tendances 270
Graphique 11.3 Retard de croissance chez les enfants par quintile de bien-être économique du ménage 271
Graphique 11.4 Pratiques d'alimentation des enfants, par âge 275
Graphique 11.5 Indicateurs PANJE sur l'apport alimentaire minimal acceptable selon que l'enfant est allaité ou non 278
Graphique 11.6 Pratiques alimentaires malsaines parmi les enfants de 6–23 mois par résidence 280
Graphique 11.7 État nutritionnel des femmes adolescentes et des femmes adultes 285
Graphique 11.8 État nutritionnel des femmes : tendances 286
Graphique 11.9 Diversité alimentaire minimale chez les femmes par bien-être économique du ménage 288

Carte 11.1 Retard de croissance chez les enfants par région 272

12 PALUDISME 311

Tableau 12.1 Possession de moustiquaires par les ménages 322
Tableau 12.2 Source d'obtention des moustiquaires 323
Tableau 12.3 Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) 324
Tableau 12.4 Utilisation des moustiquaires par les personnes dans le ménage 325
Tableau 12.5 Utilisation des MII existantes 326
Tableau 12.6 Utilisation des moustiquaires par les enfants 327
Tableau 12.7 Utilisation des moustiquaires par les femmes enceintes 328

Tableau 12.8 Raison principale pour laquelle la moustiquaire n'a pas été utilisée la nuit avant l'interview 329
Tableau 12.9 Utilisation du Traitement Préventif Intermittent (TPIg) par les femmes au cours de la grossesse 330
Tableau 12.10 Prévalence, diagnostic et traitement précoce des enfants avec de la fièvre 331
Tableau 12.11 Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant de la fièvre 332
Tableau 12.12 Type d'antipaludiques utilisés 333

Graphique 12.1 Possession de MII par les ménages 313
Graphique 12.2 Possession de MII dans les ménages : tendances 313
Graphique 12.3 Possession de MII par bien-être économique du ménage 314
Graphique 12.4 Sources d'approvisionnement des MII 315
Graphique 12.5 Accès et utilisation des MII 316
Graphique 12.6 Accès aux MII et utilisation des MII : tendances 316
Graphique 12.7 Utilisation des MII 317
Graphique 12.8 Raison de non-utilisation des MII 318
Graphique 12.9 Utilisation du traitement préventif intermittent du paludisme par les femmes enceintes : tendances 319
Graphique 12.10 Utilisation d'une combinaison thérapeutique à base d'artémisinine par les enfants présentant de la fièvre 321

Carte 12.1 Possession de MII par région 314
Carte 12.2 Accès aux MII par région 317

13 CONNAISSANCES, ATTITUDES ET COMPORTEMENTS FACE AU VIH ET AU SIDA 335

Tableau 13.1 Connaissance et opinions concernant des médicaments pour traiter le VIH ou prévenir sa transmission 350
Tableau 13.2 Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH 352
Tableau 13.3.1 Partenaires sexuels multiples et rapport sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois : Femme 354
Tableau 13.3.2 Partenaires sexuels multiples et rapport sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois : Homme 356
Tableau 13.4 Femmes enceintes ayant fait un test du VIH 358
Tableau 13.5.1 Couverture du test du VIH antérieur à l'enquête : Femme 359
Tableau 13.5.2 Couverture du test du VIH antérieur à l'enquête : Homme 360
Tableau 13.6 Nombre de fois testé pour le VIH au cours de la vie 361
Tableau 13.7 Connaissance et couverture de l'autotest de dépistage du VIH 361
Tableau 13.8 Circoncision 362
Tableau 13.9 Prévalence déclarée des infections sexuellement transmissibles (IST) et symptômes déclarés d'IST 364
Tableau 13.10.1 Connaissance des moyens de prévention du VIH parmi les jeunes : Femme 365
Tableau 13.10.2 Connaissance des moyens de prévention du VIH parmi les jeunes: Homme 366
Tableau 13.11 Âge aux premiers rapports sexuels parmi les jeunes 367
Tableau 13.12 Rapports sexuels prénuptiaux parmi les jeunes 367
Tableau 13.13.1 Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois parmi les jeunes : Femme 368
Tableau 13.13.2 Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois parmi les jeunes : Homme 369

Tableau 13.14 Tests du VIH récents parmi les jeunes 370

Graphique 13.1 Connaissance des traitements du VIH et des médicaments pour prévenir la transmission du VIH 337
Graphique 13.2 Connaissance de la prévention de la transmission mère-enfant (PTME) : tendances 337
Graphique 13.3 Attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH, par niveau d'instruction 338
Graphique 13.4 Rapports sexuels et utilisation du condom avec un partenaire non cohabitant 339
Graphique 13.5 Dépistage du VIH pendant la grossesse : tendances 340
Graphique 13.6 Dépistage du VIH 341
Graphique 13.7 Dépistage du VIH : tendances 342
Graphique 13.8 Dépistage du VIH par niveau d'instruction 342
Graphique 13.9 Circoncision, par âge et par type de circoncision 344
Graphique 13.10 Connaissance des moyens de prévention du VIH parmi les jeunes 346

Carte 13.1 Dépistage du VIH chez les femmes enceintes au cours des soins prénatals, par région 341

14 MALADIES CHRONIQUES 371
Tableau 14.1 Activité physique 381
Tableau 14.2.1 Diagnostic de la tension artérielle et traitement : Femme 382
Tableau 14.2.2 Diagnostic de la tension artérielle et traitement : Homme 383
Tableau 14.3.1 Diagnostic de l'hyperglycémie et traitement : Femme 384
Tableau 14.3.2 Diagnostic de l'hyperglycémie et traitement : Homme 385
Tableau 14.4 Diagnostic et traitement des maladies cardiaques et des maladies cardiaques à l'état chronique 386
Tableau 14.5 Diagnostic et traitement des maladies pulmonaires et des affections pulmonaires à l'état chronique 387
Tableau 14.6 Diagnostic et traitement d'un cancer ou d'une tumeur 388
Tableau 14.7 Examens pour le cancer du sein 389
Tableau 14.8 Cancer du col de l'utérus 390
Tableau 14.9 Diagnostic et traitement de la dépression ou de l'anxiété 391
Tableau 14.10 Diagnostic et traitement d'épilepsie 392
Tableau 14.11 Diagnostic et traitement de l'arthrite 393
Tableau 14.12 Vaccin contre la COVID-19 394

Graphique 14.1 Diagnostic et traitement de l'hypertension artérielle et de l'hyperglycémie 373
Graphique 14.2 Examens pour le dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus par niveau d'instruction 377

Carte 14.1 Examens pour le cancer du sein et pour le cancer du col de l'utérus par région 377

15 POUVOIR D'ACTION DES FEMMES 395
Tableau 15.1 Emploi et type de rémunération des femmes et des hommes actuellement en union 408
Tableau 15.2.1 Contrôle de l'utilisation de l'argent gagné par les femmes et importance de l'argent gagné par les femmes par rapport à celui gagné par leur conjoint 409
Tableau 15.2.2 Contrôle de l'argent gagné par les hommes 411

Tableau 15.3.1 Possession de maison et de terre : Femme....413
Tableau 15.3.2 Possession de maison et de terre : Homme....414
Tableau 15.4.1 Possession de maison et documents prouvant la propriété : Femme....415
Tableau 15.4.2 Possession de maison et documents prouvant la propriété : Homme....416
Tableau 15.5.1 Possession de terres et documents prouvant la propriété : Femme....417
Tableau 15.5.2 Possession de terres et documents prouvant la propriété : Homme....418
Tableau 15.6.1 Possession et utilisation de téléphone portable et de compte bancaire : Femme....419
Tableau 15.6.2 Possession et utilisation de téléphone portable et de comptes bancaire : Homme....420
Tableau 15.7 Participation dans la prise de décision....421
Tableau 15.8.1 Participation des femmes dans la prise de décision selon certaines caractéristiques....422
Tableau 15.8.2 Participation des hommes dans la prise de décision selon certaines caractéristiques....423
Tableau 15.9.1 Opinion des femmes concernant le fait qu'un mari batte sa femme....424
Tableau 15.9.2 Opinion des hommes concernant le fait qu'un mari batte sa femme....425
Tableau 15.10 Opinions concernant la négociation de rapports sexuels sans risque avec le mari/partenaire....426
Tableau 15.11 Capacité des femmes à négocier les rapports sexuels avec leur mari....427
Tableau 15.12 Participation des femmes dans la prise de décision concernant la santé sexuelle et reproductive....428

Graphique 15.1 Emploi par âge....396
Graphique 15.2 Contrôle des gains de la femme....397
Graphique 15.3 Possession de biens....399
Graphique 15.4 Participation des femmes dans la prise de décision....402
Graphique 15.5 Autonomisation des femmes....402
Graphique 15.6 Opinion concernant le fait de battre sa femme....404
Graphique 15.7 Participation des femmes à la prise de décision en matière de santé sexuelle et de procréation par niveau d'instruction....406

16 EAU ET ASSAINISSEMENT DANS LES MÉNAGES....429
Tableau 16.1 Eau utilisée par les ménages pour boire....440
Tableau 16.2 Échelle des services d'eau de boisson....441
Tableau 16.3 Personne qui collecte l'eau de boisson....442
Tableau 16.4 Disponibilité d'eau à boire en quantités suffisantes....443
Tableau 16.5 Moyen de traitement de l'eau de boisson des ménages....444
Tableau 16.6 Types d'installations sanitaires utilisées par les ménages....445
Tableau 16.7 Échelle des services d'assainissement....446
Tableau 16.8 Vidange et évacuation des excréments des installations sanitaires sur place....447
Tableau 16.9 Gestion des excréments humains des ménages....448
Tableau 16.10 Évacuation des selles des enfants....449
Tableau 16.11 Lavage des mains....450
Tableau 16.12 Hygiène menstruelle....451

Graphique 16.1 Services d'eau de boisson pour la population des ménages par milieu de résidence....431
Graphique 16.2 Personne chargée de la collecte de l'eau de boisson....432
Graphique 16.3 Disponibilité de l'eau à boire en quantités suffisantes par milieu de résidence....433

Graphique 16.4 Population des ménages et service d'assainissement, par résidence 435
Graphique 16.5 Gestion adaptée d'évacuation des excréments du ménage 436
Graphique 16.6 Gestion adaptée de l'évacuation des excréments du ménage par quintile de bien-être économique 437

Carte 16.1 Au moins un service élémentaire d'eau de boisson par région 432

17 EXCISION 453
Tableau 17.1 Connaissance de l'excision 459
Tableau 17.2 Prévalence de l'excision 460
Tableau 17.3 Âge à l'excision 461
Tableau 17.4 Prévalence de l'excision et âge à l'excision: Filles de 0–14 ans 462
Tableau 17.5 Excision des filles de 0–14 ans selon les caractéristiques sociodémographiques de la mère 463
Tableau 17.6 Infibulation parmi les filles de 0–14 ans excisées 464
Tableau 17.7 Aspects de l'excision parmi les filles excisées de 0 14 ans et les femmes de 15–49 ans 465
Tableau 17.8 Opinion des femmes et des hommes sur l'excision, en tant que nécessité religieuse 466
Tableau 17.9 Opinion des femmes et des hommes sur la poursuite ou non de cette pratique 468

Graphique 17.1 Type d'excision 454
Graphique 17.2 Excision : tendances 455
Graphique 17.3 Âge à l'excision 456
Graphique 17.4 Âge à l'excision parmi les femmes et les filles 457
Graphique 17.5 Opinion concernant l'excision, selon que la femme est excisée ou non 458

Carte 17.1 Prévalence de l'excision, par région 455

18 VIOLENCE DOMESTIQUE 471
Tableau 18.1 Expérience de violence physique par n'importe quel auteur 485
Tableau 18.2 Personnes ayant commis les actes de violence physique 487
Tableau 18.3 Expérience de violence physique pendant la grossesse 488
Tableau 18.4 Expérience de violence sexuelle par n'importe quel auteur 489
Tableau 18.5 Personnes ayant commis les actes de violence sexuelle 491
Tableau 18.6 Expérience de violence sexuelle par n'importe quel partenaire non-intime 492
Tableau 18.7 Âge au premier acte de violence sexuelle 494
Tableau 18.8 Violence sous différentes formes 495
Tableau 18.9.1 Formes de comportement de contrôle et de violence commis par un partenaire intime : Femmes 496
Tableau 18.9.2 Formes de comportement de contrôle et de violence commis par un partenaire intime : Hommes 498
Tableau 18.10.1 Comportements de contrôle du mari/partenaire intime par caractéristiques sociodémographiques : Femmes 500
Tableau 18.10.2 Comportements de contrôle de la femme/partenaire intime par caractéristiques sociodémographiques : Hommes 502
Tableau 18.11.1 Violence du partenaire intime selon les caractéristiques sociodémographiques : Femmes 504
Tableau 18.11.2 Violence du partenaire intime selon les caractéristiques sociodémographiques : Hommes 506

Tableau 18.12.1 Violence du partenaire intime selon les caractéristiques du mari/partenaire intime et les indicateurs d'autonomie : Femmes 508
Tableau 18.12.2 Violence du partenaire intime selon les caractéristiques de la femme/ partenaire intime : Hommes 509
Tableau 18.13.1 Violence du mari ou partenaire intime au cours des 12 derniers mois : Femmes 510
Tableau 18.13.2 Violence de la femme ou partenaire intime au cours des 12 derniers mois : Hommes 511
Tableau 18.14 Blessures des femmes et hommes dues à la violence du partenaire intime 512
Tableau 18.15 Violence des femmes et hommes contre leur mari/femme/partenaire intime selon les caractéristiques sociodémographiques des enquêtés 513
Tableau 18.16 Violence des enquêtés contre leur mari/femme/partenaire intime selon les caractéristiques du mari/femme/partenaire intime et les indicateurs d'autonomie des femmes 515

Graphique 18.1 Violence subie par les femmes, par état matrimonial 475
Graphique 18.2 Violence subie durant une grossesse, par nombre d'enfants vivants 476
Graphique 18.3 Types de comportements de contrôle 479
Graphique 18.4 Recherche d'aide, par type de violences subi 483

Carte 18.1 Violences causées par un partenaire intime par région 481

Annexe A PLAN DE SONDAGE 521
Tableau A.1 Répartition de la population par région et selon le milieu de résidence (RGPH 2022) 522
Tableau A.2 Répartition de SE et de leur taille moyenne en populations par région et selon le milieu de résidence (RGPH 2022) 522

Annexe B ESTIMATION DES ERREURS D'ÉCHANTILLONAGE 529
Tableau B.1 Liste des variables utilisées pour le calcul des erreurs de sondage, Mali 2023–2024 531
Tableau B.2 Erreurs de sondage : Echantillon Total, Mali 2023–2024 534
Tableau B.3 Erreurs de sondage : Echantillon Bamako, Mali 2023–2024 537
Tableau B.4 Erreurs de sondage : Echantillon Autre urbain, Mali 2023–2024 540
Tableau B.5 Erreurs de sondage : Echantillon Ensemble urbain, Mali 2023–2024 543
Tableau B.6 Erreurs de sondage : Echantillon Rurale, Mali 2023–2024 546
Tableau B.7 Erreurs de sondage : Echantillon Kayes, Mali 2023–2024 549
Tableau B.8 Erreurs de sondage : Echantillon Koulikoro, Mali 2023–2024 552
Tableau B.9 Erreurs de sondage : Echantillon Sikasso, Mali 2023–2024 555
Tableau B.10 Erreurs de sondage : Echantillon Ségou, Mali 2023–2024 558
Tableau B.11 Erreurs de sondage : Echantillon Mopti, Mali 2023–2024 561
Tableau B.12 Erreurs de sondage : Echantillon Tombouctou, Mali 2023–2024 564
Tableau B.13 Erreurs de sondage : Echantillon Gao, Mali 2023–2024 567
Tableau B.14 Erreurs de sondage : Echantillon Bamako, Mali 2023–2024 570
Tableau B.15 Intervalle de confiance pour l 'indice de développement de la petite enfance 2030, EDS Mali, 2023–2024 573

Annexe C TABLEAUX POUR L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES 575
Tableau C.1 Répartition par âge de la population des ménages 575
Tableau C.2.1 Répartition par âge des femmes éligibles et interviewées 576
Tableau C.2.2 Répartition par âge des hommes éligibles et interviewés 576
Tableau C.3 Déplacement d'âges aux âges 14/15 577

Tableau C.4 Déplacement d'âges aux âges 64/65 577
Tableau C.5 Issues de la grossesse par années précédant l'enquête 578
Tableau C.6 Complétude de l'enregistrement 579
Tableau C.7 Résultats de l'exercice de standardisation effectué pendant la formation anthropométrique 580
Tableau C.8 Complétude et qualité des données concernant le poids et la taille des enfants 581
Tableau C.9 Mesures de la taille à partir d'un sous-échantillon aléatoire d'enfants mesurés 583
Tableau C.10 Interférence dans les mesures du poids des enfants 584
Tableau C.11 Interférence dans les mesures du poids et de la taille des femmes 585
Tableau C.12 Concentration dans les mesures anthropométriques pour les enfants (préférence numérique) 586
Tableau C.13 Observation des moustiquaires 586
Tableau C.14 Observation des installations sanitaires pour le lavage des mains 587
Tableau C.15 Fréquentation scolaire par année d'âge 588
Tableau C.16 Carnets de vaccination photographiés 589
Tableau C.17.1 Prévalence de l'anémie chez les enfants selon les directives 2011 de l'OMS 590
Tableau C.17.2 Prévalence de l'anémie chez les femmes selon les directives 2011 de l'OMS 591

PRÉFACE

Depuis plusieurs décennies, de nombreux efforts sont faits au Mali en faveur du développement socio-sanitaire en général et particulièrement pour améliorer la santé des femmes et des enfants. L'évaluation des résultats obtenus requiert la mise en œuvre d'approches rigoureuses et pertinemment éprouvées à l'une des normes internationales en la matière.

A l'effet de cette évaluation, le Mali a déjà réalisé de 1987 à 2023 sept Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS). À l'instar des éditons précédentes, la présente qui est la 7ème du genre (EDSM-VII) a bénéficié de l'assistance technique du programme mondial des Enquêtes Démographiques et de Santé (The DHS Program) d'ICF, dont la vocation est de fournir un appui technique à des pays du monde entier pour collecter, analyser et diffuser des données sur la population et la santé.

L'enquête EDSM-VII 2023–2024 a concerné toutes les régions du Mali issues de l'ancien découpage administratif qui correspondaient aux régions sanitaires opérationnelles au moment de l'opération. Elle a été financée par le Gouvernement du Mali, l'Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID), le Fonds Mondial de Lutte contre le VIH-Sida, la Tuberculose et le Paludisme et l'UNICEF.

Les travaux de collecte de données se sont déroulés de décembre 2023 à mars 2024 sous la coordination de la Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Santé, Développement Social et Promotion de la Famille (CPS/SS-DS-PF), et la Direction Nationale de l'Enquête et de l'Institut National de la Statistique (INSTAT), qui a assuré la Direction Technique de l'Enquête.

Cette enquête a permis de collecter des données sur les niveaux de fécondité, les préférences en matière de fécondité, la connaissance et l'utilisation des méthodes de planification familiale, la mortalité des enfants, la santé maternelle et infantile, les pratiques en matière d'allaitement, l'état nutritionnel des enfants de moins 5 ans et des femmes, la possession et l'utilisation de moustiquaires, la connaissance, les attitudes et les comportements vis-à-vis du VIH/Sida et d'autres infections sexuellement transmissibles, les handicaps, la teneur en iode du sel de cuisine, l'excision, la fistule obstétricale, et les violences domestiques. Elle a aussi permis d'évaluer l'anémie chez les enfants de 6–59 mois et chez les femmes de 15–49 ans, la situation nutritionnelle chez les enfants de 0–59 mois et chez les femmes de 15–49 ans.

Le processus a permis de disposer des données statistiques actualisées, désagrégées et de qualité au plan national sur la situation sociodémographique et sanitaire des populations maliennes et notamment des enfants et des femmes du Mali afin de rendre compte des progrès accomplis dans le sens des Objectifs du Développement Durable (ODD) et d'autres engagements mondiaux et nationaux en matière de développement sanitaire et social.

A cet effet, j'adresse mes remerciements à tous ceux qui ont contribué à l'atteinte de ces résultats important pour le processus de planification du développement socio sanitaire de notre pays en commençant par la population malienne pour leur patience et adhésion à l'opération, les enquêteurs et superviseurs pour leur dévouement.

Aussi, voudrais-je saluer la qualité de la collaboration, l'intérêt constant et les efforts soutenus des partenaires comme l'Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID), le Fonds Mondial et l'UNICEF. Je leur adresse mes sincères remerciements ainsi qu'à l'ensemble des partenaires techniques et financiers du secteur.

0 3 FEV 2025

Le ministre de la Santé et du Développement Social

Colonel Assa Badiallo TOURE
Chevalier de l'Ordre national

REMERCIEMENTS

La septième édition de l'Enquête Démographique et de Santé du Mali (EDSM-VII) a été réalisée par le Ministère de l'Economie et des Finances en collaboration avec le Ministère de la Santé et du Développement Social à travers respectivement l'Institut National de la Statistique (INSTAT) et la Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Santé, Développement Social et Promotion de la Famille (CPS/SS-DS-PF).

L'amélioration constante du contenu des rapports finaux à travers la qualité des indicateurs produits et l'introduction de nouveaux chapitres enrichissants, contribuent, au fil des éditions, à aider à la prise de décisions appropriées en faveur du développement socio- sanitaire de notre pays.

L'EDSM-VII de 2023–2024 a été financée par le Gouvernement du Mali, l'Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID), le Fonds Mondial à travers CRS/MALI et l'UNICEF. Elle a concerné toutes les régions du Mali issues de l'ancien découpage administratif et qui correspondaient aux régions sanitaires opérationnelles au moment de l'opération. Un échantillon total de 9 667 ménages a été enquêté avec succès, pour un taux de réponse de 99,5 %. Dans les ménages, les interviews ont été complétées pour 17 231 femmes de 15–49 ans et 3 123 femmes de 50–64 ans, avec des taux de réponse respectifs de 98,2 % et 99 %. Dans le sous-échantillon de ménages sélectionnés pour l'enquête auprès des hommes, 7 829 ont été enquêtés avec succès pour un taux de réponse de 96 %.

Les travaux de collecte de données se sont déroulés de décembre 2023 à mars 2024 et a mobilisé cent-quatre-neuf (189) agents répartis en vingt-sept équipes composées chacune de sept (7) personnes. Les travaux de collecte ont été supervisés par vingt-cinq (25) encadreurs composés des cadres de l'INSTAT, de la CPS/SSDSPF, de la Direction Général de la santé et de l'Hygiène Publique (DGSHP), du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), de la Cellule Sectorielle de Lutte contre le Sida, la-Tuberculose et les Hépatites virales (CSLS-TBH), de la Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Eau, Environnement, Urbanisme et domaine de l'Etat (CPS/SEEUDE) et des experts d'ICF.

Ainsi, grâce à la synergie des efforts et à l'esprit de franche collaboration de tout le personnel de l'opération, des agences et des institutions partenaires, la présente enquête a pu être conduite malgré un contexte plutôt défavorable. Nous saisissons cette occasion pour adresser nos remerciements :

- à toutes les populations, les Autorités politiques, les Autorités administratives, les organisations de la société civile et les chefs traditionnels qui ont consacré une partie de leur précieux temps à répondre aux questions de cette enquête ou à faciliter le déroulement de la collecte ;
- au Ministère de la Santé et du Développement Social, au Ministère de l'Economie et des Finances et au Ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille pour la collaboration intra et intersectorielle ;
- aux Responsables et aux cadres de DGSHP, de l'INSP, de l'ONASR, de la CSLS-TBH, de la CPS/SEEUDE pour leur collaboration et le soutien de leurs services techniques à toutes les phases de l'enquête ;
- à l'Agence Fiduciaire Intel Outsourcing Services (IOS) pour leur apport dans la gestion des fonds de l'enquête ;
- aux responsables et cadres de l'INSTAT et de la CPS/SSDSPF pour leur disponibilité constante ;

- aux Directeurs Régionaux de la Santé, du Développement Social et de l'Economie Solidaire, de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, aux Directeurs Régionaux *de la Planification de la Statistique et de l'Informatique, de l'Aménagement du Territoire et de la Population,* superviseurs et autre personnel de soutien pour leur engagement et leur dévouement ;

- nos félicitations sincères aux cartographes, chefs d'équipes, enquêteurs et enquêtrices, aux assistants à la gestion des tablettes, éditeurs et chauffeurs pour leur engagement, leur dévouement et leur perspicacité au cours de cette enquête ;

- notre reconnaissance et notre profonde gratitude à ICF pour son assistance technique de qualité au cours de cette opération à travers les appuis constants de ses représentants ;

- nos remerciements à tous nos partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagné et soutenu de façon constante, au cours de cette opération. Il s'agit de l'Agence des Etats Unis pour le Développement International (USAID), le Fonds Mondial à travers CRS/MALI et l'UNICEF.

Enfin, nous adressons nos sincères remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette enquête.

Dr Moussa KAMISSOKO
Directeur National EDSM VII
Chevalier de l'Ordre national

Dr Arouna SOUGANE
Directeur National Adjoint EDSM VII
Chevalier de l'Ordre national

ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS

AMO	Assurance maladie obligatoire
ANJE	Alimentation du nourrisson et du jeune enfant
ARV	Antirétroviral
ASC	Agent de santé communautaire
BCG	Bacille Calmette et Guérin
BPCO	Bronchopneumopathie chronique obstructive
CAPI	Computer-assisted personal interviewing
CDC	Centers for Disease Control
CIF	Classification internationale du fonctionnement
CNAPN	Comité national d'action pour l'abandon des pratiques néfastes à la santé de la femme et de l'enfant
COVID 19	Coronavirus disease 2019
CPS/SS-DS-PF	Cellule de planification et de statistique du secteur santé, développement social et promotion de la famille
CSCOM	Centre de santé communautaire
CSLS TBH	Cellule sectorielle de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et les hépatites virales
CSPro	Census and Survey Processing System
CSREF	Centre de santé de référence
CTA	Combinaison thérapeutique à base d'artémisinine
DEF	Diplôme d'études fondamentales
DGSHP	Direction générale de la santé et de l'hygiène publique
DHS	Demographic and Health Survey
DIU	Dispositif-intra utérin
DR	District de recensement
DTC-HepB-Hib	Diphtérie, tétanos, coqueluche-hépatite B-Haemophilus influenzae B
EDS	Enquête démographique et de santé
EDSM	Enquête Démographique et de Santé au Mali
EIPM	Enquête sur les indicateurs du paludisme au Mali
ET	Écart-type
FAO	Food and Agriculture Organization
GBD	Global burden of diseases
GPL	Gaz propane liquéfié
GPS	Global Positioning System
HCNLS	Haut conseil national de lutte contre le sida
HepB	Hépatite B
Hib	Haemophilus influenzae type b

ICA	Indice conjoncturel d'avortement
ICF	Inner City Fund
IDPE	Indice de développement de la petite enfance
IMC	Indice de masse corporelle
INSTAT	Institut national de la statistique
IPG	Indice de parité entre les genres
IRA	Infection respiratoire aiguë
ISF	Indice synthétique de fécondité
ISFD	Indice synthétique de fécondité désirée
IST	Infections sexuellement transmissibles
IVG	Interruption volontaire de grossesse
JMP	Joint Monitoring Program
LA	Lumefantrine-artemether
MAMA	Méthode de de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée
MERG	monitoring and evaluation reference group
MGF	Mutilations génitales féminines
MICS	Multiple indicator cluster surveys
MII	Moustiquaire imprégnée d'insecticide
MILDA	Moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action
MJF	Méthode des jours fixes
ODD	Objectifs de développement durable
OMS	Organisation mondiale de la santé
ONASR	Office national de la santé de la reproduction
ONG	Organisation non gouvernementale
ONUSIDA	Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida
PANPF	Plan d'action national de planification familiale
PAPI	Paper-assisted personal interviewing
PBMH	Périmètre brachial à mi-hauteur
PCIME	Prise en charge intégrée des maladies de l'enfant
PDDSS	Plan décennal de développement sanitaire et social
PEV	Programme élargi de vaccination
PMI	US President's Malaria Initiative
PNLE	Programme national de lutte contre la pratique de l'excision
PNLP	Programme national de lutte contre le paludisme
PNP	Politique nationale de population
PNVBG	Programme national pour l'abandon des violences basés sur le genre
PrEP	Prophylaxie préexposition
PRODESS	Programme de développement socio-sanitaire
PSN	Plan stratégique national
PSNI	Plan stratégique national intégré
PSSR	Plan stratégique de la santé de la reproduction
PTME	Prévention de la transmission mère-enfant
PVVIH	Personne vivant avec le VIH

RAMED	Régime d'assistance médicale
RBM	Roll Back Malaria
RDV	Risque sur la durée de vie
RGPH	Recensement général de la population et de l'habitat
RMG	Rapport de mortalité liée à la grossesse
RMM	Rapport de mortalité maternelle
SAA	Soins après avortement
SEC	Soins essentiels dans la communauté
SIDA	Syndrome d'immunodéficience acquise
SP	Sulphadoxine-pyriméthamine
SRO	Sels de réhydratation orale
SONU	Soins Obstétricaux et Néonatals d'Urgence (SONU)
TAG	Trouble anxieux généralisé
TAR	Traitement antirétroviral
TBN	Taux brut de natalité
TBFS	Taux brut de fréquentation scolaire
TDR	Test de diagnostic rapide
TGFG	Taux global de fécondité générale
TGRIVG	Taux global de recours à l'IVG
TME	Transmission du VIH de la mère à l'enfant
TNFS	Taux net de fréquentation scolaire
TOC	Trouble obsessionnel-compulsif
TPIg	Traitement préventif intermittent contre le paludisme pendant la grossesse
TRO	Thérapie de réhydratation orale
TSPT	Trouble de stress post-traumatique
UNFPA	Fonds des Nations Unies pour la population
UPS	Unité primaire de sondage
US	Unité secondaire
UNICEF	Fonds des Nations Unies pour l'enfance
USAID	United States Agency for International Development
VAA	Vaccin contre la fièvre jaune
VAR	Vaccin antirougeoleux
VIH	Virus de l'immunodéficience humaine
VPI	Vaccin polio inactivé
VPO	Vaccin polio oral
WG	Washington group on disability statistics

LIRE ET COMPRENDRE LES TABLEAUX DE L'ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ DU MALI (EDSM-VII) 2023–2024

Le rapport final de l'EDS du Mali 2023–2024 (EDSM-VII) est basé sur environ 200 tableaux de données. Pour qu'ils puissent être consultés rapidement, les tableaux se trouvent à la fin de chaque chapitre et les utilisateurs peuvent aussi y accéder en utilisant les liens pertinents dans le texte (version électronique). En outre, ce rapport présente environ 90 graphiques qui soulignent clairement les tendances au cours du temps, les variations infranationales et certaines caractéristiques sociodémographiques. De grandes carte colorées présentent les résultats répartis par région dans le Mali. Le texte a été simplifié pour mettre en évidence les points-clés dans une liste à puces et pour identifier clairement les définitions des indicateurs dans des encadrés.



Bien que le texte et les graphiques présentés dans chaque chapitre mettent en évidence certains des résultats les plus importants des tableaux, il n'est pas possible de discuter ou de représenter graphiquement chaque résultat. Pour cette raison, les utilisateurs des données de l'EDSM-VII doivent se sentir à l'aise quand ils lisent et interprètent les tableaux.

Les pages suivantes fournissent une introduction à l'organisation des tableaux de l'EDSM-VII, la présentation des caractéristiques sociodémographiques, ainsi qu'un bref résumé de la procédure d'échantillonnage pour faciliter la compréhension des dénominateurs. En outre, cette section comprend des exercices pour que les utilisateurs s'exercent à interpréter les tableaux de l'EDSM-VII en utilisant leurs nouvelles compétences.

Exemple 1 : Exposition aux médias : Femme

Des questions posées à toutes les enquêtées

Tableau 3.4.1 Exposition aux médias : Femme 1

Pourcentage de femmes de 15–49 ans qui sont exposées à certains médias, au moins, une fois par semaine, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

3 Caractéristique sociodémographique	Lit un journal, au moins, une fois par semaine	Regarde la télévision, au mois, une fois par semaine	Écoute la radio, au moins, une fois par semaine	Accède aux trois médias, au moins, une fois par semaine	N'accède à aucun des trois médias, au moins, une fois par semaine	2 Effectif de femmes
Âge						
15–19	4,0	45,7	31,2	1,6	42,0	3 862
20–24	4,2	41,8	36,2	1,7	42,4	3 378
25–29	2,4	41,3	41,5	1,0	40,0	2 905
30–34	3,6	42,1	43,7	2,1	38,6	2 382
35–39	1,7	38,4	43,7	1,2	41,5	2 065
40–44	1,2	37,1	47,1	0,9	38,4	1 586
45–49	2,0	36,5	49,8	1,5	37,8	1 169
Résidence						
Bamako	5,5	62,5	39,5	2,3	25,1	2 675
Autre urbain	6,6	57,1	45,9	3,5	28,8	2 048
Ensemble urbain	6,0	60,2	42,3	2,8	26,7	4 723
Rural	1,9	34,4	38,9	1,0	45,8	12 624
Région[1]						
Kayes	2,1	39,8	44,3	0,8	36,8	2 635
Koulikoro	2,8	33,0	37,7	1,6	47,2	4 018
Sikasso	3,7	52,1	46,3	1,9	32,5	3 143
Ségou	1,6	32,8	39,3	0,7	47,5	2 574
Mopti	1,5	30,4	23,9	0,9	58,0	1 530
Tombouctou	2,3	23,1	42,7	0,7	46,9	281
Gao	5,2	25,1	43,6	3,6	49,3	485
Kidal	†	†	†	†	†	6
Bamako	5,5	62,5	39,5	2,3	25,1	2 675
Niveau d'instruction						
Aucun	0,2	31,7	40,1	0,1	46,8	9 382
Primaire	1,4	44,5	42,3	0,7	38,1	2 926
Secondaire ou plus	9,3	57,8	37,8	4,5	30,5	5 039
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	0,7	25,4	39,5	0,1	49,7	3 036
Second	0,5	28,7	39,9	0,1	49,1	3 143
Moyen	1,8	34,3	40,8	0,7	44,7	3 318
Quatrième	3,4	47,5	44,1	1,7	35,4	3 676
Le plus élevé	7,3	63,0	35,4	3,8	28,9	4 174
Ensemble 15–49	3,0	41,4	39,8	1,5	40,6	17 347
50–64	1,4	32,0	49,7	0,7	40,0	3 007
Ensemble 15–64	2,8	40,0	41,3	1,4	40,5	20 354

5

[1] † : Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Étape 1 : Lisez le titre et le sous-titre, surlignés en orange dans le tableau ci-dessus. Ils vous présentent le sujet et la population de référence que le tableau décrit. Dans ce cas, le tableau porte sur les femmes de 15–49 ans et leur niveau d'exposition à différents types de médias. Ces questions ont été posées à toutes les femmes éligibles de 15–49 ans.

Étape 2 : Examinez les en-têtes de colonnes—surlignés en vert dans l'Exemple 1. Ils décrivent comment l'information est présentée par catégorie. Dans ce tableau, les trois premières colonnes de données présentent les différents types de médias auxquels les femmes ont accès au moins une fois par semaine. La quatrième colonne présente les femmes qui ont accès aux trois types de médias alors que la cinquième colonne présente les femmes qui n'ont accès à aucun des trois types de médias, sur une base hebdomadaire. La dernière colonne montre les effectifs de femmes de 15–49 ans interviewées dans l'enquête.

Étape 3 : Examinez les titres des lignes—la première colonne verticale surlignée en bleu dans l'Exemple 1. Ces titres sont les catégories selon lesquelles les données sont distribuées, basées sur les caractéristiques

de la population. Dans ce cas, le tableau présente l'exposition des femmes aux médias selon l'âge, le milieu de résidence urbain-rural, région, le niveau d'instruction et le quintile de bien-être économique. Dans la plupart des tableaux de l'EDSM-VII, les résultats seront répartis selon ces mêmes catégories.

Étape 4 : Regardez la dernière ligne du tableau surlignée en rose. Ces pourcentages représentent l'ensemble de toutes les femmes de 15–49 ans et leur accès à différents types de médias au moins une fois par semaine. Dans ce cas, 3,0 %* des femmes de 15–49 ans lisent un journal au moins une fois par semaine, 41,4 % regardent la télévision au moins une fois par semaine et 39,8 % écoutent la radio sur une base hebdomadaire.

Étape 5 : Pour trouver quel pourcentage de femmes ayant un niveau d'instruction secondaire ou plus sont exposées aux trois médias, au moins, une fois par semaine, tracez deux lignes imaginaires, comme montré **en violet** dans l'Exemple 1. Cela montre que 4,5 % des femmes de 15–49 ans ayant un niveau d'instruction secondaire ou plus sont exposées aux trois médias hebdomadairement.

En regardant les variations par caractéristiques sociodémographiques, nous pouvons voir comment varie le niveau d'exposition des femmes aux médias de masse au Mali. Les médias de masse sont souvent utilisés pour communiquer des messages sur la santé. Savoir comment varie l'exposition aux médias dans les différents groupes de population peut aider les planificateurs de programmes et les décideurs politiques à mieux identifier les groupes cibles et atteindre plus efficacement les populations concernées.

*Dans ce document, les données sont présentées exactement comme elles apparaissent dans le tableau, y compris le nombre de décimales. Cependant, dans la suite de ce rapport, les chiffres seront arrondis au point de pourcentage entier le plus proche.

Pratique : Utilisez le tableau de l'Exemple 1 pour répondre aux questions suivantes :

a) Quel pourcentage de femmes de 15–49 ans n'accèdent à aucun média hebdomadairement ?
b) Comparez les femmes selon leurs milieux de résidence—dans quel groupe est-ce que la proportion de femmes exposées aux journaux hebdomadairement est-elle la plus élevée ?
c) Est-ce qu'il y a une association claire entre le niveau d'instruction et regarder la télévision au moins une fois par semaine ?
d) Est-ce qu'il y a une association claire entre le fait de n'accéder à aucun média au moins une fois par semaine et le quintile de bien-être économique ?
e) Quelle est la gamme (les pourcentages minimum et maximum) de femmes qui n'accèdent à aucun média au moins une fois par semaine selon la région ?
f) Quelle est la gamme (les pourcentages minimum et maximum) de femmes parmi celles qui regardent la télévision au moins une fois par semaine selon l'âge ?

Réponses :

a) 40,6 % de femmes de 15–49 ans n'accèdent à aucun média hebdomadairement.

b) L'exposition aux journaux est la plus élevée parmi les femmes dans les autres milieux urbains : 6,6 %.

c) Oui, le pourcentage des femmes qui regardent la télévision au moins une fois par semaine augmente avec le niveau d'instruction ; de 31,7 % parmi les femmes sans instruction à 44,5% pour celles avec un niveau primaire et 57,8 % pour les femmes ayant un niveau secondaire ou plus.

d) Oui, le pourcentage des femmes qui n'accèdent à aucun média au moins une fois par semaine diminuent à mesure que le bien-être économique augmente, de 49,7 % des femmes du quintile le plus bas à 28,9 % des femmes du quintile le plus élevé.

e) La gamme de femmes qui n'accèdent à aucun média varie par région de 25,1 % à Bamako à 58,0 % dans la région de Mopti, en gardant à l'esprit que les données de la région de Kidal ne sont pas présentées séparément.

f) La gamme de femmes qui regardent télévision hebdomadairement selon l'âge est 36,5 % parmi les femmes de 40–49 ans jusqu'au 45,7 % parmi les femmes de 15–19 ans.

Exemple 2 : Enfants avec des symptômes d'IRA et recherche de soins pour traiter les symptômes d'IRA

une question posée à un sous-groupe d'enquêtés

Tableau 10.6 Enfants avec des symptômes d'IRA et recherche de soins pour traiter les symptômes d'IRA 1

Parmi les enfants de moins de 5 ans, pourcentage ayant eu des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA) au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview ; parmi les enfants ayant présenté des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Parmi les enfants de moins de 5 ans :		2 Parmi les enfants de moins de 5 ans avec des symptômes d'IRA :		
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage avec des symptômes d'IRA[1]	Effectif d'enfants	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés[2]	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés le jour même ou le jour suivant[2]	Effectif d'enfants
Âge en mois					
<6	2,2	1 745	(45,6)	(18,8)	38
6–11	3,3	1 490	(54,6)	(26,1)	49
12–23	2,8	2 892	49,4	19,1	80
24–35	2,5	3 018	43,7	12,0	75
36–47	2,0	2 870	47,2	17,9	56
48–59	1,7	2 816	(44,3)	(10,2)	47
Sexe					
Masculin	2,2	7 456	50,2	18,4	167
Féminin	2,4	7 376	44,8	15,9	178
Statut tabagique de la mère					
Fume des cigarettes/tabac	4,3	70	*	*	3
Ne fume pas	2,3	14 761	47,8	17,3	341
Combustible et équipement pour cuisiner					
Combustible et équipement propre[3]	(0,0)	29	*	*	0
Combustible solide[4]	2,3	14 711	47,3	17,2	344
Autre combustible	*	2	*	*	0
Pas de repas préparé dans le ménage	1,0	89	*	*	1
Résidence					
Bamako	1,6	1 733	(69,2)	(32,9)	27
Autre urbain	3,7	1 462	54,9	28,7	54
Ensemble urbain	2,5	3 195	59,7	30,1	81
Rural	2,3	11 637	43,7	13,1	264
Région[5]					
Kayes	3,0	2 265	45,0	16,7	67
Koulikoro	1,2	3 504	(41,2)	(20,5)	41
Sikasso	3,3	2 906	52,6	16,7	95
Ségou	2,3	2 330	(47,4)	(12,7)	54
Mopti	3,7	1 407	34,0	13,4	52
Tombouctou	1,7	253	(34,3)	(1,0)	4
Gao	0,8	428	*	*	3
Kidal	†	6	†	†	0
Bamako	1,6	1 733	(69,2)	(32,9)	27
Niveau d'instruction de la mère					
Aucun	2,2	8 851	38,4	10,8	195
Primaire	2,2	2 557	47,0	15,6	57
Secondaire ou plus	2,7	3 424	66,8	31,5	92
Quintile de bien-être économique					
Le plus bas	2,6	3 094	24,9	6,1	82
Second	2,2	3 103	43,8	20,7	69
Moyen	2,6	3 021	53,2	13,9	79
Quatrième	1,5	3 013	48,0	9,3	46
Le plus élevé	2,6	2 600	70,8	35,5	69
Ensemble	2,3	14 831	47,4	17,1	344

a b 3 4

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.

[5] † : Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Étape 1 : Lisez le titre et le sous-titre. Dans ce cas, le tableau porte sur deux groupes de population séparés : tous les enfants de moins de 5 ans (a) et les enfants de moins de 5 ans qui ont eu des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA) au cours des 2 semaines précédant l'interview (b).

Étape 2 : Identifiez les colonnes qui se réfèrent à tous les enfants de moins de 5 ans (a), et isolez ensuite les colonnes qui se réfèrent seulement aux enfants de moins de 5 ans qui ont eu des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines précédant l'interview (b).

Étape 3 : Regardez le premier groupe de colonnes (a). Quel pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ont eu des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines précédant l'interview ? C'est 2,3 %.

Maintenant regardez le deuxième groupe de colonnes (b). Combien d'enfants de moins de 5 ans ont eu des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines précédant l'interview ? Ce sont 344 enfants, ou 2,3 % d'enfants de moins de 5 ans (avec chiffres arrondis). Le groupe (b) est un sous-ensemble du groupe (a).

Étape 4 : Seulement 344 enfants de moins de 5 ans ont eu des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines précédant l'interview. Une fois que ces 344 enfants sont répartis par caractéristiques sociodémographiques, il y a parfois trop peu de cas pour que ces pourcentages soient fiables.

- Parmi les enfants de moins de 5 ans à Bamako ayant eu des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines précédant l'interview, des conseils ou un traitement ont été recherchés pour quel pourcentage de ces enfants ? C'est 69,2 %. Ce pourcentage est entre parenthèses car il est basé sur un effectif réduit (25–49 enfants non pondérés) dans cette catégorie. Les lecteurs doivent utiliser ces chiffres avec précaution—ils peuvent ne pas être fiables. (Pour plus d'informations sur les nombres pondérés et non pondérés, voir Exemple 3.)

- Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines précédant l'interview pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés dont la mère fume des cigarettes/tabac, quel est ce pourcentage ? Il n'y a pas de chiffre dans cette cellule—seulement un astérisque. Cela parce que la valeur est basée sur un effectif de cas inférieur à 25 cas d'enfants non pondérés. Les résultats pour ce groupe ne sont pas présentés. Le sous-groupe est trop petit et, par conséquent, les données ne sont pas fiables.

Note : Quand des nombres sont présentés entre parenthèses ou quand il y a un astérisque à la place d'un chiffre dans un tableau, l'explication doit figurer dans une note au bas du tableau. S'il n'y a aucune parenthèse ou astérisque dans le tableau, vous pouvez en déduire qu'il y a suffisamment de cas dans toutes les catégories et que les données sont statistiquement représentatives.

Exemple 3 : Comprendre les pondérations dans les tableaux de l'EDSM-VII

Un échantillon est un groupe d'individus sélectionnés pour une enquête. Dans l'EDSM-VII 2023–2024, l'échantillon est conçu pour représenter la population nationale de 15–49 ans. En plus des données nationales, la plupart des pays veulent collecter et présenter des données qui portent sur des plus petites zones géographiques ou administratives. Cependant, cela nécessite une taille d'échantillon minimum par zone. L'EDSM-VII 2023–2024 est représentative au niveau national, au niveau régional, et pour les milieux de résidence urbain et rural.

Tableau 3.1 Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés

Répartition (en %) des femmes enquêtées de 15–49 ans par certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Femme		
Caractéristique sociodémographique	3 Pourcentage pondéré	2 Effectif pondéré	1 Effectif non pondéré
Région[1]			
Kayes	15,2	2 635	2 673
Koulikoro	23,2	4 018	2 703
Sikasso	18,1	3 143	2 343
Ségou	14,8	2 574	2 204
Mopti	8,8	1 530	1 798
Tombouctou	1,6	281	1 774
Gao	2,8	485	1 141
Kidal	†	6	190
Bamako	15,4	2 675	2 376
Ensemble 15–49	100,0	17 347	17 202

Pour produire des statistiques représentatives du Mali dans son ensemble et au niveau de ces 9 régions administratives, le nombre de femmes enquêtées dans chaque région doit contribuer à la taille de l'échantillon total (national) en proportion de la taille de la région. Cependant, dans le cas où certaines régions ont des petites populations, un échantillon alloué en proportion de chaque région peut ne pas inclure suffisamment de femmes de chaque région pour l'analyse. Pour résoudre ce problème, les régions avec de petites populations sont sur-échantillonnées. Prenons le cas suivant : vous disposez d'assez d'argent pour interviewer 17 202 femmes et vous voulez produire des résultats représentatifs au niveau de l'ensemble du Mali et au niveau de ses régions (comme dans le Tableau 3.1). Cependant, la population totale du Mali n'est pas répartie de manière égale à travers les régions : certaines régions, comme Koulikoro, sont très peuplées alors que d'autres comme Tombouctou, ne le sont pas. Par conséquent, Tombouctou doit être sur-échantillonnée.

Un statisticien expert en sondage détermine combien de femmes doivent être interviewées dans chaque région pour obtenir des résultats statistiquement fiables. La colonne surlignée en bleu (1) dans le tableau, à droite, présente le nombre réel de femmes interviewées dans chaque région. Dans les régions, le nombre de femmes interviewées varie de 190 à Kidal (pour des raisons d'insécurité) à 2 703 à Koulikoro. Le nombre d'interviews est suffisant pour obtenir des résultats fiables dans la plupart des régions, à l'exception de Kidal, Ménaka et Taoudenni. Dans ce rapport, les données de Ménaka ont été combinées avec celles de Gao, tandis que les données de Taoudenni ont été combinées avec celles de Tombouctou. Par ailleurs, les données de Kidal contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national, mais elles ne sont pas présentées séparément.

Avec cette répartition d'interviews, certaines régions sont surreprésentées et d'autres sont sous-représentées. Par exemple, la population de Koulikoro représente environ 23,2 % de la population du Mali alors que la population de Tombouctou ne représente que 1,6 % de la population du Mali. Cependant, comme le montre la colonne en bleu, le nombre de femmes interviewées à Koulikoro ne représentent qu'environ 16 % de l'échantillon des femmes enquêtées (2 703/17 202) et le nombre de femmes interviewées à Tombouctou représente 10 % de l'échantillon total des femmes enquêtées (1 774/17 202). Cette répartition non pondérée des femmes ne représente pas fidèlement la population du Mali.

Pour obtenir des statistiques représentatives du Mali, la répartition des femmes dans l'échantillon doit être pondérée (ou ajustée mathématiquement) de manière qu'elle soit proche de la répartition réelle dans le pays. Les femmes d'une région avec une faible population, comme Tombouctou, ne doivent que peu contribuer au total national. Les femmes d'une région avec une grande population, comme Koulikoro, doivent contribuer beaucoup plus. Les statisticiens « pondèrent » (ou ajustent mathématiquement) le nombre de femmes enquêtées dans chaque région afin que la contribution de chaque région au total soit proportionnelle à la distribution réelle de la population du Mali. Les chiffres dans la colonne surlignée en violet (2) représentent les valeurs « pondérées ». Les valeurs pondérées peuvent être plus petites ou plus

grandes que les valeurs non pondérées au niveau de la région. La taille totale de l'échantillon national de 17 202 femmes n'a pas changé après la pondération, mais la distribution des femmes à travers les régions a été modifiée pour représenter leur poids dans la taille totale de la population.

Comment les statisticiens pondèrent-ils chaque catégorie ? Ils recalculent les catégories pour qu'elles reflètent la population réelle du Mali. Si vous comparez la colonne en vert (3) à la répartition réelle de la population du Mali, vous voyez que les femmes de chaque région contribuent à l'échantillon total avec le même poids qu'elles contribuent à la population du Mali. L'effectif pondéré de femmes dans l'enquête représente maintenant avec précision la proportion de femmes qui vivent réellement à Tombouctou et la proportion de femmes qui vivent dans la région de Koulikoro.

Avec l'échantillonnage et la pondération, il est possible d'interviewer suffisamment de femmes pour fournir des statistiques fiables au niveau national et des régions. En général, seuls les chiffres pondérés sont présentés dans les tableaux de l'EDSM-VII Mali 2023–2024 ; ne soyez donc pas surpris si ces chiffres paraissent faibles : ils peuvent en fait représenter un plus grand nombre de femmes interviewées. Rappelez-vous que le tableau utilise des parenthèses et astérisques pour vous avertir s'il y a trop peu de cas non-pondérés dans une catégorie.

INDICATEURS SUR LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE, EDSM-VII MALI 2023–2024

Indicateurs sur les objectifs de développement durable—EDS Mali 2023–2024

Indicateur			Résidence			N° tableau DHS
			Urbain	Rural	Ensemble	
1.	**Éradication de la pauvreté**					
	1.4.1	Proportion de la population vivant dans des ménages ayant accès aux services de base				
		a) Accès aux services de base pour l'eau de boisson	90,7	69,9	74,8	16.2
		b) Accès aux services de base d'assainissement	59,7	54,0	55,3	16.7
		c) Accès aux services de base d'hygiène	29,8	15,6	19,0	16.11
		d) Accès à l'électricité[1]	84,6	29,9	42,9	2.3
		e) Accès aux énergies et technologies propres[2]	1,7	0,6	0,8	2.4
			Sexe			
			Homme	femme	Ensemble	
2.	**Élimination de la faim**					
	2.2.1	Prévalence du retard de croissance parmi les enfants de moins de 5 ans	26,7	23,6	25,1	11.1
	2.2.2	Prévalence de la malnutrition parmi les enfants de moins de 5 ans	7,9	5,7	6,8	na
		a) Prévalence de l'émaciation parmi les enfants de moins de 5 ans	6,3	4,4	5,4	11.1
		b) Prévalence du surpoids (obésité) parmi les enfants de moins de 5 ans	1,6	1,3	1,4	11.1
	2.2.3	Prévalence de l'anémie chez les femmes de 15 à 49 ans selon que la femme est enceinte ou non				
		a) Prévalence de l'anémie chez les femmes de 15–49 ans non enceintes	na	52,1	na	11.17
		b) Prévalence de l'anémie chez les femmes de 15–49 ans enceintes	na	57,2	na	11.17
3.	**Bonne santé et bien-être**					
	3.1.2	Proportion des naissances assistées par un professionnel qualifié	na	na	65,5	9.9
	3.2.1	Taux de mortalité infanto-juvénile[3]	87	87	87	8.2
	3.2.2	Taux de mortalité néonatale[4]	33	25	29	8.2
	3.7.1	Proportion de femmes en âge de procréer (âgées de 15–49 ans) dont les besoins en fins de planification familiale sont satisfaits à l'aide des méthodes modernes	na	45,5	na	7.14.2
	3.7.2	Taux de natalité parmi les adolescentes par 1 000 femmes				
		a) Filles âgées de 10–14 ans[5]	na	3	na	5.1
		b) Femmes âgées de 15–19 ans[6]	na	137	na	5.1
	3.a.1	Prévalence ajustée selon l'âge de l'utilisation actuelle de tabac parmi les personnes âgées de 15 et plus[7]	13,8	1,1	7,4[a]	3.12
	3.b.1	Proportion de la population cible couverte par tous les vaccins inclus dans leur programme national				
		a) Couverture du vaccin contre le DTC (3ème dose)[8]	73,4	73,4	73,4	10.4
		b) Couverture du vaccin contre la rougeole (2nd dose)[9]	37,5	34,9	36,2	10.4
		c) Couverture du vaccin contre le pneumocoque (dernière dose du calendrier vaccinal)[10]	71,6	70,7	71,1	10.4
4.	**Éducation de qualité**					
	4.2.1	Proportion d'enfants de 24–59 mois qui sont sur en bonne voie de développement en matière de santé, d'apprentissage et de bien-être psycho-social en fonction	37,9	42,5	40,2	10.13
	4.2.2	Taux de participation dans un apprentissage organisé (un an avant l'âge officiel d'inscription à l'école primaire)	49,2	45,1	47,2	2.13
5.	**Égalité entre les sexes**					
	5.2.1	Proportion de femmes ayant déjà vécu en couple et de filles âgées de 15 ans et plus, victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques commis par un partenaire intime, dans les 12 mois précédent l'enquête[11,12]	na	27,1	na	18.13.1
		a) Violence physique	na	13,4	na	18.13.1
		b) Violence sexuelle	na	6,0	na	18.13.1
		c) Violence psychologique	na	21,7	na	18.13.1
	5.2.2	Proportion de femmes et de filles âgées de 15 ans et plus victimes de violences sexuelles commis par des personnes autres que leur partenaire intime dans les 12 mois précédent l'enquête[13]	na	0,2	na	18.6
	5.3.1	Proportion de femmes âgées de 20–24 ans ayant été mariées ou en union avant l'âge de 15 ans et avant l'âge de 18 ans				
		a) Avant l'âge de 15 ans	na	14,4	na	4.4
		b) Avant l'âge de 18 ans	na	48,5	na	4.4
	5.3.2	Proportion de filles et de femmes âgées de 15–49 ans ayant subi une mutilation génitale féminine	na	88,6	na	17.2
	5.6.1	Proportion de femmes âgées de 15–49 ans qui prennent des décisions informées concernant les relations sexuelles, l'utilisation de contraceptifs et les soins de santé reproductive[14]	na	3,1	na	15.12
	5.b.1	Proportion d'individus possédant un téléphone portable[15]	86,9	65,8	76,4[a]	15.6.1 et 15.6.2

À suivre…

Suite

		Résidence			
		Urbain	Rural	Ensemble	
6.	**Eau propre et assainissement**				
6.1.1	Proportion de la population utilisant des services d'eau potable gérés en toute sécurité				
	a) Proportion avec des services élémentaires d'eau potable	90,7	69,9	74,8	16.2
	b) Proportion avec de l'eau disponible à la demande	79,7	81,0	80,7	16.4
6.2.1	Proportion de la population utilisant (a) des services d'assainissement gérés en toute sécurité et (b) une installation pour le lavage des mains avec de l'eau et du savon				
	a) Proportion utilisant un service élémentaire d'assainissement	59,7	54,0	55,3	16.7
	b) Proportion pour laquelle les excreta sont gérés sur site de manière hygiénique ou traités hors site	72,8	56,2	60,1	16.9
	c) Proportion utilisant une installation pour le lavage des mains avec de l'eau et du savon	29,8	15,6	19,0	16.11
	d) Proportion pratiquant la défécation à l'air libre	0,4	7,3	5,6	16.6
7.	**Énergie propre et à coût abordable**				
7.1.1	Proportion de la population ayant accès à l'éléctricité[1]	84,6	29,9	42,9	2.3
7.1.2	Proportion de la population ayant une dépendance primaire sur les carburants et la technologies propres[2]	1,7	0,6	0,8	2.4
		Sexe			
		Homme	Femme	Ensemble	
8.	**Travail décent et croissance économique**				
8.10.2	Proportion d'adultes (15 ans et plus) ayant un compte dans une banque, dans une autre institution financière, ou avec un fournisseur de service mobile de transfert d'argent[15]	67,5	39,7	53,6[a]	15.6.1 et 15.6.2
16.	**Paix, justice et institutions fortes**				
16.2.3	Proportion de jeunes femmes et de jeunes hommes âgés de 18–29 ans ayant subi des actes de violence sexuelle avant l'âge de 18 ans	1,2	5,5	na	18.7
16.9.1	Proportion d'enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été enregistrée à l'état civil	90,0	88,4	89,2	2.10
17.	**Partenariats pour la réalisation des objectifs**				
17.8.1	Proportion d'individus utilisant l'internet[16]	61,2	40,3	50,7[a]	3.5.1 et 3.5.2

na = Non applicable
[1] Personnes vivant dans des ménages déclarant que leur source d'éclairage principale est l'électricité.
[2] Personnes vivant dans des ménages qui déclarent : pas de cuisine, pas de radiateur ou pas d'éclairage ne sont pas exclues du numérateur.
[3] Exprimés en termes de mortalité maternelle pour 100 naissances vivantes durant la période de 7 ans précédant l'enquête.
[4] Exprimés en termes de mortalité par 1 000 naissances vivantes pour la période de 5 ans précédant l'enquête
[5] Equivalent au taux de fécondité par âge pour les filles âgées de 10–14 ans durant la période de 3 ans précédant l'enquête, exprimés en termes de naissances par 1 000 filles âgées de 10–14 ans
[6] Equivalent au taux de fécondité par âge des femmes âgées de 15–19 ans durant la période des 3 années précédant l'enquête, exprimés en termes de naissances par 1 000 filles âgées de 15–19 ans
[7] Les données ne sont pas standardisées pour l'âge et sont disponibles pour seulement les femmes et hommes de 15–49 ans.
[8] Pourcentage d'enfants de 12–23 mois qui ont reçu les trois doses de DTC-HepB-Hib
[9] Pourcentage d'enfants de 24–35 mois qui ont reçu les deux doses de vaccin contenant un antigène contre la rougeole.
[10] Pourcentage d'enfants de 12–23 mois qui ont reçu les trois doses de vaccin contre le pneumocoque
[11] Les données sont disponibles seulement pour les femmes âgées de 15–49 ans qui ont déjà été en union.
[12] Dans la DHS, la violence psychologique est appelée violence émotionnelle.
[13] Données disponibles seulement pour les femmes âgées de 15–49 ans
[14] Données disponibles seulement pour les femmes actuellement en union
[15] Données disponibles seulement pour les hommes et les femmes âgés de 15–49 ans
[16] Les données sont disponibles pour les femmes et les hommes âgés de 15–49 ans qui ont utilisé l'Internet dans les 12 mois précédents.
[a] Le total est calculé comme une moyenne arithmétique simple des pourcentages des colonnes hommes et femmes.

MALI



Note : Pour des raisons d'insécurité, les données de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région et ne sont pas présentées séparément.

PRÉSENTATION ET MÉTHODOLOGIE DE L'ENQUÊTE 1

La septième Enquête Démographique et de Santé au Mali (EDSM-VII) a été réalisée par l'Institut National de la statistique (INSTAT) en étroite collaboration avec la Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Santé, Développement Social et Promotion de la Famille (CPS/SS-DS-PF). La collecte des données s'est déroulée du 8 décembre 2023 au 28 mars 2024. ICF a fourni l'assistance technique par le biais du Programme DHS, financé par l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) qui apporte un appui financier et une assistance technique pour la réalisation d'enquêtes dans les domaines de la population et de la santé dans plusieurs pays du monde entier. Le financement de l'EDSM-VII a été assuré par l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), le Fonds mondial, l'UNICEF et le Gates Foundation.

1.1 OBJECTIFS DE L'ENQUÊTE

L'EDSM-VII est une enquête nationale par sondage. Son objectif principal est de fournir des estimations actualisées des indicateurs démographiques, nutritionnels et sanitaires de base. Cette enquête a plus précisément recueilli des informations sur les niveaux de fécondité, les préférences en matière de fécondité, la connaissance et l'utilisation des méthodes de planification familiale, la mortalité des enfants, la santé maternelle et infantile, les pratiques en matière d'allaitement, l'état nutritionnel des enfants de moins 5 ans et des femmes de 15–49 ans, la possession et l'utilisation de moustiquaires, la connaissance, les attitudes et les comportements vis-à-vis du VIH/Sida et d'autres infections sexuellement transmissibles, le handicap, l'excision, et les violences domestiques. Par ailleurs, elle a permis de réaliser un test de la teneur en iode dans le sel de cuisine, de collecter des échantillons de sang pour la réalisation du test d'anémie chez les enfants de 6–59 mois et les femmes de 15–49 ans, et de prendre des mesures anthropométriques pour évaluer la situation nutritionnelle des enfants de 0–59 mois et des femmes de 15–49 ans.

Les informations présentées dans le rapport final de l'EDSM-VII sont destinées à appuyer les décisions des responsables des orientations politiques et des gestionnaires de programmes pour l'évaluation et la conception de programmes et de stratégies visant à améliorer la santé de la population du Mali. Le rapport final de l'EDSM-VII présente également des indicateurs pertinents pour la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) pour le Mali.

1.2 CONCEPTION DE L'ÉCHANTILLON

L'EDSM-VII cible la population des individus qui résident dans les ménages ordinaires de l'ensemble du pays. L'EDSM-VII est basée sur un échantillon de ménages qui a été sélectionné de façon à fournir une représentation adéquate des milieux urbain et rural ainsi que des 11 domaines d'étude correspondant aux 10 régions administratives (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudenni et Ménaka) et au district de Bamako. Ces régions, issues de l'ancien découpage administratif, correspondaient aux régions sanitaires opérationnelles au moment de l'opération. Pour des raisons d'insécurité dans les régions de Kidal et Ménaka, l'enquête a eu lieu essentiellement dans les villes et localités sécurisées et accessibles alors qu'il était prévu d'enquêter dans toutes les localités de ces régions.

L'échantillon de l'EDSM-VII est un échantillon aréolaire stratifié et tiré à deux degrés. Au premier degré, des Unités Primaires de Sondage (UPS) ou grappes ont été tirées à partir de la liste des sections d'énumération (SE) établies au cours du cinquième recensement général de la population et de l'habitat (RGPH-5) réalisé en 2022. Globalement, 500 grappes, dont 125 en milieu urbain et 375 en milieu rural, ont été sélectionnées en procédant à un tirage systématique avec probabilité proportionnelle à la taille, celle-ci correspondant au nombre de ménages de l'UPS. Un dénombrement des ménages avec prise de

coordonnées GPS dans chacune de ces grappes a fourni une liste des ménages à partir de laquelle a été sélectionné, au second degré, un échantillon de 24 ménages avec un tirage systématique à probabilité égale, à partir des listes nouvellement établies au moment du dénombrement.

Toutes les femmes âgées de 15–64 ans vivant habituellement dans les ménages sélectionnés, ou présentes la nuit précédant l'enquête, étaient éligibles pour être enquêtées. De plus, tous les enfants de moins de 5 ans étaient éligibles pour être mesurés et pesés afin d'évaluer leur état nutritionnel.

Par ailleurs, dans un sous-échantillon d'un ménage sur deux, tous les hommes de 15–64 ans étaient éligibles pour être enquêtés seulement et les femmes de 15–49 ans étaient éligibles pour le test d'anémie et pour être mesurées et pesées afin d'évaluer leur état nutritionnel. Dans ce même sous-échantillon, les enfants de 6–59 mois étaient éligibles pour le test d'anémie.

Graphique 1.1 **Organisation de l'EDSM-VII 2023–2024**



1.3 QUESTIONNAIRES

Quatre questionnaires ont été utilisés dans le cadre de l'EDSM-VII : le questionnaire Ménage, le questionnaire Femme, le questionnaire Homme et le questionnaire Biomarqueur. Ces questionnaires, basés sur les questionnaires modèles du Programme DHS, ont été adaptés pour refléter les spécificités de la population et les problématiques de santé pertinente pour le Mali. De plus, un questionnaire destiné aux agents de terrain, auto-administré, a servi à recueillir des informations les concernant.

Le **questionnaire ménage** a permis d'enregistrer tous les membres du ménage et les visiteurs qui ont dormi la nuit précédant l'enquête avec certaines de leurs caractéristiques : lien de parenté avec le chef de ménage, sexe, âge, situation de résidence, niveau d'instruction des personnes de 3 ans et plus, état de survie et résidence des parents biologiques pour les personnes de moins de 18 ans, assistance aux frais de scolarité et aux matériels scolaires pour les personnes de 3 à 24 ans fréquentant l'école, enregistrement des naissances pour les enfants de 0 à 4 ans, et le handicap parmi les personnes de 5 ans et plus.

Il a aussi permis d'identifier les femmes, les hommes et les enfants éligibles pour les interviews individuelles et/ou pour les tests et mesures biologiques et de collecter les informations sur les caractéristiques du ménage, telle que la principale source d'approvisionnement en eau de boisson, le type de toilettes, le type d'équipement et de combustible utilisé pour la cuisine, le chauffage et l'éclairage, le type de matériaux du sol, des murs extérieurs et du toit du logement, la possession de certains biens durables, la possession du bétail et/ou de volailles, la possession et l'utilisation de la moustiquaire. Des tests pour déceler la présence d'iode dans le sel utilisé par les ménages pour la cuisine ont été aussi effectués.

Le **questionnaire individuel femme** a été utilisé pour enregistrer les informations concernant les femmes éligibles de 15–64 ans résidentes ou visiteuses. Pour les femmes de 15–49 ans, il comprend les sections suivantes :

- Caractéristiques sociodémographiques des femmes ;
- Reproduction ;
- Contraception ;
- Soins prénatals, postnatals et les soins aux nouveau-nés ;
- Vaccination des enfants (0–35 mois) ;
- Santé de l'enfant (0–59 mois) ;
- Nutrition de l'enfant (0–23 mois) ;
- Mariage et activité sexuelle ;
- Préférences en matière de fécondité ;
- Caractéristiques du mari et le travail de la femme ;
- VIH/sida ;
- Autres problèmes de santé ;
- Activité physique ;
- Maladies chroniques ;
- Mutilations génitales féminines/Excisions ;
- Violence domestique.

Pour les femmes âgées de 50–64 ans, il comprend :

- Caractéristiques sociodémographiques des femmes
- Activité physique
- Maladies chroniques

Le **questionnaire individuel homme** est indépendant du questionnaire individuel femme, mais la plupart des questions posées aux hommes âgés de 15–64 ans sont identiques à celles posées aux femmes de 15–64 ans. Le questionnaire porte sur les sections suivantes :

- Caractéristiques sociodémographiques des hommes ;
- Reproduction ;
- Contraception ;
- Mariage et activité sexuelle ;
- Préférences en matière de fécondité ;
- Emploi et rôle du sexe ;
- VIH/sida, IST ;
- Autres problèmes de santé ;
- Activité physique ;
- Maladies chroniques ;
- Mutilations génitales féminines/Excision
- Violence domestique.

À l'issue de chaque interview (ménage et individuelle), les coordonnées GPS fournissant la situation géographique du lieu de l'entretien ont été relevées.

Le **questionnaire biomarqueur** a été utilisé par les agents biomarqueurs pour enregistrer les informations et les résultats des tests d'anémie chez les enfants de 6–59 mois et chez les femmes de 15–49 ans et des mesures du poids et de la taille chez les enfants de 0–59 mois et chez les femmes de 15–49 ans.

Avant la prise de toute mesure ou avant d'effectuer un test biologique, il était obligatoire d'obtenir le consentement éclairé des participants. Après avoir rempli la version papier du questionnaire Biomarqueur, l'agent biomarqueur devait le remettre à l'enquêteur ou l'enquêtrice ayant réalisé l'entretien pour reporter les informations dans la version CAPI dans la tablette.

Le questionnaire destiné aux agents de terrain a pour objectif de recueillir des informations de base sur les personnes qui collectent les données sur le terrain, notamment le chef d'équipe, l'enquêteur ou l'enquêtrice et l'agent biomarqueur.

Les quatre questionnaires ainsi que le protocole de l'enquête ont été validés par le Comité d'Éthique de la Faculté de Médecine, Pharmacie et d'Odonto-Stomatologie de l'Université des Sciences et de Technologies de Bamako et le comité d'éthique (Institutional Review Board) d'ICF.

1.4 TEST DE L'IODE DANS LE SEL, ANTHROPOMÉTRIE, DÉPISTAGE DE L'ANÉMIE

Au cours de la collecte des données de l'EDSM-VII, les agents enquêteurs devaient, en plus de conduire l'interview dans les ménages, procéder au test pour déterminer la présence d'iode dans le sel de cuisine utilisé par les ménages. Les agents biomarqueurs devaient quant à eux effectuer les mesures anthropométriques et les tests biologiques de détection de l'anémie chez les personnes éligibles.

Iode dans le sel de cuisine : Dans chaque ménage visité, les enquêteurs ont testé le sel utilisé pour la cuisine. Ce test rapide est réalisé à l'aide d'un « kit » qui permet de déterminer la présence ou non de l'iode dans le sel.

Anthropométrie : La taille et le poids ont été mesurés pour tous les enfants de moins de 5 ans dans tous les ménages interviewés et pour les femmes âgées de 15–49 ans dans le sous-échantillon des ménages sélectionnés pour l'enquête homme. Les mesures pondérales ont été relevées à l'aide de pèse-personnes SECA. Les mesures de la taille/longueur ont été relevées avec une toise (ShorrBoard®). Les enfants de moins de 24 mois ont été mesurés en position couchée (longueur couchée), alors que les enfants plus âgés et les adultes l'ont été en position debout (taille).

Pour évaluer la précision des mesures, au moins un enfant par grappe a été choisi de manière aléatoire pour être mesuré une deuxième fois. Selon la définition du Programme DHS, une différence de moins d'un centimètre entre les deux mesures de la taille constitue un degré de précision acceptable. Les enfants ayant

un score centré réduit inférieur à -3 ou supérieur à 3 pour la Taille-pour-âge, le Poids-pour-taille ou le Poids-pour-âge ont été signalés et mesurés une deuxième fois. La deuxième mesure des cas signalés a été effectuée pour garantir l'exactitude de la déclaration des mesures de taille et de poids.

Après avoir effectué les mesures et réévaluations de la taille et du poids des enfants, les z scores du poids/taille des enfants étaient calculés avec CAPI. Les enfants ayant un *z* score inférieur à -3 pour le poids-pour-taille étaient considérés comme des enfants souffrant d'une malnutrition aiguë sévère. Un formulaire de référence était fourni au parent/adulte responsable d'un enfant identifié avec une malnutrition aiguë sévère. L'agent biomarqueur recommandait aux personnes concernées de se rendre dans un établissement sanitaire le plus proche pour diagnostic et prise en charge.

Anémie. Les échantillons sanguins pour le dépistage de l'anémie ont été prélevés sur des femmes de 15–49 ans dans les ménages sélectionnés pour l'enquête homme ayant donné leur consentement pour être testées. Des échantillons sanguins ont également été prélevés sur des enfants âgés de 6–59 mois pour lesquels les parents ou les tuteurs avaient donné leur consentement. Ces échantillons sanguins ont été obtenus à partir d'une goutte de sang prélevée par piqûre au doigt (ou au talon dans le cas des enfants âgés de 6–11 mois) et recueillis dans une microcuvette. L'analyse de l'hémoglobine a été réalisée sur place à l'aide d'un appareil portable à piles HemoCue® 201+. Les résultats ont été communiqués verbalement et par écrit aux personnes testées. Les parents ou les responsables des enfants dont le taux d'hémoglobine était inférieur à 8 g/dl ont été orientés vers un établissement de santé et invités à s'y rendre avec l'enfant pour un suivi. De même, les adultes ont été orientés pour recevoir des soins de suivi si leur taux d'hémoglobine était inférieur à 8 g/dl.

1.5 FORMATION DES FORMATEURS ET PRÉTEST

1.5.1 Formation des formateurs et prétest

La formation des formateurs a eu lieu en même temps que celle des agents enquêteurs pour le prétest des outils. Cette activité s'est déroulée du 3 au 28 octobre 2023. Elle avait pour but principal de former les formateurs principaux et de tester l'ensemble des outils de collecte (PAPI et CAPI). Il s'agissait spécifiquement de :

- Former les agents enquêteurs sur la structure et l'administration des questionnaires ;
- Tester les questionnaires en vérifiant la formulation des questions, les sauts et filtres ainsi que les séquences des questions ;
- Former les agents à l'utilisation de l'application de la collecte CAPI ;
- Tester l'application de collecte en vérifiant la cohérence avec les questionnaires papier (CAPI).

1.5.2 Formation des agents cartographes, énumérateurs et travaux de terrain

La formation des agents pour les travaux cartographiques et le dénombrement des ménages s'est tenue à Bamako du 18 au 22 octobre 2023 pour les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le District de Bamako. Pour des raisons de déplacements de la population et d'insécurité, les travaux cartographiques ont été réalisés au même moment que l'enquête dans les régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudenni et Ménaka.

Les travaux de cartographie et d'énumération (dénombrement des ménages) proprement dits se sont déroulés en 40 jours, soit du 28 octobre au 6 décembre 2023. Il s'agissait pour les cartographes et les énumérateurs de repérer les grappes sélectionnées pour l'enquête, actualiser les limites de la SE au besoin, procéder à la segmentation des SE de plus de 150 ménages pour en sélectionner un, énumérer l'ensemble des ménages s'y trouvant. Les résultats de la cartographie ont servi pour la sélection des ménages au moment de l'enquête. Trente équipes ont été constituées pour les besoins de la cartographie. Chaque équipe était composée de deux agents : un cartographe et un énumérateur.

1.6 FORMATION DU PERSONNEL DE TERRAIN

La formation pour l'enquête principale s'est tenue du 6 novembre au 7 décembre 2023 pour préparer les participants à la réalisation de l'enquête principale. Elle a concerné au total 246 agents présélectionnés.

Les participants étaient répartis entre trois salles de formation et la formation a été organisée en deux phases. Une phase théorique (présentations et simulations) s'est tenue du 6 au 27 novembre 2023 dans les différentes salles et une phase pratique sur le terrain a été réalisée du 28 novembre au 6 décembre 2023 dans trois localités non échantillonnées en dehors de Bamako. Cent-quatre-vingt-neuf agents ont été retenus pour les travaux de terrain à l'issue de la formation et des séries de tests.

La formation a porté sur les techniques d'interview, le remplissage des questionnaires, l'utilisation des tablettes Android pour conduire les interviews assistées par ordinateur (CAPI), les techniques de prise des mesures anthropométriques et de réalisation des tests d'anémie. L'approche utilisée a consisté à (i) la présentation des modules (PowerPoint) par les formateurs, suivie de la lecture concomitante, section par section, des instructions dans le manuel de l'agent enquêteur et des questions correspondantes des questionnaires suivie d'explications et de démonstrations pour prendre en compte les préoccupations mentionnées par les agents; (ii) des jeux de rôle ont été effectués en salle entre participants à l'aide des tablettes pour évaluer et améliorer leurs aptitudes à administrer les questionnaires ainsi que leur niveau de compréhension des questions suivis de discussions ; (iii) des pratiques sur le terrain suivi de discussions en salle ; et (iv) l'organisation régulière des évaluations des connaissances acquises, suivies de discussions en salle. En outre, tout au long de la formation, des séances de traduction des questionnaires dans les principales langues parlées au Mali ont été organisées pour, qu'au cours de l'enquête, les agents enquêteurs traduisent les questions le plus fidèlement possible.

Les chefs d'équipe ont aussi reçu une formation complémentaire sur le contrôle technique, l'organisation du travail et la gestion de la logistique, le contact avec les autorités et les populations ainsi que sur les techniques de dénombrement (pour permettre aux équipes de collecte de dénombrer les grappes n'ayant pas pu être visitées pendant la phase cartographique, principalement dans les régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudenni et Ménaka).

Par ailleurs, les techniciens biomarqueurs ont suivi la plus grande partie de leur formation dans une salle différente des autres agents. Ces techniciens biomarqueurs, avaient le profil Technicien de Santé, agent de laboratoire et/ou des agents avec des expériences dans les enquêtes nutritionnelles. Ils ont été formés pour mesurer d'une part la taille, le poids des enfants de moins de 5 ans et des femmes de 15–49 ans et d'autre part pour réaliser le test d'anémie chez les enfants de 6–59 mois et chez les femmes de 15–49 ans. Les techniciens responsables de la collecte des biomarqueurs ont été formés aux procédures de mesure de la taille et du poids des enfants et des adultes. La formation concernant la mesure de la taille des enfants comprenait des exercices de standardisation, et des exercices réitérés de standardisation pour les techniciens ayant échoué aux premiers exercices de standardisation. Le **Tableau C.7** en Annexe C présente les résultats du test de standardisation.

1.7 TRAVAIL DE TERRAIN

L'enquête principale s'est matérialisée par des travaux de terrain pendant la période allant du 8 décembre 2023 au 7 mars 2024 pour les équipes du centre et du Sud, du 13 décembre 2023 au 28 mars 2024 pour les équipes du nord. Au total vingt-sept équipes de travail composées chacune de sept personnes dont un chef d'équipe et un agent enquêteur pour administrer le questionnaire homme, trois enquêtrices pour le questionnaire femme et deux agents (homme ou femme) pour le questionnaire biomarqueurs.

Les vingt-sept équipes étaient placées sous la responsabilité des superviseurs de terrain composés des cadres de l'INSTAT, de la CPS/SS-DS-PF, du PNLP, de la DGSHP, de l'ONASR et de la CSLS-TBH. À l'occasion de leur tournée, ils assistaient à des interviews et à des tests, vérifiaient des questionnaires et interpellaient les agents sur les incohérences constatées dans les données. Les agents de terrain ont utilisé des tablettes Android pour enregistrer les résultats de l'enquête et contrôler en temps réel la qualité des

données collectées. Dans chaque équipe de terrain, les membres de l'équipe échangeaient des données à l'aide de Bluetooth alors que le transfert des données au niveau du bureau central de l'INSTAT, par les chefs d'équipes, se faisait par internet. À la fin de chaque journée, les chefs d'équipe transféraient les données au serveur central. Le suivi de la collecte était régulier au niveau du bureau et du terrain.

À la fin des travaux de terrain, l'enquête a été menée avec succès dans 407 grappes sur les 500 grappes tirées pour constituer l'échantillon de l'EDSM-VII (81 %) mais 93 grappes (19 %) de l'échantillon n'ont pas été enquêtées. C'est dans les régions de Kidal et Ménaka que la non-couverture de l'échantillon est la plus importante du fait principalement des difficultés d'accès aux populations rurales à cause des problèmes d'insécurité. En effet, plus de la moitié des grappes prévues pour la collecte, étaient inaccessibles dans ces deux régions (Kidal, 71 % et Ménaka, 69 %). Il convient de rappeler que la période de collecte des données dans les ménages a coïncidé avec une recrudescence de l'insécurité à Kidal et à Ménaka. La collecte des données dans ces deux régions s'est donc réalisée essentiellement dans les grappes des localités accessibles et sécurisées des chefs-lieux de région et leurs environs. Ainsi, les grappes enquêtées aussi bien à Kidal qu'à Ménaka ne sont pas suffisantes pour représenter chacune de ces régions et les indicateurs calculés ne représentent qu'une portion de la région essentiellement les chefs lieu de ces régions et des localités environnantes. Cette faible couverture est susceptible d'introduire un biais à la généralisation des indicateurs relevant de chacune de ces régions. Par conséquent, les résultats de l'enquête présentés dans ce rapport pour chacune de ces deux régions doivent être interprétés avec prudence. Pour les autres régions, le pourcentage des grappes enquêtées avec succès parmi celles échantillonnées varie de 69 % à Taoudenni, 70 % à Gao à 100 % à Bamako, Kayes et Tombouctou.

L'activité pastorale caractérisée par une vie nomade des populations de Taoudenni a conduit l'équipe qui y était affectée à adopter d'autres stratégies de collecte. En effet, il a été constaté qu'au moment de l'enquête, la population de tous les ménages échantillon d'une grappe sélectionnée avait déménagé à Tombouctou. L'équipe de travail de l'EDSM-VII, après s'être assurée auprès des autorités administratives et des chefs de fractions qu'il s'agissait bien de la même communauté, a procédé à la collecte des données auprès de ménages échantillon sélectionnés dans leurs sites actuels. Les indicateurs présentés dans ce rapport pour cette région est le reflet de cette situation. Il s'ensuit que les données collectées pour la région de Taoudenni ne peuvent être associées aux conditions et caractéristiques de cette région.

Compte tenu de la situation au moment de l'enquête, les données collectées dans les régions de Kidal, Ménaka et Taoudenni ne sont pas représentatives de chacune de ces régions. Dans ce rapport, les données de Ménaka ont été combinées avec celles de Gao pour représenter la région de Gao, tandis que les données de Taoudenni ont été combinées avec celles de Tombouctou pour représenter la région de Tombouctou. Cela permet de comparer les données avec celles des enquêtes EDS précédentes au Mali, qui ont utilisé le même groupement des régions. Par ailleurs, les données de Kidal sont incluses dans les résultats globaux et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national, mais elles ne sont pas présentées séparément.

1.8 TRAITEMENT DES DONNÉES

Parallèlement aux travaux de collecte des informations auprès des ménages, une équipe d'édition était à l'œuvre pour un meilleur suivi de la qualité des données recueillies par les agents de terrain. L'utilisation des tablettes Android comme outils de collecte a permis une saisie automatique au moyen du logiciel CSPro incorporé dans ces tablettes. En dehors de la plateforme de suivi de collecte des données, un programme de contrôle de qualité a permis de détecter, pour chaque grappe et pour chaque équipe, les principales erreurs de collecte. Ces informations ont été communiquées aux équipes lors des missions de supervision et d'autres ont été corrigées au bureau central par les éditeurs afin d'améliorer la qualité des données.

Les interviews ont été réalisées sur le terrain à l'aide des tablettes Android. Les questionnaires ont été intégrés dans une application sous CSPro pour une collecte informatisée à l'aide de tablettes. Cette application de collecte comportait plusieurs menus qui comprenaient des guides d'interview et des contrôles internes permettant aux agents enquêteurs d'éviter certaines incohérences depuis le terrain aussi bien pour l'administration du questionnaire que pour la saisie des mesures anthropométriques. Les données

des biomarqueurs initialement collectées à l'aide de questionnaire papier ont été, par la suite, saisies par les enquêteurs.

Les données collectées ont été régulièrement envoyées au serveur de l'INSTAT. Un programme de contrôle de qualité a permis, de manière quasi instantanée (Dashboard), de détecter, pour chaque équipe et pour chaque agent de terrain, les principales erreurs de collecte. Des visioconférences hebdomadaires ont été organisées entre les membres de l'équipe technique pour évaluer la qualité des données et discuter des difficultés rencontrées par les équipes sur le terrain afin d'y apporter des solutions appropriées. En dehors de la plateforme de suivi de collecte des données, un programme de contrôle de qualité a permis de détecter, pour chaque grappe et pour chaque équipe, les principales erreurs de collecte, qui a été effectué quasi simultanément par une équipe mise en place à cet effet. Cette équipe avait pour rôle d'assurer l'édition des données.

Ces informations ont été communiquées aux équipes lors des missions de supervision et d'autres ont été corrigées au bureau central par les éditeurs afin d'améliorer la qualité des données.

Ces résultats ont parfois nécessité des retours sur le terrain dans des ménages pour des vérifications nécessaires. À la fin de la collecte sur le terrain, une édition secondaire des données a été effectuée de mars à mai 2024.

1.9 TAUX DE RÉPONSE

Le **Tableau 1.1** décrit l'échantillon de l'EDSM-VII et présente le taux de réponse. Un total de 9 775 ménages a été sélectionné dans l'échantillon de l'EDSM-VII, parmi lesquels 9 714 étaient occupés. Dans ces ménages occupés, 9 667 ont été enquêtés avec succès, donnant un taux de réponse de 99,5 %. Dans les ménages interviewés, 17 555 femmes de 15–49 ans ainsi que 3 157 femmes de 50–64 ans ont été identifiées comme étant éligibles pour l'interview individuelle. Les interviews ont été complétées pour 17 231 femmes de 15–49 ans et 3 123 femmes de 50–64 ans, ce qui a permis d'obtenir respectivement des taux de réponse de 98,2 % et 98,9 %. Dans le sous-échantillon de ménages sélectionnés pour l'enquête auprès des hommes, 8 158 âgés de 15–64 ans ont été identifiés comme étant éligibles pour l'interview individuelle et 7 829 ont été enquêtés avec succès, ce qui correspond à un taux de réponse de 96 %.

Tableau 1.1 Résultats des interviews ménage et individuelle

Effectif de ménages, nombre d'interviews et taux de réponse par milieu de résidence (non pondéré), EDSM-VII Mali 2023–2024

	Résidence				
Résultat	Bamako	Autres urbain	Ensemble urbain	Rural	Ensemble
Interviews ménages					
Ménages sélectionnés	1 249	1 705	2 954	6 821	9 775
Ménages occupés	1 237	1 692	2 929	6 785	9 714
Ménages interviewés	1 229	1 683	2 912	6 755	9 667
Taux de réponse des ménages[1]	99,4	99,5	99,4	99,6	99,5
Interviews des femmes de 15–49 ans					
Effectif de femmes éligibles	2 433	2 804	5 237	12 318	17 555
Effectif de femmes éligibles interviewées	2 380	2 743	5 123	12 108	17 231
Taux de réponse des femmes éligibles[2]	97,8	97,8	97,8	98,3	98,2
Interviews ménages dans le sous-échantillon pour l'enquête homme					
Ménages sélectionnés	624	845	1 469	3 398	4 867
Ménages occupés	618	838	1 456	3 380	4 836
Ménages interviewés	615	833	1 448	3 364	4 812
Taux de réponse des ménages dans le sous-échantillon[1]	99,5	99,4	99,5	99,5	99,5
Interviews des femmes de 50–64 ans					
Effectif de femmes éligibles	275	384	659	2 498	3 157
Effectif de femmes éligibles interviewées	272	376	648	2 475	3 123
Taux de réponse des femmes éligibles[2]	98,9	97,9	98,3	99,1	98,9
Interviews des hommes de 15–64 ans					
Effectif d'hommes éligibles	1 227	1 298	2 525	5 633	8 158
Effectif d'hommes éligibles interviewés	1 171	1 231	2 402	5 427	7 829
Taux de réponse des hommes éligibles[2]	95,4	94,8	95,1	96,3	96,0

[1] Ménages enquêtés/ménages occupés.
[2] Enquêtés interviewés/enquêtés éligibles.

Indépendamment de l'enquête individuelle femme ou homme, les taux de réponse sont plus faibles en milieu urbain, en particulier dans les villes autre que Bamako, qu'en milieu rural. Cependant, quel que soit le milieu de résidence, les taux de réponse des ménages, des femmes et des hommes sont nettement supérieurs à ceux prévus dans la conception du plan de sondage.

CARACTÉRISTIQUES DU LOGEMENT ET DE LA POPULATION DES MÉNAGES 2

Principaux résultats

- ***Caractéristiques du logement :*** Dans l'ensemble, 50 % des ménages ou de la population disposent de l'électricité.
- ***Taille moyenne du ménage :*** La taille moyenne d'un ménage au Mali est de 8,9 personnes. Elle varie de 7,7 en milieu urbain à 9,4 en rural.
- ***Enregistrement des naissances :*** Pour 89 % des enfants de moins de 5 ans, la naissance a été enregistrée à l'état civil et 78 % possèdent un acte de naissance.
- ***Taux net de fréquentation scolaire :*** Cinquante-neuf pour cent des enfants de 7–12 ans fréquentent l'école au niveau primaire et 32 % de ceux âgés de 13–18 ans fréquentent l'école au niveau secondaire.
- ***Prévalence du handicap :*** Parmi la population de 5 ans et plus, 11 % éprouvaient quelques difficultés à fonctionner dans au moins un domaine. Quatre pour cent de la population avaient soit, beaucoup de difficultés à fonctionner dans au moins un domaine, ou ne parvenaient pas du tout à fonctionner dans un domaine.

Les caractéristiques socio-économiques de la population des ménages de l'EDSM-VII permettent d'interpréter les indicateurs démographiques et sanitaires et donnent une indication approximative de la représentativité de l'enquête. Ces informations fournissent également un aperçu des conditions de vie de la population.

Ce chapitre présente des informations sur les caractéristiques du logement des ménages et sur les biens qu'ils possèdent, l'utilisation de combustibles et d'équipements propres (pour la cuisson, le chauffage et l'éclairage), le niveau de bien-être économique du ménage, la composition de la population des ménages, l'état de survie des parents et la résidence des enfants avec les parents, l'enregistrement des naissances d'enfants de moins de 5 ans, le niveau d'instruction et la fréquentation scolaire.

2.1 CARACTÉRISTIQUES DU LOGEMENT

Le **Tableau 2.1** présente la répartition des ménages et de la population de droit selon certaines caractéristiques du logement telles que la disponibilité de l'électricité, les types de matériaux de revêtement du sol et le nombre de pièces utilisées pour dormir. Il présente également la répartition selon la fréquence à laquelle on fume dans le logement.

Dans l'ensemble du pays, 50 % des ménages ainsi que de la population disposent de l'électricité. On constate de grandes disparités entre milieux de résidence. En milieu rural, 37 % des ménages ont accès à l'électricité contre 86 % en milieu urbain. À Bamako, plus de neuf ménages sur dix (95 %) ont accès à l'électricité et, dans les autres villes, ce pourcentage est de 75 %.

Des questions ont été posées sur le type de revêtement du sol des logements qui, lorsqu'ils ne sont pas adéquats peuvent faciliter la propagation de certains germes responsables de maladies. On observe que dans l'ensemble, 67 % des ménages et 66 % de la population vivent dans un logement dont le sol est en matériaux de construction adéquats, c'est-à-dire en ciment (54 % des ménages ainsi que pour la

population) et en carrelage (13 % des ménages et 12 % de la population). La terre/sable/gravier demeure cependant un matériau courant puisque 25 % des ménages ainsi que de la population vivent dans un logement dont le sol est recouvert de ce matériau rudimentaire. Bien que le ciment soit le matériau dominant dans les tous les milieux, il est plus courant parmi les ménages du milieu urbain que ceux du milieu rural (63 % contre 50 %).

Dans 13 % des cas, les ménages disposent d'une pièce pour dormir, 29 % de deux pièces et 58 % d'au moins trois pièces. En milieu rural, 62 % des ménages disposent d'au moins trois pièces pour dormir contre 41 % à Bamako et 56 % dans les autres villes. Le fait de disposer d'un plus grand nombre de pièces pour dormir en milieu rural qu'en milieu urbain peut probablement s'expliquer par la taille plus élevée des ménages en milieu rural.

Les résultats présentés au **Tableau 2.1** indiquent également qu'on fume de façon quotidienne dans 19 % des ménages. Par contre, dans 69 % des ménages, on ne fume jamais. On constate que la pratique de fumer quotidiennement dans le ménage est plus courante en milieu urbain (24 %), en particulier à Bamako (27 %) qu'en milieu rural (17 %).

2.1.1 Utilisation de combustibles et d'équipements propres

Dépendance principale aux combustibles et aux équipements propres

Le pourcentage de la population utilisant des combustibles et des équipements propres pour la cuisine, le chauffage et l'éclairage, où chaque composante est définie comme suit :

Combustibles et équipements de cuisson propres

Incluant les fourneaux/cuisinières utilisant l'électricité, le GPL/gaz naturel/biogaz, l'énergie solaire et l'alcool/éthanol.

Combustibles et équipements de chauffage propres

Incluant le chauffage central, l'électricité, le GPL/gaz naturel/biogaz, les chauffages solaires et l'alcool/éthanol.

Combustibles et équipements d'éclairage propres

Incluant l'électricité, les lanternes solaires, les lampes de poche/torches/lanternes rechargeables, les lampes à biogaz.

Échantillon : Ménages et population de droit

2.1.2 Combustibles de cuisson

Au Mali, la quasi-totalité des ménages et population (respectivement 97 % et 99 %) utilisent, pour cuisiner, des combustibles solides, essentiellement le bois (respectivement 63 % et 71 %) et le charbon de bois (respectivement 32 % et 26 %) (**Tableau 2.2**). Seulement 1 % des ménages et moins de 1 % de la population utilisent des combustibles et des équipements propres pour faire la cuisine.

On remarque que cuisiner à l'intérieur du logement, c'est-à-dire la préparation des repas dans le logement est une pratique peu courante (4 % de l'ensemble des ménages). La cuisine se fait le plus fréquemment dans un bâtiment séparé du logement principal (53 %) ou à l'extérieur (41 %).

2.1.3 Combustibles de chauffage et éclairage

Le Mali, étant un pays au climat soudano-sahélien caractérisé par une chaleur persistante tout au long de l'année, les résultats concernant la technologie et le combustible utilisés pour se chauffer pourraient néanmoins se révéler utiles pendant la période de l'harmattan, lorsque les températures deviennent plus fraîches. Le **Tableau 2.3** indique que 18 % des ménages et 19 % de la population ont le chauffage dans leur logement. Les technologies de chauffage les plus utilisées sont les cuisinières commerciales (8 % des ménages) et traditionnelles (6 %) ainsi que le feu autour de trois pierres ou feu ouvert (3 %). En ce qui

concerne le type de combustible utilisé pour le chauffage, le charbon de bois demeure le plus utilisé (14 %) tandis que les combustibles et technologies propres le sont très peu (1 %). L'utilisation du charbon de bois pour le chauffage varie de manière importante, de 16 % en milieu rural à 11 % dans les autres villes du milieu urbain et à 3 % à Bamako.

Concernant l'éclairage, on constate qu'au Mali, pratiquement la totalité des ménages (98 %) et de la population (99 %) utilisent des combustibles et énergies propres pour s'éclairer, en majorité de l'électricité (45 % des ménages et 43 % de la population), des lanternes solaires (29 % des ménages et 33 % de la population) et des lampes de poche/torches/lanternes rechargeables (21 % des ménages et 20 % de la population). On ne note pas de disparité entre les milieux de résidence en ce qui concerne l'utilisation de combustibles et énergies propres pour l'éclairage. Cependant, on note que l'électricité est le principal moyen d'éclairage dans le milieu urbain contrairement au milieu rural (84 % contre 30 %).

2.1.4 Dépendance principale aux combustibles et aux équipements propres

Les résultats du **Tableau 2.4** indiquent que seulement 1 % de la population utilisent principalement des combustibles et des équipements propres pour la cuisine, le chauffage d'appoint et l'éclairage (**Graphique 2.1**). Ces combustibles et équipements propres sont très peu utilisés quel que soit le milieu de résidence (1 % en milieu rural contre 2 % en milieu urbain et 3 % à Bamako). Les résultats par région montrent que, ce pourcentage varie de 1 % à Ségou, Tombouctou et Gao à moins de 1 % dans les autres régions.

En outre, l'utilisation de combustibles et d'équipements propres est plus élevé dans le quintile de bien-être économique le plus élevé.

Graphique 2.1 **Dépendance principale aux combustibles et équipements propres**

Pourcentage de la population de droit dépendant de combustibles et d'équipements propres pour :



2.2 BIEN-ÊTRE ÉCONOMIQUE DES MÉNAGES

2.2.1 Biens durables des ménages

Au cours de l'enquête, les questions ont été posées concernant la possession de certains biens, de moyens de déplacement, de terres agricoles et d'animaux de ferme et elles ont permis d'évaluer le niveau socioéconomique des ménages. Les résultats sont présentés dans le **Tableau 2.5**.

La quasi-totalité des ménages (95 %) possèdent un téléphone portable. À l'opposé, le téléphone fixe, le réchaud et le groupe électrogène constituent des biens rares possédés par moins de 3 % des ménages. Les moyens de déplacement les plus courants sont la motocyclette/scooter (68 %) et la bicyclette (47 %) tandis que seulement 8 % des ménages possèdent une voiture/camionnette. En outre, 52 % des ménages possèdent des terres agricoles et 64 % des animaux de ferme. Ces deux dernières proportions demeurent plus élevées en milieu rural (respectivement 67 % et 76 %) comparativement au milieu urbain (respectivement 14 % et 33 %).

2.2.2 Indice de bien-être économique

Indice de bien-être économique

Les ménages se voient attribuer des scores basés sur le nombre et le type de biens de consommation qu'ils possèdent, allant du téléviseur à la bicyclette ou à la voiture, ainsi que sur les caractéristiques du logement telles que la source d'approvisionnement en eau potable, les installations sanitaires et le revêtement du sol. Ces indices sont tirés de l'analyse en composantes principales. Les quintiles de bien-être économiques au niveau national sont compilés en attribuant le score du ménage à chaque membre habituel (de droit) du ménage, en classant chaque membre de la population du ménage en fonction de son score, puis en divisant la distribution en cinq catégories égales, chacune comptant 20 % de la population.

Échantillon : Ménages

Le **Tableau 2.6** présente la répartition en pourcentage de la population de droit par quintile de bien-être économique selon le milieu et la région de résidence. Cette répartition met en évidence une forte disparité au sein de chaque milieu et région de résidence mais aussi entre milieux de résidence et régions de résidence.

Les résultats montrent que 91 % de la population urbaine appartient aux deux quintiles les plus riches contre 24 % de la population rurale. En milieu rural, plus de la moitié de la population (52 %) est classée dans les deux premiers quintiles contre seulement 3 % de la population urbaine (**Graphique 2.2**). Entre les régions, les écarts sont très importants : à Bamako, la quasi-totalité de la population est classée dans les deux quintiles les plus riches (98 %) alors que dans les autres régions, cette proportion est inférieure à 50 %.

Graphique 2.2 **Quintiles de bien-être économique des ménages, par résidence**

Répartition (en %) de la population de droit par quintile de bien-être économique



2.3 POPULATION ET COMPOSITION DES MÉNAGES

Ménage

Une personne ou un groupe de personnes apparentées ou pas qui vivent ensemble dans un même logement, qui reconnaissent un adulte, homme ou femme, à titre de chef de ménage, partageant les mêmes dispositions d'économie ménagère, et qui sont considérées comme étant une seule unité.

Population de fait

Toutes les personnes qui ont passé la nuit précédant l'enquête dans le ménage (qu'il s'agisse de résidents habituels ou de visiteurs).

Population de droit

Toutes les personnes qui sont des résidentes habituelles des ménages sélectionnés, qu'elles aient ou non passé la nuit précédant l'enquête dans le ménage.

Comment les données sont calculées

Tous les tableaux sont basés sur la population de fait, sauf indication contraire.

Les résultats présentés au **Tableau 2.7** montrent que parmi les 85 454 personnes des ménages enquêtés au cours de l'EDSM-VII, 40 975 sont des hommes et 44 479 sont des femmes, soit un rapport de masculinité de 92 hommes pour 100 femmes. Les hommes sont donc légèrement sous représentés dans la population par rapport aux femmes. En outre, la structure par grands groupes d'âges de la population met en évidence la jeunesse de la population malienne, la moitié de la population (50 %) étant âgée de moins de 15 ans. Les personnes de 65 ans et plus représentent seulement 4 % de la population. La pyramide des âges de la population (**Graphique 2.3**) présente une base élargie qui se rétrécit rapidement, caractéristique des populations à fécondité et à mortalité élevée. Un peu plus de la moitié de la population active (15–64 ans) vivent dans le milieu urbain (52 % contre 44 % en milieu rural).

***Graphique 2.3* Pyramide des âges**

Répartition (en %) de la population des ménages



Le **Tableau 2.8** présente la répartition des ménages selon le sexe du chef de ménage, selon le nombre de membres habituels du ménage, la taille moyenne du ménage et le pourcentage de ménage avec des enfants de moins de 18 ans qui sont orphelins ou ne vivant pas avec un parent biologique. Dans l'ensemble, la plupart des ménages sont dirigés par un homme (88 %). La part des ménages dirigés par une femme est de 12 % et demeure plus importante en milieu urbain (15 %) qu'en milieu rural (11 %). En outre, on constate que les ménages maliens sont de grande taille (8,9) Cette moyenne est plus élevée en milieu rural (9,4) qu'en milieu urbain (7,7).

Le **Tableau 2.8** présente également le pourcentage de ménages qui comptent des orphelins et des enfants de moins de 18 ans ne vivant pas avec un parent biologique. Il ressort que 38 % des ménages comptent des

orphelins et/ou des enfants ne vivant pas avec un parent biologique. On n'observe pas de différences selon le milieu de résidence (39 % en milieu urbain contre 38 % en milieu rural), mais ce pourcentage est un peu plus élevé dans les autres villes par rapport à Bamako (44 % contre 35 %).

Tendances : La taille moyenne des ménages a augmenté, passant de 5,6 en 1995–1996 à 8,9 personnes en 2023–2024. Le pourcentage de ménages comprenant des orphelins ou des enfants ne vivant pas avec un parent biologique a augmenté par rapport à 2018, passant de 25 % à 38 %.

2.4 ÉTAT DE SURVIE DES PARENTS ET RÉSIDENCE DES ENFANTS AVEC LES PARENTS

Orphelin
Un enfant dont l'un ou les deux parents sont décédés.
Échantillon : Enfants de moins de 18 ans

Il ressort du **Tableau 2.9** que, 71 % des enfants de moins de 18 ans vivent avec leurs deux parents. Cette proportion diminue au fur et à mesure que l'âge augmente (passant de 78–79 % % parmi les moins de 5 ans à 53 % dans le groupe d'âges de 15–17 ans). Ce pourcentage diffère peu selon le sexe de l'enfant (72 % contre 69 % chez les filles) et le milieu de résidence (71 % en milieu rural contre 68 % en milieu urbain).

`A l'opposé, 12 % des enfants de moins de 18 ans ne vivent avec aucun parent biologique et 6 % ont perdu un ou leurs deux parents. Le pourcentage d'enfants de moins de 18 ans dont l'un ou les deux parents sont décédés est légèrement plus faible en milieu rural (5 %) qu'en milieu urbain (7 %) (**Graphique 2.4**).

C'est dans la région de Gao que le pourcentage d'enfants ne vivant avec aucun parent biologique est le plus élevé (17 %) et à l'opposé, c'est dans la région de Sikasso qu'il est le plus faible (10 %).

Tendances : Le pourcentage d'enfants de moins de 18 ans vivant avec leur deux parents biologiques, est passé de 73 % en 2018 à 71 % en 2023–2024.

***Graphique 2.4* Orphelins par milieu de résidence**

Pourcentage d'enfants de moins de 18 ans dont l'un ou les deux parents sont décédés



2.5 ENREGISTREMENT DES NAISSANCES

Naissance enregistrée
L'enfant possède un certificat de naissance ou l'enfant n'en possède pas, mais la naissance a été enregistrée auprès des autorités civiles.
Échantillon : Enfants de moins de 5 ans population de droit

L'enregistrement de la naissance d'un enfant à l'état civil le rend légalement membre d'une famille et d'une nation, lui confère une nationalité ainsi que le droit d'être protégé par l'État quand la protection des parents fait défaut. Il lui permet de bénéficier des avantages sociaux de ses parents, comme l'assurance maladie, et de faire valoir ses droits à l'héritage. L'enregistrement des enfants à l'état civil constitue également une source fiable de statistiques sociodémographiques. Au cours de l'enquête, il a donc été demandé si la naissance des enfants de moins de 5 ans avait été déclarée à l'état civil. Les résultats sont présentés au **Tableau 2.10**.

Au Mali, 89 % des naissances d'enfants de moins de 5 ans ont été enregistrées à l'état civil et 78 % possèdent un acte de naissance. La possession d'un acte de naissance est nettement plus fréquente parmi les enfants de 1–4 ans que parmi les plus jeunes (80 % contre 67 %).

Selon le milieu de résidence, les résultats montrent que les enfants enregistrés à l'état civil et ceux possédant un acte de naissance sont proportionnellement moins nombreux en milieu rural (respectivement 75 % et 88 %) qu'en milieu urbain (respectivement 88 % et 96 %). Enfin ces deux proportions augmentent avec le quintile de bien-être économique (**Graphique 2.5**).

Graphique 2.5 Enregistrement des naissances par quintile de bien-être économique des ménages

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans (population de droit) dont la naissance a été enregistrée à l'état civil



Le pourcentage d'enfants dont la naissance a été enregistrée à l'état civil varie entre les régions, passant de 97 % dans le District de Bamako à 64 % dans la région de Gao (**Carte 2.1**).

Tendances : La comparaison de ces résultats avec ceux de l'enquête de 2018 mettent en évidence une tendance à l'amélioration de l'enregistrement de la naissance des enfants à l'état civil. Entre 2006 et 2023–2024, le pourcentage d'enfants dont la naissance a été enregistrée à l'état civil est passé de 53 % à 89 % et celui des enfants possédant un acte de naissance est passé de 53 % à 78 % au cours de la même période.

Carte 2.1 Enregistrement des naissances par région

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans (population de droit) dont la naissance a été enregistrée à l'état civil



Note : Pour des raisons d'insécurité, les données de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région et ne sont pas présentées séparément.

2.6 INSTRUCTION

2.6.1 Niveau d'instruction atteint

Niveau d'instruction médian

La moitié de la population a terminé moins que le nombre médian d'années de scolarité et la moitié de la population a terminé plus que le nombre médian d'années de scolarité.

Échantillon : Population de droit des ménages de 7 ans et plus

Le niveau d'instruction des membres du ménage est un élément important qui contribue à l'amélioration des conditions de vie du ménage car il peut affecter le comportement procréateur, l'utilisation de la contraception, le comportement en matière de santé, le niveau de scolarisation des enfants membres du ménage ainsi que les habitudes en matière d'hygiène et de nutrition.

Au Mali, l'enseignement fondamental est organisé en 2 cycles, le premier cycle d'une durée de 6 ans, et un second cycle de 3 ans. La fin des études du second cycle de l'enseignement fondamental est sanctionnée par le diplôme d'études fondamentales (DEF). Après le DEF, les élèves peuvent s'orienter vers l'enseignement secondaire général dans les lycées ou vers l'enseignement technique et professionnel qui durent 2 à 4 ans. L'enseignement supérieur regroupe toutes les études dont l'accès est conditionné par l'obtention du diplôme de fin d'études secondaires.

Dans le cadre de l'enquête ménage, pour chaque membre du ménage de 3 ans ou plus, on a collecté des informations sur le niveau d'instruction atteint ainsi que sur la dernière classe achevée. Trois niveaux d'instruction, à savoir, le primaire, le secondaire et le supérieur ont été retenus. Le niveau primaire correspond au 1er cycle de l'école fondamentale tandis que le niveau secondaire comprend le second cycle de l'école fondamentale, le secondaire général, les écoles techniques et professionnelles.

Les **Tableaux 2.11.1** et **2.11.2** présentent le niveau d'instruction des femmes et des hommes de 6 ans ou plus, selon certaines caractéristiques.

Les résultats sur la répartition en pourcentage selon le niveau d'instruction sont présentés dans le **Tableau 2.11.1** pour la population de fait féminine et au **Tableau 2.11.2** en ce qui concerne la population de fait masculine. Il en ressort globalement, que 43 % des hommes de 6 ans ou plus et une proportion plus élevée de femmes du même groupe d'âges (54 %) n'ont aucun niveau d'instruction. On note également que les proportions de femmes et d'hommes ayant terminé un cycle sont très faibles. Seulement 2 % des femmes et 3 % des hommes ont achevé le niveau primaire. Par ailleurs, 2 % des femmes et 4 % des hommes ont déclaré avoir atteint le niveau supérieur.

Tendances : Globalement, le niveau d'instruction de la population s'est amélioré au cours des 5 dernières années même si une petite baisse a été observée au niveau du cycle primaire. La proportion de personnes sans niveau d'instruction a diminué, passant chez les femmes de 61 % en 2018 à 54 % en 2023–2024 et, chez les hommes de 51 % à 43 %. Le pourcentage d'hommes et de femmes ayant complété le niveau primaire a légèrement diminué, passant respectivement de 4 % à 3 % et de 4 % à 2 %. La proportion de ceux ayant atteint le niveau supérieur a légèrement augmenté, passant de 1 % à 2 % chez les femmes, et de 3 % à 4 % chez les hommes.

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Des générations anciennes aux plus récentes, le pourcentage de femmes sans niveau d'instruction diminue de 92 % dans le groupe d'âges de 65 ans et plus à 33 % parmi celles de 10–14 ans. Parmi les hommes, ces pourcentages sont passé de 77 % dans le groupe d'âges 65 ans et plus à 30 % chez ceux de 10–14 ans.

- Les pourcentages de personnes sans niveau d'instruction sont près de deux fois plus élevés en milieu rural qu'en milieu urbain : respectivement 60 % contre 34 % chez les femmes et 50 % contre 22 % pour les hommes.
- Les résultats selon les régions montrent qu'à Mopti, Tombouctou et Gao, plus de la moitié des hommes n'ont aucun niveau d'instruction ; chez les femmes, on note un écart important entre Bamako où 31 % des femmes n'ont aucun niveau d'instruction et les autres régions où ce pourcentage s'échelonne de 57 % à Ségou à 65 % à Tombouctou.
- Du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, les pourcentages de femmes et d'hommes sans niveau d'instruction diminuent, passant respectivement de 73 % à 29 % et de 63 % à 16 %.

2.6.2 Fréquentation de l'école aux niveaux primaire et secondaire

Taux net de fréquentation scolaire (TNF)

Pourcentage de populations d'âge scolaire qui fréquente l'école primaire ou secondaire.

Échantillon : Enfants âgés de 7 à 12 ans pour le TNF de l'école primaire et enfants âgés de 13 à 18 ans pour le TNF de l'école secondaire.

Taux brut de fréquentation scolaire (TBF)

Nombre total d'enfants fréquentant l'école primaire divisé par la population d'âge officiel de fréquentation du niveau primaire et nombre total d'enfants fréquentant le niveau secondaire divisé par la population d'âge officiel de fréquentation du niveau secondaire.

Echantillon : Enfants âgés de 7 à 12 ans pour le TBF au niveau primaire et de 13 à 18 ans pour le TBF au niveau secondaire.

Au cours de l'EDSM-VII, des questions relatives à la fréquentation scolaire ont été posées pour toutes les personnes âgées de 3 à 24 ans. Ceci a permis de calculer les taux nets et bruts de scolarisation, par sexe et niveau d'instruction, selon le milieu et la région de résidence et le quintile de bien-être économique (**Tableau 2.12**). Dans l'ensemble, le taux net de fréquentation scolaire au niveau primaire est de 59 %, ce qui signifie qu'un peu plus d'un enfant de 7–12 ans sur deux (âge officiel de scolarisation au niveau primaire) fréquente l'école primaire. Le taux net de fréquentation scolaire pour le niveau secondaire est beaucoup plus faible, il s'établit à 32 % dans l'ensemble.

Indices de parité entre les genres (GPI)

Il s'agit du ratio du nombre d'élèves de sexe féminin et masculin fréquentant l'école primaire et celui du nombre d'élèves de sexe féminin et masculin fréquentant l'école secondaire. Ce ratio indique l'ampleur de la disparité entre les sexes.

Échantillon : Élèves de l'école primaire et de l'école secondaire

Le **Tableau 2.12** présente également l'indice de parité entre les genres qui est le rapport entre le taux de fréquentation scolaire des filles et celui des garçons. Cet indice est présenté pour le taux net et le taux brut de fréquentation scolaire et pour les niveaux primaire et secondaire. Plus l'indice de parité est proche de 1, moins l'écart de fréquentation scolaire entre les sexes est important. Un indice égal à 1 indique l'égalité totale.

Au niveau primaire, l'indice de parité entre les genres est de 0,95 pour le taux net de fréquentation scolaire, ce qui indique qu'à ce niveau, il y a 95 filles qui fréquentent l'école contre 100 garçons montrant que l'écart n'est pas très important. L'indice de parité au secondaire est plus faible (0,88), ce qui signifie que la

sous-scolarisation des filles par rapport à celle des garçons à ce niveau est plus prononcée qu'au niveau primaire.

Au niveau primaire, les inégalités entre les genres sont plus prononcées dans la région de Kayes (avec un indice de 0,87) et le district de Bamako (avec un indice de 0,86) que dans les autres régions dans lesquelles l'indice de parité entre les genres est de 0,94 ou plus.

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Les taux nets et bruts de fréquentation scolaire sont meilleurs en milieu urbain qu'en milieu rural. Au primaire, 73 % des enfants de 7–12 ans fréquentent effectivement une école primaire contre seulement 55 % en milieu rural. Au niveau secondaire, ces proportions sont respectivement de 50 % et de 25 %. Quel que soit le niveau, l'indice de parité est meilleur en milieu rural qu'en milieu urbain.
- Selon les régions, on note que c'est à Tombouctou que le taux net de fréquentation scolaire au primaire est le plus faible (41 %) et pour le niveau secondaire, c'est à Gao qu'il est le plus faible (18 %). À l'opposé, le District de Bamako enregistre les taux de scolarisation les plus élevés, que ce soit au primaire ou au secondaire respectivement 75 % et 50 %.
- Globalement, les taux nets de fréquentation scolaire au niveau secondaire augmentent avec le quintile de bien-être économique, passant, parmi les filles, de 16 % dans le plus bas à 42 % dans le plus élevé et, parmi les garçons, de respectivement 14 % à 65 % (**Graphique 2.6**).

Graphique 2.6 **Fréquentation scolaire au niveau secondaire par quintile de bien-être économique des ménages**

Taux net de fréquentation scolaire (TNF) dans le secondaire parmi les enfants de 13 à 18 ans



2.6.3 Taux de participation à l'apprentissage organisé pour les enfants âgés de 6 ans

Taux de participation à l'apprentissage guidé—taux de fréquentation net ajusté (NAR)

Pourcentage d'enfants ayant un an de moins que l'âge de scolarité obligatoire au niveau primaire (en début d'année scolaire) qui fréquentent un programme d'éducation pour la petite enfance ou qui fréquentent l'école primaire. Le ratio est nommé « ajusté » car il inclut les enfants scolarisés dans le primaire.

Echantillon : Enfants âgés de 6 ans en début d'année scolaire

Le **Tableau 2.13** présente le taux de participation à l'apprentissage organisé des enfants âgés de 6 ans en début d'année scolaire par la fréquentation d'un programme d'éducation préscolaire ou d'une école primaire et le taux net de fréquentation scolaire ajusté (TNF), selon certaines caractéristiques sociodémographiques. Cet indicateur permet de mesurer le niveau d'accès à l'éducation préscolaire et celui de la scolarisation précoce au niveau primaire.

Seulement 2 % des enfants âgés de 6 ans en début d'année scolaire fréquentent un programme d'éducation préscolaire. Ce faible pourcentage traduit probablement une insuffisance de l'offre au niveau préscolaire et/ou des difficultés d'accès de la part de la majorité de la population pour des raisons économiques.

Dans l'ensemble, 45 % des enfants de 6 ans fréquentent l'école primaire, 53 % ne fréquentent, ni un programme d'éducation préscolaire, ni l'école primaire. Le TNF ajusté s'établit à 47 %.

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- La fréquentation d'un programme d'éducation préscolaire est plus courante en milieu urbain que rural (5 % contre 1 %).
- En considérant la répartition selon les régions excepté Bamako (5 %), c'est à Kayes, Koulikoro, Mopti et Gao que le pourcentage d'enfants qui fréquentent un programme d'éducation préscolaire est le plus élevé (2 %) alors que dans les autres régions, ce pourcentage varie de 0 à 1 %.
- Du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, le pourcentage d'enfants qui atteignent 6 ans et qui sont préscolarisés augmente, passant de moins d'un pour cent à 4 %. Il en est de même en ce qui concerne le pourcentage d'enfants de 6 ans fréquentant l'école primaire qui augmente de manière importante, passant de 22 % à 86 %.

2.7 HANDICAP

L'EDSM-VII a inclus le module Handicap du DHS Program, qui comprend une série de questions élaborées par le Groupe de Washington sur les statistiques du Handicap (WG), qui utilisent comme cadre conceptuel la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) de l'Organisation mondiale de la santé. Les questions concernent six domaines de fonctionnement de base : la vue, l'audition, la communication, la cognition, la mobilité, et s'occuper de soi-même et elles fournissent les informations de base nécessaires sur le handicap, comparables à celles qui seront collectées dans le monde via les instruments de collecte du WG Disability.

2.7.1 Handicap par domaine et âge

Les informations sur les capacités de fonctionnement des membres des ménages ont été fournies par l'informateur qui a répondu au questionnaire Ménage à propos de tous les membres du ménage et des visiteurs ; au cours de l'enquête auprès des ménages, on a demandé à l'informateur si, dans le ménage, une personne n'avait aucune difficulté, quelques difficultés, beaucoup de difficultés ou était dans l'incapacité de réaliser certaines actions. Les résultats, basés sur plus de 69 329 personnes, sont présentés au **Tableau 2.14** pour la population de fait de 5 ans et plus.

Domaines de fonctionnement de base :
Voir, entendre, communiquer, se rappeler/se concentrer, marcher/monter des marches et se laver ou s'habiller.
Échantillon : population de fait de 5 ans et plus

Dans l'ensemble, selon les déclarations, 11 % de la population de 5 ans et plus, éprouvaient quelques difficulté à fonctionner dans au moins un domaine. Par ailleurs, 4 % de la population avaient soit, beaucoup de difficultés à fonctionner dans au moins un domaine, ou ne parvenaient pas du tout à fonctionner dans un domaine.

2.7.2 Handicap parmi les adultes selon d'autres caractéristiques sociodémographiques

Domaines de fonctionnement de base :
Voir, entendre, communiquer, se rappeler/se concentrer, marcher/monter des marches et prendre soins de soi/se laver ou s'habiller.
Échantillon : population de fait de 5 ans et plus

Les **Tableaux 2.15.1** et **2.15.2** présentent les résultats sur le handicap dans la population de fait des ménages pour les femmes et les hommes de 15 ans et plus selon d'autres caractéristiques sociodémographiques.

Environ huit personnes sur dix (80 % des femmes et 81 % des hommes) n'ont aucune difficulté dans les domaines fonctionnels évalués. Que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, c'est le handicap à cause d'une déficience visuelle qui est le plus fréquent (respectivement 11 % et 12 %) suivi de problèmes moteurs qui limitent la marche et empêchent la montée des escaliers (respectivement 9 % et 8 %).

Répartition selon certaines caractéristiques sociodémographiques

- Selon l'état matrimonial, on constate que 24 % des veuves ont beaucoup de difficultés ou ne peuvent pas fonctionner correctement dans au moins un type de handicap et 9 % ont beaucoup de difficultés ou ne peuvent pas fonctionner correctement dans plus d'un domaine.
- Le pourcentage de personnes handicapées chez les femmes diminue avec l'augmentation du niveau d'instruction. Parmi celles n'ayant aucun niveau d'instruction, 7 % ont beaucoup de difficultés ou ne peuvent pas fonctionner correctement dans au moins un domaine contre 2 % parmi celles ayant le niveau secondaire ou plus.
- Les résultats selon l'état matrimonial chez les hommes montrent aussi que 26 % des veufs ont beaucoup de difficultés ou ne peuvent pas fonctionner correctement dans au moins un domaine et 14 % ont beaucoup de difficultés ou ne peuvent pas fonctionner correctement dans plus d'un domaine.
- Comme chez les femmes, le pourcentage d'hommes handicapés diminue avec le niveau d'instruction. Parmi ceux n'ayant aucun niveau d'instruction, 8 % ont beaucoup de difficultés ou ne peuvent pas fonctionner correctement dans au moins un domaine contre 2 % parmi ceux ayant le niveau secondaire ou plus.

2.8 TRANSFERTS SOCIAUX

Transferts sociaux

Les transferts sociaux (protection sociale) couvrent l'ensemble des politiques et programmes nécessaires pour réduire les conséquences de la pauvreté et de l'exclusion tout au long de la vie.

Les systèmes de protection sociale aident les individus et les familles, en particulier les pauvres et les vulnérables, à faire face aux crises et aux chocs, à trouver un emploi, à améliorer la productivité, à investir dans la santé et l'éducation de leurs enfants et à protéger la population vieillissante. Au Mali, les instruments actuels de protection sociale sont, entre autres, les transferts d'argent liquide, l'aide économiques aux frais de scolarité et fournitures scolaires et autres.

Échantillon : ménages

Au cours de l'enquête, on a demandé aux femmes et aux hommes s'ils connaissaient des programmes d'aide économique extérieure dont peuvent bénéficier les ménages et s'ils avaient reçu une aide grâce à un de ces programmes. On a aussi posé des questions pour savoir si le ménage ou un membre du ménage a reçu une aide économique pour les frais de scolarité et à l'achat des matériels scolaire pour les enfants de 3–24 ans qui fréquentent actuellement l'école. Les résultats sont présentés aux **Tableaux 2.16** et **2.17**.

Les résultats du **Tableau 2.16** montre que dans l'ensemble du pays, 13 % des ménages ont déjà reçu une aide économique extérieure et 5 % avaient reçu l'aide au cours des 12 derniers mois. Six pour cent des ménages ont déclaré avoir reçu une aide grâce au programme gouvernemental d'urgence Jigisèmèjiri et 9 % ont déclaré avoir reçu une aide grâce à un autre programme d'aide économique extérieure.

On note également que dans l'ensemble, la grande majorité des enfants de 3–24 ans qui fréquentent actuellement l'école n'ont bénéficié ni d'un soutien pour des frais de scolarité, ni pour l'achat de matériel scolaire (83 %) (**Tableau 2.17**). Seulement 17 % des enfants de 3–24 ans ont reçu un soutien pour s'acquitter des frais de scolarité ou pour l'achets de matériel scolaire. Le pourcentage d'enfants âgés de 3–24 ans ayant bénéficié d'un soutien pour l'achat de matériel scolaire s'élève à 15 % et ceux ayant bénéficié d'un soutien aux frais de scolarité seulement est de 7 %.

Pour 60 % des enfants de 3–24 ans qui fréquentent actuellement l'école, ce soutien scolaire était suffisant. Concernant la source du soutien scolaire, on constate que dans la majorité des cas (67 %) ce sont les parents, les proches ou les amis qui ont fourni l'aide pour s'acquitter des frais scolaires ; dans 24 % des cas, c'est l'État/public qui a fourni l'assistance et pour 11 % des enfants ce sont des organisations confessionnelles ou non confessionnelles (**Tableau 2.17**).

Répartition selon certaines caractéristiques sociodémographiques

- Selon le milieu de résidence, on note que le pourcentage de ménages ayant reçu une aide économique extérieure est plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain (16 % contre 6 %). Le même résultat a été observé pour les ménages ayant reçu une aide grâce au programme gouvernemental d'urgence Jigisèmèjiri (7 % contre 3 %) (**Tableau 2.16**).
- On note également, qu'un ménage sur quatre (25 %) dans la région de Mopti a déclaré avoir reçu une aide économique extérieure contre 5 % dans le District de Bamako.
- Le pourcentage d'enfants ayant bénéficié de soutien pour des frais de scolarité ou pour l'achat du matériel scolaire durant l'année scolaire 2023–2024 a tendance à augmenter avec l'âge, de 15 % dans le groupe d'âges 3–9 ans à 25 % dans le groupe 20–24 ans) (**Tableau 2.17**).
- Le pourcentage d'enfants de 3–24 ans qui fréquentent actuellement l'école et qui ont reçu un appui pour des frais scolaire ou pour des fournitures scolaires est plus élevé parmi ceux qui sont dans une école Étatique/Publique (20 %) que dans les autres types d'école (15 % dans le privé et 11 % dans les écoles communautaires).
- Les résultats par région montrent que les enfants de 3–24 ans ayant bénéficié d'un soutien pour des frais scolaires, ou pour l'achat de fournitures scolaires est plus élevé dans les régions de Gao (39 %), Kayes et de Mopti (25 %) contre seulement 10 % à Sikasso (**Tableau 2.17**).

LISTE DES TABLEAUX

Pour des informations plus détaillées sur le handicap, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 2.1 Caractéristiques du ménage : Logement**
- **Tableau 2.2 Caractéristiques du ménage : Cuisine**
- **Tableau 2.3 Caractéristiques du ménage : Chauffage et éclairage**
- **Tableau 2.4 Dépendance principale à l'égard des combustibles et technologies propres**
- **Tableau 2.5 Biens possédés par le ménage**
- **Tableau 2.6 Quintiles de bien-être économique**
- **Tableau 2.7 Population des ménages par âge, sexe et milieu de résidence**
- **Tableau 2.8 Composition des ménages**
- **Tableau 2.9 Enfants orphelins et résidence des enfants avec les parents**
- **Tableau 2.10 Enregistrement à l'état civil des naissances d'enfants de moins de 5 ans**
- **Tableau 2.11.1 Niveau d'instruction de la population des ménages : Femme**
- **Tableau 2.11.2 Niveau d'instruction de la population des ménages : Homme**
- **Tableau 2.12 Taux de fréquentation scolaire**
- **Tableau 2.13 Taux de participation dans des activités d'apprentissage organisées**
- **Tableau 2.14 Handicap par degré de difficulté selon le type de handicap et selon l'âge**
- **Tableau 2.15.1 Handicap parmi les adultes selon certaines caractéristiques sociodémographiques : Femme**
- **Tableau 2.15.2 Handicap parmi les adultes selon certaines caractéristiques sociodémographiques : Homme**
- **Tableau 2.16 Aide économique extérieure aux ménages**
- **Tableau 2.17 Aide économique aux frais de scolarité et fournitures scolaires**

Tableau 2.1 Caractéristiques du ménage: Logement

Répartition (en %) des ménages et de la population de droit par certaines caractéristiques du logement, et répartition (en %) des ménages par fréquence à laquelle on fume dans le logement, selon le milieu de résidence, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Ménages					Population				
Caractéristique	Bamako	Autre urbain	Ensemble urbain	Rural	Ensemble	Bamako	Autre urbain	Ensemble urbain	Rural	Ensemble
Électricité										
Oui	95,3	74,5	86,2	36,5	50,3	96,5	76,0	87,3	37,7	49,5
Non	4,7	25,5	13,8	63,5	49,7	3,5	24,0	12,7	62,3	50,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Matériau de revêtement du sol										
Terre/sable/gravier	0,5	11,2	5,2	33,0	25,3	0,4	10,6	5,0	31,4	25,1
Bouse	0,1	2,0	0,9	9,3	7,0	0,1	1,9	0,9	10,5	8,2
Planche en bois	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
Palme/bambou	0,0	0,3	0,1	1,0	0,8	0,0	0,3	0,1	0,8	0,6
Carrelage	39,4	18,8	30,4	6,1	12,9	41,0	20,2	31,6	6,0	12,0
Ciment	59,4	67,4	62,9	50,0	53,6	57,9	66,7	61,9	51,0	53,6
Moquette	0,6	0,4	0,5	0,2	0,3	0,6	0,3	0,4	0,1	0,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Pièces utilisées pour dormir										
Une	24,9	11,6	19,1	10,6	12,9	10,6	5,3	8,2	4,4	5,3
Deux	34,6	32,2	33,5	27,0	28,8	25,4	21,9	23,9	16,0	17,9
Trois ou plus	40,5	56,2	47,4	62,4	58,2	63,9	72,8	67,9	79,6	76,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fréquence à laquelle on fume dans le logement										
Tous les jours	26,7	21,3	24,4	17,4	19,3	31,2	24,7	28,3	20,7	22,5
Une fois par semaine	4,6	5,2	4,8	4,7	4,7	3,7	5,3	4,4	5,0	4,8
Une fois par mois	2,2	2,9	2,5	3,4	3,2	2,4	2,5	2,4	3,6	3,3
Moins d'une fois par mois	3,1	5,0	3,9	4,3	4,2	3,5	4,7	4,1	4,3	4,3
Jamais	63,4	65,6	64,4	70,2	68,6	59,1	62,8	60,8	66,3	65,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de ménages/ population	1 509	1 171	2 680	6 987	9 667	11 261	9 246	20 507	65 843	86 350

Tableau 2.2 Caractéristiques du ménage : Cuisine

Répartition (en %) des ménages et de la population de droit par endroit où se fait la cuisine, par équipement de cuisine, et combustible utilisé pour cuisiner, selon le milieu de résidence, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Ménages					Population				
Caractéristique	Bamako	Autre urbain	Ensemble urbain	Rural	Ensemble	Bamako	Autre urbain	Ensemble urbain	Rural	Ensemble
Endroit pour cuisiner										
Dans le logement	**4,6**	**7,3**	**5,8**	**3,2**	**3,9**	**3,0**	**6,8**	**4,7**	**2,6**	**3,1**
Pièce/cuisine séparée	2,2	4,1	3,1	1,1	1,7	2,1	4,1	3,0	1,1	1,6
Pas de pièce/cuisine séparée	2,4	3,2	2,7	2,0	2,2	0,9	2,7	1,8	1,5	1,5
Dans un bâtiment séparé	22,6	46,2	32,9	60,6	52,9	33,4	55,7	43,5	67,7	61,9
À l'extérieur	67,4	44,5	57,4	34,3	40,7	62,1	37,0	50,8	29,0	34,2
Pas de repas préparé dans le ménage	5,4	1,9	3,9	2,0	2,5	1,4	0,4	1,0	0,7	0,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Équipement principal pour cuisiner										
Combustibles et équipements propres	3,6	1,0	2,5	0,3	0,9	1,4	0,6	1,0	0,1	0,3
Cuisinière électrique	0,5	0,2	0,4	0,0	0,1	0,5	0,1	0,3	0,0	0,1
Four solaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuisinière GPL/gaz naturel	1,2	0,4	0,8	0,1	0,3	0,5	0,1	0,4	0,0	0,1
Cuisinière au gaz naturel canalisé	1,9	0,1	1,1	0,1	0,3	0,4	0,2	0,3	0,0	0,1
Cuisinière au Biogaz	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0
Autres combustibles et équipements	91,0	97,0	93,7	97,7	96,6	97,2	99,0	98,0	99,2	98,9
Réchaud à combustible liquide n'utilisant pas d'alcool/éthanol	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuisinière à combustible solide vendue dans le commerce	54,6	36,7	46,8	12,6	22,1	57,1	33,3	46,4	10,6	19,1
Avec une cheminée	6,2	7,6	6,8	2,5	3,7	7,0	7,1	7,0	2,2	3,4
Sans cheminée	48,4	29,1	40,0	10,1	18,4	50,1	26,2	39,3	8,3	15,7
Cuisinière traditionnelle à combustible solide	30,8	19,7	25,9	12,9	16,5	30,2	16,4	24,0	11,6	14,5
Avec une cheminée	0,8	2,6	1,6	1,6	1,6	0,9	2,1	1,5	1,1	1,2
Sans cheminée	30,0	17,0	24,3	11,3	14,9	29,3	14,3	22,5	10,5	13,3
Feu autour de trois pierres/feu ouvert	5,6	40,7	21,0	72,2	58,0	9,9	49,4	27,7	77,0	65,3
Pas de repas préparé dans le ménage	5,4	1,9	3,9	2,0	2,5	1,4	0,4	1,0	0,7	0,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Combustible pour cuisiner										
Combustibles et équipements propres[1]	3,6	1,0	2,5	0,3	0,9	1,4	0,6	1,0	0,1	0,3
Combustibles solides pour cuisiner	91,0	97,0	93,6	97,7	96,6	97,2	99,0	98,0	99,2	98,9
Charbon/lignite	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Charbon de bois	77,7	49,6	65,4	18,8	31,7	75,2	43,3	60,9	15,5	26,3
Bois	13,1	47,2	28,0	75,9	62,6	21,9	55,5	37,0	80,9	70,5
Paille/branchages/herbes	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Résidus agricoles	0,0	0,0	0,0	1,9	1,3	0,0	0,0	0,0	1,8	1,3
Bouse d'animal/déchets	0,0	0,1	0,0	0,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6
Combustibles biomasse transformés (pellets) ou granulés de bois	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres combustibles	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autre	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pas de repas préparé dans le ménage	5,4	1,9	3,9	2,0	2,5	1,4	0,4	1,0	0,7	0,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de ménages/population	1 509	1 171	2 680	6 987	9 667	11 261	9 246	20 507	65 843	86 350

GPL = Gaz propane liquéfié
[1] Comprend les cuisinières/réchauds utilisant l'électricité, le GPL/gaz naturel/biogaz, énergie solaire et alcool/éthanol

Tableau 2.3 Caractéristiques du ménage : Chauffage et éclairage

Répartition (en %) des ménages et de la population de droit par technologie de chauffage, combustible pour le chauffage et principal combustible ou technologie pour l'éclairage, selon le milieu de résidence, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Ménages					Population				
Caractéristique	Bamako	Autre urbain	Ensemble urbain	Rural	Ensemble	Bamako	Autre urbain	Ensemble urbain	Rural	Ensemble
Technologie de chauffage										
Chauffage central	0,1	0,0	0,0	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,4	0,3
Chauffage d'appoint commercial	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1
Avec une cheminée	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sans cheminée	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0
Chauffage d'appoint traditionnel	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1	0,3	0,3
Avec une cheminée	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Sans cheminée	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2
Cuisinière commerciale	1,4	5,9	3,4	10,1	8,2	1,1	5,9	3,2	10,3	8,7
Avec une cheminée	0,7	2,2	1,4	2,9	2,5	0,6	2,4	1,5	2,5	2,2
Sans cheminée	0,6	3,7	2,0	7,2	5,8	0,4	3,4	1,8	7,8	6,4
Cuisinière traditionnelle	2,0	7,5	4,4	6,7	6,1	2,5	6,3	4,2	7,0	6,3
Avec une cheminée	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	2,2	1,3	1,8	1,6	1,6
Sans cheminée	0,5	6,1	3,0	5,3	4,7	0,4	5,0	2,5	5,4	4,7
Feu autour de trois pierres/Feu ouvert	0,1	2,9	1,3	3,8	3,1	0,1	4,7	2,2	3,9	3,5
Autre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pas de chauffage dans le ménage	96,3	83,5	90,7	78,7	82,0	96,0	82,9	90,1	78,0	80,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Combustible pour le chauffage										
Combustibles et technologies propres[1]	0,5	1,7	1,0	1,0	1,0	0,6	2,2	1,3	1,3	1,3
Chauffage central	0,1	0,0	0,0	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,4	0,3
Électricité	0,4	1,7	1,0	0,5	0,6	0,5	2,2	1,3	0,8	0,9
Chauffe-air solaire	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
Charbon/lignite	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
Charbon de bois	3,1	11,3	6,6	16,4	13,7	3,3	9,7	6,2	16,4	13,9
Bois	0,1	3,5	1,6	3,7	3,1	0,1	5,2	2,4	4,2	3,7
Résidus agricoles	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Déjections animales/bouse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Déchets/plastique	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pas de chauffage dans le ménage	96,3	83,5	90,7	78,7	82,0	96,0	82,9	90,1	78,0	80,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Principal combustible ou technologie pour l'éclairage										
Combustibles et énergies propres	98,5	98,7	98,6	98,1	98,2	98,4	98,9	98,6	98,6	98,6
Électricité	94,0	70,9	83,9	29,5	44,6	95,0	72,0	84,6	29,9	42,9
Lanterne solaire	1,1	16,0	7,6	37,2	29,0	0,9	16,7	8,0	41,3	33,4
Lampe de poche/torche/lanterne rechargeable	2,5	9,5	5,5	27,5	21,4	1,9	8,0	4,6	24,4	19,7
Lampe de poche/torche/lanterne à pile	0,9	2,4	1,5	3,9	3,2	0,6	2,2	1,3	3,0	2,6
Lampe à essence/groupe électrogène	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Charbon de bois	1,3	0,7	1,0	0,7	0,8	1,2	0,7	1,0	0,5	0,6
Bois	0,1	0,3	0,2	0,7	0,6	0,3	0,3	0,3	0,5	0,4
Excréments d'animaux/bouse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lampe à huile	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Pas d'éclairage dans le ménage	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de ménages/population	1 509	1 171	2 680	6 987	9 667	11 261	9 246	20 507	65 843	86 350

GPL = Gaz Propane Liquéfié

[1] Comprend le chauffage central, l'électricité, le GPL/gaz naturel/biogaz, chauffage à air soufflant solaire et alcool/éthanol

Tableau 2.4 Dépendance principale à l'égard des combustibles et technologies propres

Pourcentage de la population de droit dépendant de combustibles et de technologies propres pour la cuisine, pourcentage dépendant de combustibles solides pour la cuisine, pourcentage dépendant de combustibles et de technologies propres pour le chauffage d'appoint, pourcentage dépendant de combustibles et de technologies propres pour l'éclairage, pourcentage dépendant de combustibles et de technologies propres pour la cuisine, le chauffage d'appoint et l'éclairage, selon certaines caractéristiques socio-économiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Dépendance principale à l'égard de combustibles et d'équipements propres pour cuisiner[1]	Dépendance principale à l'égard de combustibles solides pour la cuisine[2]	Nombre de personnes dans les ménages ayant déclaré cuisiner	Dépendance principale à l'égard de combustibles et de technologies propres pour le chauffage d'appoint[3]	Nombre de personnes dans les ménages ayant déclaré utiliser un chauffage d'appoint	Dépendance principale à l'égard de combustibles et de technologies propres pour l'éclairage[4]	Nombre de personnes dans les ménages ayant déclaré utiliser de l'éclairage	Dépendance principale à l'égard de combustibles et de technologies propres pour la cuisine, le chauffage d'appoint et l'éclairage[5]	Effectif de personnes
Résidence									
Bamako	1,4	98,6	11 101	14,6	446	98,4	11 252	2,6	11 261
Autre urbain	0,6	99,4	9 206	12,7	1 578	99,0	9 242	0,7	9 246
Ensemble urbain	1,0	99,0	20 306	13,1	2 024	98,7	20 494	1,7	20 507
Rural	0,1	99,9	65 389	6,0	14 498	98,8	65 736	0,6	65 843
Région									
Kayes	0,1	99,9	12 646	21,9	2 886	98,9	12 717	0,5	12 728
Koulikoro	0,2	99,8	20 091	3,4	7 597	98,9	20 142	0,4	20 164
Sikasso	0,1	99,9	16 227	8,6	1 650	100,0	16 286	0,2	16 286
Ségou	0,2	99,7	13 473	1,3	2 193	99,8	13 687	1,4	13 691
Mopti	0,2	99,8	8 029	0,7	1 408	99,5	8 042	0,2	8 044
Tombouctou	0,3	99,7	1 551	4,2	65	99,1	1 553	0,8	1 561
Gao	0,7	99,3	2 548	1,6	275	82,5	2 520	1,0	2 586
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	†	30
Bamako	1,4	98,6	11 101	14,6	446	98,4	11 252	2,6	11 261
Quintile de bien-être économique									
Le plus bas	0,0	100,0	17 278	2,6	3 040	99,5	17 266	0,0	17 282
Second	0,1	99,9	17 102	4,8	3 869	99,3	17 260	0,7	17 276
Moyen	0,1	99,9	17 117	8,0	4 041	98,5	17 211	0,6	17 254
Quatrième	0,3	99,7	17 100	6,9	3 214	97,7	17 227	0,8	17 272
Le plus élevé	1,2	98,8	17 099	14,2	2 358	98,9	17 266	2,1	17 266
Ensemble	0,3	99,7	85 696	6,9	16 522	98,8	86 230	0,8	86 350

[1] Comprend les cuisinières/cuiseurs utilisant l'électricité, GPL/gaz naturel/biogaz, énergie solaire et alcool/éthanol
[2] Comprend le charbon/lignite, charbon de bois, bois, paille/branchages/herbes, résidus agricoles et bouse/déjections animales, biomasse transformée (granulés de bois) ou copeaux de bois, déchets/plastique et sciure
[3] Comprend le chauffage central, l'électricité, le GPL/gaz naturel/biogaz, chauffe-air solaire et alcool/éthanol
[4] Comprend l'électricité, lanterne solaire, lampe de poche/torche/lanterne à piles, lampe de poche/torche/lanterne rechargeable et lampe biogaz
[5] Pour pouvoir calculer l'indicateur ODD 7.1.2, les personnes vivant dans les ménages ayant déclaré pas de cuisine, pas de chauffage d'appoint ou pas d'éclairage sont incluses dans le numérateur.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 2.5 Biens possédés par le ménage

Pourcentage de ménages possédant certains équipements, des moyens de transport, de la terre agricole et du bétail/animaux de ferme par milieu de résidence, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Résidence				
Possession	Bamako	Autre urbain	Ensemble urbain	Rural	Ensemble
Biens possédés par le ménage					
Radio	59,6	70,6	64,4	66,7	66,0
Télévision	75,2	70,7	73,2	44,8	52,7
Téléphone portable	97,7	96,4	97,1	94,0	94,9
Téléphone fixe	3,9	2,8	3,4	1,0	1,7
Ordinateur	23,0	14,5	19,3	5,2	9,1
Réfrigérateur	39,7	26,4	33,9	9,2	16,1
Montre	54,6	52,8	53,8	33,8	39,3
Chaise en matériaux traditionnels	56,3	63,7	59,5	73,3	69,5
Armoire/Bibliothèque	64,7	40,9	54,3	18,7	28,6
Réchaud	5,6	4,9	5,3	1,4	2,5
Cuisinière, à gaz ou électrique	25,7	12,2	19,8	3,7	8,2
Foyer amélioré	8,8	18,4	13,0	9,6	10,6
Climatiseur	13,2	7,5	10,7	2,0	4,4
Modem/clé internet	11,2	7,4	9,6	3,0	4,8
Panneau solaire	7,3	24,1	14,6	55,8	44,4
Groupe électrogène	4,3	2,0	3,3	1,6	2,1
Moyens de transport					
Bicyclette	23,0	39,0	30,0	53,3	46,8
Charette tirée par un animal	1,4	10,9	5,5	49,1	37,0
Motocyclette/scooter	75,7	74,3	75,1	65,6	68,2
Voiture/camionnette	18,3	11,8	15,5	5,3	8,1
Bateau à moteur ou pinasse	0,5	0,8	0,6	1,1	0,9
Charrue	1,5	8,3	4,5	44,7	33,5
Pirogue	0,5	0,9	0,7	2,5	2,0
Tracteur	0,6	1,1	0,8	1,6	1,4
Motoculteur/tracteur	1,2	1,2	1,2	1,7	1,6
Semoir motorisé	1,0	2,7	1,7	7,2	5,6
Moto tricycle	1,5	5,3	3,2	7,1	6,0
Possession de terres agricoles	8,2	21,4	14,0	67,0	52,3
Possession d'animaux de ferme[1]	19,6	49,2	32,5	75,6	63,7
Effectif de ménages	1 509	1 171	2 680	6 987	9 667

[1] Vaches, taureaux, autre bovin, chevaux, ânes, mules, chèvres, moutons, cochons, chameaux, dromadaires, poulets ou autre volaille

Tableau 2.6 Quintiles de bien-être économique

Répartition (en %) de la population de droit par quintile de bien-être économique et coefficient de Gini, selon le milieu de résidence et la région, EDSM-VII Mali 2023–2024

Résidence/région	Quintile de bien-être économique					Total	Effectif de personnes	Coefficient de Gini[1]
	Le plus bas	Second	Moyen	Quatrième	Le plus élevé			
Résidence								
Bamako	0,0	0,1	1,5	23,3	75,0	100,0	11 261	0,09
Autre urbain	1,3	4,3	12,6	38,1	43,6	100,0	9 246	0,22
Ensemble urbain	0,6	2,0	6,6	30,0	60,9	100,0	20 507	0,14
Rural	26,1	25,6	24,2	16,9	7,3	100,0	65 843	0,43
Région								
Kayes	17,2	31,3	25,5	19,1	6,8	100,0	12 728	0,42
Koulikoro	20,6	17,9	16,1	24,3	21,1	100,0	20 164	0,47
Sikasso	31,9	22,3	20,1	15,6	10,0	100,0	16 286	0,48
Ségou	24,6	26,9	25,0	16,3	7,1	100,0	13 691	0,41
Mopti	28,9	24,5	23,1	14,6	8,8	100,0	8 044	0,49
Tombouctou	1,5	15,2	50,4	22,6	10,3	100,0	1 561	0,32
Gao	0,3	5,6	47,6	37,8	8,7	100,0	2 586	0,28
Kidal	†	†	†	†	†	†	30	†
Bamako	0,0	0,1	1,5	23,3	75,0	100,0	11 261	0,09
Ensemble	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0	86 350	0,44

[1] Le coefficient de Gini mesure le niveau de concentration de la richesse, 0 représentant une distribution égale de la richesse et 1 signifiant une distribution totalement inégalitaire.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 2.7 Population des ménages par âge, sexe et milieu de résidence

Répartition (en %) de la population de fait des ménages par différents groupes d'âges et pourcentage de la population de fait des ménages de 10–19 ans, selon le sexe et le milieu de résidence, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Bamako			Autre urbain			Ensemble urbain			Rural			Ensemble		
Âge	Masculin	Féminin	Ensemble	Masculin	Féminin	Ensemble	Masculin	Féminin	Ensemble	Masculin	Féminin	Ensemble	Masculin	Féminin	Ensemble
<5	17,2	15,6	16,4	17,5	16,8	17,1	17,3	16,2	16,7	20,6	18,6	19,5	19,8	18,0	18,9
5–9	14,1	13,2	13,6	16,8	13,7	15,2	15,3	13,5	14,3	19,2	16,9	18,0	18,3	16,1	17,1
10–14	12,4	13,7	13,1	13,7	15,1	14,5	13,0	14,4	13,7	15,7	13,5	14,6	15,1	13,7	14,4
15–19	9,7	13,4	11,6	10,5	12,2	11,4	10,0	12,9	11,5	8,8	8,2	8,5	9,1	9,3	9,2
20–24	10,4	10,2	10,3	8,5	9,6	9,1	9,5	9,9	9,7	5,3	7,6	6,5	6,3	8,1	7,3
25–29	6,5	7,6	7,1	5,3	7,1	6,3	6,0	7,4	6,7	4,5	6,9	5,7	4,8	7,0	6,0
30–34	6,0	6,4	6,2	5,7	6,0	5,9	5,9	6,2	6,1	4,3	5,6	5,0	4,7	5,7	5,2
35–39	5,7	4,9	5,3	4,8	4,3	4,5	5,3	4,6	4,9	4,2	5,0	4,6	4,5	4,9	4,7
40–44	4,3	3,9	4,1	4,0	3,6	3,8	4,2	3,7	3,9	3,7	3,7	3,7	3,8	3,7	3,8
45–49	3,6	2,5	3,0	3,1	2,5	2,8	3,4	2,5	2,9	2,9	2,8	2,8	3,0	2,7	2,9
50–54	3,1	2,3	2,7	2,7	3,0	2,8	2,9	2,6	2,8	2,5	3,4	3,0	2,6	3,2	2,9
55–59	1,9	1,7	1,8	2,1	1,6	1,9	2,0	1,7	1,8	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
60–64	1,9	1,3	1,6	1,8	1,5	1,7	1,9	1,4	1,6	1,8	2,0	1,9	1,8	1,8	1,8
65–69	1,4	1,7	1,5	1,6	1,3	1,4	1,5	1,5	1,5	1,8	1,5	1,6	1,7	1,5	1,6
70–74	0,9	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	1,2	1,0	1,1	1,1	0,9	1,0
75–79	0,5	0,3	0,4	0,6	0,2	0,4	0,5	0,3	0,4	0,7	0,5	0,6	0,7	0,4	0,6
80 +	0,5	0,6	0,5	0,4	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Groupes d'âges dépendants															
0–14	43,7	42,6	43,1	47,9	45,7	46,8	45,6	44,0	44,8	55,5	49,1	52,2	53,2	47,8	50,4
15–64	53,1	54,2	53,7	48,5	51,3	50,0	51,0	52,9	52,0	40,2	47,3	43,9	42,7	48,7	45,8
65+	3,2	3,2	3,2	3,5	3,0	3,2	3,3	3,1	3,2	4,3	3,6	3,9	4,1	3,5	3,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Populations des enfants et des adultes															
0–17	49,5	51,0	50,3	54,4	52,8	53,5	51,7	51,8	51,7	61,5	54,0	57,6	59,2	53,5	56,2
18+	50,5	49,0	49,7	45,6	47,2	46,4	48,3	48,2	48,2	38,5	46,0	42,4	40,8	46,5	43,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Adolescents 10–19	22,1	27,1	24,8	24,2	27,3	25,8	23,1	27,2	25,2	24,6	21,8	23,1	24,2	23,1	23,6
Effectif de la population	5 317	5 845	11 162	4 344	4 822	9 166	9 661	10 667	20 328	31 313	33 812	65 125	40 975	44 479	85 454

Tableau 2.8 Composition des ménages

Répartition (en %) des ménages par sexe du chef de ménage et par taille du ménage ; taille moyenne des ménages ; et pourcentage de ménages avec des enfants de moins de 18 ans qui sont orphelins ou ne vivant pas avec un parent biologique, selon le milieu de résidence, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Résidence				
Caractéristique	Bamako	Autre urbain	Ensemble urbain	Rural	Ensemble
Chef du ménage					
Homme	85,5	84,8	85,2	89,5	88,3
Femme	14,5	15,2	14,8	10,5	11,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nombre de membres habituels					
1	8,6	3,5	6,4	2,6	3,7
2	5,0	3,0	4,1	3,0	3,3
3	8,0	8,1	8,0	5,7	6,4
4	12,0	9,2	10,8	8,7	9,3
5	12,1	12,7	12,4	9,8	10,5
6	10,8	12,0	11,4	10,7	10,9
7	9,4	10,6	10,0	9,1	9,3
8	5,7	7,7	6,6	8,4	7,9
9+	28,3	33,1	30,4	41,9	38,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taille moyenne du ménage	7,5	7,9	7,7	9,4	8,9
Pourcentage de ménages avec des enfants de moins de 18 ans qui sont orphelins ou ne vivant pas avec un parent biologique					
Orphelin double	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Orphelin simple[1]	12,7	15,0	13,7	13,4	13,5
Enfants ne vivant pas avec un parent biologique[2]	30,8	39,2	34,5	33,1	33,5
Orphelins et/ou enfants ne vivant pas avec un parent biologique	34,7	43,5	38,6	37,6	37,8
Effectif de ménages	1 509	1 171	2 680	6 987	9 667

Note : Le tableau est basé sur la population de droit des ménages, c'est-à-dire les résidents habituels.
[1] Comprend les enfants dont l'un des deux parents est décédé et dont l'état de survie de l'autre est inconnu
[2] Les enfants ne vivant pas avec un parent biologique sont les enfants de moins de 18 ans qui vivent dans un ménage dans lequel il n'y a ni leur mère, ni leur père.

Tableau 2.9 Enfants orphelins et résidence des enfants avec les parents

Répartition (en %) de la population de droit des enfants de moins de 18 ans par état de survie des parents et résidence avec les parents, pourcentage d'enfants ne vivant avec aucun parent biologique et pourcentage d'enfants dont l'un ou les deux parents sont décédés, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Vit avec les deux parents	Vit avec la mère mais pas avec le père		Vit avec le père mais pas avec la mère		Ne vit avec aucun des deux parents					Total	Pourcentage ne vivant avec aucun parent biologique	Pourcentage avec un ou les deux parents décédés[1]	Effectif d'enfants
		Père en vie	Père décédé	Mère en vie	Mère décédée	Les deux en vie	Seule la mère en vie	Seul le père en vie	Les deux décédés	Information manquante sur père/ mère				
Groupe d'âges														
0–4	78,3	16,0	0,9	1,2	0,1	2,9	0,1	0,2	0,0	0,1	100,0	3,3	1,4	16 124
<2	79,0	19,1	0,5	0,3	0,1	0,7	0,0	0,1	0,0	0,1	100,0	0,8	0,8	6 379
2–4	77,9	14,0	1,2	1,8	0,2	4,4	0,2	0,3	0,0	0,1	100,0	4,9	1,8	9 746
5–9	72,9	10,2	2,4	3,5	0,7	8,4	0,9	0,7	0,1	0,2	100,0	10,2	4,9	14 679
10–14	65,0	7,8	4,0	4,5	1,4	13,7	1,8	1,1	0,4	0,3	100,0	17,0	8,7	12 291
15–17	52,8	5,4	5,5	3,7	1,6	24,1	3,6	1,5	1,2	0,6	100,0	30,4	13,4	4 975
Sexe														
Masculin	72,2	11,0	2,7	3,5	0,9	7,5	1,1	0,7	0,2	0,2	100,0	9,4	5,6	24 321
Féminin	68,9	11,1	2,6	2,5	0,7	11,7	1,2	0,8	0,4	0,3	100,0	14,0	5,6	23 748
Résidence														
Bamako	69,7	10,0	3,2	2,9	0,6	10,7	1,7	0,8	0,3	0,2	100,0	13,5	6,6	5 587
Autre urbain	66,2	11,8	2,6	2,5	0,8	12,8	1,7	1,0	0,3	0,3	100,0	15,8	6,4	4 890
Ensemble urbain	68,0	10,8	2,9	2,7	0,7	11,7	1,7	0,9	0,3	0,2	100,0	14,6	6,5	10 477
Rural	71,3	11,1	2,6	3,1	0,8	9,0	1,0	0,7	0,3	0,2	100,0	10,9	5,3	37 592
Région														
Kayes	67,8	13,6	3,1	3,6	1,0	8,7	1,1	0,8	0,3	0,2	100,0	10,8	6,1	7 280
Koulikoro	70,5	11,4	2,5	3,4	0,5	9,5	1,1	0,7	0,3	0,3	100,0	11,6	5,1	11 239
Sikasso	76,8	7,0	2,3	2,9	0,9	8,0	1,1	0,5	0,2	0,1	100,0	9,8	5,1	9 277
Ségou	70,8	11,0	2,0	2,3	0,8	10,8	1,0	0,6	0,3	0,3	100,0	12,7	4,7	7 630
Mopti	67,0	15,4	2,5	2,4	0,8	9,6	1,1	0,9	0,2	0,2	100,0	11,7	5,4	4 667
Tombouctou	73,1	6,0	4,7	1,8	1,6	10,8	0,6	0,8	0,5	0,1	100,0	12,7	8,2	881
Gao	58,6	14,4	4,5	4,3	1,2	12,5	2,3	1,5	0,3	0,3	100,0	16,7	9,9	1 492
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	100,0	†	†	16
Bamako	69,7	10,0	3,2	2,9	0,6	10,7	1,7	0,8	0,3	0,2	100,0	13,5	6,6	5 587
Quintile de bien-être économique														
Le plus bas	75,5	10,2	1,8	3,1	0,7	7,4	0,5	0,5	0,1	0,1	100,0	8,6	3,6	10 028
Second	73,6	10,3	2,5	3,0	0,9	7,7	1,0	0,5	0,2	0,2	100,0	9,4	5,2	9 964
Moyen	68,7	11,8	3,6	2,7	1,0	9,5	1,4	0,8	0,2	0,2	100,0	12,0	7,0	9 875
Quatrième	69,0	11,7	3,2	2,9	0,8	9,9	1,1	0,8	0,5	0,2	100,0	12,2	6,4	9 463
Le plus élevé	65,5	11,2	2,2	3,2	0,4	13,8	1,9	1,0	0,3	0,4	100,0	17,0	5,9	8 738
Ensemble <15	72,6	11,7	2,3	2,9	0,7	7,9	0,9	0,6	0,2	0,2	100,0	9,6	4,7	43 094
Ensemble <18	70,6	11,0	2,7	3,0	0,8	9,6	1,2	0,7	0,3	0,2	100,0	11,7	5,6	48 069

Note : Le tableau est basé sur la population de droit des ménages, c'est-à-dire les résidents habituels.

[1] Comprend les enfants dont le père est décédé, ceux dont la mère est décédée, ceux dont les deux parents sont décédés et ceux dont un parent est décédé et dont l'information sur l'état de survie de l'autre est manquante

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 2.10 Enregistrement à l'état civil des naissances d'enfants de moins de 5 ans

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans (population de droit) dont la naissance a été enregistrée à l'état civil, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'enfants dont la naissance a été enregistrée et qui :		Pourcentage total dont la naissance a été enregistrée	Effectif d'enfants
	Ont un acte de naissance	N'ont pas d'acte de naissance		
Âge				
<1	66,9	20,9	87,7	3 348
1–4	80,3	9,3	89,6	12 776
Sexe				
Masculin	78,7	11,2	90,0	8 121
Féminin	76,3	12,1	88,4	8 004
Résidence				
Bamako	89,9	7,2	97,1	1 831
Autre urbain	85,6	8,2	93,8	1 554
Ensemble urbain	87,9	7,7	95,6	3 385
Rural	74,8	12,7	87,5	12 740
Région				
Kayes	80,0	8,6	88,6	2 411
Koulikoro	76,3	14,1	90,4	3 834
Sikasso	83,3	9,8	93,1	3 156
Ségou	74,5	13,5	88,0	2 587
Mopti	67,7	16,4	84,1	1 518
Tombouctou	50,2	15,3	65,5	296
Gao	55,3	9,1	64,4	486
Kidal	†	†	†	6
Bamako	89,9	7,2	97,1	1 831
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	71,6	13,5	85,1	3 438
Second	73,2	13,9	87,1	3 391
Moyen	72,9	11,9	84,8	3 284
Quatrième	82,4	10,3	92,7	3 240
Le plus élevé	90,0	8,1	98,0	2 771
Ensemble	77,5	11,7	89,2	16 124

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 2.11.1 Niveau d'instruction de la population des ménages : Femme

Répartition (en %) de la population de fait des femmes des ménages âgées de 6 ans et plus, en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années complétées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Aucun	Primaire incomplet	Primaire complet[1]	Secondaire incomplet	Secondaire complet[2]	Supérieur	Ne sait pas	Total	Effectif de femmes	Nombre médian d'années complétées
Groupe d'âges[3]										
6–9	44,0	55,5	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1	100,0	5 798	0,0
10–14	32,6	49,6	2,3	15,4	0,0	0,0	0,1	100,0	6 105	2,4
15–19	38,1	17,2	3,4	37,8	1,2	1,9	0,4	100,0	4 155	4,2
20–24	44,6	14,3	3,2	28,3	3,2	6,0	0,3	100,0	3 615	3,0
25–29	53,8	12,7	2,8	23,6	2,8	3,8	0,6	100,0	3 119	0,0
30–34	59,5	12,2	2,1	18,5	3,0	4,3	0,5	100,0	2 552	0,0
35–39	71,6	10,1	1,8	11,9	1,4	2,7	0,4	100,0	2 190	0,0
40–44	80,3	8,7	1,6	6,7	0,5	1,7	0,4	100,0	1 662	0,0
45–49	80,4	9,9	2,0	6,1	0,3	1,2	0,2	100,0	1 214	0,0
50–54	82,0	8,8	1,3	6,6	0,3	0,6	0,3	100,0	1 439	0,0
55–59	84,4	8,0	1,7	4,9	0,1	0,5	0,2	100,0	884	0,0
60–64	84,1	7,1	1,6	5,2	0,9	0,6	0,5	100,0	821	0,0
65+	91,9	3,1	0,5	3,1	0,3	1,0	0,2	100,0	1 536	0,0
Résidence										
Bamako	31,2	26,9	2,5	29,3	3,3	6,5	0,3	100,0	4 817	3,6
Autre urbain	36,5	27,1	2,3	28,5	2,8	2,6	0,2	100,0	3 888	2,5
Ensemble urbain	33,6	27,0	2,4	28,9	3,1	4,8	0,3	100,0	8 705	3,1
Rural	60,3	25,1	1,8	11,1	0,5	0,9	0,3	100,0	26 401	0,0
Région										
Kayes	58,0	28,4	1,9	10,3	0,6	0,6	0,1	100,0	5 258	0,0
Koulikoro	53,4	25,3	2,2	15,9	0,8	2,4	0,1	100,0	8 053	0,0
Sikasso	58,3	23,7	2,1	14,2	0,9	0,5	0,3	100,0	6 485	0,0
Ségou	57,4	25,3	1,6	13,3	0,6	0,9	0,9	100,0	5 475	0,0
Mopti	61,9	23,5	1,1	11,9	0,7	0,7	0,3	100,0	3 335	0,0
Tombouctou	64,7	22,4	1,8	9,4	1,0	0,7	0,0	100,0	614	0,0
Gao	57,7	28,8	1,6	9,8	1,0	0,8	0,4	100,0	1 058	0,0
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	100,0	11	†
Bamako	31,2	26,9	2,5	29,3	3,3	6,5	0,3	100,0	4 817	3,6
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	73,3	20,4	1,2	4,7	0,1	0,0	0,2	100,0	6 734	0,0
Second	68,1	23,8	1,4	6,3	0,1	0,1	0,1	100,0	6 850	0,0
Moyen	58,9	27,8	2,1	10,2	0,3	0,2	0,5	100,0	7 016	0,0
Quatrième	41,7	29,8	2,4	23,1	1,4	1,2	0,4	100,0	7 037	1,1
Le plus élevé	29,2	25,8	2,5	31,4	3,4	7,4	0,2	100,0	7 469	4,1
Ensemble	53,7	25,6	2,0	15,5	1,1	1,9	0,3	100,0	35 105	0,0

Note : L'ensemble comprend 17 femmes pour lesquelles l'information sur l'âge est manquante.
[1] A achevé 6 classes du niveau primaire. Le niveau primaire correspond au 1er cycle de l'école fondamentale
[2] A achevé 6 classes du niveau secondaire. Le niveau secondaire comprend le 2nd cycle de l'école fondamentale, le secondaire général, les écoles techniques et professionnelles.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 2.11.2 Niveau d'instruction de la population des ménages : Homme

Répartition (en %) de la population de fait des hommes des ménages âgés de 6 ans et plus, en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années complétées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Aucun	Primaire incomplet	Primaire complet[1]	Secondaire incomplet	Secondaire complet[2]	Supérieur	Ne sait pas	Total	Effectif des hommes	Nombre médian d'années complétées
Groupe d'âges										
6–9	41,0	58,7	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	100,0	6 008	0,0
10–14	29,9	53,5	2,1	14,3	0,0	0,0	0,2	100,0	6 188	2,4
15–19	29,0	20,3	3,4	44,9	0,7	1,3	0,3	100,0	3 739	5,0
20–24	29,9	16,8	4,2	33,0	4,3	11,1	0,8	100,0	2 583	5,4
25–29	35,7	13,4	4,2	31,7	3,7	10,1	1,1	100,0	1 980	5,0
30–34	42,0	13,1	3,6	24,6	5,0	10,4	1,4	100,0	1 931	3,7
35–39	49,7	13,2	3,7	18,1	3,9	9,5	1,9	100,0	1 831	0,0
40–44	59,4	11,3	2,6	15,9	1,7	6,5	2,6	100,0	1 553	0,0
45–49	68,0	12,6	2,6	9,4	1,6	4,3	1,6	100,0	1 228	0,0
50–54	65,0	14,9	3,1	10,4	1,6	3,3	1,7	100,0	1 057	0,0
55–59	67,8	13,0	2,7	10,9	1,2	2,5	1,8	100,0	856	0,0
60–64	66,5	11,3	3,5	10,9	0,8	6,0	0,9	100,0	747	0,0
65+	77,4	7,1	2,5	7,9	0,7	3,5	0,9	100,0	1 662	0,0
Résidence										
Bamako	18,2	27,1	2,8	33,0	3,3	14,1	1,5	100,0	4 255	5,6
Autre urbain	26,3	31,1	2,3	30,6	3,2	5,5	1,1	100,0	3 449	3,7
Ensemble urbain	21,8	28,9	2,6	31,9	3,3	10,3	1,3	100,0	7 705	4,8
Rural	49,6	31,1	2,5	13,4	0,9	1,8	0,6	100,0	23 674	0,0
Région										
Kayes	44,6	35,7	2,3	15,0	0,8	1,4	0,2	100,0	4 528	0,1
Koulikoro	41,5	31,0	3,1	18,0	1,7	4,2	0,4	100,0	7 447	0,7
Sikasso	47,4	31,1	2,2	15,2	1,5	1,6	0,8	100,0	5 861	0,0
Ségou	46,1	31,8	2,5	16,1	0,8	1,5	1,3	100,0	4 892	0,0
Mopti	57,5	25,0	1,8	12,6	0,8	1,8	0,4	100,0	2 858	0,0
Tombouctou	60,9	21,2	2,9	11,7	1,0	2,2	0,1	100,0	600	0,0
Gao	52,0	30,9	0,9	11,5	1,2	1,8	1,9	100,0	926	0,0
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	100,0	11	†
Bamako	18,2	27,1	2,8	33,0	3,3	14,1	1,5	100,0	4 255	5,6
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	62,8	27,2	2,3	7,2	0,2	0,1	0,3	100,0	6 323	0,0
Second	55,9	31,0	2,5	9,3	0,6	0,3	0,3	100,0	6 209	0,0
Moyen	47,9	33,5	2,3	14,0	0,9	0,6	0,7	100,0	6 137	0,0
Quatrième	32,4	33,3	3,0	24,8	1,8	3,3	1,5	100,0	6 224	2,3
Le plus élevé	15,8	28,0	2,4	34,1	4,0	14,8	1,0	100,0	6 486	6,0
Ensemble	42,8	30,6	2,5	18,0	1,5	3,9	0,8	100,0	31 379	0,6

Note : L'ensemble comprend 16 hommes pour lesquelles l'information sur l'âge est manquante

[1] A achevé 6 classes du niveau primaire. Le niveau primaire correspond au 1er cycle de l'école fondamentale

[2] A achevé 6 classes du niveau secondaire. Le niveau secondaire comprend le 2nd cycle de l'école fondamentale, le secondaire général, les écoles techniques et professionnelles.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 2.12 Taux de fréquentation scolaire

Taux Net de Fréquentation scolaire (TNF) et Taux Brut de Fréquentation scolaire (TBF), de la population de fait des ménages, par sexe et niveau d'études, et indice de parité entre les genres selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Taux net de fréquentation scolaire[1]				Taux brut de fréquentation scolaire[2]			
	Masculin	Féminin	Ensemble	Indice de parité entre les genres[3]	Masculin	Féminin	Ensemble	Indice de parité entre les genres[3]
NIVEAU PRIMAIRE								
Résidence								
Bamako	80,4	69,4	74,5	0,86	109,5	92,8	100,6	0,85
Autre urbain	73,3	68,2	70,8	0,93	96,9	94,8	95,8	0,98
Ensemble urbain	76,9	68,8	72,7	0,89	103,2	93,7	98,3	0,91
Rural	55,5	53,8	54,7	0,97	75,7	71,0	73,4	0,94
Région								
Kayes	62,7	54,8	58,7	0,87	90,1	71,1	80,4	0,79
Koulikoro	61,7	58,2	60,0	0,94	81,0	77,6	79,4	0,96
Sikasso	58,7	56,2	57,5	0,96	78,6	75,6	77,2	0,96
Ségou	55,6	56,0	55,8	1,01	74,3	74,3	74,3	1,00
Mopti	47,3	52,2	49,8	1,10	65,8	68,2	67,0	1,04
Tombouctou	39,2	43,8	41,4	1,12	52,2	61,3	56,5	1,17
Gao	45,9	49,5	47,6	1,08	68,2	70,3	69,2	1,03
Bamako	80,4	69,4	74,5	0,86	109,5	92,8	100,6	0,85
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	43,3	44,2	43,7	1,02	57,8	56,8	57,3	0,98
Second	51,5	47,4	49,5	0,92	69,1	63,0	66,2	0,91
Moyen	59,4	57,5	58,4	0,97	82,6	76,2	79,5	0,92
Quatrième	73,4	70,3	71,8	0,96	99,7	93,5	96,6	0,94
Le plus élevé	78,3	69,3	73,8	0,88	106,0	95,0	100,5	0,90
Ensemble	59,8	57,1	58,5	0,95	81,2	76,0	78,6	0,94
NIVEAU SECONDAIRE								
Résidence								
Bamako	60,9	41,8	49,6	0,69	85,5	63,8	72,6	0,75
Autre urbain	56,7	47,6	51,5	0,84	87,5	72,1	78,7	0,82
Ensemble urbain	59,0	44,4	50,4	0,75	86,4	67,5	75,3	0,78
Rural	26,8	23,9	25,4	0,89	35,9	32,6	34,3	0,91
Région								
Kayes	28,9	18,1	23,2	0,63	37,1	24,9	30,7	0,67
Koulikoro	34,5	27,2	30,7	0,79	49,1	38,2	43,5	0,78
Sikasso	33,1	35,1	34,1	1,06	45,2	50,5	47,8	1,12
Ségou	29,4	36,3	32,5	1,23	41,7	49,6	45,2	1,19
Mopti	26,4	26,5	26,4	1,01	36,4	37,9	37,1	1,04
Tombouctou	18,8	18,8	18,8	1,00	27,8	25,9	26,8	0,93
Gao	17,8	18,7	18,3	1,05	26,9	27,2	27,1	1,01
Bamako	60,9	41,8	49,6	0,69	85,5	63,8	72,6	0,75
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	13,9	15,9	14,7	1,14	17,2	19,7	18,2	1,14
Second	20,8	16,2	18,6	0,78	25,1	21,8	23,6	0,87
Moyen	27,1	20,6	24,0	0,76	35,6	29,2	32,5	0,82
Quatrième	46,5	43,0	44,6	0,93	66,1	60,3	62,9	0,91
Le plus élevé	64,7	41,5	50,6	0,64	96,3	63,1	76,2	0,66
Ensemble	34,4	30,4	32,4	0,88	47,8	43,6	45,7	0,91

[1] Le taux net de fréquentation scolaire (TNF) au niveau primaire est le pourcentage de la population d'âge officiel de fréquentation du niveau primaire (7–12 ans) qui fréquente l'école primaire. Le taux net de fréquentation scolaire pour le niveau secondaire est le pourcentage de la population d'âge officiel de fréquentation du niveau secondaire (13–18 ans) qui fréquente l'école secondaire. Par définition le taux net de fréquentation ne peut pas excéder 100 %.

[2] Le taux brut de fréquentation scolaire (TBF) au niveau primaire est le nombre total d'élèves du niveau primaire, exprimé en pourcentage de la population d'âge officiel de fréquentation du niveau primaire. Le taux brut de fréquentation scolaire au niveau secondaire est le nombre total d'élèves du niveau secondaire, exprimé en pourcentage de la population d'âge officiel de fréquentation du niveau secondaire. S'il y a pour un niveau donné un nombre important d'élèves plus âgés ou plus jeunes que l'âge officiel pour ce niveau, le TBF peut excéder 100 %.

[3] L'indice de parité entre les genres au niveau primaire est le ratio du TNF (TBF) au niveau primaire des filles sur le TNF (TBF) des garçons. L'indice de parité entre les genres au niveau secondaire est le ratio du TNF (TBF) au niveau secondaire des filles sur le TNF (TBF) des garçons.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 2.13 Taux de participation dans des activités d'apprentissage organisées

Répartition (en %) des enfants qui ont un an de moins que l'âge officiel d'entrée en cycle primaire au début de l'année scolaire par fréquentation d'un programme d'éducation préscolaire ou d'une école primaire, et taux net de fréquentation scolaire ajusté (TNF), selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Répartition (en %) des enfants fréquentant				TNF ajusté[1]	Effectif d'enfants de 6 ans au début de l'année scolaire
	Un programme d'éducation préscolaire	L'école primaire	Ni un programme d'éducation préscolaire, ni l'école primaire	Total		
Sexe						
Masculin	2,2	47,0	50,8	100,0	49,2	1 592
Féminin	1,6	43,5	54,9	100,0	45,1	1 602
Résidence						
Bamako	5,1	79,9	15,0	100,0	85,0	327
Autre urbain	3,8	65,3	30,9	100,0	69,1	301
Ensemble urbain	4,5	72,9	22,6	100,0	77,4	628
Rural	1,3	38,5	60,2	100,0	39,8	2 566
Région						
Kayes	1,9	47,8	50,3	100,0	49,7	499
Koulikoro	2,1	45,3	52,6	100,0	47,4	769
Sikasso	0,4	43,8	55,8	100,0	44,2	594
Ségou	1,4	32,5	66,1	100,0	33,9	522
Mopti	2,1	32,3	65,5	100,0	34,5	320
Tombouctou	0,0	33,3	66,7	100,0	33,3	51
Gao	1,6	43,3	55,2	100,0	44,8	111
Kidal	†	†	†	100,0	†	1
Bamako	5,1	79,9	15,0	100,0	85,0	327
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	0,6	21,5	77,9	100,0	22,1	721
Second	0,8	30,2	68,9	100,0	31,1	688
Moyen	1,4	40,3	58,3	100,0	41,7	669
Quatrième	3,7	61,8	34,5	100,0	65,5	612
Le plus élevé	3,8	86,3	10,0	100,0	90,0	504
Ensemble	1,9	45,3	52,8	100,0	47,2	3 194

[1] Le taux net de fréquentation scolaire ajusté (TNF) pour l'apprentissage organisé est équivalent au pourcentage d'enfants d'un an plus jeune que l'âge officiel d'entrée en cycle primaire (au début de l'année scolaire) qui fréquentent un programme d'éducation préscolaire ou l'école primaire.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 2.14 Handicap par degré de difficulté selon le type de handicap et selon l'âge

Répartition (en %) de la population (de fait) des ménages de 5 ans et plus par degré de difficulté de fonctionnement, par domaine de fonctionnement et pourcentage de la population dont le niveau de difficulté de fonctionnement est considéré comme étant le plus sévère dans, au moins, un domaine selon l'âge, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Degré de difficulté							
Domaine et âge	Aucune difficulté	Quelques difficultés	Beaucoup de difficultés	Ne peut pas fonctionner du tout	Ne sait pas	Total	Beaucoup de difficultés ou ne peut pas fonctionner	Effectif de personnes
Domaine								
Difficultés pour voir	92,5	6,0	1,3	0,1	0,0	100,0	1,4	69 329
Difficultés pour entendre	96,8	2,5	0,6	0,1	0,0	100,0	0,7	69 329
Difficultés pour communiquer	98,4	1,1	0,3	0,2	0,0	100,0	0,5	69 329
Difficultés pour se rappeler ou se concentrer	97,3	2,1	0,4	0,1	0,0	100,0	0,6	69 329
Difficultés pour marcher ou monter des marches	94,5	3,9	1,4	0,1	0,0	100,0	1,5	69 329
Difficultés pour se laver ou s'habiller	98,1	1,2	0,3	0,3	0,0	100,0	0,7	69 329
Difficultés dans au moins un domaine[1]								
5–9	91,9	5,6	1,2	1,2	0,1	100,0	2,4	14 651
10–14	94,7	4,0	1,0	0,3	0,0	100,0	1,3	12 293
15–19	93,7	5,0	1,1	0,2	0,0	100,0	1,3	7 894
20–29	92,3	5,9	1,3	0,4	0,1	100,0	1,7	11 297
30–39	88,1	9,7	1,9	0,3	0,0	100,0	2,2	8 503
40–49	77,8	18,8	3,1	0,3	0,0	100,0	3,4	5 656
50–59	63,2	28,7	7,6	0,6	0,0	100,0	8,1	4 236
60+	36,5	39,8	21,1	2,7	0,0	100,0	23,7	4 766
15 ans et plus	80,6	14,3	4,5	0,6	0,0	100,0	5,1	42 352
Ensemble	85,5	10,6	3,2	0,7	0,0	100,0	3,8	69 329

Note : L'ensemble comprend 33 personnes pour lesquelles l'information sur l'âge est manquante

[1] Si on a déclaré qu'une personne avait des difficultés dans plus d'un domaine, seul le niveau de difficulté le plus élevé est présenté dans ce tableau.

Tableau 2.15.1 Handicap parmi les adultes selon certaines caractéristiques sociodémographiques : Femme

Pourcentage de la population (de fait) des ménages de 15 ans et plus qui ont des difficultés de fonctionnement par domaine et par le plus haut niveau de difficulté de fonctionnement dans au moins un domaine, et pourcentage ayant beaucoup de difficultés pour fonctionner ou ne pouvant pas fonctionner du tout dans plus d'un domaine, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

		Quelques difficultés, beaucoup de difficultés ou ne peut pas fonctionner pour :						Difficultés dans au moins un domaine[1]					Beaucoup de difficultés ou ne peut pas fonctionner dans plus d'un domaine	Effectif de femmes
Caractéristiques sociodémographiques	Aucune difficulté dans aucun domaine	Voir	Entendre	Communiquer	Se rappeler ou se concentrer	Marcher ou monter des marches	Se laver ou s'habiller	Quelques difficultés	Beaucoup de difficultés	Ne peut pas fonctionner	Ne sait pas	Beaucoup de difficultés ou ne peut pas fonctionner		
État matrimonial														
Célibataire	90,2	5,4	2,0	1,4	1,5	2,2	0,6	7,6	1,9	0,3	0,0	2,3	0,6	3 865
En union	83,0	8,8	3,5	1,1	2,2	7,1	0,7	13,6	3,1	0,3	0,0	3,4	0,5	17 010
Divorcée ou séparée	71,0	13,3	5,4	3,4	6,1	15,9	2,0	20,0	7,5	1,2	0,3	8,7	3,0	332
Veuve	40,5	39,8	18,1	6,1	15,7	37,6	9,2	35,4	21,1	3,0	0,1	24,1	9,2	1 995
Résidence														
Bamako	77,5	15,0	3,6	1,6	2,5	7,7	1,4	17,7	4,4	0,4	0,1	4,8	1,0	3 357
Autre urbain	80,8	11,9	3,8	1,9	3,1	8,7	1,3	14,6	4,2	0,4	0,0	4,6	1,2	2 619
Ensemble urbain	78,9	13,7	3,7	1,7	2,7	8,2	1,4	16,3	4,3	0,4	0,1	4,7	1,1	5 976
Rural	80,9	10,0	4,8	1,5	3,5	9,4	1,5	13,9	4,6	0,6	0,0	5,2	1,4	17 227
Région[2]														
Kayes	84,5	8,2	3,5	1,5	2,3	8,3	0,9	10,9	4,0	0,6	0,0	4,6	1,4	3 431
Koulikoro	81,8	10,0	4,0	1,8	3,8	9,0	1,5	13,2	4,4	0,6	0,0	5,0	1,4	5 383
Sikasso	80,1	10,1	5,7	1,6	3,6	8,9	1,5	15,0	4,5	0,4	0,1	4,9	1,2	4 225
Ségou	77,4	12,1	5,2	1,6	4,5	10,8	1,6	16,6	5,4	0,7	0,0	6,1	1,5	3 621
Mopti	82,3	9,8	4,4	1,0	1,9	9,0	1,5	12,4	4,4	0,8	0,0	5,2	1,5	2 108
Tombouctou	78,1	10,0	6,7	2,2	6,8	12,0	2,5	18,0	3,3	0,7	0,0	3,9	0,7	396
Gao	75,7	16,3	7,3	2,2	3,8	10,7	2,3	18,6	5,1	0,6	0,0	5,7	1,6	676
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	7
Bamako	77,5	15,0	3,6	1,6	2,5	7,7	1,4	17,7	4,4	0,4	0,1	4,8	1,0	3 357
Niveau d'instruction														
Aucun	77,7	11,8	5,9	2,0	4,3	11,5	2,0	15,6	5,8	0,9	0,0	6,7	1,9	14 307
Primaire	83,4	8,4	3,2	1,4	2,8	7,3	0,6	13,3	3,1	0,2	0,0	3,3	0,8	3 275
Secondaire ou plus	85,5	10,3	1,8	0,7	1,2	3,8	0,5	12,4	1,9	0,1	0,0	2,0	0,2	5 526
Ne sait pas/ Manquant	86,6	5,4	4,5	0,3	2,1	4,8	1,4	9,7	2,9	0,0	0,9	2,9	0,0	94
Quintile de bien-être économique														
Le plus bas	79,6	9,7	6,4	1,5	5,0	10,2	1,6	14,5	5,2	0,6	0,0	5,8	1,7	4 342
Second	80,4	9,8	4,9	1,7	3,5	9,7	1,6	14,3	4,8	0,5	0,0	5,3	1,4	4 385
Moyen	80,2	10,4	5,4	2,0	3,7	9,8	1,9	14,0	4,9	0,9	0,0	5,8	1,6	4 548
Quatrième	82,2	10,6	3,5	1,4	2,5	8,2	1,2	13,5	3,7	0,6	0,0	4,3	1,2	4 684
Le plus élevé	79,5	13,7	2,9	1,3	2,2	7,7	1,1	16,1	4,0	0,4	0,0	4,4	0,8	5 243
Ensemble	80,4	10,9	4,5	1,6	3,3	9,1	1,5	14,5	4,5	0,6	0,0	5,1	1,3	23 202

[1] Si on a déclaré qu'une personne avait des difficultés dans plus d'un domaine, seul le niveau de difficulté le plus élevé est présenté dans ce tableau.
[2] Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 2.15.2 Handicap parmi les adultes selon certaines caractéristiques sociodémographiques : Homme

Pourcentage de la population (de fait) des ménages de 15 ans et plus qui ont des difficultés de fonctionnement par domaine et par le plus haut niveau de difficulté de fonctionnement dans au moins un domaine, et pourcentage ayant beaucoup de difficultés pour fonctionner ou ne pouvant pas fonctionner du tout dans plus d'un domaine, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristiques sociodémographiques	Aucune difficulté dans aucun domaine	Quelques difficultés, beaucoup de difficultés ou ne peut pas fonctionner pour :						Difficultés dans au moins un domaine[1]					Beaucoup de difficultés ou ne peut pas fonctionner dans plus d'un domaine	Effectif d'hommes
		Voir	Entendre	Communiquer	Se rappeler ou se concentrer	Marcher ou monter des marches	Se laver ou s'habiller	Quelques difficultés	Beaucoup de difficultés	Ne peut pas fonctionner	Ne sait pas	Beaucoup de difficultés ou ne peut pas fonctionner		
État matrimonial														
Célibataire	93,4	1,9	1,4	1,5	1,8	1,8	0,8	4,4	1,6	0,5	0,1	2,1	0,6	6 889
En union	74,2	16,5	5,3	2,3	4,0	10,3	1,8	19,2	5,9	0,7	0,0	6,5	1,6	12 011
Divorcé ou séparé	70,4	11,7	6,3	8,1	8,8	8,9	2,5	20,8	8,2	0,6	0,0	8,8	2,9	132
Veuf	40,7	49,1	23,8	6,6	14,3	34,2	10,8	33,7	20,5	5,1	0,0	25,6	14,2	151
Résidence														
Bamako	81,1	11,1	2,9	2,7	2,5	6,1	1,2	15,3	3,0	0,5	0,2	3,4	0,7	2 993
Autre urbain	82,7	11,2	3,4	1,5	2,5	6,8	1,2	13,5	3,3	0,5	0,0	3,8	1,1	2 262
Ensemble urbain	81,8	11,1	3,1	2,2	2,5	6,4	1,2	14,5	3,1	0,5	0,1	3,6	0,9	5 254
Rural	80,5	11,6	4,4	2,1	3,6	7,9	1,6	13,8	5,0	0,7	0,0	5,7	1,6	13 929
Région[2]														
Kayes	83,1	9,9	3,8	1,7	2,5	6,5	1,3	11,3	4,7	0,9	0,0	5,6	1,6	2 704
Koulikoro	84,2	9,2	3,2	2,3	3,0	6,9	1,8	11,4	3,7	0,7	0,0	4,4	1,3	4 555
Sikasso	80,4	11,5	4,4	1,8	3,8	7,2	1,3	14,4	4,6	0,6	0,1	5,2	1,7	3 494
Ségou	75,1	15,6	5,4	2,3	4,6	10,3	1,6	18,3	5,9	0,6	0,0	6,5	1,7	2 907
Mopti	79,7	12,1	5,1	1,3	2,1	8,0	1,5	13,9	5,6	0,8	0,0	6,4	1,3	1 609
Tombouctou	79,6	12,6	5,6	1,8	6,9	8,9	1,9	16,6	3,3	0,5	0,0	3,8	1,0	385
Gao	77,3	16,0	5,1	2,4	4,9	8,1	2,4	15,8	5,9	1,0	0,0	6,9	1,2	529
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	8
Bamako	81,1	11,1	2,9	2,7	2,5	6,1	1,2	15,3	3,0	0,5	0,2	3,4	0,7	2 993
Niveau d'instruction														
Aucun	75,7	14,5	5,7	2,9	4,8	10,6	2,3	16,7	6,4	1,2	0,1	7,6	2,3	9 106
Primaire	82,5	9,7	3,8	1,7	2,7	6,1	0,9	13,3	3,9	0,3	0,0	4,1	0,8	3 409
Secondaire ou plus	87,1	8,2	1,8	1,1	1,5	3,8	0,7	10,7	2,0	0,1	0,0	2,2	0,3	6 437
Ne sait pas/ Manquant	83,3	10,5	5,4	2,2	1,2	7,1	0,7	12,0	4,7	0,0	0,0	4,7	0,0	232
Quintile de bien-être économique														
Le plus bas	77,6	12,4	5,0	2,3	5,3	9,7	2,0	15,8	5,8	0,7	0,1	6,6	1,7	3 568
Second	77,6	13,4	5,9	2,2	3,8	8,6	1,7	15,5	6,3	0,5	0,0	6,8	1,9	3 556
Moyen	80,9	11,7	4,3	2,4	3,6	7,9	1,8	13,2	4,9	1,1	0,0	6,0	1,7	3 635
Quatrième	84,5	9,1	3,3	1,7	2,1	6,2	1,1	11,7	3,2	0,5	0,1	3,7	0,9	3 973
Le plus élevé	82,7	11,1	2,3	2,0	2,1	5,4	1,1	14,2	2,7	0,4	0,0	3,1	0,8	4 451
Ensemble	80,8	11,5	4,1	2,1	3,3	7,5	1,5	14,0	4,5	0,7	0,0	5,1	1,4	19 183

[1] Si on a déclaré qu'une personne avait des difficultés dans plus d'un domaine, seul le niveau de difficulté le plus élevé est présenté dans ce tableau.
[2] Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 2.16 Aide économique extérieure aux ménages

Pourcentage de ménages selon qu'ils ont reçu, ou non, une aide grâce au programme gouvernemental d'urgence Jigisèmèjiri ou à un autre programme d'aide économique extérieure ; pourcentage de ménages ayant déjà reçu une aide économique extérieure et pourcentage ayant reçu une aide économique extérieure au cours des 12 derniers mois, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Ménage a reçu une aide grâce au programme gouvernemental d'urgence Jigisèmèjiri	Ménage a reçu une aide grâce à un autre programme d'aide économique extérieure	Ménage n'a jamais reçu une aide économique extérieure	Ne sait pas/ Manquant	Pourcentage ayant déjà reçu une aide économique extérieure	Pourcentage ayant reçu une aide économique extérieure au cours des 12 derniers mois	Effectif de ménages
Résidence							
Bamako	2,6	2,6	93,5	1,7	4,8	0,2	1 509
Autre urbain	2,8	4,2	91,6	1,8	6,6	2,1	1 171
Ensemble urbain	2,7	3,3	92,6	1,8	5,6	1,0	2 680
Rural	7,4	10,6	82,6	1,2	16,2	5,9	6 987
Région							
Kayes	8,0	7,0	86,2	1,1	12,8	3,9	1 305
Koulikoro	6,7	7,2	86,6	1,0	12,4	3,9	2 053
Sikasso	6,8	7,0	85,3	1,9	12,8	2,9	1 631
Ségou	5,8	12,2	83,0	0,7	16,2	5,9	1 632
Mopti	9,2	18,7	74,4	0,4	25,2	12,7	895
Tombouctou	3,7	7,4	85,3	3,9	10,9	5,7	248
Gao	3,7	13,9	81,1	3,1	15,8	8,4	387
Kidal	†	†	†	†	†	†	7
Bamako	2,6	2,6	93,5	1,7	4,8	0,2	1 509
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	12,0	14,6	74,8	1,0	24,3	6,7	1 487
Second	10,9	12,9	78,5	1,0	20,5	6,9	1 751
Moyen	6,0	10,6	83,1	1,6	15,2	6,4	2 062
Quatrième	2,2	4,7	92,0	1,6	6,4	2,8	2 318
Le plus élevé	2,4	2,9	93,9	1,3	4,9	0,8	2 050
Ensemble	6,1	8,6	85,4	1,3	13,3	4,5	9 667

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 2.17 Aide économique aux frais de scolarité et fournitures scolaires

Pourcentage d'enfants de 3–24 ans qui fréquentent actuellement l'école selon qu'ils ont bénéficié, ou non, d'un soutien aux frais de scolarité ou à l'achat du matériel scolaire au cours de l'année scolaire 2023–2024; pourcentage ayant bénéficié d'un soutien aux frais de scolarité ou à l'achat du matériel scolaire au cours de l'année scolaire 2023–2024.Pourcentage d'enfants de 3–24 ans qui fréquentent actuellement l'école et qui ont bénéficié d'un soutien aux frais de scolarité ou à l'achat du matériel scolaire au cours de l'année scolaire 2023–2024, pourcentage pour lesquels le soutien reçu est estimé suffisant et pourcentage selon la source du soutien scolaire, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Pourcentage d'enfants de 3–24 ans qui fréquentent actuellement l'école selon qu'ils ont bénéficié, ou non, d'un soutien aux frais de scolarité ou à l'achat du matériel scolaire au cours de l'année scolaire 2023–2024						Pourcentage ayant bénéficié d'un soutien selon la source du soutien				Effectif d'enfants de 3–24 ans qui fréquentent actuellement l'école et qui ont bénéficié d'un soutien aux frais de scolarité ou à l'achat du matériel scolaire au cours de l'année scolaire 2023–2024
Caractéristique sociodémographique	A bénéficié d'un soutien aux frais de scolarité	A bénéficié d'un soutien à l'achat du matériel scolaire	N'a pas bénéficié de soutien aux frais de scolarité ou à l'achat du matériel scolaire	A bénéficié d'un soutien aux frais de scolarité ou à l'achat du matériel scolaire	Effectif d'enfants de 3–24 ans qui fréquentent actuellement l'école	Pourcentage pour lesquels le soutien reçu est estimé suffisant	État/public	Organisation confessionnelle/non-confessionnelle	Parent/proche/ami	Autre	
Âge											
3–9	6,0	14,0	84,6	15,4	8 325	59,9	15,3	12,4	72,6	3,3	1 285
10–14	6,3	15,7	82,5	17,5	7 495	55,7	18,3	12,6	67,2	5,5	1 308
15–19	7,2	16,8	80,7	19,0	3 051	63,3	38,8	5,3	61,7	2,7	581
20–24	11,9	20,6	75,3	24,6	993	68,2	58,2	2,8	52,4	0,5	244
Type d'école fréquentée											
Étatique/publique	5,4	17,7	80,2	19,8	10 279	50,9	31,1	12,3	56,3	5,4	2 034
Privée	8,2	13,2	85,2	14,7	8 935	73,9	11,3	6,2	85,6	1,4	1 316
Communautaire	4,5	9,0	89,4	10,5	649	37,7	35,3	44,0	37,3	3,6	68
Niveau d'instruction											
Pre-primaire	4,8	10,6	88,9	11,1	990	81,2	0,0	0,9	97,7	2,3	110
Primaire	6,4	15,3	83,0	17,0	13 201	56,0	17,8	13,9	67,5	4,8	2 251
Secondaire ou plus	7,5	16,4	81,3	18,7	5 661	64,6	38,2	4,6	63,5	1,9	1 058
Ne sait pas/Manquant	0,0	0,0	0,0	0,0	10	-	-	-	-	-	0
Résidence											
Bamako	4,6	11,6	87,0	13,0	3 764	81,7	27,0	3,3	73,6	1,2	489
Autre urbain	7,9	9,6	87,2	12,8	2 953	57,6	28,9	5,9	69,4	1,7	378
Ensemble urbain	6,1	10,7	87,1	12,9	6 717	71,2	27,8	4,4	71,8	1,5	867
Rural	6,9	17,8	80,5	19,4	13 146	55,5	22,1	12,7	65,7	4,7	2 551
Région											
Kayes	8,5	21,1	75,2	24,8	2 712	38,4	24,5	7,4	70,6	1,5	672
Koulikoro	5,9	15,5	83,7	16,3	4 618	63,4	21,5	6,1	77,9	0,6	752
Sikasso	3,0	9,3	89,9	10,1	3 559	51,5	26,2	17,0	46,3	12,4	361
Ségou	8,1	17,3	81,6	18,3	2 856	78,1	17,2	18,1	66,9	4,1	521
Mopti	9,0	21,3	74,9	25,0	1 614	42,8	23,3	11,7	59,2	9,9	403
Tombouctou	4,0	10,6	88,0	12,0	244	32,8	54,0	50,3	7,6	0,9	29
Gao	30,0	28,8	61,5	38,5	494	64,9	27,1	16,9	64,3	2,9	190
Kidal	†	†	†	†	3	†	†	†	†	†	0
Bamako	4,6	11,6	87,0	13,0	3 764	81,7	27,0	3,3	73,6	1,2	489
Quintile de bien-être économique											
Le plus bas	2,9	15,7	83,0	17,0	2 391	46,3	25,6	23,3	46,3	10,5	406
Second	4,9	16,4	82,2	17,8	2 878	39,2	22,7	15,5	61,4	5,0	513
Moyen	8,2	17,1	80,5	19,4	3 604	57,0	22,1	11,3	65,9	5,1	700
Quatrième	8,7	17,3	80,4	19,4	4 969	63,3	20,0	7,9	75,5	2,4	966
Le plus élevé	6,3	12,2	86,2	13,8	6 021	76,0	28,3	3,9	72,6	0,4	833
Ensemble	6,6	15,4	82,7	17,2	19 863	59,5	23,5	10,6	67,2	3,8	3 418

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES ENQUÊTÉES 3

Principaux résultats

- ***Niveau d'instruction :*** 54 % des femmes et 37 % des hommes de 15–49 ans n'ont aucun niveau d'instruction.
- ***Exposition aux médias de masse :*** 41 % des femmes et 39 % des hommes de 15–49 ans n'ont été exposés à aucun média.
- ***Utilisation de l'internet :*** 43 % des femmes et 63 % des hommes de 15–49 ans ont déjà utilisé l'internet.
- ***Emploi :*** Au cours des sept jours précédant l'enquête 52 % des femmes et 82 % des hommes de 15–49 ans travaillaient.
- ***Occupation :*** Les femmes travaillaient principalement dans les ventes et services (64 %) et dans l'agriculture (17 %). Parmi les hommes, 29 % étaient employés dans l'agriculture, 27 % occupaient un emploi manuel qualifié et 25 % étaient employés dans les ventes et services.
- ***Assurance médicale :*** La quasi-totalité des personnes interrogées n'étaient pas couvertes par une assurance médicale (94 % pour les femmes ou pour les hommes).
- ***Usage du tabac :*** Parmi les personnes enquêtées, 1 % des femmes et 14 % des hommes de 15–49 ans consommaient du tabac sous n'importe quelle forme.
- ***Consommation d'alcool :*** Environ, 1 % des femmes et 2 % des hommes de 15–49 ans ont consommé au moins un verre d'alcool au cours du mois dernier.

Ce chapitre présente des informations sur les caractéristiques démographiques et socio-économiques des personnes enquêtées, telles que l'âge, le niveau d'instruction, l'alphabétisation, l'état matrimonial, l'emploi, l'occupation, le bien-être économique, l'assurance médicale, le lieu de résidence à la naissance, le lieu de résidence actuel et la migration récente. Ce chapitre présente également des informations sur la consommation d'alcool et l'usage de tabac des personnes enquêtées. L'ensemble de ces informations est utile pour comprendre les facteurs qui affectent le recours aux services de santé reproductive, l'utilisation de la contraception ainsi que d'autres comportements en matière de santé.

3.1 CARACTÉRISTIQUES DE BASE DES PERSONNES INTERROGÉES POUR L'ENQUÊTE

Au cours de l'EDSM-VII, 17 347 femmes et 6 686 hommes de 15–49 ans ont été interviewés. Le pourcentage de femmes et d'hommes interrogés diminue avec l'âge, passant de 22 % de femmes et 25 % d'hommes dans le groupe d'âge 15–19 ans à 7 % de femmes et 9 % d'hommes dans le groupe d'âge 45–49 ans (**Tableau 3.1**).

Dans l'ensemble, 81 % des femmes et 90 % des hommes ont déclaré que leur état de santé était bon ou très bon.

Vingt et un pour cent des femmes et 47 % des hommes n'ont jamais été mariés. Soixante-seize pour cent des femmes sont mariées ou vivent avec un homme comme si elles étaient mariées contre 53 % parmi les hommes.

Cinquante-quatre pour cent des femmes et 37 % des hommes n'ont aucun niveau d'instruction. Vingt-neuf pour cent des femmes et 43 % des hommes ont un niveau d'instruction secondaire ou plus.

3.2 INSTRUCTION ET ALPHABÉTISATION

Alphabétisation

On suppose que les personnes enquêtées qui ont fréquenté un niveau supérieur au niveau secondaire sont alphabétisées. Toutes les autres personnes enquêtées sont considérées comme étant alphabétisés si elles peuvent lire à haute voix tout ou partie d'une phrase qui leur est présentée.

Échantillon : Femmes et hommes âgés de 15 à 49 ans

Les **Tableaux 3.2.1** et **3.2.2** présentent la répartition en pourcentage des femmes et des hommes enquêtés selon le plus haut niveau d'instruction atteint.

Parmi les enquêtés de 15–49 ans, 54 % des femmes et 37 % des hommes n'ont aucun niveau d'instruction. Seulement, 3 % des femmes et 8 % des hommes ont déclaré avoir atteint le niveau supérieur (**Graphique 3.1**).

Les **Tableaux 3.3.1** et **3.3.2** présentent les pourcentages de femmes et d'hommes alphabétisés. Près d'une femme sur trois (32 %) et un homme sur deux (50 %) sont alphabétisés.

Graphique 3.1 **Niveau d'instruction des enquêtés**

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15–49 ans en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé



Tendances : Entre 2001 et 2023–2024, le pourcentage de femmes de 15–49 ans qui n'ont aucun niveau d'instruction a diminué, passant de 80 % à 54 % ; chez les hommes, ce pourcentage est passé de 62 % à 37 %. Dans la même période, le pourcentage de femmes de 15–49 ans alphabétisées est passé de 15 % à 32 % et celui des hommes de 15–49 ans de 34 % à 50 %.

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Les pourcentages de femmes et d'hommes n'ayant aucun niveau d'instruction sont plus élevés en milieu rural qu'en milieu urbain (respectivement 62 % contre 33 % chez les femmes et 45 % contre 17 % chez les hommes).
- Les pourcentages de femmes et d'hommes alphabétisés sont plus élevés en milieu urbain qu'en milieu rural (respectivement 52 % contre 25 % et 75 % contre 39 %).
- Les écarts entre régions sont importants : chez les femmes comme chez les hommes, Tombouctou présente les pourcentages les plus élevés de ceux n'ayant aucun niveau d'instruction (respectivement 68 % et 64 %) (**Carte 3.1**).

Carte 3.1 Niveau d'instruction par région

Pourcentage d'hommes et de femmes de 15–49 ans n'ayant aucun niveau d'instruction



Note : Pour des raisons d'insécurité, les données de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région et ne sont pas présentées séparément.

- Du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, les proportions de femmes et d'hommes de 15 à 49 ans ayant atteint un niveau d'instruction secondaire ou supérieur augmentent, passant de moins d'un pour cent (<1 %) à 19 % chez les femmes et de 1 % à 37 % chez les hommes (**Graphique 3.2**).

- Du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, le pourcentage de celles et ceux qui sont alphabétisés augmentent de manière importante, passant chez les femmes de 14 % à 58 % et, chez les hommes de 26 % à 82 %.

Graphique 3.2 Niveau d'instruction secondaire par niveau de bien-être économique

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans ayant un niveau d'instruction secondaire complet ou supérieur



3.3 EXPOSITION AUX MÉDIAS DE MASSE ET UTILISATION DE L'INTERNET

Exposition aux médias de masse

Il a été demandé aux personnes enquêtées à quelle fréquence elles lisent le journal, écoutent la radio et regardent la télévision. Celles ayant répondu *au moins une fois par semaine* sont considérées comme étant régulièrement exposées à ce type de média.

Échantillon : Femmes et hommes de 15 à 49 ans

Utilisation de l'internet

Il a été demandé aux personnes interrogées si elles ont utilisé l'internet sur n'importe quel support, si elles ont utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois, et dans l'affirmative, avec quelle fréquence au cours du mois passé.

Échantillon : Femmes et hommes de 15 à 49 ans

3.3.1 Exposition aux médias de masse

Deux femmes de 15–49 ans sur cinq (41 %) ne sont exposées à aucun des médias cités dans l'enquête, au moins une fois par semaine (**Tableau 3.4.1**). Parmi les hommes de 15–49 ans, ce pourcentage est plus faible (39 %) (**Tableau 3.4.2**). La télé est le média auquel les femmes et les hommes sont les plus exposés (respectivement 41 % et 46 %), suivie de la radio (respectivement 40 % et 36 %). Seulement 3 % des femmes et 5 % des hommes lisent un journal au moins une fois par semaine. Globalement, 2 % des femmes et 3 % des hommes sont exposés aux trois médias au moins une fois par semaine (**Graphique 3.3**).

Graphique 3.3 **Exposition aux médias**

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans exposés à des médias, chaque semaine



Tendances : Depuis 2012–2013, le pourcentage de femmes de 15–49 ans qui ne sont exposées à aucun média a légèrement diminué, passant de 46 % à 41 %. Par contre, chez les hommes, on note la tendance inverse, ce pourcentage étant passé de 21 % à 39 %.

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Les proportions de femmes et d'hommes qui ne sont exposées régulièrement à aucun des médias cités dans l'enquête sont plus élevées en milieu rural qu'en milieu urbain (respectivement 46 % contre 27 % et 42 % contre 31 %).
- Dans les régions, on observe de fortes disparités. Plus de la moitié des femmes dans la région de Mopti (58 %) et 49 % des femmes à Gao ne sont exposées à aucun média contre 25 % des femmes de Bamako. Chez les hommes, c'est dans la région de Sikasso que le pourcentage d'hommes qui ne sont exposés à aucun média est le plus élevé (48 %), suivi des régions de Mopti (46 %) et de Koulikoro (43 %). En revanche, à Bamako, ce pourcentage n'est que de seulement 26 %.
- Quel que soit le sexe, les pourcentages de celles et ceux qui ne sont pas exposés régulièrement à ces médias baissent avec le niveau d'instruction, passant chez les femmes de 47 % parmi celles sans aucun niveau d'instruction à 31 % parmi celles ayant le niveau secondaire ou plus et, chez les hommes de, respectivement, 46 % à 31 %.

- Du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, le pourcentage de celles et ceux qui ne sont régulièrement exposés à aucun des médias cités diminue de manière importante, passant chez les femmes de 50 % à 29 % et, chez les hommes de 47 % à 27 %.

3.3.2 Utilisation de l'internet

Les **Tableaux 3.5.1** et **3.5.2** présentent les pourcentages des femmes et des hommes de 15–49 ans qui ont utilisé l'internet, et parmi ceux qui l'ont utilisé, la fréquence d'utilisation. Parmi les femmes, 43 % ont déjà utilisé l'internet et 40 % l'ont utilisé au cours des 12 derniers mois. Parmi celles ayant utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois, 47 % l'avaient utilisé presque chaque jour et 37 % au moins une fois par semaine.

Les pourcentages des hommes ayant utilisé l'internet sont plus élevés que chez les femmes ; 63 % l'avaient déjà utilisé et 61 % l'avaient utilisé au cours des 12 derniers mois. Parmi ceux l'ayant utilisé au cours des 12 derniers mois, 56 % l'avaient utilisé presque chaque jour et 36 % au moins une fois par semaine.

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Indépendamment du sexe, c'est dans les groupes d'âges 20–24 et 25–29 ans que l'utilisation de l'internet dans les 12 derniers mois est la plus fréquente.

- L'utilisation de l'internet au cours des 12 derniers mois est plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural (64 % contre 32 % parmi les femmes et 78 % contre 54 % parmi les hommes), en particulier à Bamako (71 % parmi les femmes et 83 % parmi les hommes) (**Graphique 3.4**).

- L'utilisation de l'internet au cours des 12 derniers mois augmente avec le niveau d'instruction, passant chez les femmes, de 25 % parmi celles sans niveau d'instruction à 68 % parmi celles ayant le niveau secondaire ou plus et, chez les hommes, de respectivement 46 % à 77 %.

Graphique 3.4 **Utilisation de l'internet par milieu de résidence**

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans ayant utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois



- Du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, le pourcentage de celles et ceux qui ont utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois augmente de manière importante, passant chez les femmes de 14 % à 73 % et, chez les hommes, de 40 % à 85 %.

3.4 EMPLOI

Actuellement employé

Personnes interrogées qui étaient employées dans les 7 jours précédant l'enquête

Échantillon : Femmes et hommes âgés de 15 à 49 ans

Les **Tableaux 3.6.1** et **3.6.2** présentent les résultats sur l'emploi. Les résultats montrent que 52 % des femmes et 82 % des hommes ont déclaré qu'ils travaillaient au cours des 7 jours avant l'enquête. De plus, 10 % des femmes et des hommes travaillaient au cours des 12 mois avant l'enquête mais ne travaillaient plus au moment de l'enquête. Neuf pour cent des hommes n'avaient pas travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête contre 38 % chez les femmes.

Tendances : Entre 2018 et 2012–2013, le pourcentage des femmes et des hommes de 15–49 ans ayant déclaré avoir travaillé au cours des 12 mois avant l'enquête et qui travaillaient encore au moment de l'enquête a baissé, passant de 55 % à 52 % chez les femmes et de 90 % à 82 % chez les hommes.

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage des hommes qui travaillaient au moment de l'enquête est plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain (85 % contre 76 %). Par contre, chez les femmes, l'écart est moins important et le pourcentage est légèrement plus élevé en urbain qu'en rural (53 % contre 51 %).

- Le pourcentage des femmes qui travaillaient au moment de l'enquête est plus faible parmi celles ayant le niveau secondaire ou plus (47 %) comparé à celles ayant le niveau primaire (57 %) et celles n'ayant aucun niveau d'instruction (53 %). Chez les hommes, 74 % de ceux ayant le niveau secondaire ou plus travaillaient contre 89 % chez ceux ayant le niveau primaire et 88 % parmi ceux n'ayant aucun niveau d'instruction (**Graphique 3.5**).

- Le pourcentage des femmes qui travaillaient au moment de l'enquête augmente avec le nombre d'enfants vivants, passant de 38 % chez celles n'ayant aucun enfant à 61 % chez celles en ayant 5 ou plus.

***Graphique 3.5* Emploi par niveau d'instruction**

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans qui travaillent actuellement



3.5 OCCUPATION

Occupation

Classement selon les catégories suivantes : professionnel/technicien/cadre, employé de bureau, ventes et services, manuel qualifié, manuel non qualifié, service domestique, agriculture et autres.

Échantillon : Femmes et hommes âgés de 15 à 49 ans actuellement employés ou ayant travaillé au cours des 12 mois précédant l'enquête.

Les **Tableaux 3.7.1** et **3.7.2** présentent les résultats sur le type d'occupation des femmes et des hommes. Les femmes travaillent principalement dans les ventes et services (64 %) et dans l'agriculture (17 %). Cinq pour cent occupent un emploi manuel qualifié et 5 % sont employées de maison. Chez les hommes, 29 % sont employés dans l'agriculture, 27 % occupent un emploi manuel qualifié et 25 % sont employés dans les ventes et services. Seulement 4 % des femmes et 7 % des hommes occupaient un emploi qualifié ou de technicien ou de cadre (**Graphique 3.6**).

Par ailleurs, parmi les femmes qui travaillaient au cours des 12 derniers mois, 17 % n'étaient pas rémunérées et 81 % travaillaient à leur compte. Quand les femmes travaillaient dans le secteur agricole, environ 39 % n'étaient pas rémunérées pour leur travail et 29 % étaient employées par un membre de leur famille et la quasi-totalité (87 %) travaillait de manière saisonnière contre 35 % dans l'ensemble (**Tableau 3.8**).

***Graphique 3.6* Occupation**

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans qui ont travaillé au cours des 12 mois précédant l'enquête, par type d'occupation



Tendances : Entre 2018 et 2023–2024, le pourcentage des femmes occupées dans l'agriculture a diminué, passant de 42 % à 17 % ; par contre, le pourcentage de celles travaillant dans les ventes et services a augmenté, passant de 50 % à 64 %. Le pourcentage de celles occupant un emploi qualifié ou de technicien ou de cadre est resté inchangé (4 %). Sur la même période, on constate que le pourcentage des hommes occupés dans l'agriculture a aussi diminué, passant de 52 % à 29 % ; de même le pourcentage de ceux occupant un poste qualifié, de technicien ou d'encadrement a légèrement diminué, passant de 9 % à 7 % et celui des hommes employés dans les ventes et services est passé de 32 % à 25 %.

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Les pourcentages des femmes et des hommes travaillant dans l'agriculture diminuent avec l'augmentation du niveau d'instruction, passant chez les femmes de 23 % parmi celles n'ayant aucun niveau d'instruction à 7 % parmi les plus instruites et chez les hommes, de respectivement 42 % à 16 %.

- Les pourcentages des femmes et des hommes qui sont employés dans l'agriculture diminuent du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, passant, parmi les femmes, de 32 % à moins de 1 % et, parmi les hommes, de 60 % à 3 %.

- Le pourcentage des hommes qui sont occupés dans les ventes et services augmente avec le niveau d'instruction, passant de 23 % chez ceux sans niveau d'instruction à 28 % chez ceux ayant un niveau d'instruction secondaire ou plus. Parmi les femmes, 68 % travaillent dans les ventes et services et ont un niveau d'instruction primaire contre 63 % qui n'ont aucun niveau et 63 % qui ont un niveau secondaire ou plus.

- Du quintile le plus bas au plus élevé, le pourcentage des hommes occupés dans les ventes et services augmente, passant de 14 % à 35 %.

3.6 ASSURANCE MALADIE

L'assurance maladie améliore l'accès aux soins de santé, ce qui contribue à maintenir une bonne santé. Un accès raisonnable aux soins de santé encourage les personnes à recourir plus régulièrement aux services de santé, permettant à terme de prévenir des maladies potentiellement graves. En outre, l'assurance maladie protège les personnes contre les difficultés financières qui peuvent résulter de factures médicales élevées et/ou inattendues.

Les **Tableaux 3.9.1** et **3.9.2** présentent les pourcentages des femmes et des hommes possédant divers types d'assurance maladie et le pourcentage n'en possédant aucune, selon les différentes caractéristiques sociodémographiques. Les résultats montrent que 94 % des femmes ou des hommes ne possèdent pas d'assurance maladie. L'assurance fournie par l'employeur uniquement est le type d'assurance le plus fréquent, aussi bien chez les femmes que chez les hommes (respectivement 5 % et 6 %).

Tendances : Entre 2012–2013 et 2023–2024, on constate une légère amélioration de la couverture par une assurance médicale aussi bien chez les femmes que chez les hommes, passant de 3 % à 6 %.

3.7 USAGE DE TABAC

Les **Tableaux 3.10.1** et **3.10.2** présentent les pourcentages des femmes et des hommes qui consomment du tabac à fumer. Seulement 1 % des femmes fument du tabac, essentiellement des cigarettes. Le pourcentage des hommes qui fument du tabac est nettement plus élevé (13 %) et dans la majorité des cas (13 %), les hommes fument des cigarettes. En outre, 11 % des hommes fument du tabac tous les jours.

Le **Tableau 3.11** présente les pourcentages d'hommes qui fument des cigarettes tous les jours par nombre moyen de cigarettes fumées par jour. Parmi les hommes de 15–49 ans qui fument des cigarettes tous les jours, 18 % en fument moins de 5 par jour, 33 % en fument 5 à 9 et 16 % en fument entre 15 et 24 par jour.

Les **Tableaux 3.12** et **3.13** montrent que globalement, 1 % des femmes et 14 % des hommes de 15–49 ans consomment du tabac sous une forme quelconque. En outre, 1 % des hommes et moins d'un pour cent des femmes consomment du tabac non fumé.

Tendances : La comparaison des résultats avec les enquêtes antérieures laisse apparaître une légère augmentation de la consommation de cigarettes par les femmes (de moins d'un pour cent en 2012–2013 à 1 % en 2023–2024). Cependant chez les hommes, on constate une diminution du pourcentage de consommateurs de cigarettes, de 15 % en 2012–2013 à 13 % en 2023–2024.

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Cinq pour cent des jeunes hommes de 15–19 ans fument du tabac contre 1 % de femmes dans la même tranche d'âge. Cette consommation de tabac est plus élevée dans la tranche de 45–49 ans aussi bien chez les hommes que chez les femmes (respectivement 17 % et 2 %).
- Parmi les hommes, consommer du tabac sous quelque forme que ce soit est plus important en milieu urbain qu'en milieu rural (17 % contre 13 %) (**Tableau 3.13**) Les écarts sont très faibles chez les femmes.
- Indépendamment du sexe et hors Bamako, la consommation de tabac sous n'importe quelle forme est plus élevée dans la région de Gao (24 % chez les hommes et 11 % chez les femmes). Par contre, la région de Koulikoro enregistre le plus faible taux de consommation de tabac chez les femmes (moins de 1 %). Chez les hommes c'est dans la région de Sikasso qu'on enregistre le taux le plus faible de consommation de tabac (9 %).
- Le pourcentage des hommes qui consomment du tabac sous n'importe quelle forme est de 12 % parmi ceux qui n'ont aucun niveau d'instruction, 18 % parmi ceux qui ont un niveau primaire et 14 % parmi les hommes avec un niveau secondaire ou plus. Parmi les femmes, le pourcentage varie peu (autour de 1 %).

3.8 CONSOMMATION D'ALCOOL

Les **Tableaux 3.14.1** et **3.14.2** présentent les résultats sur la consommation d'alcool par les femmes et les hommes de 15–49 ans. Au Mali, au cours du mois ayant précédé l'enquête, 1 % des femmes avaient consommé de l'alcool. Parmi ces femmes, 86 % en avaient consommé entre 1 et 10 jours. Six pour cent en avaient consommé chaque jour ou presque chaque jour. Parmi les femmes ayant consommé de l'alcool au cours du mois dernier, sept femmes sur dix (70 %) avaient bu, en moyenne, 1 à 2 verres et 12 % au moins 6 verres les jours où de l'alcool a été consommé (**Tableau 3.15.1**).

La consommation d'alcool est un peu plus fréquente chez les hommes que chez les femmes : au cours du mois ayant précédé l'enquête, 2 % des hommes de 15–49 ans contre 1 % des femmes avaient consommé de l'alcool. Parmi ces hommes, 75 % en avaient consommé entre 1 et 10 jours. En outre, 11 % des hommes ont consommé au moins un verre d'alcool entre 11 et 24 jours. En ce qui concerne le nombre habituel de verres d'alcool consommés les jours où de l'alcool a été bu, on constate qu'il est en moyenne de 1 ou 2 verres pour 61 % des hommes. Par ailleurs, 9 % des hommes ont consommé 6 verres ou plus le jour où de l'alcool a été bu (**Tableau 3.15.1** et **3.15.2**).

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- La proportion de femmes et d'hommes ayant consommé de l'alcool au cours du mois dernier augmente avec l'âge, passant chez les femmes de moins d'un pour cent chez les 15–19 ans à un pour cent chez les 45–49 ans et chez les hommes d'un pour cent chez les 15–19 ans à 4 % chez les 45–49 ans.

- La consommation d'alcool varie de manière importante entre les régions : que ce soit parmi les femmes ou parmi les hommes, c'est dans la région de Ségou que la consommation d'alcool est la plus élevée (2 % pour les femmes et 5 % pour les hommes). Par contre, dans les régions du Nord, elle est très faible.

3.9 LIEU DE RÉSIDENCE À LA NAISSANCE ET MIGRATION RÉCENTE

Migration récente

Pourcentage de personnes enquêtées qui sont nées hors de leur lieu de résidence actuelle et qui ont emménagé dans leur lieu de résidence actuelle au cours des 5 années précédant l'enquête.

Échantillon : Femmes et hommes âgés de 15 à 49 ans nés hors de leur lieu de résidence actuel.

Le **Tableau 3.16.1** montre que 50 % des femmes de 15–49 ans ont toujours vécu dans leur lieu de résidence actuel ; 46 % sont nées au Mali mais hors de leur lieu de résidence actuel et 5 % sont nées hors du Mali. Par ailleurs, parmi celles nées hors de leur lieu de résidence actuel, 32 % avaient emménagé au cours des cinq dernières années dans leur lieu de résidence actuel. Le **Tableau 3.16.2** montre que 64 % des hommes ont toujours vécu dans leur lieu de résidence actuel ; 32 % sont nés au Mali mais hors de leur lieu de résidence actuel et 4 % sont nés hors du Mali. Parmi les hommes nés hors de leur lieu de résidence actuel, 33 % avaient emménagé au cours des cinq dernières années dans leur lieu de résidence actuel.

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Les pourcentages de personnes ayant emménagé récemment dans leur lieu de résidence actuel varient avec l'âge, cela aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Ce pourcentage varie de 65 % chez les femmes de 15–19 ans à 8 % chez les femmes 45–49 ans. Chez les hommes, il varie de respectivement 47 % à 16 %. En outre, les écarts entre les groupes d'âges sont plus marqués chez les femmes que chez les hommes.

- Chez les femmes, la migration récente est plus fréquente en milieu urbain (41 %) qu'en milieu rural (29 %). Chez les hommes en revanche, on observe l'inverse (25 % en urbain contre 37 % en rural).
- Du quintile le plus bas au plus élevé, le pourcentage de femmes ayant migré récemment augmente, passant de 20 % à 44 %.

3.9.1 Type de migration

Le **Tableau 3.17** présente les résultats concernant le type de migration, en termes de lieu de départ et de destination. Les femmes qui ont migré récemment se sont surtout déplacées à l'intérieur du milieu rural (38 %) puis de l'urbain vers rural (26 %). Les hommes ont migré en majorité du milieu urbain vers le milieu rural (40 %) puis du rural vers le rural (34 %). Environ un homme sur six (16 %) s'est déplacé à l'intérieur du milieu urbain.

3.9.2 Raison de la migration

Les résultats montrent que les femmes et les hommes migrent pour des raisons différentes : pour plus de la moitié des femmes (57 %), la raison de la migration récente est le mariage, suivi du rapprochement familial ou d'autres motifs liés à la famille (31 %). Dans seulement 6 % des cas, c'est l'emploi qui est la raison du déplacement et dans seulement 3 % des cas, ce sont les études ou la poursuite d'une formation qui ont motivé la migration. Par contre, chez les hommes, c'est le rapprochement familial ou d'autres motifs liés à la famille qui est la raison la plus importante de la migration (43 %) suivi dans 36 % des cas par des raisons liées à l'emploi et enfin, dans 13 % des cas, pour des raisons liées à la poursuite d'études et de formation (**Tableau 3.18.1** et **Tableau 3.18.2**).

Dans le contexte d'insécurité actuel au Mali, 3 % des femmes ayant migré au cours des cinq dernières années ont mentionné le déplacement forcé en raison d'attaques de groupes armés comme cause de leur migration. Ce pourcentage est légèrement plus élevé chez les hommes (5 %).

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur les caractéristiques des personnes enquêtées, voir les tableaux suivants :

- **Tableau 3.1 Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés**
- **Tableau 3.2.1 Niveau d'instruction : Femme**
- **Tableau 3.2.2 Niveau d'instruction : Homme**
- **Tableau 3.3.1 Alphabétisation : Femme**
- **Tableau 3.3.2 Alphabétisation : Homme**
- **Tableau 3.4.1 Exposition aux médias : Femme**
- **Tableau 3.4.2 Exposition aux médias : Homme**
- **Tableau 3.5.1 Utilisation de l'internet : Femme**
- **Tableau 3.5.2 Utilisation de l'internet : Homme**
- **Tableau 3.6.1 Emploi : Femme**
- **Tableau 3.6.2 Emploi : Homme**
- **Tableau 3.7.1 Occupation : Femme**
- **Tableau 3.7.2 Occupation : Homme**
- **Tableau 3.8 Type d'emploi : Femme**
- **Tableau 3.9.1 Couverture médicale : Femme**
- **Tableau 3.9.2 Couverture médicale : Homme**
- **Tableau 3.10.1 Consommation de tabac à fumer : Femme**
- **Tableau 3.10.2 Consommation de tabac à fumer : Homme**
- **Tableau 3.11 Nombre moyen de cigarettes fumées par jour : Homme**
- **Tableau 3.12 Consommation de tabac non fumé et de tabac sous n'importe quelle forme**
- **Tableau 3.13 Consommation de tabac par caractéristique sociodémographique**
- **Tableau 3.14.1 Consommation d'alcool : Femme**
- **Tableau 3.14.2 Consommation d'alcool : Homme**
- **Tableau 3.15.1 Nombre habituel de verres d'alcool consommés : Femme**
- **Tableau 3.15.2 Nombre habituel de verres d'alcool consommés : Homme**
- **Tableau 3.16.1 Lieu de résidence à la naissance et migration récente : Femmes**
- **Tableau 3.16.2 Lieu de résidence à la naissance et migration récente : Hommes**
- **Tableau 3.17 Type de migration**
- **Tableau 3.18.1 Raison de la migration : Femme**
- **Tableau 3.18.2 Raison de la migration : Homme**

Tableau 3.1 Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés

Répartition (en %) des femmes et des hommes enquêtés de 15–49 ans par certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Femme			Homme		
	Pourcentage pondéré	Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Pourcentage pondéré	Effectif pondéré	Effectif non pondéré
Âge						
15–19	22,3	3 862	3 935	25,0	1 669	1 684
20–24	19,5	3 378	3 345	17,4	1 165	1 142
25–29	16,7	2 905	2 853	13,9	930	912
30–34	13,7	2 382	2 396	13,6	909	889
35–39	11,9	2 065	1 995	11,7	784	772
40–44	9,1	1 586	1 558	9,9	663	670
45–49	6,7	1 169	1 120	8,5	568	574
État de santé autodéclaré						
Très bon	33,1	5 741	5 731	54,6	3 648	3 657
Bon	47,8	8 288	8 419	35,5	2 373	2 407
Moyennement bon	17,2	2 976	2 736	9,1	608	525
Mauvais	1,9	325	303	0,8	54	50
Très mauvais	0,1	18	13	0,0	3	4
Religion						
Musulmane	94,8	16 439	16 484	93,9	6 278	6 328
Chrétienne	2,8	480	398	2,8	189	152
Animiste	0,3	52	40	1,4	96	72
Autre	0,0	0	0	0,0	2	1
Sans religion	2,2	377	280	1,8	121	90
Ethnie						
Bambara	31,0	5 384	4 241	30,6	2 045	1 587
Malinké	10,3	1 780	1 536	12,0	800	675
Peulh	13,2	2 281	2 135	12,2	816	772
Sarakolé/Soninké/Marka	10,9	1 898	1 702	9,3	620	569
Khassonké	0,9	153	158	0,8	53	51
Sonraï	4,1	711	1 343	3,9	262	563
Dogon	7,4	1 286	1 200	6,8	456	426
Touareg/Bella	2,4	410	1 434	2,4	161	448
Sénoufo/Minianka	10,8	1 868	1 468	12,1	811	605
Bobo	2,5	437	355	2,3	157	121
Bozo	3,4	592	603	2,6	177	179
Arabe/Maure	0,9	158	682	0,7	46	391
Autre ethnie malienne	1,3	230	193	3,2	215	199
Pays CEDEAO	0,4	70	71	0,3	23	22
Autres pays africains	0,3	47	45	0,5	36	27
Autres nationalités	0,2	40	36	0,1	7	8
État matrimonial						
Célibataire	20,7	3 585	3 646	46,8	3 127	3 099
Actuellement en union	76,3	13 237	12 900	52,5	3 512	3 496
En rupture d'union	3,0	525	656	0,7	47	48
Résidence						
Bamako	15,4	2 675	2 376	17,6	1 177	1 027
Autre urbain	11,8	2 048	2 744	11,9	795	1 065
Ensemble urbain	27,2	4 723	5 120	29,5	1 971	2 092
Rural	72,8	12 624	12 082	70,5	4 714	4 551
Région						
Kayes	15,2	2 635	2 673	13,8	920	899
Koulikoro	23,2	4 018	2 703	24,5	1 637	1 080
Sikasso	18,1	3 143	2 343	18,2	1 215	889
Ségou	14,8	2 574	2 204	14,0	939	832
Mopti	8,8	1 530	1 798	7,5	505	601
Tombouctou	1,6	281	1 774	1,9	128	862
Gao	2,8	485	1 141	2,4	163	368
Kidal	†	6	190	†	2	85
Bamako	15,4	2 675	2 376	17,6	1 177	1 027
Niveau d'instruction						
Aucun	54,1	9 382	9 816	37,0	2 476	2 790
Primaire	16,9	2 926	2 766	20,2	1 352	1 296
Secondaire ou plus	29,0	5 039	4 620	42,7	2 858	2 557
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	17,5	3 036	2 630	17,6	1 179	972
Second	18,1	3 143	3 035	17,6	1 174	1 186
Moyen	19,1	3 318	4 046	17,8	1 190	1 527
Quatrième	21,2	3 676	3 723	21,6	1 446	1 428
Le plus élevé	24,1	4 174	3 768	25,4	1 697	1 530

À suivre...

Tableau 3.1—*Suite*

Caractéristique sociodémographique	Femme			Homme		
	Pourcentage pondéré	Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Pourcentage pondéré	Effectif pondéré	Effectif non pondéré
Ensemble 15–49	100,0	17 347	17 202	100,0	6 686	6 643
50–64	na	3 007	3 152	na	1 143	1 186
Ensemble 15–64	na	20 354	20 354	na	7 829	7 829

Note : Le niveau d'instruction correspond au plus haut niveau d'instruction atteint, qu'il ait été achevé ou non.
na = non applicable
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 3.2.1 Niveau d'instruction : Femme

Répartition (en %) des femmes de 15–49 ans en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années d'instruction achevées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Plus haut niveau d'instruction atteint						Total	Nombre médian d'années complétées	Effectif de femmes
	Aucun niveau	Primaire incomplet	Primaire complet[1]	Secondaire incomplet	Secondaire complet[2]	Supérieur			
Âge									
15–24	38,6	16,5	4,2	33,2	3,7	3,7	100,0	4,1	7 240
15–19	35,1	17,2	4,6	38,4	3,1	1,7	100,0	4,6	3 862
20–24	42,7	15,8	3,7	27,3	4,5	6,0	100,0	3,3	3 378
25–29	51,5	13,7	3,2	24,6	3,1	3,9	100,0	a	2 905
30–34	59,2	11,9	2,4	19,5	2,8	4,2	100,0	a	2 382
35–39	71,4	10,5	2,6	11,6	1,4	2,4	100,0	a	2 065
40–44	79,4	9,9	1,7	6,7	0,9	1,4	100,0	a	1 586
45–49	80,9	9,5	2,3	5,6	0,4	1,3	100,0	a	1 169
Résidence									
Bamako	31,0	12,6	4,1	35,2	6,7	10,4	100,0	6,1	2 675
Autre urbain	34,9	12,1	2,9	38,6	7,3	4,2	100,0	5,5	2 048
Ensemble urbain	32,7	12,4	3,6	36,7	7,0	7,7	100,0	5,8	4 723
Rural	62,1	14,1	3,1	17,9	1,1	1,6	100,0	a	12 624
Région									
Kayes	58,9	18,6	3,0	17,4	1,1	0,9	100,0	a	2 635
Koulikoro	53,0	13,7	3,2	23,9	2,2	4,0	100,0	a	4 018
Sikasso	59,8	11,4	3,4	21,2	3,2	1,1	100,0	a	3 143
Ségou	59,0	12,9	3,5	21,8	1,2	1,6	100,0	a	2 574
Mopti	64,0	12,1	1,7	19,1	1,6	1,5	100,0	a	1 530
Tombouctou	68,4	10,8	2,9	14,6	1,8	1,5	100,0	a	281
Gao	61,8	16,6	2,4	15,4	2,8	0,9	100,0	a	485
Kidal	†	†	†	†	†	†	100,0	†	6
Bamako	31,0	12,6	4,1	35,2	6,7	10,4	100,0	6,1	2 675
Quintile de bien-être économique									
Le plus bas	77,1	11,9	2,6	8,3	0,2	0,0	100,0	a	3 036
Second	70,5	15,2	2,5	11,4	0,2	0,2	100,0	a	3 143
Moyen	62,1	15,9	3,6	17,1	1,0	0,4	100,0	a	3 318
Quatrième	44,2	13,7	3,6	32,9	3,7	2,0	100,0	3,1	3 676
Le plus élevé	27,4	11,8	3,8	38,6	7,0	11,5	100,0	7,1	4 174
Ensemble 15–49	54,1	13,6	3,3	23,0	2,7	3,3	100,0	a	17 347
50–64	84,6	6,8	1,9	5,8	0,3	0,6	100,0	a	3 007
Ensemble 15–64	58,6	12,6	3,0	20,5	2,4	2,9	100,0	a	20 354

a = non calculé parce que plus de 50 % de femmes ont complété 0 années d'instruction
[1] A achevé 6 classes du niveau primaire. Le niveau primaire correspond au 1er cycle de l'école fondamentale.
[2] A achevé 6 classes du niveau secondaire. Le niveau secondaire comprend le 2e cycle de l'école fondamentale, le secondaire général, les écoles techniques et professionnelles.
† : Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 3.2.2 Niveau d'instruction : Homme

Répartition (en %) des hommes de 15–49 ans en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années d'instruction achevées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Plus haut niveau d'instruction atteint						Total	Nombre médian d'années complétées	Effectif d'hommes
	Aucun niveau	Primaire incomplet	Primaire complet[1]	Secondaire incomplet	Secondaire complet[2]	Supérieur			
Âge									
15–24	24,6	16,6	5,9	39,4	7,4	6,0	100,0	7,0	2 833
15–19	24,2	16,8	5,8	45,4	5,9	1,9	100,0	7,0	1 669
20–24	25,3	16,3	6,1	30,9	9,5	12,0	100,0	7,1	1 165
25–29	30,9	14,2	5,1	32,0	6,5	11,3	100,0	5,8	930
30–34	37,9	14,8	5,2	24,8	6,8	10,5	100,0	4,4	909
35–39	47,9	12,5	4,2	19,8	4,3	11,3	100,0	1,6	784
40–44	58,7	13,5	5,4	14,6	1,6	6,3	100,0	a	663
45–49	67,2	12,7	4,3	9,2	2,0	4,7	100,0	a	568
Résidence									
Bamako	16,0	8,8	5,0	37,2	11,2	21,8	100,0	8,5	1 177
Autre urbain	18,9	12,4	5,0	42,7	11,8	9,1	100,0	8,0	795
Ensemble urbain	17,2	10,3	5,0	39,4	11,4	16,7	100,0	8,3	1 971
Rural	45,3	16,8	5,5	24,7	3,4	4,2	100,0	2,5	4 714
Région									
Kayes	41,4	18,9	5,7	28,0	3,4	2,7	100,0	3,3	920
Koulikoro	33,0	16,0	5,8	29,7	6,2	9,2	100,0	5,1	1 637
Sikasso	44,3	14,9	6,1	25,7	5,6	3,4	100,0	3,3	1 215
Ségou	41,5	16,8	5,2	30,8	3,0	2,7	100,0	3,5	939
Mopti	58,1	11,3	3,7	20,0	3,1	3,8	100,0	a	505
Tombouctou	64,2	9,6	4,7	16,0	2,3	3,2	100,0	a	128
Gao	38,4	29,7	0,8	23,5	4,5	3,1	100,0	2,4	163
Kidal	†	†	†	†	†	†	100,0	†	2
Bamako	16,0	8,8	5,0	37,2	11,2	21,8	100,0	8,5	1 177
Quintile de bien-être économique									
Le plus bas	58,5	19,0	6,1	16,0	0,4	0,1	100,0	a	1 179
Second	52,9	18,3	5,7	20,1	1,9	1,2	100,0	a	1 174
Moyen	42,9	19,3	5,2	28,1	2,8	1,7	100,0	2,9	1 190
Quatrième	30,8	13,7	5,9	36,5	6,6	6,5	100,0	5,7	1 446
Le plus élevé	12,4	7,7	4,2	38,7	13,6	23,6	100,0	9,9	1 697
Ensemble 15–49	37,0	14,9	5,3	29,1	5,8	7,9	100,0	4,6	6 686
50–64	66,3	13,5	4,1	10,3	1,6	4,3	100,0	a	1 143
Ensemble 15–64	41,3	14,7	5,1	26,3	5,2	7,4	100,0	3,8	7 829

a = non calculé parce que plus de 50 % de femmes ont complété 0 années d'instruction

[1] A achevé 6 classes du niveau primaire. Le niveau primaire correspond au 1er cycle de l'école fondamentale.

[2] A achevé 6 classes du niveau secondaire. Le niveau secondaire comprend le 2e cycle de l'école fondamentale, le secondaire général, les écoles techniques et professionnelles.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 3.3.1 Alphabétisation : Femme

Répartition (en %) des femmes de 15–49 ans par niveau d'instruction atteint et niveau d'alphabétisation et pourcentage de femmes alphabétisées selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Supérieur	Pas d'instruction, niveau primaire ou secondaire					Total	Pourcentage alphabétisée[1]	Effectif de femmes
		Peut lire une phrase entière	Peut lire une partie de phrase	Ne peut pas lire	Pas de carte dans la langue de l'enquêtée	Aveugle/ malvoyante			
Âge									
15–24	3,7	26,1	12,6	55,4	2,2	0,0	100,0	42,4	7 240
15–19	1,7	29,3	14,2	52,1	2,7	0,0	100,0	45,2	3 862
20–24	6,0	22,6	10,7	59,2	1,5	0,0	100,0	39,3	3 378
25–29	3,9	20,2	9,9	64,8	1,1	0,1	100,0	34,0	2 905
30–34	4,2	17,1	8,3	69,4	0,9	0,0	100,0	29,6	2 382
35–39	2,4	10,4	6,9	79,0	1,3	0,0	100,0	19,7	2 065
40–44	1,4	7,1	5,3	85,2	1,0	0,0	100,0	13,8	1 586
45–49	1,3	7,2	4,4	85,8	1,2	0,1	100,0	12,9	1 169
Résidence									
Bamako	10,4	32,1	10,3	43,3	3,8	0,1	100,0	52,8	2 675
Autre urbain	4,2	34,6	11,8	47,8	1,5	0,1	100,0	50,7	2 048
Ensemble urbain	7,7	33,2	10,9	45,2	2,8	0,1	100,0	51,9	4 723
Rural	1,6	13,7	9,2	74,4	1,1	0,0	100,0	24,5	12 624
Région									
Kayes	0,9	13,4	9,8	74,5	1,3	0,0	100,0	24,2	2 635
Koulikoro	4,0	19,6	10,1	65,0	1,3	0,0	100,0	33,7	4 018
Sikasso	1,1	16,9	9,8	71,4	0,8	0,0	100,0	27,8	3 143
Ségou	1,6	17,2	8,7	71,8	0,7	0,0	100,0	27,5	2 574
Mopti	1,5	14,7	8,2	74,1	1,5	0,1	100,0	24,3	1 530
Tombouctou	1,5	13,5	9,7	74,8	0,5	0,0	100,0	24,7	281
Gao	0,9	11,9	10,3	74,6	2,3	0,0	100,0	23,2	485
Kidal	†	†	†	†	†	†	100,0	†	6
Bamako	10,4	32,1	10,3	43,3	3,8	0,1	100,0	52,8	2 675
Quintile de bien-être économique									
Le plus bas	0,0	6,2	7,5	85,9	0,4	0,0	100,0	13,7	3 036
Second	0,2	7,8	9,3	82,1	0,7	0,0	100,0	17,2	3 143
Moyen	0,4	11,7	8,7	77,6	1,7	0,0	100,0	20,8	3 318
Quatrième	2,0	25,5	12,3	58,3	1,9	0,0	100,0	39,8	3 676
Le plus élevé	11,5	36,9	9,9	39,1	2,6	0,1	100,0	58,2	4 174
Ensemble 15–49	3,3	19,0	9,6	66,5	1,5	0,0	100,0	31,9	17 347
50–64	0,6	6,4	3,8	88,7	0,5	0,1	100,0	10,7	3 007
Ensemble 15–64	2,9	17,1	8,8	69,8	1,4	0,0	100,0	28,8	20 354

[1] Comprend les femmes qui ont fréquenté l'école au niveau supérieur et celles qui ont un niveau d'instruction plus faible que le supérieur qui peuvent lire une phrase entière ou une partie de phrase

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 3.3.2 Alphabétisation : Homme

Répartition (en %) des hommes de 15–49 ans par niveau d'instruction atteint et niveau d'alphabétisation et pourcentage d'hommes alphabétisés selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Pas d'instruction, niveau primaire ou secondaire						Total	Pourcentage alphabétisé[1]	Effectif d'hommes
	Supérieur	Peut lire une phrase entière	Peut lire une partie de phrase	Ne peut pas lire	Pas de carte dans la langue de l'enquêtée	Aveugle/ malvoyant			
Âge									
15–24	6,0	36,2	14,3	42,2	1,2	0,0	100,0	56,6	2 833
15–19	1,9	39,9	15,2	42,1	0,9	0,0	100,0	57,0	1 669
20–24	12,0	30,9	13,1	42,4	1,6	0,0	100,0	56,0	1 165
25–29	11,3	29,2	15,6	43,2	0,7	0,0	100,0	56,1	930
30–34	10,5	25,6	14,6	48,2	1,2	0,0	100,0	50,7	909
35–39	11,3	22,1	9,4	55,9	1,3	0,0	100,0	42,8	784
40–44	6,3	17,1	10,9	63,4	2,1	0,3	100,0	34,3	663
45–49	4,7	14,6	12,0	66,3	2,4	0,0	100,0	31,3	568
Résidence									
Bamako	21,8	40,1	15,4	20,6	1,9	0,1	100,0	77,3	1 177
Autre urbain	9,1	43,7	19,1	27,4	0,8	0,0	100,0	71,8	795
Ensemble urbain	16,7	41,6	16,9	23,3	1,4	0,1	100,0	75,1	1 971
Rural	4,2	22,9	12,0	59,6	1,3	0,0	100,0	39,1	4 714
Région									
Kayes	2,7	27,7	11,2	57,1	1,3	0,0	100,0	41,6	920
Koulikoro	9,2	29,2	10,2	50,8	0,7	0,0	100,0	48,5	1 637
Sikasso	3,4	25,0	16,3	53,7	1,6	0,0	100,0	44,7	1 215
Ségou	2,7	24,2	17,0	56,0	0,1	0,0	100,0	43,9	939
Mopti	3,8	20,3	10,4	62,0	3,6	0,0	100,0	34,4	505
Tombouctou	3,2	21,7	7,9	67,2	0,0	0,0	100,0	32,8	128
Gao	3,1	20,4	16,3	56,6	3,6	0,0	100,0	39,8	163
Kidal	†	†	†	†	†	†	100,0	†	2
Bamako	21,8	40,1	15,4	20,6	1,9	0,1	100,0	77,3	1 177
Quintile de bien-être économique									
Le plus bas	0,1	12,7	13,5	72,5	1,2	0,0	100,0	26,3	1 179
Second	1,2	18,4	9,6	69,0	1,9	0,0	100,0	29,1	1 174
Moyen	1,7	23,0	15,3	58,9	1,2	0,0	100,0	39,9	1 190
Quatrième	6,5	34,2	15,5	42,5	1,3	0,1	100,0	56,1	1 446
Le plus élevé	23,6	45,1	13,1	17,1	1,1	0,1	100,0	81,7	1 697
Ensemble 15–49	7,9	28,4	13,4	48,9	1,3	0,0	100,0	49,7	6 686
50–64	4,3	17,7	10,4	65,9	1,6	0,1	100,0	32,4	1 143
Ensemble 15–64	7,4	26,8	13,0	51,4	1,4	0,0	100,0	47,2	7 829

[1] Comprend les hommes qui ont fréquenté l'école au niveau supérieur et ceux qui ont un niveau d'instruction plus faible que le supérieur qui peuvent lire une phrase entière ou une partie de phrase

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 3.4.1 Exposition aux médias : Femme

Pourcentage de femmes de 15–49 ans qui sont exposées à certains médias, au moins, une fois par semaine, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Lit un journal, au moins, une fois par semaine	Regarde la télévision, au mois, une fois par semaine	Écoute la radio, au moins, une fois par semaine	Accède aux trois médias, au moins, une fois par semaine	N'accède à aucun des trois médias, au moins, une fois par semaine	Effectif de femmes
Âge						
15–19	4,0	45,7	31,2	1,6	42,0	3 862
20–24	4,2	41,8	36,2	1,7	42,4	3 378
25–29	2,4	41,3	41,5	1,0	40,0	2 905
30–34	3,6	42,1	43,7	2,1	38,6	2 382
35–39	1,7	38,4	43,7	1,2	41,5	2 065
40–44	1,2	37,1	47,1	0,9	38,4	1 586
45–49	2,0	36,5	49,8	1,5	37,8	1 169
Résidence						
Bamako	5,5	62,5	39,5	2,3	25,1	2 675
Autre urbain	6,6	57,1	45,9	3,5	28,8	2 048
Ensemble urbain	6,0	60,2	42,3	2,8	26,7	4 723
Rural	1,9	34,4	38,9	1,0	45,8	12 624
Région						
Kayes	2,1	39,8	44,3	0,8	36,8	2 635
Koulikoro	2,8	33,0	37,7	1,6	47,2	4 018
Sikasso	3,7	52,1	46,3	1,9	32,5	3 143
Ségou	1,6	32,8	39,3	0,7	47,5	2 574
Mopti	1,5	30,4	23,9	0,9	58,0	1 530
Tombouctou	2,3	23,1	42,7	0,7	46,9	281
Gao	5,2	25,1	43,6	3,6	49,3	485
Kidal	†	†	†	†	†	6
Bamako	5,5	62,5	39,5	2,3	25,1	2 675
Niveau d'instruction						
Aucun	0,2	31,7	40,1	0,1	46,8	9 382
Primaire	1,4	44,5	42,3	0,7	38,1	2 926
Secondaire ou plus	9,3	57,8	37,8	4,5	30,5	5 039
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	0,7	25,4	39,5	0,1	49,7	3 036
Second	0,5	28,7	39,9	0,1	49,1	3 143
Moyen	1,8	34,3	40,8	0,7	44,7	3 318
Quatrième	3,4	47,5	44,1	1,7	35,4	3 676
Le plus élevé	7,3	63,0	35,4	3,8	28,9	4 174
Ensemble 15–49	3,0	41,4	39,8	1,5	40,6	17 347
50–64	1,4	32,0	49,7	0,7	40,0	3 007
Ensemble 15–64	2,8	40,0	41,3	1,4	40,5	20 354

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 3.4.2 Exposition aux médias : Homme

Pourcentage d'hommes de 15–49 ans qui sont exposés à certains médias, au moins, une fois par semaine, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Lit un journal, au moins, une fois par semaine	Regarde la télévision, au mois, une fois par semaine	Écoute la radio, au moins, une fois par semaine	Exposé aux trois médias, au moins, une fois par semaine	Exposé à aucun des trois médias, au moins, une fois par semaine	Effectif d'hommes
Âge						
15–19	2,3	46,5	21,2	1,2	46,1	1 669
20–24	4,6	43,9	27,1	2,2	43,4	1 165
25–29	5,8	47,2	38,1	2,1	36,5	930
30–34	6,7	45,6	42,9	4,4	36,3	909
35–39	10,3	45,9	46,8	6,1	32,7	784
40–44	7,6	47,9	49,3	4,4	30,4	663
45–49	4,7	45,2	50,5	3,2	33,2	568
Résidence						
Bamako	7,9	64,6	30,5	3,5	25,9	1 177
Autre urbain	6,6	52,3	33,4	4,0	38,6	795
Ensemble urbain	7,4	59,6	31,7	3,7	31,0	1 971
Rural	4,6	40,2	37,5	2,7	41,9	4 714
Région						
Kayes	1,8	51,2	20,1	1,2	40,5	920
Koulikoro	9,4	42,0	40,1	6,0	42,5	1 637
Sikasso	2,7	35,2	34,3	1,1	48,4	1 215
Ségou	3,4	47,2	44,6	1,4	32,1	939
Mopti	1,7	38,0	38,1	1,3	45,5	505
Tombouctou	4,0	31,6	52,0	3,7	37,1	128
Gao	13,5	30,2	61,7	8,3	30,5	163
Kidal	†	†	†	†	†	2
Bamako	7,9	64,6	30,5	3,5	25,9	1 177
Niveau d'instruction						
Aucun	0,6	32,6	38,4	0,3	46,2	2 476
Primaire	1,8	41,5	36,3	1,2	41,3	1 352
Secondaire ou plus	11,4	59,6	33,4	6,3	31,0	2 858
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	1,3	28,0	40,7	0,5	46,8	1 179
Second	2,1	32,9	34,7	0,9	48,3	1 174
Moyen	3,0	42,8	35,7	1,6	40,4	1 190
Quatrième	5,8	49,8	38,0	3,7	36,7	1 446
Le plus élevé	12,0	66,4	31,4	6,6	27,1	1 697
Ensemble 15–49	5,4	46,0	35,8	3,0	38,7	6 686
50–64	4,6	43,3	59,1	3,5	26,8	1 143
Ensemble 15–64	5,3	45,6	39,2	3,1	37,0	7 829

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 3.5.1 Utilisation d'internet : Femme

Pourcentage de femmes de 15–49 ans qui ont déjà utilisé internet et pourcentage qui ont utilisé internet au cours des 12 derniers mois ; parmi les femmes ayant utilisé internet au cours des 12 derniers mois, répartition (en %) par fréquence d'utilisation d'internet au cours du mois dernier, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	A déjà utilisé internet	A utilisé internet au cours des 12 derniers mois	Effectif de femmes	Parmi les femmes ayant utilisé internet au cours des 12 derniers mois, pourcentage qui, au cours du mois dernier, l'ont utilisé : Presque chaque jour	Au moins une fois par semaine	Moins d'une fois par semaine	Pas du tout	Total	Effectif de femmes
Âge									
15–19	44,7	42,0	3 862	44,4	36,4	14,5	4,6	100,0	1 623
20–24	54,7	51,0	3 378	47,6	37,6	11,9	3,0	100,0	1 721
25–29	46,4	43,3	2 905	48,3	35,2	13,2	3,3	100,0	1 259
30–34	42,9	39,7	2 382	46,0	40,5	10,4	3,1	100,0	945
35–39	36,2	34,0	2 065	49,5	34,5	13,8	2,2	100,0	702
40–44	29,4	27,5	1 586	41,1	38,5	16,1	4,3	100,0	436
45–49	27,8	25,8	1 169	48,5	35,6	14,8	1,1	100,0	302
Résidence									
Bamako	71,8	70,5	2 675	55,9	31,7	10,2	2,2	100,0	1 885
Autre urbain	57,4	54,5	2 048	50,5	36,6	11,2	1,6	100,0	1 116
Ensemble urbain	65,5	63,6	4 723	53,9	33,5	10,6	2,0	100,0	3 001
Rural	34,7	31,6	12 624	41,1	39,5	15,0	4,4	100,0	3 986
Région									
Kayes	58,0	53,3	2 635	44,1	39,1	10,5	6,4	100,0	1 404
Koulikoro	44,9	42,8	4 018	45,5	38,3	12,4	3,8	100,0	1 720
Sikasso	25,8	22,7	3 143	47,2	34,4	16,2	2,1	100,0	714
Ségou	28,5	25,0	2 574	27,9	45,7	24,7	1,8	100,0	644
Mopti	32,1	29,4	1 530	43,5	41,3	14,8	0,3	100,0	450
Tombouctou	23,8	21,3	281	49,6	26,1	20,3	4,0	100,0	60
Gao	25,2	22,2	485	51,7	30,3	11,3	6,7	100,0	108
Kidal	†	†	6	†	†	†	†	100,0	3
Bamako	71,8	70,5	2 675	55,9	31,7	10,2	2,2	100,0	1 885
Niveau d'instruction									
Aucun	27,4	24,6	9 382	36,9	41,1	17,6	4,4	100,0	2 311
Primaire	46,6	42,3	2 926	40,1	40,3	15,3	4,4	100,0	1 239
Secondaire ou plus	70,4	68,2	5 039	55,5	32,9	9,3	2,3	100,0	3 438
Quintile de bien-être économique									
Le plus bas	18,1	14,3	3 036	27,2	42,7	24,4	5,8	100,0	433
Second	24,0	20,9	3 143	26,2	44,6	22,6	6,6	100,0	658
Moyen	32,1	29,0	3 318	35,6	41,9	16,7	5,7	100,0	961
Quatrième	54,2	51,1	3 676	40,3	43,2	13,7	2,8	100,0	1 878
Le plus élevé	74,7	73,2	4 174	61,1	29,0	8,0	1,9	100,0	3 057
Ensemble 15–49	43,1	40,3	17 347	46,6	36,9	13,1	3,4	100,0	6 987
50–64	17,0	15,9	3 007	41,6	40,6	16,1	1,7	100,0	477
Ensemble 15–64	39,3	36,7	20 354	46,3	37,2	13,3	3,3	100,0	7 464

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 3.5.2 Utilisation d'internet : Homme

Pourcentage d'hommes de 15–49 ans qui ont déjà utilisé internet et pourcentage qui ont utilisé internet au cours des 12 derniers mois ; parmi les hommes ayant utilisé internet au cours des 12 derniers mois, répartition (en %) par fréquence d'utilisation d'internet au cours du mois dernier, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	A déjà utilisé internet	A utilisé internet au cours des 12 derniers mois	Effectif de femmes	Parmi les hommes ayant utilisé internet au cours des 12 derniers mois, pourcentage qui, au cours du mois dernier, l'ont utilisé : Presque chaque jour	Au moins une fois par semaine	Moins d'une fois par semaine	Pas du tout	Total	Effectif d'hommes
Âge									
15–19	45,8	43,8	1 669	34,2	52,8	10,9	2,0	100,0	731
20–24	77,8	75,7	1 165	59,1	33,2	6,5	1,2	100,0	881
25–29	78,5	76,1	930	61,6	32,6	4,3	1,6	100,0	707
30–34	74,1	71,2	909	59,7	30,9	7,8	1,6	100,0	647
35–39	66,6	64,9	784	61,7	31,8	4,8	1,7	100,0	509
40–44	55,9	54,1	663	63,8	28,5	7,2	0,5	100,0	359
45–49	46,3	45,3	568	56,2	36,0	6,9	0,9	100,0	257
Résidence									
Bamako	84,3	82,5	1 177	68,4	27,6	3,2	0,9	100,0	971
Autre urbain	72,5	71,2	795	68,1	25,7	4,7	1,5	100,0	566
Ensemble urbain	79,5	78,0	1 971	68,3	26,9	3,7	1,1	100,0	1 537
Rural	56,4	54,2	4 714	48,2	41,2	8,9	1,7	100,0	2 554
Région									
Kayes	66,8	65,5	920	49,6	43,4	5,6	1,4	100,0	602
Koulikoro	59,4	56,6	1 637	57,4	37,9	4,1	0,7	100,0	927
Sikasso	50,5	48,7	1 215	57,4	32,9	7,6	2,1	100,0	592
Ségou	62,9	60,6	939	41,8	43,0	12,7	2,5	100,0	569
Mopti	60,6	59,0	505	50,1	37,5	11,5	0,9	100,0	297
Tombouctou	47,8	47,2	128	32,6	20,7	46,2	0,6	100,0	61
Gao	46,6	43,4	163	53,3	31,6	5,1	10,0	100,0	71
Kidal	†	†	2	†	†	†	†	100,0	2
Bamako	84,3	82,5	1 177	68,4	27,6	3,2	0,9	100,0	971
Niveau d'instruction									
Aucun	48,4	46,3	2 476	45,4	42,7	10,4	1,5	100,0	1 146
Primaire	57,9	55,2	1 352	44,9	41,5	10,1	3,6	100,0	747
Secondaire ou plus	78,6	76,9	2 858	64,8	30,3	4,2	0,7	100,0	2 199
Quintile de bien-être économique									
Le plus bas	43,0	39,8	1 179	33,8	51,0	12,2	3,0	100,0	469
Second	48,6	46,1	1 174	43,0	41,4	13,6	2,0	100,0	541
Moyen	55,8	54,6	1 190	43,1	44,2	11,0	1,7	100,0	650
Quatrième	69,7	68,1	1 446	57,6	36,3	5,1	1,0	100,0	985
Le plus élevé	87,1	85,2	1 697	72,1	24,7	2,2	1,0	100,0	1 446
Ensemble 15–49	63,2	61,2	6 686	55,7	35,8	7,0	1,4	100,0	4 091
50–64	34,7	33,6	1 143	54,4	37,3	7,1	1,2	100,0	384
Ensemble 15–64	59,1	57,2	7 829	55,6	36,0	7,0	1,4	100,0	4 475

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 3.6.1 Emploi : Femme

Répartition (en %) des femmes de 15–49 ans en fonction du fait qu'elles travaillent ou non, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	A travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête		N'a pas travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête	Total	Effectif de femmes
	Travaille actuellement[1]	Ne travaille pas actuellement			
Âge					
15–19	35,7	8,2	56,1	100,0	3 862
20–24	45,2	10,4	44,4	100,0	3 378
25–29	54,2	10,6	35,1	100,0	2 905
30–34	60,4	11,8	27,8	100,0	2 382
35–39	62,3	10,6	27,1	100,0	2 065
40–44	64,5	11,6	23,8	100,0	1 586
45–49	62,3	12,1	25,6	100,0	1 169
État matrimonial					
Célibataire	39,9	7,0	53,1	100,0	3 585
Actuellement en union	54,3	11,5	34,3	100,0	13 237
En rupture d'union	65,8	6,3	27,9	100,0	525
Nombre d'enfants vivants					
0	38,3	7,4	54,3	100,0	4 462
1–2	49,3	11,1	39,5	100,0	4 581
3–4	58,6	10,6	30,8	100,0	3 928
5+	61,4	12,5	26,2	100,0	4 376
Résidence					
Bamako	58,0	6,9	35,2	100,0	2 675
Autre urbain	47,3	6,2	46,5	100,0	2 048
Ensemble urbain	53,3	6,6	40,1	100,0	4 723
Rural	51,0	11,8	37,2	100,0	12 624
Région					
Kayes	49,3	15,6	35,1	100,0	2 635
Koulikoro	56,9	5,9	37,2	100,0	4 018
Sikasso	52,4	13,6	34,0	100,0	3 143
Ségou	52,1	10,8	37,0	100,0	2 574
Mopti	45,5	15,5	39,0	100,0	1 530
Tombouctou	21,3	4,0	74,7	100,0	281
Gao	16,0	2,9	81,2	100,0	485
Kidal	†	†	†	100,0	6
Bamako	58,0	6,9	35,2	100,0	2 675
Niveau d'instruction					
Aucun	52,7	11,9	35,4	100,0	9 382
Primaire	56,7	10,8	32,5	100,0	2 926
Secondaire ou plus	46,7	7,4	45,9	100,0	5 039
Quintile de bien-être économique					
Le plus bas	52,7	16,5	30,8	100,0	3 036
Second	49,2	16,2	34,6	100,0	3 143
Moyen	50,4	10,1	39,5	100,0	3 318
Quatrième	51,8	6,0	42,1	100,0	3 676
Le plus élevé	53,5	5,7	40,8	100,0	4 174
Ensemble	51,6	10,4	38,0	100,0	17 347

[1] « Travaille actuellement » signifie que les femmes ont travaillé au cours des 7 derniers jours. En outre, les femmes qui n'ont pas travaillé au cours des 7 derniers jours mais qui ont un emploi régulier et qui étaient absentes parce qu'elles étaient en congé, malades ou en vacances ou encore pour d'autres raisons pareilles sont incluses ici.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 3.6.2 Emploi : Homme

Répartition (en %) des hommes de 15–49 ans en fonction du fait qu'ils travaillent ou non, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	A travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête		N'a pas travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête	Total	Effectif d'hommes
	Travaille actuellement[1]	Ne travaille pas actuellement			
Âge					
15–19	61,8	15,4	22,7	100,0	1 669
20–24	79,5	8,9	11,6	100,0	1 165
25–29	91,4	5,4	3,1	100,0	930
30–34	92,2	6,1	1,7	100,0	909
35–39	92,2	5,6	2,2	100,0	784
40–44	92,6	5,3	2,1	100,0	663
45–49	92,1	6,0	2,0	100,0	568
État matrimonial					
Célibataire	70,4	12,5	17,1	100,0	3 127
Actuellement en union	92,8	5,3	1,8	100,0	3 512
En rupture d'union	(90,0)	(3,8)	(6,2)	100,0	47
Nombre d'enfants vivants					
0	72,4	11,8	15,8	100,0	3 445
1–2	93,5	4,3	2,2	100,0	1 124
3–4	92,1	5,8	2,1	100,0	913
5+	92,8	6,0	1,2	100,0	1 204
Résidence					
Bamako	75,7	9,6	14,7	100,0	1 177
Autre urbain	75,3	9,2	15,5	100,0	795
Ensemble urbain	75,5	9,5	15,0	100,0	1 971
Rural	85,2	8,3	6,5	100,0	4 714
Région					
Kayes	83,6	8,9	7,6	100,0	920
Koulikoro	87,3	4,8	7,9	100,0	1 637
Sikasso	81,3	8,4	10,3	100,0	1 215
Ségou	82,2	13,8	4,0	100,0	939
Mopti	83,2	9,9	6,9	100,0	505
Tombouctou	86,8	5,0	8,2	100,0	128
Gao	75,1	11,1	13,8	100,0	163
Kidal	†	†	†	100,0	2
Bamako	75,7	9,6	14,7	100,0	1 177
Niveau d'instruction					
Aucun	88,2	7,2	4,6	100,0	2 476
Primaire	88,8	6,5	4,7	100,0	1 352
Secondaire ou plus	74,1	11,0	14,8	100,0	2 858
Quintile de bien-être économique					
Le plus bas	85,8	9,1	5,1	100,0	1 179
Second	84,6	11,5	3,9	100,0	1 174
Moyen	83,8	8,6	7,6	100,0	1 190
Quatrième	84,5	5,6	9,9	100,0	1 446
Le plus élevé	75,5	9,1	15,5	100,0	1 697
Ensemble 15–49	82,3	8,7	9,0	100,0	6 686
50–64	84,4	8,7	6,9	100,0	1 143
Ensemble 15–64	82,6	8,7	8,7	100,0	7 829

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.
[1] « Travaille actuellement » signifie que les hommes ont travaillé au cours des 7 derniers jours. En outre, les hommes qui n'ont pas travaillé au cours des 7 derniers jours mais qui ont un emploi régulier et qui étaient absents parce qu'ils étaient en congé, malades ou en vacances ou encore pour d'autres raisons pareilles sont inclus ici.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 3.7.1 Occupation : Femme

Répartition (en %) des femmes de 15–49 ans qui travaillaient au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête par type d'occupation, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Emploi qualifié/ technique/ encadre-ment	Employée de bureau	Vente et services	Emploi manuel qualifié	Emploi manuel non qualifié	Employée de maison	Agriculture	Manquant	Total	Effectif de femmes
Âge										
15–19	0,5	0,3	52,6	6,0	4,4	17,8	15,9	2,4	100,0	1 695
20–24	3,6	0,9	62,3	5,9	3,6	5,3	16,5	2,0	100,0	1 877
25–29	4,3	2,1	66,8	4,7	2,4	2,2	16,3	1,2	100,0	1 885
30–34	6,1	1,8	64,1	4,2	2,8	1,8	18,3	0,9	100,0	1 719
35–39	4,1	1,6	66,5	4,2	2,0	0,7	20,0	1,0	100,0	1 505
40–44	2,6	1,1	68,8	4,6	3,9	0,9	17,5	0,6	100,0	1 208
45–49	3,2	1,4	69,7	4,6	2,0	0,8	17,7	0,7	100,0	871
État matrimonial										
Célibataire	4,0	2,5	54,6	6,6	2,7	19,9	6,5	3,2	100,0	1 681
Actuellement en union	3,4	1,0	65,2	4,6	3,2	1,7	19,9	1,0	100,0	8 700
En rupture d'union	4,5	2,4	71,2	6,3	2,9	4,9	7,3	0,6	100,0	378
Nombre d'enfants vivants										
0	4,0	1,9	54,7	7,0	3,0	16,7	9,6	2,9	100,0	2 041
1–2	4,8	1,4	62,6	5,1	3,2	3,4	18,2	1,3	100,0	2 770
3–4	4,8	1,4	66,3	4,1	3,0	1,3	18,2	1,0	100,0	2 719
5+	1,2	0,7	68,3	4,2	3,1	1,0	20,8	0,7	100,0	3 230
Résidence										
Bamako	6,1	3,0	69,8	6,2	0,0	14,1	0,1	0,6	100,0	1 734
Autre urbain	8,4	2,2	74,2	6,1	0,2	4,7	1,8	2,4	100,0	1 095
Ensemble urbain	7,0	2,7	71,5	6,2	0,1	10,4	0,8	1,3	100,0	2 830
Rural	2,3	0,8	61,0	4,5	4,1	2,6	23,3	1,4	100,0	7 930
Région										
Kayes	2,3	0,9	51,1	1,6	10,6	2,2	31,1	0,2	100,0	1 711
Koulikoro	3,6	1,6	67,3	6,8	0,8	4,2	13,2	2,4	100,0	2 525
Sikasso	2,6	0,7	57,6	2,9	6,0	0,7	28,5	1,0	100,0	2 073
Ségou	3,1	0,7	70,9	6,1	0,2	4,5	12,0	2,4	100,0	1 621
Mopti	3,1	0,5	65,7	5,3	0,2	2,3	22,6	0,3	100,0	933
Tombouctou	5,5	2,2	73,1	7,7	0,0	7,8	2,7	0,9	100,0	71
Gao	7,4	1,9	70,4	13,1	0,3	0,9	0,5	5,4	100,0	91
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	†	100,0	1
Bamako	6,1	3,0	69,8	6,2	0,0	14,1	0,1	0,6	100,0	1 734
Niveau d'instruction										
Aucun	0,2	0,4	62,7	4,1	3,6	5,3	22,9	0,8	100,0	6 061
Primaire	0,6	1,0	67,9	5,4	3,7	6,1	14,7	0,6	100,0	1 974
Secondaire ou plus	13,1	3,6	63,1	6,5	1,4	2,3	6,9	3,0	100,0	2 725
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	0,3	0,2	58,7	3,3	2,4	1,8	32,0	1,4	100,0	2 101
Second	0,6	0,4	53,5	4,4	4,3	1,3	34,7	0,7	100,0	2 054
Moyen	1,4	0,5	64,2	4,8	7,5	1,5	19,0	0,9	100,0	2 006
Quatrième	4,2	1,2	78,6	6,1	1,9	2,4	4,1	1,5	100,0	2 127
Le plus élevé	10,0	3,7	63,4	5,9	0,1	14,4	0,4	2,1	100,0	2 471
Ensemble	3,5	1,3	63,7	4,9	3,1	4,7	17,4	1,3	100,0	10 760

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 3.7.2 Occupation : Homme

Répartition (en %) des hommes de 15–49 ans qui travaillaient au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête par type d'occupation, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Emploi qualifié/ technique/ encadre-ment	Employé de bureau	Vente et services	Emploi manuel qualifié	Emploi manuel non qualifié	Employé de maison	Agriculture	Manquant	Total	Effectif d'hommes
Âge										
15–19	1,4	0,1	20,0	28,0	8,6	1,2	36,8	4,1	100,0	1 289
20–24	3,7	0,3	27,3	30,9	9,9	0,8	24,5	2,5	100,0	1 029
25–29	9,1	2,1	27,4	28,1	10,0	0,6	22,1	0,6	100,0	900
30–34	10,1	2,5	26,0	26,4	6,9	0,4	27,0	0,7	100,0	893
35–39	13,0	2,8	24,8	21,8	6,6	0,1	30,2	0,7	100,0	767
40–44	9,4	2,2	25,8	26,2	5,8	0,1	30,0	0,5	100,0	649
45–49	7,1	0,7	24,6	28,7	5,7	1,1	31,8	0,4	100,0	557
État matrimonial										
Célibataire	4,0	0,8	23,7	29,9	9,5	1,0	28,1	3,0	100,0	2 593
Actuellement en union	9,3	1,9	25,7	25,5	6,6	0,4	30,0	0,5	100,0	3 448
En rupture d'union	(7,7)	(0,0)	(27,8)	(28,5)	(17,6)	(0,0)	(14,3)	(4,1)	100,0	44
Nombre d'enfants vivants										
0	4,0	0,9	23,7	28,6	9,2	1,0	29,8	2,8	100,0	2 901
1–2	10,2	2,2	28,3	27,1	8,1	0,3	22,9	0,7	100,0	1 099
3–4	11,0	2,8	24,4	27,7	6,5	0,3	26,8	0,5	100,0	894
5+	8,5	0,9	24,6	24,4	5,9	0,4	34,9	0,5	100,0	1 190
Résidence										
Bamako	9,9	3,7	35,9	41,9	6,4	0,2	1,1	0,8	100,0	1 004
Autre urbain	14,0	2,6	26,5	40,0	8,1	0,0	7,9	1,0	100,0	672
Ensemble urbain	11,6	3,2	32,1	41,1	7,1	0,1	3,8	0,9	100,0	1 676
Rural	5,3	0,7	22,1	22,1	8,3	0,9	38,7	1,9	100,0	4 409
Région										
Kayes	4,1	0,4	30,2	24,4	16,6	3,2	20,5	0,6	100,0	851
Koulikoro	8,8	1,3	22,6	24,6	5,3	0,2	32,3	4,9	100,0	1 508
Sikasso	5,1	0,9	23,0	26,6	9,4	0,3	34,4	0,2	100,0	1 090
Ségou	5,9	1,0	17,8	26,5	5,9	0,6	42,2	0,1	100,0	901
Mopti	7,1	0,9	17,7	16,5	4,2	0,0	53,1	0,5	100,0	470
Tombouctou	6,2	1,0	20,2	25,2	6,2	0,0	40,6	0,6	100,0	118
Gao	8,6	0,8	24,5	20,8	11,5	0,0	30,7	3,1	100,0	140
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	†	100,0	2
Bamako	9,9	3,7	35,9	41,9	6,4	0,2	1,1	0,8	100,0	1 004
Niveau d'instruction										
Aucun	2,5	0,6	22,5	23,6	7,8	0,8	41,9	0,3	100,0	2 363
Primaire	1,1	0,1	23,3	33,3	9,7	0,9	30,5	1,1	100,0	1 288
Secondaire ou plus	14,6	2,9	27,9	27,9	7,2	0,4	15,9	3,2	100,0	2 434
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	1,9	0,0	13,6	19,2	4,9	0,6	59,7	0,1	100,0	1 119
Second	2,3	0,2	20,2	17,3	7,8	1,5	49,7	0,9	100,0	1 128
Moyen	4,2	0,5	23,4	21,3	13,1	0,7	35,7	1,1	100,0	1 100
Quatrième	9,6	1,0	28,5	41,8	8,6	0,4	8,1	1,9	100,0	1 302
Le plus élevé	14,6	4,6	35,1	33,2	5,8	0,3	3,0	3,5	100,0	1 435
Ensemble 15–49	7,0	1,4	24,8	27,4	8,0	0,7	29,1	1,6	100,0	6 084
50–64	9,6	3,0	23,5	22,5	2,3	0,1	38,5	0,4	100,0	1 064
Ensemble 15–64	7,4	1,7	24,6	26,7	7,1	0,6	30,5	1,4	100,0	7 149

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 3.8 Type d'emploi : Femme

Répartition (en %) des femmes de 15–49 ans qui travaillaient au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête en fonction du type de rémunération, du type d'employeur et de la régularité de l'emploi, selon le secteur d'activité (agricole ou non-agricole), EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique de l'emploi	Travail agricole	Travail non agricole	Manquant	Ensemble
Type de rémunération				
En argent seulement	31,8	77,1	34,8	68,7
En argent et en nature	21,4	10,6	4,5	12,4
En nature seulement	7,8	1,2	0,9	2,3
Pas rémunérée	39,1	11,1	59,8	16,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Type d'employeur				
Employée par un membre de la famille	29,4	7,8	9,4	11,5
Employée par quelqu'un qui n'est pas membre de la famille	2,7	8,0	4,1	7,0
Travaille à son compte	67,9	84,2	86,6	81,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Régularité de l'emploi				
Toute l'année	10,1	61,1	49,6	52,1
Saisonnier/partie de l'année	86,6	24,3	23,0	35,1
De temps en temps	3,3	14,6	27,4	12,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes qui travaillaient au cours des 12 derniers mois	1 867	8 749	144	10 760

Note : L'ensemble comprend les femmes dont l'information sur le type d'emploi est manquante et qui ne sont pas présentées séparément.

Tableau 3.9.1 Couverture médicale : Femme

Pourcentage de femmes de 15–49 ans ayant certains types spécifiques d'assurance médicale et pourcentage ayant n'importe quel type d'assurance médicale, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Sécurité sociale	Autre assurance fournie par l'employeur	Mutuelle de santé/ assurance communau-taire	Souscription individuelle à une assurance privée	Autre	Aucune	Une assurance médicale	Effectif de femmes
Âge								
15–19	0,0	4,2	0,3	0,0	0,1	95,3	4,7	3 862
20–24	0,0	4,5	0,5	0,1	0,2	94,7	5,3	3 378
25–29	0,0	4,8	0,5	0,3	0,3	94,2	5,8	2 905
30–34	0,1	6,2	0,6	0,0	0,2	93,1	6,9	2 382
35–39	0,2	6,1	0,6	0,6	0,2	92,7	7,3	2 065
40–44	0,0	5,6	0,5	0,4	0,4	93,4	6,6	1 586
45–49	0,0	6,5	0,1	0,5	0,3	92,7	7,3	1 169
Résidence								
Bamako	0,1	11,7	0,2	0,1	0,8	87,5	12,5	2 675
Autre urbain	0,0	12,1	0,9	0,0	0,4	86,9	13,1	2 048
Ensemble urbain	0,1	11,9	0,5	0,1	0,7	87,2	12,8	4 723
Rural	0,0	2,6	0,5	0,3	0,1	96,6	3,4	12 624
Région								
Kayes	0,1	4,0	0,2	0,0	0,1	95,6	4,4	2 635
Koulikoro	0,1	4,9	0,0	0,0	0,1	95,0	5,0	4 018
Sikasso	0,0	3,4	0,1	0,0	0,1	96,4	3,6	3 143
Ségou	0,0	3,1	0,8	1,3	0,1	94,6	5,4	2 574
Mopti	0,0	3,6	1,5	0,0	0,1	94,8	5,2	1 530
Tombouctou	0,0	4,9	7,7	0,0	0,3	87,2	12,8	281
Gao	0,0	3,7	0,0	0,0	0,1	96,2	3,8	485
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	6
Bamako	0,1	11,7	0,2	0,1	0,8	87,5	12,5	2 675
Niveau d'instruction								
Aucun	0,0	1,1	0,4	0,3	0,0	98,1	1,9	9 382
Primaire	0,0	2,7	0,5	0,2	0,0	96,5	3,5	2 926
Secondaire ou plus	0,1	14,0	0,5	0,1	0,7	85,1	14,9	5 039
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	0,0	0,2	0,2	0,5	0,0	99,0	1,0	3 036
Second	0,1	0,1	0,2	0,5	0,0	99,0	1,0	3 143
Moyen	0,0	1,4	0,7	0,1	0,0	97,8	2,2	3 318
Quatrième	0,0	4,4	0,6	0,0	0,1	95,0	5,0	3 676
Le plus élevé	0,1	16,1	0,5	0,1	0,8	82,9	17,1	4 174
Ensemble	0,0	5,1	0,5	0,2	0,2	94,0	6,0	17 347

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 3.9.2 Couverture médicale : Homme

Pourcentage d'hommes de 15–49 ans ayant certains types spécifiques d'assurance médicale et pourcentage ayant n'importe quel type d'assurance médicale, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Sécurité sociale	Autre assurance fournie par l'employeur	Mutuelle de santé/ assurance communau-taire	Souscription individuelle à une assurance privée	Autre	Aucune	Une assurance médicale	Effectif d'hommes
Âge								
15–19	0,0	3,8	0,1	0,0	0,2	96,0	4,0	1 669
20–24	0,0	3,8	0,0	0,1	0,0	96,1	3,9	1 165
25–29	0,4	4,8	0,5	0,3	0,7	94,3	5,7	930
30–34	0,0	5,8	0,1	0,0	0,8	93,8	6,2	909
35–39	0,0	9,9	0,5	0,0	0,4	89,5	10,5	784
40–44	0,0	8,3	0,7	0,2	0,8	90,4	9,6	663
45–49	0,3	7,3	0,4	0,4	0,6	91,3	8,7	568
Résidence								
Bamako	0,0	13,9	0,2	0,4	1,3	84,6	15,4	1 177
Autre urbain	0,0	8,5	0,7	0,0	0,8	90,7	9,3	795
Ensemble urbain	0,0	11,8	0,4	0,3	1,1	87,1	12,9	1 971
Rural	0,1	3,1	0,2	0,1	0,1	96,6	3,4	4 714
Région								
Kayes	0,0	3,0	0,0	0,0	0,5	96,6	3,4	920
Koulikoro	0,2	4,7	0,0	0,0	0,1	95,2	4,8	1 637
Sikasso	0,0	3,1	0,3	0,0	0,3	96,5	3,5	1 215
Ségou	0,3	4,2	1,3	0,3	0,0	94,8	5,2	939
Mopti	0,0	3,9	0,2	0,0	0,2	95,9	4,1	505
Tombouctou	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	95,2	4,8	128
Gao	0,0	4,2	0,2	0,0	0,5	95,4	4,6	163
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	2
Bamako	0,0	13,9	0,2	0,4	1,3	84,6	15,4	1 177
Niveau d'instruction								
Aucun	0,1	0,4	0,3	0,1	0,1	99,2	0,8	2 476
Primaire	0,0	2,0	0,2	0,1	0,3	97,6	2,4	1 352
Secondaire ou plus	0,1	11,9	0,3	0,1	0,8	87,3	12,7	2 858
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	99,8	0,2	1 179
Second	0,0	0,3	0,4	0,0	0,1	99,2	0,8	1 174
Moyen	0,2	1,3	0,2	0,2	0,2	98,3	1,7	1 190
Quatrième	0,0	5,2	0,1	0,0	0,4	94,4	5,6	1 446
Le plus élevé	0,2	16,7	0,5	0,3	1,1	82,1	17,9	1 697
Ensemble 15–49	0,1	5,7	0,3	0,1	0,4	93,8	6,2	6 686
50–64	0,0	7,2	0,4	0,1	0,4	91,9	8,1	1 143
Ensemble 15–64	0,1	5,9	0,3	0,1	0,4	93,5	6,5	7 829

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 3.10.1 Consommation de tabac à fumer : Femme

Pourcentage de femmes de 15–49 ans qui fument du tabac sous différentes formes, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage qui fume :[1]			Effectif de femmes
	Des cigarettes[2]	D'autres types de tabac[3]	N'importe quel type de tabac	
Âge				
15–19	0,8	0,2	0,8	3 862
20–24	0,6	0,1	0,6	3 378
25–29	0,6	0,1	0,7	2 905
30–34	0,5	0,0	0,5	2 382
35–39	0,4	0,0	0,4	2 065
40–44	0,6	0,0	0,6	1 586
45–49	1,9	1,1	2,0	1 169
Résidence				
Bamako	0,4	0,2	0,5	2 675
Autre urbain	1,5	0,4	1,6	2 048
Ensemble urbain	0,9	0,3	1,0	4 723
Rural	0,6	0,1	0,6	12 624
Région				
Kayes	0,7	0,1	0,7	2 635
Koulikoro	0,3	0,1	0,3	4 018
Sikasso	1,1	0,0	1,1	3 143
Ségou	1,0	0,4	1,0	2 574
Mopti	0,5	0,1	0,5	1 530
Tombouctou	0,7	0,8	1,3	281
Gao	1,9	0,0	1,9	485
Kidal	†	†	†	6
Bamako	0,4	0,2	0,5	2 675
Niveau d'instruction				
Aucun	0,6	0,1	0,6	9 382
Primaire	0,9	0,2	0,9	2 926
Secondaire ou plus	0,8	0,2	0,8	5 039
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	0,5	0,2	0,5	3 036
Second	0,6	0,0	0,6	3 143
Moyen	1,0	0,1	1,0	3 318
Quatrième	0,6	0,2	0,7	3 676
Le plus élevé	0,7	0,3	0,8	4 174
Ensemble	0,7	0,2	0,7	17 347

[1] Y compris un usage quotidien et occasionnel (pas tous les jours)
[2] Les cigarettes incluent les kreteks.
[3] Comprend les pipes à tabac, les cigares, les cheroots, les cigarillos et les pipes à eau
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 3.10.2 Consommation de tabac à fumer : Homme

Pourcentage d'hommes de 15–49 ans qui fument du tabac sous différentes formes et répartition (en %) des hommes en fonction de la fréquence de consommation de tabac, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage qui fume :[1]			Fréquence de consommation de tabac			Total	Effectif d'hommes
	Des cigarettes[2]	D'autres types de tabac[3]	N'importe quel type de tabac	Quotidienne	Occasionnelle[4]	Non-fumeur		
Âge								
15–19	5,3	0,3	5,4	4,0	1,5	94,5	100,0	1 669
20–24	14,9	0,5	15,1	9,9	5,1	84,9	100,0	1 165
25–29	16,0	0,5	16,1	13,8	2,3	83,9	100,0	930
30–34	14,7	0,2	14,7	13,6	1,2	85,3	100,0	909
35–39	14,1	0,5	14,3	12,5	1,8	85,7	100,0	784
40–44	15,2	0,2	15,4	13,6	1,8	84,6	100,0	663
45–49	17,1	0,0	17,1	15,2	1,9	82,9	100,0	568
Résidence								
Bamako	17,0	1,1	17,4	14,2	3,2	82,6	100,0	1 177
Autre urbain	14,8	0,4	14,8	12,8	2,0	85,2	100,0	795
Ensemble urbain	16,1	0,8	16,4	13,7	2,7	83,6	100,0	1 971
Rural	11,3	0,1	11,4	9,3	2,1	88,6	100,0	4 714
Région								
Kayes	16,1	0,5	16,4	14,3	2,2	83,5	100,0	920
Koulikoro	13,0	0,0	13,0	10,8	2,2	87,0	100,0	1 637
Sikasso	8,6	0,0	8,6	6,8	1,8	91,4	100,0	1 215
Ségou	10,5	0,2	10,5	8,0	2,5	89,5	100,0	939
Mopti	10,6	0,1	10,7	8,9	1,7	89,3	100,0	505
Tombouctou	8,1	0,8	8,5	7,3	1,1	91,5	100,0	128
Gao	14,8	0,2	14,8	12,7	2,1	85,2	100,0	163
Kidal	†	†	†	†	†	†	100,0	2
Bamako	17,0	1,1	17,4	14,2	3,2	82,6	100,0	1 177
Niveau d'instruction								
Aucun	10,1	0,2	10,3	8,6	1,7	89,7	100,0	2 476
Primaire	17,1	0,2	17,1	13,8	3,2	82,9	100,0	1 352
Secondaire ou plus	13,0	0,5	13,1	10,8	2,4	86,8	100,0	2 858
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	7,3	0,1	7,3	6,1	1,2	92,7	100,0	1 179
Second	10,3	0,2	10,5	8,4	2,1	89,5	100,0	1 174
Moyen	13,7	0,1	13,7	11,2	2,6	86,2	100,0	1 190
Quatrième	15,4	0,4	15,5	13,2	2,4	84,5	100,0	1 446
Le plus élevé	15,4	0,7	15,6	12,6	2,9	84,4	100,0	1 697
Ensemble 15–49	12,8	0,3	12,9	10,6	2,3	87,1	100,0	6 686
50–64	12,0	0,7	12,5	11,2	1,5	87,4	100,0	1 143
Ensemble 15–64	12,6	0,4	12,8	10,7	2,2	87,2	100,0	7 829

[1] Y compris un usage quotidien et occasionnel (pas tous les jours)
[2] Les cigarettes incluent les cigarettes fabriquées commercialement, les cigarettes roulées à la main et les kreteks.
[3] Comprend les pipes à tabac, les cigares, les cheroots, les cigarillos et les pipes à eau
[4] Par consommation occasionnelle, on entend ici une consommation qui n'est pas quotidienne.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 3.11 Nombre moyen de cigarettes fumées par jour : Homme

Parmi les hommes de 15–49 ans qui fument des cigarettes tous les jours, répartition (en %) par nombre moyen de cigarettes fumées par jour, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Nombre moyen de cigarettes fumées par jour[1]					Total	Effectif d'hommes qui fument des cigarettes tous les jours[1]
	<5	5–9	10–14	15–24	≥25		
Âge							
15–19	42,5	35,3	13,0	3,7	5,6	100,0	66
20–24	26,4	31,2	26,4	12,8	3,1	100,0	114
25–29	12,3	39,7	25,9	19,5	2,6	100,0	128
30–34	10,9	37,3	33,2	15,2	3,4	100,0	123
35–39	14,0	30,8	40,0	13,3	2,0	100,0	96
40–44	15,0	22,6	35,1	25,9	1,5	100,0	89
45–49	12,7	27,3	37,6	21,3	1,1	100,0	86
Résidence							
Bamako	22,2	33,5	28,4	12,2	3,7	100,0	166
Autre urbain	11,3	33,3	34,0	18,7	2,7	100,0	102
Ensemble urbain	18,1	33,4	30,5	14,6	3,3	100,0	268
Rural	17,6	32,1	30,6	17,4	2,3	100,0	436
Région							
Kayes	21,0	33,2	32,1	13,7	0,0	100,0	129
Koulikoro	11,8	35,0	34,3	14,8	4,1	100,0	177
Sikasso	22,8	43,8	21,1	10,2	2,0	100,0	82
Ségou	20,7	19,5	33,9	22,3	3,6	100,0	75
Mopti	9,8	28,0	23,4	37,7	1,1	100,0	44
Tombouctou	0,9	28,7	46,1	15,7	8,6	100,0	9
Gao	(7,4)	(15,8)	(40,7)	(36,2)	(0,0)	100,0	21
Kidal	†	†	†	†	†	100,0	1
Bamako	22,2	33,5	28,4	12,2	3,7	100,0	166
Niveau d'instruction							
Aucun	17,6	30,6	29,7	20,8	1,3	100,0	210
Primaire	20,6	33,3	27,3	16,7	2,1	100,0	187
Secondaire ou plus	16,2	33,5	33,2	13,1	4,0	100,0	307
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	33,1	32,4	24,0	6,7	3,8	100,0	71
Second	20,4	34,2	28,6	15,4	1,3	100,0	97
Moyen	15,1	28,1	33,2	19,5	4,2	100,0	133
Quatrième	11,4	29,0	35,4	23,0	1,2	100,0	189
Le plus élevé	18,8	37,8	27,7	12,2	3,4	100,0	213
Ensemble 15–49	17,8	32,6	30,6	16,4	2,7	100,0	704
50–64	11,5	33,3	33,5	18,4	3,3	100,0	122
Ensemble 15–64	16,9	32,7	31,0	16,7	2,8	100,0	825

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.
[1] Comprend les cigarettes achetées en commerce, les cigarettes roulées à la main et les kreteks
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 3.12 Consommation de tabac non fumé et de tabac sous n'importe quelle forme

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans qui consomment actuellement du tabac non fumé, par type de tabac et pourcentage qui consomme du tabac sous n'importe quelle forme, EDSM-VII Mali 2023–2024

Type de tabac	Femme	Homme
Tabac à priser, par la bouche	0,3	0,9
Tabac à priser, par voie nasale	0,0	0,1
Tabac à chiquer	0,1	0,1
Chique de Bétel avec tabac	0,0	0,0
Autre type de tabac non fumé	0,0	0,0
N'importe quel type de tabac non fumé[1]	0,4	1,1
N'importe quel type de tabac[2]	1,1	13,8
Effectif 15–49	17 347	6 686

Note : Le tableau comprend les femmes et les hommes qui consomment du tabac non fumé tous les jours ou de manière occasionnelle (pas tous les jours).

[1] Comprend le tabac à priser dans la bouche, le tabac à priser par voie nasale, le tabac à chiquer, le bétel à chiquer avec du tabac.

[2] Comprend tous les types de tabac non fumé figurant dans ce tableau plus les cigarettes, les kreteks, les pipes, les cigares, cheroots, cigarillos, pipes à eau.

Tableau 3.13 Consommation de tabac sous n'importe quelle forme, selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans qui consomment actuellement n'importe quel type de tabac, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Femme		Homme	
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage qui consomme du tabac sous n'importe quelle forme	Effectif de femmes	Pourcentage qui consomme du tabac sous n'importe quelle forme	Effectif d'hommes
Âge				
15–19	1,0	3 862	5,6	1 669
20–24	0,9	3 378	15,4	1 165
25–29	1,0	2 905	16,7	930
30–34	0,9	2 382	15,6	909
35–39	0,6	2 065	16,1	784
40–44	1,2	1 586	17,5	663
45–49	2,9	1 169	19,6	568
Résidence				
Bamako	0,6	2 675	17,9	1 177
Autre urbain	1,7	2 048	14,8	795
Ensemble urbain	1.1	4 723	16.7	1 971
Rural	1,1	12 624	12,6	4 714
Région				
Kayes	0,9	2 635	17,1	920
Koulikoro	0,3	4 018	14,1	1 637
Sikasso	1,2	3 143	9,0	1 215
Ségou	1,2	2 574	10,8	939
Mopti	0,5	1 530	12,1	505
Tombouctou	1,8	281	10,6	128
Gao	11,1	485	24,1	163
Kidal	†	6	†	2
Bamako	0,6	2 675	17,9	1 177
Niveau d'instruction				
Aucun	1,2	9 382	12,1	2 476
Primaire	0,9	2 926	17,7	1 352
Secondaire ou plus	0,9	5 039	13,5	2 858
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	0,6	3 036	8,6	1 179
Second	0,9	3 143	11,7	1 174
Moyen	1,9	3 318	15,3	1 190
Quatrième	1,1	3 676	16,3	1 446
Le plus élevé	0,8	4 174	15,8	1 697
Ensemble 15–49	1,1	17 347	13,8	6 686
50–64	na	na	17,4	1 143
Ensemble 15–64	na	na	14,3	7 829

na = non applicable
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 3.14.1 Consommation d'alcool : Femme

Pourcentage de femmes de 15–49 ans qui ont consommé de l'alcool au cours du mois dernier ; et parmi les femmes ayant consommé de l'alcool au cours du mois dernier, répartition (en %) par fréquence de consommation de l'alcool (nombre de jours où de l'alcool a été consommé), selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	A consommé de l'alcool au cours du mois dernier	Effectif de femmes	Parmi les femmes ayant consommé de l'alcool au cours du mois dernier, répartition (en %) par fréquence de consommation : 1–5 jours	6–10 jours	11–24 jours	Chaque jour/presque chaque jour[1]	Total	Effectif de femmes ayant consommé de l'alcool au cours du mois dernier
Âge								
15–19	0,3	3 862	*	*	*	*	100,0	12
20–24	0,4	3 378	*	*	*	*	100,0	14
25–29	0,4	2 905	*	*	*	*	100,0	12
30–34	0,6	2 382	*	*	*	*	100,0	15
35–39	0,9	2 065	*	*	*	*	100,0	18
40–44	0,7	1 586	*	*	*	*	100,0	11
45–49	1,1	1 169	*	*	*	*	100,0	12
Résidence								
Bamako	0,2	2 675	*	*	*	*	100,0	4
Autre urbain	0,6	2 048	*	*	*	*	100,0	13
Ensemble urbain	0,4	4 723	*	*	*	*	100,0	17
Rural	0,6	12 624	66,5	21,3	8,5	3,7	100,0	79
Région								
Kayes	0,1	2 635	*	*	*	*	100,0	3
Koulikoro	0,0	4 018	*	*	*	*	100,0	2
Sikasso	1,3	3 143	(69,0)	(17,2)	(6,9)	(6,9)	100,0	42
Ségou	1,7	2 574	(64,4)	(23,2)	(8,6)	(3,8)	100,0	44
Mopti	0,0	1 530	*	*	*	*	100,0	1
Tombouctou	0,1	281	*	*	*	*	100,0	0
Gao	0,0	485	*	*	*	*	0,0	0
Kidal	†	6	†	†	†	†	0,0	0
Bamako	0,2	2 675	*	*	*	*	100,0	4
Niveau d'instruction								
Aucun	0,6	9 382	(62,2)	(20,5)	(12,0)	(5,4)	100,0	54
Primaire	0,6	2 926	*	*	*	*	100,0	16
Secondaire ou plus	0,5	5 039	*	*	*	*	100,0	25
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	1,3	3 036	(62,6)	(22,5)	(7,4)	(7,4)	100,0	39
Second	0,8	3 143	*	*	*	*	100,0	24
Moyen	0,3	3 318	*	*	*	*	100,0	10
Quatrième	0,4	3 676	*	*	*	*	100,0	15
Le plus élevé	0,2	4 174	*	*	*	*	100,0	8
Ensemble	0,6	17 347	65,7	20,3	8,0	6,0	100,0	96

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

[1] L'enquêtée a déclaré qu'elle a bu de l'alcool chaque jour, presque chaque jour, ou pendant 25 jours ou plus au cours du mois dernier.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 3.14.2 Consommation d'alcool : Homme

Pourcentage d'hommes de 15–49 ans qui ont consommé de l'alcool au cours du mois dernier ; et parmi les hommes ayant consommé de l'alcool au cours du mois dernier, répartition (en %) par fréquence de consommation de l'alcool (nombre de jours où de l'alcool a été consommé), selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	A consommé de l'alcool au cours du mois dernier	Effectif d'hommes	Parmi les hommes ayant consommé de l'alcool au cours du mois dernier, répartition (en %) par fréquence de consommation :					Effectif d'hommes ayant consommé de l'alcool au cours du mois dernier
			1–5 jours	6–10 jours	11–24 jours	Chaque jour/presque chaque jour[1]	Total	
Âge								
15–19	0,9	1 669	*	*	*	*	100,0	16
20–24	2,2	1 165	*	*	*	*	100,0	25
25–29	3,2	930	(45,3)	(38,6)	(2,9)	(13,3)	100,0	30
30–34	2,3	909	*	*	*	*	100,0	21
35–39	2,9	784	*	*	*	*	100,0	23
40–44	2,8	663	*	*	*	*	100,0	19
45–49	4,1	568	*	*	*	*	100,0	23
Résidence								
Bamako	2,0	1 177	*	*	*	*	100,0	23
Autre urbain	2,6	795	(59,0)	(18,2)	(12,9)	(9,9)	100,0	21
Ensemble urbain	2,2	1 971	(55,4)	(22,4)	(8,1)	(14,1)	100,0	44
Rural	2,4	4 714	47,4	25,9	12,1	14,6	100,0	112
Région								
Kayes	1,6	920	*	*	*	*	100,0	15
Koulikoro	2,3	1 637	*	*	*	*	100,0	38
Sikasso	2,3	1 215	*	*	*	*	100,0	28
Ségou	4,5	939	(34,9)	(22,5)	(23,9)	(18,7)	100,0	42
Mopti	1,9	505	*	*	*	*	100,0	10
Tombouctou	0,2	128	*	*	*	*	100,0	0
Gao	0,4	163	*	*	*	*	100,0	1
Kidal	†	2	†	†	†	†	100,0	0
Bamako	2,0	1 177	*	*	*	*	100,0	23
Niveau d'instruction								
Aucun	2,2	2 476	(44,8)	(29,1)	(9,7)	(16,4)	100,0	55
Primaire	2,7	1 352	(43,6)	(26,2)	(22,5)	(7,7)	100,0	36
Secondaire ou plus	2,3	2 858	57,0	20,7	5,6	16,7	100,0	65
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	3,0	1 179	(31,6)	(32,9)	(8,8)	(26,7)	100,0	35
Second	2,2	1 174	*	*	*	*	100,0	25
Moyen	1,3	1 190	*	*	*	*	100,0	15
Quatrième	2,6	1 446	(52,1)	(12,3)	(28,6)	(7,0)	100,0	38
Le plus élevé	2,5	1 697	(62,0)	(25,5)	(0,0)	(12,5)	100,0	42
Ensemble 15–49	2,3	6 686	49,6	24,9	11,0	14,5	100,0	156
50–64	3,5	1 143	(50,7)	(19,6)	(22,4)	(7,4)	100,0	40
Ensemble 15–64	2,5	7 829	49,9	23,8	13,3	13,0	100,0	196

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
[1] L'enquêté a déclaré qu'il a bu de l'alcool chaque jour, presque chaque jour, ou pendant 25 jours ou plus au cours du mois dernier.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 3.15.1 Nombre habituel de verres d'alcool consommés : Femme

Parmi les femmes de 15–49 ans qui ont consommé de l'alcool au cours du mois dernier, répartition (en %) du nombre habituel de verres consommés les jours où de l'alcool a été consommé, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Répartition (en %) du nombre habituel de verres consommés le jour où de l'alcool a été consommé							Effectif de femmes ayant consommé de l'alcool au cours du mois dernier
	1	2	3	4	5	6 ou plus	Total	
Âge								
15–19	*	*	*	*	*	*	100,0	12
20–24	*	*	*	*	*	*	100,0	14
25–29	*	*	*	*	*	*	100,0	12
30–34	*	*	*	*	*	*	100,0	15
35–39	*	*	*	*	*	*	100,0	18
40–44	*	*	*	*	*	*	100,0	11
45–49	*	*	*	*	*	*	100,0	12
Fréquence de consommation au cours du mois dernier								
1–5 jours	73,2	4,2	10,0	9,1	3,6	0,0	100,0	63
6–10 jours	*	*	*	*	*	*	100,0	19
11–24 jours	*	*	*	*	*	*	100,0	8
Chaque jour/presque chaque jour[1]	*	*	*	*	*	*	100,0	6
Résidence								
Bamako	*	*	*	*	*	*	100,0	4
Autre urbain	*	*	*	*	*	*	100,0	13
Ensemble urbain	*	*	*	*	*	*	100,0	17
Rural	59,0	11,3	8,7	7,3	1,7	12,1	100,0	79
Région								
Kayes	*	*	*	*	*	*	100,0	3
Koulikoro	*	*	*	*	*	*	100,0	2
Sikasso	(80,0)	(13,8)	(6,3)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	100,0	42
Ségou	(33,9)	(13,3)	(11,6)	(15,1)	(5,1)	(21,1)	100,0	44
Mopti	*	*	*	*	*	*	100,0	1
Tombouctou	*	*	*	*	*	*	100,0	0
Bamako	*	*	*	*	*	*	100,0	4
Niveau d'instruction								
Aucun	(49,9)	(20,0)	(10,1)	(8,1)	(0,0)	(11,9)	100,0	54
Primaire	*	*	*	*	*	*	100,0	16
Secondaire ou plus	*	*	*	*	*	*	100,0	25
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	(70,7)	(14,9)	(10,5)	(0,0)	(0,0)	(3,9)	100,0	39
Second	*	*	*	*	*	*	100,0	24
Moyen	*	*	*	*	*	*	100,0	10
Quatrième	*	*	*	*	*	*	100,0	15
Le plus élevé	*	*	*	*	*	*	100,0	8
Ensemble	56,4	13,3	8,1	8,2	2,4	11,6	100,0	96

Note : Une consommation d'alcool correspond à une canette ou une bouteille de bière, un verre de vin, un verre de liqueur, ou une coupe de dolo ou de Banji. Les enquêtées qui ont déclaré avoir bu quelques gorgées d'alcool ont été enregistrés comme ayant consommé moins d'un verre standard. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

[1] L'enquêtée a déclaré qu'elle a bu de l'alcool chaque jour, presque chaque jour, ou pendant 25 jours ou plus au cours du mois dernier.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 3.15.2 Nombre habituel de verres d'alcool consommés : Homme

Parmi les hommes de 15–49 ans qui ont consommé de l'alcool au cours du mois dernier, répartition (en %) du nombre habituel de verres consommés les jours où de l'alcool a été consommé, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Répartition (en %) du nombre habituel de verres consommés le jour où de l'alcool a été consommé							Effectif d'hommes ayant consommé de l'alcool au cours du mois dernier
	1	2	3	4	5	6 ou plus	Total	
Âge								
15–19	*	*	*	*	*	*	100,0	16
20–24	*	*	*	*	*	*	100,0	25
25–29	(23,1)	(30,9)	(16,8)	(9,0)	(14,1)	(6,0)	100,0	30
30–34	*	*	*	*	*	*	100,0	21
35–39	*	*	*	*	*	*	100,0	23
40–44	*	*	*	*	*	*	100,0	19
45–49	*	*	*	*	*	*	100,0	23
Fréquence de consommation au cours du mois dernier								
1–5 jours	27,0	36,5	13,4	7,5	4,7	10,9	100,0	98
6–10 jours	(25,3)	(29,5)	(17,4)	(9,2)	(7,5)	(11,0)	100,0	47
11–24 jours	*	*	*	*	*	*	100,0	26
Chaque jour/presque chaque jour[1]	*	*	*	*	*	*	100,0	26
Résidence								
Bamako	*	*	*	*	*	*	100,0	23
Autre urbain	(20,9)	(28,3)	(17,1)	(8,1)	(9,2)	(16,5)	100,0	21
Ensemble urbain	(15,8)	(45,7)	(18,4)	(6,0)	(6,4)	(7,7)	100,0	44
Rural	29,2	31,7	12,6	12,0	5,3	9,2	100,0	112
Région								
Kayes	*	*	*	*	*	*	100,0	15
Koulikoro	*	*	*	*	*	*	100,0	38
Sikasso	*	*	*	*	*	*	100,0	28
Ségou	(29,9)	(42,8)	(10,2)	(5,3)	(4,6)	(7,2)	100,0	42
Mopti	*	*	*	*	*	*	100,0	10
Tombouctou	*	*	*	*	*	*	100,0	0
Gao	*	*	*	*	*	*	100,0	1
Kidal	†	†	†	†	†	†	100,0	0
Bamako	*	*	*	*	*	*	100,0	23
Niveau d'instruction								
Aucun	(18,9)	(34,9)	(20,7)	(8,6)	(4,1)	(12,8)	100,0	55
Primaire	(38,1)	(26,2)	(9,8)	(16,4)	(3,2)	(6,3)	100,0	36
Secondaire ou plus	23,9	41,6	11,1	8,4	8,2	6,8	100,0	65
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	(25,8)	(21,7)	(20,0)	(15,5)	(4,1)	(13,0)	100,0	35
Second	*	*	*	*	*	*	100,0	25
Moyen	*	*	*	*	*	*	100,0	15
Quatrième	(23,6)	(23,9)	(10,4)	(17,2)	(11,8)	(13,2)	100,0	38
Le plus élevé	(18,3)	(54,6)	(16,5)	(5,1)	(4,7)	(0,8)	100,0	42
Ensemble 15–49	25,4	35,7	14,2	10,3	5,6	8,8	100,0	156
50–64	(18,8)	(19,1)	(22,6)	(6,7)	(16,6)	(16,3)	100,0	40
Ensemble 15–64	24,0	32,3	15,9	9,6	7,8	10,3	100,0	196

Note : Une consommation d'alcool correspond à une canette ou une bouteille de bière, un verre de vin, un verre de liqueur, ou une coupe de dolo ou de Banji. Les enquêtées qui ont déclaré avoir bu quelques gorgées d'alcool ont été enregistrés comme ayant consommé moins d'un verre standard. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
[1] L'enquêté a déclaré qu'il a bu de l'alcool chaque jour, presque chaque jour, ou pendant 25 jours ou plus au cours du mois dernier.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 3.16.1 Lieu de naissance et migration récente : Femme

Répartition (en %) des femmes de 15–49 ans qui ont toujours vécu dans leur lieu de résidence actuel, de celles qui sont nées au Mali mais hors de leur lieu de résidence actuel, et de celles qui sont nées dans un autre pays, et parmi les femmes qui sont nées hors de leur lieu de résidence actuel, pourcentage qui ont emménagé dans leur lieu de résidence actuel au cours des 5 dernières années, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Répartition (en %) par résidence lieu de naissance					Parmi les femmes nées hors de leur lieu de résidence actuel	
Caractéristique sociodémographique	A toujours vécu dans le lieu de résidence actuel[1]	Née au Mali mais hors du lieu de résidence actuel	Née hors du Mali	Total	Effectif de femmes	Pourcentage ayant emménagé dans leur lieu de résidence actuel au cours des 5 dernières années	Effectif de femmes[2]
Âge							
15–19	58,1	38,9	3,1	100,0	3 846	64,5	1 612
20–24	51,1	45,4	3,5	100,0	3 361	49,3	1 642
25–29	45,6	49,0	5,4	100,0	2 891	26,8	1 572
30–34	46,2	47,0	6,8	100,0	2 371	19,3	1 276
35–39	45,4	48,7	5,9	100,0	2 060	11,8	1 125
40–44	44,4	49,2	6,4	100,0	1 585	10,3	881
45–49	46,5	49,0	4,5	100,0	1 167	8,1	624
Résidence							
Bamako	46,5	45,9	7,6	100,0	2 675	38,7	1 431
Autre urbain	46,2	48,3	5,5	100,0	2 035	43,1	1 094
Ensemble urbain	46,4	46,9	6,7	100,0	4 710	40,6	2 525
Rural	50,6	45,3	4,1	100,0	12 571	28,5	6 208
Région							
Kayes	55,7	40,7	3,5	100,0	2 595	27,9	1 148
Koulikoro	48,9	46,5	4,6	100,0	4 010	36,8	2 048
Sikasso	47,0	46,4	6,6	100,0	3 131	29,9	1 658
Ségou	47,8	49,6	2,5	100,0	2 572	25,6	1 342
Mopti	50,3	46,3	3,4	100,0	1 527	24,3	758
Tombouctou	89,9	9,3	0,7	100,0	281	35,8	28
Gao	34,9	60,5	4,6	100,0	485	40,9	316
Kidal	†	†	†	100,0	6	†	4
Bamako	46,5	45,9	7,6	100,0	2 675	38,7	1 431
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	50,1	47,1	2,8	100,0	3 028	20,1	1 511
Second	57,7	39,5	2,8	100,0	3 126	20,6	1 322
Moyen	53,3	42,0	4,7	100,0	3 296	28,3	1 539
Quatrième	46,4	47,9	5,8	100,0	3 660	36,5	1 963
Le plus élevé	42,5	50,6	6,9	100,0	4 170	44,3	2 397
Ensemble 15–49	49,5	45,8	4,8	100,0	17 281	32,0	8 733
50–64	52,5	43,5	4,0	100,0	3 006	7,8	1 428
Ensemble 15–64	49,9	45,4	4,7	100,0	20 287	28,6	10 161

Note : Les enquêtées qui sont des visiteuses dans le ménage ne sont pas prises en compte dans ce tableau.
[1] Peut inclure des enquêtées qui sont nées ailleurs au Mali mais qui ont emménagé dans leur lieu de résidence actuel alors qu'elles étaient très jeunes.
[2] Inclut les enquêtées ayant déclaré être nées à l'extérieur du Mali et ayant toujours vécu dans leur lieu de résidence actuel. On suppose que ces enquêtées n'ont pas emménagé dans les cinq dernières années.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 3.16.2 Lieu de naissance et migration récente : Homme

Répartition (en %) des hommes de 15–49 ans qui ont toujours vécu dans leur lieu de résidence actuel, de ceux qui sont nés au Mali mais hors de leur lieu actuel de résidence, et de ceux qui sont nés dans un autre pays, et parmi les hommes qui sont nés hors de leur lieu de résidence actuel, pourcentage qui ont emménagé dans leur lieu actuel de résidence au cours des 5 dernières années, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Répartition (en %) par résidence lieu de naissance					Parmi les hommes nés hors de leur lieu de résidence actuel	
Caractéristique sociodémographique	A toujours vécu dans le lieu de résidence actuel[1]	Né au Mali mais hors du lieu de résidence actuel	Né hors du Mali	Total	Effectif d'hommes	Pourcentage ayant emménagé dans leur lieu de résidence actuel au cours des 5 dernières années	Effectif d'hommes[2]
Âge							
15–19	74,1	23,3	2,6	100,0	1 669	47,3	432
20–24	66,5	30,6	2,9	100,0	1 162	47,0	390
25–29	63,8	32,5	3,7	100,0	929	34,3	336
30–34	59,7	35,2	5,1	100,0	909	27,9	366
35–39	53,9	39,0	7,1	100,0	783	26,5	361
40–44	56,1	38,6	5,4	100,0	661	17,9	290
45–49	61,1	36,1	2,8	100,0	567	16,2	221
Résidence							
Bamako	52,4	42,2	5,5	100,0	1 177	20,2	561
Autre urbain	66,5	28,5	5,0	100,0	795	35,4	267
Ensemble urbain	58,0	36,7	5,3	100,0	1 971	25,1	827
Rural	66,7	29,9	3,4	100,0	4 707	37,0	1 568
Région							
Kayes	51,5	45,7	2,8	100,0	918	45,5	445
Koulikoro	68,2	28,0	3,8	100,0	1 637	36,5	520
Sikasso	72,7	20,6	6,7	100,0	1 210	26,2	330
Ségou	63,0	35,4	1,6	100,0	939	25,7	347
Mopti	75,5	21,6	2,8	100,0	505	52,2	123
Tombouctou	92,6	6,8	0,6	100,0	128	(31,5)	10
Gao	64,7	34,1	1,2	100,0	163	67,2	58
Kidal	†	†	†	100,0	2	†	2
Bamako	52,4	42,2	5,5	100,0	1 177	20,2	561
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	80,1	17,3	2,6	100,0	1 179	39,2	235
Second	76,1	21,4	2,5	100,0	1 170	34,1	279
Moyen	68,0	29,2	2,8	100,0	1 188	35,1	380
Quatrième	51,3	43,9	4,8	100,0	1 445	27,1	704
Le plus élevé	53,0	41,0	6,0	100,0	1 697	34,8	798
Ensemble 15–49	64,1	31,9	4,0	100,0	6 678	32,9	2 396
50–64	56,0	41,7	2,3	100,0	1 142	11,1	503
Ensemble 15–64	62,9	33,3	3,7	100,0	7 820	29,1	2 898

Note : Les enquêtés qui sont des visiteurs dans le ménage ne sont pas pris en compte dans ce tableau. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.

[1] Peut inclure des enquêtés qui sont nés ailleurs au Mali mais qui ont emménagé dans leur lieu de résidence actuel alors qu'ils étaient très jeunes

[2] Inclut les enquêtés ayant déclaré être nés à l'extérieur du Mali et ayant toujours vécu dans leur lieu de résidence actuel. On suppose que ces enquêtés n'ont pas emménagé dans les cinq dernières années.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 3.17 Type de migration

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15–49 ans qui ont emménagé dans leur lieu de résidence actuel au cours des 5 dernières années par type de migration, selon l'âge, EDSM-VII Mali 2023–2024

Âge	Type de migration				Total	Effectif d'enquêtés
	Urbain vers urbain	Urbain vers rural	Rural vers urbain	Rural vers rural		
			FEMME 15–49			
15–19	9,0	22,3	30,8	37,9	100,0	1 041
20–24	13,0	25,5	19,1	42,4	100,0	810
25–29	19,8	27,0	19,0	34,2	100,0	421
30–34	18,3	29,2	19,1	33,4	100,0	246
35–39	19,5	28,9	13,5	38,1	100,0	133
40–44	12,7	34,2	21,2	31,9	100,0	91
45–49	16,0	36,7	24,6	22,6	100,0	50
Ensemble 15–49	13,4	25,5	23,4	37,8	100,0	2 791
50–64	12,2	24,8	20,6	42,4	100,0	112
15–64	13,3	25,5	23,2	38,0	100,0	2 903
			HOMME 15–49			
15–19	14,5	34,9	16,3	34,2	100,0	204
20–24	16,0	36,7	13,8	33,6	100,0	183
25–29	18,3	42,6	9,7	29,3	100,0	115
30–34	20,6	44,4	6,2	28,8	100,0	102
35–39	15,8	43,4	0,9	39,9	100,0	96
40–44	8,7	50,6	0,0	40,7	100,0	52
45–49	(19,8)	(32,4)	(7,7)	(40,1)	100,0	36
Ensemble 15–49	16,2	39,6	10,1	34,0	100,0	788
50–64	18,7	35,7	3,2	42,4	100,0	56
15–64	16,4	39,4	9,7	34,6	100,0	844

Note : Le type de migration est basé sur la catégorisation du lieu de résidence précédent et du lieu de résidence actuel comme urbain ou rural. Le lieu de résidence précédent est l'endroit d'où la personne a déménagé juste avant d'emménager dans son lieu de résidence actuel. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.

Tableau 3.18.1 Raison de la migration : Femme

Répartition (en %) des femmes de 15–49 ans qui ont emménagé dans leur lieu de résidence actuel par raison de la migration, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Emploi	Études/ formation	Mariage	Rapproche-ment familial/ autres raisons liées à la famille	Déplacement forcé	Autre	Total	Effectif de femmes
Âge								
15–19	18,5	9,1	26,8	43,5	2,0	0,0	100,0	1 604
20–24	5,2	4,7	58,0	29,8	2,2	0,0	100,0	1 634
25–29	2,2	1,8	66,8	26,6	2,6	0,0	100,0	1 562
30–34	3,7	1,2	62,5	29,5	3,1	0,0	100,0	1 256
35–39	2,1	1,1	66,0	27,9	2,8	0,0	100,0	1 118
40–44	2,3	1,1	64,2	29,3	3,2	0,0	100,0	874
45–49	2,0	0,8	66,9	26,8	3,3	0,2	100,0	620
Durée depuis le déménagement dans le lieu de résidence actuel								
0–4 ans	13,6	5,6	45,4	30,7	4,8	0,0	100,0	2 791
5–9 ans	3,3	3,2	62,8	29,2	1,5	0,0	100,0	1 888
10 ans ou plus	2,0	1,9	61,9	32,5	1,6	0,0	100,0	3 988
Type de migration[1]								
Urbain vers urbain	8,2	7,6	49,6	33,0	1,6	0,0	100,0	373
Urbain vers rural	5,9	4,9	46,7	39,7	2,8	0,0	100,0	712
Rural vers urbain	36,6	9,0	28,1	22,6	3,6	0,0	100,0	652
Rural vers rural	6,4	3,2	53,7	28,8	7,9	0,0	100,0	1 054
Résidence								
Bamako	20,4	5,3	36,5	36,7	1,0	0,1	100,0	1 412
Autre urbain	7,2	8,1	47,0	34,7	3,1	0,0	100,0	1 088
Ensemble urbain	14,6	6,5	41,1	35,8	1,9	0,0	100,0	2 500
Rural	2,5	2,1	63,1	29,3	2,9	0,0	100,0	6 168
Région								
Kayes	3,0	2,7	56,1	37,7	0,5	0,0	100,0	1 147
Koulikoro	4,7	2,8	51,9	40,0	0,7	0,0	100,0	2 023
Sikasso	2,4	3,1	71,4	22,2	0,9	0,0	100,0	1 643
Ségou	3,1	4,3	63,5	27,4	1,7	0,0	100,0	1 342
Mopti	2,4	2,0	68,2	19,6	7,8	0,0	100,0	755
Tombouctou	1,2	2,2	48,0	37,1	11,5	0,0	100,0	28
Gao	1,0	2,2	50,0	17,5	29,3	0,0	100,0	316
Kidal	†	†	†	†	†	†	100,0	4
Bamako	20,4	5,3	36,5	36,7	1,0	0,1	100,0	1 412
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	0,6	0,6	82,1	16,1	0,5	0,0	100,0	1 497
Second	0,2	0,7	76,2	20,6	2,4	0,0	100,0	1 317
Moyen	1,3	1,8	63,8	27,2	6,0	0,0	100,0	1 533
Quatrième	4,0	5,2	47,4	39,0	4,3	0,1	100,0	1 948
Le plus élevé	17,3	6,1	33,2	42,8	0,5	0,0	100,0	2 373
Ensemble 15–49	6,0	3,4	56,8	31,2	2,6	0,0	100,0	8 668
50–64	1,3	0,4	61,6	32,4	4,3	0,0	100,0	1 419
Ensemble 15–64	5,3	3,0	57,4	31,4	2,9	0,0	100,0	10 086

Note : Les enquêtées qui sont des visiteuses dans le ménage ne sont pas prises en compte dans ce tableau. La question sur la raison de la migration n'a pas été posée aux enquêtées ayant déclaré qu'elles sont nées hors du Mali et qu'elles ont toujours vécu dans leur lieu de résidence actuel et ces enquêtées ne sont pas incluses dans ce tableau.

[1] Limité aux enquêtées qui ont migré au cours des 5 dernières années.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 3.18.2 Raison de la migration : Homme

Répartition (en %) des hommes de 15–49 ans qui ont emménagé dans leur lieu de résidence actuel par raison de la migration, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Emploi	Études/ formation	Mariage	Rapproche-ment familial/ autres raisons liées à la famille	Déplacement forcé	Autre	Total	Effectif d'hommes
Âge								
15–19	15,2	30,3	0,3	49,8	3,9	0,5	100,0	427
20–24	26,8	20,6	1,2	47,3	3,5	0,6	100,0	389
25–29	35,4	12,5	3,9	44,9	2,9	0,4	100,0	329
30–34	40,0	9,3	3,3	39,0	7,1	1,3	100,0	359
35–39	47,1	5,0	2,4	39,8	5,2	0,6	100,0	347
40–44	54,8	3,4	2,2	34,6	4,6	0,4	100,0	289
45–49	43,3	2,4	2,4	42,0	9,1	0,7	100,0	220
Durée depuis le déménagement dans le lieu de résidence actuel								
0–4 ans	40,0	17,5	2,6	29,2	9,8	0,9	100,0	788
5–9 ans	36,9	18,4	1,2	39,0	3,6	0,9	100,0	442
10 ans ou plus	32,5	8,6	2,2	54,2	2,1	0,4	100,0	1 129
Type de migration[1]								
Urbain vers urbain	28,3	24,0	3,9	41,7	1,5	0,6	100,0	128
Urbain vers rural	42,9	11,7	4,3	38,1	1,9	1,1	100,0	312
Rural vers urbain	42,0	46,1	0,7	6,4	3,9	1,0	100,0	80
Rural vers rural	41,7	12,6	0,5	19,6	24,7	0,9	100,0	268
Résidence								
Bamako	32,6	21,8	3,4	40,6	0,9	0,8	100,0	560
Autre urbain	44,1	18,5	1,3	29,1	6,7	0,3	100,0	263
Ensemble urbain	36,3	20,8	2,7	36,9	2,7	0,6	100,0	823
Rural	35,6	9,5	1,8	46,3	6,1	0,7	100,0	1 537
Région								
Kayes	48,9	9,2	3,4	34,0	3,8	0,7	100,0	443
Koulikoro	43,7	13,3	0,9	38,4	2,7	1,0	100,0	516
Sikasso	33,7	8,0	0,4	54,7	2,7	0,5	100,0	302
Ségou	22,6	13,7	1,3	60,3	1,7	0,3	100,0	347
Mopti	22,5	9,5	4,3	43,8	19,9	0,0	100,0	123
Tombouctou	(19,7)	(2,6)	(2,0)	(41,0)	(34,7)	(0,0)	100,0	9
Gao	17,4	2,8	0,6	11,0	68,2	0,0	100,0	58
Kidal	†	†	†	†	†	†	100,0	2
Bamako	32,6	21,8	3,4	40,6	0,9	0,8	100,0	560
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	34,9	4,4	2,7	54,5	3,4	0,0	100,0	221
Second	26,0	6,0	4,4	54,9	8,2	0,4	100,0	268
Moyen	32,7	6,2	1,5	48,1	10,1	1,4	100,0	376
Quatrième	44,2	13,6	1,8	34,5	5,3	0,6	100,0	699
Le plus élevé	33,6	21,7	1,8	40,8	1,5	0,6	100,0	794
Ensemble 15–49	35,9	13,4	2,1	43,0	5,0	0,6	100,0	2 360
50–64	47,7	1,2	1,2	42,7	6,4	0,7	100,0	501
Ensemble 15–64	37,9	11,3	2,0	42,9	5,2	0,7	100,0	2 861

Note : Les enquêtés qui sont des visiteurs dans le ménage ne sont pas pris en compte dans ce tableau. La question sur la raison de la migration n'a pas été posée aux enquêtés ayant déclaré qu'ils sont nés hors du Mali et qu'ils ont toujours vécu dans leur lieu de résidence actuel et ces enquêtés ne sont pas inclus dans ce tableau. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.

[1] Limité aux enquêtés qui ont migré au cours des 5 dernières années

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE 4

Principaux résultats

- ***État matrimonial actuel :*** Plus de trois femmes de 15–49 ans sur quatre (76 %) et un peu plus de la moitié des hommes (53 %) sont actuellement en union
- ***Enregistrement du mariage :*** Le pourcentage de femmes de 15–49 ans actuellement en union dont le mariage ou l'union actuel a été enregistré et qui disposent d'un certificat de mariage est de 30 %.
- ***Polygamie :*** Malgré la prédominance des unions monogamiques (60 % des femmes et 79 % des hommes), la polygamie demeure une pratique assez répandue puisqu'elle concerne 40 % des femmes et 21 % des hommes en union
- ***Âge à la première union :*** L'âge d'entrée en union des femmes est précoce ; 14% des femmes de 20–24 ans au moment de l'enquête étaient déjà en union avant d'atteindre l'âge exact de 15 ans et 49 % l'étaient déjà en union avant l'âge de 18 ans exact
- ***Âge aux premiers rapports sexuels :*** L'âge médian aux premiers rapports sexuels est de 16,2 ans chez les femmes de 25–49 ans et de 21,8 ans chez les hommes de 25–49 ans.

Le mariage et l'activité sexuelle permettent de déterminer le degré d'exposition au risque de grossesse pour les femmes. Ce sont donc des déterminants importants des niveaux de fécondité. Le calendrier et les circonstances du mariage, ainsi que de l'activité sexuelle, ont également de profondes conséquences sur la vie des femmes et des hommes.

4.1 ÉTAT MATRIMONIAL

Actuellement en union

Femmes et hommes qui déclarent être mariés ou vivre ensemble avec un(e) partenaire comme s'ils étaient mariés au moment de l'enquête. Dans ce rapport, les termes « actuellement en union » et « actuellement mariés » sont utilisés de façon interchangeable, sauf indication contraire.

Échantillon : Femmes et hommes âgés de 15 à 49 ans

Au moment de l'enquête, plus de sept femmes sur dix (76 %) et un peu plus de la moitié des hommes (53 %) de 15–49 ans étaient en union, conformément à la définition retenue dans l'enquête. En outre, environ une femme sur cinq (21 %) et 47 % des hommes étaient célibataires. Le veuvage, la séparation ou le divorce concernaient 3 % des femmes et 1 % des hommes (**Tableau 4.1** et **Graphique 4.1**).

Graphique 4.1 Situation matrimoniale

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15–49 ans



Note : À cause d'un arrondissement, le total excède 100 %.

Les pourcentages de célibataires diminuent rapidement avec l'âge, de façon plus marquée parmi les femmes que parmi les hommes : dans le groupe d'âges 25–29 ans, seulement 6 % des femmes contre 37 % des hommes sont encore célibataires.

Tendances : Entre 2006 et 2023–2024, les pourcentages de femmes de 15–49 ans en union au moment de l'enquête ont légèrement diminué passant de 85 % en 2006 à 76 % en 2023–2024. Chez les hommes, ces pourcentages sont passés de 60 % en 2006 à 53 % en 2023–2024.

Dans la même période, les pourcentages des célibataires ont augmenté, passant de 12 % à 21 % parmi les femmes et de 35 % à 47 % parmi les hommes.

4.2 ENREGISTREMENT DU MARIAGE

Mariage enregistré

Une femme dont le mariage est enregistré à l'état civil, qu'elle possède ou non un certificat de mariage.

Échantillon : Femmes de 15–49 ans, actuellement en union ; n'inclut pas les femmes qui vivent avec un homme comme si elles étaient mariées mais qui ne se déclarent pas comme étant mariées.

L'enregistrement du mariage à l'état civil peut être déterminant dans la protection sociale des enfants et des femmes. Au cours de l'enquête, on a demandé aux femmes actuellement en union si leur mariage/union était enregistré à l'état civil et si elles disposaient d'un certificat de mariage. Au Mali, trois femmes de 15–49 ans sur dix (30 %) ont eu leur mariage ou leur union actuel enregistré auprès de l'état civil et disposent d'un certificat de mariage. Cette proportion varie de 61 % en milieu urbain à 21 % en milieu rural. Les résultats selon le bien-être économique montrent que le pourcentage de femmes de 15–49 ans disposant d'un certificat de mariage pour le mariage actuel varie de 10 % dans le quintile le plus bas à 70 % dans le plus élevé (**Tableau 4.2**). Les résultats selon les régions mettent en évidence des disparités : le pourcentage de femmes dont le mariage a été enregistré à l'état civil varie d'un minimum de 6 % à Gao à un maximum de 33 % à Koulikoro. Avec 71 %, le district de Bamako enregistre la proportion la plus élevée de femmes sont le mariage a été enregistré à l'état civil et qui dispose d'un certificat de mariage.

4.3 POLYGAMIE

Polygamie

Les femmes qui déclarent que leur partenaire ou leur mari a d'autres épouses sont considérés comme étant en union polygame.

Echantillon : Femmes de 15–19 ans actuellement en union

Au Mali, malgré la prédominance des unions monogames (60 % des femmes et 79 % des hommes de 15–49 ans), on constate que la polygamie reste encore une pratique assez courante puisqu'elle concerne 40 % des femmes et 21 % des hommes en union (**Tableau 4.3.1** et **Tableau 4.3.2**). Un tiers des femmes en union ont 1 coépouse (33 %) et 7 % ont 2 coépouses ou plus.

Tendances : De façon générale, le pourcentage de femmes de 15 -49 ans en union polygame n'a pratiquement pas changé entre 2001 et 2023–2024, passant de 42 % à 40 % (**Graphique 4.2**). Par contre, dans la même période, on note une diminution du pourcentage d'hommes de 15–49 ans ayant deux épouses ou plus passant de 25 % en 2006 et à 21 % en 2023–2024.

Graphique 4.2 **Tendances de la polygynie**

Pourcentage de femmes de 15–49 ans en union polygynique



Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- La proportion de femmes ayant au moins une coépouse augmente avec l'âge. Elle varie de 18 % parmi les femmes de 15–19 ans à 59 % parmi celles de 40–44 ans (**Tableau 4.3.1**).
- La polygamie est plus fréquemment pratiquée en milieu rural qu'en milieu urbain. En effet, 43 % des femmes en milieu rural vivent en union polygame contre 28 % parmi celles du milieu urbain (**Tableau 4.3.1**). Parmi les hommes, cette proportion est de 23 % en milieu rural contre 14 % en milieu urbain (**Tableau 4.3.2**).

- Concernant les régions, c'est dans celles de Mopti (47 %), Sikasso (47 %) et Kayes (45 %) que l'on enregistre les pourcentages les plus élevés de femmes en union polygame. À l'opposé, c'est dans la région de Tombouctou (17 %) que le pourcentage de femmes en union polygame est le plus faible (**Carte 4.1**).

- Le pourcentage de femmes en union polygame diminue avec l'augmentation du niveau d'instruction, passant de 45 % parmi les femmes n'ayant aucun niveau d'instruction à 37 % parmi celles ayant le niveau primaire et à 26 % parmi celles ayant atteint le niveau secondaire ou plus (**Tableau 4.3.1**).

- La pratique de la polygamie a tendance à diminuer avec l'augmentation du quintile de bien-être économiques, passant, parmi les femmes, de 48 % dans le quintile le plus bas à 30 % dans le quintile le plus élevé (**Tableau 4.3.1**). Parmi les hommes , la tendance est similaire, le pourcentage passant respectivement de 28 % à 14 % (**Tableau 4.3.2**).

Carte 4.1 Polygynie par région

Pourcentage de femmes de 15–49 ans actuellement en union polygynique



Note : Pour des raisons d'insécurité, les données de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région et ne sont pas présentées séparément.

4.4 ÂGE À LA PREMIÈRE UNION

Âge médian à la première union

Âge auquel la moitié des enquêtés sont entrés en première union.

Échantillon : Femmes âgées de 20–49 ans et 25–49 ans, et hommes âgés de 20–49 ans, 25–49 ans, 30–49 ans et 30–64 ans.

Au Mali, l'âge d'entrée en première union des femmes est précoce. En effet, parmi les femmes âgées de 25–49 ans au moment de l'enquête, 17 % étaient déjà en union avant d'atteindre l'âge de 15 ans exact et près de la moitié (48 %) l'était déjà avant 18 ans exacts. Avant 25 ans exacts, près de neuf femmes sur dix (88 %) avait déjà contracté leur première union (**Tableau 4.4**). L'âge médian d'entrée en première union des femmes de 25–49 ans est estimé à 18,3 ans. En outre, les résultats montrent que cet âge médian n'a pas

subi de modification importante des générations anciennes aux plus récentes, cet âge médian variant de 18,7 dans le groupe d'âges 45–49 ans à 18,2 ans dans celui de 25–29 ans (**Tableau 4.4**).

Les hommes entrent en première union à un âge beaucoup plus tardif que les femmes. : parmi les enquêtés de 20–49 ans, 66 % des femmes étaient déjà en union avant d'atteindre l'âge de 20 ans contre seulement 6 % parmi les hommes. L'âge médian à la première union des hommes de 30–49 ans est de 26,3 ans. Avant 30 ans, la moitié d'hommes n'étaient pas encore mariés. (**Tableau 4.4**).

Tendances : La comparaison des résultats des différentes enquêtes montre que la proportion des femmes de 20–24 ans en première union avant l'âge de 15 ans et avant 18 ans a tendance à baisser entre 2006 et 2023–2024. En effet, le pourcentage des femmes de 20–24 ans en première union avant l'âge de 15 ans est passé de 25 % en 2006 à 14 % en 2023–2024. Dans la même période, la proportion des femmes en première union avant l'âge de 18 ans est passé de 71 %.

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Les femmes de Bamako entrent en première union plus tard (âge médian de 20,5 ans) que les femmes des autres villes (âge médian de 19,2 ans) et que celles du milieu rural (âge médian de 17,8 ans) (**Tableau 4.5** et **Graphique 4.3**).

Graphique 4.3 **Âge médian des femmes à la première union par résidence**



- Les résultats selon la région montrent que dans deux régions _Kayes et Sikasso_ l'âge médian des femmes de 25–49 ans est inférieur à 18 ans, âge légal d'entrée en union au Mali (**Tableau 4.5**). Dans les autres régions, cet âge médian est égal ou légèrement supérieur à 18 ans ; Bamako se distingue par un âge nettement plus tardif (20,5 ans)
- Les résultats selon le niveau d'instruction montrent que plus les femmes sont instruites, plus elles entrent en union à un âge tardif ; l'âge médian chez les femmes de 25–49 ans n'ayant aucun niveau d'instruction est de 17,6 ans, il est de 18,0 ans parmi celles ayant le niveau primaire et de 21,3 ans parmi celles ayant le niveau secondaire ou plus. Parmi les hommes, les mêmes tendances sont observées, cet indicateur passe de 25,3 ans parmi les hommes n'ayant aucun niveau d'instruction à 28,3 ans parmi ceux ayant le niveau secondaire ou plus (**Tableau 4.5**).
- Dans les ménages du quintile le plus élevé, les femmes et les hommes se marient un peu plus tard que les autres (**Tableau 4.5**).

4.5 ÂGE AU PREMIER RAPPORT SEXUEL

Âge médian au premier rapport sexuel

Âge auquel la moitié des enquêtés ont eu des rapports sexuels.

Échantillon : Femmes âgées de 20–49 ans et 25–49 ans et hommes âgés de 30–49 ans et 30–64 ans.

En tant que déterminant proche de la fécondité, l'âge au premier rapport sexuel est tout aussi important que l'âge à la première union, les rapports sexuels n'ayant pas forcément lieu dans le cadre exclusif de l'union. Pour cette raison, on a demandé aux personnes enquêtées quand elles ont eu, pour la première fois, des rapports sexuels. Le **Tableau 4.6** présente les pourcentages de femmes et d'hommes de 15–49 ans ayant eu leur premier rapport sexuel avant d'atteindre certains âges exacts, les pourcentages n'ayant jamais eu de rapports sexuels et l'âge médian aux premiers rapports sexuels selon l'âge actuel. Avant d'atteindre 15 ans exacts, 22 % des femmes de 25–49 ans avaient déjà eu des rapports sexuels. Cette proportion est de 75 % avant d'atteindre 18 ans et de 88 % avant d'atteindre 20 ans. L'âge médian aux premiers rapports sexuels chez les femmes âgées de 25–49 ans est estimé à 16,2 ans. Chez les hommes de 25- 49 ans, 2 % avaient déjà eu leur premier rapport sexuel avant d'atteindre 15 ans exacts et 12 % avant 18 ans exacts. La comparaison de ces pourcentages entre hommes et femmes de 25–49 ans montre que les femmes commencent leur vie sexuelle plus tôt que les hommes. L'âge médian des hommes de 25–49 ans aux premiers rapports sexuels est estimé à 21,8 ans et il est donc plus vieux de cinq ans que chez les femmes (**Tableau 4.6**).

***Graphique 4.4* Âge médian aux premiers rapports sexuels et à la première union pour les femmes de 25–49 ans**

Âge médian en années



L'âge médian au premier rapport sexuel des femmes est inférieur à celui d'entrée à la première union (**Graphique 4.4**), ce qui montre l'existence de relations sexuelles prénuptiales. En effet, l'âge médian aux premiers rapports sexuels des femmes âgées de 25–49 ans est estimé à 16,2 ans et l'âge médian à la première union est de 18,3 ans.

Tendances : Depuis 2006, le pourcentage de femmes de 25–49 ans ayant déjà eu des rapports sexuels avant d'atteindre l'âge de 18 ans a globalement augmenté, passant de 70 % à 75 % en 2023–2024. Par ailleurs, pour la même période, le pourcentage d'hommes de 25–49 ans ayant eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre l'âge de 18 ans a diminué passant de 20 % en 2006 à 12 % en 2023–2024 (**Graphique 4.5**).

***Graphique 4.5* Rapports sexuels précoces : tendance**

Pourcentage ayant eu leurs premiers rapports sexuels avant 18 ans



Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- L'âge médian au premier rapport sexuel des femmes de 25–49 ans est légèrement plus précoce en milieu rural qu'en milieu urbain (16,0 ans contre 16,9 ans) (**Tableau 4.7**).

- Par région, l'âge médian au premier rapport sexuel des femmes de 25–49 ans le plus précoce est observé à Kayes avec 15,5 ans, suivi de la région de Gao (15,9 ans). C'est dans le district de Bamako que l'âge médian au premier rapport sexuel des femmes de 25–49 ans est le plus tardif (17,1 ans) (**Tableau 4.7**).

- Plus les femmes ont un niveau d'instruction élevé, plus l'âge médian au premier rapport sexuel est tardif. Ainsi, il passe de 16,0 ans chez les femmes n'ayant aucun niveau d'instruction à 17,4 ans chez celles ayant le niveau secondaire ou plus (**Tableau 4.7**).

- Du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, l'âge médian des femmes de 25–49 ans au premier rapport sexuel augmente, passant respectivement de 15,9 ans à 17,2 ans (**Tableau 4.7**).

4.6 ACTIVITÉ SEXUELLE RÉCENTE

La fréquence des rapports sexuels est un facteur important de l'exposition au risque de grossesse et de transmission des infections et maladies sexuellement transmissibles, si des mesures de protections ne sont pas prises. Les **Tableaux 4.8.1** et **4.8.2** présentent les résultats sur l'activité sexuelle récente des femmes et des hommes de 15–49 ans. Six femmes sur dix (60 %) et un peu plus de la moitié des hommes (51 %) de 15 à 49 ans ont déclaré avoir eu leurs derniers rapports sexuels dans les quatre semaines avant l'enquête. Pour 19 % des femmes et 13 % des hommes, les derniers rapports sexuels ont eu lieu au cours de la dernière année mais pas dans les quatre semaines avant l'enquête et, pour 7 % des femmes et 5 % des hommes, les derniers rapports sexuels ont eu lieu il y a un an et plus. En outre, 15 % des femmes et 30 % des hommes ont déclaré n'avoir jamais eu de rapports sexuels.

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

Le pourcentage de femmes sexuellement actives au cours des quatre dernières semaines a tendance à augmenter avec l'âge, passant de 26 % parmi les femmes de 15–19 ans à 76 % parmi celles de 35–39 ans pour diminuer ensuite légèrement pour atteindre 73% à 45–49 ans. Parmi les hommes, on note la même tendance que chez les femmes, le pourcentage de ceux qui étaient sexuellement actifs au cours des quatre dernières semaines passant de 3 % parmi ceux de 15–19 ans à 88 % à 35–39 ans et à 87 % à 45–49 ans (**Tableaux 4.8.1** et **4.8.2**).

L'activité sexuelle récente varie selon l'état matrimonial : chez les femmes comme chez les hommes, c'est parmi celles et ceux qui sont en union que les pourcentages ayant déclaré que leurs derniers rapports sexuels avaient eu lieu dans les quatre dernières semaines sont les plus élevés (76 % parmi les femmes et 86 % parmi les hommes).

La proportion de femmes ayant eu une activité sexuelle récente est plus élevée en milieu rural (64 %) qu'en milieu urbain (50 %).

Les résultats selon le niveau d'instruction montrent que la proportion de femmes sexuellement actives dans la période récente diminue avec l'augmentation du niveau d'instruction, passant de 67 % chez les femmes n'ayant aucun niveau d'instruction à 58 % chez celles ayant le niveau primaire et à 47 % chez celles de niveau secondaire ou plus. La même tendance est observée chez les hommes, le pourcentage passant respectivement de 64 % à 50 % et à 42 %.

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur le mariage et l'activité sexuelle, voir les tableaux suivants :

- **Tableau 4.1 État matrimonial actuel**
- **Tableau 4.2 Enregistrement du mariage**
- **Tableau 4.3.1 Nombre de coépouses des femmes**
- **Tableau 4.3.2 Nombre d'épouses des hommes**
- **Tableau 4.4 Âge à la première union**
- **Tableau 4.5 Âge médian à la première union selon certaines caractéristiques**
- **Tableau 4.6 Âge aux premiers rapports sexuels**
- **Tableau 4.7 Âge médian aux premiers rapports sexuels selon certaines caractéristiques**
- **Tableau 4.8.1 Activité sexuelle récente : Femme**
- **Tableau 4.8.2 Activité sexuelle récente : Homme**

Tableau 4.1 État matrimonial actuel

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15–49 ans par état matrimonial actuel, selon l'âge, EDSM-VII Mali 2023–2024

	État matrimonial								
		Actuellement en union		En rupture d'union					
Âge	Célibataire	Marié	Vivant ensemble	Divorcé	Séparé	Veuf	Total	Pourcentage d'enquêtés actuellement en union	Effectif d'enquêtés
					FEMME				
15–19	67,3	31,1	1,0	0,2	0,4	0,0	100,0	32,1	3 862
20–24	21,0	75,0	1,7	1,4	0,5	0,4	100,0	76,7	3 378
25–29	5,5	91,2	1,0	1,1	0,5	0,7	100,0	92,1	2 905
30–34	2,8	93,7	0,5	1,5	0,7	0,8	100,0	94,2	2 382
35–39	1,4	93,0	0,7	1,2	0,7	3,0	100,0	93,7	2 065
40–44	0,8	92,4	0,4	1,4	0,5	4,5	100,0	92,8	1 586
45–49	0,7	90,2	1,9	1,2	0,5	5,6	100,0	92,1	1 169
Ensemble 15–49	20,7	75,3	1,0	1,1	0,5	1,4	100,0	76,3	17 347
					HOMME				
15–19	99,6	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	100,0	0,4	1 669
20–24	84,9	13,9	1,1	0,1	0,0	0,0	100,0	15,0	1 165
25–29	37,2	60,2	2,0	0,0	0,6	0,0	100,0	62,2	930
30–34	10,6	86,9	0,5	1,1	0,6	0,3	100,0	87,4	909
35–39	3,2	95,4	0,6	0,6	0,1	0,1	100,0	96,0	784
40–44	0,8	97,2	0,5	0,9	0,3	0,2	100,0	97,8	663
45–49	0,9	96,0	2,0	0,5	0,2	0,3	100,0	98,0	568
Ensemble 15–49	46,8	51,6	0,9	0,4	0,2	0,1	100,0	52,5	6 686
50–64	0,4	97,5	0,6	0,5	0,3	0,7	100,0	98,1	1 143
Ensemble 15–64	40,0	58,3	0,9	0,4	0,2	0,2	100,0	59,2	7 829

Tableau 4.2 Enregistrement du mariage

Pourcentage de femmes de 15–49 ans en union dont le mariage ou l'union actuel a été enregistré, pourcentage dont le mariage ou l'union actuel a été enregistré et qui disposent des documents reconnaissant le mariage/l'union, et pourcentage dont le mariage ou l'union actuel a été enregistré et qui disposent d'un certificat de mariage, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage dont le mariage ou l'union actuel a été enregistré[1]	Pourcentage dont le mariage ou l'union actuel a été enregistré et qui disposent des documents reconnaissant le mariage/l'union	Pourcentage dont le mariage ou l'union actuel a été enregistré et qui disposent d'un certificat de mariage	Effectif de femmes en union[1]
Âge				
15–19	24,3	23,6	22,9	1 241
20–24	31,0	30,2	29,0	2 592
25–29	33,3	32,6	31,8	2 677
30–34	36,3	35,2	34,3	2 243
35–39	32,8	31,6	30,6	1 935
40–44	28,5	27,7	26,9	1 472
45–49	29,7	28,5	27,8	1 077
Résidence				
Bamako	72,9	72,4	70,8	1 553
Autre urbain	52,5	51,0	49,5	1 339
Ensemble urbain	63,4	62,5	60,9	2 892
Rural	22,7	21,8	21,1	10 345
État matrimonial				
Marié	32,0	31,1	30,2	13 056
Vivant ensemble	4,5	4,1	3,6	181
Région				
Kayes	17,2	15,5	13,9	2 094
Koulikoro	33,7	33,2	32,6	3 130
Sikasso	29,1	28,2	27,5	2 558
Ségou	24,7	23,5	22,7	2 109
Mopti	26,5	25,8	25,6	1 230
Tombouctou	9,3	8,9	8,5	199
Gao	7,4	6,5	5,7	360
Kidal	†	†	†	5
Bamako	72,9	72,4	70,8	1 553
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	11,5	10,5	10,0	2 720
Second	15,8	14,8	14,3	2 745
Moyen	22,9	21,8	20,9	2 692
Quatrième	40,2	39,5	38,0	2 642
Le plus élevé	72,1	71,4	70,3	2 438
Ensemble	31,6	30,7	29,8	13 237

[1] Y compris les femmes qui déclarent être actuellement mariées ou vivent avec un homme comme s'ils étaient mariés

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 4.3.1 Nombre de coépouses des femmes

Répartition (en %) des femmes de 15–49 ans actuellement en union par nombre de coépouses et pourcentage de femmes actuellement en union ayant une coépouse ou plus, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Nombre de coépouses				Ensemble	Pourcentage ayant une coépouse ou plus[1]	Effectif de femmes
	0	1	2+	Ne sait pas			
Âge							
15–19	82,2	16,3	1,4	0,1	100,0	17,7	1 241
20–24	76,6	21,6	1,7	0,0	100,0	23,4	2 592
25–29	65,4	29,9	4,6	0,0	100,0	34,6	2 677
30–34	55,7	36,0	8,2	0,1	100,0	44,2	2 243
35–39	45,9	42,8	11,3	0,1	100,0	54,1	1 935
40–44	41,1	45,5	13,2	0,2	100,0	58,7	1 472
45–49	44,9	40,8	14,2	0,2	100,0	54,9	1 077
Résidence							
Bamako	74,4	21,3	4,1	0,2	100,0	25,4	1 553
Autre urbain	68,9	25,0	5,9	0,2	100,0	30,9	1 339
Ensemble urbain	71,8	23,0	4,9	0,2	100,0	28,0	2 892
Rural	57,1	35,2	7,6	0,0	100,0	42,9	10 345
Région							
Kayes	55,1	35,2	9,7	0,0	100,0	44,9	2 094
Koulikoro	63,5	31,3	5,2	0,1	100,0	36,4	3 130
Sikasso	52,9	37,0	10,0	0,0	100,0	47,0	2 558
Ségou	58,6	35,1	6,3	0,0	100,0	41,4	2 109
Mopti	52,9	39,4	7,7	0,0	100,0	47,1	1 230
Tombouctou	82,4	15,6	1,7	0,3	100,0	17,3	199
Gao	78,0	17,3	4,6	0,1	100,0	21,9	360
Kidal	†	†	†	†	100,0	†	5
Bamako	74,4	21,3	4,1	0,2	100,0	25,4	1 553
Niveau d'instruction							
Aucun	54,9	36,5	8,5	0,1	100,0	45,0	8 200
Primaire	62,8	31,8	5,3	0,1	100,0	37,1	2 167
Secondaire ou plus	73,9	21,9	4,1	0,1	100,0	26,1	2 870
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	52,0	40,7	7,3	0,0	100,0	48,0	2 720
Second	55,8	36,9	7,3	0,0	100,0	44,2	2 745
Moyen	58,7	33,3	8,0	0,0	100,0	41,3	2 692
Quatrième	66,2	26,8	6,9	0,1	100,0	33,7	2 642
Le plus élevé	70,1	24,1	5,6	0,2	100,0	29,7	2 438
Ensemble	60,3	32,6	7,1	0,1	100,0	39,6	13 237

[1] Non compris les femmes qui ont répondu "Ne sait pas" quand on leur a demandé si leur conjoint avait d'autres épouses/partenaires
Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 4.3.2 Nombre d'épouses des hommes

Répartition (en %) des hommes de 15–49 ans actuellement en union par nombre d'épouses, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Nombre d'épouses		Total	Effectif d'hommes
	1	2+		
Âge				
15–19	*	*	100,0	7
20–24	95,0	5,0	100,0	175
25–29	94,6	5,4	100,0	578
30–34	89,7	10,3	100,0	794
35–39	78,4	21,6	100,0	753
40–44	63,6	36,4	100,0	648
45–49	62,0	38,0	100,0	557
Résidence				
Bamako	88,8	11,2	100,0	503
Autre urbain	82,0	18,0	100,0	365
Ensemble urbain	85,9	14,1	100,0	868
Rural	77,0	23,0	100,0	2 644
Région				
Kayes	78,0	22,0	100,0	474
Koulikoro	79,3	20,7	100,0	884
Sikasso	76,3	23,7	100,0	689
Ségou	74,9	25,1	100,0	493
Mopti	72,2	27,8	100,0	298
Tombouctou	96,0	4,0	100,0	72
Gao	84,8	15,2	100,0	97
Kidal	†	†	100,0	2
Bamako	88,8	11,2	100,0	503
Niveau d'instruction				
Aucun	73,4	26,6	100,0	1 710
Primaire	79,6	20,4	100,0	679
Secondaire ou plus	87,7	12,3	100,0	1 123
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	72,5	27,5	100,0	708
Second	78,7	21,3	100,0	704
Moyen	76,2	23,8	100,0	636
Quatrième	82,1	17,9	100,0	718
Le plus élevé	85,7	14,3	100,0	747
Ensemble 15–49	79,2	20,8	100,0	3 512
50–64	57,0	43,0	100,0	1 121
Ensemble 15–64	73,8	26,2	100,0	4 633

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 4.4 Âge à la première union

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans qui étaient en première union avant d'atteindre certains âges exacts et âge médian à la première union, selon l'âge actuel, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Pourcentage en première union avant d'atteindre l'âge exact de :					Pourcentage de célibataires	Effectif d'enquêtés	Âge médian à la première union
Âge actuel	15	18	20	22	25			
				FEMME				
15–19	9,8	na	na	na	na	67,3	3 862	a
20–24	14,4	48,5	67,1	na	na	21,0	3 378	18,2
25–29	17,4	48,4	68,5	80,6	90,6	5,5	2 905	18,2
30–34	16,5	45,8	63,5	75,5	86,8	2,8	2 382	18,4
35–39	20,1	50,3	65,8	77,1	87,8	1,4	2 065	18,0
40–44	16,2	48,1	67,3	78,0	88,7	0,8	1 586	18,2
45–49	14,3	44,1	58,5	74,2	85,2	0,7	1 169	18,7
20–49	16,5	47,8	65,9	na	na	7,3	13 485	18,2
25–49	17,2	47,6	65,4	77,5	88,2	2,7	10 107	18,3
				HOMME				
15–19	0,0	na	na	na	na	99,6	1 669	a
20–24	0,1	1,3	4,0	na	na	84,9	1 165	a
25–29	0,0	1,1	5,7	16,1	45,8	37,2	930	a
30–34	0,2	2,3	5,7	16,0	38,7	10,6	909	26,3
35–39	0,4	2,2	6,4	15,0	36,9	3,2	784	26,6
40–44	0,5	3,7	9,8	19,7	41,0	0,8	663	26,0
45–49	0,0	2,8	8,9	18,3	40,1	0,9	568	26,3
20–49	0,2	2,1	6,3	na	na	29,2	5 017	a
25–49	0,2	2,3	7,0	16,8	40,6	12,4	3 853	a
20–64	0,2	2,1	6,4	na	na	23,9	6 160	a
25–64	0,2	2,4	6,9	16,9	38,6	9,7	4 996	a
30–49	0,3	2,7	7,4	17,0	39,0	4,5	2 923	26,3
30–64	0,3	2,6	7,2	17,1	37,0	3,4	4 066	26,7

Note : L'âge à la première union est défini comme étant l'âge auquel l'enquêté(e) a commencé à vivre avec son premier époux/épouse/partenaire.
na = non applicable pour cause de troncature
a = non calculé parce que moins de 50 % des enquêtés ont commencé à vivre pour la première fois avec leur époux/épouse/partenaire avant d'atteindre le début du groupe d'âges

Tableau 4.5 Âge médian à la première union selon certaines caractéristiques

Âge médian à la première union parmi les femmes de 20–49 ans et de 25–49 ans et âge médian à la première union parmi les hommes de 30–49 ans et de 30–64 ans, selon certaines caractéristiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Âge des femmes		Âge des hommes	
Caractéristique	20–49	25–49	30–49	30–64
Résidence				
Bamako	a	20,5	29,1	29,0
Autre urbain	19,3	19,2	27,6	27,7
Ensemble urbain	a	20,0	28,4	28,5
Rural	17,8	17,8	25,7	26,0
Région[1]				
Kayes	17,0	17,0	27,0	27,6
Koulikoro	17,9	18,0	26,0	26,3
Sikasso	17,7	17,7	25,4	25,3
Ségou	18,6	18,7	24,9	25,3
Mopti	18,4	18,5	26,2	26,7
Tombouctou	18,5	18,8	26,4	27,1
Gao	17,9	18,1	26,3	27,4
Bamako	a	20,5	29,1	29,0
Niveau d'instruction				
Aucun	17,5	17,6	25,3	25,8
Primaire	17,8	18,0	26,1	26,4
Secondaire ou plus	a	21,3	28,3	28,5
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	17,4	17,6	24,7	25,1
Second	17,4	17,4	24,8	25,3
Moyen	17,7	17,8	26,0	26,6
Quatrième	18,5	18,6	27,0	27,2
Le plus élevé	a	20,6	28,8	29,0
Ensemble	18,2	18,3	26,3	26,7

Note : L'âge à la première union est défini comme étant l'âge auquel l'enquêté(e) a commencé à vivre avec son premier époux/épouse/ partenaire.
a = non calculé parce que moins de 50 % des femmes ou des hommes ont commencé à vivre pour la première fois avec leur époux/épouse/ partenaire avant d'atteindre le début du groupe d'âges
[1] Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 4.6 Âge aux premiers rapports sexuels

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans ayant eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre certains âges exacts, pourcentage n'ayant jamais eu de rapports sexuels et âge médian aux premiers rapports sexuels selon l'âge actuel, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Pourcentage ayant déjà eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre l'âge exact de :					Pourcentage n'ayant jamais eu de rapports sexuels	Effectif d'enquêtés	Âge médian aux premiers rapports sexuels
Âge actuel	15	18	20	22	25			
				FEMME				
15–19	12,6	na	na	na	na	54,7	3 862	a
20–24	18,6	65,5	80,9	na	na	11,7	3 378	16,7
25–29	22,1	72,5	86,5	92,2	94,4	1,6	2 905	16,3
30–34	21,9	74,7	88,0	93,5	95,2	0,3	2 382	16,3
35–39	21,6	76,1	88,0	92,6	94,2	0,2	2 065	16,2
40–44	21,7	76,0	90,2	95,0	95,6	0,1	1 586	16,1
45–49	20,8	75,4	89,3	94,3	95,9	0,0	1 169	16,2
20–49	20,9	72,4	86,3	na	na	3,4	13 485	16,4
25–49	21,7	74,6	88,1	93,3	94,9	0,6	10 107	16,2
15–24	15,4	na	na	na	na	34,6	7 240	a
				HOMME				
15–19	4,0	na	na	na	na	83,5	1 669	a
20–24	5,1	20,3	40,1	na	na	42,1	1 165	a
25–29	3,4	17,8	36,7	56,0	78,5	10,5	930	21,1
30–34	1,8	12,3	32,0	50,8	69,6	2,1	909	21,9
35–39	0,5	10,1	27,1	49,6	69,1	0,4	784	22,0
40–44	1,4	9,1	26,4	47,9	69,4	0,1	663	22,3
45–49	0,6	7,1	22,7	48,5	65,9	0,0	568	22,2
20–49	2,5	13,8	32,2	na	na	12,2	5 017	a
25–49	1,7	11,9	29,8	51,0	71,1	3,1	3 853	21,8
15–24	4,5	na	na	na	na	66,5	2 833	a
20–64	2,1	12,5	29,4	na	na	10,0	6 160	a
25–64	1,4	10,7	27,0	48,1	67,1	2,5	4 996	22,3

na = non applicable pour cause de troncature
a = non calculé parce que moins de 50 % des enquêtés ont eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre le début du groupe d'âges

Tableau 4.7 Âge médian aux premiers rapports sexuels selon certaines caractéristiques

Âge médian aux premiers rapports sexuels parmi les femmes de 20–49 ans et de 25–49 ans et âge médian aux premiers rapports sexuels parmi les hommes de 20–64 ans et de 25–64 ans, selon certaines caractéristiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Âge des femmes		Âge des hommes
Caractéristique	20–49	25–49	25–64
Résidence			
Bamako	17,5	17,1	21,7
Autre urbain	17,0	16,8	22,3
Ensemble urbain	17,2	16,9	21,9
Rural	16,1	16,0	22,4
Région[1]			
Kayes	15,6	15,5	20,6
Koulikoro	16,2	16,0	22,8
Sikasso	16,4	16,3	23,0
Ségou	16,6	16,5	20,9
Mopti	16,5	16,5	24,2
Tombouctou	16,7	16,6	24,4
Gao	15,9	15,9	23,9
Bamako	17,5	17,1	21,7
Niveau d'instruction			
Aucun	16,0	16,0	22,7
Primaire	16,2	16,2	21,8
Secondaire ou plus	17,7	17,4	21,7
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	16,0	15,9	22,0
Second	16,0	15,9	22,7
Moyen	16,0	16,0	22,4
Quatrième	16,5	16,4	22,3
Le plus élevé	17,5	17,2	21,9
Ensemble	16,4	16,2	22,3

[1] Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 4.8.1 Activité sexuelle récente : Femme

Répartition (en %) des femmes de 15–49 ans en fonction du moment auquel ont eu lieu leurs derniers rapports sexuels, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Derniers rapports sexuels ont eu lieu : Dans les 4 dernières semaines	Dans la dernière année[1]	Il y a un an ou plus	N'a jamais eu de rapports sexuels	Total	Effectif de femmes
Âge						
15–19	26,2	14,7	4,4	54,7	100,0	3 862
20–24	58,5	23,3	6,6	11,7	100,0	3 378
25–29	71,2	21,1	6,0	1,6	100,0	2 905
30–34	73,8	19,7	6,1	0,3	100,0	2 382
35–39	75,5	16,3	8,0	0,2	100,0	2 065
40–44	74,6	16,0	9,4	0,1	100,0	1 586
45–49	72,8	16,6	10,6	0,0	100,0	1 169
État matrimonial						
Célibataire	9,2	12,4	7,0	71,3	100,0	3 585
Actuellement en union	75,7	19,8	4,5	0,1	100,0	13 237
En rupture d'union	10,8	30,0	59,2	0,0	100,0	525
Durée de l'union actuelle[2]						
< 1 an	73,5	23,6	2,5	0,4	100,0	659
1–4 ans	70,1	24,3	5,5	0,1	100,0	2 679
5–9 ans	74,4	21,7	3,9	0,0	100,0	3 017
10–14 ans	77,3	18,7	4,0	0,0	100,0	2 331
15–19 ans	78,5	16,4	5,1	0,0	100,0	1 710
20–24 ans	80,1	15,1	4,8	0,0	100,0	1 574
25+ ans	79,7	16,0	4,3	0,0	100,0	1 268
Résidence						
Bamako	48,1	16,4	9,2	26,2	100,0	2 675
Autre urbain	51,2	20,3	7,7	20,8	100,0	2 048
Ensemble urbain	49,5	18,1	8,6	23,8	100,0	4 723
Rural	63,9	18,7	5,9	11,4	100,0	12 624
Région						
Kayes	59,2	20,7	8,2	11,9	100,0	2 635
Koulikoro	61,9	18,2	5,1	14,8	100,0	4 018
Sikasso	65,4	18,1	4,9	11,6	100,0	3 143
Ségou	63,0	20,7	4,7	11,6	100,0	2 574
Mopti	60,9	17,1	9,5	12,5	100,0	1 530
Tombouctou	58,4	15,7	7,4	18,6	100,0	281
Gao	60,8	20,2	9,1	9,9	100,0	485
Kidal	†	†	†	†	100,0	6
Bamako	48,1	16,4	9,2	26,2	100,0	2 675
Niveau d'instruction						
Aucun	67,4	18,7	7,0	6,9	100,0	9 382
Primaire	58,4	19,8	5,4	16,3	100,0	2 926
Secondaire ou plus	47,1	17,6	6,6	28,7	100,0	5 039
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	68,6	19,4	5,6	6,5	100,0	3 036
Second	67,4	19,6	5,3	7,6	100,0	3 143
Moyen	63,7	19,6	5,8	11,0	100,0	3 318
Quatrième	59,0	17,4	6,7	16,9	100,0	3 676
Le plus élevé	46,1	17,3	9,0	27,5	100,0	4 174
Ensemble	60,0	18,6	6,6	14,8	100,0	17 347

[1] Non compris les femmes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 4 dernières semaines
[2] Non compris les femmes qui ne sont pas actuellement en union
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 4.8.2 Activité sexuelle récente : Homme

Répartition (en %) des hommes de 15–49 ans en fonction du moment auquel ont eu lieu leurs derniers rapports sexuels, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Derniers rapports sexuels ont eu lieu : Dans les 4 dernières semaines	Dans la dernière année[1]	Il y a un an ou plus	N'a jamais eu de rapports sexuels	Total	Effectif d'hommes
Âge						
15–19	3,4	8,1	4,9	83,5	100,0	1 669
20–24	25,2	22,6	10,1	42,1	100,0	1 165
25–29	62,6	20,1	6,7	10,5	100,0	930
30–34	79,9	13,1	4,8	2,1	100,0	909
35–39	88,0	9,8	1,9	0,4	100,0	784
40–44	89,8	8,0	2,1	0,1	100,0	663
45–49	86,8	10,8	2,4	0,0	100,0	568
État matrimonial						
Célibataire	10,6	16,4	9,0	64,0	100,0	3 127
Actuellement en union	88,2	10,6	1,2	0,0	100,0	3 512
En rupture d'union	(23,7)	(24,4)	(52,0)	(0,0)	100,0	47
Durée de l'union actuelle[2]						
< 1 an	80,5	17,9	1,6	0,0	100,0	157
1–4 ans	85,0	13,6	1,5	0,0	100,0	780
5–9 ans	87,5	11,1	1,3	0,0	100,0	861
10–14 ans	89,1	9,5	1,2	0,1	100,0	626
15–19 ans	93,9	5,8	0,3	0,0	100,0	443
20–24 ans	89,3	8,5	2,1	0,0	100,0	338
25+ ans	92,9	7,1	0,0	0,0	100,0	124
Marié plus d'une fois	88,6	10,2	1,1	0,0	100,0	184
Résidence						
Bamako	46,0	15,4	7,2	31,4	100,0	1 177
Autre urbain	46,7	14,9	6,1	32,3	100,0	795
Ensemble urbain	46,3	15,2	6,8	31,8	100,0	1 971
Rural	53,6	12,6	4,6	29,2	100,0	4 714
Région						
Kayes	50,1	19,1	7,6	23,1	100,0	920
Koulikoro	52,5	11,2	5,6	30,7	100,0	1 637
Sikasso	52,0	12,3	3,1	32,6	100,0	1 215
Ségou	53,4	11,6	4,6	30,4	100,0	939
Mopti	55,8	12,9	2,8	28,5	100,0	505
Tombouctou	53,5	8,2	1,9	36,4	100,0	128
Gao	56,0	12,5	3,3	28,1	100,0	163
Kidal	†	†	†	†	100,0	2
Bamako	46,0	15,4	7,2	31,4	100,0	1 177
Niveau d'instruction						
Aucun	63,6	10,9	4,0	21,5	100,0	2 476
Primaire	49,6	14,4	5,5	30,5	100,0	1 352
Secondaire ou plus	41,7	15,1	6,1	37,1	100,0	2 858
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	55,7	10,3	3,9	30,1	100,0	1 179
Second	54,6	13,1	3,7	28,6	100,0	1 174
Moyen	51,7	12,9	4,2	31,2	100,0	1 190
Quatrième	51,5	13,6	5,7	29,2	100,0	1 446
Le plus élevé	46,0	15,9	7,5	30,6	100,0	1 697
Ensemble 15–49	51,4	13,4	5,2	30,0	100,0	6 686
50–64	79,5	15,4	4,8	0,3	100,0	1 143
Ensemble 15–64	55,5	13,7	5,2	25,6	100,0	7 829

[1] Non compris les hommes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 4 dernières semaines
[2] Non compris les hommes qui ne sont pas actuellement en union
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

FÉCONDITÉ 5

Principaux résultats

- ***Indice synthétique de fécondité :*** L'indice synthétique de fécondité est de 6,0 enfants par femme. Il est plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain (6,4 contre 5,0).
- ***Espacement des naissances :*** La moitié des naissances de rang supérieur à un se sont produites 32,9 mois après la naissance précédente ; 21 % des naissances ont eu lieu moins de 24 mois après la naissance précédente.
- ***Âge médian à la première naissance :*** L'âge auquel la moitié des femmes âgées de 25–49 ans ont déjà eu leur premier enfant est de 19,3 ans.
- ***Grossesse des adolescentes :*** Au Mali, plus d'une jeune fille de 15–19 ans sur quatre (28 %) a déjà été enceinte : 22 % sont déjà mères, 3 % ont déjà eu une grossesse improductive et 8 % sont actuellement enceintes.

Le nombre d'enfants qu'une femme met au monde dépend de nombreux facteurs, notamment l'âge auquel commence sa procréation, l'espacement entre deux naissances ainsi que sa fécondité. Retarder les premières naissances et allonger l'intervalle entre les naissances ont contribué à la réduction des niveaux de fécondité dans de nombreux pays. Ces facteurs ont également des conséquences positives en termes de santé. En revanche, des naissances rapprochées (moins de 24 mois) peuvent entraîner des conséquences négatives pour les nouveau-nés et leurs mères, notamment des naissances prématurées, un faible poids à la naissance et le décès. La procréation à un très jeune âge est associée à des risques accrus de complications au cours de la grossesse et de l'accouchement, ainsi qu'à des taux de mortalité néonatale plus élevés.

Ce chapitre décrit le niveau actuel de fécondité au Mali et certains de ses déterminants proches. Il présente l'indice synthétique de fécondité, l'intervalle intergénésique, l'insusceptibilité de tomber enceinte (pour cause d'aménorrhée post-partum, d'abstinence post-partum ou de ménopause), l'âge à la première naissance, les grossesses d'adolescentes et les taux d'interruptions volontaires de grossesse.

5.1 FÉCONDITÉ ACTUELLE

Indice Synthétique de Fécondité

Nombre moyen d'enfants qu'aurait une femme à la fin de sa vie féconde si elle avait des enfants aux taux actuels de fécondité par âge. Les taux de fécondité par âge sont calculés pour la période des trois années précédant l'enquête, basés sur l'historique des grossesses fournis par les femmes.

Échantillon : Femmes de 15 à 49 ans

Au Mali, le niveau de fécondité mesuré par l'indice synthétique de fécondité (ISF) est estimé à 6,0 enfants par femme. Il est plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain (6,4 contre 5,0) et dans les autres villes qu'à Bamako (5,2 contre 4,9) (**Tableau 5.1**).

Le taux de fécondité, qui est le nombre de naissances pour 1 000 femmes, est plus élevé chez les femmes de 25 à 29 ans (278 ‰) et de 20–24 ans (273 ‰). A partir de 30 ans, les taux de fécondité tendent à diminuer.

Le Taux Global de Fécondité Générale, c'est-à-dire le nombre annuel moyen de naissances vivantes dans la population des femmes en âge de procréer, est estimé à 207 ‰. Il est plus élevé en milieu rural (223 ‰) qu'en milieu urbain (164 ‰) (**Tableau 5.1**).

Les données du **Tableau 5.2** montrent que 11 % des femmes de 15–49 ans ont déclaré être enceintes. Le nombre moyen d'enfants nés vivants pour les femmes de 40–49 ans assimilable à la descendance finale est de 6,7.

Tendances : Entre 1987 et 2023–2024, l'indice synthétique de fécondité a diminué, passant, dans l'ensemble, de 7,1 enfants à 6,0 enfants par femme. Cette tendance s'observe quel que soit le milieu de résidence : en milieu urbain, ce nombre moyen est passé de 6,3 enfants en 1987 à 5,0 enfants en 2023–2024 et, en milieu rural de respectivement 7,4 à 6,4 enfants par femme (**Graphique 5.1**).

***Graphique 5.1* Tendances de la fécondité par résidence**



Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Le nombre moyen d'enfants par femme varie selon le niveau d'instruction : il passe de 6,5 enfants parmi les femmes sans niveau d'instruction à 5,1 parmi celles ayant le niveau secondaire ou plus.
- Du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, l'ISF diminue, passant de 7,1 à 4,9 enfants par femme (**Graphique 5.2**).
- Les niveaux les plus faibles de l'ISF sont enregistrés dans le District de Bamako (4,9) et la région de Tombouctou (5,3). Dans les autres régions, l'ISF est plus élevé avec des niveaux variant relativement peu, de 6,5 dans les régions de Sikasso et de Mopti ; 6,4 à Ségou et 6,1 dans les régions de Kayes, Koulikoro et de Gao (**Carte 5.1**).

***Graphique 5.2* Fécondité par quintile de bien-être économique du ménage**



Carte 5.1 Fécondité par région

Indice synthétique de fécondité des 3 ans précédant l'enquête



Note : Pour des raisons d'insécurité, les données de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région et ne sont pas présentées séparément.

Le **Tableau 5.3.1** présente les taux de fécondité par âge par période de cinq ans avant chaque enquête. L'examen de ce tableau indique que les taux de fécondité pour la période la plus récente (0–4 ans avant l'enquête) sont inférieurs à ceux des périodes précédentes quel que soit le groupe d'âges de la mère à la naissance. En particulier, dans les groupes d'âges de forte fécondité, on note que le taux à 20–24 ans est passé de 283 ‰ 5–9 ans avant l'enquête à 278 ‰ 0–4 ans avant l'enquête et, dans le groupe d'âges 25–29 ans de respectivement 290 ‰ à 279 ‰.

Tendances : Les résultats des six enquêtes EDS du Mali indiquent que, globalement, la fécondité tend à diminuer lentement au cours du temps. On constate une certaine similarité de l'allure des courbes des taux de fécondité par âge. Elles augmentent toutes de la même manière, atteignant leur maximum entre 20–24 ou entre 25–29 ans avant de décroître progressivement (**Tableau 5.3.2** et **Graphique 5.3**).

Graphique 5.3 Tendances de la fécondité par âge

Naissances pour 1 000 femmes



On note, en particulier que le taux de fécondité des jeunes femmes de 15–19 ans a diminué de manière importante comme le montrent les données du **Tableau 5.3.1**. En effet, le taux de fécondité de ces jeunes femmes est passé de 167 ‰, 10–14 ans avant l'EDSM-VII à 141 ‰, 0–4

ans avant la même enquête. La même tendance est observée pour cette même catégorie de jeunes femmes entre 2018 (taux de fécondité de 172 ‰) et 2023–2024 (taux de fécondité de 137 ‰) (**Tableau 5.3.2**).

5.2 ENFANTS NÉS VIVANTS ET ENFANTS SURVIVANTS

Au Mali, les femmes de 15–49 ans au moment de l'enquête ont eu, en moyenne 3,2 enfants parmi lesquels 2,8 sont encore en vie. Parmi les femmes en union du même groupe d'âges, ces nombres moyens sont de 4,0 enfants nés vivants et 3,5 enfants survivants. Par ailleurs, 25 % de l'ensemble des femmes et 8 % de celles en union n'ont jamais eu d'enfants.

Le nombre moyen d'enfants nés vivants augmente avec l'âge de la femme : de 0,3 enfants dans le groupe d'âges 15–19 ans, il atteint 1,5 enfants dans le groupe d'âges 20–24 ans et un maximum de 6,8 enfants dans le groupe d'âges 45–49 ans. Par ailleurs, la répartition des femmes selon le nombre de naissances vivantes révèle une fécondité précoce élevée, 22 % des jeunes femmes de moins de 20 ans ayant déjà donné naissance à, au moins, un enfant vivant (**Tableau 5.4**).

5.3 INTERVALLE INTERGÉNÉSIQUE

Intervalle intergénésique médian

Nombre de mois écoulés entre deux naissances successives pour la moitié des naissances.

Échantillon : Naissances autres que les naissances de rang 1 qui ont eu lieu au cours des 5 années précédant l'enquête.

L'intervalle inter génésique a une influence sur l'état de santé de l'enfant et sur celui de sa mère. Les intervalles inférieurs à 24 mois font courir à l'enfant et à la mère des risques accrus de morbidité et de mortalité. Au Mali, la moitié des naissances qui ont eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête se sont produites 32,9 mois après la naissance précédente (**Tableau 5.5**).

Au cours des 5 années précédant l'enquête, 8 % des naissances se sont produites entre 7–17 mois après la naissance précédente et 22 % des naissances ont eu lieu dans un intervalle inférieur à 24 mois après la naissance précédente (**Graphique 5.4**).

Graphique 5.4 **Intervalles génésiques**

Répartition (en %) des naissances autres que les naissances de rang 1 par nombre de mois depuis la naissance précédente



Tendances : L'intervalle inter génésique médian reste globalement stable depuis 2001 ; estimé à 32,3 mois en 2001 puis à 32,0 mois en 2006 et à 32,1 mois en 2018, il s'établit à 32,9 en 2023–2024.

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Le nombre médian de mois depuis la naissance précédente a tendance à augmenter avec l'âge de la mère, passant de 26,7 mois parmi celles de 15–19 ans à 30,4 mois parmi celles de 20–29 ans et à 39,1 mois dans le groupe d'âges 40–49 ans (**Tableau 5.5**).
- L'intervalle inter génésique médian est plus court quand la naissance a lieu après le décès de l'enfant précédent (26,9 mois) que quand l'enfant précédent était en vie (33,4 mois).
- La durée de l'intervalle intergénésique est un peu plus courte en milieu rural qu'en milieu urbain (32,4 mois contre 35,3 mois).

- La durée médiane d'espacement des naissances augmente avec le niveau d'instruction de la mère, passant de 32,6 mois quand la mère n'a aucun niveau d'instruction à 35,2 mois quand elle a le niveau secondaire ou plus.

- Du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, la durée médiane de l'intervalle inter génésique augmente, passant de 32,2 mois à 36,0 mois.

5.4 INSUSCEPTIBILITÉ DE TOMBER ENCEINTE

Aménorrhée post-partum

Période qui suit la fin d'une grossesse et qui précède la reprise des menstruations.

Abstinence post-partum

La période qui suit la fin d'une grossesse et qui précède la reprise des rapports sexuels.

Insusceptibilité post-partum

Période pendant laquelle on considère qu'une femme ne court pas de risque de tomber enceinte, soit parce qu'elle est en aménorrhée post-partum et/ou en abstinence sexuelle post-partum.

Durée médiane de l'aménorrhée post-partum

Calculé comme le nombre de mois écoulés entre la fin d'une grossesse et le retour des menstruations pour la moitié des femmes.

Échantillon : Femmes ayant eu une naissance vivante ou une mortinaissance au cours des 3 années précédant l'enquête.

Durée médiane de l'insusceptibilité post-partum

Calculé comme le nombre de mois depuis la fin d'une grossesse pendant lesquels la moitié des femmes ne sont plus protégées contre le risque d'une grossesse, du fait de l'aménorrhée post-partum ou du fait de l'abstinence sexuelle post-partum.

Échantillon : Femmes ayant eu une naissance vivante ou une mortinaissance au cours des 3 années précédant l'enquête.

La durée et l'intensité de l'allaitement influencent la durée de l'aménorrhée, qui offre une protection contre la conception. Dans l'ensemble, pour un peu moins d'un tiers des naissances (29 %) ayant eu lieu durant les 3 années précédant l'enquête, les mères sont en aménorrhée ; pour 13 %, les mères sont en abstinence post-partum et pour 33 % des naissances, les mères ne sont pas susceptibles de tomber enceintes (**Tableau 5.6**).

Le nombre de mois après la fin de la grossesse au cours desquels la moitié des femmes sont en aménorrhée post-partum est de 9,2 mois ; ce nombre médian de mois est de 2,5 pour l'abstinence post-partum et de 10,7 pour la durée d'insusceptibilité post-partum (**Tableau 5.6**).

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- La durée médiane d'insusceptibilité postpartum est un peu plus courte en milieu urbain (8,9 mois) qu'en milieu urbain (11,3 mois) (**Tableau 5.7**).

- La durée médiane de l'insusceptibilité postpartum est plus courte chez les femmes ayant un niveau d'instruction secondaire ou plus (7,6 mois) que chez celles ayant le niveau primaire (10,1 mois) ou n'ayant aucun niveau d'instruction (11,7 mois) (**Tableau 5.7**).

- La durée médiane de l'insusceptibilité post-partum diminue avec le niveau de bien-être économique, passant de 12,6 mois parmi les femmes dont le ménage est classé dans le quintile le plus bas à 6,0 mois parmi celles dont le ménage est classé dans le plus élevé (**Tableau 5.7**).

5.5 ÂGE AUX PREMIÈRES MENSTRUATIONS

L'âge moyen aux premières règles est de 14,1 ans. Des générations anciennes aux plus récentes, l'âge moyen aux premières règles tend à rajeunir légèrement, passant de 14,4 ans parmi les femmes de 45–49 ans à 13,7 ans parmi celles de 15–19 ans (**Tableau 5.8**).

5.6 MÉNOPAUSE

Ménopause

Les femmes sont considérées comme ayant atteint la ménopause si elles ne sont ni enceintes ni en aménorrhée post-partum et n'ont pas eu de règles au cours des 6 mois précédant l'enquête, ou si elles déclarent être ménopausées ou avoir subi une hystérectomie, ou si elles n'ont jamais eu de règles.

Échantillon : Femmes âgées de 30 à 49 ans

Le pourcentage de femmes de 30–49 ans considérées comme étant en ménopause au moment de l'enquête est de 8 %. Ce pourcentage augmente avec l'âge, passant de 2 % entre 30–34 ans à 34 % entre 48–49 ans (**Tableau 5.9**).

5.7 ÂGE À LA PREMIÈRE NAISSANCE

Âge médian à la première naissance

Âge auquel la moitié des femmes ont donné naissance à leur premier enfant.

Échantillon : Femmes âgées de 20–49 ans et de 25–49 ans

Dans l'ensemble, l'âge médian des femmes de 25–49 ans à la première naissance est de 19,3 ans. Cet âge médian pour les femmes de 15–49 ans n'a pas subi de modification importante des générations anciennes aux plus récentes. Avant d'atteindre 15 ans, 7 % des femmes de 25–49 ans ont déjà eu, au moins une naissance vivante ; cette proportion est de 57 % avant 20 ans et 87 % avant 25 ans (**Tableau 5.10**).

Au Mali, plus de la moitié des femmes de 25–49 ans ont déjà eu leur première naissance vivante avant l'âge de 20 ans. Avant d'atteindre l'âge exact de 15 ans, 7 % des femmes de 20–49 ans et autant parmi celles de 25–49 ans avaient déjà eu une première naissance vivante. Cette proportion est de 35 % avant 18 ans pour ces mêmes groupes de femmes (**Tableau 5.10**).

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- L'âge médian à la première naissance parmi les femmes de 25 à 49 ans est un peu plus précoce en milieu rural qu'en milieu urbain (19,1 ans contre 20,3 ans) et dans les autres villes qu'à Bamako (19,8 ans contre 20,6 ans) (**Tableau 5.11**).

- Cet indicateur varie peu entre les régions, de 18,6 ans dans la région de Kayes, 19,3 ans dans celles de Ségou et Koulikoro, 20,4 ans dans celle Tombouctou et 20,7 ans dans celle de Gao. (**Tableau 5.11**).

- L'âge médian à la première naissance augmente avec le niveau d'instruction variant de 19,0 ans parmi celles n'ayant aucun niveau d'instruction à 21,0 ans parmi celles ayant le niveau secondaire ou plus (**Graphique 5.5**).
- L'âge médian à la première naissance varie de 19,0 ans dans le quintile le plus bas à 20,7 ans dans le quintile le plus élevé.

Graphique 5.5 **Âge médian à la première naissance par niveau d'instruction**



5.8 GROSSESSE DES ADOLESCENTES

Grossesse des adolescentes
Pourcentage de femmes âgées de 15–19 ans qui ont déjà été enceintes.
Échantillon : Femmes âgées de 15–19 ans

La fécondité des adolescentes occupe une place importante dans l'élaboration des politiques publiques et la mise en œuvre des stratégies et des programmes de la santé de la reproduction. Une grossesse précoce peut conduire une adolescente à la déscolarisation ou fragiliser sa santé.

Au Mali, plus d'une jeune fille de 15–19 ans sur quatre (28 %) a déjà été enceinte et plus d'une sur cinq (22 %) a déjà eu une naissance vivante ; 3 % ont déjà eu une grossesse improductive et 8 % sont actuellement enceintes (**Tableau 5.12**).

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage d'adolescentes qui ont déjà été enceintes augmente rapidement avec l'âge, passant de 4% à 15 ans à 54 % à 19 ans.
- Le pourcentage d'adolescentes ayant été enceintes est presque deux fois plus élevé en milieu rural (33 %) qu'en milieu urbain (17 %) (**Tableau 5.12**).
- Le pourcentage d'adolescentes qui ont déjà été enceintes varie de manière importante entre les régions. C'est dans la région de Kayes que ce pourcentage est le plus élevé (38 %), suivie des régions de Gao (35 %) et de Sikasso (33 %). En outre, les résultats montrent aussi que plus du quart des adolescentes de 15–19 ans ont déjà été enceintes dans les régions de Koulikoro (29 %), Mopti et Tombouctou (27 %) et Ségou (26 %). En revanche, le District de Bamako enregistre le pourcentage le plus faible (14 %) (**Carte 5.2**).

Carte 5.2 Grossesse des adolescentes par région

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 19 ans ayant déjà été enceintes



Note : Pour des raisons d'insécurité, les données de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région et ne sont pas présentées séparément.

- Le pourcentage d'adolescentes ayant déjà été enceintes diminue de manière très importante avec l'augmentation de leur niveau d'instruction, passant de 38 % parmi les adolescentes n'ayant aucun niveau d'instruction à 18 % parmi celles ayant atteint le niveau secondaire ou plus

- Du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, le pourcentage de jeunes femmes de 15–19 ans qui ont déjà été enceintes a tendance à diminuer, passant de 43 % à 13 % (**Graphique 5.6**).

Graphique 5.6 Grossesse des adolescentes par quintile de bien-être économique du ménage

Pourcentage de femmes de 15–19 ans ayant déjà été enceintes



5.9 RÉSULTATS DE GROSSESSE ET TAUX D'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE

Résultats de grossesse

Naissance vivante :	un enfant né vivant, ne serait-ce que pendant un laps de temps très court
Mortinaissance :	un enfant mort-né (sans signe de vie) à la suite d'une grossesse ayant duré 7 mois (28 semaines) ou plus.
Fausse couche :	une interruption spontanée de grossesse avant 7 mois (28 semaines).
Interruption volontaire de grossesse :	une grossesse interrompue volontairement

Échantillon : Grossesses des femmes âgées de 15–49 ans, qui se sont terminées dans les 3 années précédant l'enquête

La répartition des grossesses qui se sont terminées dans les 3 années ayant précédé l'enquête montre que neuf grossesses sur dix (90 %) ont abouti à une naissance vivante et 10 % sont des grossesses improductives : 8 % des grossesses se sont terminées par une fausse-couche et 2 % par un mort-né (**Graphique 5.7** et **Tableau 5.13**).

Au Mali, le taux global de recours à l'IVG (TGRIVG) est estimé à 1 ‰, c'est-à-dire que pour 1 000 femmes enceintes, seulement une a recours à l'interruption volontaire de grossesse.

L'indice conjoncturel d'avortement (ICA) qui est le nombre théorique d'IVG que connaîtrait une femme tout au long de sa vie est insignifiant (**Tableau 5.14**).

Graphique 5.7 **Issue de la grossesse**

Répartition (en %) des grossesses qui se sont terminées au cours des 3 années ayant précédé l'enquête



Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage de grossesses qui se sont terminées par une naissance vivante a tendance à diminuer avec l'âge de la mère (90 % à moins de 20 ans à 74 % à 45–49 ans). En revanche, le pourcentage s'étant terminé par une fausse-couche augmente avec l'âge (7 % à moins de 20 ans à 11 % à 35–44 ans et 24 % à 45–49 ans) (**Tableau 5.13**).

- Le pourcentage de grossesses qui se sont terminées par une naissance vivante est légèrement plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain (91 % contre 87 %) et les fausses-couches sont plus fréquentes en milieu urbain qu'en milieu rural (11 % contre 7 %).

- Le pourcentage de grossesses qui se sont terminées par une fausse-couche est relativement plus élevé dans le District de Bamako (11 %) et dans la région de Tombouctou (10 %), suivies des régions de Ségou (9 %), de Gao (9 %) et de Koulikoro (8 %). Les régions de Kayes et de Sikasso enregistrent les pourcentages les plus faibles avec 6 % chacune.

5.10 RAPPORTS SEXUELS ET COMPORTEMENTS EN MATIÈRE DE SANTÉ REPRODUCTIVE AVANT L'ÂGE DE 15 ANS

Parmi les adolescents de 15–19 ans 13 % des jeunes filles et 4 % des jeunes garçons ont eu leurs premiers rapports sexuels avant l'âge de 15 ans. Dix pour cent (10 %) des adolescentes étaient en union avant l'âge de 15 ans et 6% étaient déjà enceintes avant l'âge de 15 ans. Aucun adolescent n'était en union avant l'âge de 15 ans. Ces résultats indiquent que les rapports sexuels n'ont pas toujours lieu dans le cadre de l'union. Par ailleurs, 2 % des femmes ont donné naissance à un enfant et pratiquement aucun homme n'a engendré d'enfant avant l'âge de 15 ans (**Tableau 5.15** et **Graphique 5.8**).

Graphique 5.8 **Comportements en matière de sexualité et de santé génésique avant 15 ans**

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–19 ans



LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur les niveaux de fécondité et certains déterminants de la fécondité, voir les tableaux suivants :

- **Tableau 5.1 Fécondité actuelle**
- **Tableau 5.2 Fécondité selon certaines caractéristiques**
- **Tableau 5.3.1 Tendances de la fécondité par âge**
- **Tableau 5.3.2 Tendance de la fécondité par âge et indice synthétique de fécondité**
- **Tableau 5.4 Enfants nés vivants et enfants survivants des femmes**
- **Tableau 5.5 Intervalles inter génésiques**
- **Tableau 5.6 Aménorrhée, abstinence et insusceptibilité post-partum**
- **Tableau 5.7 Durée médiane de l'aménorrhée, de l'abstinence post-partum et de l'insusceptibilité post-partum**
- **Tableau 5.8 Âge aux premières règles**
- **Tableau 5.9 Ménopause**
- **Tableau 5.10 Âge à la première naissance**
- **Tableau 5.11 Âge médian à la première naissance**
- **Tableau 5.12 Grossesse des adolescentes**
- **Tableau 5.13 Résultat de la grossesse par caractéristique sociodémographique**
- **Tableau 5.14 Taux d'avortement provoqué**
- **Tableau 5.15 Rapports sexuels et comportements en matière de santé reproductive avant l'âge de 15 ans**

Tableau 5.1 Fécondité actuelle

Taux de fécondité par âge, Indice Synthétique de Fécondité (ISF), Taux Global de Fécondité Générale (TGFG) et Taux Brut de Natalité (TBN) pour la période des 3 années ayant précédé l'enquête par milieu de résidence, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Résidence				
Groupe d'âges	Bamako	Autre urbain	Ensemble urbain	Rural	Ensemble
10–14	[1]	[3]	[2]	[4]	[3]
15–19	71	110	87	161	137
20–24	212	218	215	295	273
25–29	239	251	244	290	278
30–34	196	234	213	241	234
35–39	162	149	156	192	184
40–44	77	56	67	87	82
45–49	[18]	[22]	[20]	[21]	[21]
ISF (15–49)	4,9	5,2	5,0	6,4	6,0
TGFG	157	174	164	223	207
TBN	38,3	39,4	38,8	42,9	42,0

Notes : Les taux sont exprimés pour 1 000 femmes. Les taux entre crochets sont tronqués. Les taux correspondent à la période de 1–36 mois précédant l'enquête. Les taux pour le groupe d'âges 10–14 ans sont basés sur des données rétrospectives provenant des femmes âgées de 15–17 ans.
ISF : Indice Synthétique de Fécondité exprimé pour une femme
TGFG : Taux Global de Fécondité Générale exprimé pour 1 000 femmes âgées de 15–44 ans
TBN : Taux Brut de Natalité exprimé pour 1 000 individus

Tableau 5.2 Fécondité selon certaines caractéristiques

Indice Synthétique de Fécondité pour les 3 années précédant l'enquête, pourcentage de femmes de 15–49 ans actuellement enceintes et nombre moyen d'enfants nés vivants pour les femmes de 40–49 ans, selon certaines caractéristiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique	Indice Synthétique de Fécondité	Pourcentage de femmes de 15–49 ans actuellement enceintes	Nombre moyen d'enfants nés vivants des femmes de 40–49 ans
Résidence			
Bamako	4,9	6,9	5,4
Autre urbain	5,2	9,6	5,6
Ensemble urbain	5,0	8,1	5,5
Rural	6,4	11,3	7,0
Région			
Kayes	6,1	10,2	6,7
Koulikoro	6,1	10,6	6,5
Sikasso	6,5	12,4	7,1
Ségou	6,4	11,7	7,2
Mopti	6,5	10,8	7,1
Tombouctou	5,3	12,0	5,6
Gao	6,1	9,1	5,6
Kidal	†	†	†
Bamako	4,9	6,9	5,4
Niveau d'instruction			
Aucun	6,5	11,0	6,9
Primaire	6,2	11,2	6,2
Secondaire ou plus	5,1	8,9	4,6
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	7,1	13,7	7,6
Second	6,9	13,5	7,4
Moyen	6,2	11,0	6,7
Quatrième	5,7	8,4	6,0
Le plus élevé	4,9	7,1	5,1
Ensemble	6,0	10,5	6,7

Note : L'Indice Synthétique de Fécondité correspond à la période de 1–36 mois précédant l'enquête.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 5.3.1 Tendances de la fécondité par âge

Taux de fécondité par âge par période de 5 ans précédant l'enquête, selon le groupe d'âges, EDSM-VII Mali 2023–2024

Âge de la mère à la naissance	Nombre d'années précédant l'enquête			
	0–4	5–9	10–14	15–19
10–14	5	10	13	18
15–19	141	163	167	168
20–24	278	283	285	285
25–29	279	290	309	314
30–34	245	272	284	[280]
35–39	190	202	[250]	
40–44	90	[142]		
45–49	[23]			

Notes : Les taux de fécondité par âge sont exprimés pour 1 000 femmes. Les taux entre crochets sont tronqués. Les taux excluent le mois de l'interview. Pour la période 0–4 ans, les taux pour le groupe d'âges 10–14 ans sont basées sur des données rétrospectives provenant des femmes âgées de 15–19 ans.

Tableau 5.3.2 Tendance de la fécondité par âge et indice synthétique de fécondité

Taux de fécondité par âge et Indice synthétique de fécondité (ISF) pour la période des 3 années précédant l'EDSM-I, l'EDSM-II, l'EDSM-III, l'EDSM-IV, l'EDSM-V, l'EDSM-VI, et l'EDSM-VII, selon l'âge de la mère au moment de la naissance de l'enfant

Âge de la mère à la naissance	EDSM-II 1995–1996	EDSM-III 2001	EDSM-IV 2006	EDSM-V 2012–2013	EDSM-VI 2018	EDSM-VI 2023–2024
10–14	[4]	[8]	[7]	[11]	[7]	[3]
15–19	187	185	188	172	172	137
20–24	299	290	283	252	252	273
25–29	196	280	292	292	272	278
30–34	244	260	255	255	231	234
35–39	205	202	180	180	166	184
40–44	91	103	91	84	97	82
45–49	[21]	[35]	[25]	[44]	[24]	[21]
ISF (15–49)	6,7	6,8	6,6	6,1	6,3	6,0

Note : Les taux de fécondité par âge sont exprimés pour 1 000 femmes. Les taux pour les groupes d'âges 10–14 et 45–49 ans peuvent être légèrement biaisés du fait de données incomplètes et sont, par conséquent, placés entre crochets. Les taux correspondent à la période 1–36 mois précédant l'enquête. Les taux pour le groupe d'âges 10–14 ans sont basés sur des données rétrospectives provenant des femmes âgées de 15–19 ans.

Tableau 5.4 Enfants nés vivants et enfants survivants des femmes

Répartition (en %) de l'ensemble des femmes de 15–49 ans et des femmes de 15–49 ans actuellement en union par nombre d'enfants nés vivants, nombre moyen d'enfants nés vivants et nombre moyen d'enfants survivants, par le groupe d'âges, EDSM-VII Mali 2023–2024

Groupe d'âges	Nombre moyen d'enfants nés vivants											Total	Effectif de femmes	Nombre moyen d'enfants nés vivants	Nombre moyen d'enfants survivants
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+				
ENSEMBLE DES FEMMES															
15–19	78,4	17,5	3,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	3 862	0,26	0,24
20–24	26,0	27,4	26,6	13,9	5,2	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	3 378	1,48	1,36
25–29	7,9	10,8	18,1	25,3	21,2	11,4	3,5	1,4	0,3	0,0	0,0	100,0	2 905	2,98	2,70
30–34	3,7	5,8	9,4	14,4	19,4	20,7	13,8	7,9	3,5	0,9	0,5	100,0	2 382	4,28	3,83
35–39	2,5	3,1	4,2	7,3	11,1	15,7	18,3	14,9	12,3	6,8	3,9	100,0	2 065	5,70	4,95
40–44	1,7	2,7	3,3	5,6	8,3	11,2	15,7	13,8	13,8	11,6	12,4	100,0	1 586	6,55	5,49
45–49	2,8	2,1	2,9	5,3	8,3	8,6	12,8	12,7	15,6	12,0	16,8	100,0	1 169	6,81	5,54
Ensemble	25,0	12,6	11,4	10,7	9,9	8,4	7,0	5,2	4,3	2,8	2,8	100,0	17 347	3,17	2,76
FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION															
15–19	43,2	45,0	11,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1 241	0,69	0,64
20–24	11,0	30,4	32,8	17,9	6,7	1,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	2 592	1,83	1,68
25–29	4,0	9,9	18,5	26,9	22,8	12,2	3,8	1,5	0,4	0,0	0,0	100,0	2 677	3,16	2,86
30–34	2,4	4,6	8,6	14,6	20,3	21,5	14,6	8,4	3,7	0,9	0,5	100,0	2 243	4,44	3,96
35–39	1,8	2,4	3,5	7,2	10,9	15,8	18,9	15,4	12,8	7,3	4,1	100,0	1 935	5,85	5,08
40–44	1,0	2,0	3,1	5,0	8,2	11,3	16,4	13,7	14,2	12,2	13,1	100,0	1 472	6,71	5,62
45–49	2,5	1,8	2,4	5,4	7,9	8,8	13,4	12,2	15,9	12,2	17,5	100,0	1 077	6,90	5,62
Ensemble	8,0	13,7	13,7	13,5	12,5	10,6	8,9	6,5	5,4	3,6	3,6	100,0	13 237	3,98	3,47

Tableau 5.5 Intervalles intergénésiques

Répartition (en %) des naissances vivantes, autres que les naissances de rang un, ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête par nombre de mois écoulés depuis la naissance vivante précédente et nombre médian de mois depuis la naissance vivante précédente, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Mois depuis la naissance vivante précédente						Total	Effectif de naissances vivante autres que de premier rang	Nombre médian de mois depuis la naissance vivante précédente
	7–17	18–23	24–35	36–47	48–59	60+			
Âge de la mère									
15–19	16,2	23,8	38,7	16,3	5,0	0,0	100,0	167	26,7
20–29	9,7	15,8	42,0	19,3	7,5	5,7	100,0	5 861	30,4
30–39	5,8	12,4	33,7	23,3	11,8	13,0	100,0	5 325	35,3
40–49	5,0	9,0	27,7	23,2	13,6	21,5	100,0	1 438	39,1
Sexe de l'enfant précédent									
Masculin	7,3	12,4	37,7	21,7	10,4	10,5	100,0	6 535	33,3
Féminin	8,0	15,1	36,0	21,0	9,5	10,4	100,0	6 257	32,5
État de survie de la naissance précédente									
Vivante	6,2	1,2	37,8	21,8	10,3	10,6	100,0	11 615	33,4
Décédée	21,6	19,0	27,4	16,9	6,2	9,0	100,0	1 176	26,9
Rang de naissance									
2–3	9,2	14,0	37,2	19,8	9,3	10,6	100,0	5 330	32,5
4–6	6,5	13,2	36,9	22,4	10,6	10,4	100,0	5 062	33,3
7+	6,7	14,4	36,1	22,5	10,1	10,3	100,0	2 399	33,2
Résidence									
Bamako	6,5	11,5	32,5	22,6	11,5	15,4	100,0	1 381	35,8
Autre urbain	7,4	12,5	34,5	22,6	9,3	13,7	100,0	1 181	34,5
Ensemble urbain	6,9	12,0	33,4	22,6	10,5	14,6	100,0	2 562	35,3
Rural	7,8	14,2	37,7	21,1	9,8	9,4	100,0	10 229	32,4
Région									
Kayes	7,1	13,9	39,9	20,4	8,9	9,7	100,0	1 933	31,8
Koulikoro	8,0	13,4	33,9	22,0	10,8	11,8	100,0	2 997	33,7
Sikasso	7,7	13,4	38,3	22,5	8,9	9,2	100,0	2 566	32,9
Ségou	6,7	13,2	38,6	21,1	11,1	9,3	100,0	2 027	32,7
Mopti	7,7	16,2	37,7	20,4	9,4	8,6	100,0	1 314	32,1
Tombouctou	13,7	18,2	37,1	16,3	7,1	7,6	100,0	210	28,2
Gao	13,4	16,8	37,7	17,2	7,1	7,8	100,0	358	29,7
Kidal	†	†	†	†	†	†	100,0	5	†
Bamako	6,5	11,5	32,5	22,6	11,5	15,4	100,0	1 381	35,8
Niveau d'instruction									
Aucun	7,4	14,1	38,1	21,0	9,5	9,9	100,0	8 137	32,6
Primaire	8,8	14,0	37,5	20,9	9,5	9,3	100,0	2 093	32,3
Secondaire ou plus	7,4	12,4	32,4	23,0	11,8	13,1	100,0	2 561	35,2
Quintile de bien-être économique									
Le plus bas	6,7	15,3	39,4	21,9	9,6	7,1	100,0	2 834	32,2
Second	7,3	14,2	40,6	21,4	8,9	7,7	100,0	2 779	32,1
Moyen	8,2	13,5	38,6	19,2	10,0	10,4	100,0	2 619	32,0
Quatrième	9,0	12,7	33,0	22,6	10,1	12,5	100,0	2 486	34,2
Le plus élevé	7,0	12,3	30,8	21,9	11,6	16,3	100,0	2 073	36,0
Ensemble	7,6	13,7	36,9	21,4	10,0	10,5	100,0	12 791	32,9

Note : Les naissances vivantes de rang 1 sont exclues. L'intervalle pour les naissances multiples est le nombre de mois écoulés depuis la grossesse précédente qui a abouti à une naissance vivante.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 5.6 Aménorrhée, abstinence et insusceptibilité post-partum

Pourcentage de naissances vivantes et de mort-nés des 3 années ayant précédé l'enquête dont les mères sont en aménorrhée, en abstinence et en insusceptibilité post-partum, selon le nombre de mois depuis la naissance et durées médiane et moyenne, EDSM-VII Mali 2023–2024

Nombre de mois depuis la naissance	Pourcentage de naissances dont les mères sont :			Effectif de naissances
	En aménorrhée	En abstinence	En insusceptibilité[1]	
< 2	87,4	77,3	95,2	608
2–3	67,3	26,1	73,6	632
4–5	59,9	17,3	64,7	579
6–7	54,2	12,9	58,5	483
8–9	50,4	11,6	54,7	570
10–11	47,4	11,0	51,5	511
12–13	36,1	10,0	41,5	560
14–15	27,0	6,2	30,9	545
16–17	21,0	7,4	25,4	498
18–19	17,2	4,5	20,8	468
20–21	13,4	5,4	17,4	487
22–23	8,0	4,6	11,4	477
24–25	3,6	4,4	7,2	547
26–27	4,2	3,1	6,6	572
28–29	1,1	3,0	3,7	538
30–31	2,0	1,6	3,3	504
32–33	1,6	2,3	3,7	552
34–35	2,9	1,8	3,7	514
Ensemble	29,2	12,5	33,1	9 646
Médiane	9,2	2,5	10,7	na
Moyenne	11,1	5,2	12,5	na

Note : Les estimations sont basées sur le statut au moment de l'enquête.
na = non applicable
[1] Y compris les naissances vivantes et les mort-nés pour lesquels les mères sont encore, soit en aménorrhée, soit en abstinence, (ou les deux), à la suite d'une naissance
[2] Y compris les naissances vivantes et les mort-nés

Tableau 5.7 Durée médiane de l'aménorrhée, de l'abstinence post-partum et de l'insusceptibilité post-partum

Nombre médian de mois d'aménorrhée post-partum, d'abstinence post-partum et d'insusceptibilité post-partum à la suite de naissances vivantes ou de mort-nés ayant eu lieu au cours des 3 années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Aménorrhée post-partum	Abstinence post-partum	Insusceptibilité post-partum[1]
Âge de la mère			
15–29	8,7	2,5	10,2
30–49	11,0	2,4	11,8
Résidence			
Bamako	5,4	2,4	7,3
Autre urbain	7,2	2,8	9,9
Ensemble urbain	5,6	2,5	8,9
Rural	10,0	2,5	11,3
Région			
Kayes	8,3	2,4	9,3
Koulikoro	9,6	2,5	10,6
Sikasso	10,8	2,6	12,2
Ségou	11,1	2,2	11,6
Mopti	7,9	2,9	9,6
Tombouctou	10,4	(2,8)	11,5
Gao	13,4	3,5	14,3
Bamako	5,4	2,4	7,3
Niveau d'instruction			
Aucun	10,7	2,5	11,7
Primaire	9,6	2,6	10,1
Secondaire ou plus	4,9	2,4	7,6
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	11,8	2,4	12,6
Second	11,4	2,5	12,6
Moyen	10,5	2,6	11,3
Quatrième	7,3	2,3	8,5
Le plus élevé	4,3	2,6	6,0
Ensemble	9,2	2,5	10,7

Note : Les médianes sont basées sur le statut au moment de l'enquête (statut actuel). Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.
[1] Y compris les naissances vivantes et les mort-nés pour lesquelles les mères sont encore, soit en aménorrhée, soit en abstinence, (ou les deux), à la suite d'une naissance
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 5.8 Âge aux premières règles

Répartition (en%) des femmes de 15–49 ans par âge aux premières règles et âge moyen aux premières règles, selon l'âge actuel, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Âge aux premières règles												
Âge actuel	10	11	12	13	14	15	16	Ne sait pas	Pourcentage n'ayant jamais eu de règles	Total	Effectif de femmes	Âge moyen aux premières règles	Effectif des femmes ayant leurs règles[1]
15–19	1,5	2,8	10,3	24,9	29,2	20,3	6,0	0,8	4,3	100,0	3 862	13,7	3 666
20–24	1,8	2,3	8,8	19,5	26,7	26,5	13,2	1,1	0,1	100,0	3 378	14,1	3 336
25–29	1,2	2,0	9,6	19,8	26,4	28,2	11,6	1,2	0,0	100,0	2 905	14,1	2 869
30–34	1,3	1,2	8,4	18,9	26,6	28,5	13,6	1,5	0,0	100,0	2 382	14,2	2 346
35–39	1,4	1,3	8,9	17,6	26,0	29,1	13,8	1,8	0,0	100,0	2 065	14,2	2 027
40–44	0,8	1,8	8,1	18,0	28,8	28,7	12,7	1,1	0,1	100,0	1 586	14,2	1 567
45–49	0,7	1,3	8,9	14,2	29,5	29,3	15,0	1,3	0,0	100,0	1 169	14,4	1 155
Ensemble	1,3	2,0	9,2	19,9	27,5	26,4	11,5	1,2	1,0	100,0	17 347	14,1	16 966

[1] Effectif de femmes ayant donné une réponse numérique

Tableau 5.9 Ménopause

Pourcentage de femmes de 30–49 ans qui sont en ménopause, selon l'âge, EDSM-VII Mali 2023–2024

Âge	Pourcentage en ménopause[1]	Effectif de femmes
30–34	1,5	2 382
35–39	2,4	2 065
40–41	6,1	702
42–43	11,8	634
44–45	18,6	586
46–47	26,5	455
48–49	34,4	379
Ensemble	7,8	7 202

[1] Le pourcentage de femmes qui (1) ne sont pas enceintes, (2) ont eu une naissance dans les 5 dernières années et ne sont pas en aménorrhée post-partum et (3) celles qui présentent les caractéristiques suivantes : (a) les dernières règles ont eu lieu 6 mois ou plus avant l'interview ou (b) elles ont déclaré qu'elles étaient en ménopause ou qu'elles avaient eu une hystérectomie ou (c) elles n'avaient jamais eu de règles

Tableau 5.10 Âge à la première naissance

Pourcentage de femmes de 15–49 ans qui ont déjà eu une naissance vivante avant d'atteindre certains âges exacts, pourcentage n'ayant jamais eu de naissance vivante et âge médian à la première naissance vivante, selon l'âge actuel, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Pourcentage qui ont déjà eu une naissance vivante avant d'atteindre l'âge exact de :					Pourcentage n'ayant jamais eu de naissance vivante	Effectif de femmes	Âge médian à la première naissance vivante
Âge actuel	15	18	20	22	25			
15–19	2,4	na	na	na	na	78,4	3 862	a
20–24	5,5	33,2	57,5	na	na	26,0	3 378	19,3
25–29	6,1	35,3	59,1	75,7	88,4	7,9	2 905	19,2
30–34	8,6	37,3	58,6	74,3	87,9	3,7	2 382	19,2
35–39	8,1	35,9	59,1	74,6	87,3	2,5	2 065	19,1
40–44	7,7	33,8	55,0	73,3	85,9	1,7	1 586	19,5
45–49	5,8	29,9	49,4	66,2	83,7	2,8	1 169	20,1
20–49	6,9	34,6	57,3	na	na	9,7	13 485	19,3
25–49	7,3	35,1	57,2	73,7	87,1	4,3	10 107	19,3

na = non applicable pour cause de troncature
a = Sans objet parce que moins de 50 % des femmes ont donné naissance avant d'atteindre le début du groupe d'âges

Tableau 5.11 Âge médian à la première naissance

Âge médian à la première naissance vivante parmi les femmes de 20–49 ans et de 25–49 ans, selon certaines caractéristique, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique	Femmes de 20–49 ans	Femmes de 25–49 ans
Résidence		
Bamako	a	20,6
Autre urbain	19,9	19,8
Ensemble urbain	a	20,3
Rural	19,0	19,1
Région		
Kayes	18,6	18,6
Koulikoro	19,2	19,3
Sikasso	18,9	18,9
Ségou	19,3	19,3
Mopti	19,7	19,8
Tombouctou	a	20,4
Gao	a	20,7
Kidal	†	†
Bamako	a	20,6
Niveau d'instruction		
Aucun	18,9	19,0
Primaire	18,9	19,0
Secondaire ou plus	a	21,0
Quintile de bien-être économique		
Le plus bas	18,9	19,0
Second	18,8	18,8
Moyen	19,0	19,0
Quatrième	19,4	19,4
Le plus élevé	a	20,7
Ensemble	19,3	19,3

a = Sans objet parce que moins de 50 % des femmes ont donné naissance avant d'atteindre le début du groupe d'âges
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 5.12 Grossesse des adolescentes

Pourcentage de femmes de 15–19 ans qui ont déjà eu une naissance vivante, pourcentage ayant déjà eu une grossesse improductive, pourcentage qui sont actuellement enceintes et pourcentage ayant déjà été enceintes, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes de 15–19 ans qui : Ont déjà eu une naissance vivante	Ont déjà eu une grossesse improductive[1]	Sont actuellement enceintes	Ont déjà été enceintes	Effectif de femmes
Âge					
15	1,7	0,3	2,4	4,3	755
16	8,7	1,3	4,7	13,0	837
17	18,6	3,2	8,4	26,6	732
18	34,3	5,0	10,1	42,6	850
19	46,8	6,8	12,5	53,9	688
Résidence					
Bamako	10,7	1,9	3,7	13,9	743
Autre urbain	17,9	2,6	4,7	21,9	539
Ensemble urbain	13,7	2,2	4,1	17,3	1 281
Rural	25,5	3,8	9,2	32,9	2 581
Région					
Kayes	31,0	4,1	9,7	37,6	656
Koulikoro	22,2	4,1	8,1	28,9	913
Sikasso	24,3	2,8	10,9	32,6	634
Ségou	19,7	3,2	6,0	25,7	454
Mopti	20,9	3,0	6,4	26,5	280
Tombouctou	23,1	3,4	6,3	27,2	70
Gao	27,6	3,5	5,6	34,5	111
Kidal	†	†	†	†	1
Bamako	10,7	1,9	3,7	13,9	743
Niveau d'instruction					
Aucun	29,9	5,1	10,7	38,2	1 354
Primaire	24,3	3,2	7,4	30,7	842
Secondaire ou plus	13,5	1,8	5,0	17,7	1 666
Quintile de bien-être économique					
Le plus bas	28,8	5,4	15,0	43,1	474
Second	32,5	4,8	12,6	40,8	569
Moyen	29,0	3,9	9,1	34,8	719
Quatrième	21,0	2,7	5,4	26,2	880
Le plus élevé	9,8	1,7	2,8	12,5	1 220
Ensemble	21,6	3,3	7,5	27,7	3 862

[1] Grossesse n'ayant pas abouti à la naissance d'un enfant vivant. Inclut les mort-nés, les fausses-couches ou les avortements.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 5.13 Résultat de la grossesse par caractéristique sociodémographique

Répartition (en%) des grossesses qui se sont terminées dans les 3 années ayant précédé l'enquête par type de résultat, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Résultat de la grossesse				Total	Effectif de grossesses
	Naissance vivante	Mort-né[1]	Fausse couche[2]	Avortement provoqué		
Âge au résultat de la grossesse						
<20	89,6	3,1	7,1	0,2	100,0	1 801
20–24	91,4	1,9	6,3	0,4	100,0	2 896
25–34	90,4	1,7	7,5	0,4	100,0	4 310
35–44	85,9	2,7	10,8	0,6	100,0	1 662
45–49	74,2	1,4	24,4	0,0	100,0	60
Rang de grossesse						
Première	89,3	2,9	7,5	0,2	100,0	1 858
Seconde	90,1	2,3	7,2	0,5	100,0	1 767
Troisième	91,0	1,5	7,2	0,3	100,0	1 616
Quatrième	92,3	1,3	5,9	0,4	100,0	1 424
Cinquième ou plus	88,4	2,3	8,9	0,5	100,0	4 063
Résidence						
Bamako	86,7	1,7	11,3	0,2	100,0	1 266
Autre urbain	87,5	2,2	9,9	0,4	100,0	1 083
Ensemble urbain	87,1	1,9	10,7	0,3	100,0	2 349
Rural	90,5	2,2	6,9	0,4	100,0	8 380
Région						
Kayes	91,2	2,3	5,7	0,8	100,0	1 627
Koulikoro	89,9	2,2	7,9	0,0	100,0	2 529
Sikasso	90,9	2,2	6,4	0,5	100,0	2 108
Ségou	89,1	2,4	8,5	0,0	100,0	1 733
Mopti	90,4	1,8	6,6	1,2	100,0	1 000
Tombouctou	85,8	2,7	10,3	1,2	100,0	154
Gao	88,9	1,5	9,0	0,5	100,0	306
Kidal	†	†	†	†	100,0	5
Bamako	86,7	1,7	11,3	0,2	100,0	1 266
Niveau d'instruction						
Aucun	90,7	2,3	6,7	0,3	100,0	6 192
Primaire	89,2	2,3	8,1	0,4	100,0	1 875
Secondaire ou plus	87,9	1,8	9,7	0,5	100,0	2 662
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	91,3	2,4	5,8	0,5	100,0	2 189
Second	92,0	2,2	5,5	0,4	100,0	2 219
Moyen	90,5	2,4	6,9	0,3	100,0	2 128
Quatrième	89,6	1,9	8,0	0,5	100,0	2 174
Le plus élevé	84,9	1,9	12,9	0,3	100,0	2 020
Ensemble	89,7	2,1	7,7	0,4	100,0	10 728

[1] Les mortinaissances sont des décès fœtaux qui se sont produits à 28 semaines de grossesse ou plus. Quand la durée de la grossesse est déclarée en mois, les mortinaissances sont des décès fœtaux qui se sont produits à 7 mois de grossesse ou plus.
[2] Les fausses couches sont des décès fœtaux qui se sont produits au cours de grossesses qui ont duré moins de 28 semaines. Quand la durée de la grossesse est déclarée en mois, les fausses couches sont des décès fœtaux qui se sont produits au cours de grossesses qui ont duré moins de 7 mois.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 5.14 Taux d'avortement provoqué

Taux d'avortement provoqué par âge spécifique, indice conjoncturel d'avortement (ICA) et Taux Global d'Avortement provoqué (TGA) pour la période des 3 années ayant précédé l'enquête, selon le milieu de résidence, selon le milieu de résidence, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Résidence				
Groupe d'âges	Bamako	Autre urbain	Ensemble urbain	Rural	Ensemble
10–14	[0]	[0]	0	[0]	[0]
15–19	0	0	0	0	0
20–24	1	2	1	1	1
25–29	0	2	1	2	2
30–34	1	0	1	1	1
35–39	1	0	1	1	1
40–44	0	0	0	1	1
45–49	[0]	[0]	0	[0]	[0]
ICA (15–49)	0,0	0,0	00	0,0	0,0
TGRIVG	0	1	1	1	1

Notes : Les taux par âge spécifique d'avortement provoqué sont exprimés pour 1 000 femmes. Les taux entre crochets sont tronqués. Les taux correspondent à la période 1–36 mois précédant l'enquête. Les taux pour le groupe d'âges 10–14 ans sont basés sur des données rétrospectives provenant des femmes âgées de 15–17 ans.
ICA = L'indice conjoncturel d'avortement est exprimé pour une femme
TGRIVG = Taux Global de Recours à l'IVG exprimé pour 1 000 femmes de 15–44 ans

Tableau 5.15 Rapports sexuels et comportements en matière de santé reproductive avant l'âge de 15 ans

Parmi les femmes et les hommes de 15–19 ans, pourcentage qui ont commencé leur vie sexuelle avant l'âge de 15 ans, pourcentage qui étaient en union avant l'âge de 15 ans et pourcentage qui avaient déjà eu une naissance vivante/engendré une naissance vivante avant l'âge de 15 ans, selon le sexe ; et pourcentage de femmes qui ont déjà été enceintes avant l'âge de 15 ans, EDSM-VII Mali 2023–2024

Sexe	Ont eu des rapports sexuels avant 15 ans	Étaient en union avant l'âge de 15 ans	Avaient déjà eu une naissance vivante/ engendré une naissance vivante avant l'âge de 15 ans	Ont déjà été enceintes avant l'âge de 15 ans	Effectif
Femme	12,6	9,8	2,4	5,6	3 862
Homme	4,0	0,0	0,0	na	1 669

na = non applicable

PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ 6

Principaux résultats

- ***Désir d'un autre enfant :*** Trois femmes de 15–49 ans actuellement en union sur quatre (75 %) et plus de neuf hommes de 15–49 ans actuellement en union sur dix (93 %) désirent avoir un enfant ou un enfant supplémentaire.
- ***Limitation des naissances :*** Environ deux femmes de 15–49 ans actuellement en union sur dix (20 %) et 6 % des hommes de 15–49 ans actuellement en union ne veulent plus avoir d'enfants ou sont stérilisés.
- ***Nombre idéal d'enfants :*** Le nombre idéal d'enfants est en moyenne de 6,4 enfants pour l'ensemble des femmes de 15–49 ans et de 8,9 enfants pour l'ensemble des hommes du même groupe d'âges.
- ***Planification de la fécondité :*** Près de la totalité (98 %) des naissances et des grossesses actuelles ayant eu lieu au cours des 3 dernières années étaient désirées. Plus de quatre naissances et grossesses actuelles sur cinq (84 %) étaient souhaitées et se sont produites au moment voulu et dans 14 % des cas, les femmes auraient souhaité qu'elles se produisent plus tard.
- ***Fécondité désirée :*** L'Indice synthétique de fécondité désirée est de 5,4 enfants et, il est légèrement inférieur à l'Indice Synthétique de Fécondité (6,0 enfants) des 3 dernières années précédant l'enquête, signe manifeste que les femmes font un peu plus d'enfants qu'elles n'en souhaitent.

Les informations sur les préférences en matière de procréation peuvent aider les responsables de programmes de planification familiale à évaluer le souhait d'avoir des enfants, l'importance des grossesses mal planifiées et non désirées, et la demande en matière de contraception pour espacer ou limiter les naissances. Ces informations peuvent donner une indication de la tendance de la fécondité.

Ce chapitre présente des informations permettant non seulement de savoir si les hommes et les femmes en union (mariés ou en union consensuelle) souhaitent ou pas avoir davantage d'enfants et, dans l'affirmative, à quel moment ils les souhaitent, mais aussi de connaître la taille idéale de la famille, de savoir si la dernière naissance était désirée ou pas ; le chapitre présente aussi le taux de fécondité théorique, c'est-à-dire si toutes les naissances non désirées avaient été évitées.

6.1 DÉSIR D'AVOIR UN AUTRE ENFANT

Désir d'avoir un autre enfant

Il a été demandé aux femmes et aux hommes s'ils voulaient d'autres enfants et, dans l'affirmative, combien de temps ils préféreraient attendre avant la naissance du prochain enfant. Les femmes et les hommes qui sont stérilisés sont considérés comme ne voulant plus d'enfants.

Échantillon : Femmes et hommes de 15–49 ans actuellement en union

Parmi les femmes de 15–49 ans actuellement en union, trois sur quatre (75 %) désirent avoir un enfant ou un enfant supplémentaire (**Tableau 6.1**). Dans 28 % des cas, les femmes souhaitent la prochaine naissance dans les deux ans à venir, 46 % veulent espacer la prochaine naissance de deux ans ou plus et 2 % veulent un autre enfant mais ne sont pas sûres du moment. Cependant, 23 % des femmes ne souhaitent plus d'enfants ou sont stérilisées.

Plus de neuf hommes sur dix (93 %) de 15–49 ans actuellement en union souhaitent un enfant supplémentaire (**Tableau 6.1**). Parmi eux, 38 % désirent un enfant dans les deux prochaines années, plus d'un sur deux (53 %) souhaitent la prochaine naissance dans deux ans ou plus et 2 % désirent un autre enfant mais ne sont pas sûrs du moment. Par contre, 6 % ne désirent plus d'enfants ou sont stérilisés.

Tendances : La proportion de femmes de 15–49 ans actuellement en union ne désirant plus d'enfants a peu varié entre 1995–1996 et 2023–2024. Chez les hommes, on observe une tendance quasi similaire entre 1995–1996 et 2012–2013, avec des proportions variant entre 4 % et 7 %, puis une nette augmentation en 2018 (12 %) suivie d'une importante baisse à 6 % en 2023–2024 (**Graphique 6.1**).

***Graphique 6.1* Désir de limiter les naissances par nombre d'enfants vivants : tendances**

Pourcentage de femmes de 15–49 ans actuellement en union ne souhaitant plus d'enfants



Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- La proportion de femmes de 15–49 ans actuellement en union ne désirant plus d'enfants augmente avec le nombre d'enfants vivants. Elle passe de 2 % pour les femmes n'ayant pas d'enfants vivants à 10 % pour celles qui en ont 3 et à 54 % pour celles en ayant 6 ou plus (**Graphique 6.2**).

***Graphique 6.2* Désir de limiter le nombre d'enfants par nombre d'enfants vivants**

Pourcentage de femmes de 15–49 ans actuellement en union qui ne désirent plus d'enfants



- La proportion d'hommes de 15–49 ans actuellement en union qui ne désirent plus d'enfants est plus élevée en milieu urbain (7 %) qu'en milieu rural (5 %). Chez les femmes par contre, ce nombre moyen ne varie pratiquement pas selon le milieu de résidence (**Tableaux 6.2.1** et **6.2.2**).
- Les résultats par région montrent que les proportions les plus élevées de femmes qui ne souhaitent plus d'enfants sont observées à Kayes (23 %) et Ségou (23 %) et à l'opposé, la plus faible est observée à Gao (7 %) (**Tableau 6.2.1**). Chez les hommes, c'est à Mopti (17 %) que cette proportion est la plus élevée contre 2 % à Tombouctou (**Tableau 6.2.2**).
- La proportion de femmes de 15–49 ans actuellement en union qui ne désirent plus d'enfants diminue avec l'augmentation du niveau d'instruction, passant de 25 % chez celles qui n'ont aucun niveau d'instruction à 11 % parmi celles de niveau secondaire ou plus (**Tableau 6.2.1**).

6.2 TAILLE IDÉALE DE LA FAMILLE

Taille idéale de la famille

On a demandé aux enquêtés, sans enfant : « Si vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien voudriez-vous en avoir ? ». Aux enquêtés qui avaient des enfants, on a demandé : « Si vous pouviez revenir au moment où vous n'aviez pas encore d'enfants et que vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien auriez-vous voulu en avoir ? ».

Échantillon : Femmes et hommes de 15–49 ans

Le nombre idéal moyen d'enfants est de 6,4 enfants pour l'ensemble des femmes de 15–49 ans (**Tableau 6.3** et **Graphique 6.3**) ; parmi tous les hommes de la même tranche d'âges, il est plus élevé (8,9 enfants). Parmi les femmes et les hommes de 15–49 ans actuellement en union, ce nombre idéal moyen d'enfants est plus élevé (6,7 enfants pour les femmes et de 10,1 pour les hommes).

Parmi toutes les femmes de 15–49 ans, près de trois sur cinq (59 %) désirent avoir 6 enfants ou plus (**Tableau 6.3**). La proportion de femmes ayant déclaré un nombre idéal d'enfants de 6 ou plus varie de 43 % parmi celles qui n'ont pas d'enfants vivants, à 64 % chez celles qui ont 3 enfants vivants et à 76 % chez celles en ayant au moins 6.

Parmi tous les hommes de 15–49 ans, 72 % ont déclaré un nombre idéal d'enfants de 6 ou plus. Cette proportion passe de 66 % parmi les hommes n'ayant pas d'enfants vivants à 83 % parmi ceux qui en ont 6 ou plus (**Tableau 6.3**).

***Graphique 6.3* Taille idéale de la famille**



Tendances : Le nombre idéal moyen d'enfants pour l'ensemble des femmes de 15–49 ans a diminué entre 1987 et 2018, passant de 6,9 à 6,0 en 2018, puis a légèrement augmenté en 2023–2024 (6,4 enfants). Parmi tous les hommes de 15–49 ans, la même tendance est observée. En effet, ce nombre idéal moyen d'enfants baisse entre 1995–1996 (8,3 enfants) et 2006 (7,7 enfants) puis augmente à 8,9 enfants en 2023–2024.

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Le nombre idéal d'enfants parmi l'ensemble des femmes de 15–49 ans augmente avec l'âge, passant de 5,7 enfants chez les femmes de 15–19 ans à 7,2 enfants chez celles de 45–49 ans (**Tableau 6.4**).
- Il varie selon le milieu et la région de résidence de la femme : plus élevé en milieu rural qu'en urbain (6,6 contre 6,0 enfants) et dans les régions de Mopti (7,9 enfants) et Gao (7,7 enfants) qu'à Bamako (5,8 enfants).
- Le nombre idéal d'enfants pour l'ensemble des femmes de 15–49 ans diminue avec l'augmentation du niveau d'instruction. Il passe de 6,9 enfants parmi les femmes qui n'ont aucun niveau d'instruction à 5,6 enfants parmi celles ayant le niveau secondaire ou plus (**Tableau 6.4**).

- Du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, le nombre moyen idéal d'enfants pour l'ensemble des femmes de 15–49 ans diminue, passant de 7,0 enfants à 5,7 enfants (**Tableau 6.4** et **Graphique 6.4**).

Graphique 6.4 **Taille idéale de la famille par quintile de bien-être économique du ménage**



6.3 PLANIFICATION DE LA FÉCONDITÉ

Planification des naissances/des grossesses

Les femmes ont déclaré si la grossesse/naissance était souhaitée au moment où elle s'est produite (naissance planifiée), souhaitée plus tard (naissance mal planifiée) ou si elle n'était pas souhaitée (naissance non désirée).

Échantillon : Grossesses actuelles et naissances vivantes au cours des 3 années précédant l'enquête pour les femmes âgées de 15–49 ans ; tous les résultats de grossesses au cours des 3 années précédant l'enquête pour les femmes âgées de 15–49 ans.

Au Mali, la majorité des naissances ou des grossesses actuelles (84 %) des trois dernières années précédant l'enquête étaient désirées et se sont produites au moment voulu. Par contre, plus d'une naissance vivante ou d'une grossesse actuelle sur dix (14 %) étaient voulues, mais plus tard. Les naissances vivantes ou grossesses actuelles non désirées, c'est-à-dire celles qui ont eu lieu au moment où les femmes ne voulaient pas ou ne voulaient plus d'enfant représentent 2 % de l'ensemble des naissances vivantes ou des grossesses actuelles des trois dernières années (**Tableau 6.5** et **Graphique 6.5**).

Graphique 6.5 **Planification de la fécondité**



En outre, les résultats montrent que quand l'issue de la grossesse est une naissance vivante, celle-ci était voulue au moment, ou voulue plus tard dans 98 % des cas et seulement 2 % n'étaient pas souhaitées. Quand l'issue de la grossesse est une fausse-couche ou un avortement, la naissance ou la grossesse était moins bien planifiée : quand la grossesse s'est terminée par une fausse-couche, 13 % étaient souhaitées plus tard et 4 % n'étaient pas souhaitées. Dans le cas de l'avortement, ces pourcentages sont respectivement de 16 % et de moins d'un pour cent (**Graphique 6.6**).

***Graphique 6.6* Planification de la fécondité**

Répartition (en %) des résultats de grossesse des femmes âgées de 15 à 49 ans au cours des 3 années précédant l'enquête en fonction de la situation de planification de la grossesse



Tendances : En comparant les résultats des différentes opérations EDS qui ont été réalisées au Mali, on constate que la proportion des naissances vivantes ou de grossesses voulues au moment n'a pratiquement pas varié entre 1995–1996 et 2018, passant de 77 % à 84 %. Entre 2018 et 2023–2024, ce pourcentage est demeuré quasiment le même. La proportion des naissances vivantes ou des grossesses actuelles mal planifiées, parce qu'elles étaient désirées plus tard ou pas du tout, a nettement diminué passant de 22 % en 1995–1996 à 16 % en 2018. Au cours de la période récente, ce pourcentage a peu varié (17% en 2023–2024).

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- La proportion des naissances vivantes ou grossesses actuelles ayant eu lieu au moment voulu diminue avec le rang de naissance, passant de 88 % pour le rang 1 à 80 % pour le rang 4 ou plus.
- À l'inverse, la proportion des naissances ou grossesses actuelles voulues mais plus tard augmente avec le rang de naissance. De 11 % pour celles de rang 1, elle atteint 16 % pour celles de rang 4 ou plus.
- En considérant l'âge de la mère à la naissance de l'enfant, on constate que les naissances vivantes ou grossesses actuelles les mieux planifiées sont celles des femmes de moins de 30 ans (85 %).

6.4 TAUX DE FÉCONDITÉ DÉSIRÉE

Naissance non désirée

Toutes les naissances dont le nombre est supérieur au nombre idéal déclaré par la femme.

Naissance souhaitée

Toutes les naissances dont le nombre est inférieur ou égal au nombre idéal déclaré par la femme.

Taux de fécondité désirée

Nombre moyen d'enfants qu'aurait une femme en fin de vie féconde si elle avait des enfants aux taux de fécondité par âge actuels, en excluant les naissances non désirées.

Échantillon : Femmes de 15–49 ans

La fécondité désirée peut être mesurée par l'indice synthétique de fécondité désirée (ISFD). Au Mali, si toutes les naissances non désirées étaient évitées, le nombre moyen d'enfants par femme serait de 5,4 au lieu de 6,0 enfants (ISF), ce qui signifie qu'en moyenne, les femmes font un peu plus d'enfants qu'elles n'en souhaitent (**Tableau 6.6**).

Tendances : Dans l'ensemble, les différentes EDS ont montré que l'ISFD est toujours inférieur à l'ISF et au fil du temps, ils tendent tous à diminuer. En effet, sur la période 1987 à 2023–2024, l'ISF est passé de 7,1 enfants en 1987 à 6,0 enfants en 2023–2024. Concernant l'ISFD, cette même tendance est observée puisqu'il est passé de 6,6 enfants en 1987 à 5,4 enfants en 2023–2024 (**Graphique 6.7**).

***Graphique 6.7* Fécondité désirée et fécondité actuelle : tendances**



Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- L'Indice Synthétique de Fécondité Désirée (ISFD) est plus élevé en milieu rural (5,8 enfants) qu'en milieu urbain (4,5 enfants).
- La région de Mopti enregistre la valeur de l'ISFD la plus élevée (6,2 enfants) et celle de Bamako, la plus faible avec 4,3 enfants.
- L'écart entre l'ISF et l'ISFD est plus important dans les régions de Sikasso et Ségou (6,5 et 5,6) et très faible dans celle de Tombouctou (5,3 et 5,1).
- L'ISFD diminue avec le niveau d'instruction de la femme. Il passe de 5,8 enfants parmi les femmes sans instruction à 4,7 enfants parmi celles ayant le niveau secondaire ou plus.
- Les niveaux des deux indicateurs diminuent avec l'amélioration du niveau de bien-être économique du ménage dans lequel vit la femme et en outre, on constate que l'écart entre les deux indicateurs eux se réduit.

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur les préférences en matière de fécondité, consultez les tableaux suivants :

- **Tableau 6.1 Préférences en matière de fécondité par nombre d'enfants vivants**
- **Tableau 6.2.1 Désir de limiter les naissances : Femme**
- **Tableau 6.2.2 Désir de limiter les naissances : Homme**
- **Tableau 6.3 Nombre idéal d'enfants selon le nombre d'enfants vivants**
- **Tableau 6.4 Nombre idéal d'enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques**
- **Tableau 6.5 Planification de la fécondité**
- **Tableau 6.6 Taux de fécondité désirée**

Tableau 6.1 Préférences en matière de fécondité par nombre d'enfants vivants

Répartition (en%) des femmes de 15–49 ans actuellement en union et des hommes de 15–49 ans actuellement en union par désir d'enfants, selon le nombre d'enfants vivants, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Nombre d'enfants vivants							Ensemble	Ensemble
Désir d'enfants	0	1	2	3	4	5	6+	15–49	15–64
				FEMME[1]					
Veut un autre bientôt[2]	79,9	37,4	32,0	25,2	24,9	17,0	10,7	27,5	na
Veut un autre plus tard[3]	8,8	55,7	60,1	60,2	51,0	44,8	25,4	45,5	na
Veut un autre, ne sait pas quand	5,1	3,4	2,6	2,0	2,1	1,5	1,1	2,3	na
Indécise	0,9	0,8	0,9	1,2	2,5	3,9	4,2	2,2	na
Ne veut plus d'enfants	2,0	1,3	3,3	9,2	16,8	29,8	51,8	19,4	na
Stérilisé[4]	0,2	0,4	0,2	0,4	0,9	0,8	1,8	0,8	na
S'est déclarée stérile	3,2	1,0	0,9	1,7	1,9	2,3	4,9	2,4	na
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	na
Effectif	877	1 939	2 091	2 037	1 828	1 604	2 860	13 237	na
				HOMME[5]					
Veut un autre bientôt[2]	67,3	42,0	35,3	35,5	34,5	31,6	34,1	38,2	37,3
Veut un autre plus tard[3]	26,7	54,5	60,1	57,4	56,5	60,0	50,3	53,1	46,3
Veut un autre, ne sait pas quand	0,1	1,1	1,8	2,8	1,7	1,8	1,9	1,7	1,7
Indécise	1,9	0,3	0,3	1,0	1,4	0,4	1,6	1,0	1,7
Ne veut plus d'enfants	3,1	2,1	2,2	3,0	5,7	5,6	10,6	5,3	10,6
Stérilisé[4]	0,5	0,0	0,0	0,4	0,1	0,4	0,7	0,3	1,1
S'est déclarée stérile	0,5	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,7	0,3	1,2
Manquant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	304	470	554	487	430	371	897	3 512	4 633

na = non applicable

[1] Le nombre d'enfants vivants comprend la grossesse actuelle d'une femme.

[2] Veut la prochaine naissance dans les 2 ans

[3] Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus

[4] Y compris la stérilisation féminine et masculine

[5] Le nombre d'enfants vivants pour les hommes comprend un enfant supplémentaire si l'épouse de l'enquêté est enceinte (ou si l'une des épouses est enceinte pour les hommes ayant actuellement plus d'une épouse).

Tableau 6.2.1 Désir de limiter les naissances : Femme

Pourcentage de femmes de 15–49 ans actuellement en union qui ne veulent plus d'enfants par nombre d'enfants vivants, selon certaines caractéristiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Nombre d'enfants vivants[1]							Ensemble
	0	1	2	3	4	5	6+	
Résidence								
Bamako	3,9	0,8	7,3	14,2	25,4	38,2	65,2	22,4
Autre urbain	1,3	1,7	3,6	10,5	19,1	39,4	53,0	19,3
Ensemble urbain	2,7	1,2	5,5	12,6	22,5	38,8	59,3	21,0
Rural	2,0	1,8	2,9	8,5	16,1	28,4	52,6	19,9
Région								
Kayes	0,0	1,8	5,7	12,3	26,5	32,9	56,2	22,9
Koulikoro	0,4	1,5	0,4	9,8	12,9	32,8	53,3	17,8
Sikasso	4,5	1,6	4,6	6,3	12,6	27,5	53,8	20,3
Ségou	1,1	2,9	2,9	9,1	18,8	35,3	57,7	23,1
Mopti	6,6	0,7	2,7	7,5	16,3	19,5	45,0	18,2
Tombouctou	1,6	0,6	2,1	4,1	13,5	13,9	36,8	12,2
Gao	1,7	3,5	2,3	5,6	6,7	12,6	16,0	7,1
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	5,6
Bamako	3,9	0,8	7,3	14,2	25,4	38,2	65,2	22,4
Niveau d'instruction								
Aucun	3,3	2,8	4,9	11,6	18,7	32,1	54,0	25,0
Primaire	1,3	0,3	1,5	5,0	15,0	30,8	49,0	14,8
Secondaire ou plus	0,8	0,7	2,1	8,1	16,9	23,4	57,1	10,5
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	1,3	1,2	5,9	9,1	15,8	26,1	57,2	23,8
Second	3,5	1,9	2,1	9,1	18,9	29,6	54,0	22,2
Moyen	2,8	1,9	2,7	7,2	12,5	27,3	47,2	17,5
Quatrième	1,8	1,9	2,5	9,2	15,0	32,8	52,1	17,6
Le plus élevé	1,3	1,3	4,5	13,0	25,6	40,0	58,8	19,5
Ensemble	2,2	1,7	3,5	9,6	17,7	30,6	53,6	20,2

Note : Les femmes stérilisées ou celles dont le partenaire/mari est stérilisé sont considérées comme ne voulant plus d'enfant.

[1] Le nombre d'enfants vivants inclut la grossesse actuelle d'une femme.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 6.2.2 Désir de limiter les naissances : Homme

Pourcentage d'hommes de 15–49 ans actuellement en union qui ne veulent plus d'enfants par nombre d'enfants vivants, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Nombre d'enfants vivants[1]							Ensemble
	0	1	2	3	4	5	6+	
Résidence								
Bamako	(0,0)	1,8	0,0	4,9	8,8	(15,2)	17,3	6,4
Autre urbain	(7,3)	2,3	7,5	3,3	8,3	(14,4)	13,2	8,0
Ensemble urbain	2,8	2,0	2,6	4,3	8,6	14,9	15,1	7,1
Rural	3,8	2,1	2,0	2,9	4,7	3,7	10,4	5,1
Région								
Kayes	(2,1)	0,0	0,0	0,0	5,8	(0,0)	8,2	2,9
Koulikoro	3,8	1,1	1,1	2,2	6,9	5,6	13,0	5,5
Sikasso	(0,0)	0,0	1,0	4,0	3,6	4,7	4,9	3,1
Ségou	*	(0,0)	1,1	1,4	(0,0)	(5,4)	10,4	4,6
Mopti	(24,6)	(19,0)	(20,9)	(10,1)	(13,3)	(5,4)	19,8	16,8
Tombouctou	*	2,9	4,3	0,1	0,3	4,3	2,0	2,2
Gao	*	(3,4)	(5,1)	(3,9)	(8,4)	*	(18,7)	8,0
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	1,6
Bamako	(0,0)	1,8	0,0	4,9	8,8	(15,2)	17,3	6,4
Niveau d'instruction								
Aucun	5,9	3,2	1,6	3,1	3,5	4,3	9,5	5,5
Primaire	0,0	1,9	0,7	4,0	2,0	5,8	17,2	5,7
Secondaire ou plus	2,5	1,3	3,3	3,3	13,2	10,2	12,3	5,7
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	0,0	2,1	0,0	5,4	4,3	3,1	8,7	4,5
Second	6,2	0,0	0,0	0,8	2,6	1,9	10,2	4,1
Moyen	6,8	3,9	6,4	2,3	4,8	8,6	11,2	6,9
Quatrième	0,9	3,6	1,7	3,5	5,9	4,9	15,3	6,1
Le plus élevé	2,6	1,1	2,7	4,4	10,1	12,4	12,7	6,5
Ensemble 15–49	3,5	2,1	2,2	3,3	5,8	6,0	11,3	5,6
50–64	(23,0)	*	*	(26,0)	17,7	29,9	33,9	30,8
Ensemble 15–64	5,3	2,5	2,3	5,0	8,0	11,5	22,0	11,7

Note : Les hommes stérilisés ou qui ont déclaré à la question concernant le désir d'enfants que leur épouse/partenaire était stérilisée sont considérés comme ne voulant plus d'enfants. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
[1] Le nombre d'enfants vivants comprend un enfant supplémentaire si l'épouse/partenaire de l'enquêté est enceinte (ou si une des épouses est enceinte pour les hommes qui ont actuellement plus d'une épouse).
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 6.3 Nombre idéal d'enfants selon le nombre d'enfants vivants

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15–49 ans par nombre idéal d'enfants et nombre moyen idéal d'enfants pour l'ensemble des enquêtés et pour les enquêtés actuellement en union, selon le nombre d'enfants vivants, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Nombre d'enfants vivants							
Nombre idéal d'enfants	0	1	2	3	4	5	6+	Ensemble
				FEMME[1]				
0	1,9	1,5	1,3	2,1	1,4	2,5	3,2	2,0
1	0,3	0,1	0,3	0,2	0,1	0,6	0,3	0,3
2	2,7	1,6	0,9	0,4	0,9	1,1	0,9	1,4
3	6,8	5,2	3,0	2,2	1,3	1,4	1,3	3,5
4	21,8	19,7	15,1	9,0	8,6	5,9	5,3	13,3
5	19,3	22,6	21,6	19,2	14,5	11,0	7,3	16,7
6+	42,9	46,1	54,9	63,8	69,2	72,7	75,8	58,8
Réponse non numérique	4,3	3,0	3,0	3,1	4,0	4,9	5,8	4,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	4 131	2 355	2 257	2 103	1 891	1 659	2 950	17 347
Nombre idéal d'enfants pour les femmes de 15–49[2]								
Ensemble des femmes	5,7	5,7	6,1	6,5	6,7	7,1	7,7	6,4
Effectif de femmes	3 954	2 284	2 190	2 038	1 815	1 578	2 780	16 640
Femmes actuellement en union	6,2	5,8	6,2	6,5	6,7	7,1	7,7	6,7
Effectif de femmes actuellement en union	826	1 883	2 030	1 976	1 755	1 528	2 700	12 699
				HOMME[3]				
0	0,4	0,7	0,1	0,0	0,5	0,0	0,3	0,4
1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
2	0,7	0,0	0,3	0,0	0,8	0,6	0,0	0,5
3	3,9	2,2	0,8	0,9	0,9	0,3	0,7	2,5
4	9,0	8,6	7,5	2,3	3,8	1,5	0,6	6,4
5	14,2	15,0	10,0	7,7	7,1	5,1	2,5	10,9
6+	66,3	67,9	73,2	80,0	74,9	84,6	83,3	71,9
Réponse non numérique	5,4	5,4	8,1	9,0	12,0	7,9	12,5	7,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	3 360	557	578	491	430	373	897	6 686
Nombre idéal d'enfants pour les hommes de 15–49[2]								
Ensemble des hommes	7,6	8,3	8,8	9,7	9,5	10,0	13,0	8,9
Effectif des hommes	3 178	526	531	447	378	344	784	6 189
Hommes actuellement en union	8,1	8,7	8,8	9,7	9,5	10,0	13,0	10,1
Effectif des hommes actuellement en union	281	442	507	443	378	341	784	3 176
Nombre idéal d'enfants pour les hommes de 15–64[2]								
Ensemble des hommes	7,6	8,4	8,7	9,6	9,3	10,1	12,8	9,2
Effectif des hommes	3 211	545	549	484	460	440	1 469	7 159
Hommes actuellement en union	8,1	8,7	8,8	9,6	9,3	10,1	12,8	10,5
Effectif des hommes actuellement en union	309	460	523	477	460	435	1 464	4 127

[1] Le nombre d'enfants vivants inclut la grossesse actuelle pour les femmes.
[2] Les moyennes sont calculées en excluant les enquêtés qui ont fourni des réponses non numériques.
[3] Pour les hommes, le nombre d'enfants vivants comprend un enfant supplémentaire si l'épouse de l'enquêté est enceinte (ou si l'une des épouses est enceinte si l'homme a actuellement plus d'une épouse).

Tableau 6.4 Nombre idéal d'enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Nombre idéal d'enfants pour l'ensemble des femmes de 15–49 ans selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Nombre moyen	Effectif de femmes[1]
Âge		
15–19	5,7	3 700
20–24	6,0	3 266
25–29	6,4	2 795
30–34	6,7	2 310
35–39	7,1	1 984
40–44	7,3	1 493
45–49	7,2	1 091
Résidence		
Bamako	5,8	2 492
Autre urbain	6,3	1 957
Ensemble urbain	6,0	4 449
Rural	6,6	12 191
Région		
Kayes	6,0	2 519
Koulikoro	6,1	3 924
Sikasso	6,8	3 016
Ségou	6,4	2 445
Mopti	7,9	1 524
Tombouctou	7,1	249
Gao	7,7	467
Kidal	†	4
Bamako	5,8	2 492
Niveau d'instruction		
Aucun	6,9	8 971
Primaire	6,3	2 785
Secondaire ou plus	5,6	4 884
Quintile de bien-être économique		
Le plus bas	7,0	2 912
Second	6,8	3 032
Moyen	6,6	3 198
Quatrième	6,3	3 528
Le plus élevé	5,7	3 971
Ensemble	6,4	16 640

[1] Effectif de femmes ayant donné une réponse numérique

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 6.5 Planification de la fécondité

Répartition (en %) des naissances vivantes et des grossesses actuelles des femmes de 15–49 ans ayant eu lieu au cours des 3 années précédant l'enquête par planification de la grossesse, selon le rang de naissance et l'âge de la mère à la naissance de l'enfant ; répartition (en %) de toutes les issues de grossesses des femmes de 15–49 ans des 3 années précédant l'enquête par planification de la grossesse, selon le type de résultat de la grossesse, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique	Planification de l'issue de la grossesse			Total	Nombre d'issues de grossesses[1]
	Voulue au moment	Voulue plus tard	Ne veut plus d'enfants		
NAISSANCES VIVANTES ET GROSSESSES ACTUELLES					
Rang de naissance					
1	88,0	11,2	0,8	100,0	2 172
2	86,0	13,6	0,3	100,0	2 058
3	85,9	13,6	0,5	100,0	1 799
4+	79,9	15,6	4,5	100,0	5 413
Âge de la mère à la naissance de l'enfant[2]					
<20	84,6	14,5	0,9	100,0	1 877
20–24	85,4	14,2	0,4	100,0	3 120
25–29	84,9	14,4	0,7	100,0	2 770
30–34	83,3	14,2	2,5	100,0	1 915
35–39	77,6	14,7	7,6	100,0	1 259
40–44	75,5	8,4	16,1	100,0	444
45–49	73,4	10,2	16,4	100,0	56
Ensemble	83,5	14,1	2,4	100,0	11 441
TOUTES LES ISSUES DE GROSSESSE					
Type d'issue de la grossesse					
Grossesses actuelle	84,2	13,6	2,2	100,0	1 814
Naissances vivantes	83,4	14,2	2,4	100,0	9 628
Enfants mort-né	87,8	9,1	3,1	100,0	230
Fausse couche	83,3	13,2	3,6	100,0	828
Avortement	83,8	16,2	0,0	100,0	43
Ensemble	83,6	14,0	2,5	100,0	12 542

Note : Une issue de grossesse fait référence à une fausse couche, un avortement, une naissance vivante ou une mortinaissance. Certaines grossesses produisent des issues multiples comme dans le cas de jumeaux. Dans ce tableau, chaque issue de grossesse est comptée individuellement. Par conséquent, une grossesse sera comptée plus d'une fois si elle se termine par des naissances multiples (naissances vivantes ou mort-nés). Les grossesses actuelles, les fausses couches et les avortements sont toujours comptés comme une issue de grossesse.

[1] Pour les grossesses ayant abouti à des issues multiples (par exemple, des jumeaux), chaque issue est comptée individuellement.

[2] Pour les grossesses actuelles, l'âge de la mère à la naissance est estimé comme étant l'âge attendu de la mère au moment de la naissance.

Tableau 6.6 Taux de fécondité désirée

Indice Synthétique de Fécondité désiré et Indice Synthétique de Fécondité pour les 3 années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Taux de fécondité désiré	Taux de fécondité
Résidence		
Bamako	4,3	4,9
Autre urbain	4,8	5,2
Ensemble urbain	4,5	5,0
Rural	5,8	6,4
Région		
Kayes	5,5	6,1
Koulikoro	5,5	6,1
Sikasso	5,6	6,5
Ségou	5,6	6,4
Mopti	6,2	6,5
Tombouctou	5,1	5,3
Gao	5,7	6,1
Kidal	†	†
Bamako	4,3	4,9
Niveau d'instruction		
Aucun	5,8	6,5
Primaire	5,5	6,2
Secondaire ou plus	4,7	5,1
Quintile de bien-être économique		
Le plus bas	6,2	7,1
Second	6,1	6,9
Moyen	5,5	6,2
Quatrième	5,3	5,7
Le plus élevé	4,4	4,9
Ensemble	5,4	6,0

Note : Les taux sont basés sur les naissances des femmes de 15–49 ans durant la période 1–36 mois précédant l'enquête. L'Indice Synthétique de Fécondité est le même que celui présenté au Tableau 5.2.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

PLANIFICATION FAMILIALE 7

Principaux résultats

- ***Connaissance des méthodes contraceptives :*** En 2023–2024, la quasi-totalité des femmes (96 %) et des hommes (95 %) ont déjà entendu parler d'au moins une méthode contraceptive.
- ***Utilisation de la contraception :*** Au Mali, 19 % des femmes âgées de 15–49 ans utilisent au moins une méthode contraceptive (18 % pour les méthodes modernes et 1 % pour les méthodes traditionnelles). Cette prévalence est de 22 % chez les femmes actuellement en union contre 41 % chez les femmes qui ne sont pas en union mais sexuellement actives.
- ***Méthodes utilisées :*** Les méthodes contraceptives modernes les plus utilisées par les femmes sont les implants (24 % chez les femmes non en union, mais sexuellement active et 11 % chez les femmes actuellement en union) et les injectables (respectivement 7 % et 5 %).
- ***Besoins et demande en matière de planification familiale :*** Au Mali, la proportion de femmes en union ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale s'élève, en moyenne, à 25 % et dans la majorité des cas (19 %) ces besoins non satisfaits sont orientés vers l'espacement. Quant à la demande totale en PF parmi les femmes en union, elle est estimée à 47 % dont 35 % sont orientés vers l'espacement des naissances.
- ***Discontinuation des méthodes contraceptives :*** Parmi les épisodes d'utilisation contraceptive commencés par les femmes au cours des 5 dernières années, 36 % ont été discontinués au cours des 12 mois précédant l'enquête. C'est pour les injectables (58 %) et la pilule (49 %) que les taux de discontinuité sont les plus élevés.

Les couples peuvent utiliser des méthodes contraceptives pour limiter ou espacer le nombre d'enfants. Ce chapitre présente des informations sur l'utilisation et les sources des méthodes contraceptives, le choix informé des méthodes, ainsi que les taux et les raisons de l'abandon des contraceptifs. Il examine également la demande potentielle de planification familiale et le degré de contact des non-utilisateurs avec les prestataires de planification familiale.

L'utilisation de la contraception permet d'éviter les grossesses non désirées ou non planifiées et prévient des grossesses à risque. La contraception contribue également à l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Au Mali, malgré les actions réalisées par le Gouvernement et ses partenaires, le niveau de la fécondité reste l'un des plus élevés au monde. En réaction à cette situation, le Gouvernement a opté pour une approche plus élaborée et plus complète par la prise en compte de la dimension population dans tous les plans et programmes de développement. Cette orientation a été consolidée par la Politique Nationale de Population (PNP) dont l'objectif est d'atteindre l'équilibre entre l'accroissement de la population et le développement socio-économique.

7.1 CONNAISSANCE ET UTILISATION DE LA CONTRACEPTION

L'utilisation de la contraception suppose, au préalable, la connaissance d'au moins une méthode contraceptive. Ainsi, lors de l'enquête, des questions relatives à la connaissance des méthodes contraceptives ont été posées à tous les enquêtés. Il ressort des résultats qu'une grande partie de la population malienne âgée de 15–49 ans connaît au moins une méthode contraceptive. En effet, la quasi-totalité des femmes (96 %) et des hommes (95 %) ont déjà entendu parler d'une méthode contraceptive (**Tableau 7.1**).

Globalement, les méthodes modernes sont mieux connues que les méthodes traditionnelles, que ce soit par les femmes et les hommes (96 % contre 56 % et 95 % contre 60 %). Parmi les méthodes modernes, les implants (93 %), les injectables (91 %), la pilule (90 %) et le condom masculin (80 %) sont les méthodes les plus connues par les femmes. Quant aux hommes âgés de 15–49 ans, les méthodes modernes les plus fréquemment citées sont : le condom masculin (90 %), les implants (87 %), les injectables (81 %) et les pilules (80 %) (**Tableau 7.1**).

Le niveau de connaissance des méthodes contraceptives, en particulier les méthodes modernes, reste relativement élevé quelle que soit la catégorie socio démographique considérée. Cependant, les plus faibles proportions de femmes en union ayant entendu parler d'au moins une méthode contraceptive sont observées dans les régions de Gao (79 %) et de Tombouctou (86 %) (**Tableau 7.2**).

Prévalence de la contraception

Pourcentage de femmes utilisant une méthode contraceptive quelle qu'elle soit.

Échantillon : Toutes les femmes âgées de 15–49 ans, les femmes de 15–49 ans actuellement en union et les femmes de 15–49 ans célibataires sexuellement actives

Méthodes modernes

Incluant la stérilisation masculine et féminine, les dispositifs intra-utérins (DIU), les contraceptifs injectables, les implants contraceptifs, les pilules contraceptives, les condoms masculin et féminin, la contraception d'urgence, la méthode des jours fixes (MJF) et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA).

Dans l'ensemble, 19 % des femmes âgées de 15–49 ans utilisaient au moins une méthode contraceptive au moment de l'enquête (18 % une méthode moderne et 1 % une méthode traditionnelle) (**Tableau 7.3**). Cette prévalence de la contraception est de 22 % chez les femmes actuellement en union et de 41 % parmi celles qui ne sont pas en union mais qui sont sexuellement actives (**Graphique 7.1**). Parmi les méthodes modernes utilisées par les femmes, on constate que les implants (24 % des femmes non en union, mais sexuellement active et 11 % chez les femmes en union) et les injectables (respectivement 7 % et 5 %) sont les plus utilisées (**Graphique 7.1**).

Tendances : Globalement, on constate que même si la prévalence contraceptive moderne parmi les femmes en union reste relativement faible, elle tend à augmenter au fil des années. En effet, elle passe de 1 % en 1987 à 6 % en 2001 à 16 % en 2018 pour atteindre 21 % en 2023–2024 (**Graphique 7.2**).

Graphique 7.1 Utilisation contraceptive

Pourcentage de femmes âgées de 15–49 ans utilisant actuellement une méthode contraceptive



Graphique 7.2 Utilisation contraceptive : tendance

Pourcentage de femmes actuellement en union utilisant une méthode de contraception



Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- La prévalence de la contraception moderne parmi les femmes en union augmente avec le nombre d'enfants vivants, de 2 % parmi celles n'ayant aucun enfant à 25 % parmi celles ayant 5 enfants ou plus (**Tableau 7.4**).
- Quant aux résultats selon le milieu de résidence, ils montrent que la prévalence contraceptive moderne est moins élevée en milieu rural qu'en milieu urbain. En effet, parmi les femmes en union, cette prévalence est estimée à 28 % en milieu urbain contre 19 % en milieu rural. Chez les femmes qui ne sont pas en union mais qui sont sexuellement actives, elle est de 40 % en milieu urbain contre 36 % en milieu rural (**Tableau 7.4**).

- La proportion de femmes en union ayant recours à une méthode contraceptive moderne varie selon la région de résidence. Les prévalences de la contraception moderne les plus élevées sont enregistrées dans le district de Bamako (30 %) et dans les régions de Koulikoro (24 %), Ségou (23 %) et Sikasso (20 %). À l'opposé, les plus faibles sont observées dans les régions de Gao (3 %) et Tombouctou (7 %) (**Carte 7.1**).

Carte 7.1 Utilisation de méthodes contraceptives modernes par région

Pourcentage de femmes de 15–49 ans actuellement en union qui utilisent une méthode moderne de contraception



Note : Pour des raisons d'insécurité, les données de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région et ne sont pas présentées séparément.

- Le niveau d'utilisation de la contraception augmente avec l'augmentation du niveau d'instruction des femmes actuellement en union, passant pour les méthodes modernes, de 17 % parmi celles n'ayant aucun niveau d'instruction à 24 % parmi celles ayant le niveau primaire pour atteindre 29 % parmi celles ayant le niveau secondaire ou plus (**Tableau 7.4**).

- L'utilisation actuelle d'une méthode contraceptive moderne par les femmes en union varie avec le quintile de bien-être économique, passant de 17 % dans le plus bas à 28 % dans le quintile le plus élevé (**Graphique 7.3**).

Graphique 7.3 Utilisation de méthodes contraceptives modernes par quintile de bien-être économique du ménage

Pourcentage de femmes de 15–49 ans actuellement en union qui utilisent une méthode contraceptive moderne



Moment de la stérilisation

L'âge médian de la stérilisation chez les femmes de 15 à 49 ans est de 35 ans (Données non présentées).

Utilisation de DMPA-SC/Sayana Press

Globalement, 20 % des femmes âgées de 15–49 ans utilisatrices actuelles d'injectables, utilisent le DMPA-SC/Savana Press (**Tableau 7.5**). Dans la majorité (97 %) des cas, l'injectable a été administré par un prestataire de santé et seulement 3 % des utilisatrices l'ont auto-administrées. (**Tableau 7.5**).

7.1.1 Utilisation de la contraception d'urgence

Au Mali, seule 1 % des femmes âgées de 15–49 ans ont eu recours à la contraception d'urgence au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête (**Tableau 7.6**). La proportion des femmes de 15–49 ans qui ont eu recours à la contraception d'urgence augmente légèrement avec le niveau d'instruction de la femme, passant de 1 % chez les femmes qui n'ont aucun niveau d'instruction à 2 % chez celles ayant le niveau secondaire ou plus (**Tableau 7.6**).

7.1.2 Connaissance de la période de fécondité

L'utilisation de certaines méthodes contraceptives (moderne ou traditionnelle) suppose au préalable, la connaissance du cycle menstruel. Ainsi, lors de l'enquête, on a demandé aux femmes si elles savaient qu'il existe au cours du cycle menstruel une période plus propice pour tomber enceinte et, si oui, on leur a demandé si elles pouvaient situer cette période. Les résultats montrent dans l'ensemble que seules 27 % des femmes savent situer correctement cette période. Cette proportion est néanmoins plus élevée parmi les femmes utilisatrices de la méthode du rythme (52 %) (**Tableau 7.7**). Les résultats selon l'âge montrent que c'est parmi les plus jeunes femmes (15–19 ans) que la proportion de celles qui savent situer correctement la période féconde est la plus faible 19 % contre 32 % à 30-34 ans (**Tableau 7.8**).

7.2 SOURCE DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES MODERNES

Source des contraceptifs modernes

L'endroit où la méthode contraceptive moderne actuellement utilisée a été obtenue, lors de sa dernière acquisition.

Échantillon : Femmes de 15–49 ans utilisant actuellement une méthode contraceptive moderne

Le secteur public est, de loin, le secteur qui joue le rôle le plus important dans l'approvisionnement en méthodes contraceptives modernes. En effet, pour obtenir les méthodes modernes de contraception, 77 % des femmes utilisatrices des méthodes modernes se sont adressées au secteur médical public (**Tableau 7.9**). Viennent ensuite le secteur médical privé (18 %), le secteur médical (ONG) (1 %). Cinq pour cent des femmes ont reporté des sources non spécifier.

Les femmes utilisatrices des méthodes contraceptives modernes qui se sont approvisionnées dans le secteur médical public, se sont adressées majoritairement aux Centres de Santé Communautaire (CSCom) (57 %) et dans les Centres de Santé de Référence (CSREF) (11 %) (**Tableau 7.9**).

S'agissant de l'utilisation de méthodes modernes, on note que le secteur public reste la source la plus importante pour les implants (88 %) et les injectables (77 %), tandis que le secteur médical privé est la source la plus importante pour les pilules (45 %) (**Graphique 7.4**).

***Graphique 7.4* Sources d'approvisionnement en méthodes modernes de contraception**

Répartition (en %) des utilisatrices actuelles de méthodes modernes de contraception, âgées de 15–49 ans, par source d'approvisionnement la plus récente



7.3 CHOIX INFORMÉ

Choix informé

Le choix informé indique que les femmes ont été averties des effets secondaires de la méthode, de ce qu'il convient de faire en cas d'effets secondaires ainsi que des autres méthodes qu'elles peuvent utiliser.

Echantillon : Femmes 15–49 ans qui utilisent actuellement certaines méthodes modernes dont la dernière période d'utilisation a commencé au cours des 5 années précédant l'enquête

Dans l'optique d'une bonne utilisation des méthodes contraceptives modernes par les femmes, les formations sanitaires, les prestataires de services de planification familiale sont censés assurer des services complets en fournissant le maximum d'informations utiles aux demandeurs de produits de planification familiale comme les différentes méthodes contraceptives existantes, leurs contraintes, leurs effets secondaires ou de problèmes liés à l'utilisation de ces méthodes etc.

Dans l'ensemble, les résultats montrent que 60 % des femmes utilisatrices des méthodes contraceptives modernes ont été informées de possibles effets secondaires ou de problèmes liés à l'utilisations de ces méthodes, six femmes utilisatrices sur dix (61 %) ont été informées de ce qu'il fallait faire en cas d'effets secondaires et un peu plus de six femmes utilisatrices sur dix (63 %) ont été informées par un agent de santé ou un agent en planification familiale d'autres méthodes qui pourraient être utilisées (**Tableau 7.10**). Globalement, une femme utilisatrice sur deux (50 %) des méthodes contraceptives modernes a reçu les trois types d'informations et 63 % ont été informées qu'elles pouvaient changer pour une autre méthode si elles le souhaitaient ou si elles en avaient besoin (**Tableau 7.10**).

7.4 DISCONTINUATION DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES

Taux d'abandon des méthodes contraceptives

Pourcentage d'épisodes contraceptifs discontinués au cours des 12 mois.

Échantillon : Épisodes d'utilisation contraceptive au cours des 5 années précédant l'enquête des femmes actuellement âgées de 15–49 ans (une femme a pu avoir plus d'un épisode)

Parmi les épisodes d'utilisation contraceptive des 5 dernières années, 36 % ont été discontinués au cours des 12 mois précédents l'enquête (**Tableau 7.11**). C'est pour les injectables et la pilule que les taux de discontinuation sont les plus élevés avec respectivement 58 % et 49 % (**Tableau 7.11** et **Graphique 7.5**).

Les raisons de discontinuation les plus citées par les femmes utilisatrices des méthodes contraceptives au cours des 5 dernières années sont : le désir de tomber enceinte (45 %) et les effets secondaires ou des problèmes de santé (16 %) (**Tableau 7.12**).

Graphique 7.5 **Taux de discontinuation des méthodes contraceptives**

Pourcentage d'épisodes contraceptifs discontinués dans les 12 mois



7.5 DEMANDE EN PLANIFICATION FAMILIALE

Besoins non satisfaits en matière de planification familiale

Pourcentage de femmes : (1) qui ne sont ni enceintes, ni en aménorrhée post-partum et qui sont considérées comme fécondes et qui souhaitent retarder leur prochaine naissance de deux ans ou plus ou ne plus avoir d'enfants, mais qui n'utilisent pas de méthode contraceptive, ou (2) dont la grossesse actuelle a été mal planifiée ou n'était pas désirée ou (3) qui sont en aménorrhée post-partum et dont la dernière naissance au cours des 2 dernières années était mal planifiée ou non désirée.

Besoins satisfaits en matière de planification familiale

Utilisation actuelle de contraceptifs (toutes méthodes)

Échantillon : Toutes les femmes de 15–49 ans, les femmes de 15–49 ans actuellement en union et les femmes de 15–49 ans célibataires sexuellement actives

Demande pour la planification familiale :

Besoins non satisfaits pour la planification familiale + besoins satisfaits (utilisation actuelle de la contraception (toutes méthodes))

Pourcentage de demande satisfaite :

$$\frac{\text{Utilisation actuelle de contraceptifs (toutes méthodes)}}{\text{Besoins non satisfaits + utilisation actuelle de la contraception (toutes méthode)}}$$

Pourcentage de demande satisfaite par des méthodes modernes :

$$\frac{\text{Utilisation actuelle de la contraception (toutes méthodes modernes)}}{\text{Besoins non satisfaits + utilisation actuelle de contraceptifs (toutes méthodes)}}$$

Dans l'ensemble, les résultats montrent que la proportion de femmes en union ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale s'élève à 25 % et, dans la majorité des cas (19 %), ces besoins sont orientés vers l'espacement (**Tableau 7.13.1** et **Graphique 7.6**).

La demande totale en planification familiale pour les femmes de 15–49 ans actuellement en union s'élève à 47 % dont 35 % orientés vers l'espacement et 13 % vers la limitation des naissances. Cette demande est satisfaite dans 47 % des cas et dans 44 % des cas par les méthodes modernes (**Tableau 7.13.1**).

Dans l'ensemble, on note que 20 % des femmes âgées de 15–49 ans ont des besoins non satisfaits en matière de planification familiale et 19 % ont des besoins satisfaits en matière de planification familiale (utilisation actuelle) (**Tableau 7.13.2**). La demande totale en planification familiale pour l'ensemble des femmes est de 40 %. Cette demande est satisfaite dans 49 % des cas et, en grande partie, par les méthodes modernes (46 %) (**Tableau 7.13.2**).

Graphique 7.6 Demande en matière de planification familiale

Répartition (en %) des femmes de 15–49 ans actuellement en union selon les besoins en matière de planification familiale



Tendances : La demande globale en planification familiale pour les femmes de 15–49 ans actuellement en union a fluctué de manière plus ou moins importante au fil des années. Estimée à 34 % en 1995–1996, puis à 38 % en 2001, elle se stabilise autour de 36 % entre 2006 et 2012–2013 puis elle commence à augmenter en 2018 (41 %) pour atteindre 47 % en 2023–2024 (**Graphique 7.7**).

Graphique 7.7 Tendances de la demande en matière de planification familiale

Pourcentage de femmes de 15–49 ans actuellement en union



Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Les besoins non satisfaits en planification familiale des femmes âgées de 15–49 ans actuellement en union varient selon le milieu de résidence. En effet, la proportion des femmes actuellement en union qui ont des besoins non satisfaits en PF est plus élevée en milieu rural (26 %) qu'en milieu urbain (21 %) (**Tableau 7.13.1**).

- Au niveau des régions, on note que les proportions de femmes en union ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale varient d'un minimum de 18 % dans la région de Tombouctou à un maximum de 32 % à Gao (**Carte 7.9**).

- Les proportions de femmes actuellement en union dont les besoins en planification familiale ne sont pas satisfaits diminuent avec l'augmentation du niveau d'instruction de la femme, de 27 % parmi celles n'ayant aucun niveau d'instruction à 21 % parmi celles ayant le niveau secondaire ou plus (**Tableau 7.13.1**).

Carte 7.2 Besoins non satisfaits en matière de planification familiale par région

Pourcentage de femmes de 15–49 ans actuellement en union dont les besoins en matière de planification familiale ne sont pas satisfaits



Note : Pour des raisons d'insécurité, les données de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région et ne sont pas présentées séparément.

- Les résultats selon le niveau de bien-être économique montrent que la proportion de femmes en union dont les besoins en planification familiale ne sont pas satisfaits a tendance à diminuer du quintile le plus bas au plus élevé, passant de 27 % à 23 % (**Graphique 7.8**).

Graphique 7.8 Besoins non satisfaits en matière de planification familiale par quintile de bien-être économique du ménage

Pourcentage de femmes de 15–49 ans actuellement en union dont les besoins en matière de planification familiale ne sont pas satisfaits



7.5.1 Prise de décision concernant la planification familiale et opinion sur son utilisation

Dans l'ensemble, les femmes actuellement en union sont impliquées dans la décision d'utilisation de la contraception dans 59 % des cas : dans 39 % des cas, c'est principalement la femme qui a pris la décision et dans 20 % des cas, c'est une décision conjointe de la femme et de son mari/partenaire. En outre, 8 % des femmes ont déclaré que leur opinion sur ce sujet est plus importante et 9 % que l'opinion du mari/partenaire et de la femme est d'égale importance. Cependant dans 40 % des cas, c'est le mari/partenaire qui a décidé (**Tableau 7.14**) et pour seulement 2 % des femmes, l'opinion de la femme compte moins que celle du mari/partenaire.

Le pourcentage des femmes en union qui participe à la prise de décision sur la planification familiale est plus important en milieu urbain (71 %) qu'en milieu rural (56 %) (**Tableau 7.15**). Cette proportion

augmente aussi avec le niveau d'instruction de la femme passant de 56 % parmi celles qui n'ont aucun d'instruction à 66 % parmi celles ayant le niveau d'instruction secondaire ou plus. De même, la proportion des femmes actuellement en union qui sont impliquées dans la prise de décision d'utilisation de la PF augmente avec le quintile de bien-être économique du ménage, passant de 52 % chez celles vivant dans un ménage du quintile le plus bas à 69 % chez celles dont le ménage est classé dans le quintile le plus élevé.

7.5.2 Pression exercée pour tomber enceinte et utilisation future de la contraception

Certaines femmes en union peuvent subir une pression de la part d'autres personnes pour tomber enceinte alors qu'elles ne le souhaitent pas. Pour cette raison, lors de l'enquête, on a demandé à toutes les femmes actuellement en union s'il était déjà arrivé que leur mari/partenaire ou un membre de leur famille fasse pression sur elles pour qu'elles tombent enceinte. On note qu'au Mali, 9 % des femmes âgées de 15–49 ans vivant en union ont déclaré avoir subi de la pression de la part de leur mari/partenaire ou d'un autre membre de la famille pour tomber enceinte (**Tableau 7.16**). Cette proportion est plus élevée parmi celles qui n'ont pas d'enfant (17 %) ; dans les régions de Kayes (12 %) et Ségou (10 %).

Lors de l'enquête, on a demandé aux femmes en union qui n'utilisaient pas la contraception au moment de l'enquête, si elles avaient l'intention d'utiliser une méthode dans l'avenir. Il ressort des résultats qu'un peu plus d'une femme sur deux en union non-utilisatrices de méthodes contraceptives ont déclaré ne pas avoir l'intention d'en utiliser une dans le futur (55 %) (**Tableau 7.17**). Par contre, 37 % des femmes non-utilisatrices d'une méthode ont déclaré avoir l'intention d'utiliser les méthodes de planification familiale dans le futur.

7.5.3 Exposition aux messages sur la planification familiale

Les résultats du **Tableau 7.18.1** présentent des informations concernant l'exposition des femmes aux messages sur la planification familiale véhiculés par certains médias ou par téléphone portable au cours des 12 mois précédant l'enquête. On note dans l'ensemble que 37 % des femmes ont été exposées aux messages sur la planification familiale par le biais de la radio, 31 % via la télévision, 13 % au cours de réunions ou évènements communautaires et 10 % par les médias sociaux (**Tableau 7.18.1**). Il est important de noter aussi que près d'une femme sur deux (49 %) âgée de 15–49 ans n'a été exposée à aucun des huit médias cités dans le **Tableau 7.18.1**.

Parmi les hommes de 15–49 ans, un peu plus de quatre sur dix (43 %) n'ont été exposés à aucun des huit media (**Tableau 7.18.2**). Cependant, 36 % ont entendu ou vu des messages spécifiques sur la planification familiale dans les 12 derniers mois via la radio, 32 % par la télévision et 19 % par les media sociaux (**Tableau 7.18.2**).

7.6 CONTACT DES NON-UTILISATRICES AVEC DES PRESTATAIRES DE PLANIFICATION FAMILIALE

Contact des non-utilisatrices avec des prestataires de planification familiale

L'enquêtée a parlé de planification familiale au cours des 12 mois précédant l'enquête avec un agent de santé ou lors d'une visite dans un établissement de santé.

Échantillon : Femmes de 15–49 ans qui n'utilisent actuellement aucune méthode contraceptive.

Dans l'ensemble, les résultats montrent que plus de huit femmes sur dix (84 %) non-utilisatrices de la contraception ont déclaré ne pas avoir parlé de planification familiale ni avec un agent de terrain ni dans un établissement de santé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête (**Tableau 7.19**). Seules 8 % des femmes non-utilisatrices de la planification familiale ont reçu la visite d'un agent de santé avec qui elles ont parlé de planification familiale. En outre, 13 % se sont rendues dans un établissement de santé au cours

des 12 derniers mois et ont parlé de planification familiale mais 34 % n'ont pas abordé le sujet (**Tableau 7.19**).

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- La proportion de femmes non-utilisatrices de la contraception qui n'ont pas parlé de planification familiale ni avec un agent de santé, ni dans un établissement de santé est plus importante parmi celles âgées de 15–19 ans (94 %) et plus faible (77 %) dans la tranche d'âge de 30–34 ans.

- S'agissant des résultats selon le milieu de résidence, on note que le pourcentage de femmes non-utilisatrices de la planification familiale n'ayant pas discuté de planification familiale dans un établissement sanitaire ou avec un agent de terrain est un peu plus élevée en milieu urbain (86 %) qu'en milieu rural (83 %). Cette proportion est de 87 % à Bamako contre 85 % dans les autres villes.

- Les résultats selon les régions de résidence montrent des variations importantes. En effet, la proportion de femmes non-utilisatrices des méthodes contraceptives n'ayant pas parlé de planification familiale, ni avec un agent de terrain, ni dans un établissement de santé varie d'un minimum de 78 % dans la région de Kayes à un maximum de 95 % dans celle de Tombouctou.

LISTE DES TABLEAUX

- **Tableau 7.1 Connaissance des méthodes contraceptives**
- **Tableau 7.2 Connaissance des méthodes contraceptives selon certaines caractéristiques sociodémographiques**
- **Tableau 7.3 Utilisation actuelle de la contraception selon l'âge**
- **Tableau 7.4 Utilisation actuelle de la contraception selon certaines caractéristiques sociodémographiques**
- **Tableau 7.5 Utilisation de DMPA-SC/Sayana Press**
- **Tableau 7.6 Utilisation de la contraception d'urgence**
- **Tableau 7.7 Connaissance de la période de fertilité**
- **Tableau 7.8 Connaissance de la période de fertilité par âge**
- **Tableau 7.9 Source d'approvisionnement des méthodes modernes de contraception**
- **Tableau 7.10 Choix informé de la méthode contraceptive**
- **Tableau 7.11 Taux de discontinuation des méthodes contraceptives sur 12 mois**
- **Tableau 7.12 Raisons de la discontinuation des méthodes contraceptives**
- **Tableau 7.13.1 Besoins et demande en matière de planification familiale parmi les femmes actuellement en union**
- **Tableau 7.13.2 Besoins et demande en matière de planification familiale parmi l'ensemble des femmes et parmi les femmes non en union sexuellement actives**
- **Tableau 7.14 Prise de décision concernant le recours à la planification familiale**
- **Tableau 7.15 Prise de décision concernant la planification familiale selon certaines caractéristiques sociodémographiques**
- **Tableau 7.16 Pression subie pour tomber enceinte**
- **Tableau 7.17 Utilisation future de la contraception**
- **Tableau 7.18.1 Exposition aux messages sur la planification familiale : Femme**
- **Tableau 7.18.2 Exposition aux messages sur la planification familiale : Homme**
- **Tableau 7.19 Contact des non-utilisatrices de la contraception avec des prestataires de planification familiale**

Tableau 7.1 Connaissance des méthodes contraceptives

Pourcentage de tous les enquêtés de 15–49 ans, pourcentage d'enquêtés de 15–49 ans actuellement en union et pourcentage d'enquêtés de 15–49 ans qui ne sont pas en union et qui sont sexuellement actifs qui ont entendu parler d'une méthode contraceptive, selon la méthode, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Femme			Homme		
Méthode	Ensemble des femmes	Femme actuellement en union	Femme non en union sexuellement active[1]	Ensemble des hommes	Homme actuellement en union	Homme non en union sexuellement actif[1]
N'importe quelle méthode	95,7	97,8	94,4	94,8	99,2	99,5
Une méthode moderne	95,6	97,7	94,4	94,5	99,1	99,5
Stérilisation féminine	53,9	59,2	51,3	43,7	56,5	41,4
Stérilisation masculine	25,4	27,7	23,8	28,4	36,0	28,7
DIU	64,2	70,6	60,3	29,2	38,6	27,2
Injectables	91,1	94,8	88,9	80,8	91,6	88,2
Implants	93,1	95,6	91,4	86,5	94,4	94,1
Pilule	89,5	93,6	88,4	80,1	90,3	88,9
Condom masculin	79,5	83,1	81,7	89,6	96,5	98,5
Condom féminin	43,4	46,8	43,2	45,2	55,6	50,4
Contraception d'urgence	33,7	36,2	42,5	29,2	37,6	36,5
Méthode des Jours Fixes (MJF)	49,6	55,4	47,7	33,9	47,0	35,8
Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA)	52,2	60,2	35,8	28,8	43,2	23,1
Autre méthode moderne	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	1,4
Une méthode traditionnelle	55,5	60,2	61,9	60,0	76,8	73,4
Méthode du rythme	45,7	49,1	50,3	39,2	52,8	48,7
Retrait	40,1	44,4	47,3	48,4	61,6	61,9
Autre méthode traditionnelle	9,2	11,0	6,8	10,0	15,9	4,6
Nombre moyen de méthodes connues par les enquêtés de 15–49 ans	7,7	8,3	7,6	6,7	8,2	7,3
Effectif d'enquêtés	17 347	13 237	387	6 686	3 512	341
Nombre moyen de méthodes connues par les enquêtés de 15–64	na	na	na	6,9	8,2	7,3
Effectif d'enquêtés	na	na	na	7 829	4 633	344

na = non applicable

[1] Sexuellement actif signifie que la personne a eu ses derniers rapports sexuels dans les 30 jours qui ont précédé l'enquête.

Tableau 7.2 Connaissance des méthodes contraceptives selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans, actuellement en union, qui ont entendu parler d'au moins une méthode contraceptive et pourcentage ayant entendu parler d'au moins une méthode contraceptive moderne, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Femme			Homme		
Caractéristique sociodémographique	A entendu parler d'au moins une méthode	A entendu parler d'au moins une méthode moderne[1]	Effectif	A entendu parler d'au moins une méthode	A entendu parler d'au moins une méthode moderne[1]	Effectif
Âge						
15–19	94,5	94,4	1 241	*	*	7
20–24	97,7	97,6	2 592	99,0	97,3	175
25–29	98,2	98,1	2 677	99,4	99,4	578
30–34	98,5	98,4	2 243	99,6	99,4	794
35–39	98,2	98,1	1 935	99,5	99,5	753
40–44	98,7	98,6	1 472	99,6	99,6	648
45–49	97,6	97,4	1 077	98,1	97,7	557
Résidence						
Bamako	99,6	99,6	1 553	100,0	100,0	503
Autre urbain	99,2	99,2	1 339	99,7	99,7	365
Ensemble urbain	99,4	99,4	2 892	99,9	99,9	868
Rural	97,4	97,3	10 345	99,0	98,8	2 644
Région						
Kayes	98,7	98,6	2 094	99,5	99,3	474
Koulikoro	98,6	98,4	3 130	99,2	98,8	884
Sikasso	97,9	97,9	2 558	99,2	99,2	689
Ségou	99,4	99,4	2 109	99,8	99,8	493
Mopti	96,9	96,8	1 230	97,7	97,7	298
Tombouctou	86,0	83,3	199	99,5	98,4	72
Gao	79,0	78,5	360	95,6	95,0	97
Kidal	†	†	5	†	†	2
Bamako	99,6	99,6	1 553	100,0	100,0	503
Niveau d'instruction						
Aucun	96,9	96,8	8 200	98,6	98,4	1 710
Primaire	98,7	98,6	2 167	99,6	99,0	679
Secondaire ou plus	99,7	99,7	2 870	100,0	100,0	1 123
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	97,8	97,6	2 720	99,3	99,0	708
Second	97,4	97,3	2 745	98,7	98,6	704
Moyen	96,7	96,5	2 692	98,6	98,4	636
Quatrième	98,0	97,9	2 642	99,4	99,1	718
Le plus élevé	99,5	99,5	2 438	100,0	100,0	747
Ensemble 15–49	97,8	97,7	13 237	99,2	99,1	3 512
50–64	na	na	na	99,0	98,4	1 121
Ensemble 15–64	na	na	na	99,2	98,9	4 633

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
na = non applicable
[1] Stérilisation féminine, stérilisation masculine, DIU, injectables, implants, pilule, condom masculin, condom féminin, contraception d'urgence, méthode des jours fixes (MJF), Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA) et d'autres méthodes modernes
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 7.3 Utilisation actuelle de la contraception selon l'âge

Répartition (en %) de l'ensemble des femmes de 15–49 ans, des femmes de 15–49 ans actuellement en union et des femmes de 15–49 ans non en union et sexuellement actives par méthode actuellement utilisée et selon l'âge, EDSM-VII Mali 2023–2024

			Méthode moderne											Méthode traditionnelle					
Âge	Une méthode	Une méthode moderne	Stérilisation féminine	DIU	Injectables	Implants	Pilule	Condom masculin	Contraception d'urgence	MJF	MAMA	Autre	Une méthode traditionnelle	Rythme	Retrait	Autre	N'utilise pas actuellement	Total	Effectif de femmes
ENSEMBLE DES FEMMES																			
15–19	7,4	6,8	0,0	0,0	1,3	4,5	0,3	0,4	0,1	0,1	0,3	0,0	0,6	0,3	0,0	0,2	92,6	100,0	3 862
20–24	20,3	18,8	0,0	0,3	5,1	11,3	1,5	0,2	0,1	0,0	0,2	0,0	1,5	0,6	0,2	0,7	79,7	100,0	3 378
25–29	22,2	20,9	0,0	0,4	5,7	11,6	2,3	0,1	0,1	0,1	0,7	0,0	1,3	0,9	0,0	0,4	77,8	100,0	2 905
30–34	25,7	24,3	0,5	1,0	6,1	13,3	2,7	0,2	0,0	0,2	0,4	0,0	1,4	0,7	0,0	0,7	74,3	100,0	2 382
35–39	26,3	25,0	1,4	1,2	5,4	11,5	4,2	0,2	0,2	0,1	0,7	0,0	1,3	0,5	0,1	0,8	73,7	100,0	2 065
40–44	24,1	22,7	2,4	1,8	4,9	10,4	2,4	0,4	0,0	0,3	0,1	0,0	1,4	0,4	0,3	0,7	75,9	100,0	1 586
45–49	15,8	14,7	2,8	2,1	1,4	6,7	1,5	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	1,1	0,4	0,0	0,8	84,2	100,0	1 169
Ensemble	19,2	18,1	0,7	0,7	4,2	9,7	1,9	0,2	0,1	0,1	0,4	0,0	1,2	0,5	0,1	0,6	80,8	100,0	17 347
FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION																			
15–19	11,2	10,3	0,0	0,0	2,6	6,4	0,6	0,1	0,0	0,2	0,4	0,0	0,9	0,4	0,0	0,5	88,8	100,0	1 241
20–24	22,0	20,4	0,0	0,2	6,0	11,8	1,9	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	1,6	0,5	0,2	0,9	78,0	100,0	2 592
25–29	22,1	21,0	0,0	0,4	5,8	11,6	2,3	0,0	0,0	0,1	0,6	0,0	1,1	0,6	0,0	0,5	77,9	100,0	2 677
30–34	25,7	24,2	0,5	1,0	6,1	13,1	2,8	0,1	0,0	0,2	0,4	0,0	1,5	0,7	0,0	0,7	74,3	100,0	2 243
35–39	26,7	25,5	1,5	1,3	5,7	11,5	4,4	0,0	0,2	0,1	0,7	0,1	1,2	0,4	0,1	0,7	73,3	100,0	1 935
40–44	24,9	23,5	2,3	1,9	5,2	10,8	2,5	0,4	0,0	0,3	0,1	0,0	1,4	0,3	0,3	0,8	75,1	100,0	1 472
45–49	16,3	15,1	2,7	2,3	1,4	7,1	1,5	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	1,2	0,4	0,0	0,8	83,7	100,0	1 077
Ensemble	22,2	20,9	0,8	0,9	5,1	10,9	2,4	0,1	0,0	0,1	0,4	0,0	1,3	0,5	0,1	0,7	77,8	100,0	13 237
FEMMES NON EN UNION SEXUELLEMENT ACTIVES[1]																			
15–19	32,8	30,8	0,0	0,6	5,3	18,5	1,0	3,8	1,0	0,0	0,0	0,6	1,9	1,3	0,7	0,0	67,2	100,0	166
20–24	43,0	39,3	0,0	1,0	7,2	26,5	2,0	0,6	2,1	0,0	0,0	0,0	3,7	2,7	0,0	1,0	57,0	100,0	101
25+	49,8	45,3	0,9	0,8	8,9	28,5	2,5	3,0	0,8	0,0	0,0	0,0	4,5	2,7	0,0	1,7	50,2	100,0	121
Ensemble	40,7	37,6	0,3	0,8	6,9	23,7	1,7	2,7	1,2	0,0	0,0	0,2	3,2	2,1	0,3	0,8	59,3	100,0	387

Note : Si plus d'une méthode est utilisée, seule la plus efficace est prise en compte dans ce tableau.
MJF = Méthode des Jours Fixes
MAMA = Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée
[1] Femmes qui ont eu leurs derniers rapports sexuels dans les 30 jours précédant l'enquête

Tableau 7.4 Utilisation actuelle de la contraception selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Répartition (en %) des femmes de 15–49 ans actuellement en union et des femmes de 15–49 ans non en union sexuellement actives par méthode contraceptive actuellement utilisée, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

			Méthode moderne											Méthode traditionnelle					
Caractéristique sociodémographique	Une méthode	Une méthode moderne	Stérilisation féminine	DIU	Injectables	Implants	Pilule	Condom masculin	Contraception d'urgence	MJF	MAMA	Autre	Une méthode traditionnelle	Rythme	Retrait	Autre	N'utilise pas actuellement	Total	Effectif de femmes
									FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION										
Nombre d'enfants vivants																			
0	2,2	2,1	0,1	0,0	0,7	0,9	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	97,8	100,0	1 165
1–2	20,7	19,2	0,3	0,4	4,8	11,3	1,8	0,2	0,0	0,1	0,4	0,0	1,4	0,6	0,1	0,8	79,3	100,0	4 042
3–4	24,9	23,4	0,6	1,0	5,9	12,2	3,0	0,0	0,1	0,1	0,5	0,0	1,5	0,7	0,2	0,6	75,1	100,0	3 796
5+	26,6	25,4	1,6	1,6	6,1	12,2	3,0	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	1,3	0,3	0,1	0,9	73,4	100,0	4 234
Résidence																			
Bamako	32,7	29,9	1,0	2,4	5,0	14,2	5,1	0,6	0,2	0,1	1,3	0,0	2,8	1,4	0,5	0,9	67,3	100,0	1 553
Autre urbain	26,7	25,7	0,6	1,1	6,2	12,7	4,8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	1,0	0,4	0,2	0,5	73,3	100,0	1 339
Ensemble urbain	29,9	28,0	0,8	1,8	5,5	13,5	4,9	0,4	0,1	0,1	0,8	0,0	2,0	0,9	0,3	0,7	70,1	100,0	2 892
Rural	20,0	18,9	0,8	0,6	5,0	10,2	1,7	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	1,1	0,4	0,0	0,7	80,0	100,0	10 345
Région																			
Kayes	20,1	18,7	0,4	0,7	5,0	10,1	1,3	0,1	0,0	0,3	0,8	0,1	1,3	0,8	0,2	0,4	79,9	100,0	2 094
Koulikoro	24,6	23,5	0,5	0,9	5,8	13,5	2,4	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	1,1	0,5	0,0	0,6	75,4	100,0	3 130
Sikasso	22,0	20,4	1,1	0,8	5,4	11,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	1,6	0,3	0,0	1,3	78,0	100,0	2 558
Ségou	23,5	22,6	1,4	0,6	6,2	10,6	3,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,9	0,2	0,0	0,8	76,5	100,0	2 109
Mopti	12,5	12,1	0,4	0,4	3,4	5,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,1	0,3	87,5	100,0	1 230
Tombouctou	7,7	7,1	0,0	0,2	1,7	2,5	1,8	0,1	0,3	0,1	0,6	0,0	0,6	0,3	0,2	0,0	92,3	100,0	199
Gao	2,9	2,7	0,0	0,1	1,0	0,7	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	97,1	100,0	360
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	100,0	5
Bamako	32,7	29,9	1,0	2,4	5,0	14,2	5,1	0,6	0,2	0,1	1,3	0,0	2,8	1,4	0,5	0,9	67,3	100,0	1 553
Niveau d'instruction																			
Aucun	18,3	17,3	0,9	0,7	4,2	9,1	1,8	0,1	0,0	0,1	0,4	0,0	1,1	0,3	0,1	0,7	81,7	100,0	8 200
Primaire	25,0	23,8	0,6	0,5	6,8	12,5	2,4	0,1	0,0	0,2	0,6	0,0	1,2	0,5	0,1	0,6	75,0	100,0	2 167
Secondaire ou plus	31,0	28,9	0,5	1,8	6,5	15,0	4,0	0,3	0,2	0,2	0,4	0,1	2,1	1,2	0,3	0,5	69,0	100,0	2 870
Quintile de bien-être économique																			
Le plus bas	17,9	17,0	1,0	0,6	4,8	9,9	0,5	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,9	0,1	0,0	0,7	82,1	100,0	2 720
Second	18,4	17,5	0,9	0,3	5,0	9,5	0,9	0,0	0,0	0,1	0,7	0,0	0,9	0,4	0,0	0,5	81,6	100,0	2 745
Moyen	19,8	18,6	0,7	0,4	4,9	10,2	1,9	0,1	0,0	0,1	0,4	0,0	1,2	0,4	0,0	0,8	80,2	100,0	2 692
Quatrième	26,0	24,3	0,6	1,1	5,8	11,7	4,2	0,3	0,0	0,1	0,4	0,1	1,7	0,8	0,1	0,8	74,0	100,0	2 642
Le plus élevé	29,6	27,8	0,7	2,3	5,2	13,8	4,8	0,2	0,2	0,1	0,5	0,0	1,8	0,9	0,3	0,6	70,4	100,0	2 438
Ensemble	22,2	20,9	0,8	0,9	5,1	10,9	2,4	0,1	0,0	0,1	0,4	0,0	1,3	0,5	0,1	0,7	77,8	100,0	13 237

À suivre...

Tableau 7.4—*Suite*

Caractéristique sociodémographique	Une méthode	Une méthode moderne	Méthode moderne										Une méthode tradition-nelle	Méthode traditionnelle			N'utilise pas actuelle-ment	Total	Effectif de femmes
			Stérili-sation féminine	DIU	Injec-tables	Implants	Pilule	Condom masculin	Contra-ception d'ur-gence	MJF	MAMA	Autre		Rythme	Retrait	Autre			
FEMME NON EN UNION SEXUELLEMENT ACTIVE[1]																			
Résidence																			
Bamako	45,3	41,5	0,0	3,4	5,4	24,0	3,2	4,6	1,1	0,0	0,0	0,0	3,8	2,6	1,2	0,0	54,7	100,0	87
Autre urbain	40,1	37,5	0,0	0,0	8,0	22,3	4,8	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,9	0,0	1,7	59,9	100,0	57
Ensemble urbain	43,3	39,9	0,0	2,0	6,4	23,3	3,8	3,7	0,6	0,0	0,0	0,0	3,3	1,9	0,8	0,7	56,7	100,0	144
Rural	39,2	36,1	0,4	0,0	7,2	23,9	0,5	2,1	1,5	0,0	0,0	0,4	3,1	2,2	0,0	0,9	60,8	100,0	243
Ensemble	40,7	37,6	0,3	0,8	6,9	23,7	1,7	2,7	1,2	0,0	0,0	0,2	3,2	2,1	0,3	0,8	59,3	100,0	387

Note : Si plus d'une méthode est utilisée, seule la plus efficace est prise en compte dans ce tableau.
DIU = Dispositif intra-utérin
MJF = Méthode des Jours Fixes
MAMA = Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée
[1] Femmes qui ont eu leur dernier rapports sexuels dans les 30 jours précédant l'enquête
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 7.5 Utilisation de DMPA-SC/Sayana Press

Pourcentage d'utilisatrices actuelles d'injectables de 15–49 ans qui utilisent le DMPA-SC/Sayana Press ; parmi les femmes utilisant le DMPA-SC/Sayana Press, répartition (en %) par la personne qui a administré l'injection la dernière fois, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

			Parmi les utilisatrices de DMPA-SC/Sayana Press, personne ayant administré l'injection la dernière fois :			
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage utilisant DMPA-SC/Sayana Press	Effectif de femmes utilisant des injectables	Injection auto-administrée	Injection effectuée par prestataire de santé	Total	Effectif de femmes
Âge						
15–19	26,5	49	*	*	100,0	13
20–24	23,3	172	(9,2)	(90,8)	100,0	40
25–29	23,3	165	(0,0)	(100,0)	100,0	38
30–34	15,8	144	*	*	100,0	23
35–39	15,1	111	*	*	100,0	17
40–44	17,8	78	*	*	100,0	14
45–49	*	16	*	*	100,0	1
Résidence						
Bamako	30,7	96	(0,0)	(100,0)	100,0	29
Autre urbain	22,2	94	*	*	100,0	21
Ensemble urbain	26,5	189	1,6	98,4	100,0	50
Rural	17,5	547	4,2	95,8	100,0	96
Région						
Kayes	18,1	115	*	*	100,0	21
Koulikoro	21,4	186	(0,0)	(100,0)	100,0	40
Sikasso	15,6	146	*	*	100,0	23
Ségou	20,9	136	*	*	100,0	28
Mopti	9,4	48	*	*	100,0	5
Tombouctou	(9,0)	5	*	*	100,0	0
Gao	*	5	*	*	0,0	0
Kidal	†	0	†	†	0,0	0
Bamako	30,7	96	(0,0)	(100,0)	100,0	29
Niveau d'instruction						
Aucun	14,9	360	2,0	98,0	100,0	54
Primaire	18,5	155	*	*	100,0	29
Secondaire ou plus	28,9	221	3,8	96,2	100,0	64
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	15,2	135	*	*	100,0	21
Second	14,0	144	*	*	100,0	20
Moyen	19,5	143	(8,4)	(91,6)	100,0	28
Quatrième	21,5	164	(4,7)	(95,3)	100,0	35
Le plus élevé	28,2	150	(1,9)	(98,1)	100,0	42
Ensemble	19,8	737	3,3	96,7	100,0	146

Note : Subcutaneous (SC) depot medroxyprogesterone acétate (DMPA) ou Acétate de médroxyprogestérone par voie sous-cutanée ou Depo-Provera est un contraceptif auto injectable ; il est commercialisé sous la marque Sayana Press. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 7.6 Utilisation de la contraception d'urgence

Pourcentage de femmes de 15–49 ans qui ont utilisé la contraception d'urgence dans les 12 derniers mois, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant utilisé la contraception d'urgence	Effectif de femmes
Âge		
15–19	0,4	3 862
20–24	1,0	3 378
25–29	1,8	2 905
30–34	1,7	2 382
35–39	1,3	2 065
40–44	1,3	1 586
45–49	0,6	1 169
Résidence		
Bamako	1,0	2 675
Autre urbain	1,2	2 048
Ensemble urbain	1,1	4 723
Rural	1,2	12 624
Région		
Kayes	1,4	2 635
Koulikoro	1,2	4 018
Sikasso	1,3	3 143
Ségou	1,6	2 574
Mopti	0,3	1 530
Tombouctou	0,8	281
Gao	0,0	485
Kidal	†	6
Bamako	1,0	2 675
Niveau d'instruction		
Aucun	0,9	9 382
Primaire	1,3	2 926
Secondaire ou plus	1,6	5 039
Quintile de bien-être économique		
Le plus bas	1,4	3 036
Second	1,2	3 143
Moyen	0,8	3 318
Quatrième	1,1	3 676
Le plus élevé	1,2	4 174
Ensemble	1,1	17 347

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 7.7 Connaissance de la période de fertilité

Répartition (en %) des utilisatrices de la méthode du rythme, des utilisatrices de la MJF et de l'ensemble des femmes de 15–49 ans par connaissance de la période de fertilité pendant le cycle menstruel, EDSM-VII Mali 2023–2024

A situé la période fertile :	Utilisatrice de la méthode du rythme	Ensemble des femmes
Juste avant le début des règles	5,8	4,2
Pendant les règles	1,2	1,4
Juste après la fin des règles	35,7	44,5
Au milieu de deux cycles menstruels	51,6	27,2
Pas de moment spécifique	1,2	11,7
Ne sait pas	4,4	11,0
Total	100,0	100,0
Effectif de femmes	93	17 347

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
MJF = Méthode des Jours Fixes

Tableau 7.8 Connaissance de la période de fertilité par âge

Pourcentage de femmes de 15–49 ans qui savent situer correctement la période de fertilité pendant le cycle ovulatoire, selon l'âge, EDSM-VII Mali 2023–2024

Âge	Pourcentage sachant situer correctement la période de fertilité	Effectif de femmes
15–19	19,0	3 862
20–24	28,3	3 378
25–29	29,1	2 905
30–34	32,0	2 382
35–39	28,5	2 065
40–44	30,3	1 586
45–49	29,8	1 169
Ensemble	27,2	17 347

Note : Une connaissance correcte de la période de fertilité est définie ainsi : "Au milieu de deux cycles menstruels."

Tableau 7.9 Source d'approvisionnement des méthodes modernes de contraception

Répartition (en %) des utilisatrices de méthodes modernes de contraception, âgées de 15–49 ans, par source d'approvisionnement la plus récente, selon la méthode, EDSM-VII Mali 2023–2024

Source de la méthode	Stérilisation féminine	Stérilisation masculine	DIU	Injectables	Implants	Pilules	Condom masculin	Ensemble
Secteur médical public	**87,6**	*	**77,4**	**76,5**	**87,6**	**29,9**	**(4,1)**	**76,6**
Hôpital national	10,6	*	0,7	0,2	0,2	0,0	(0,0)	0,6
Hôpital régional	6,8	*	0,0	0,6	0,6	0,0	(0,0)	0,8
Centre de santé de référence	33,9	*	34,1	6,5	11,1	3,6	(0,9)	10,7
Centre de santé communautaire	36,3	*	39,7	54,7	69,8	22,2	(3,1)	57,2
Dispensaire/maternité	0,0	*	2,1	6,9	3,6	1,3	(0,0)	3,9
Infirmerie de garnison militaire	0,0	*	0,8	0,3	0,3	0,0	(0,0)	0,3
Centre médicaux inter-entreprises (CMIE/INPS)	0,0	*	0,0	0,0	0,1	0,0	(0,0)	0,0
Agent de santé communautaire (ASC)/relais	0,0	*	0,0	7,2	1,8	2,9	(0,0)	3,1
Autre secteur public	0,0	*	0,0	0,0	0,2	0,0	(0,0)	0,1
Secteur médical privé	**9,4**	*	**21,3**	**17,9**	**10,9**	**44,5**	**(73,7)**	**17,8**
Hôpital/clinique privé	8,4	*	18,4	6,3	7,1	1,3	(0,0)	6,7
Centre confessionnel	0,0	*	0,0	0,0	0,2	0,0	(0,0)	0,1
Cabinet médical	0,0	*	2,1	2,0	1,5	0,3	(0,0)	1,4
Cabinet de soin privé	1,0	*	0,8	3,5	1,8	0,5	(0,0)	2,0
Pharmacie	0,0	*	0,0	6,1	0,3	42,3	(71,2)	7,6
Autre secteur médical privé	0,0	*	0,0	0,0	0,0	0,0	(2,5)	0,0
Secteur médical (ONG)	**1,5**	*	**0,0**	**1,1**	**0,7**	**0,8**	**(3,0)**	**0,9**
Hôpital ONG	0,0	*	0,0	0,3	0,0	0,0	(0,0)	0,1
Clinique ONG	1,5	*	0,0	0,7	0,6	0,8	(3,0)	0,7
Autre secteur médical ONG	0,0	*	0,0	0,1	0,1	0,0	(0,0)	0,1
Autre source	**0,0**	*	**1,2**	**4,5**	**0,7**	**24,8**	**(19,1)**	**4,7**
Boutique	0,0	*	0,0	0,0	0,0	7,9	(10,7)	1,0
Kiosque/tablier	0,0	*	0,0	0,2	0,0	0,9	(0,0)	0,1
Vendeur ambulant	0,0	*	1,2	0,5	0,0	14,6	(0,0)	1,8
Amis/parents	0,0	*	0,0	3,8	0,7	1,3	(8,4)	1,7
Autre	0,0	*	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,0)	0,0
Ne sait pas	1,6	*	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,0)	0,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes	113	1	127	737	1 689	334	38	3 071

Note : L'ensemble inclut 2 utilisatrices de condom féminin, 13 utilisatrices de la contraception d'urgence, 17 utilisatrices de la MJF et 2 utilisatrices d'autres méthodes modernes mais exclut la Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA). Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
MJF = Méthode des Jours Fixes
ONG = Organisation non gouvernementale

Tableau 7.10 Choix informé de la méthode contraceptive

Parmi les utilisatrices actuelles de certaines méthodes modernes, âgées de 15–49 ans, dont la dernière période d'utilisation d'une méthode a commencé dans les 5 années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant été informé de possibles effets secondaires ou de problèmes liés à cette méthode, pourcentage ayant été informé sur ce qu'il fallait faire si elles ressentaient des effets secondaires, pourcentage ayant été informé sur l'existence d'autres méthodes qu'elles pourraient utiliser, pourcentage ayant reçu les 3 types d'information, et pourcentage ayant été informé qu'elles pouvaient changer pour une autre méthode si elles le voulaient ou si elles en avaient besoin, selon la méthode et la source initiale de la méthode, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Parmi les femmes dont la dernière période d'utilisation d'une méthode moderne a commencé dans les 5 années ayant précédé l'enquête :						
Méthode/source	Pourcentage ayant été informé de possibles effets secondaires ou de problèmes liés à la méthode utilisée	Pourcentage ayant été informé de ce qu'il fallait faire en cas d'effets secondaires	Pourcentage ayant été informé d'autres méthodes qui pourraient être utilisées	Pourcentage ayant reçu les trois types d'informations (Indice information méthode)[1]	Effectif de femmes	Pourcentage ayant été informé qu'elles pouvaient changer pour une autre méthode si elles le souhaitaient ou si elles en avaient besoin	Effectif de femmes[2]
Méthode							
Stérilisation féminine	(43,1)	(49,8)	(48,6)	(35,3)	60	na	na
DIU	65,3	69,8	77,1	59,1	94	77,6	94
Injectables	56,6	58,3	61,9	48,5	710	61,1	710
Implants	66,5	68,3	67,9	55,5	1 568	67,9	1 568
Pilule	34,1	30,8	40,3	26,3	318	40,2	318
Source initiale de la méthode[3]							
Secteur médical public	**63,7**	**65,9**	**67,7**	**54,2**	**2 115**	**67,3**	**2 064**
Hôpital national	*	*	*	*	7	*	5
Hôpital régional	*	*	*	*	18	*	14
Centre de santé de référence	65,9	70,5	72,6	55,0	272	77,2	258
Centre de santé communautaire	63,9	66,2	67,5	54,9	1 601	66,4	1 572
Dispensaire/maternité	68,9	69,8	72,6	58,3	116	73,7	116
Infirmerie de garnison militaire	*	*	*	*	8	*	8
Centre médicaux inter-entreprises (CMIE/INPS)	*	*	*	*	1	*	1
Agent de santé communautaire (ASC)/relais	41,9	41,6	46,0	30,2	88	40,1	88
Autre secteur public	*	*	*	*	2	*	2
Secteur médical privé	**50,2**	**49,5**	**51,6**	**39,0**	**494**	**53,4**	**486**
Hôpital/clinique privé	57,2	58,2	62,3	47,1	193	63,5	185
Centre confessionnel	*	*	*	*	3	*	3
Cabinet médical	(70,7)	(65,1)	(53,9)	(48,5)	41	(62,0)	41
Cabinet de soin privé	(72,5)	(69,1)	(69,9)	(62,5)	57	(69,4)	57
Pharmacie	33,1	29,9	35,6	23,4	184	38,7	184
Autre secteur médical privé	*	*	*	*	17	*	17
Secteur médical (ONG)	*	*	*	*	**26**	*	**24**
Hôpital ONG	*	*	*	*	3	*	3
Clinique ONG	*	*	*	*	19	*	17
Autre secteur médical ONG	*	*	*	*	4	*	4
Autre source	**26,2**	**22,5**	**28,6**	**21,0**	**116**	**29,6**	**116**
Boutique	*	*	*	*	23	*	23
Kiosque/tablier	*	*	*	*	3	*	3
Vendeur ambulant	(19,6)	(14,1)	(24,5)	(12,1)	51	(28,4)	51
Amis/parents	(48,3)	(44,7)	(49,2)	(42,7)	38	(47,1)	38
Ne sait pas	*	*	*	*	1	*	0
Ensemble	59,6	61,0	63,1	50,0	2 751	63,2	2 690

Note : Le tableau n'inclut que les méthodes figurant sur la liste. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
na = non applicable
ONG = Organisation non gouvernementale
[1] L'indice d'information sur la méthode est le pourcentage de femmes qui ont été informées : (1) sur les effets secondaires ou problèmes liés à la méthode utilisée, (2) sur ce qu'il fallait faire si des effets secondaires étaient ressentis, et (3) sur d'autres méthodes qui pourraient être utilisées.
[2] Non compris les femmes qui sont stérilisées
[3] Source au moment où a commencé l'épisode d'utilisation de la méthode actuelle

Tableau 7.11 Taux de discontinuation des méthodes contraceptives sur 12 mois

Parmi les épisodes d'utilisation contraceptive ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête, pourcentage d'épisodes discontinués dans les 12 mois, selon la raison de discontinuation et de la méthode, EDSM-VII Mali 2023–2024

Méthode	Échec de la méthode	Souhaitait tomber enceinte	Autres raisons liées à la fécondité[1]	Changement du flux menstruel	Autres effets secondaires/problèmes de santé	Souhaitait une méthode plus efficace	Autres raisons liées à la méthode[2]	Mari/partenaire désapprouvait	Autres raisons[3]	N'importe quelle raison[4]	A changé pour une autre méthode[5]	Nombre d'épisodes d'utilisation[6]
DIU	(0,4)	(6,1)	(2,0)	(1,3)	(6,0)	(1,2)	(0,0)	(1,1)	(0,9)	(19,1)	(3,3)	191
Injectables	1,2	19,3	3,9	8,8	12,1	2,9	2,2	4,4	3,4	58,2	2,0	1 711
Implants	0,5	6,2	0,8	2,7	5,1	1,2	0,2	2,8	1,1	20,4	0,7	2 775
Pilule	3,7	16,2	5,9	2,2	7,3	4,1	2,5	3,1	3,6	48,5	3,5	930
Autre[7]	4,0	10,4	1,1	3,0	0,9	3,2	1,5	2,8	4,7	31,5	4,4	676
Toutes les méthodes	1,5	11,6	2,4	4,2	6,9	2,3	1,2	3,2	2,5	35,9	1,9	6 282

Note : Les valeurs sont basées sur des calculs de table de survie en utilisant les informations sur les épisodes d'utilisation qui ont eu lieu 3–62 mois avant l'enquête. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.

[1] Comprend rapports sexuels peu fréquents/mari absent, difficulté à tomber enceinte/ménopause et dissolution de l'union/séparation

[2] Comprend difficultés d'accès/trop éloigné, coût trop élevé et utilisation pas pratique

[3] Comprend ce que Dieu veut/fataliste et autres raisons

[4] Les raisons de la discontinuation sont mutuellement exclusives et leur somme correspond au total figurant dans cette colonne.

[5] On considère qu'une femme a changé de méthode si elle a utilisé une méthode différente dans le mois qui a suivi la discontinuation ou si elle a donné comme raison de discontinuation qu'elle "souhaitait une méthode plus efficace" et qu'elle a commencé à utiliser une autre méthode dans les deux mois qui ont suivi la discontinuation.

[6] Tous les épisodes d'utilisation qui ont eu lieu dans les 5 ans ayant précédé l'enquête sont inclus. Les épisodes d'utilisation incluent les épisodes qui ont été discontinués pendant la période d'observation ainsi que les épisodes d'utilisation qui n'ont pas été discontinués durant la période d'observation.

[7] Y compris la Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA), stérilisation féminine, stérilisation masculine, condom masculin, condom féminin, contraception d'urgence, Méthode des Jours Fixes, autre méthode moderne, rythme, retrait, et autre méthode traditionnelle

Tableau 7.12 Raisons de la discontinuation des méthodes contraceptives

Répartition (en %) des discontinuations de méthodes contraceptives dans les 5 années ayant précédé l'enquête par raison principale de discontinuation, selon la méthode spécifique, EDSM-VII Mali 2023–2024

Raison	DIU	Injectables	Implants	Pilule	Rythme	Autre[1]	Ensemble des méthodes
Est tombée enceinte pendant l'utilisation	0,0	2,1	1,8	7,2	19,3	8,5	3,6
Voulait tomber enceinte	46,4	42,2	49,9	44,0	49,3	37,0	45,4
Mari/partenaire désapprouvait	4,5	6,5	10,4	6,0	6,2	6,3	7,8
Souhaitait une méthode plus efficace	6,3	5,0	3,0	7,3	11,7	7,6	5,0
Changement du flux menstruel	6,9	12,3	9,2	3,1	1,2	10,4	8,9
Autres effets secondaires/ problèmes de santé	26,9	17,5	17,3	14,8	0,0	4,7	16,0
Manque d'accès/trop éloigné	0,0	1,8	0,1	1,3	0,0	0,8	0,9
Coûte trop cher	0,0	1,8	0,0	0,5	0,0	0,0	0,7
Pas pratique à utiliser	0,0	0,3	0,3	2,0	0,0	3,1	0,8
Cela dépend de Dieu/fataliste	0,0	0,7	0,8	0,5	0,0	0,0	0,6
Difficultés pour tomber enceinte/ ménopause	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1
Rapports sexuels peu fréquents/ mari éloigné	6,9	5,3	2,5	8,0	7,1	6,4	4,9
Dissolution de l'union/séparation	0,0	0,2	0,2	0,4	0,0	0,6	0,2
Autre	2,2	3,7	4,1	3,6	2,7	13,5	4,5
Ne sait pas	0,0	0,5	0,4	1,2	2,6	1,2	0,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nombre de discontinuations	107	1 211	1 497	708	70	273	3 867

[1] Y compris stérilisation féminine, stérilisation masculine, condom masculin, condom féminin, contraception d'urgence, méthode des jours fixes, la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA), autre méthode moderne, retrait, et autre méthode traditionnelle

Tableau 7.13.1 Besoins et demande en matière de planification familiale parmi les femmes actuellement en union

Pourcentage de femmes de 15–49 ans, actuellement en union, ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, pourcentage dont les besoins en matière de planification familiale sont satisfaits, demande totale en planification familiale, pourcentage de la demande en planification familiale qui est satisfaite, et pourcentage de demande satisfaite par des méthodes modernes, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Besoins non satisfaits en matière de planification familiale			Besoins satisfaits en matière de planification familiale (Utilisation actuelle)			Demande totale en planification familiale[1]			Effectif de femmes	Pourcentage de demande satisfaite[2]	Pourcentage de demande satisfaite par des méthodes modernes[3]
	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total			
Âge												
15–19	20,7	0,4	21,0	11,2	0,0	11,2	31,8	0,4	32,2	1 241	34,7	31,9
20–24	23,9	0,4	24,3	21,7	0,3	22,0	45,6	0,7	46,3	2 592	47,5	44,0
25–29	23,8	1,5	25,2	20,9	1,1	22,1	44,7	2,6	47,3	2 677	46,6	44,4
30–34	19,9	3,8	23,7	19,9	5,8	25,7	39,8	9,6	49,4	2 243	52,0	49,1
35–39	17,3	11,9	29,2	14,6	12,2	26,7	31,9	24,1	56,0	1 935	47,8	45,6
40–44	10,3	19,0	29,3	5,0	19,9	24,9	15,3	39,0	54,2	1 472	45,9	43,3
45–49	3,2	17,7	20,9	2,2	14,1	16,3	5,4	31,8	37,3	1 077	43,8	40,6
Résidence												
Bamako	14,2	6,7	20,9	23,3	9,4	32,7	37,5	16,0	53,5	1 553	61,0	55,9
Autre urbain	17,3	4,5	21,8	19,8	7,0	26,7	37,1	11,4	48,5	1 339	55,1	53,0
Ensemble urbain	15,6	5,6	21,3	21,7	8,3	29,9	37,3	13,9	51,2	2 892	58,4	54,6
Rural	19,6	6,5	26,2	14,1	5,9	20,0	33,7	12,5	46,2	10 345	43,3	40,9
Région												
Kayes	16,8	7,2	24,0	13,4	6,6	20,1	30,2	13,8	44,1	2 094	45,5	42,5
Koulikoro	19,1	5,6	24,7	18,3	6,3	24,6	37,5	11,8	49,3	3 130	49,9	47,6
Sikasso	17,4	6,2	23,6	15,7	6,4	22,0	33,1	12,6	45,7	2 558	48,3	44,8
Ségou	22,4	7,3	29,6	15,6	7,9	23,5	38,0	15,2	53,1	2 109	44,2	42,5
Mopti	21,3	6,5	27,8	9,3	3,2	12,5	30,6	9,6	40,2	1 230	31,0	30,2
Tombouctou	13,8	4,3	18,2	7,4	0,3	7,7	21,2	4,7	25,9	199	29,8	27,6
Gao	28,4	3,4	31,8	2,4	0,5	2,9	30,8	3,9	34,7	360	8,3	7,6
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	†	†	5	†	†
Bamako	14,2	6,7	20,9	23,3	9,4	32,7	37,5	16,0	53,5	1 553	61,0	55,9
Niveau d'instruction												
Aucun	18,7	8,2	26,9	11,2	7,1	18,3	29,9	15,3	45,2	8 200	40,6	38,2
Primaire	19,5	4,9	24,4	19,4	5,6	25,0	38,9	10,5	49,4	2 167	50,6	48,2
Secondaire ou plus	18,2	2,3	20,5	25,9	5,1	31,0	44,1	7,4	51,5	2 870	60,2	56,2
Quintile de bien-être économique												
Le plus bas	19,9	7,5	27,4	11,1	6,8	17,9	31,0	14,3	45,3	2 720	39,5	37,5
Second	17,7	7,8	25,5	12,0	6,4	18,4	29,8	14,2	43,9	2 745	42,0	39,9
Moyen	19,5	5,5	25,0	14,4	5,4	19,8	33,9	11,0	44,9	2 692	44,2	41,5
Quatrième	19,4	5,4	24,8	19,8	6,2	26,0	39,2	11,5	50,7	2 642	51,2	47,8
Le plus élevé	17,0	5,5	22,5	22,2	7,4	29,6	39,2	12,9	52,1	2 438	56,9	53,4
Ensemble	18,7	6,4	25,1	15,7	6,4	22,2	34,5	12,8	47,3	13 237	46,9	44,2

Note : Les valeurs figurant dans ce tableau sont basées sur la définition révisée des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, décrite dans Bradley et al.,2012.

[1] La demande totale équivaut à la somme des besoins non satisfaits et des besoins satisfaits.

[2] Le pourcentage de demande satisfaite équivaut aux besoins satisfaits divisés par la demande totale.

[3] Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine, la stérilisation masculine, le DIU, les injectables, les implants, la pilule, le condom masculin, le condom féminin, la contraception d'urgence, la méthode des jours fixes (MJF), la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA) et d'autres méthodes modernes.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 7.13.2 Besoins et demande en matière de planification familiale pour l'ensemble des femmes et pour les femmes non en union sexuellement actives

Pourcentage de toutes les femmes de 15–49 ans et de femmes de 15–49 ans, non en union sexuellement actives, ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, pourcentage dont les besoins en matière de planification familiale sont satisfaits, demande totale en planification familiale, pourcentage de la demande en planification familiale qui est satisfaite, et pourcentage de demande satisfaite par des méthodes moderne, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Besoins non satisfaits en matière de planification familiale			Besoins satisfaits en matière de planification familiale (Utilisation actuelle)			Demande totale en planification familiale[1]			Effectif de femmes	Pourcentage de demande satisfaite[2]	Pourcentage de demande satisfaite par des méthodes modernes[3]
	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total			
Âge												
15–19	9,6	0,2	9,8	7,3	0,1	7,4	16,9	0,3	17,2	3 862	43,0	39,7
20–24	19,9	0,4	20,2	19,9	0,4	20,3	39,8	0,7	40,5	3 378	50,1	46,4
25–29	22,8	1,4	24,1	21,1	1,1	22,2	43,9	2,5	46,4	2 905	47,9	45,1
30–34	19,1	3,6	22,7	19,9	5,8	25,7	39,0	9,4	48,4	2 382	53,1	50,3
35–39	16,7	11,2	27,8	14,4	11,8	26,3	31,1	23,0	54,1	2 065	48,5	46,2
40–44	9,9	17,8	27,7	5,1	19,0	24,1	15,0	36,8	51,8	1 586	46,6	43,9
45–49	3,1	16,3	19,4	2,1	13,6	15,8	5,2	30,0	35,2	1 169	44,8	41,6
Résidence												
Bamako	10,1	3,9	14,0	18,7	5,9	24,5	28,7	9,8	38,5	2 675	63,7	58,0
Autre urbain	12,8	3,1	15,9	16,1	4,7	20,8	28,9	7,7	36,7	2 048	56,7	54,0
Ensemble urbain	11,3	3,5	14,8	17,6	5,3	22,9	28,8	8,9	37,7	4 723	60,8	56,3
Rural	17,1	5,4	22,5	12,8	5,1	17,9	29,9	10,5	40,4	12 624	44,2	41,8
Région												
Kayes	14,4	5,8	20,2	12,8	5,6	18,3	27,2	11,3	38,5	2 635	47,6	44,7
Koulikoro	15,8	4,3	20,1	16,0	5,1	21,1	31,8	9,5	41,3	4 018	51,2	48,7
Sikasso	15,2	5,1	20,3	13,9	5,3	19,2	29,1	10,4	39,5	3 143	48,5	44,7
Ségou	19,5	6,0	25,5	14,3	6,7	21,0	33,8	12,7	46,5	2 574	45,2	43,5
Mopti	17,8	5,2	23,1	8,5	2,6	11,1	26,4	7,8	34,2	1 530	32,5	31,8
Tombouctou	10,7	3,1	13,8	7,3	0,2	7,5	18,0	3,4	21,3	281	35,4	32,3
Gao	25,8	3,6	29,4	2,8	0,3	3,1	28,6	4,0	32,5	485	9,6	9,1
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	†	†	6	†	†
Bamako	10,1	3,9	14,0	18,7	5,9	24,5	28,7	9,8	38,5	2 675	63,7	58,0
Niveau d'instruction												
Aucun	17,2	7,2	24,4	10,5	6,5	17,0	27,7	13,6	41,4	9 382	41,0	38,7
Primaire	15,9	3,7	19,6	16,5	4,5	20,9	32,4	8,2	40,5	2 926	51,6	49,1
Secondaire ou plus	12,2	1,4	13,6	19,4	3,1	22,5	31,6	4,4	36,0	5 039	62,4	57,8
Quintile de bien-être économique												
Le plus bas	18,4	6,7	25,1	10,3	6,2	16,6	28,7	12,9	41,6	3 036	39,8	37,9
Second	16,6	6,8	23,4	11,3	5,9	17,2	27,9	12,7	40,6	3 143	42,4	40,1
Moyen	17,0	4,6	21,6	13,5	4,5	18,1	30,6	9,1	39,7	3 318	45,5	42,7
Quatrième	15,7	4,0	19,7	16,8	4,8	21,6	32,5	8,8	41,3	3 676	52,2	48,8
Le plus élevé	11,3	3,2	14,5	17,0	4,6	21,6	28,3	7,8	36,1	4 174	59,9	55,6
Ensemble	15,5	4,9	20,4	14,1	5,1	19,2	29,6	10,0	39,7	17 347	48,5	45,5
FEMMES NON EN UNION SEXUELLEMENT ACTIVES[4]												
Âge												
15–19	54,6	1,5	56,1	31,0	1,7	32,8	85,6	3,2	88,8	166	36,9	34,7
20–24	46,3	1,1	47,5	42,0	1,0	43,0	88,3	2,1	90,4	101	47,5	43,5
25–29	39,1	1,5	40,6	49,5	1,7	51,2	88,7	3,2	91,8	60	55,8	51,9
30–34	(29,9)	(2,1)	(32,0)	(44,7)	(18,9)	(63,5)	(74,5)	(21,0)	(95,6)	25	(66,5)	(66,5)
35–39	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23	*	*
40–44	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11	*	*
45–49	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	*	*
Résidence												
Bamako	49,2	0,0	49,2	41,7	3,6	45,3	90,9	3,6	94,5	87	48,0	43,9
Autre urbain	45,8	1,2	47,0	40,1	0,0	40,1	85,9	1,2	87,1	57	46,0	43,1
Ensemble urbain	47,8	0,5	48,3	41,1	2,2	43,3	88,9	2,6	91,6	144	47,3	43,6
Rural	46,9	2,2	49,1	34,2	5,0	39,2	81,1	7,2	88,3	243	44,4	40,9
Région												
Kayes	37,1	1,4	38,5	41,6	7,7	49,3	78,7	9,2	87,9	65	56,2	56,2
Koulikoro	40,5	0,0	40,5	48,9	2,2	51,1	89,4	2,2	91,6	89	55,8	49,4
Sikasso	(47,3)	(0,0)	(47,3)	(27,8)	(5,7)	(33,5)	(75,1)	(5,7)	(80,8)	55	(41,5)	(34,1)
Ségou	(53,9)	(0,0)	(53,9)	(30,1)	(4,9)	(35,0)	(84,0)	(4,9)	(88,9)	41	(39,4)	(39,4)
Mopti	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16	*	*
Tombouctou	(50,5)	(1,2)	(51,7)	(47,7)	(0,0)	(47,7)	(98,2)	(1,2)	(99,4)	5	(48,0)	(37,0)
Gao	69,3	14,6	83,9	8,9	0,0	8,9	78,3	14,6	92,9	30	9,6	9,6
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	†	†	0	†	†
Bamako	49,2	0,0	49,2	41,7	3,6	45,3	90,9	3,6	94,5	87	48,0	43,9

À suivre…

Tableau 7.13.2—*Suite*

Caractéristique sociodémographique	Besoins non satisfaits en matière de planification familiale			Besoins satisfaits en matière de planification familiale (Utilisation actuelle)			Demande totale en planification familiale[1]			Effectif de femmes	Pourcentage de demande satisfaite[2]	Pourcentage de demande satisfaite par des méthodes modernes[3]
	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total			
Niveau d'instruction												
Aucun	58,4	2,9	61,3	20,8	4,5	25,3	79,2	7,4	86,6	111	29,2	27,0
Primaire	49,2	1,5	50,7	35,4	9,3	44,7	84,5	10,9	95,4	81	46,9	42,9
Secondaire ou plus	40,0	0,8	40,9	46,5	1,4	47,9	86,5	2,2	88,8	195	54,0	49,8
Quintile de bien-être économique												
Le plus bas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	24	*	*
Second	54,0	0,1	54,1	23,6	10,5	34,1	77,6	10,6	88,2	58	38,6	32,7
Moyen	39,5	3,4	43,0	39,2	4,9	44,2	78,8	8,4	87,2	75	50,7	49,9
Quatrième	52,9	2,9	55,8	32,6	1,5	34,1	85,5	4,3	89,9	110	37,9	34,6
Le plus élevé	44,4	0,2	44,6	46,0	2,6	48,6	90,4	2,9	93,2	121	52,1	47,3
Ensemble	47,2	1,6	48,8	36,8	3,9	40,7	84,0	5,5	89,5	387	45,5	41,9

Note : Les valeurs figurant dans ce tableau sont basées sur la définition révisée des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, décrite dans Bradley et al., 2012. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

[1] La demande totale équivaut à la somme des besoins non satisfaits et des besoins satisfaits.

[2] Le pourcentage de demande satisfaite équivaut aux besoins satisfaits divisés par la demande totale.

[3] Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine, la stérilisation masculine, le DIU, les injectables, les implants, la pilule, le condom masculin, le condom féminin, la contraception d'urgence, la Méthode des Jours Fixes (MJF), la Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA) et d'autres méthodes modernes.

[4] Femmes qui ont eu des rapports sexuels dans les 30 jours qui ont précédé l'enquête

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 7.14 Prise de décision concernant le recours à la planification familiale

Répartition (en %) des femmes actuellement en union selon la personne qui prend, habituellement, la décision d'utiliser ou non la planification familiale, EDSM-VII Mali 2023–2024

Décisionnaire	Pourcentage
Principalement la femme	38,9
Femme et mari/partenaire conjointement	20,1
L'opinion de la femme est plus importante	8,3
L'opinion de la femme et du mari/partenaire sont d'égale importance	9,4
L'opinion de la femme est moins importante que celle du mari/partenaire	2,3
Principalement le mari	40,1
Quelqu'un d'autre/autre	0,9
Manquant	0,0
Total	100,0
Effectif de femmes actuellement mariées	13 237

Tableau 7.15 Prise de décision concernant la planification familiale selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Répartition (en %) des femmes de 15–49 ans actuellement en union en fonction de la personne qui prend habituellement la décision d'utiliser ou pas la planification familiale et pourcentage qui participe à la décision d'utiliser ou non la planification familiale, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Principalement la femme	La femme et le mari/partenaire ensemble	Principalement le mari/partenaire	Quelqu'un d'autre/autre	Total	Pourcentage qui participe à la prise de décision sur la planification familiale	Effectif de femmes
Âge							
15–19	31,1	18,1	49,0	1,8	100,0	49,2	1 241
20–24	34,5	21,1	43,5	0,9	100,0	55,6	2 592
25–29	36,5	21,6	41,0	0,9	100,0	58,2	2 677
30–34	38,9	21,4	39,0	0,7	100,0	60,3	2 243
35–39	42,4	19,6	37,4	0,6	100,0	62,0	1 935
40–44	47,5	18,0	33,8	0,7	100,0	65,5	1 472
45–49	46,7	16,8	35,6	0,9	100,0	63,5	1 077
Utilisation de la planification familiale							
Utilise actuellement	36,9	30,9	31,6	0,6	100,0	67,8	2 936
N'utilise pas actuellement[1]	39,5	17,0	42,6	1,0	100,0	56,5	10 301
Nombre d'enfants vivants							
0	36,6	17,1	44,7	1,6	100,0	53,7	1 165
1–2	36,1	20,5	42,2	1,2	100,0	56,6	4 042
3–4	39,2	21,5	38,8	0,5	100,0	60,8	3 796
5+	42,0	19,2	38,1	0,7	100,0	61,2	4 234
Résidence							
Bamako	60,8	17,5	21,3	0,4	100,0	78,3	1 553
Autre urbain	37,0	25,6	36,1	1,4	100,0	62,6	1 339
Ensemble urbain	49,8	21,3	28,1	0,9	100,0	71,0	2 892
Rural	35,9	19,7	43,5	0,9	100,0	55,6	10 345
Région							
Kayes	30,9	17,2	51,1	0,8	100,0	48,1	2 094
Koulikoro	36,2	19,2	44,4	0,2	100,0	55,4	3 130
Sikasso	42,7	20,4	35,5	1,4	100,0	63,1	2 558
Ségou	37,4	26,3	34,7	1,6	100,0	63,7	2 109
Mopti	37,3	18,8	43,7	0,2	100,0	56,1	1 230
Tombouctou	23,3	19,5	55,4	1,8	100,0	42,8	199
Gao	12,0	21,3	63,3	3,5	100,0	33,3	360
Kidal	†	†	†	†	100,0	†	5
Bamako	60,8	17,5	21,3	0,4	100,0	78,3	1 553
Niveau d'instruction							
Aucun	38,4	17,8	43,1	0,8	100,0	56,2	8 200
Primaire	39,4	21,6	37,9	1,1	100,0	60,9	2 167
Secondaire ou plus	40,1	25,5	33,4	1,0	100,0	65,6	2 870
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	34,0	18,5	47,3	0,2	100,0	52,4	2 720
Second	35,7	18,4	44,8	1,1	100,0	54,1	2 745
Moyen	37,3	20,9	40,2	1,6	100,0	58,2	2 692
Quatrième	42,2	20,2	36,7	0,8	100,0	62,5	2 642
Le plus élevé	46,3	22,6	30,5	0,6	100,0	68,9	2 438
Ensemble	38,9	20,1	40,1	0,9	100,0	59,0	13 237

[1] Les non-utilisatrices incluent les femmes enceintes.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 7.16 Pressions subies pour tomber enceinte

Pourcentage de femmes actuellement en union qui ont déjà subi des pressions de la part de leur mari/partenaire ou d'un autre membre de la famille pour tomber enceinte alors qu'elles ne le souhaitaient pas, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes ayant subi des pressions de la part de leur mari/partenaire ou d'un autre membre de la famille pour tomber enceinte	Effectif de femmes
Âge		
15–19	6,6	1 241
20–24	8,0	2 592
25–29	8,6	2 677
30–34	9,9	2 243
35–39	9,1	1 935
40–44	9,6	1 472
45–49	8,6	1 077
Nombre d'enfants vivants		
0	16,7	1 165
1–2	8,7	4 042
3–4	8,3	3 796
5+	6,9	4 234
Utilisation de la planification familiale		
Utilise actuellement	8,6	2 936
N'utilise pas actuellement[1]	8,7	10 301
Résidence		
Bamako	8,9	1 553
Autre urbain	8,4	1 339
Ensemble urbain	8,7	2 892
Rural	8,7	10 345
Région		
Kayes	12,3	2 094
Koulikoro	7,8	3 130
Sikasso	6,3	2 558
Ségou	10,3	2 109
Mopti	8,8	1 230
Tombouctou	5,4	199
Gao	3,9	360
Kidal	†	5
Bamako	8,9	1 553
Niveau d'instruction		
Aucun	8,2	8 200
Primaire	10,9	2 167
Secondaire ou plus	8,6	2 870
Quintile de bien-être économique		
Le plus bas	7,1	2 720
Second	8,6	2 745
Moyen	9,3	2 692
Quatrième	9,8	2 642
Le plus élevé	8,7	2 438
Ensemble	8,7	13 237

[1] Les non-utilisatrices incluent les femmes enceintes.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 7.17 Utilisation future de la contraception

Répartition (en %) des femmes de 15–49 ans, actuellement en union, qui n'utilisent pas de méthode contraceptive par intention d'utiliser dans le futur, selon le nombre d'enfants vivants, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Nombre d'enfants vivants[1]					
Intention d'utiliser dans le futur	0	1	2	3	4+	Ensemble
A l'intention d'utiliser	24,2	37,8	38,8	42,6	36,2	36,8
Pas sûre	10,0	9,3	8,2	8,0	6,6	7,7
N'a pas l'intention d'utiliser	65,8	52,8	53,0	49,4	57,2	55,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes	851	1 572	1 622	1 534	4 722	10 301

[1] Y compris la grossesse actuelle

Tableau 7.18.1 Exposition aux messages sur la planification familiale : Femme

Pourcentage de femmes de 15–49 ans qui ont entendu ou vu des messages spécifiques sur la planification familiale dans les 12 derniers mois, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Radio	Télévision	Journal/ magazine	Téléphone portable	Médias Sociaux[1]	Poster/ dépliant/ brochure	Publicité à l'extérieur ou panneau d'affichage	Réunions ou évènements communau-taires	Aucun de ces huit médias	Effectif de femmes
Âge										
15–19	23,6	21,9	3,7	5,6	8,5	3,0	4,8	10,0	60,1	3 862
20–24	37,3	31,4	4,8	9,1	14,0	4,1	7,9	13,6	45,9	3 378
25–29	40,7	33,8	5,1	9,0	12,1	4,9	9,0	14,6	46,1	2 905
30–34	43,2	36,1	6,1	8,5	10,4	5,2	7,5	13,7	45,0	2 382
35–39	42,3	32,8	4,7	6,7	7,9	4,6	7,1	14,8	47,0	2 065
40–44	42,6	31,7	2,9	5,8	5,2	3,2	5,8	13,8	48,5	1 586
45–49	47,5	32,4	5,1	6,0	7,2	4,3	7,8	15,6	45,5	1 169
Résidence										
Bamako	32,9	40,9	6,6	13,4	23,6	4,8	14,7	18,2	39,6	2 675
Autre urbain	41,0	38,0	9,7	11,9	16,5	8,1	9,0	10,4	43,5	2 048
Ensemble urbain	36,4	39,6	7,9	12,8	20,5	6,2	12,2	14,8	41,3	4 723
Rural	37,8	27,2	3,4	5,4	6,0	3,4	5,1	12,7	52,3	12 624
Région										
Kayes	29,8	27,7	5,8	9,2	11,9	6,3	9,3	19,1	54,7	2 635
Koulikoro	34,9	25,6	3,1	4,9	5,9	1,4	3,1	5,5	55,0	4 018
Sikasso	38,8	33,4	3,1	4,0	5,8	4,9	5,5	10,8	50,7	3 143
Ségou	60,3	38,1	4,9	8,1	9,0	5,2	8,4	20,2	29,3	2 574
Mopti	22,6	17,6	2,4	4,6	4,8	2,9	2,9	9,2	70,1	1 530
Tombouctou	26,9	10,1	4,1	4,8	5,5	2,6	2,0	16,8	63,0	281
Gao	46,0	26,8	14,7	14,0	8,7	6,2	4,4	8,2	48,6	485
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	†	†	6
Bamako	32,9	40,9	6,6	13,4	23,6	4,8	14,7	18,2	39,6	2 675
Niveau d'instruction										
Aucun	36,8	25,3	2,1	3,7	3,3	2,4	3,8	13,0	54,1	9 382
Primaire	38,1	32,4	3,3	6,3	9,6	3,2	6,6	15,4	48,5	2 926
Secondaire ou plus	38,0	39,4	10,1	14,8	22,6	7,9	13,4	12,6	40,9	5 039
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	42,1	27,7	1,9	4,2	2,4	2,4	3,9	16,3	49,5	3 036
Second	37,7	23,3	2,5	4,1	3,8	3,0	4,4	14,2	54,5	3 143
Moyen	36,3	24,1	3,1	4,9	6,5	3,4	5,7	13,0	53,3	3 318
Quatrième	39,4	33,8	5,2	8,2	10,4	4,8	6,7	10,7	48,2	3 676
Le plus élevé	32,8	40,6	8,8	13,5	22,5	6,3	12,8	12,8	43,1	4 174
Ensemble	37,4	30,6	4,6	7,4	10,0	4,1	7,0	13,3	49,3	17 347

[1] Les médias sociaux incluent les plateformes comme Facebook, X (précédemment connu sous le nom de Twitter), ou Instagram.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 7.18.2 Exposition aux messages sur la planification familiale : Homme

Pourcentage d'hommes de 15–49 ans qui ont entendu ou vu messages spécifiques sur la planification familiale dans les 12 derniers mois, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Radio	Télévision	Journal/ magazine	Téléphone portable	Médias Sociaux[1]	Poster/ dépliant/ brochure	Publicité à l'extérieur ou panneau d'affichage	Réunions ou évènements communau-taires	Aucun de ces huit médias	Effectif d'hommes
Âge										
15–19	16,4	18,8	2,0	3,0	7,5	3,5	6,5	3,8	65,8	1 669
20–24	27,2	28,4	3,5	7,2	26,2	6,5	11,8	5,1	43,5	1 165
25–29	36,4	35,3	6,1	9,9	26,6	7,7	14,8	6,7	36,1	930
30–34	43,6	37,8	7,8	12,2	24,3	8,4	14,2	8,6	34,0	909
35–39	49,7	38,5	8,9	10,6	22,3	10,8	13,6	8,1	31,6	784
40–44	55,8	42,5	7,4	9,3	15,4	7,7	12,5	8,2	27,4	663
45–49	51,2	36,4	6,7	7,9	11,2	6,5	11,8	7,3	35,5	568
Résidence										
Bamako	31,9	47,9	8,9	14,6	35,4	10,3	16,0	10,3	26,3	1 177
Autre urbain	32,2	31,4	6,3	10,3	23,3	9,8	18,5	4,8	43,9	795
Ensemble urbain	32,0	41,3	7,9	12,9	30,5	10,1	17,1	8,1	33,4	1 971
Rural	37,0	27,4	4,3	5,8	13,5	5,4	9,2	5,6	47,1	4 714
Région										
Kayes	16,1	25,4	3,0	3,5	21,6	4,3	8,0	6,6	53,3	920
Koulikoro	35,9	29,2	6,5	8,0	13,9	6,4	12,1	3,7	48,5	1 637
Sikasso	40,8	29,6	3,7	3,4	8,9	5,4	9,0	3,5	46,4	1 215
Ségou	47,6	29,7	5,2	10,6	19,0	9,8	15,5	7,0	35,4	939
Mopti	37,4	27,9	3,1	6,4	17,0	3,9	7,1	3,4	50,9	505
Tombouctou	44,0	16,1	2,3	2,1	6,5	1,8	6,6	30,1	44,0	128
Gao	46,3	18,4	5,4	8,5	9,3	5,4	5,1	9,0	45,6	163
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	†	†	2
Bamako	31,9	47,9	8,9	14,6	35,4	10,3	16,0	10,3	26,3	1 177
Niveau d'instruction										
Aucun	37,8	24,7	1,7	2,8	8,3	2,0	4,7	4,5	49,8	2 476
Primaire	34,4	27,3	1,9	4,4	10,9	2,7	8,5	6,3	46,7	1 352
Secondaire ou plus	34,1	39,4	10,2	13,9	31,0	12,8	18,8	7,8	35,5	2 858
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	37,3	18,8	1,2	3,1	4,6	1,3	5,0	3,9	53,4	1 179
Second	38,0	27,7	2,8	3,3	10,8	3,5	7,1	5,8	45,9	1 174
Moyen	37,6	31,0	3,2	5,5	12,3	5,2	9,8	5,6	44,7	1 190
Quatrième	33,8	29,6	6,4	8,7	21,7	9,3	13,0	6,5	45,4	1 446
Le plus élevé	32,6	44,9	10,7	15,3	35,2	11,8	18,9	8,6	30,9	1 697
Ensemble 15–49	35,5	31,5	5,4	7,9	18,5	6,8	11,5	6,3	43,1	6 686
50–64	54,7	33,7	5,8	4,4	9,5	6,6	11,6	8,1	31,2	1 143
Ensemble 15–64	38,3	31,8	5,4	7,4	17,2	6,8	11,5	6,6	41,3	7 829

[1] Les médias sociaux incluent les plateformes comme Facebook, X (précédemment connu sous le nom de Twitter), ou Instagram.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 7.19 Contact des non utilisatrices de la contraception avec des prestataires en planification familiale

Parmi les femmes de 15–49 ans non utilisatrices de la contraception, pourcentage qui, au cours des 12 derniers mois, ont reçu la visite d'un agent de terrain avec qui elles ont parlé de planification familiale, pourcentage qui se sont rendues dans un établissement de santé et ont parlé de planification familiale, pourcentage qui se sont rendues dans un établissement de santé et n'ont pas parlé de planification familiale et pourcentage qui n'ont pas parlé de planification familiale, que ce soit avec un agent de terrain ou dans un établissement de santé, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes ayant reçu la visite d'un agent de terrain avec qui elles ont parlé de planification familiale	Pourcentage de femmes qui se sont rendues dans un établissement de santé au cours des 12 derniers mois et qui :		Pourcentage de femmes n'ayant pas parlé de planification familiale, ni avec un agent de terrain, ni dans un établissement de santé	Effectif de femmes
		Ont parlé de planification familiale	N'ont pas parlé de planification familiale		
Âge					
15–19	3,2	5,0	23,9	93,8	3 577
20–24	8,4	14,7	37,4	82,1	2 692
25–29	10,6	18,2	41,0	78,4	2 260
30–34	11,1	19,8	40,1	76,7	1 769
35–39	10,3	18,4	36,9	78,7	1 522
40–44	8,1	14,6	35,3	83,1	1 203
45–49	5,4	8,1	32,8	89,8	985
Résidence					
Bamako	8,4	11,7	36,2	87,0	2 019
Autre urbain	5,8	13,3	33,1	85,2	1 622
Ensemble urbain	7,2	12,4	34,8	86,2	3 641
Rural	7,9	13,7	34,1	83,3	10 368
Région					
Kayes	10,8	17,4	32,3	77,8	2 153
Koulikoro	4,3	12,0	39,3	86,5	3 169
Sikasso	10,6	13,0	26,5	83,8	2 541
Ségou	8,1	15,6	33,5	81,2	2 033
Mopti	4,6	10,7	45,4	87,2	1 359
Tombouctou	2,5	4,0	14,2	94,5	260
Gao	9,3	15,9	26,5	82,8	470
Kidal	†	†	†	†	5
Bamako	8,4	11,7	36,2	87,0	2 019
Niveau d'instruction					
Aucun	7,8	13,2	33,5	84,0	7 790
Primaire	8,2	15,0	34,8	82,3	2 313
Secondaire ou plus	7,4	12,6	35,7	85,3	3 905
Quintile de bien-être économique					
Le plus bas	10,9	15,5	32,3	80,7	2 533
Second	8,4	13,3	34,2	83,4	2 602
Moyen	6,3	13,1	34,0	84,7	2 718
Quatrième	7,2	14,7	34,7	83,1	2 884
Le plus élevé	6,4	10,8	35,9	87,6	3 271
Ensemble	7,7	13,3	34,3	84,1	14 009

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

MORTALITÉ INFANTILE ET MORTALITÉ JUVÉNILE 8

Principaux résultats

- ***Mortalité infantile :*** Pour la période des 5 années ayant précédé l'enquête, sur 1 000 naissances vivantes, 52 n'atteignent pas leur premier anniversaire.
- ***Mortalité infanto-juvénile :*** Pour la période des 5 années ayant précédé l'enquête, sur 1 000 naissances vivantes, 87 n'atteignent pas leur cinquième anniversaire.
- ***Variation selon l'intervalle avec la naissance précédente :*** Pour la période des 10 années ayant précédé l'enquête, les risques de décès des enfants diminuent avec l'allongement de la durée de l'intervalle intergénésique, quelle que soit la composante de la mortalité. Pour la mortalité infanto-juvénile, le taux passe de 153 ‰ lorsque la durée est inférieure à 2 ans à 54 ‰ quand elle est d'au moins 4 années.
- ***Variation selon le quintile de bien-être économique :*** Le risque de mortalité infanto-juvénile diminue du quintile le plus bas (134 ‰) au quintile le plus élevé (52 ‰).
- ***Comportements procréateurs à hauts risques :*** Parmi les naissances ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête, 63 % sont classées dans une catégorie de hauts risques évitables.

Les informations sur la mortalité infantile et juvénile sont non seulement pertinentes pour l'évaluation de la situation démographique de la population mais elles constituent aussi un indicateur important du développement socio-économique ainsi que de la qualité de vie dans le pays. Elles permettent aussi d'identifier les enfants à haut risque de mortalité et elles peuvent être utiles pour mettre en place des stratégies pour réduire ce risque, comme par exemple, la promotion de l'espacement des naissances.

Ce chapitre présente des informations sur le niveau, les tendances et les différentiels des taux de mortalité périnatale, néonatale, infantile et infanto-juvénile. Il présente également les facteurs biodémographiques et les comportements procréateurs qui contribuent à augmenter les risques de mortalité des nourrissons et des enfants de moins de 5 ans. Les indicateurs de mortalité sont calculés à partir des informations rétrospectives recueillies dans l'historique des grossesses, où les femmes enquêtées déclarent toutes les naissances qu'elles ont eues, ainsi que pour chaque enfant, la date de naissance, l'état de survie, l'âge actuel ou l'âge au décès.

La qualité des estimations de mortalité calculées à partir des informations recueillies dans l'historique des grossesses dépend de la capacité de la mère à se souvenir de tous les enfants qu'elle a mis au monde, de leur date de naissance et de leur âge au moment de leur décès. Les problèmes qui peuvent affecter la qualité des données comprennent :

- L'omission sélective de l'historique des grossesses des naissances qui n'ont pas survécu, ce qui pourra entraîner une sous-estimation de la mortalité infantile.

- Le déplacement des dates de naissance, qui peut biaiser les tendances de la mortalité. Cela peut se produire si l'enquêteur enregistre sciemment une naissance à une date différente de celle à laquelle elle a effectivement eu lieu. Cela peut également se produire si l'enquêteur tente de réduire sa charge de travail globale, car les naissances vivantes survenues au cours des 3 années précédant l'entretien donnent lieu à une longue série de questions supplémentaires.

- L'exactitude de la déclaration de l'âge de l'enfant lors de son décès. Une déclaration erronée peut biaiser les variations de la mortalité par âge, en particulier, si l'effet net de cette déclaration erronée aboutit à transposer des décès d'une tranche d'âges à une autre.

- Toute méthode de mesure de la mortalité infantile qui se fonde sur les déclarations des mères (par exemple, l'historique des grossesses) suppose que la mortalité des femmes adultes n'est pas élevée ou, si elle l'est, que la corrélation entre les risques de mortalité des mères et ceux des enfants est minime ou nulle.

Des indicateurs sélectionnés concernant la qualité des données de mortalité, sur lesquelles sont basées les estimations de mortalité de ce chapitre, sont présentés à l'annexe C, Tableaux C.5 et C.6.

8.1 MORTALITÉ INFANTILE ET MORTALITÉ JUVÉNILE

Mortalité néonatale : probabilité de décéder avant d'atteindre un mois.
Mortalité post-néonatale : probabilité de décéder entre le premier mois et le premier anniversaire (calculée par différence entre la mortalité infantile et la mortalité néonatale).
Mortalité infantile : probabilité de décéder entre la naissance et le premier anniversaire.
Mortalité juvénile : probabilité de décéder entre le premier anniversaire et le cinquième anniversaire.
Mortalité infanto-juvénile : probabilité de décéder entre la naissance et le cinquième anniversaire.

Au cours des cinq années précédant l'enquête, le quotient de mortalité néonatale au Mali est estimé à 29 décès pour 1 000 naissances vivantes, le quotient de mortalité infantile à 52 décès pour 1 000 naissances vivantes et le quotient de mortalité infanto-juvénile à 87 décès pour 1 000 naissances vivantes (**Tableau 8.1**). Les décès néonatals représentent plus de la moitié des décès infantiles.

Tendances : Le **Graphique 8.1** présente les tendances des quotients de mortalité infantile, infanto-juvénile et néonatale depuis la première Enquête Démographique et de Santé (EDSM-I 1987). Bien que les niveaux actuels de ces indicateurs comptent parmi les plus élevés au monde, il n'en demeure pas moins qu'ils ont considérablement diminué au cours de ces dernières décennies. En effet, les résultats montrent une diminution régulière sur la période 1987–2006 suivie d'une baisse importante en 2012–2013, baisse qui pourrait être due à une sous-

Graphique 8.1 **Tendances de la mortalité des enfants de moins de 5 ans**

Décès pour 1 000 naissances vivantes par période de 5 ans avant l'enquête



estimation liée à des sous-déclarations importantes de décès lors de l'EDSM-V en raison notamment du contexte sécuritaire de l'époque marqué par l'insécurité dans toute la partie septentrionale et dans quelques localités du centre du pays. Concernant la mortalité infantile et la mortalité néonatale, la tendance à la baisse a été un peu moins régulière puisqu'entre 1987 et 1995–1996, leurs niveaux ont augmenté, passant de 105 ‰ à 122 ‰ pour l'infantile et de 51 ‰ à 60 ‰ pour la néonatale. Puis sur la période 1995–1996 et 2023–2024, les niveaux de ces deux indicateurs de mortalité ont connu une baisse continue jusqu'en 2023–2024 (52 ‰ pour l'infantile et 33 ‰ pour la néonatale).

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

Les niveaux de mortalité par sexe et par milieu de résidence, présentés au **Tableau 8.2**, sont calculés pour la période des 5 années ayant précédé l'enquête.

- Les résultats de l'EDSM-VII indiquent que les garçons présentent, comme attendu, un risque de mortalité néonatale ou infantile plus élevé que les filles. En effet, pour la mortalité néonatale, 33 naissances vivantes masculines sur mille décèdent dans leur premier mois de vie contre 25 chez les filles. Pour ce qui est du taux de mortalité infantile, il s'établit à 53 ‰ pour les garçons contre 50 ‰ pour les filles. Le taux de mortalité infanto-juvénile quant à lui ne présente pas d'écart entre les sexes (87 ‰) (**Tableau 8.2**).

- Quelle que soit la composante de la mortalité considérée, on constate que le risque de décès est plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain. Ainsi, le quotient de mortalité infanto-juvénile qui est de 95 ‰ en milieu rural est estimé à 53 ‰ en milieu urbain. Pour la mortalité infantile, ce risque est de 54 ‰ en milieu rural contre 41 ‰ en milieu urbain (**Tableau 8.2**).

Le **Tableau 8.3** présente les données de mortalité des enfants de moins de 5 ans selon d'autres caractéristiques sociodémographiques pour la période des 10 années précédant l'enquête. Une période de référence de 10 ans a été adoptée pour disposer de suffisamment de cas et augmenter ainsi la fiabilité des estimations calculées.

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques additionnelles

- Les régions de Ségou, Mopti et Sikasso présentent les niveaux de mortalité des enfants de moins de 5 ans les plus élevés, cela quelle que soit la composante, avec des taux de mortalité infanto-juvénile supérieurs à 110 ‰ (respectivement, 125 ‰, 124 ‰ et 111 ‰) (**Carte 8.1**), des taux de mortalité infantile égaux ou supérieurs à 64 ‰ (respectivement, 64 ‰, 67 ‰ et 64 ‰) et des taux de mortalité néonatale supérieurs à 35 ‰ (respectivement, 36 ‰, 40 ‰ et 39 ‰).

Carte 8.1 Mortalité infanto-juvénile par région

Décès pour 1 000 naissances vivantes pour les 10 années ayant précédé l'enquête



Note : Pour des raisons d'insécurité, les données de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région et ne sont pas présentées séparément.

- Les risques de mortalité des enfants ont tendance à diminuer avec l'augmentation du niveau d'instruction de la mère, cela quelle que soit la composante de la mortalité. Le quotient de mortalité infantile varie de 60 ‰ parmi les enfants dont la mère n'a aucun niveau d'instruction à 56 ‰ lorsqu'elle a un niveau primaire et à un minimum de 42 ‰ lorsque la mère a atteint au moins le niveau secondaire. Il en est de même pour la mortalité infanto-juvénile qui passe respectivement de 108 ‰ à 94 ‰ et à 61 ‰ (**Tableau 8.3**).

- Les risques de décès infantiles et infanto-juvéniles diminuent avec l'amélioration du statut socioéconomique. Pour la mortalité infanto-juvénile, le taux passe de 134 ‰ dans le quintile le plus bas, à 116 ‰ dans le second quintile puis à 52 ‰ dans le plus élevé (**Graphique 8.2**).

Graphique 8.2 Mortalité infanto-juvénile par quintile de bien-être économique du ménage

Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période des 10 années ayant précédé l'enquête



- Un âge de la mère trop précoce ou trop tardif à la naissance de l'enfant est préjudiciable à la survie de ce dernier. En effet, le quotient de mortalité infantile est plus élevé quand la mère avait moins de 20 ans à la naissance de l'enfant (77 ‰) ou quand celle-ci avait entre 40–49 ans (87 ‰).

- Les risques de décès des enfants varient avec le rang de naissance. Pour la mortalité néonatale et infantile, c'est parmi ceux de rang 1 (respectivement, 44 ‰ et 69 ‰) qu'ils sont les plus élevés et, à l'opposé, parmi ceux de rangs 4–6 qu'ils sont les plus faibles (respectivement, 26 ‰ et 49 ‰). Quant à

la mortalité infanto-juvénile, les risques les plus élevés sont observés parmi les enfants de rang 7 ou plus (123 ‰).

- Les risques de décès des enfants diminuent avec l'augmentation de l'intervalle avec la naissance précédente. Le quotient de mortalité infanto-juvénile est de 153 ‰ lorsque la durée écoulée avec la naissance précédente est inférieure à 2 ans. Ce quotient passe à 91 ‰ pour un intervalle de 2 ans, à 69 ‰ pour un intervalle de 3 ans et à 54 ‰ quand l'intervalle avec la naissance précédente est d'au moins 4 années. Cette tendance s'observe pour toutes les composantes de la mortalité (**Graphique 8.3**).

***Graphique 8.3* Mortalité infanto-juvénile selon l'intervalle avec la naissance précédente**

Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période des 10 années ayant précédé l'enquête



8.2 MORTALITÉ PÉRINATALE

Taux de mortalité périnatale

Les décès périnatals comprennent les mort-nés (décès fœtaux survenant après 28 semaines de gestation) et les décès néonatals précoces (décès de naissances vivantes qui se sont produits dans les 7 premiers jours). Le taux de mortalité périnatale est calculé comme étant le nombre de décès périnatals pour 1 000 grossesses d'une durée de 28 semaines ou plus.

Échantillon : Nombre de grossesses d'une durée de 28 semaines ou plus chez les femmes de 15–49 ans au cours des 5 années précédant l'enquête.

En 2014, le Plan d'action Every Newborn, une initiative mondiale et multipartenaires destinée à mettre fin à la mortalité maternelle et néonatale évitable, ainsi qu'à la mortinatalité, a fixé pour objectif des taux nationaux de mortinatalité de 12 décès ou moins pour 1 000 naissances dans tous les pays d'ici 2030 (OMS, 2014).

Durant les 5 années ayant précédé l'EDSM-VII, on a enregistré 393 mort-nés et 367 décès néonatals précoces pour 16 247 grossesses de 7 mois ou plus. Le taux de mortalité périnatale est estimé à 47 ‰ (**Tableau 8.4**). Un résultat qui montre que l'objectif national en la matière n'est pas atteint.

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Les maternités précoces et tardives sont associées à des risques élevés de mortalité périnatale. Le taux de mortalité périnatale est plus élevé quand l'âge de la mère à la naissance est inférieur à 20 ans (60 ‰) ou quand il se situe entre 40–49 ans (60 ‰) par rapport à 20–29 ans (42 ‰).
- Le taux de mortalité périnatale est nettement plus faible en milieu urbain qu'en milieu rural (38 ‰ contre 49 ‰).
- Les régions de Gao (28 ‰), Bamako (34 ‰) et dans une moindre mesure Tombouctou (39 ‰) enregistrent les taux de mortalité périnatale les plus faibles. À l'opposé, la région de Sikasso enregistre le taux de décès périnatal le plus élevé (55 ‰).

- Le taux de mortalité périnatale est plus élevé quand la mère n'a aucun niveau d'instruction (48 ‰). Quand la mère a le niveau d'instruction primaire, ce taux est estimé à 47 ‰ et à 43 ‰ quand elle a le niveau secondaire ou plus.
- Le taux de mortalité périnatale est plus élevé dans le quintile de bien-être économique le plus bas que dans les autres (54 ‰ contre 40 ‰ dans le quintile le plus élevé (**Graphique 8.4**).

Graphique 8.4 **Mortalité périnatale par quintile de bien-être économique du ménage**

Décès pour 1 000 grossesses de 7 mois ou plus pour les 5 ans ayant précédé l'enquête



8.3 COMPORTEMENT PROCRÉATEUR À HAUT RISQUE

La survie des nourrissons et des enfants dépend en partie des caractéristiques démographiques et biologiques de leur mère. Généralement, la probabilité de décès en bas âge est nettement plus élevée chez les enfants dont la mère est trop jeune à la naissance (moins de 18 ans) ou trop âgées (plus de 34 ans), chez les enfants nés après un court espacement des naissances (moins de 24 mois après la naissance précédente) et chez les enfants nés de mères à parité élevée (plus de trois enfants).

Le **Tableau 8.5** présente la répartition (en %) des enfants nés au cours des cinq années précédant l'enquête par catégorie de risque élevé de mortalité (ainsi que les ratios de risques) et la répartition (en %) des femmes actuellement en union par catégorie de risque si elles concevaient un enfant au moment de l'enquête.

Un quart (25 %) des naissances ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête ne se trouvent dans aucune catégorie à haut risque et 13 % des naissances sont classées dans une catégorie à risque inévitable qui correspond à celle des naissances de rang 1, entre 18 et 34 ans.

Plus de trois naissances ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête sur cinq (63 %) sont classées dans une catégorie à hauts risques évitables, dont deux sur 5 (40 %) sont dans la catégorie à haut risque unique et 23 % dans la catégorie à hauts risques multiples.

Le rapport de risques indique la relation entre les facteurs de risque et la mortalité. Par exemple, le risque de décès d'un enfant qui relève de l'une des catégories à haut risque évitable est 1,56 fois plus élevé que celui d'un enfant qui n'appartient à aucune catégorie à haut risque.

Une naissance appartenant à une catégorie quelconque à haut risque unique court un risque de décéder 1,41 fois supérieur à celle n'appartenant à aucune catégorie à hauts risques évitables. L'âge avancé de la mère à la naissance de l'enfant (supérieur à 34 ans) apparait comme un facteur de risques élevés puisqu'un enfant, né d'une mère après cet âge court un risque de décéder 2,53 fois plus important que la catégorie de référence. Il en est de même pour un intervalle intergénésique court, puisque les enfants nés moins de 24 mois après la naissance précédente, courent un risque de décéder 2,01 fois plus important que ceux de la catégorie de référence.

Les naissances classées dans la catégorie à hauts risques multiples sont les plus exposés. En effet, la combinaison des facteurs de risque, évoqués ci-dessus, contribue à une augmentation des risques à la naissance. Le ratio de risque parmi les naissances classées dans la catégorie à hauts risques multiples

s'élève à 1,81 et le risque le plus élevé (4,02) concerne les naissances dont la mère a moins de 18 ans et l'intervalle intergénésique est inférieur à 24 mois.

À partir de cette analyse des comportements procréateurs à hauts risques, on a cherché à déterminer la proportion de femmes actuellement en union qui, potentiellement, pourraient avoir de tels comportements. Pour cela, à partir de l'âge actuel des femmes, de l'intervalle écoulé depuis leur dernière naissance et du rang de leur dernière naissance, on détermine dans quelle catégorie se situerait la prochaine naissance si chaque femme concevait un enfant au moment de l'enquête. Il s'agit donc d'une simulation ayant pour objectif de déterminer quelles proportions des futures naissances entreraient dans les catégories à risques, en l'absence de tout comportement régulateur de la fécondité. Il apparaît que dans l'ensemble, 78 % des femmes en union seraient classées dans une des catégorie à hauts risques évitables si elles avaient conçu un enfant au moment de l'enquête, soit 32 % qui appartiendraient à la catégorie à haut risque unique et 47 % à la catégorie à hauts risques multiples.

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur la mortalité infantile et post-infantile, consultez les tableaux suivants :

- **Tableau 8.1 Quotients de mortalité des enfants de moins de 5 ans**
- **Tableau 8.2 Quotients de mortalité des enfants sur 5 ans selon certaines caractéristiques démographiques**
- **Tableau 8.3 Quotients de mortalité des enfants sur 10 ans selon d'autres caractéristiques**
- **Tableau 8.4 Mortalité périnatale**
- **Tableau 8.5 Comportement procréateur à hauts risque**

Tableau 8.1 Quotient de mortalité des enfants de moins de 5 ans

Quotients de mortalité néonatale, post-néonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile par période de 5 ans ayant précédé l'enquête, EDSM-VII Mali 2023–2024

Nombre d'années avant l'enquête	Année civile approximative	Mortalité néonatale (NN)	Mortalité post-néonatale (PNN)[1]	Mortalité infantile ($_1q_0$)	Mortalité juvénile ($_4q_1$)	Mortalité infanto-juvénile ($_5q_0$)
0–4	2020–2024	29 (IC : 26–33)	22 (IC : 20–25)	52 (IC : 47–56)	37 (IC : 32–42)	87 (IC : 80–93)
5–9	2014–2019	38 (IC : 34–42)	23 (IC : 20–27)	61 (IC : 56–67)	52 (IC : 45–60)	111 (IC : 100–121)
10–14	2009–2013	37 (IC : 32–42)	28 (IC : 24–32)	65 (IC : 58–72)	72 (IC : 64–80)	132 (IC : 122–143)

IC : Intervalle de confiance
[1] Calculé par différence entre les taux de mortalité infantile et néonatale.

Tableau 8.2 Quotients de mortalité des enfants sur 5 ans selon certaines caractéristiques démographiques

Quotients de mortalité néonatale, postnéonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile des enfants de moins de 5 ans pour la période des 5 années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques démographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique démographique	Mortalité néonatale (NN)	Mortalité postnéonatale (PNN)[1]	Mortalité infantile ($_1q_0$)	Mortalité juvénile ($_4q_1$)	Mortalité infanto-juvénile ($_5q_0$)
Sexe de l'enfant					
Masculin	33	20	53	36	87
Féminin	25	25	50	39	87
Résidence					
Bamako	18	21	39	9	48
Autre urbain	24	20	44	17	60
Ensemble urbain	21	20	41	13	53
Rural	31	23	54	43	95
Ensemble	29	22	52	37	87

[1] Calculé par différence entre les taux de mortalité infantile et néonatale

Tableau 8.3 Quotients de mortalité des enfants sur 10 ans selon d'autres caractéristiques

Quotients de mortalité néonatale, postnéonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile des enfants de moins de 5 ans pour la période des 10 années ayant précédé l'enquête, selon d'autres caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Mortalité néonatale (NN)	Mortalité postnéonatale (PNN)[1]	Mortalité infantile ($_1q_0$)	Mortalité juvénile ($_4q_1$)	Mortalité infanto-juvénile ($_5q_0$)
Âge de la mère à la naissance					
<20	50	27	77	46	119
20–29	28	21	49	44	91
30–39	31	20	51	42	91
40–49	41	47	87	(51)	(134)
Rang de naissance					
1	44	25	69	38	105
2–3	31	19	51	38	86
4–6	26	23	49	47	93
7+	39	28	67	60	123
Intervalle avec la naissance précédente[2]					
<2 ans	55	33	88	70	153
2 ans	27	21	48	45	91
3 ans	20	17	37	33	69
4+ ans	17	16	33	22	54
Région					
Kayes	32	21	53	45	96
Koulikoro	31	20	52	31	81
Sikasso	39	24	64	50	111
Ségou	36	28	64	66	125
Mopti	40	27	67	60	124
Tombouctou	20	12	32	21	52
Gao	20	24	45	21	65
Kidal	†	†	†	†	†
Bamako	23	17	40	20	59
Niveau d'instruction de la mère					
Aucun	35	25	60	51	108
Primaire	33	23	56	40	94
Secondaire ou plus	27	14	42	21	61
Quintile de bien-être économique					
Le plus bas	44	24	68	71	134
Second	32	28	60	60	116
Moyen	29	26	56	41	94
Quatrième	34	20	54	22	75
Le plus élevé	25	14	39	14	52

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 250–499 enfants non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 250 enfants non pondérés et qu'elle a été supprimée

[1] Calculé par différence entre les taux de mortalité infantile et néonatale

[2] Non compris les naissances de rang 1

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 8.4 Mortalité périnatale

Nombre de mort-nés, nombre de décès néonatals précoces, taux de mortinatalité, taux de mortalité néonatale précoce, taux de mortalité périnatale, et ratio mort-nés aux décès néonatals précoces pour la période des 5 années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Nombre de mort-nés[1]	Nombre de décès néonatals précoces[2]	Taux de mortinatalité[3]	Taux de mortalité néonatale précoce[4]	Taux de mortalité périnatale[5]	Effectif de grossesses de 28 semaines et plus[6]	Ratio de mort-nés aux décès néonatals précoces
Âge de la mère à la naissance							
<20	92	74	33	28	60	2 786	1,2
20–29	172	175	21	22	42	8 243	1,0
30–39	105	99	23	23	45	4 513	1,1
40–49	24	18	34	27	60	705	1,3
Intervalle en mois avec la naissance précédente[7]							
Première grossesse	97	74	34	27	60	2 877	1,3
<15	116	127	33	37	69	3 518	0,9
15–26	99	85	20	18	38	4 889	1,2
27–38	51	40	19	15	34	2 661	1,3
39+	30	40	13	18	31	2 301	0,8
Résidence							
Bamako	33	30	18	17	34	1 837	1,1
Autre urbain	38	28	24	18	42	1 577	1,4
Ensemble urbain	71	58	21	17	38	3 414	1,2
Rural	322	309	25	25	49	12 833	1,0
Région							
Kayes	56	52	23	21	43	2 486	1,1
Koulikoro	96	82	25	22	46	3 823	1,2
Sikasso	85	90	27	29	55	3 192	0,9
Ségou	84	55	32	22	53	2 599	1,5
Mopti	27	48	17	31	48	1 570	0,6
Tombouctou	6	5	22	17	39	270	1,3
Gao	7	6	14	14	28	462	1,0
Kidal	0	0	†	†	†	6	†
Bamako	33	30	18	17	34	1 837	1,1
Niveau d'instruction de la mère							
Aucun	252	221	26	23	48	9 790	1,1
Primaire	62	68	22	25	47	2 774	0,9
Secondaire ou plus	79	78	21	22	43	3 683	1,0
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	95	92	27	27	54	3 456	1,0
Second	85	72	25	21	46	3 432	1,2
Moyen	88	69	27	22	48	3 313	1,3
Quatrième	65	83	20	26	46	3 262	0,8
Le plus élevé	60	51	21	19	40	2 783	1,2
Ensemble	393	367	24	23	47	16 247	1,1

Note : Les enquêtées peuvent déclarer la durée de leur grossesse soit en semaines, soit en mois.
[1] Les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits à 28 semaines ou plus de grossesse. Quand la durée de la grossesse est déclarée en mois, les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits au cours de grossesse de 7 mois ou plus.
[2] Les décès néonatals précoces sont des décès qui se sont produits à 0–6 jours parmi les enfants nés-vivants.
[3] Taux de mortinatalité : nombre de mort-nés divisé par le nombre de grossesses à 28 semaines ou plus, exprimé pour 1 000.
[4] Taux de mortalité néonatale précoce : nombre de décès néonatals précoces divisés par le nombre de naissances vivantes, exprimé pour 1 000.
[5] Taux de mortalité périnatale : somme du nombre de mort-nés et de décès néonatals précoces divisée par le nombre de grossesse à 28 semaines ou plus, exprimé pour 1 000.
[6] Y compris les grossesses de 7 mois ou plus quand la durée de la grossesse a été déclarée en mois.
[7] Catégories d'intervalles entre grossesses correspondent aux différents intervalles entre naissances de <24 mois, 24–35 mois, 36–47 mois et 48 mois ou+ en supposant une durée de grossesse de 9 mois.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 8.5 Comportement procréateur à hauts risques

Répartition (en %) des enfants nés dans les 5 années ayant précédé l'enquête par catégorie de haut risque de mortalité, ratio de risque et répartition (en%) des femmes actuellement en union par catégorie de risque si elles concevaient un enfant au moment de l'enquête, EDSM-VII Mali 2023–2024

Catégorie de risque	Naissances dans les 5 années avant l'enquête		Pourcentage de femmes actuellement en union[1]
	Pourcentage de naissances	Ratio de risque	
Dans aucune catégorie à haut risque	24,5	1,00	15,7
Catégorie à risque inévitable			
Naissances de rang 1, entre 18 et 34 ans	12,9	1,55	6,0
Dans une des catégories de hauts risques évitables	62,6	1,56	78,3
Catégorie à haut risque unique			
Âge de la mère <18 seulement	7,0	1,66	1,6
Âge de la mère >34 seulement	0,8	2,53	2,3
Intervalle intergénésique <24 mois seulement	7,1	2,01	9,8
Rang de naissance >3 seulement	25,1	1,14	18,1
Sous-total	40,0	1,41	31,8
Catégorie à hauts risques multiples			
Âge <18 et intervalle intergénésique <24 mois[2]	0,6	4,02	0,5
Âge >34 et intervalle intergénésique <24 mois	0,1	*	0,2
Âge >34 et rang de naissance >3	12,5	1,22	26,6
Âge >34 et intervalle intergénésique <24 mois et rang de naissance >3	1,9	2,60	5,8
Intervalle intergénésique <24 mois et rang de naissance >3	7,6	2,42	13,5
Sous-total	22,6	1,81	46,5
Total	100,0	na	100,0
Dans une des catégories de hauts risques évitables			
Âge de la mère <18	7,6	1,85	2,0
Âge de la mère >34	15,2	1,46	35,0
Intervalle intergénésique <24 mois	17,2	2,32	29,7
Rang de naissance >3	47,1	1,43	63,9
Effectif de naissances/femmes	15 854	na	13 237

Note : Le ratio de risque est le rapport de la proportion de naissances décédées parmi les naissances appartenant à une catégorie à haut risque spécifique à la proportion de naissances décédées parmi celles n'appartenant à aucune catégorie à hauts risques.
na = non applicable
[1] Les femmes sont classées dans les catégories à risque selon le statut qu'elles auraient à la naissance de l'enfant si elles concevaient un enfant au moment de l'enquête : âge actuel inférieur à 17 ans et 3 mois ou supérieur à 34 ans et 2 mois, la dernière naissance a eu lieu il y a 15 mois ou la dernière naissance était de rang 3 ou plus.
[2] Y compris la catégorie : âge <18 et rang de naissance >3
[a] Y compris les femmes stérilisées

SANTÉ DES MÈRES ET DES NOUVEAU-NÉS 9

Principaux résultats

- ***Couverture en soins prénatals :*** Parmi les femmes de 15–49 ans ayant eu une naissance vivante et/ou un mort-né au cours des 2 années avant l'enquête, 69 % ont reçu, pour la naissance vivante ou le mort-né le plus récent, des soins prénatals dispensés par un prestataire de santé qualifié.
- ***Composantes des soins prénatals :*** Parmi les femmes ayant reçu des soins prénatals pour la naissance vivante ou le mort-né le plus récent, la quasi-majorité ont effectué des examens préventifs comme la vérification de de la tension artérielle (95 %), l'auscultation des battements cardiaques du bébé (88 %), une analyse de sang (87 %) et une analyse d'urine (82 %).
- ***Lieu et assistance à l'accouchement :*** La majorité des naissances vivantes et/ou des mort-nés ayant eu lieu au cours des 2 années avant l'enquête (81 %) se sont déroulées dans un établissement de santé. Une naissance sur cinq (19 %) a eu lieu à la maison. Plus de six naissances des 2 dernières années sur dix (66 %) ont eu lieu avec l'assistance d'un prestataire de santé qualifié.
- ***Soins postnatals de la mère :*** Parmi les femmes ayant eu une naissance vivante et/ou un mort-né au cours des 2 années avant l'enquête, près de sept sur dix ont reçu des soins postnatals dans les deux jours qui ont suivi l'accouchement (69 %). Trois femmes sur dix (30 %), n'ont pas eu d'examen postnatal dans les délais recommandés.
- ***Soins postnatals du nouveau-né :*** Parmi les naissances vivantes les plus récentes ayant eu lieu au cours des 2 années avant l'enquête, sept sur dix (70 %) ont reçu des soins postnatals dans les deux jours qui ont suivi l'accouchement.

Les services de soins pendant la grossesse, l'accouchement et à la suite de la naissance sont importants pour la survie et le bien-être de la mère et du nourrisson. Les soins prénatals peuvent réduire les risques de santé pour les mères et leurs nourrissons grâce au suivi des grossesses et au dépistage d'éventuelles complications. Un accouchement dans un établissement de santé, associé à des soins médicaux qualifiés et à de bonnes conditions d'hygiène, réduit le risque de complications et d'infections pendant le travail et l'accouchement. Des soins postnatals en temps approprié permettent de traiter les complications liées à l'accouchement et d'enseigner à la mère comment prendre soin d'elle-même et de son nouveau-né.

Le gouvernement du Mali a adopté plusieurs mesures législatives et règlementaires sur la santé parmi lesquels on peut citer :

- La loi n°02-049 du 22 juillet 2002 portant Loi d'orientation sur la santé au Mali ;
- La Loi n°02-44 du 24 juin 2002 relative à la santé de la reproduction ;
- La loi n°06-028 du 29 juin 2006 fixant les règles relatives à la prévention, à la prise en charge et au contrôle du VIH et du sida ;
- Décret N° 05-147 PRM du 31 mars 2005 fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'assistance particulière de l'État aux malades du sida et PVVIH et de la garantie de la confidentialité ;
- Décret N°05-350 du 4 août 2005 relatif à la gratuité de la césarienne ;
- Décret N°10-628/P-RM du 29 novembre 2010 portant gratuité des moyens de prévention et de traitement du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans et chez la femme enceinte dans les établissements de santé ;
- Arrêté N°2017-0637 MSHP-SG du 17 mars 2017 relative à la notification des cas de décès maternels, périnatals et néonatals et à l'institutionnalisation des décès maternels, périnatals et néonatals et des cas d'Accidents évités de justesse ou Near miss.

En collaboration avec ses partenaires, le pays a développé et mis en œuvre plusieurs plans, programmes et stratégies en matière de santé maternelle et infantile :

- Le plan décennal de développement sanitaire social (PDDSS) 2014–2023 ;
- Le programme de développement sanitaire et social (PRODESS) III 2014–2018 ;
- Le plan stratégique de la santé de la reproduction (PSSR) 2014–2018 ;
- Le plan stratégique des soins essentiels dans la communauté (SEC) 2014–2018 ;
- Le plan d'action national de la planification familiale (PANPF) 2014–2018 ;
- Le programme national de soins obstétricaux d'Urgence (SOU) ;
- Le programme de prévention de la transmission mère enfant du VIH (PTME) ;
- Le programme élargi de vaccination (PEV) ;
- La stratégie nationale de communication ;
- La stratégie nationale de survie de l'enfant ;
- Le plan d'action de prévention et de prise en charge de la fistule obstétricale 2018–2022 ;
- Le plan stratégique santé des adolescents et des jeunes 2017–2021 ;
- Le plan multisectoriel nutrition ;
- Le plan stratégique hygiène et salubrité.

Ces plans sont mis à œuvre à travers plusieurs stratégies d'intervention et mesures novatrices, entre autres :

- L'organisation du système de référence/évacuation pour la prise en charge des urgences obstétricales dans tous les districts sanitaires ;
- L'extension des soins obstétricaux et néonatals d'urgence (SONU) ;
- La prise en charge gratuite de la césarienne dans les établissements publics hospitaliers, les centres de santé de référence de cercle (CSREF), et les établissements du service de santé des armées ;
- L'offre des soins essentiels au nouveau-né et la prise en charge de nouveau-nés prématurés à travers les soins mère kangourou ;
- La prise en charge gratuite du paludisme chez les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans ;

- Les distributions gratuites des moustiquaires imprégnées d'insecticide aux femmes enceintes et aux enfants correctement et complètement vaccinés ;
- L'institutionnalisation de la campagne nationale en faveur de la planification familiale depuis 2005 ;
- L'offre de service de PF en stratégie avancée, en équipes mobiles et la distribution à base Communautaire de contraceptifs ;
- La mise en place de sites de prévention de la transmission du VIH mère-enfant (sites PTME) ;
- La prise en charge intégrée des maladies de l'enfant (PCIME) ;
- La mise en œuvre des soins essentiels dans la communauté SEC ;
- La mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de prise en charge de la fistule obstétricale ;
- Le dépistage et la prise en charge du cancer du col de l'utérus ;
- La surveillance des décès maternels, périnatals et néonatals y compris l'audit de ces décès ;
- L'offre des soins après avortement (SAA) ;
- L'intensification des activités de la planification familiale dans les structures de santé, en stratégies fixe et mobile ;
- La médicalisation de certains CSCOM (Mise à disposition de personnel qualifié) ;
- La mise en œuvre du programme élargi de vaccination (femmes enceintes et enfants de moins de 5 ans) ;
- Le renforcement des activités de communication pour orienter tous les accouchements vers les formations sanitaires à temps ;
- Le développement des mécanismes de financement alternatif (caisse de solidarité, mutuelle de santé, RAMED et AMO).

Le Gouvernement du Mali met tout en œuvre par des interventions-clés et efficaces afin d'améliorer la santé maternelle et celle du nouveau-né à travers la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique, en partenariat avec d'autres structures telles que les ministères en charge du développement social, de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, de la population, de l'éducation, et de la jeunesse. La division santé de la reproduction en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers a développé et mis en œuvre plusieurs politiques et stratégies en matière de santé reproductive pour la réalisation des objectifs.

Ce chapitre présente certains indicateurs actuels de santé maternelle et néonatale. En outre, la comparaison avec les résultats des enquêtes précédentes permet de retracer les tendances de ces indicateurs et, par conséquent, d'évaluer aussi l'impact des politiques et programmes mis en œuvre.

La première partie de ce chapitre présente des informations sur les prestataires de soins prénatals, le nombre et le calendrier des visites prénatales, ainsi que sur les différentes composantes des soins. La deuxième partie est axée sur l'accouchement et présente des informations sur le lieu de l'accouchement, l'assistance au cours de l'accouchement et les accouchements par césarienne. La troisième partie est centrée sur les soins postnatals et présente des informations sur les contrôles de l'état de santé des mères et des nouveau-nés, ainsi que sur l'implication des hommes dans les soins de santé maternelle. La dernière partie aborde des sujets qui ont une incidence sur la santé des femmes, indépendamment de leur statut

maternel : tests de dépistage du cancer du sein ou du col de l'utérus, problèmes pour accéder aux soins de santé et distance entre leur domicile et l'établissement de santé le plus proche.

9.1 COUVERTURE SANITAIRE ET CONTENU SPÉCIFIQUE DES SOINS PRÉNATALS

9.1.1 Prestataires qualifiés

Soins prénatals dispensés par un prestataire qualifié

Soins, relatifs à la grossesse, reçus de prestataires qualifiés, comme les médecins et les infirmières obstétriciennes/sages-femmes.

Échantillon : Femmes de 15–49 ans ayant eu une naissance vivante ou un mort-né au cours des 2 années précédant l'enquête.

Le **Tableau 9.1** présente la répartition des femmes de 15–49 ans qui ont eu une naissance vivante et/ou un mort-né au cours des 2 années ayant précédé l'enquête par type de prestataire de santé vu au cours de la grossesse selon certaines caractéristiques sociodémographiques. Rappelons que les données concernent seulement les dernières naissances des deux dernières années. Lors de l'enquête, toutes les catégories de personnes consultées par la mère pendant la grossesse ont été enregistrées, mais seule la personne la plus qualifiée a été retenue dans ce tableau.

Les résultats montrent qu'au Mali, 69 % des femmes de 15–49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des 2 années avant l'enquête ont reçu des soins prénatals dispensés par un prestataire qualifié, en majorité par une infirmière obstétricienne/sage-femme (60 %). Pour 16 % des femmes, c'est une matrone qui a fourni les soins prénatals. Lorsque l'accouchement s'est terminé par un mort-né, 62 % des femmes ont reçu des soins dispensés par un prestataire qualifié.

Une proportion non négligeable de femmes ayant eu une naissance vivante et/ou un mort-né au cours des 2 années ayant précédé l'enquête (14 %) n'a reçu aucun soin prénatal (**Tableau 9.1**). Cette proportion est beaucoup plus élevée lorsque l'issue de la grossesse est un mort-né puisqu'elle concerne un quart des femmes (25 %).

Entre 1987 et 2023–2024, le pourcentage de femmes ayant reçu des soins dispensés par un médecin est passée de moins d'un pour cent à 10 %. Dans la même période, le pourcentage de femmes ayant reçu des soins dispensés par des infirmières/sage-femmes a globalement augmenté de 32 % en 1987 à 75 % en 2018 avant de diminuer en 2023–2024 pour s'établir à 60 %. Sur la même période, on note une très nette baisse de la proportion des femmes qui n'ont reçu aucun soin prénatal d'un prestataire qualifié, passant de 64 % en 1987 à 14 % en 2023–2024.

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage de femmes ayant reçu des soins prénatals dispensés par un prestataire qualifié diminue avec l'augmentation de l'âge des femmes, passant de 71 % parmi les moins de 20 ans à 66 % parmi celles de 35–49 ans.
- Le pourcentage de femmes ayant reçu des soins prénatals par un prestataire qualifié diminue avec le rang de naissance de l'enfant, passant de 75 % pour le rang 1 à 61 % pour les rangs 6 ou plus.
- Le pourcentage de femmes ayant reçu des soins prénatals par un prestataire qualifié est plus élevé en milieu urbain (92 %) qu'en milieu rural (63 %).
- On observe des variations importantes selon les régions. Si, à Bamako, pratiquement toutes les femmes (98 %) ont bénéficié d'un suivi prénatal par du personnel qualifié, ce pourcentage n'est que de seulement 54 % à Sikasso et Tombouctou.

- Le suivi prénatal dispensé par un prestataire qualifié augmente avec le niveau d'instruction de la femme, passant de 61 % parmi les femmes n'ayant aucun niveau d'instruction, à 72 % parmi celles ayant le niveau primaire et à 86 % parmi celles ayant le niveau secondaire ou plus.
- Du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, le pourcentage de femmes ayant reçu des soins prénatals par un prestataire qualifié augmente de manière importante, passant de 44 % à 97 %.

9.1.2 Stade de la grossesse et nombre de visites de santé prénatale

Pour être efficaces, les soins prénatals doivent débuter à un stade précoce de la grossesse et se poursuivre avec une certaine régularité jusqu'à l'accouchement. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande au moins 4 visites prénatales et 8 contacts, la première visite devant avoir lieu avant le troisième mois de la grossesse.

Au Mali, environ la moitié des femmes ayant eu une naissance vivante et/ou un mort-né au cours des deux dernières années avant l'enquête (51 %) a effectué, au moins 4 visites prénatales. Cette proportion est beaucoup plus faible parmi les femmes dont la grossesse s'est terminée par un mort-né (37 %) (**Tableau 9.2**).

La proportion des femmes ayant eu une naissance vivante et effectué, au moins 4 visites prénatales, est plus élevée en milieu urbain (71 %) qu'en milieu rural (46 %).

Par ailleurs, seulement 38 % des femmes qui ont eu une naissance vivante et 35 % de femmes dont la grossesse s'est terminée par un mort-né ont effectué leur première visite prénatale au cours du premier trimestre de la grossesse. Ce pourcentage varie de 52 % en milieu urbain contre 34 % en milieu rural pour les femmes qui ont eu une naissance vivante.

La moitié des femmes qui ont eu une naissance vivante au cours de deux dernières années précédant l'enquête et qui ont reçu des soins prénatals ont effectué leur première visite prénatale après 4,3 mois de grossesse. Ce nombre médian est plus élevé à Sikasso (4,9), Gao (4,7) et Ségou (4,6) qu'à Tombouctou (3,9) et Bamako (3,7). Lorsque la grossesse s'est terminée par un mort-né, ce nombre médian de mois est de 4,2.

Tendances : Entre 1995–1996 et 2023–2024, la proportion de femmes qui ont eu une naissance vivante au cours des deux dernières années avant l'enquête et qui ont effectué, au moins 4 visites prénatales a augmenté, passant de 26 % en 1995–1996 à 51 % en 2023–2024 (**Graphique 9.1**).

Graphique 9.1 **Tendances de la couverture en soins prénatals**

Pourcentage de femmes de 15–49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années précédant l'enquête (pour la naissance la plus récente)



9.2 COMPOSANTES DES SOINS PRÉNATALS

Composantes des soins prénatals

Les soins prénatals spécifiques dispensés par un prestataire de soins de santé incluent : la prise de la tension artérielle, un prélèvement d'urine, une prise de sang, l'auscultation des battements du cœur du bébé, des conseils à la mère sur son régime alimentaire, sur l'allaitement et des questions sur d'éventuels saignements vaginaux.

Échantillon—indicateur de la qualité des soins : Femmes de 15–49 ans qui ont eu une naissance vivante ou un mort-né au cours des 2 années précédant l'enquête et qui ont effectué, au minimum, une visite de santé prénatale.

Échantillon—indicateur basé sur la population : Toutes les femmes de 15–49 ans qui ont eu une naissance vivante ou un mort- né au cours des 2 années précédant l'enquête.

L'efficacité des soins prénatals en tant qu'intervention permettant d'identifier les problèmes au cours de la grossesse qui sont susceptibles de nuire à l'issue de la grossesse, dépend, en grande partie, des éléments fournis par le prestataire de soins dans ce domaine.

Dans le cadre de la santé prénatale, certaines interventions et certains tests sont recommandés à chaque contact. Il s'agit notamment de :

- **Mesure de la tension artérielle.** Il est essentiel de prendre la tension artérielle d'une femme à chaque visite prénatale pour déceler l'hypertension gestationnelle ou la prééclampsie.
- **Analyses d'urine et de sang.** Ces tests dépistent des signes d'infection ou d'autres maladies et troubles qui pourraient nuire à la mère ou à son bébé, pendant ou après la grossesse.
- **Écouter les battements de cœur du bébé.** Cela permet de confirmer que le fœtus est vivant et ainsi de réconforter la mère.
- **Des conseils en matière de nutrition maternelle, plus précisément sur une alimentation saine pendant la grossesse et l'allaitement.** Ces messages/ conseils favorisent une prise de poids saine pendant la grossesse et aideront un allaitement précoce du nouveau-né par sa mère.
- **Des questions concernant d'éventuels saignements vaginaux.** Des saignements légers ou des métrorragies sont courants, surtout pendant les premiers mois de la grossesse. Des saignements abondants peuvent être le signe d'un problème plus grave ; une femme enceinte qui saigne abondamment devra consulter un prestataire de soins de santé professionnel.

Au cours de l'EDSM-VII, les données recueillies sur les composantes de la santé prénatale sont calculées de deux façons. Le **Tableau 9.3.1** présente le pourcentage de femmes ayant reçu certains soins prénatals parmi les femmes ayant eu une naissance vivante ou un mort-né au cours des 2 années précédant l'enquête et qui ont déclaré avoir effectué, au minimum, une visite prénatale ; ce tableau fournit un indicateur de mesure de la qualité des services de santé prénatale dont ont bénéficié ces femmes. Le **Tableau 9.3.2** présente le pourcentage de femmes ayant reçu certains services de santé prénatale parmi toutes les femmes ayant eu une naissance vivante ou un mort-né au cours des 2 dernières années, qu'elles aient ou pas déclaré avoir effectué une visite de santé prénatale. Ce tableau présente un indicateur de mesure de la couverture de ces interventions-clés de santé prénatale pour la population des femmes qui en ont besoin.

La majorité des femmes ayant reçu des soins prénatals pour la naissance la plus récente ayant eu lieu au cours des deux années avant l'enquête, a effectué les examens préventifs les plus courants comme la vérification de la tension artérielle (95 %), l'auscultation des battements cardiaques du bébé (88 %), une analyse de sang (87 %) et une analyse d'urine (82 %). Par contre, les pourcentages de femmes ayant été questionnées sur d'éventuels saignements vaginaux (64 %) ou ayant reçu des conseils sur le plan de la nutrition (64 %) sont un peu plus faibles. De même, seulement 54 % des femmes ont reçu des conseils sur l'allaitement (**Tableau 9.3.1** et **Graphique 9.2**).

Graphique 9.2 Composantes des soins prénatals selon l'issue de la grossesse

Parmi les femmes ayant reçu des soins prénatals pour la naissance la plus récente, pourcentage ayant effectué certains examens ou reçu certains services



Le **Tableau 9.3.2** montre que, pour l'ensemble de toutes les femmes ayant eu une naissance au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, les pourcentages de celles ayant reçu les différents examens prénatals sont plus faibles : par exemple, 82 % ont eu la tension artérielle vérifiée et pour 76 % d'entre elles, les battements cardiaques du bébé ont été auscultés ; seulement 71 % ont eu un prélèvement d'urine et 75 % une analyse de sang ou d'urine. Parmi toutes ces femmes, moins d'une sur deux (47 %) a reçu des conseils sur l'allaitement.

Tendances : Au cours de 15 dernières années, le pourcentage de femmes ayant eu une naissance au cours des 2 années ayant précédé l'enquête et ayant reçu un suivi prénatal pour lesquelles la tension artérielle a été vérifiée, a diminué entre les enquêtes de 2001 et 2018, passant de 85 % à 77 %, pour augmenter lors de l'enquête de 2023–2024 à 95 %. Pour les analyses de sang et d'urine, on constate une amélioration depuis l'enquête de 2018, les pourcentages étant passés, respectivement, de 65 % à 87 % et de 60 % à 82 %.

9.2.1 Prise de vermifuges et supplémentation en fer parmi les femmes enceintes

Pendant la grossesse, les besoins en micronutriments des femmes enceintes sont accrus et elles sont particulièrement exposées à des carences en micronutriments, notamment en fer, principale cause d'anémie. Une anémie grave peut mettre en danger la mère et le bébé en raison d'un risque accru de perte de sang pendant le travail et un risque accru d'accouchement prématuré, de faible poids à la naissance et de mortalité périnatale (Haider et al. 2013). Pour lutter contre l'anémie maternelle, les femmes enceintes reçoivent, par le biais d'interventions, du fer sous forme de sirop ou de pastilles et/ou des suppléments de multimicronutriments contenant du fer (OMS 2016c).

Le **Tableau 9.4** présente les pourcentages de femmes de 15–49 ans qui ont eu une naissance vivante et ou un mort-né au cours des 2 années avant l'enquête et qui ont reçu, au cours de leur grossesse la plus récente, des médicaments contre les vers intestinaux et des suppléments contenant du fer. Le tableau présente aussi le nombre de jours pendant lesquels les femmes ont pris du fer.

Quatre-vingt-cinq pour cent des femmes ayant eu une naissance vivante ont pris des suppléments de fer sous forme de sirop ou de comprimés et dans 57 % des cas, les femmes ont pris des médicaments contre les vers intestinaux. Vingt-deux pour cent des femmes ont pris des suppléments contenant du fer pendant moins de 60 jours et 17 % pendant au moins 180 jours.

Les résultats concernant la prise de médicaments contre les parasites intestinaux ne font pas apparaître de variations importantes. Notons cependant que dans la région de Tombouctou (13 %), le pourcentage de

femmes ayant pris ce type de médicaments est relativement plus faible qu'ailleurs, en particulier par rapport aux régions de Kayes (68 %) et Koulikoro (65 %).

9.2.2 Source des suppléments contenant du fer

Les sources des suppléments contenant du fer fournissent des informations permettant de mieux comprendre les schémas de distribution des suppléments contenant du fer.

Plus de sept femmes ayant eu une naissance vivante et/ou un mort-né sur dix (78 %) ont obtenu les suppléments contenant du fer principalement auprès du secteur public, en majorité dans un centre de santé communautaire (50 %). Une femme sur quatre (25 %) a obtenu les suppléments contenant du fer auprès du secteur privé, essentiellement dans une pharmacie (19 %) (**Tableau 9.5**).

9.3 PROTECTION CONTRE LE TÉTANOS NÉONATAL

Protection contre le tétanos néonatal

Le nombre d'injections d'anatoxine tétanique nécessaires pour protéger un bébé contre le tétanos néonatal dépend des vaccinations reçues par la mère. Une naissance est protégée contre le tétanos néonatal si la mère a reçu l'une des combinaisons suivantes :

- Deux injections d'anatoxine tétanique pendant la grossesse
- Deux injections ou plus, la dernière dans les 3 ans suivant la naissance
- Trois injections ou plus, la dernière dans les 5 ans suivant la naissance
- Quatre injections ou plus, la dernière dans les 10 ans suivant la naissance
- Cinq injections ou plus à tout moment avant l'accouchement

Échantillon : Femmes de 15–49 ans ayant eu une naissance vivante dans les 2 années précédant l'enquête

Le tétanos néonatal sévit toujours dans les pays en développement et particulièrement au Mali. Il est dû dans la plupart des cas à un manque d'hygiène et/ou d'asepsie durant l'accouchement. Cependant, cette maladie est évitable quand la vaccination antitétanique chez les femmes de 15–49 ans est complétée et se maintient à un seuil de 90 % selon l'objectif du Plan Pluriannuel Complet (PPaC) 2017–2021.

La vaccination antitétanique pendant la grossesse est l'une des interventions essentielles, recommandée par les programmes de santé maternelle et infantile, afin d'améliorer les chances de survie des femmes et de leurs nouveau-nés. Il ressort du **Tableau 9.6** que 35 % des femmes ayant eu une naissance vivante au cours des deux dernières années ont reçu, au moins, deux doses de vaccin antitétanique au cours de leur dernière grossesse. et dans 49 % des cas, cette dernière naissance a été protégée contre le tétanos néonatal, soit du fait des vaccinations reçues au cours de cette grossesse, soit du fait de vaccinations antérieures à cette grossesse.

Tendances : De 2006 à 2023–2024, on note une tendance à la baisse de la protection antitétanique. En effet, le pourcentage de femmes dont la dernière naissance vivante a été protégée contre le tétanos néonatal est passé de 54 % en 2006 à 50 % en 2018 et 49 % en 2023–2024.

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage de femmes dont la dernière naissance a été protégée contre le tétanos néonatal est plus élevé en milieu urbain (59 %) qu'en milieu rural (46 %).

- La protection contre le tétanos néonatal augmente avec le niveau d'instruction des femmes, passant de 44 % chez les femmes n'ayant aucun niveau d'instruction, à 51 % chez celles ayant le niveau primaire et à 57 % chez celles ayant le niveau secondaire ou plus.

- C’est dans les ménages du quintile de bien-être économique le plus élevé que la protection contre le tétanos néonatal est la plus élevée : 65 % contre 41 % dans le quintile le plus bas.
- La protection antitétanique néonatale varie entre les régions ; elle est nettement plus faible dans la région de Tombouctou (21 %) que dans le district de Bamako (66 %).

9.4 SERVICES D’ACCOUCHEMENT

9.4.1 Accouchements en établissement de santé

Accouchements en établissement de santé
Les accouchements qui se produisent dans un établissement de santé.
Échantillon : Toutes les naissances vivantes et/ou mort-nés au cours des 2 années précédant l’enquête.

Le droit à la santé est un droit humain fondamental qui signifie que tous les individus doivent avoir accès aux services de santé. Cet accès aux soins de santé est particulièrement important pour accélérer la réduction de la mortalité et de la morbidité chez la mère, le nouveau-né et l’enfant, ce qui constitue une voie vers l’équité et la dignité des femmes et des enfants. Certes, l’accès aux établissements de santé dans les zones rurales est plus difficile que dans les zones urbaines en raison de la distance, de l’inaccessibilité et du manque d’infrastructures appropriées.

Au Mali, un plus de huit naissances vivantes sur dix ayant eu lieu au cours des deux années précédant l’enquête (81 %) ont eu lieu dans un établissement de santé, en majorité dans le secteur public (69 % contre 12 % dans le secteur privé). Près de deux femmes sur dix (19 %) ont accouché à la maison. (**Tableau 9.7**). Parmi les femmes dont la grossesse s’est terminée par un mort-né au cours des deux dernières années, le pourcentage ayant accouché à la maison, est légèrement plus élevé (22 %).

Tendances : Entre 1995–1996 et 2023–2024, la proportion de naissances qui ont eu lieu dans un établissement de santé dans les deux années avant l'enquête a augmenté, passant de 31 % à 81 % ; dans la même période, le pourcentage de femmes ayant accouché à la maison a diminué, passant de 63 % à 19 % (**Graphique 9.3**).

***Graphique 9.3* Lieu d'accouchement : tendances**

Pourcentage de naissances vivantes des 2 années précédant l'enquête



Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- La proportion de naissances ayant eu lieu dans un établissement de santé diminue avec l'âge de la mère à la naissance, passant de 84 % à moins de 20 ans à 77 % parmi les femmes de 35–49 ans.
- La proportion de naissances ayant eu lieu dans un établissement de santé diminue avec le rang de naissance, passant de 88 % pour le rang 1 à 73 % pour les rangs 6 ou plus (**Graphique 9.4**).
- Parmi les grossesses qui n'ont bénéficié d'aucune visite prénatale, 43 % des naissances ont eu lieu dans un établissement de santé contre 91 % quand la mère a effectué au moins 4 visites prénatales.

***Graphique 9.4* Naissances dans un établissement de santé par rang de naissance**

Pourcentage de naissances vivantes des 2 années précédant l'enquête qui se sont déroulées dans un établissement de santé



- La proportion de naissances ayant eu lieu à la maison est nettement plus élevée en milieu rural (23 %) qu'en milieu urbain (4 %).
- Dans les régions, le pourcentage de naissances ayant eu lieu dans un établissement de santé varie de 55 % dans la région de Gao à 92 % dans la région de Koulikoro. Ce pourcentage est de 97 % à Bamako (**Carte 9.1**).

Carte 9.1 Naissances dans un établissement de santé par région

Pourcentage de naissances vivantes des 2 années précédant l'enquête qui se sont déroulées dans un établissement de santé



Note : Pour des raisons d'insécurité, les données de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région et ne sont pas présentées séparément.

9.4.2 Accouchement par césarienne

Cinq pour cent des naissances vivantes et/ou des mort-nés des deux années ayant précédé l'enquête se sont déroulées par césarienne (**Tableau 9.8**).

Tendances : Entre 1995–1996 et 2023–2024, le pourcentage de naissance des deux années avant l'enquête dont l'accouchement a été effectué par césarienne a augmenté, passant de 1 % à 5 %.

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Le recours à la césarienne est plus fréquent parmi les naissances dont la mère a le niveau d'instruction secondaire ou plus (8 %) que parmi celles n'ayant aucun niveau d'instruction (4 %).
- Le pourcentage de naissances dont l'accouchement s'est déroulé par césarienne est deux fois plus élevé en milieu urbain (8 %) qu'en milieu rural (4 %).
- Le pourcentage de naissances par césarienne est nettement plus élevé dans le quintile de bien-être économique le plus élevé que dans les autres (11 % contre 3 % dans le plus bas et 5 % dans le quatrième) (**Graphique 9.5**).

Graphique 9.5 Accouchement par césarienne par quintile de bien-être économique du ménage

Pourcentage de naissances vivantes des 2 années précédant l'enquête dont l'accouchement s'est déroulé par césarienne



9.4.3 Accouchement assisté par du personnel qualifié

Accouchement assisté par du personnel qualifié
Accouchements avec l'aide de médecins et d'infirmières/sage-femmes.
Échantillon : Toutes les naissances vivantes et/ou mort-nés au cours des 2 années précédant l'enquête.

Parmi les naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 2 années avant l'enquête, deux tiers (66 %) ont eu lieu avec l'assistance de personnel qualifié, en majorité par les infirmières ou sage-femmes (55 %) et les médecins (10 %). Dans 4 % des cas, les femmes n'ont bénéficié d'aucune assistance (**Tableau 9.9** et **Graphique 9.6**).

***Graphique 9.6* Assistance à l'accouchement**

Répartition (en %) des naissances des 2 ans précédant l'enquête



Une des stratégies pour maintenir la température du nouveau-né consiste à utiliser la méthode « Contact peau à peau » immédiatement après la naissance. Près de deux nouveau-nés sur cinq (38 %) ont bénéficié de cette méthode immédiatement après la naissance.

Tendances : Le pourcentage de naissances dont l'accouchement a été assisté par un prestataire de santé qualifié a doublé entre les enquêtes de 1987 et 2006 (de 26 % à 52 %) puis a continué d'augmenter jusqu'en 2018 (70 %). Sur la période récente entre 2018 et 2023–2024, il a baissé (66 %).

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- L'assistance à l'accouchement par du personnel qualifié diminue avec l'augmentation du rang de naissance. En effet, il varie de 75 % pour les naissances de rang 1 à 56 % pour celles de rangs 6 ou plus.
- On note des disparités importantes entre les milieux de résidence : 93 % des naissances du milieu urbain se sont déroulées avec l'assistance de personnel qualifié, alors que ce pourcentage n'est que de 58 % en milieu rural.
- Le district de Bamako (97 %) et les régions de Koulikoro (65 %), Ségou (62 %), Mopti (62 %) et Gao (62 %) se distinguent des autres avec des pourcentages relativement élevés de naissances ayant bénéficié d'une assistance par du personnel qualifié. C'est dans la région de Tombouctou (52 %) que ce pourcentage est le plus faible.
- Le pourcentage de naissances dont l'accouchement a été assisté par du personnel qualifié augmente avec le niveau d'instruction de la femme, passant de 56 % parmi celles n'ayant aucun niveau d'instruction à 85 % parmi celle ayant le niveau secondaire ou plus.

- Le pourcentage de naissances ayant bénéficié d'une assistance à l'accouchement par du personnel qualifié augmente avec le niveau de bien-être économique, passant de 39 % dans le quintile le plus bas à 96 % dans le quintile le plus élevé (**Graphique 9.7**).

Graphique 9.7 Assistance à l'accouchement par du personnel qualifié par bien-être économique du ménage

Pourcentage de naissances vivantes des 2 années précédant l'enquête assistées par du personnel qualifié



Durée du séjour dans l'établissement de santé

Le **Tableau 9.10** présente les pourcentages de femmes ayant eu une naissance vivante et/ou un mort-né au cours des 2 années avant l'enquête qui ont accouché dans un établissement de santé par durée de séjour dans l'établissement selon le type d'accouchement. On constate que la durée du séjour dans l'établissement de santé après l'accouchement est nettement plus longue quand l'accouchement a eu lieu par césarienne que par voie normale : 55 % des femmes qui ont accouché par césarienne sont restées au moins 3 jours dans l'établissement de santé contre 3 % parmi celles ayant accouché par voie normale.

9.5 SOINS POSTNATALS

9.5.1 Bilan de santé postnatal des mères

Une proportion importante de décès maternels et de décès de nouveau-nés qui surviennent dans la période néonatale se produisent dans les 48 heures qui suivent l'accouchement. Pour cette raison, il est recommandé par l'OMS que, dans les 2 jours qui suivent l'accouchement, toutes les femmes effectuent une visite postnatale et tous les nouveau-nés reçoivent des soins postnatals.

Parmi les femmes ayant eu une naissance vivante ou un mort-né au cours des 2 dernières années, un peu moins de sept sur dix (69 %) ont reçu des soins postnatals dans les 2 premiers jours après l'accouchement dont la majorité (59 %) moins de 4 heures après l'accouchement. Cependant, 30 % de femmes n'ont jamais reçu de soins postnatals (**Tableau 9.11**).

Tendances : Entre 2012–2013 et 2023–2024, le pourcentage de femmes ayant bénéficié de soins postnatals dans les 48 heures suivant la naissance a augmenté, passant de 40 % en 2012–2013 à 56 % en 2018 puis à 69 % en 2023–2024.

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage de femmes ayant reçu des soins postnatals dans les délais recommandés est nettement plus élevé quand la naissance a eu lieu dans un établissement de santé qu'ailleurs (respectivement 78 % dans le secteur public et 87 % dans le secteur privé contre 26 % ailleurs) (**Graphique 9.8**).

- Ce pourcentage est plus faible en milieu rural (65 %) qu'en milieu urbain (86 %).

- Le pourcentage de femmes ayant reçu des soins postnatals dans les 2 jours après la naissance de l'enfant varie de manière importante entre les régions, les pourcentages les plus élevés étant observés à Bamako (90 %) et dans les régions de Koulikoro (77 %), Mopti (65 %) et Sikasso (65 %) et les plus faibles dans celles de Tombouctou (55 %) et Gao (50 %).

Graphique 9.8 **Soins postnatals selon le lieu de l'accouchement**

Pourcentage des dernières naissances vivantes des 2 années précédant l'enquête pour lesquelles les femmes et les nouveau-nés ont reçu des soins postnatals dans les 2 jours après la naissance



- La couverture en soins postnatals dans les délais recommandés augmente en fonction du niveau d'instruction de la mère, passant de 61 % pour les femmes qui n'ont aucun niveau d'instruction à 84 % parmi celles ayant le niveau secondaire ou plus.

- Le pourcentage de femmes ayant reçu des soins postnatals dans les délais recommandés augmente avec le quintile de bien-être économique, passant de 58 % dans le quintile le plus bas à 87 % dans le quintile le plus élevé.

Type de prestataire de soins pour la mère

Parmi les femmes qui ont eu une naissance vivante au cours des deux années avant l'enquête, on constate que les soins postnatals ont été dispensés par un médecin, une infirmière ou une sage-femme dans 53 % des cas (**Tableau 9.12**).

Composantes des soins postnatals pour la mère

Parmi les femmes ayant reçu des soins postnatals dans les 2 jours suivant la naissance la plus récente ayant eu lieu au cours des deux années avant l'enquête, peu ont bénéficié des examens postnatals recommandés. En effet, une femme sur cinq (20 %) a eu sa tension artérielle mesurée. Le problème des saignements vaginaux a été abordé avec 18 % d'entre elles et 14 % des femmes ont discuté de planification familiale. Le pourcentage de femmes pour lesquelles les trois examens ont été effectués dans les 2 jours suivant la naissance est de 12 %. (**Tableau 9.13**).

9.5.2 Bilan de santé postnatal pour les nouveau-nés

L'état de santé a été examiné dans les 2 jours qui ont suivi la naissance pour sept nouveau-nés sur dix (70 %), mais pour 29 % d'entre eux, il n'y a pas eu d'examen postnatal. Pour 39 % des nouveau-nés, l'examen a été effectué 1–3 heures après la naissance et pour 21 % d'entre eux, il a eu lieu rapidement après la naissance, c'est-à-dire moins d'une heure (**Tableau 9.14**).

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage de nouveau-nés ayant eu un examen postnatal dans les 2 jours ayant suivi la naissance est nettement plus élevé quand l'accouchement a eu lieu dans un établissement de santé qu'ailleurs (respectivement 77 % dans le secteur public et 86 % dans le secteur privé contre 34 % ailleurs) (**Graphique 9.8**).

- La couverture en soins postnatals du nouveau-né varie entre les régions : elle est plus élevée à Bamako (85 %) et dans les régions de Koulikoro (79 %) et Mopti (74 %) et plus faible dans les régions de Tombouctou (53 %) et de Gao (50 %).

Type de prestataire de soins pour les nouveau-nés

Le **Tableau 9.15** indique que dans environ un cas sur deux (52 %), les soins postnatals aux nouveau-nés dans les 2 jours suivant la naissance ont été dispensés par un médecin, une infirmière ou une sage-femme. Dans 13 % cas, ces soins ont été donnés par des matrones.

Composante des soins pour les nouveau-nés

L'enquête a également recueilli des données sur les composantes des soins postnatals des nouveau nés. Plus précisément, on a cherché à savoir si certains actes et si des conseils avaient été dispensés à la mère (l'examen du cordon, la prise de la température, l'observation et/ou le conseil sur l'allaitement, avertir la mère sur les signes de danger/comment reconnaître si l'enfant a besoin de soins médicaux immédiats, et la prise du poids) avaient été effectués dans les 2 jours suivant la naissance. Dans l'ensemble, les cinq actes/conseils ont été dispensés dans les premières 48 heures pour seulement 9 % des dernières naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête (**Tableau 9.16**).

Les examens qui ont été les plus fréquemment effectués sont la pesée (51 %), l'examen du cordon ombilical (22 %) et la vérification de la température (21 %). L'observation de l'allaitement (18 %), les conseils sur l'allaitement (17 %) et les conseils sur les signes de danger (16 %) ont été les moins fréquemment effectués.

9.5.3 Contrôles de santé postnatals pour les mères et les nouveau-nés

Le **Tableau 9.17** présente les pourcentages de femmes et de nouveau-nés qui ont reçu des soins postnatals dans les 2 jours ayant suivi la naissance. Dans 63 % des cas, les mères et les nouveau-nés ont bénéficié d'un suivi postnatal dans les 2 jours ayant suivi la naissance mais dans 24 % des cas, ni la mère, ni le nouveau-né n'ont eu un suivi postnatal. Ce dernier pourcentage est nettement plus élevé quand la naissance a eu lieu ailleurs que dans un établissement de santé (62 % contre 15 %). Les pourcentages de nouveau-nés et de mères qui n'ont bénéficié d'aucun suivi postnatal sont plus élevés dans les régions de Gao (46 %) et Tombouctou (38) que dans les régions de Mopti (22 %), Koulikoro (15 %) ou la capitale Bamako (7 %).

9.6 PARTICIPATION DES HOMMES AUX SOINS DE SANTÉ MATERNELLE

Au cours de l'enquête auprès des hommes, on leur a posé des questions pour évaluer leur participation aux soins de santé maternelle. Le **Tableau 9.18** montre que 90 % des hommes de 15–49 ans dont l'enfant le plus jeune a entre 0 et 2 ans, ont déclaré que la mère de l'enfant avait reçu des soins prénatals durant la grossesse de cet enfant. Parmi les hommes dont la mère de l'enfant de 0–2 ans a reçu des soins postnatals, 53 % ont déclaré qu'ils étaient présents lors de certains de ces examens prénatals. En outre, parmi les hommes de 15–49 ans dont l'enfant le plus jeune a entre 0 et 2 ans, 84 % ont déclaré que leur enfant était né dans un établissement de santé et parmi les hommes dont l'enfant de 0–2 ans est né dans un établissement de santé, 65 % se sont rendus avec la mère de l'enfant dans l'établissement de santé.

9.7 DIFFICULTÉS D'ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ

Difficultés d'accès aux soins de santé

On a demandé aux femmes si les facteurs ci-dessous constituaient un obstacle important limitant leur recherche et leur accès à une consultation pour un avis médical ou pour un traitement pour elles-mêmes lorsqu'elles sont souffrantes :

- Avoir la permission pour aller chez le médecin
- Avoir l'argent pour des conseils ou un traitement
- Distance pour se rendre dans un établissement de santé
- Ne pas vouloir s'y rendre seule

Échantillon : Femmes de 15–49 ans

L'identification des problèmes qui empêchent les femmes d'accéder aux soins de santé quand elles en ont besoin est importante pour la mise en des œuvres de stratégies visant l'instauration de la couverture universelle. Les résultats montrent que plus d'une femme de 15–49 ans sur deux (52 %) ont déclaré avoir au moins un des problèmes d'accès aux soins de santé listés dans l'enquête. Le problème le plus fréquemment reporté est la difficulté d'obtenir l'argent pour se faire soigner (46 %). Ce pourcentage est particulièrement élevé chez les femmes ayant cinq enfants ou plus (52 %), parmi celles de la région de Tombouctou (80 %) et parmi celles dont le ménage est classé dans le quintile le plus bas ou le second (52 %) (**Tableau 9.19**).

Plus d'une femme sur quatre ont cité comme obstacle aux soins de santé la distance à parcourir jusqu'à l'établissement de santé (27 %). Dans la région de Tombouctou, ce pourcentage est de 69 % et dans celle de Gao, de 46 %.

9.8 DISTANCE ET MOYENS DE TRANSPORT POUR SE RENDRE À L'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ LE PLUS PROCHE

Au cours de l'enquête, on a demandé aux femmes combien de minutes il fallait pour se rendre de leur domicile à l'établissement de santé le plus proche et quels moyens de déplacement elles utilisaient pour se rendre dans l'établissement depuis leur domicile. Plus de trois femmes de 15–49 ans sur dix mettent moins de 30 minutes pour effectuer le trajet domicile-établissement de santé le plus proche (61 %). En outre, pour près d'un quart, le trajet est de 30–59 minutes (23 %) ; pour 12 % des femmes, if faut 60 à 119 minutes pour parcourir ce trajet et 4 % doivent effectuer un trajet de 2 heures ou plus pour se rendre dans l'établissement de santé le plus proche de leur domicile (**Tableau 9.20**).

Pour se déplacer jusqu'à l'établissement de santé, 73 % ont déclaré utiliser un moyen non motorisé comme une charrette tirée par un animal, une bicyclette, un bateau sans moteur ou à pied. Dans les régions de Koulikoro, Mopti, Gao et la capitale Bamako, ce pourcentage atteint au moins 77 %. Un peu plus d'un quart des femmes se sont déplacé avec un véhicule motorisé (27 %).

Le temps de trajet est plus long pour les femmes du milieu rural par rapport à celles du milieu urbain, parmi celles sans niveau d'instruction et celles dont le ménage est classé dans le quintile le plus bas. En outre, les résultats montrent que les femmes des régions de Ségou, Tombouctou et Gao ont un temps de trajet plus long que les autres pour atteindre l'établissement de santé le plus proche de leur domicile. En particulier, dans ces deux dernières régions, 14 % des femmes mettent au moins deux heures pour atteindre l'établissement de santé le plus proche et la majorité n'est pas motorisée (respectivement 60 % et 77 %).

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur les soins de santé maternelle, consultez les tableaux suivants :

- **Tableau 9.1 Soins prénatals**
- **Tableau 9.2 Nombre de visites prénatales et stade de la grossesse à la première visite**
- **Tableau 9.3.1 Composantes des soins prénatals parmi les femmes ayant reçu des soins prénatals**
- **Tableau 9.3.2 Composantes des soins prénatals parmi toutes les femmes**
- **Tableau 9.4 Déparasitage et supplémentation contenant du fer pendant la grossesse**
- **Tableau 9.5 Source des suppléments contenant du fer**
- **Tableau 9.6 Vaccination antitétanique**
- **Tableau 9.7 Lieu de l'accouchement**
- **Tableau 9.8 Césarienne**
- **Tableau 9.9 Assistance au cours de l'accouchement**
- **Tableau 9.10 Durée du séjour dans l'établissement de santé après la naissance**
- **Tableau 9.11 Moment où le premier examen postnatal a été dispensé à la mère**
- **Tableau 9.12 Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal à la mère**
- **Tableau 9.13 Contenu des soins postnatals dispensés à la mère**
- **Tableau 9.14 Moment où le premier examen postnatal a été dispensé au nouveau-né**
- **Tableau 9.15 Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal au nouveau-né**
- **Tableau 9.16 Contenu des examens postnatals dispensés aux nouveau-nés**
- **Tableau 9.17 Soins postnatals dispensés à la mère et au nouveau-né**
- **Tableau 9.18 Implication des hommes dans les soins de santé maternelle**
- **Tableau 9.19 Problèmes d'accès aux soins de santé**
- **Tableau 9.20 Distance à l'établissement de soins de santé**

Tableau 9.1 Soins prénatals

Répartition (en %) des femmes de 15–49 ans qui ont eu une naissance vivante et/ou un mort-né au cours des 2 années ayant précédé l'enquête par type de prestataire de soins prénatals vu durant la grossesse ayant abouti à la naissance vivante ou au mort-né le plus récent et pourcentage ayant reçu, pour la naissance vivante ou le mort-né le plus récent, des soins prénatals dispensés par un prestataire de santé qualifié, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Prestataire de soins prénatals								Pourcentage ayant reçu des soins prénatals d'un prestataire qualifié[1]	Effectif de femmes
	Médecin	Infirmière obstétricienne/ sage-femme	Matrone	Agent de santé communautaire	Accoucheuse traditionnelle formée et suivie (ATR)	Accoucheuse traditionnelle	Pas de soins prénatals	Total		
NAISSANCES VIVANTES										
Âge à la naissance										
<20	9,0	62,0	16,6	0,3	0,0	0,0	12,0	100,0	71,0	972
20–34	10,3	59,5	16,2	0,8	0,1	0,1	13,1	100,0	69,7	4 213
35–49	8,3	57,5	16,5	0,9	0,0	0,3	16,5	100,0	65,7	963
Rang de naissance[2]										
1	13,4	61,8	14,8	0,5	0,0	0,0	9,4	100,0	75,2	1 189
2–3	10,6	61,9	15,6	0,5	0,0	0,0	11,5	100,0	72,5	2 050
4–5	9,5	58,3	17,4	0,5	0,2	0,1	14,0	100,0	67,8	1 497
6+	5,8	55,6	17,6	1,4	0,1	0,3	19,2	100,0	61,4	1 413
Résidence										
Bamako	27,2	70,5	0,2	0,0	0,0	0,0	2,1	100,0	97,7	724
Autre urbain	14,7	71,4	9,1	0,1	0,0	0,1	4,7	100,0	86,1	602
Ensemble urbain	21,5	70,9	4,2	0,0	0,0	0,0	3,3	100,0	92,4	1 326
Rural	6,5	56,4	19,7	0,9	0,1	0,1	16,2	100,0	63,0	4 822
Région										
Kayes	11,5	55,5	12,3	0,3	0,0	0,2	20,2	100,0	67,0	958
Koulikoro	7,0	58,3	25,7	0,0	0,1	0,2	8,7	100,0	65,3	1 466
Sikasso	4,0	49,4	29,5	0,2	0,0	0,0	16,8	100,0	53,5	1 202
Ségou	6,4	63,1	14,3	0,3	0,0	0,1	15,8	100,0	69,5	963
Mopti	10,6	72,3	1,2	5,9	0,3	0,2	9,5	100,0	82,9	580
Tombouctou	12,1	41,5	7,4	0,7	0,3	0,0	37,9	100,0	53,6	79
Gao	5,2	62,7	2,0	0,9	0,0	0,0	29,2	100,0	67,9	174
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	100,0	†	3
Bamako	27,2	70,5	0,2	0,0	0,0	0,0	2,1	100,0	97,7	724
Niveau d'instruction										
Aucun	5,2	55,9	19,3	1,1	0,1	0,2	18,3	100,0	61,1	3 513
Primaire	8,7	63,6	16,2	0,5	0,2	0,1	10,7	100,0	72,3	1 078
Secondaire ou plus	20,7	65,1	9,8	0,0	0,0	0,1	4,3	100,0	85,8	1 558
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	2,5	41,6	30,4	1,5	0,1	0,3	23,6	100,0	44,1	1 290
Second	4,2	49,9	23,8	1,4	0,2	0,1	20,4	100,0	54,1	1 253
Moyen	7,0	62,5	16,2	0,5	0,1	0,0	13,7	100,0	69,5	1 237
Quatrième	11,8	73,7	7,7	0,1	0,0	0,1	6,6	100,0	85,5	1 264
Le plus élevé	25,4	71,9	1,5	0,0	0,0	0,0	1,3	100,0	97,2	1 104
Ensemble	9,7	59,6	16,3	0,7	0,1	0,1	13,5	100,0	69,3	6 148
MORT-NÉS										
Ensemble	9,1	52,9	12,1	0,5	0,0	0,4	25,0	100,0	62,1	143
NAISSANCES VIVANTES ET MORT-NÉS[3]										
Ensemble	9,7	59,6	16,3	0,7	0,1	0,1	13,6	100,0	69,2	6 257

Note : Si plus d'un prestataire de soins prénatals a été déclaré, seul celui possédant les qualifications les plus élevées a été pris en compte dans ce tableau. Les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits après une grossesse de 28 semaines ou plus. Quand la durée de la grossesse est déclarée en mois, les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits après une grossesse de 7 mois ou plus.

[1] Sont considérés comme prestataires de soins prénatals qualifiés les médecins et infirmière obstétricienne/sage-femme.

[2] Le rang de naissance fait référence au rang de naissance parmi les naissances vivantes de l'enquêtée.

[3] Pour les femmes qui ont eu une naissance vivante et un mort-né au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, les données sont calculées sur la naissance la plus récente seulement.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 9.2 Nombre de visites prénatales et stade de la grossesse à la première visite

Répartition (en %) des femmes de 15–49 ans qui ont eu une naissance vivante et/ou un mort-né au cours des 2 années ayant précédé l'enquête par nombre de visites prénatales durant la grossesse ayant abouti à la naissance vivante ou au mort-né le plus récent et en fonction du stade de la grossesse au moment de la première visite prénatale; parmi les femmes qui ont eu des soins prénatals, nombre médian de mois de grossesse à la première visite, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Nombre de visites prénatales							Total	4+ visites pré-natales	Nombre de mois de grossesse à la première visite prénatale					Total	Effectif de femmes	Nombre médian de mois de grossesse à la première visite prénatale (pour les femmes ayant reçu des soins prénatals)	Effectif de femmes ayant reçu des soins prénatals
	Aucune	1	2	3	4–7	8+	Ne sait pas			Pas de soins prénatals	<4	4–6	7+	Ne sait pas				
	NAISSANCES VIVANTES																	
Âge à la naissance																		
<20	12,0	5,6	12,2	19,0	46,9	3,6	0,6	100,0	50,5	12,0	39,4	40,7	7,6	0,3	100,0	972	4,3	856
20–34	13,1	4,6	10,0	19,7	48,1	4,3	0,2	100,0	52,3	13,1	39,1	40,5	7,0	0,3	100,0	4 213	4,3	3 662
35–49	16,5	5,2	11,7	19,0	43,4	4,0	0,0	100,0	47,4	16,5	31,8	42,7	8,9	0,2	100,0	963	4,6	804
Rang de naissance[1]																		
1	9,4	4,5	10,9	17,5	52,1	5,1	0,5	100,0	57,2	9,4	47,2	35,4	7,6	0,5	100,0	1 189	3,9	1 077
2–3	11,5	4,4	9,8	19,8	49,5	4,8	0,3	100,0	54,2	11,5	40,5	41,4	6,4	0,2	100,0	2 050	4,2	1 815
4–5	14,0	4,4	11,2	19,9	46,0	4,5	0,1	100,0	50,5	14,0	36,0	42,8	7,1	0,2	100,0	1 497	4,4	1 288
6+	19,2	6,3	11,1	20,4	40,8	2,0	0,2	100,0	42,8	19,2	28,8	42,7	9,0	0,2	100,0	1 413	4,7	1 142
Résidence																		
Bamako	2,1	1,7	4,5	11,2	66,7	13,1	0,7	100,0	79,8	2,1	58,2	35,3	4,5	0,0	100,0	724	3,7	708
Autre urbain	4,7	3,5	9,8	21,7	53,8	6,0	0,5	100,0	59,8	4,7	43,4	43,5	8,2	0,1	100,0	602	4,3	574
Ensemble urbain	3,3	2,5	6,9	16,0	60,8	9,9	0,6	100,0	70,7	3,3	51,5	39,0	6,2	0,1	100,0	1 326	3,9	1 282
Rural	16,2	5,5	11,7	20,5	43,4	2,6	0,2	100,0	46,0	16,2	34,3	41,4	7,7	0,3	100,0	4 822	4,5	4 039
Région																		
Kayes	20,2	4,2	11,1	18,1	42,5	3,7	0,3	100,0	46,2	20,2	38,7	35,8	5,2	0,2	100,0	958	4,1	764
Koulikoro	8,7	4,5	6,3	18,0	58,4	3,9	0,3	100,0	62,3	8,7	40,1	44,7	6,4	0,1	100,0	1 466	4,3	1 339
Sikasso	16,8	6,2	15,5	21,4	38,3	1,8	0,1	100,0	40,1	16,8	26,1	45,2	11,3	0,5	100,0	1 202	4,9	1 000
Ségou	15,8	5,4	13,1	23,1	40,4	1,9	0,1	100,0	42,4	15,8	32,3	41,6	10,1	0,1	100,0	963	4,6	811
Mopti	9,5	7,4	13,3	25,6	40,5	3,7	0,0	100,0	44,2	9,5	44,9	38,7	6,1	0,8	100,0	580	4,0	525
Tombouctou	37,9	5,8	15,5	19,3	18,4	1,3	1,7	100,0	19,7	37,9	32,0	27,1	2,6	0,4	100,0	79	3,9	49
Gao	29,2	3,8	12,2	21,2	30,3	2,9	0,4	100,0	33,2	29,2	26,5	38,9	5,1	0,3	100,0	174	4,7	124
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	100,0	†	†	†	†	†	†	100,0	3	†	2
Bamako	2,1	1,7	4,5	11,2	66,7	13,1	0,7	100,0	79,8	2,1	58,2	35,3	4,5	0,0	100,0	724	3,7	708
Niveau d'instruction																		
Aucun	18,3	5,9	12,8	20,1	40,6	2,1	0,2	100,0	42,7	18,3	30,0	42,2	9,1	0,3	100,0	3 513	4,7	2 868
Primaire	10,7	4,9	10,9	20,4	48,8	3,9	0,4	100,0	52,7	10,7	39,7	41,9	7,3	0,4	100,0	1 078	4,3	962
Secondaire ou plus	4,3	2,5	5,7	17,3	60,9	8,8	0,4	100,0	69,7	4,3	54,9	37,1	3,6	0,1	100,0	1 558	3,8	1 491
Quintile de bien-être économique																		
Le plus bas	23,6	7,7	13,8	20,6	33,1	1,3	0,1	100,0	34,4	23,6	26,0	39,5	10,7	0,3	100,0	1 290	4,9	986
Second	20,4	5,4	12,1	21,4	38,6	2,0	0,0	100,0	40,6	20,4	30,1	42,4	6,7	0,3	100,0	1 253	4,6	997
Moyen	13,7	5,5	14,2	20,5	44,0	1,9	0,3	100,0	45,9	13,7	36,1	41,9	8,0	0,2	100,0	1 237	4,4	1 067
Quatrième	6,6	3,9	7,9	21,0	56,7	3,3	0,4	100,0	60,1	6,6	39,0	47,1	7,0	0,4	100,0	1 264	4,4	1 181
Le plus élevé	1,3	1,3	4,4	13,2	65,8	13,4	0,6	100,0	79,2	1,3	62,1	32,3	4,2	0,2	100,0	1 104	3,6	1 090
Ensemble	13,5	4,9	10,7	19,5	47,1	4,1	0,3	100,0	51,3	13,5	38,0	40,9	7,4	0,3	100,0	6 148	4,3	5 321

À suivre…

Tableau 9.2—*Suite*

Caractéristique sociodémographique	Nombre de visites prénatales							Total	4+ visites pré-natales	Nombre de mois de grossesse à la première visite prénatale					Total	Effectif de femmes	Nombre médian de mois de grossesse à la première visite prénatale (pour les femmes ayant reçu des soins prénatals)	Effectif de femmes ayant reçu des soins prénatals
	Aucune	1	2	3	4–7	8+	Ne sait pas			Pas de soins prénatals	<4	4–6	7+	Ne sait pas				
										MORT-NÉS								
Ensemble	25,0	8,2	12,6	16,6	35,7	1,7	0,3	100,0	37,4	25,0	35,2	33,2	6,7	0,0	100,0	143	4,2	107
										NAISSANCES VIVANTES ET MORT-NÉS[2]								
Ensemble	13,6	5,0	10,7	19,5	46,9	4,1	0,3	100,0	51,0	13,6	38,0	40,8	7,4	0,3	100,0	6 257	4,3	5 408

Note : Les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits après une grossesse de 28 semaines ou plus. Quand la durée de la grossesse est déclarée en mois, les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits après une grossesse de 7 mois ou plus.
[1] Le rang de naissance fait référence au rang de naissance parmi les naissances vivantes de l'enquêtée.
[2] Pour les femmes qui ont eu une naissance vivante et un mort-né au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, les données sont calculées sur la naissance la plus récente seulement.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 9.3.1 Composantes des soins prénatals parmi les femmes ayant reçu des soins prénatals

Parmi les femmes de 15–49 ans ayant reçu des soins prénatals pour la naissance vivante et/ou le mort-né le plus récent ayant eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant reçu des services prénatals spécifiques dispensés par un prestataire de santé, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Parmi les femmes ayant reçu des soins prénatals pour leur naissance vivante et/ou leur mort-né le plus récent, pourcentage ayant reçu des services prénatals spécifiques durant leurs visites prénatales dispensées par un prestataire de santé qualifié :							Effectif de femmes ayant reçu des soins prénatals pour la naissance vivante et/ou le mort-né le plus récent ayant eu lieu au cours des 2 dernières années
	Pression artérielle mesurée	Échantillon d'urine prélevé	Échantillon de sang prélevé	Battements cardiaques du bébé écoutés	Conseils donnés sur l'alimentation de la mère	Conseils donnés sur l'allaitement	Questions sur des saignements vaginaux posées	
NAISSANCES VIVANTES								
Âge à la naissance								
<20	94,7	82,1	86,0	86,8	58,9	49,3	60,0	856
20–34	94,3	82,8	87,3	88,4	63,8	54,5	64,7	3 662
35–49	95,7	79,8	85,9	88,9	67,4	58,0	66,6	804
Rang de naissance[1]								
1	94,9	84,9	89,7	89,9	62,6	51,8	62,0	1 077
2–3	94,4	81,5	86,0	87,8	62,3	52,6	65,3	1 815
4–5	94,6	84,1	88,7	89,5	65,0	56,5	64,6	1 288
6+	94,7	78,9	83,7	86,0	65,0	56,4	64,2	1 142
Résidence								
Bamako	96,7	91,3	95,7	93,5	56,8	47,2	69,7	708
Autre urbain	97,7	85,5	91,6	89,7	72,6	63,0	68,6	574
Ensemble urbain	97,1	88,7	93,9	91,8	63,9	54,3	69,2	1 282
Rural	93,8	80,2	84,7	87,1	63,5	54,2	62,6	4 039
Région								
Kayes	95,5	81,8	81,3	85,3	65,3	51,5	57,2	764
Koulikoro	96,0	82,8	88,6	84,8	63,4	58,2	66,9	1 339
Sikasso	95,8	87,5	87,3	93,7	68,5	56,8	68,0	1 000
Ségou	89,5	70,0	81,8	87,5	61,7	50,0	61,3	811
Mopti	92,1	77,1	85,4	83,7	63,8	56,4	58,2	525
Tombouctou	96,0	79,9	78,5	84,4	48,3	41,3	39,5	49
Gao	96,3	87,7	92,9	95,6	71,1	69,6	69,8	124
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	2
Bamako	96,7	91,3	95,7	93,5	56,8	47,2	69,7	708
Niveau d'instruction								
Aucun	93,3	79,7	85,1	86,5	63,0	53,2	61,8	2 868
Primaire	93,8	80,4	83,1	86,8	60,2	51,2	60,7	962
Secondaire ou plus	97,5	88,5	92,8	92,6	66,8	58,1	71,1	1 491
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	92,8	76,2	84,9	85,2	61,4	54,0	60,1	986
Second	91,7	77,5	79,6	83,7	61,1	53,0	60,4	997
Moyen	92,2	77,9	81,0	84,5	61,7	50,5	61,2	1 067
Quatrième	97,7	85,6	91,1	91,7	66,1	55,9	66,6	1 181
Le plus élevé	97,9	92,8	96,6	95,1	66,9	57,2	71,8	1 090
Ensemble	94,6	82,3	86,9	88,3	63,6	54,2	64,2	5 321
MORT-NÉS								
Ensemble	96,4	84,2	81,2	87,7	53,8	40,4	55,9	107
NAISSANCES VIVANTES ET MORT-NÉS[2]								
Ensemble	94,6	82,3	86,8	88,3	63,4	54,0	64,0	5 408

Note : Le dénominateur de ce tableau comprend toutes les femmes ayant eu une naissance au cours des 2 années ayant précédé l'enquête et qui ont reçu des soins prénatals pour cette naissance. Les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits après une grossesse de 28 semaines ou plus. Quand la durée de la grossesse est déclarée en mois, les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits après une grossesse de 7 mois ou plus.

[1] Le rang de naissance fait référence au rang de naissance parmi les naissances vivantes de l'enquêtée.

[2] Pour les femmes qui ont eu une naissance vivante et un mort-né au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, les données sont calculées sur la naissance la plus récente seulement.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 9.3.2 Composantes des soins prénatals parmi toutes les femmes

Parmi toutes les femmes de 15–49 ans ayant eu une naissance vivante et/ou un mort-né au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant reçu des services prénatals spécifiques dispensés par un prestataire de santé pour la naissance vivante et/ou le mort-né le plus récent, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Parmi les femmes ayant reçu des soins prénatals pour leur naissance vivante et/ou leur mort-né le plus récent, pourcentage ayant reçu des services prénatals spécifiques durant leurs visites prénatales dispensées par un prestataire de santé qualifié :							Effectif de femmes ayant eu une naissance vivante et/ou un mort-né au cours des 2 dernières années
	Pression artérielle mesurée	Échantillon d'urine prélevé	Échantillon de sang prélevé	Battements cardiaques du bébé écoutés	Conseils donnés sur l'alimentation de la mère	Conseils donnés sur l'allaitement	Questions sur des saignements vaginaux posées	
NAISSANCES VIVANTES								
Âge à la naissance								
<20	83,3	72,2	75,7	76,4	51,8	43,4	52,8	972
20–34	82,0	72,0	75,9	76,9	55,5	47,4	56,2	4 213
35–49	79,9	66,7	71,7	74,2	56,3	48,4	55,6	963
Rang de naissance[1]								
1	86,0	76,9	81,3	81,4	56,7	47,0	56,2	1 189
2–3	83,6	72,2	76,1	77,7	55,1	46,6	57,8	2 050
4–5	81,4	72,4	76,4	77,0	55,9	48,6	55,5	1 497
6+	76,5	63,7	67,6	69,5	52,5	45,6	51,9	1 413
Résidence								
Bamako	94,6	89,4	93,6	91,5	55,6	46,2	68,2	724
Autre urbain	93,1	81,5	87,4	85,5	69,2	60,1	65,4	602
Ensemble urbain	94,0	85,8	90,8	88,8	61,8	52,5	66,9	1 326
Rural	78,6	67,2	70,9	73,0	53,2	45,4	52,4	4 822
Région								
Kayes	76,2	65,2	64,9	68,1	52,1	41,1	45,6	958
Koulikoro	87,7	75,7	80,9	77,5	57,9	53,2	61,1	1 466
Sikasso	79,6	72,8	72,6	77,9	56,9	47,2	56,6	1 202
Ségou	75,3	59,0	68,9	73,6	52,0	42,1	51,6	963
Mopti	83,4	69,7	77,3	75,8	57,7	51,1	52,7	580
Tombouctou	59,6	49,6	48,7	52,4	30,0	25,6	24,5	79
Gao	68,2	62,1	65,8	67,7	50,3	49,3	49,4	174
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	3
Bamako	94,6	89,4	93,6	91,5	55,6	46,2	68,2	724
Niveau d'instruction								
Aucun	76,2	65,0	69,5	70,6	51,4	43,4	50,5	3 513
Primaire	83,8	71,7	74,1	77,5	53,8	45,7	54,2	1 078
Secondaire ou plus	93,4	84,7	88,8	88,6	63,9	55,6	68,0	1 558
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	70,9	58,2	64,9	65,1	47,0	41,3	45,9	1 290
Second	73,0	61,7	63,4	66,6	48,6	42,2	48,0	1 253
Moyen	79,5	67,2	69,9	72,9	53,2	43,6	52,8	1 237
Quatrième	91,2	79,9	85,1	85,7	61,7	52,2	62,2	1 264
Le plus élevé	96,7	91,6	95,3	93,9	66,1	56,5	70,9	1 104
Ensemble	81,9	71,2	75,2	76,4	55,0	46,9	55,6	6 148
MORT-NÉS								
Ensemble	72,3	63,2	61,0	65,8	40,4	30,3	41,9	143
NAISSANCES VIVANTES ET MORT-NÉS[2]								
Ensemble	81,8	71,1	75,0	76,3	54,8	46,7	55,3	6 257

Note : Le dénominateur de ce tableau comprend toutes les femmes ayant eu une naissance au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, qu'elles aient reçu ou non des soins prénatals pour cette naissance. Les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits après une grossesse de 28 semaines ou plus. Quand la durée de la grossesse est déclarée en mois, les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits après une grossesse de 7 mois ou plus.

[1] Le rang de naissance fait référence au rang de naissance parmi les naissances vivantes de l'enquêtée.

[2] Pour les femmes qui ont eu une naissance vivante et un mort-né au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, les données sont calculées sur la naissance la plus récente seulement.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 9.4 Déparasitage et supplémentation contenant du fer pendant la grossesse

Parmi les femmes de 15–49 ans ayant eu une naissance vivante ou un mort-né au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant pris des médicaments pour le déparasitage et pourcentage ayant pris des suppléments contenant du fer pendant la grossesse de la naissance vivante ou du mort-né le plus récent, et répartition (en %) par nombre de jours pendant lesquels les femmes de 15–49 ans ayant eu une naissance vivante ou un mort-né dans les 2 années ayant précédé l'enquête ont pris des suppléments contenant du fer pendant la grossesse de la naissance vivante ou du mort-né le plus récent, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Parmi les femmes ayant eu une naissance vivante et/ou mort-né au cours des 2 dernières années, pourcentage qui, pendant la grossesse de la naissance vivante et/ou du mort-né le plus récent, ont :		Nombre de jours pendant lesquels les femmes ayant eu une naissance vivante et/ou mort-né dans les 2 dernières années ont pris des suppléments contenant du fer[1] pendant la grossesse de la naissance vivante et/ou du mort-né le plus récent :							Effectif de femmes ayant eu une naissance vivante et/ou un mort-né au cours des 2 dernières années
	Pris des médicaments pour le déparasitage	Pris des suppléments contenant du fer[1]	Aucune	<60	60–89	90–179	180+	Ne sait pas	Total	
NAISSANCES VIVANTES										
Âge à la naissance										
<20	53,5	86,6	13,4	29,5	10,1	29,7	14,1	3,2	100,0	972
20–34	58,1	85,8	14,2	21,3	11,9	32,0	18,1	2,5	100,0	4 213
35–49	56,3	80,8	19,2	19,7	10,5	33,0	15,9	1,8	100,0	963
Rang de naissance[2]										
1	56,7	89,8	10,2	25,1	10,6	29,2	21,0	3,9	100,0	1 189
2–3	56,6	87,0	13,0	21,0	11,6	32,4	19,0	2,9	100,0	2 050
4–5	59,8	84,5	15,5	21,5	11,4	34,2	16,0	1,5	100,0	1 497
6+	55,1	79,2	20,8	22,8	11,7	30,4	12,5	1,8	100,0	1 413
Résidence										
Bamako	42,9	96,7	3,3	4,5	6,7	35,3	49,0	1,3	100,0	724
Autre urbain	65,1	92,1	7,9	23,2	9,3	32,7	21,6	5,2	100,0	602
Ensemble urbain	53,0	94,6	5,4	13,0	7,9	34,1	36,5	3,1	100,0	1 326
Rural	58,2	82,5	17,5	24,9	12,3	31,1	11,8	2,4	100,0	4 822
Région										
Kayes	67,7	79,6	20,4	32,8	11,9	23,2	11,1	0,7	100,0	958
Koulikoro	65,1	88,6	11,4	13,1	11,1	39,1	19,9	5,4	100,0	1 466
Sikasso	54,2	83,8	16,2	35,0	12,0	25,8	7,6	3,4	100,0	1 202
Ségou	51,3	81,5	18,5	24,0	11,5	34,5	11,5	0,0	100,0	963
Mopti	59,2	87,9	12,1	25,8	15,8	34,0	10,7	1,5	100,0	580
Tombouctou	12,6	60,1	39,9	12,3	19,3	21,2	5,2	2,1	100,0	79
Gao	54,3	70,3	29,7	13,4	6,9	27,1	19,1	3,8	100,0	174
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	†	100,0	3
Bamako	42,9	96,7	3,3	4,5	6,7	35,3	49,0	1,3	100,0	724
Niveau d'instruction										
Aucun	53,6	80,2	19,8	23,5	13,1	30,0	11,9	1,8	100,0	3 513
Primaire	58,7	87,3	12,7	26,2	10,2	33,6	14,6	2,8	100,0	1 078
Secondaire ou plus	63,7	94,7	5,3	17,0	8,4	34,5	30,9	4,0	100,0	1 558
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	53,7	76,1	23,9	27,4	14,8	25,6	6,6	1,7	100,0	1 290
Second	56,3	79,0	21,0	24,3	13,7	31,8	6,8	2,3	100,0	1 253
Moyen	55,3	84,2	15,8	28,3	11,4	30,3	12,0	2,2	100,0	1 237
Quatrième	61,6	91,0	9,0	20,5	9,5	37,6	20,3	2,9	100,0	1 264
Le plus élevé	58,5	97,0	3,0	9,5	6,7	33,8	43,4	3,5	100,0	1 104
Ensemble	57,1	85,1	14,9	22,3	11,4	31,8	17,2	2,5	100,0	6 148
MORT-NÉS										
Ensemble	41,1	73,7	26,3	16,2	15,6	26,9	14,3	0,7	100,0	143
NAISSANCES VIVANTES ET MORT-NÉS[3]										
Ensemble	56,8	85,0	15,0	22,3	11,4	31,7	17,1	2,5	100,0	6 257

Note : Les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits après une grossesse de 28 semaines ou plus. Quand la durée de la grossesse est déclarée en mois, les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits après une grossesse de 7 mois ou plus.

[1] Comprimés de fer et sirop ou ACFOL

[2] Le rang de naissance fait référence au rang de naissance parmi les naissances vivantes de l'enquêtée.

[3] Pour les femmes qui ont eu une naissance vivante et un mort-né au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, les données sont calculées sur la naissance la plus récente seulement.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 9.5 Source des suppléments contenant du fer

Parmi les femmes de 15–49 ans ayant eu une naissance vivante et/ou un mort-né au cours des 2 années ayant précédé l'enquête à qui on a donné ou qui ont acheté des suppléments contenant du fer au cours de la grossesse de la naissance vivante ou du mort-né le plus récent, pourcentage ayant obtenu ces suppléments, selon la source, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Pourcentage ayant obtenu des suppléments contenant du fer de chacune des sources[1] :		
Source	Naissance vivantes	Mort-nés	Naissance vivantes et mort-nés[2]
Secteur médical public	77,4	82,9	77,5
Pharmacie hospitalière	13,9	8,6	13,8
Dépôts de vente de médicaments/Centre de santé de référence/CSREF	5,9	5,7	5,9
Dépôts de vente de médicaments/Centre de santé communautaire/CSCOM	49,4	57,8	49,5
Dispensaire/Maternité	6,6	7,8	6,6
Infirmerie de garnison militaire	0,2	0,0	0,2
Centre médicaux inter-entreprises (CMIE/INPS)	0,0	0,0	0,0
Agent de santé communautaire (ASC)/relais	2,4	4,3	2,4
Autre secteur médical public	0,0	0,0	0,0
Secteur médical privé	24,7	22,9	24,7
Hôpital/Clinique privé	4,3	6,4	4,4
Centre confessionnel	0,4	0,0	0,4
Cabinet médical	0,9	1,4	0,9
Cabinet de soin privé	1,0	0,0	1,0
Pharmacie	18,6	15,1	18,5
Secteur médical ONG	0,2	0,0	0,2
Hôpital ONG	0,0	0,0	0,0
Clinique ONG	0,1	0,0	0,1
Autre source	0,2	0,0	0,2
Boutique	0,0	0,0	0,0
Vendeur de médicaments ambulants	0,1	0,0	0,1
Guérisseur/praticien traditionnel	0,0	0,0	0,0
Marché	0,0	0,0	0,0
Autre	0,2	0,0	0,2
Effectif de femmes	5 255	105	5 339

Note : Les suppléments peuvent être obtenus auprès de plus d'une source. Les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits après une grossesse de 28 semaines ou plus. Quand la durée de la grossesse est déclarée en mois, les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits après une grossesse de 7 mois ou plus.
ASC = Agent de santé communautaire
ONG = Organisation non gouvernementale
[1] Comprimés de fer et sirop ou ACFOL
[2] Pour les femmes qui ont eu une naissance vivante et un mort-né au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, les données sont calculées sur la naissance la plus récente seulement.

Tableau 9.6 Vaccination antitétanique

Parmi les femmes de 15–49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant reçu deux injections antitétaniques ou plus au cours de la grossesse de la naissance vivante la plus récente et pourcentage dont la dernière naissance vivante a été protégée contre le tétanos néonatal, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant reçu deux injections ou plus durant la grossesse de la naissance vivante la plus récente	Pourcentage dont la naissance vivante la plus récente est protégée contre le tétanos néonatal[1]	Effectif de femmes
Âge à la naissance			
<20	35,2	41,4	972
20–34	34,4	50,2	4 213
35–49	34,0	50,5	963
Rang de naissance[2]			
1	38,4	44,4	1 189
2–3	34,9	50,7	2 050
4–5	33,7	51,6	1 497
6+	31,4	47,0	1 413
Résidence			
Bamako	35,0	66,2	724
Autre urbain	34,0	50,7	602
Ensemble urbain	34,5	59,2	1 326
Rural	34,5	46,0	4 822
Région			
Kayes	35,4	50,5	958
Koulikoro	38,7	48,9	1 466
Sikasso	32,0	42,5	1 202
Ségou	34,4	45,3	963
Mopti	32,0	48,6	580
Tombouctou	16,9	20,9	79
Gao	25,8	44,2	174
Kidal	†	†	3
Bamako	35,0	66,2	724
Niveau d'instruction			
Aucun	31,7	44,3	3 513
Primaire	38,0	51,4	1 078
Secondaire ou plus	38,3	57,4	1 558
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	31,2	41,4	1 290
Second	34,6	44,3	1 253
Moyen	34,2	45,9	1 237
Quatrième	34,1	50,2	1 264
Le plus élevé	38,9	64,5	1 104
Ensemble	34,5	48,9	6 148

[1] Y compris les femmes ayant reçu deux injections au cours de la grossesse de la naissance vivante la plus récente ou, au moins, deux injections (la dernière ayant été effectuée au cours des 3 années ayant précédé la dernière naissance vivante), ou, au moins, trois injections (la dernière ayant été effectuée au cours des 5 années ayant précédé la dernière naissance vivante), ou, au moins, quatre injections (la dernière ayant été effectuée au cours des 10 années ayant précédé la dernière naissance vivante), ou, au moins, cinq injections avant la dernière naissance vivante.

[2] Le rang de naissance fait référence au rang de naissance parmi les naissances vivantes de l'enquêtée.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 9.7 Lieu de l'accouchement

Répartition (en %) des naissances vivantes et/ou des mort-nés ayant eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête par lieu de l'accouchement et pourcentage dont l'accouchement s'est déroulé dans un établissement de santé, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Établissement de santé			Maison	Autre	Total	Pourcentage dont l'accouchement s'est déroulé dans un établissement de santé	Effectif de naissances
	Secteur médical public	Secteur médical privé	Secteur médical ONG					
NAISSANCES VIVANTES								
Âge de la mère à la naissance								
<20	71,5	12,6	0,0	15,7	0,2	100,0	84,1	1 011
20–34	68,3	11,9	0,4	19,3	0,0	100,0	80,7	4 402
35–49	66,7	10,5	0,0	22,8	0,0	100,0	77,2	1 000
Rang de naissance[1]								
1	74,3	13,7	0,2	11,5	0,2	100,0	88,3	1 236
2–3	68,6	13,1	0,5	17,8	0,0	100,0	82,2	2 136
4–5	68,0	11,5	0,2	20,3	0,0	100,0	79,7	1 558
6+	64,5	8,6	0,1	26,8	0,0	100,0	73,2	1 483
Visites prénatales[2]								
Aucune	39,4	3,2	0,4	57,0	0,0	100,0	43,0	827
1–3	69,2	9,4	0,2	21,2	0,0	100,0	78,8	2 152
4+	75,4	15,7	0,3	8,6	0,1	100,0	91,4	3 153
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	*	100,0	*	16
Résidence								
Bamako	65,3	32,0	0,0	2,6	0,1	100,0	97,3	751
Autre urbain	77,9	14,9	1,2	5,9	0,1	100,0	94,0	630
Ensemble urbain	71,1	24,2	0,5	4,1	0,1	100,0	95,8	1 381
Rural	67,9	8,4	0,2	23,4	0,0	100,0	76,5	5 032
Région								
Kayes	59,4	9,2	0,1	31,2	0,1	100,0	68,7	1 002
Koulikoro	76,5	15,7	0,0	7,8	0,0	100,0	92,2	1 527
Sikasso	75,8	9,0	1,1	14,1	0,0	100,0	85,9	1 262
Ségou	67,6	5,3	0,2	26,8	0,1	100,0	73,1	1 002
Mopti	60,2	2,8	0,0	37,0	0,0	100,0	63,0	608
Tombouctou	58,7	0,4	0,0	40,9	0,0	100,0	59,1	80
Gao	54,9	0,4	0,0	44,7	0,0	100,0	55,3	179
Kidal	†	†	†	†	†	100,0	†	3
Bamako	65,3	32,0	0,0	2,6	0,1	100,0	97,3	751
Niveau d'instruction de la mère								
Aucun	66,0	7,5	0,2	26,3	0,0	100,0	73,7	3 679
Primaire	73,2	11,1	0,3	15,2	0,2	100,0	84,6	1 117
Secondaire ou plus	71,5	22,1	0,4	6,1	0,0	100,0	93,9	1 617
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	66,2	2,9	0,0	30,9	0,0	100,0	69,1	1 343
Second	66,3	4,3	0,3	29,2	0,0	100,0	70,8	1 309
Moyen	70,5	6,6	0,2	22,6	0,1	100,0	77,3	1 289
Quatrième	74,2	16,5	0,6	8,6	0,1	100,0	91,3	1 314
Le plus élevé	65,6	31,0	0,3	3,0	0,1	100,0	97,0	1 158
Ensemble	68,6	11,8	0,3	19,3	0,0	100,0	80,7	6 413
MORT-NÉS								
Ensemble	72,9	5,6	0,0	21,5	0,0	100,0	78,5	151
NAISSANCES VIVANTES ET MORT-NÉS[3]								
Ensemble	68,7	11,7	0,3	19,3	0,0	100,0	80,6	6 564

Note : Les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits après une grossesse de 28 semaines ou plus. Quand la durée de la grossesse est déclarée en mois, les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits après une grossesse de 7 mois ou plus. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

ONG = Organisation non gouvernementale

[1] Le rang de naissance fait référence au rang de naissance parmi les naissances vivantes de l'enquêtée.

[2] Concerne seulement la naissance vivante la plus récente ayant eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête

[3] Pour les femmes qui ont eu une naissance vivante et un mort-né au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, les données sont calculées sur la naissance la plus récente seulement.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 9.8 Césarienne

Pourcentage de naissances vivantes et/ou de mort-nés ayant eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête accouchées par césarienne, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage accouché par césarienne	Effectif de naissances
NAISSANCES VIVANTES		
Âge de la mère à la naissance		
<20	4,9	1 011
20–34	5,2	4 402
35–49	5,1	1 000
Rang de naissance[1]		
1	7,5	1 236
2–3	4,6	2 136
4–5	5,0	1 558
6+	4,0	1 483
Visites prénatales[2]		
Aucune	1,3	827
1–3	3,6	2 152
4+	7,1	3 153
Ne sait pas/manquant	*	16
Lieu de l'accouchement		
Établissement de santé	6,4	5 174
Secteur médical public	6,4	4 399
Secteur médical privé	6,1	757
Secteur médical ONG	*	17
Résidence		
Bamako	9,5	751
Autre urbain	7,1	630
Ensemble urbain	8,4	1 381
Rural	4,2	5 032
Région		
Kayes	5,8	1 002
Koulikoro	4,7	1 527
Sikasso	4,7	1 262
Ségou	3,5	1 002
Mopti	3,0	608
Tombouctou	6,6	80
Gao	5,9	179
Kidal	†	3
Bamako	9,5	751
Niveau d'instruction de la mère		
Aucun	3,5	3 679
Primaire	5,7	1 117
Secondaire ou plus	8,4	1 617
Quintile de bien-être économique		
Le plus bas	2,8	1 343
Second	4,4	1 309
Moyen	3,6	1 289
Quatrième	4,8	1 314
Le plus élevé	10,8	1 158
Ensemble	5,1	6 413
MORT-NÉS		
Ensemble	5,6	151
NAISSANCES VIVANTES ET MORT-NÉS[3]		
Ensemble	5,1	6 564

Note : La question sur la césarienne n'est posée qu'aux femmes qui ont accouché dans un établissement de santé. Dans ce tableau, on suppose que les femmes qui n'ont pas accouché dans un établissement de santé n'ont pas accouché par césarienne. Les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits après une grossesse de 28 semaines ou plus. Quand la durée de la grossesse est déclarée en mois, les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits après une grossesse de 7 mois ou plus. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

[1] Le rang de naissance fait référence au rang de naissance parmi les naissances vivantes de l'enquêtée.

[2] Concerne seulement la naissance la plus récente ayant eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête

[3] Pour les femmes qui ont eu une naissance vivante et un mort-né au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, les données sont calculées sur la naissance la plus récente seulement.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 9.9 Assistance au cours de l'accouchement

Répartition (en %) des naissances vivantes et/ou des mort-nés ayant eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête par catégorie de personnel ayant assisté l'accouchement et pourcentage de naissances dont l'accouchement a été assisté par un prestataire de santé qualifié; parmi les naissances vivantes les plus récentes ayant eu lieu au cours des 2 années avant l'enquête, pourcentage qui ont eu le contact 'peau-à-peau' immédiatement après la naissance, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Personnel ayant fourni l'assistance durant l'accouchement								Total	Pourcentage dont l'accouchement a été assisté par un prestataire qualifié[1]	Effectif de naissances vivantes et/ou mort-nés	Parmi les naissances vivantes les plus récentes	
	Médecin	Infirmière obstétricienne/ sage-femme	Matrone	Agent de santé communautaire/relais	Accoucheuse traditionnelle formée et suivie (ATR)	Accoucheuse traditionnelle	Parents/amis/ autres	Personne				Pourcentage ayant eu le contact « peau-à-peau » immédiatement après la naissance	Effectif de naissances vivantes
						NAISSANCES VIVANTES							
Âge de la mère à la naissance													
<20	10,2	60,2	15,3	0,9	0,9	6,0	4,5	2,0	100,0	70,4	1 011	32,9	972
20–34	10,4	55,1	16,6	1,5	1,0	7,4	4,3	3,8	100,0	65,5	4 402	39,2	4 213
35–49	10,5	50,2	16,7	1,9	1,4	7,2	6,1	5,8	100,0	60,8	1 000	38,5	963
Rang de naissance[2]													
1	13,8	61,4	14,3	0,9	0,6	4,6	3,3	1,1	100,0	75,2	1 236	36,1	1 189
2–3	11,5	57,0	14,8	1,5	0,8	6,7	4,3	3,4	100,0	68,5	2 136	39,9	2 050
4–5	9,4	53,8	17,8	1,4	1,3	7,2	4,7	4,2	100,0	63,3	1 558	41,5	1 497
6+	6,9	48,7	18,9	2,2	1,4	9,9	6,0	6,1	100,0	55,6	1 483	33,6	1 413
Visites prénatales[3]													
Aucune	2,5	26,8	15,8	2,0	1,9	21,6	16,9	12,5	100,0	29,3	827	13,4	827
1–3	6,0	56,8	17,8	1,8	1,4	7,9	4,5	3,9	100,0	62,8	2 152	36,2	2 152
4+	15,0	61,4	15,8	1,2	0,6	2,7	1,7	1,6	100,0	76,4	3 153	45,9	3 153
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	*	*	*	*	100,0	*	16	*	16
Lieu de l'accouchement													
Établissement de santé	12,8	66,3	19,6	1,0	0,0	0,1	0,1	0,1	100,0	79,1	5 174	45,5	4 948
Secteur médical public	9,4	67,5	21,6	1,1	0,0	0,1	0,2	0,1	100,0	76,9	4 399	44,8	4 207
Secteur médical privé	32,6	58,5	8,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	91,1	757	49,7	725
Secteur médical ONG	*	*	*	*	*	*	*	*	100,0	*	17	*	17
Ailleurs	0,4	8,6	3,0	3,4	5,2	36,7	23,3	19,4	100,0	9,0	1 239	7,4	1 200
Résidence													
Bamako	28,9	68,1	0,3	0,6	0,0	0,8	0,4	0,8	100,0	97,0	751	55,3	724
Autre urbain	15,0	72,1	8,5	0,4	0,1	1,5	1,4	1,0	100,0	87,1	630	53,5	602
Ensemble urbain	22,6	69,9	4,0	0,5	0,0	1,1	0,9	0,9	100,0	92,5	1 381	54,5	1 326
Rural	7,0	51,1	19,8	1,7	1,3	8,8	5,6	4,6	100,0	58,1	5 032	33,6	4 822

À suivre…

Tableau 9.9—*Suite*

Caractéristique sociodémographique	Personnel ayant fourni l'assistance durant l'accouchement								Total	Pourcentage dont l'accouchement a été assisté par un prestataire qualifié[1]	Effectif de naissances vivantes et/ou mort-nés	Parmi les naissances vivantes les plus récentes	
	Médecin	Infirmière obstétricienne/ sage-femme	Matrone	Agent de santé communautaire/relais	Accoucheuse traditionnelle formée et suivie (ATR)	Accoucheuse traditionnelle	Parents/amis/ autres	Personne				Pourcentage qui ont eu le contact « peau-à-peau » immédiatement après la naissance	Effectif de naissances vivantes
Région													
Kayes	8,2	50,9	11,3	1,0	1,3	12,8	8,0	6,5	100,0	59,1	1 002	27,8	958
Koulikoro	10,4	54,8	27,4	1,0	0,1	4,2	0,9	1,2	100,0	65,3	1 527	36,9	1 466
Sikasso	7,0	50,6	30,2	1,6	0,1	2,9	4,2	3,4	100,0	57,5	1 262	41,3	1 202
Ségou	6,8	55,6	12,3	1,5	1,7	8,8	6,1	7,2	100,0	62,4	1 002	29,3	963
Mopti	5,8	56,5	0,7	4,6	4,0	16,7	5,7	6,1	100,0	62,3	608	47,2	580
Tombouctou	5,6	46,3	8,0	2,6	6,2	20,7	10,6	0,0	100,0	51,9	80	27,7	79
Gao	6,3	56,0	1,3	0,5	2,2	10,2	22,5	1,0	100,0	62,3	179	34,8	174
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	†	100,0	†	3	†	3
Bamako	28,9	68,1	0,3	0,6	0,0	0,8	0,4	0,8	100,0	97,0	751	55,3	724
Niveau d'instruction de la mère													
Aucun	5,6	50,9	18,9	1,7	1,3	10,1	6,4	5,1	100,0	56,4	3 679	33,3	3 513
Primaire	10,8	56,4	18,1	1,8	1,3	5,5	3,5	2,7	100,0	67,1	1 117	38,7	1 078
Secondaire ou plus	21,1	64,0	9,7	0,8	0,2	1,5	1,2	1,5	100,0	85,1	1 617	48,6	1 558
Quintile de bien-être économique													
Le plus bas	3,6	35,8	31,2	2,2	1,0	12,9	6,2	7,1	100,0	39,4	1 343	28,3	1 290
Second	4,0	43,1	24,4	2,4	2,4	11,6	6,4	5,6	100,0	47,1	1 309	31,2	1 253
Moyen	6,2	56,3	16,3	1,5	1,3	8,0	6,5	3,9	100,0	62,4	1 289	35,8	1 237
Quatrième	11,3	75,3	6,6	0,8	0,4	1,8	2,9	0,9	100,0	86,7	1 314	44,1	1 264
Le plus élevé	29,0	67,1	1,4	0,5	0,0	0,5	0,5	1,0	100,0	96,1	1 158	53,0	1 104
Ensemble	10,4	55,1	16,4	1,5	1,0	7,1	4,6	3,8	100,0	65,5	6 413	38,1	6 148
MORT-NÉS													
Ensemble	20,9	48,7	11,2	3,6	0,9	4,4	6,5	3,7	100,0	69,7	151	na	na
NAISSANCES VIVANTES ET MORT-NÉS[4]													
Ensemble	10,6	55,0	16,3	1,5	1,0	7,1	4,7	3,8	100,0	65,6	6 564	na	na

na = non applicable
Note : Si l'enquêtée déclare que plus d'une personne a assisté l'accouchement, seule celle possédant les qualifications les plus élevées est prise en compte dans ce tableau. Les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits après une grossesse de 28 semaines ou plus. Quand la durée de la grossesse est déclarée en mois, les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits après une grossesse de 7 mois ou plus. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
[1] Le personnel qualifié comprend les médecins et infirmière obstétricienne/sage-femme.
[2] Le rang de naissance fait référence au rang de naissance parmi les naissances vivantes de l'enquêtée.
[3] Concerne seulement la naissance vivante la plus récente ayant eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête.
[4] Pour les femmes qui ont eu une naissance vivante et un mort-né au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, les données sont calculées sur la naissance la plus récente seulement.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 9.10 Durée du séjour dans l'établissement de santé après la naissance

Parmi les femmes ayant eu une naissance vivante et/ou un mort-né au cours des 2 années ayant précédé l'enquête dont l'accouchement de la naissance la plus récente s'est déroulé dans un établissement de santé, répartition (en %) par durée de séjour dans l'établissement de santé suivant la naissance la plus récente, selon le type d'accouchement, EDSM-VII Mali 2023–2024

Type d'accouchement	< 6 heures	6–11 heures	12–23 heures	1–2 jours	3+ jours	Ne sait pas	Total	Effectif de femmes
NAISSANCES VIVANTES								
Accouchement par voie basse	28,0	41,8	8,7	17,7	3,1	0,7	100,0	4 636
Césarienne	8,9	15,2	4,2	17,0	54,7	0,0	100,0	313
MORT-NÉS								
Accouchement par voie basse	37,9	25,2	8,6	14,6	13,7	0,0	100,0	102
Césarienne	*	*	*	*	*	*	100,0	8
NAISSANCES VIVANTES ET MORT-NÉS[1]								
Accouchement par voie basse	28,2	41,5	8,6	17,7	3,3	0,7	100,0	4 712
Césarienne	8,7	14,8	4,1	16,6	55,8	0,0	100,0	320

Note : Les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits après une grossesse de 28 semaines ou plus. Quand la durée de la grossesse est déclarée en mois, les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits après une grossesse de 7 mois ou plus. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

[1] Pour les femmes qui ont eu une naissance vivante et un mort-né au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, les données sont calculées sur la naissance la plus récente seulement.

Tableau 9.11 Moment où le premier examen postnatal a été dispensé à la mère

Parmi les femmes de 15–49 ans ayant eu une naissance vivante et/ou un mort-né dans les 2 années ayant précédé l'enquête, répartition (en %) de la durée écoulée entre l'accouchement et le premier examen postnatal de la mère pour la naissance vivante ou le mort-né le plus récent et pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante ou un mort-né dans les 2 années ayant précédé l'enquête qui ont reçu un examen postnatal dans les 2 jours ayant suivi la naissance, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Durée écoulée entre l'accouchement et le premier examen postnatal de la mère[1]						Pas d'examen postnatal[2]	Total	Pourcentage de femmes ayant eu un examen postnatal dans les 2 jours ayant suivi la naissance[1]	Effectif de femmes
	Moins de 4 heures	4–23 heures	1–2 jours	3–6 jours	7–41 jours	Ne sait pas				
NAISSANCES VIVANTES										
Âge à la naissance										
<20	57,8	7,6	2,3	0,1	0,1	0,6	31,5	100,0	67,8	972
20–34	59,4	8,6	1,9	0,6	0,4	0,7	28,5	100,0	69,9	4 213
35–49	56,8	8,6	1,6	0,4	0,1	0,6	32,0	100,0	66,9	963
Rang de naissance[3]										
1	59,5	9,2	2,2	0,5	0,1	0,4	28,2	100,0	70,9	1 189
2–3	61,1	8,0	1,7	0,3	0,4	0,8	27,6	100,0	70,9	2 050
4–5	60,4	8,1	1,6	0,7	0,5	0,8	28,0	100,0	70,1	1 497
6+	52,7	9,0	2,2	0,4	0,1	0,5	35,1	100,0	63,9	1 413
Lieu de l'accouchement										
Secteur médical public	65,5	10,5	2,3	0,5	0,2	0,8	20,3	100,0	78,2	4 207
Secteur médical privé	79,2	7,1	0,9	0,3	0,2	0,7	11,7	100,0	87,1	725
Secteur médical ONG	*	*	*	*	*	*	*	100,0	*	17
Ailleurs	22,2	2,2	1,3	0,4	0,7	0,1	73,1	100,0	25,7	1 200
Résidence										
Bamako	84,5	4,0	1,0	0,4	0,2	0,7	9,2	100,0	89,6	724
Autre urbain	69,2	9,8	2,0	0,2	0,0	0,9	17,9	100,0	81,0	602
Ensemble urbain	77,6	6,7	1,4	0,3	0,1	0,8	13,1	100,0	85,7	1 326
Rural	53,5	9,0	2,0	0,5	0,4	0,6	34,0	100,0	64,5	4 822
Région										
Kayes	56,1	4,5	1,4	0,1	0,4	0,0	37,5	100,0	62,0	958
Koulikoro	63,1	10,9	2,9	0,3	0,3	0,4	22,1	100,0	76,9	1 466
Sikasso	51,5	11,8	1,9	1,0	0,3	1,0	32,5	100,0	65,2	1 202
Ségou	50,9	7,8	1,8	0,5	0,3	1,5	37,3	100,0	60,5	963
Mopti	53,1	10,7	1,6	0,4	0,2	0,4	33,7	100,0	65,4	580
Tombouctou	44,0	6,1	4,6	0,9	0,2	0,4	43,7	100,0	54,7	79
Gao	47,4	1,7	0,9	0,2	0,2	0,6	48,9	100,0	50,0	174
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	100,0	†	3
Bamako	84,5	4,0	1,0	0,4	0,2	0,7	9,2	100,0	89,6	724
Niveau d'instruction										
Aucun	52,3	7,1	1,8	0,5	0,5	0,6	37,2	100,0	61,3	3 513
Primaire	60,5	11,0	1,9	0,4	0,0	0,7	25,6	100,0	73,4	1 078
Secondaire ou plus	71,8	9,8	2,1	0,4	0,1	0,8	15,0	100,0	83,7	1 558
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	46,3	9,2	1,9	0,8	0,5	0,5	40,8	100,0	57,5	1 290
Second	48,1	9,1	2,0	0,4	0,4	0,5	39,5	100,0	59,2	1 253
Moyen	57,8	7,3	1,4	0,2	0,3	0,8	32,3	100,0	66,4	1 237
Quatrième	66,0	9,2	2,2	0,4	0,2	0,7	21,3	100,0	77,5	1 264
Le plus élevé	78,0	7,3	2,0	0,4	0,1	0,8	11,4	100,0	87,3	1 104
Ensemble	58,7	8,5	1,9	0,4	0,3	0,7	29,5	100,0	69,1	6 148
MORT-NÉS										
Ensemble	52,5	6,8	5,1	0,9	0,0	1,1	33,6	100,0	64,4	143
NAISSANCES VIVANTES ET MORT-NÉS[4]										
Ensemble	58,6	8,5	2,0	0,5	0,3	0,7	29,6	100,0	69,0	6 257

Note : Les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits après une grossesse de 28 semaines ou plus. Quand la durée de la grossesse est déclarée en mois, les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits après une grossesse de 7 mois ou plus. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

[1] Y compris les femmes qui ont eu un examen postnatal dispensé par un médecin, une infirmière/sage-femme, une sage-femme auxiliaire, un agent de santé communautaire/agent de terrain ou une sage-femme traditionnelle

[2] Y compris les femmes qui ont eu un examen postnatal après 41 jours

[3] Le rang de naissance fait référence au rang de naissance parmi les naissances vivantes de l'enquêtée.

[4] Pour les femmes qui ont eu une naissance vivante et un mort-né au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, les données sont calculées sur la naissance la plus récente seulement.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 9.12 Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal à la mère

Parmi les femmes de 15–49 ans ayant eu une naissance vivante et/ou un mort-né dans les 2 années ayant précédé l'enquête, répartition (en %) par type de prestataire de santé ayant dispensé le premier examen postnatal de la mère dans les 2 jours ayant suivi la dernière naissance, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Type de prestataire de santé ayant dispensé le premier examen postnatal à la mère					Pas d'examen postnatal dans les 2 jours ayant suivi la naissance	Total	Effectif de femmes
	Médecin/ infirmière/sage -femme	Matrone	Agent de santé communau-taire/relais	Accoucheuse traditionnelle formée et suivie (ATR)	Accoucheuse traditionnelle			
				NAISSANCES VIVANTES				
Âge à la naissance								
<20	52,1	13,1	0,7	0,3	1,5	32,2	100,0	972
20–34	54,4	12,4	0,8	0,3	2,1	30,1	100,0	4 213
35–49	49,7	13,1	0,8	0,6	2,7	33,1	100,0	963
Rang de naissance[1]								
1	56,7	12,1	0,8	0,2	1,2	29,1	100,0	1 189
2–3	56,6	11,2	0,6	0,4	2,1	29,1	100,0	2 050
4–5	53,4	13,5	0,8	0,3	2,0	29,9	100,0	1 497
6+	45,4	14,1	1,1	0,4	2,9	36,1	100,0	1 413
Lieu de l'accouchement								
Établissement de santé	64,1	15,1	0,3	0,0	0,1	20,4	100,0	4 948
Secteur médical public	61,2	16,6	0,4	0,0	0,1	21,8	100,0	4 207
Secteur médical privé	80,2	6,7	0,2	0,0	0,0	12,9	100,0	725
Secteur médical ONG	*	*	*	*	*	*	100,0	17
Ailleurs	8,7	2,2	2,7	1,6	10,4	74,3	100,0	1 200
Résidence								
Bamako	89,2	0,2	0,0	0,0	0,2	10,4	100,0	724
Autre urbain	72,3	8,1	0,3	0,0	0,2	19,0	100,0	602
Ensemble urbain	81,5	3,8	0,1	0,0	0,2	14,3	100,0	1 326
Rural	45,5	15,0	1,0	0,4	2,6	35,5	100,0	4 822
Région								
Kayes	49,5	9,6	0,7	0,1	2,2	38,0	100,0	958
Koulikoro	56,1	19,3	0,4	0,0	1,1	23,1	100,0	1 466
Sikasso	38,7	25,1	0,8	0,1	0,5	34,8	100,0	1 202
Ségou	47,6	8,8	1,2	0,4	2,4	39,5	100,0	963
Mopti	50,8	0,6	2,7	2,3	9,0	34,6	100,0	580
Tombouctou	42,6	7,0	0,4	0,9	3,8	45,3	100,0	79
Gao	45,9	1,4	0,0	0,3	2,4	50,0	100,0	174
Kidal	†	†	†	†	†	†	100,0	3
Bamako	89,2	0,2	0,0	0,0	0,2	10,4	100,0	724
Niveau d'instruction								
Aucun	43,3	13,8	0,7	0,5	3,0	38,7	100,0	3 513
Primaire	55,3	15,3	1,3	0,2	1,2	26,6	100,0	1 078
Secondaire ou plus	74,4	7,9	0,7	0,1	0,6	16,3	100,0	1 558
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	28,1	23,5	1,3	0,2	4,4	42,5	100,0	1 290
Second	35,7	17,7	1,5	1,1	3,1	40,8	100,0	1 253
Moyen	49,9	13,7	0,8	0,2	1,7	33,6	100,0	1 237
Quatrième	71,1	5,2	0,2	0,1	0,9	22,5	100,0	1 264
Le plus élevé	86,0	1,2	0,1	0,0	0,0	12,7	100,0	1 104
Ensemble	53,3	12,6	0,8	0,3	2,1	30,9	100,0	6 148
				MORT-NÉS				
Ensemble	53,2	7,6	1,9	0,0	1,8	35,6	100,0	143
				NAISSANCES VIVANTES ET MORT-NÉS[2]				
Ensemble	53,3	12,5	0,8	0,3	2,1	31,0	100,0	6 257

Note : Les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits après une grossesse de 28 semaines ou plus. Quand la durée de la grossesse est déclarée en mois, les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits après une grossesse de 7 mois ou plus. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

[1] Le rang de naissance fait référence au rang de naissance parmi les naissances vivantes de l'enquêtée.

[2] Pour les femmes qui ont eu une naissance vivante et un mort-né au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, les données sont calculées sur la naissance la plus récente seulement.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 9.13 Contenu des soins postnatals dispensés à la mère

Parmi les femmes de 15–49 ans ayant eu une naissance vivante et/ou un mort-né au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, pourcentage pour lesquelles certains examens ont été effectués dans les 2 jours ayant suivi la naissance la plus récente, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage pour lesquelles un prestataire de santé a effectué, dans les 2 jours ayant suivi la naissance la plus récente, les examens suivants : A mesuré la pression artérielle	A parlé de saignements vaginaux	A discuté de planification familiale	Pourcentage pour lesquelles les 3 examens ont été effectués dans les 2 jours ayant suivi la naissance	Effectif de femmes
NAISSANCES VIVANTES					
Âge à la naissance					
<20	19,5	16,4	12,2	10,8	972
20–34	19,2	17,5	15,0	12,7	4 213
35–49	20,6	19,0	14,4	12,7	963
Rang de naissance[1]					
1	23,4	19,4	14,8	12,8	1 189
2–3	18,2	16,6	13,6	12,0	2 050
4–5	19,0	18,0	16,3	13,4	1 497
6+	18,4	17,0	13,4	11,5	1 413
Lieu de l'accouchement					
Établissement de santé	22,1	19,8	16,7	14,3	4 948
Secteur médical public	22,6	20,3	17,4	14,9	4 207
Secteur médical privé	19,1	16,4	12,1	10,4	725
Secteur médical ONG	*	*	*	*	17
Ailleurs	8,4	8,5	5,3	4,5	1 200
Résidence					
Bamako	19,9	18,2	11,6	10,6	724
Autre urbain	27,4	25,1	22,0	19,5	602
Ensemble urbain	23,3	21,3	16,3	14,7	1 326
Rural	18,4	16,6	13,9	11,7	4 822
Région					
Kayes	18,8	17,7	15,4	13,7	958
Koulikoro	19,4	15,8	12,0	10,8	1 466
Sikasso	26,8	23,8	22,3	18,6	1 202
Ségou	12,8	13,1	10,3	6,7	963
Mopti	14,4	14,2	12,2	11,5	580
Tombouctou	21,8	19,2	15,7	14,8	79
Gao	23,6	22,0	17,4	16,6	174
Kidal	†	†	†	†	3
Bamako	19,9	18,2	11,6	10,6	724
Niveau d'instruction de la mère					
Aucun	17,4	16,1	12,8	10,9	3 513
Primaire	19,1	17,7	14,2	12,2	1 078
Secondaire ou plus	24,4	21,0	18,4	15,8	1 558
Quintile de bien-être économique					
Le plus bas	20,9	19,1	16,7	13,4	1 290
Second	17,1	15,8	13,5	12,0	1 253
Moyen	18,3	17,4	13,2	11,2	1 237
Quatrième	16,9	15,3	12,7	11,2	1 264
Le plus élevé	24,8	20,8	16,3	14,3	1 104
Ensemble	19,5	17,6	14,4	12,4	6 148
MORT-NÉS					
Ensemble	23,3	22,7	12,0	10,8	143
NAISSANCES VIVANTES ET MORT-NÉS[2]					
Ensemble	19,6	17,7	14,4	12,4	6 257

Note : Les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits après une grossesse de 28 semaines ou plus. Quand la durée de la grossesse est déclarée en mois, les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits après une grossesse de 7 mois ou plus. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

[1] Le rang de naissance fait référence au rang de naissance parmi les naissances vivantes de l'enquêtée.

[2] Pour les femmes qui ont eu une naissance vivante et un mort-né au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, les données sont calculées sur la naissance la plus récente seulement.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 9.14 Moment où le premier examen postnatal a été dispensé au nouveau-né

Répartition (en %) des naissances vivantes les plus récentes ayant eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête par durée écoulée entre le premier examen postnatal et l'accouchement et pourcentage de naissances ayant eu un examen postnatal dans les 2 jours ayant suivi la naissance, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Durée écoulée entre l'accouchement et le premier examen postnatal du nouveau-né[1]						Pas d'examen postnatal[2]	Total	Pourcentage de naissances ayant eu un examen postnatal dans les 2 jours ayant suivi la naissance[1]	Effectif de naissances
	Moins d'1 heure	1–3 heures	4–23 heures	1–2 jours	3–6 jours	Ne sait pas				
Âge de la mère à la naissance										
<20	19,6	39,8	6,9	1,7	0,6	0,2	31,3	100,0	67,9	972
20–34	21,6	39,1	7,4	2,1	0,5	0,9	28,4	100,0	70,2	4 213
35–49	21,5	38,3	7,3	1,9	0,3	1,2	29,5	100,0	69,0	963
Rang de naissance[3]										
1	21,5	38,7	7,7	2,9	0,4	0,6	28,2	100,0	70,8	1 189
2–3	22,6	40,0	7,7	1,3	0,5	1,0	26,9	100,0	71,6	2 050
4–5	20,5	40,8	6,4	2,0	0,7	0,8	28,8	100,0	69,7	1 497
6+	20,1	36,1	7,3	2,1	0,5	0,8	33,1	100,0	65,6	1 413
Lieu de l'accouchement										
Établissement de santé	23,2	44,5	8,6	1,9	0,5	0,9	20,4	100,0	78,2	4 948
Secteur médical public	21,4	44,7	8,8	2,0	0,6	0,9	21,6	100,0	76,8	4 207
Secteur médical privé	33,9	42,9	7,8	0,9	0,0	1,2	13,3	100,0	85,5	725
Secteur médical ONG	*	*	*	*	*	*	*	100,0	*	17
Ailleurs	13,5	16,7	1,9	2,4	0,4	0,3	64,8	100,0	34,4	1 200
Résidence										
Bamako	50,1	32,3	1,9	0,6	0,2	1,5	13,5	100,0	84,8	724
Autre urbain	18,6	48,4	8,3	2,2	0,7	0,8	20,9	100,0	77,6	602
Ensemble urbain	35,8	39,6	4,8	1,3	0,4	1,2	16,9	100,0	81,6	1 326
Rural	17,3	38,9	8,0	2,1	0,5	0,7	32,4	100,0	66,3	4 822
Région										
Kayes	24,7	29,8	3,5	1,7	0,5	0,0	39,8	100,0	59,7	958
Koulikoro	15,2	52,9	8,7	2,1	0,4	0,8	20,1	100,0	78,7	1 466
Sikasso	8,8	41,1	11,8	2,3	0,6	0,9	34,5	100,0	64,0	1 202
Ségou	24,0	30,6	6,8	2,1	0,8	1,3	34,4	100,0	63,5	963
Mopti	20,5	40,7	10,4	2,4	0,6	0,6	24,8	100,0	74,0	580
Tombouctou	0,3	40,8	6,2	5,6	0,7	0,7	45,7	100,0	52,9	79
Gao	18,1	28,6	1,0	2,2	0,8	0,7	48,7	100,0	49,8	174
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	100,0	†	3
Bamako	50,1	32,3	1,9	0,6	0,2	1,5	13,5	100,0	84,8	724
Niveau d'instruction de la mère										
Aucun	18,2	37,0	6,7	2,4	0,6	0,8	34,4	100,0	64,2	3 513
Primaire	21,8	39,5	8,2	1,3	0,3	1,0	27,9	100,0	70,8	1 078
Secondaire ou plus	27,8	43,5	8,2	1,6	0,5	0,8	17,6	100,0	81,0	1 558
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	17,1	34,8	9,9	2,0	0,2	0,4	35,6	100,0	63,8	1 290
Second	14,5	35,7	7,4	3,0	1,1	0,8	37,5	100,0	60,6	1 253
Moyen	19,7	38,6	6,1	1,9	0,4	0,6	32,6	100,0	66,3	1 237
Quatrième	23,7	43,5	7,0	1,8	0,5	0,7	22,8	100,0	76,0	1 264
Le plus élevé	33,0	43,2	5,8	1,0	0,4	1,6	15,0	100,0	83,0	1 104
Ensemble	21,3	39,1	7,3	2,0	0,5	0,8	29,0	100,0	69,6	6 148

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
[1] Y compris les nouveau-nés qui ont eu un examen postnatal dispensé par un médecin, une Infirmière/sage-femme, sage-femme auxiliaire, un agent de santé communautaire/agent de terrain ou une accoucheuse traditionnelle.
[2] Y compris les nouveau-nés qui ont eu un examen après la première semaine.
[3] Le rang de naissance fait référence au rang de naissance parmi les naissances vivantes de l'enquêtée.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 9.15 Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal au nouveau-né

Répartition (en %) des naissances vivantes les plus récentes ayant eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête par type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal au nouveau-né dans les 2 jours ayant suivi la naissance, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal au nouveau-né					Pas d'examen postnatal au cours des 2 jours ayant suivi la naissance	Total	Effectif de naissances
	Médecin/ infirmière/ sage-femme	Matrone	Agent de santé communautaire /relais	Accoucheuse traditionnelle formée et suivie (ATR)	Accoucheuse traditionnelle			
Âge de la mère à la naissance								
<20	50,8	13,1	0,9	0,4	2,7	32,1	100,0	972
20–34	52,4	12,7	0,7	0,5	3,9	29,8	100,0	4 213
35–49	48,3	13,6	0,5	0,9	5,7	31,0	100,0	963
Rang de naissance[1]								
1	54,9	12,0	0,8	0,5	2,6	29,2	100,0	1 189
2–3	55,5	11,4	0,5	0,4	3,8	28,4	100,0	2 050
4–5	50,6	14,0	0,7	0,7	3,8	30,3	100,0	1 497
6+	43,8	14,5	1,0	0,6	5,6	34,4	100,0	1 413
Lieu de l'accouchement								
Établissement de santé	62,1	15,4	0,4	0,1	0,2	21,8	100,0	4 948
Secteur médical public	59,2	16,9	0,4	0,1	0,2	23,2	100,0	4 207
Secteur médical privé	78,4	7,0	0,1	0,0	0,0	14,5	100,0	725
Secteur médical ONG	*	*	*	*	*	*	100,0	17
Ailleurs	7,9	2,5	2,1	2,3	19,6	65,6	100,0	1 200
Résidence								
Bamako	84,1	0,2	0,0	0,0	0,6	15,2	100,0	724
Autre urbain	68,4	8,0	0,5	0,2	0,5	22,4	100,0	602
Ensemble urbain	77,0	3,7	0,2	0,1	0,6	18,4	100,0	1 326
Rural	44,5	15,4	0,8	0,7	4,9	33,7	100,0	4 822
Région								
Kayes	46,6	9,2	0,7	0,1	3,1	40,3	100,0	958
Koulikoro	56,0	20,9	0,4	0,2	1,3	21,3	100,0	1 466
Sikasso	37,1	24,8	0,9	0,3	1,0	36,0	100,0	1 202
Ségou	46,0	8,9	0,8	0,7	7,1	36,5	100,0	963
Mopti	51,0	0,6	2,0	3,0	17,4	26,0	100,0	580
Tombouctou	38,0	7,8	0,4	1,7	5,1	47,1	100,0	79
Gao	43,2	1,5	0,0	0,8	4,3	50,2	100,0	174
Kidal	†	†	†	†	†	†	100,0	3
Bamako	84,1	0,2	0,0	0,0	0,6	15,2	100,0	724
Niveau d'instruction de la mère								
Aucun	42,5	14,7	0,7	0,7	5,7	35,8	100,0	3 513
Primaire	52,6	13,8	1,0	0,4	3,0	29,2	100,0	1 078
Secondaire ou plus	71,1	8,2	0,5	0,3	0,9	19,0	100,0	1 558
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	29,5	23,5	1,2	0,5	9,1	36,2	100,0	1 290
Second	34,2	17,8	1,0	1,4	6,2	39,4	100,0	1 253
Moyen	47,8	14,3	0,7	0,4	3,1	33,7	100,0	1 237
Quatrième	68,5	5,9	0,4	0,3	0,9	24,0	100,0	1 264
Le plus élevé	81,5	1,2	0,1	0,1	0,2	17,0	100,0	1 104
Ensemble	51,5	12,9	0,7	0,5	4,0	30,4	100,0	6 148

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
[1] Le rang de naissance fait référence au rang de naissance parmi les naissances vivantes de l'enquêtée.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 9.16 Contenu des examens postnatals dispensés aux nouveau-nés

Parmi les naissances vivantes les plus récentes ayant eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, pourcentage pour lesquelles on a effectué certains actes/conseils au cours des 2 jours ayant suivi la naissance et pourcentage pour lesquelles cinq actes/conseils ont été effectués dans les 2 jours ayant suivi la naissance, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Pourcentage de naissances vivantes les plus récentes pour lesquelles un prestataire de santé a effectué certains actes/conseils dans les 2 jours ayant suivi la naissance :								
Caractéristique sociodémographique	A examiné le cordon	A vérifié la température	A dit à la mère comment reconnaître si l'enfant avait besoins de soins médicaux immédiats	A donné à la mère des conseils sur l'allaitement	A observé l'allaitement	A donné à la mère des conseils sur l'allaitement et a observé l'allaitement	A pesé l'enfant[1]	Pourcentage pour lesquelles on a effectué 5[2] actes/ conseils dans les 2 jours ayant suivi la naissance	Effectif de naissances
Âge de la mère à la naissance									
<20	20,2	20,1	13,4	16,1	17,8	14,5	48,3	6,7	972
20–34	21,9	21,3	16,6	17,9	18,7	15,7	52,7	9,6	4 213
35–49	21,2	19,6	17,0	17,0	16,6	14,6	48,6	8,7	963
Rang de naissance[3]									
1	23,8	24,5	17,3	19,9	21,7	18,0	56,1	9,5	1 189
2–3	20,5	20,0	16,1	17,7	17,8	15,6	51,9	9,0	2 050
4–5	22,6	20,7	16,4	17,4	18,3	15,5	53,5	10,0	1 497
6+	20,0	19,2	14,9	15,0	15,6	12,8	44,3	7,6	1 413
Lieu de l'accouchement									
Établissement de santé	22,4	23,2	17,8	18,9	20,0	16,8	62,3	10,8	4 948
Secteur médical public	22,9	23,8	18,4	19,5	20,6	17,5	60,2	11,0	4 207
Secteur médical privé	19,3	19,6	13,9	15,4	16,4	13,1	74,5	9,8	725
Secteur médical ONG	*	*	*	*	*	*	*	*	17
Ailleurs	18,0	11,1	9,2	11,3	10,7	9,4	6,2	1,6	1 200
Résidence									
Bamako	19,4	18,9	16,8	15,4	15,2	14,6	78,2	11,9	724
Autre urbain	29,8	29,0	24,2	25,6	26,6	23,5	76,8	19,8	602
Ensemble urbain	24,1	23,5	20,1	20,0	20,3	18,6	77,5	15,5	1 326
Rural	20,8	20,1	15,0	16,7	17,6	14,5	44,1	7,2	4 822
Région									
Kayes	26,0	27,4	14,6	15,9	19,9	12,2	47,0	8,7	958
Koulikoro	16,4	19,0	13,9	16,2	16,4	14,5	56,0	8,9	1 466
Sikasso	30,1	27,7	23,6	24,4	24,0	22,0	54,4	13,2	1 202
Ségou	12,9	13,5	10,8	12,4	15,0	11,2	40,8	3,7	963
Mopti	24,6	15,5	16,0	19,5	17,2	16,6	32,2	6,0	580
Tombouctou	23,4	19,0	18,3	18,1	18,5	17,6	16,8	7,9	79
Gao	26,5	21,1	17,8	17,3	17,2	15,9	42,0	10,2	174
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	†	3
Bamako	19,4	18,9	16,8	15,4	15,2	14,6	78,2	11,9	724
Niveau d'instruction de la mère									
Aucun	20,2	18,5	14,4	15,8	16,6	13,9	41,8	7,1	3 513
Primaire	22,7	22,5	17,4	17,8	18,2	15,3	50,9	9,4	1 078
Secondaire ou plus	23,7	25,1	19,0	20,9	21,8	18,7	73,1	13,0	1 558
Quintile de bien-être économique									
Le plus bas	25,6	22,7	19,1	21,4	20,9	18,9	35,1	8,5	1 290
Second	18,9	17,7	13,7	15,3	16,8	13,5	34,8	5,1	1 253
Moyen	21,3	20,4	15,0	15,4	17,0	13,5	42,9	7,2	1 237
Quatrième	18,4	19,1	13,3	15,3	15,6	12,9	66,5	9,5	1 264
Le plus élevé	23,8	24,8	19,9	20,0	21,0	18,2	81,3	15,5	1 104
Ensemble	21,5	20,9	16,1	17,4	18,2	15,4	51,3	9,0	6 148

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
[1] Concerne les nouveau-nés qui ont été pesés « à la naissance ». Il se peut que certains nouveau-nés pesés au cours des 2 jours ayant suivi la naissance aient été exclus.
[2] Le actes/conseils sont (1) l'examen du cordon, (2) la prise de la température, (3) l'observation et/ou le conseil sur l'allaitement, (4) avertir la mère sur les signes de danger/comment reconnaître si l'enfant a besoin de soins médicaux immédiats, et (5) la prise du poids. Correspond à la définition des cinq actes/conseils sur laquelle est basée l'évaluation du contenu des soins postnatals décrite dans Moran et al, 2013.
[3] Le rang de naissance fait référence au rang de naissance parmi les naissances vivantes de l'enquêtée.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 9.17 Soins postnatals dispensés à la mère et au nouveau-né

Parmi les naissances vivantes les plus récentes ayant eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, pourcentage pour lesquelles les mère de 15–49 ans ont reçu un examen postnatal dans les 2 jours ayant suivi la naissance, pourcentage pour lesquelles les nouveau-nés ont reçu un examen postnatal dans les 2 jours ayant suivi la naissance, pourcentage pour lesquelles la mère et le nouveau-né ont reçu un examen postnatal et pourcentage pour lesquelles ni la mère, ni le nouveau-né n'ont reçu un examen postnatal, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Pourcentage ayant reçu un examen postnatal[1] dans les 2 jours ayant suivi la naissance				
Caractéristique sociodémographique	Mère	Nouveau-né	Mère et nouveau-né	Ni la mère, ni le nouveau-né n'ont reçu un examen postnatal[2]	Effectif de naissances
Âge de la mère à la naissance					
<20	67,8	67,9	60,6	24,9	972
20–34	69,9	70,2	63,6	23,6	4 213
35–49	66,9	69,0	60,2	24,3	963
Rang de naissance[3]					
1	70,9	70,8	63,5	21,8	1 189
2–3	70,9	71,6	64,6	22,1	2 050
4–5	70,1	69,7	63,6	23,7	1 497
6+	63,9	65,6	58,1	28,6	1 413
Lieu de l'accouchement					
Établissement de santé	79,6	78,2	72,5	14,7	4 948
Secteur médical public	78,2	76,8	71,1	16,0	4 207
Secteur médical privé	87,1	85,5	80,3	7,7	725
Secteur médical ONG	*	*	*	*	17
Ailleurs	25,7	34,4	21,9	61,8	1 200
Résidence					
Bamako	89,6	84,8	81,3	6,9	724
Autre urbain	81,0	77,6	75,7	17,1	602
Ensemble urbain	85,7	81,6	78,8	11,6	1 326
Rural	64,5	66,3	58,2	27,3	4 822
Région					
Kayes	62,0	59,7	55,8	34,0	958
Koulikoro	76,9	78,7	70,5	14,8	1 466
Sikasso	65,2	64,0	59,2	30,0	1 202
Ségou	60,5	63,5	52,7	28,7	963
Mopti	65,4	74,0	61,7	22,3	580
Tombouctou	54,7	52,9	46,0	38,4	79
Gao	50,0	49,8	45,8	45,9	174
Kidal	†	†	†	†	3
Bamako	89,6	84,8	81,3	6,9	724
Niveau d'instruction de la mère					
Aucun	61,3	64,2	55,4	29,9	3 513
Primaire	73,4	70,8	65,4	21,2	1 078
Secondaire ou plus	83,7	81,0	77,0	12,3	1 558
Quintile de bien-être économique					
Le plus bas	57,5	63,8	53,9	32,6	1 290
Second	59,2	60,6	52,6	32,9	1 253
Moyen	66,4	66,3	59,5	26,7	1 237
Quatrième	77,5	76,0	70,4	16,9	1 264
Le plus élevé	87,3	83,0	78,8	8,5	1 104
Ensemble	69,1	69,6	62,6	23,9	6 148

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
ONG = Organisation non gouvernementale
[1] Y compris un examen effectué par un médecin, une infirmière/sage-femme, une sage-femme auxiliaire, un agent de santé communautaire/agent de terrain ou une accoucheuse traditionnelle
[2] Y compris un examen effectué après les 2 jours qui ont suivi la naissance ou dispensés par d'autres personnes
[3] Le rang de naissance fait référence au rang de naissance parmi les naissances vivantes de l'enquêtée.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 9.18 Implication des hommes dans les soins de santé maternelle

Parmi les hommes de 15–49 ans dont l'enfant le plus jeune a 0–2 ans, pourcentage ayant déclaré que la mère de l'enfant avait effectué des consultations prénatales durant la grossesse de l'enfant ; parmi les hommes de 15–49 ans pour lesquels la mère du plus jeune enfant de 0–2 ans a effectué des consultations prénatales pendant la grossesse de cet enfant, pourcentage qui était toujours présent au moment d'une consultation; parmi les hommes de 15–49 ans dont l'enfant le plus jeune a 0–2 ans, pourcentage ayant déclaré que l'enfant est né dans un établissement de santé; parmi les hommes dont l'enfant le plus jeune de 0–2 ans est né dans un établissement de santé, pourcentage qui se sont rendus dans l'établissement de santé avec la mère, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Parmi les hommes de 15–49 ans dont l'enfant le plus jeune a 0–2 ans		Parmi les hommes de 15–49 ans pour lesquels la mère du plus jeune enfant de 0–2 ans a effectué des consultations prénatales		Parmi les hommes de 15–49 ans dont l'enfant le plus jeune a 0–2 ans		Parmi les hommes de 15–49 ans dont l'enfant le plus jeune de 0–2 ans est né dans un établissement de santé	
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant déclaré que la mère de l'enfant a effectué des consultations prénatales pendant la grossesse de cet enfant	Effectif d'hommes	Pourcentage qui était présent lors de certaines consultations prénatale	Effectif d'hommes	Pourcentage ayant déclaré que leur enfant est né dans un établissement de santé	Effectif d'hommes	Pourcentage qui se sont rendus avec la mère de l'enfant dans l'établissement de santé	Effectif d'hommes
Âge du père au moment de l'interview								
<20	*	3	*	3	*	3	*	3
20–34	89,9	1 132	53,1	1 018	85,3	1 132	63,4	966
35–49	89,7	1 293	52,5	1 160	82,7	1 293	67,2	1 069
Nombre d'enfants que le père a engendrés								
1	89,9	364	53,4	327	89,4	364	59,5	325
2–3	89,4	722	55,6	645	86,6	722	64,4	625
4–5	91,0	558	54,7	508	84,7	558	70,7	473
6+	89,3	785	48,5	701	78,4	785	65,3	615
Résidence								
Bamako	89,4	336	61,1	300	99,7	336	72,2	335
Autre urbain	96,2	252	54,9	243	96,6	252	76,4	244
Ensemble urbain	92,3	588	58,3	543	98,4	588	74,0	579
Rural	89,0	1 840	50,9	1 638	79,3	1 840	61,9	1 459
Région								
Kayes	86,0	328	66,3	282	73,5	328	49,3	241
Koulikoro	93,6	565	44,2	529	92,3	565	67,5	522
Sikasso	90,1	515	48,2	464	87,8	515	60,0	452
Ségou	93,0	379	57,1	352	77,1	379	68,5	292
Mopti	83,8	193	37,6	162	71,3	193	75,8	138
Tombouctou	78,3	49	59,6	39	44,5	49	72,0	22
Gao	84,4	62	72,7	53	58,4	62	76,6	36
Kidal	†	1	†	1	†	1	†	1
Bamako	89,4	336	61,1	300	99,7	336	72,2	335
Niveau d'instruction du père								
Aucun	85,2	1 165	49,8	992	76,3	1 165	60,1	889
Primaire	92,4	472	45,4	436	83,6	472	61,9	394
Secondaire ou plus	95,1	792	60,9	754	95,3	792	73,3	755
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	84,9	498	49,6	423	73,4	498	65,6	366
Second	84,7	487	52,1	412	73,5	487	56,4	358
Moyen	91,1	434	52,2	395	79,1	434	59,1	343
Quatrième	93,9	490	45,8	460	93,0	490	67,6	456
Le plus élevé	94,5	520	63,1	491	99,3	520	73,6	516
Ensemble 15–49	89,8	2 429	52,8	2 181	83,9	2 429	65,4	2 038
50–64	85,7	359	48,4	308	78,1	359	67,1	280
Ensemble 15–64	89,3	2 788	52,2	2 489	83,2	2 788	65,6	2 319

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 9.19 Problèmes d'accès aux soins de santé

Pourcentage de femmes de 15–49 ans qui ont déclaré qu'elles avaient des problèmes importants d'accès aux soins de santé quand elles étaient malades, par type de problèmes, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Problèmes d'accès aux soins de santé					
	Obtenir la permission d'aller se faire soigner	Obtenir l'argent pour se faire soigner	Distance jusqu'à l'établissement de santé	Ne veut pas s'y rendre seule	Au moins un problème d'accès aux soins de santé	Effectif de femmes
Âge						
15–19	27,3	43,1	24,8	22,6	49,1	3 862
20–34	25,9	44,6	26,9	21,5	50,7	8 665
35–49	26,9	51,2	29,3	22,7	56,6	4 820
Nombre d'enfants vivants						
0	25,9	41,9	23,7	21,5	47,9	4 462
1–2	24,8	42,3	25,9	20,9	48,5	4 581
3–4	27,6	49,0	28,7	22,7	54,2	3 928
5+	28,0	51,9	30,4	23,4	57,7	4 376
État matrimonial						
Célibataire	25,2	43,8	22,8	21,1	48,9	3 585
Actuellement en union	26,9	46,4	28,3	22,4	52,5	13 237
En rupture d'union	26,2	54,8	26,7	21,2	58,3	525
Emploi (dans les 12 derniers mois)						
N'a pas travaillé	27,8	44,2	28,3	23,5	49,5	6 587
A travaillé et a été rémunérée en argent	25,1	46,6	26,0	20,3	53,1	8 724
A travaillé mais n'a pas été rémunérée en argent	28,5	49,9	28,2	25,0	55,1	2 036
Résidence						
Bamako	17,5	49,6	23,2	15,5	52,6	2 675
Autre urbain	27,3	39,9	24,1	20,9	44,3	2 048
Ensemble urbain	21,7	45,4	23,6	17,9	49,0	4 723
Rural	28,3	46,4	28,4	23,7	53,1	12 624
Région						
Kayes	41,2	48,2	37,3	34,4	55,8	2 635
Koulikoro	23,7	45,6	21,2	17,6	50,2	4 018
Sikasso	29,1	41,8	24,4	18,6	46,0	3 143
Ségou	17,9	40,7	20,0	17,5	50,2	2 574
Mopti	24,6	43,7	35,5	29,7	53,1	1 530
Tombouctou	61,0	80,2	68,6	54,6	84,4	281
Gao	34,6	64,1	46,2	32,2	68,7	485
Kidal	†	†	†	†	†	6
Bamako	17,5	49,6	23,2	15,5	52,6	2 675
Niveau d'instruction						
Aucun	30,1	51,2	31,7	25,3	57,2	9 382
Primaire	25,2	44,8	24,9	20,7	51,2	2 926
Secondaire ou plus	20,5	37,4	19,8	16,9	42,7	5 039
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	32,4	52,3	36,8	30,6	60,0	3 036
Second	33,1	51,6	35,0	28,1	58,9	3 143
Moyen	27,3	46,5	27,2	21,2	53,0	3 318
Quatrième	22,2	43,1	21,5	17,9	47,2	3 676
Le plus élevé	20,5	39,8	18,9	15,7	44,3	4 174
Ensemble	26,5	46,1	27,1	22,1	52,0	17 347

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 9.20 Distance à l'établissement de soins de santé

Répartition (en %) des femmes de 15–49 ans par durée de trajet pour atteindre l'établissement de santé le plus proche et par moyen de transport pour se rendre à l'établissement de santé le plus proche, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Durée de trajet pour atteindre l'établissement de santé le plus proche					Moyens de transport utilisés pour se rendre à l'établissement de santé le plus proche				
	<30 minutes	30–59 minutes	60–119 minutes	≥2 heures	Total	Motorisé[1]	Non motorisé[2]	Autre	Total	Effectif de femmes
Âge										
15–19	65,5	22,0	9,5	3,0	100,0	23,8	75,8	0,5	100,0	3 862
20–34	60,4	23,4	12,2	4,1	100,0	27,0	72,9	0,1	100,0	8 665
35–49	57,7	23,8	13,4	5,2	100,0	27,9	72,1	0,0	100,0	4 820
Accès aux soins de santé										
La distance à l'établissement de santé est un problème	49,4	26,8	16,7	7,1	100,0	31,9	68,0	0,1	100,0	4 700
La distance à l'établissement de santé n'est pas un problème	65,0	21,8	10,1	3,0	100,0	24,5	75,3	0,2	100,0	12 646
Moyens de transport utilisés pour se rendre à l'établissement de santé le plus proche										
Motorisé[1]	46,4	30,4	16,3	6,8	100,0	na	na	na	na	4 600
Non motorisé[2]	66,0	20,6	10,4	3,1	100,0	na	na	na	na	12 715
Autre	(66,0)	(9,6)	(0,0)	(24,3)	100,0	na	na	na	na	32
Résidence										
Bamako	78,9	16,4	3,2	1,6	100,0	17,8	81,8	0,4	100,0	2 675
Autre urbain	71,2	22,3	5,8	0,7	100,0	30,2	69,4	0,4	100,0	2 048
Ensemble urbain	75,6	18,9	4,3	1,2	100,0	23,2	76,4	0,4	100,0	4 723
Rural	55,2	24,8	14,8	5,2	100,0	27,8	72,1	0,1	100,0	12 624
Région										
Kayes	68,3	18,5	9,9	3,3	100,0	31,1	68,9	0,0	100,0	2 635
Koulikoro	57,5	25,3	13,6	3,6	100,0	19,5	80,5	0,0	100,0	4 018
Sikasso	60,2	23,3	10,9	5,6	100,0	29,4	70,1	0,5	100,0	3 143
Ségou	47,4	32,9	15,3	4,4	100,0	40,6	59,4	0,1	100,0	2 574
Mopti	61,0	21,7	14,3	3,0	100,0	21,5	78,5	0,1	100,0	1 530
Tombouctou	36,5	27,4	22,1	14,0	100,0	39,6	60,3	0,0	100,0	281
Gao	35,4	17,7	32,5	14,4	100,0	23,3	76,5	0,2	100,0	485
Kidal	†	†	†	†	100,0	†	†	†	100,0	6
Bamako	78,9	16,4	3,2	1,6	100,0	17,8	81,8	0,4	100,0	2 675
Niveau d'instruction										
Aucun	54,9	24,1	15,1	5,9	100,0	26,4	73,4	0,2	100,0	9 382
Primaire	61,8	23,6	11,2	3,4	100,0	23,9	75,8	0,3	100,0	2 926
Secondaire ou plus	71,0	21,2	6,4	1,4	100,0	28,1	71,7	0,1	100,0	5 039
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	47,1	24,3	20,3	8,3	100,0	34,6	65,4	0,0	100,0	3 036
Second	49,4	28,5	16,2	5,8	100,0	29,7	70,1	0,2	100,0	3 143
Moyen	58,0	23,2	13,3	5,5	100,0	24,3	75,5	0,2	100,0	3 318
Quatrième	66,1	23,8	8,3	1,7	100,0	19,6	80,3	0,1	100,0	3 676
Le plus élevé	76,8	17,7	4,6	0,8	100,0	26,1	73,5	0,3	100,0	4 174
Ensemble	60,8	23,2	11,9	4,1	100,0	26,5	73,3	0,2	100,0	17 347

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.
na = non applicable
[1] Comprend voiture/camion, bus public, motocyclette/scooter et bateau à moteur
[2] Comprend charrette tirée par un animal, bicyclette, bateau sans moteur et marche
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

SANTÉ, DÉVELOPPEMENT ET BIEN-ÊTRE DE L'ENFANT

10

Principaux résultats

- ***Vaccinations :*** Au moment de l'enquête, 52 % des enfants âgés de 12 à 23 mois étaient complètement vaccinés contre tous les antigènes de base et 33 % l'étaient conformément au calendrier national.
- ***Symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA) :*** 2 % des enfants de moins de 5 ans ont présenté des symptômes d'infection respiratoire aiguë au cours des 2 semaines précédant l'interview. Des conseils ou un traitement ont été recherchés pour 47 % de ces enfants
- ***Fièvre :*** Des conseils ou un traitement ont été recherchés pour 51 % des enfants de moins de 5 ans ayant présenté de la fièvre au cours des 2 semaines précédant l'interview.
- ***Diarrhée :*** Des conseils ou un traitement ont été recherchés pour 37 % des enfants de moins de 5 ans ayant souffert de diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview. En outre, 30 % des enfants souffrant de diarrhée ont reçu une TRO mais 29 % n'ont reçu aucun traitement contre la diarrhée.
- ***Indice de développement de la petite enfance 2030 :*** Au Mali, 40 % des enfants de 24–59 mois sont en bonne voie de développement, en termes de santé, d'apprentissage et de bien-être psychosocial.
- ***Personnes s'occupant d'enfants ne vivant pas avec un parent biologique :*** parmi les enfants de 0–17 ans n'ayant jamais été mariés, 11 % ne vivent avec aucun de leurs parents biologiques. Dans 30 % des cas, c'est un grand-parent qui s'occupe de ces enfants et dans 22 % des cas, c'est un oncle ou une tante. Dans 3 % des cas, personne ne s'occupe de l'enfant qui n'a jamais été marié et qui ne vit avec aucun de ses parents biologiques.
- ***Fréquence des contacts avec les parents qui vivent ailleurs :*** Parmi les enfants de 0 à 17 ans n'ayant jamais été mariés et dont la mère vit ailleurs, 47 % sont en contact avec leur mère au moins une fois par semaine. Cinquante-deux pour cent des enfants dont le père vit ailleurs sont en contact avec leur père au moins une fois par semaine.

Les informations sur la santé et la survie des enfants permettent aux décideurs et aux responsables de programmes d'évaluer l'efficacité des stratégies actuelles, de mettre en place des interventions appropriées pour prévenir les décès dus aux maladies infantiles et contribuer à améliorer la santé des enfants au Mali.

Ce chapitre présente des informations sur le poids à la naissance et le statut de vaccination des jeunes enfants. On y examine également la prévalence et les comportements de recours aux soins pour trois maladies infantiles courantes : les infections respiratoires aiguës (IRA), la fièvre et la diarrhée.

10.1 TAILLE ET POIDS DE L'ENFANT À LA NAISSANCE

Parmi les naissances vivantes des 2 années ayant précédé l'enquête, un poids à la naissance a été déclaré pour 51 % d'entre elles. Le poids à la naissance déclaré a été relevé à partir d'un enregistrement écrit pour 25 % des naissances vivantes et pour 26 % des naissances le poids à la naissance est basé sur la seule déclaration de la mère (**Tableau 10.1**).

Pour chacune des naissances vivantes des deux dernières années précédant l'enquête, on a demandé à la mère son estimation de la grosseur de l'enfant à la naissance : très petit, plus petit que la moyenne, moyen ou plus gros que la moyenne. Selon la déclaration des mères, 85 % des enfants étaient moyens ou plus gros que la moyenne à leur naissance et 3 % étaient très petits.

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage de naissances pour lesquelles on dispose d'un poids à la naissance varie non seulement entre les régions mais aussi selon le niveau d'instruction de la mère et du milieu de résidence : Ce pourcentage est de seulement 17 % dans la région de Tombouctou contre 78 % dans le District de Bamako.

- Parmi les naissances dont la mère n'a aucun niveau d'instruction, on dispose du poids à la naissance dans 42 % des cas contre 73 % des cas quand la mère a le niveau secondaire ou plus ; enfin, le pourcentage de naissances dont on connaît le poids à la naissance varie de 44 % dans le milieu rural à 78 % dans l'ensemble urbain et du quintile le plus bas au plus élevé, ce pourcentage passe de 35 % à 81 %.

10.2 VACCINATION DES ENFANTS

La vaccination universelle des enfants contre les maladies courantes évitables grâce à la vaccination est essentielle pour réduire la morbidité et la mortalité des enfants. Au Mali, les vaccins courants comprennent le BCG (tuberculose) ; le vaccin antipolio oral (VPO) ou le vaccin antipolio inactivé (VPI) ; le vaccin pentavalent ou DTC-HepB-Hib (diphtérie, tétanos, coqueluche, hépatite B et Haemophilus influenzae B) ; le vaccin pneumococcique conjugué (PCV13), le vaccin antirotavirus ; le vaccin antirougeoleux (VAR) ; le vaccin contre la fièvre jaune (VAA) et le vaccin contre la méningite (MenAfriVac).

Les informations sur la couverture vaccinale ont été obtenues de deux façons dans le cadre de l'EDS du Mali : à partir des registres de vaccination, y compris les carnets de vaccination ou de santé, et à partir de déclarations verbales. Pour chaque enfant né au cours des trois années précédant l'enquête, on a demandé à la mère de montrer à l'enquêteur le carnet de vaccination ou tout autre document ayant servi à enregistrer les vaccinations de l'enfant. Si un carnet de vaccination ou tout autre document était disponible, l'enquêteur recopie les dates de chaque vaccination reçue. Si une vaccination n'était pas enregistrée comme ayant été administrée sur le carnet de vaccination ou sur le document, on a demandé à la mère de se rappeler si ce vaccin spécifique avait été administré. Si la mère n'était pas en mesure de présenter le carnet de vaccination ou tout autre document relatif à l'enfant, on lui a demandé de se rappeler si l'enfant avait reçu les vaccins suivants à la naissance : BCG, polio, DTC-HepB-Hib, pneumocoque, rotavirus, MenAfriVac, VAA et VAR. Si elle a déclaré que l'enfant avait reçu l'un des vaccins multidoses, on lui a demandé le nombre de doses reçues par l'enfant.

10.2.1 Possession d'un carnet de vaccination et sa disponibilité

Les carnets de vaccination sont un outil essentiel pour s'assurer qu'un enfant a reçu tous les vaccins recommandés dans les délais prévus. Parmi les enfants de 12–23 mois et de 24–35 mois respectivement 88 % et 85 % avaient déjà eu un carnet de vaccination ou un autre document sur lequel leurs vaccinations étaient enregistrées (**Tableau 10.2**). Mais toutes les mères n'ont pas été en mesure de produire le carnet de

vaccination de leur enfant au moment de l'interview. Un carnet de vaccination était disponible au moment de l'interview pour seulement 68 % des enfants âgés de 12–23 mois et 52 % de ceux de 24–35 mois.

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Les pourcentages des enfants de 12–23 mois et de 24–35 mois ayant déjà eu un carnet de vaccination ou un autre document sur lequel leurs vaccinations étaient enregistrées sont plus élevés en milieu urbain qu'en milieu rural (95 % contre 86 % pour les enfants de 12–23 mois et 93 % contre 83 % pour les enfants de 24–35 mois).
- De même, les pourcentages des enfants dont le carnet a été vu sont plus élevés en milieu urbain qu'en milieu rural (71 % contre 67 % pour les enfants de 12–23 mois et 56 % contre 50 % pour les enfants de 24–35 mois).
- Les pourcentages des enfants dont le carnet a été vu augmentent avec le niveau d'instruction de la mère, passant, pour les enfants de 12–23 mois de 66 % quand la mère n'a aucun niveau d'instruction à 71 % quand la mère a le niveau d'instruction secondaire ou plus. De même, parmi les enfants de 24–35 mois, ces pourcentages varient respectivement de 49 % à 54 %.

10.2.2 Couverture vaccinale de base

Complètement vaccinés—antigènes de base

Pourcentage d'enfants ayant reçu des vaccins spécifiques à un moment quelconque avant l'enquête (selon un carnet de vaccination ou déclaration de la mère). Pour avoir reçu tous les antigènes de base, un enfant doit recevoir au minimum :

- Une dose de vaccin BCG contre la tuberculose
- Trois doses de vaccin antipoliomyélitique administrées sous la forme orale, de vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) ou d'une combinaison des deux.
- Trois doses du vaccin associé DTC contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche.
- Une dose de vaccin contre la rougeole (VAR).

Échantillon : Enfants âgés de 12–23 mois et de 24–35 mois

Le pourcentage d'enfants ayant reçu tous les antigènes « de base » est considéré depuis longtemps comme une mesure essentielle de la couverture vaccinale. Les enfants sont considérés comme complètement vaccinés contre tous les antigènes de base s'ils ont reçu le vaccin BCG, trois doses du vaccin antipoliomyélitique et du vaccin DTC, et une dose unique du vaccin antirougeoleux. Au Mali, le vaccin BCG est généralement administré à la naissance ou lors du premier contact clinique, tandis que les vaccins contre la polio et le vaccin DTC-HepB-Hib sont administrés dans les 6, 10 et 14 premières semaines de la vie de l'enfant. Un premier vaccin contre la rougeole doit être administré à l'âge de 9 mois.

Au Mali, 84 % des enfants de 12–23 mois ont reçu le BCG, 73 % ont reçu la troisième dose de DTC-HepB-Hib, 63 % la troisième dose de VPO et 73 % la première dose de VPI. En outre, 69 % ont été vaccinés contre la rougeole.

Globalement, le pourcentage d'enfants de 12–23 mois complètement vaccinés à n'importe quel moment avant l'enquête, c'est-à-dire ceux qui ont reçu tous les antigènes de base, est de 52 %. À l'opposé, parmi les enfants de 12–23 mois, 13 % n'ont reçu aucun vaccin. Parmi ceux de 24–35 mois, le pourcentage est de 16 % (**Tableau 10.3 1**).

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- La couverture vaccinale complète (antigènes de base) des enfants de 12–23 mois est plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural (58 % contre 51 %) et à Bamako que dans les autres milieux urbains (64 % contre 50 %) (**Tableau 10.4**).
- Dans les régions, la couverture vaccinale complète (antigènes de base) des enfants de 12–23 mois présente des disparités importantes : la plus forte proportion d'enfants complètement vaccinés est enregistrée dans la région de Ségou (59 %) et la plus faible dans la région de Tombouctou (16 %) (**Carte 10.1**).

Carte 10.1 **Couverture vaccinale par région**

Pourcentage d'enfants de 12–23 mois complètement vaccinés (vaccins de base) à un moment quelconque avant l'enquête



Note : Pour des raisons d'insécurité, les données de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région et ne sont pas présentées séparément.

Tendances : Entre 1995–1996 et 2023–2024, la couverture vaccinale (antigènes de base) des enfants de 12–23 mois s'est améliorée, passant de 32 % à 52 %. Dans la même période, le pourcentage d'enfants de 12–23 mois n'ayant reçu aucun vaccin de base est passé de 23 % en 1995–1996 à 13 % en 2023–2024. (**Graphique 10.1**).

***Graphique 10.1* Tendances de la couverture vaccinale des enfants**

Pourcentage d'enfants de 12–23 mois ayant reçu tous les vaccins de base à un moment quelconque avant l'enquête



10.2.3 Couverture vaccinale conformément au calendrier national

Complètement vaccinés conformément au calendrier national (enfants âgés de 12 à 23 mois)

Pourcentage d'enfants ayant reçu des vaccins spécifiques à un moment quel qu'il soit avant l'enquête (selon leur carnet de vaccination ou la déclaration de la mère). Pour être complètement vacciné conformément au calendrier national, un enfant doit recevoir les vaccins suivants :

- Une dose de vaccin BCG
- VPO (dose à la naissance)
- Trois doses de VPO et une dose de VPI[1]
- Trois doses de DTC-HepB-Hib
- Trois doses de PCV13
- Trois doses de Rotavirus
- Une dose de vaccin contre la rougeole (VAR)
- Une dose du vaccin contre la fièvre jaune.
- Une dose de vaccin contre la méningite (MenAfriVac)

Échantillon : Enfants de 12–23 mois

Complètement vaccinés conformément au calendrier national (enfants âgés de 24–35 mois)

Pourcentage d'enfants ayant reçu des vaccins spécifiques à un moment quelconque avant l'enquête (selon leur carnet de vaccination ou la déclaration de la mère). Pour être complètement vacciné conformément au calendrier national, un enfant doit recevoir tous les vaccins énumérés ci-dessus ainsi que ceux-ci-dessous :

- Une deuxième dose de vaccin contre la rougeole (VAR).

Échantillon : Enfants de 24–35 mois

Le pourcentage d'enfants âgés de 12 à 23 mois et de 24 à 35 mois complètement vaccinés conformément au calendrier national constitue une deuxième mesure de la couverture vaccinale. Dans ce rapport, un enfant de 12–23 mois est considéré comme étant complètement vacciné conformément au calendrier national s'il a reçu tous les antigènes de base ainsi qu'une dose de VPO à la naissance, une dose de VPI, trois doses de vaccin contre le pneumocoque, trois doses de vaccin antirotavirus, une dose du vaccin contre

[1] Le VPI 2 ayant été lancé en novembre 2021, tous les enfants éligibles n'avaient pas accès au vaccin au moment de l'enquête. Par conséquent, le VPI 2 a été exclu de cet indicateur.

la fièvre jaune et une dose de vaccin contre la méningite (MenAfriVac). Les enfants de 24–35 mois ont reçu tous les vaccins conformément au calendrier national s'ils ont reçu une deuxième dose du vaccin contre la rougeole, (VAR) en plus de tous les vaccins nécessaires pour les enfants de 12–23 mois.

Le pourcentage d'enfants complètement vaccinés conformément au calendrier national est de 33 % chez les enfants de 12–23 mois et de 14 % chez ceux de 24–35 mois. En outre des vaccins de base décrit ci-haut, 71 % d'enfants de 12–23 mois ont reçu la troisième dose de PCV13 contre le pneumocoque, 71 % la troisième dose de rotavirus. Le vaccin de la fièvre jaune a été administré à 65 % des enfants de 12–23 mois et celui contre la méningite à 66 % des enfants d'entre eux (**Graphique 10.2**).

Les enfants de 24–35 mois ont quant à eux reçus une deuxième dose de rougeole en plus de tous les vaccins reçus.

En considérant l'âge auquel est intervenue la vaccination, 28 % des enfants de 12–23 mois ont été complètement vaccinés conformément au calendrier national et à un âge approprié. Cette proportion est de 11 % chez les enfants de 24–35 mois (**Tableau 10.3**).

Graphique 10.2 Vaccination des enfants

Pourcentage d'enfants de 12 à 23 mois vaccinés à un moment quelconque avant l'enquête



+ A cause d'une erreur de saut dans le questionnaire, on n'a pas posé la question aux mères de 152 enfants âgés de 12–23 mois et de 167 enfants âgés 24–35 mois concernant la vaccination contre la méningite
* conformément au calendrier national

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Les enfants dont la mère n'a aucun niveau d'instruction sont les moins vaccinés, avec un taux de couverture vaccinale complète conformément au calendrier national de 29 % contre 37 % pour les enfants dont la mère at le niveau d'instruction primaire et 40 % pour les enfants dont la mère a le niveau d'instruction secondaire ou plus (**Tableau 10.4**).

- La couverture vaccinale complète des enfants de 12–23 mois conformément au calendrier national est inégale selon le milieu de résidence, avec une nette disparité entre les milieux urbain et rural. Cette couverture vaccinale est plus élevée à Bamako (52 %) que dans les autres milieux urbains (28 %). Le pourcentage d'enfants complètement vaccinés est de 41 % en milieu urbain indiquant une couverture supérieure à la moyenne nationale (33 %). Dans le milieu rural, seulement 31 % des enfants sont complètement vaccinés (**Graphique 10.3**).

***Graphique 10.3* Couverture vaccinale par résidence**

Pourcentage d'enfants de 12–23 mois complètement vaccinés (conformément au calendrier national) à un moment quelconque avant l'enquête



Source des vaccins

Au Mali, c'est majoritairement dans le secteur médical public que les enfants, quel que soit leur âge (12–23 mois ou 24–35 mois), ont reçu la plupart de leurs vaccinations (90 %). On peut néanmoins souligner qu'à Bamako et dans la région de Koulikoro, le pourcentage d'enfants vaccinés dans le secteur médical privé est non négligeable (respectivement 23 % et 10 % pour les enfants de 12–23 mois et respectivement 22 % et 11 % pour les enfants de 24–35 mois) (**Tableau 10.5**).

10.3 SYMPTÔMES D'INFECTION RESPIRATOIRE AIGUË (IRA) ET COMPORTEMENT DE RECOURS AUX SOINS

Les infections respiratoires aiguës (IRA), et particulièrement la pneumonie, constituent l'une des premières causes de mortalité des enfants dans les pays en développement. Pour évaluer la prévalence de ces infections parmi les enfants, on a demandé aux mères si leurs enfants avaient souffert de la toux, s'ils avaient eu un souffle court et rapide ou des difficultés pour respirer à n'importe quel moment au cours des deux dernières semaines précédant l'interview et, si oui, on a ensuite demandé si ce souffle rapide ou ces difficultés pour respirer étaient dus à un problème de bronche ou à un nez bouché ou qui coulait. Par ailleurs, la fièvre peut être un symptôme important de nombreuses maladies. C'est pourquoi au cours de l'EDSM-VII, on a demandé aux mères si leurs enfants avaient eu de la fièvre durant les deux semaines ayant précédé l'interview. En outre, pour les enfants ayant présenté ces symptômes d'IRA et pour ceux ayant eu de la fièvre, on a cherché à connaître le pourcentage de ceux qui avaient été conduits en consultation ainsi que les traitements éventuels qui avaient été donnés. Précisons que la prévalence présentée ne reflète que la situation qui prévalait pendant les deux semaines ayant précédé l'interview.

Recours aux soins pour des symptômes de maladie respiratoire aiguë (MRA)

Enfants présentant des symptômes d'infection respiratoire aiguë pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés. Symptômes d'IRA : respiration courte associée à des problèmes dans la poitrine et/ou difficultés respiratoires, respiration associée à des problèmes dans la poitrine.

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans présentant des symptômes d'infection respiratoire aigüe au cours des 2 semaines précédant l'interview

Parmi les enfants de moins de 5 ans, 2 % d'entre eux ont présenté des symptômes d'IRA au cours des deux semaines précédant l'interview. Pour 47 % de ces enfants, des conseils ou un traitement ont été recherchés et pour 17 % des enfants, les conseils ou le traitement ont été recherchés rapidement, c'est-à-dire le jour même où le jour suivant (**Tableau 10.6**).

Source de conseils ou de traitement des symptômes d'IRA

C'est dans le secteur médical public (21 %), essentiellement dans les centres de santé communautaire (CSCOM) (15 %), que les personnes responsables de l'enfant ont recherché les conseils ou le traitement pour les enfants ayant eu des symptômes d'IRA. Pour les enfants ayant présenté des symptômes et pour lesquels on a recherché des soins, les pourcentages sont respectivement de 42 % et 29 %. Dans 27 % des cas, on s'est adressé au secteur médical privé, surtout à la pharmacie (14 %) et enfin pour 33 % des enfants, les conseils ont été obtenus auprès d'une autre source, en majorité dans des boutiques (16 %) (**Tableau 10.7**).

10.4 FIÈVRE ET COMPORTEMENT DE RECOURS AUX SOINS

La fièvre est une manifestation majeure du paludisme et d'autres infections aiguës chez l'enfant. En outre, parce qu'elle figure parmi les signes généraux d'une maladie qui peut survenir toute l'année, la fièvre contribue à la morbidité et la mortalité chez les jeunes enfants. Sa prise en charge rapide (dans les 24 à 48 heures) revêt une importance capitale pour la réduction de la morbidité et de la mortalité infanto-juvénile.

Recours aux soins pour la fièvre

Enfants présentant de la fièvre pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés.

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre dans les 2 semaines précédant l'interview

La prévalence de la fièvre a été évaluée en demandant aux mères si leurs enfants de moins de 5 ans avaient eu de la fièvre au cours des deux semaines ayant précédé l'interview. Dans l'ensemble, 15 % des enfants de moins de 5 ans ont eu de la fièvre durant la période de référence indiquée. Des conseils ou un traitement ont été recherchés pour 51 % de ces enfants. Dans 22 % des cas, ces conseils ou ce traitement ont été recherchés le jour même où le lendemain. En outre, un enfant sur quatre (25 %) a reçu des antibiotiques pour traitement (**Tableau 10.8**).

Tendances : Entre 2018 et 2023–2024, le pourcentage d'enfants de moins de cinq ans ayant eu de la fièvre et pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement a diminué, passant de 53 % à 51 %. Par contre, le pourcentage d'enfants dont la fièvre a été traitée avec des antibiotiques a augmenté, passant de 17 % à 25 %.

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage d'enfants ayant eu de la fièvre et pour lesquels on a recherché des soins est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural (54 % contre 50 %).
- Plus d'un enfant avec de la fièvre sur deux a bénéficié d'une recherche de traitement dans les régions de Koulikoro (56 %), Bamako (55 %), Gao (54 %), Mopti (53 %) et Sikasso (51 %) contre 43 % à Kayes, 45 % à Ségou et 46 % à Tombouctou.
- Le pourcentage d'enfants pour lesquels on a recherché des soins pour la fièvre augmente avec le niveau d'instruction de la mère, passant de 46 % parmi ceux dont la mère n'a aucun niveau d'instruction à 58 % parmi ceux dont la mère a le niveau secondaire ou plus.

- Du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, le pourcentage d'enfants pour lesquels on a recherché des soins pour traiter la fièvre augmente, passant de 42 % à 61 %.

- Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre, 25 % ont été traités avec des antibiotiques. Ce pourcentage est nettement plus élevé à Bamako (31 %), parmi les enfants dont la mère a le niveau secondaire ou plus (35 %) et parmi ceux du quintile le plus élevé (35 %).

10.5 MALADIE DIARRHÉIQUE

Au Mali, les maladies diarrhéiques restent une cause importante de mortalité et de morbidité des jeunes enfants. La thérapie de réhydratation orale (TRO) et la supplémentation en zinc, associées à une alimentation continue, constituent les interventions recommandées pour traiter la diarrhée. La TRO peut se présenter sous la forme d'une augmentation des liquides (en particulier un allaitement maternel accru), d'un liquide préparé à partir d'un sachet de sels de réhydratation orale (SRO) ou de liquides faits maison comme le recommandent les autorités publiques. Il est prouvé que le zinc réduit l'intensité et la durée de la diarrhée, et il est recommandé que tous les enfants souffrant de diarrhée suivent une cure de zinc pendant 5 jours.

10.5.1 Diarrhée et comportement de recours aux soins

Recours aux soins pour traiter la diarrhée

Enfants souffrant de diarrhée pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés.

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans ayant souffert de diarrhée dans les 2 semaines précédant l'interview

Dans l'ensemble, 17 % des enfants de moins de 5 ans ont souffert de diarrhée au cours des deux dernières semaines précédant l'interview. Des conseils ou un traitement médical ont été recherchés pour 37 % de ces enfants (**Tableau 10.9**).

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- La prévalence de la diarrhée augmente rapidement et de manière importante pour atteindre ses niveaux les plus élevés dans les groupes d'âges 6–11 mois (32 %) et 12–23 mois (29 %), puis diminue par la suite pour atteindre son niveau le plus faible à 48–59 mois (5 %) (**Graphique 10.4**).

- Les niveaux les plus élevés de la prévalence de la diarrhée sont enregistrés dans les régions de Mopti (25 %), Kayes (23 %) et Sikasso (19 %). À l'opposé, ce sont les régions de Koulikoro et Tombouctou qui enregistrent le niveau le plus faible (12 % dans les deux cas).

Graphique 10.4 **Prévalence de la diarrhée par âge**

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines précédant l'interview



- Le pourcentage d'enfants pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement contre la diarrhée augmente en fonction du niveau d'instruction de la mère (35 % quand la mère n'aucun niveau à 43 % quand elle a le niveau secondaire ou plus).

10.5.2 Pratiques alimentaires

Pratiques alimentaires adaptées

Les enfants souffrant de diarrhée reçoivent davantage de liquides que d'habitude, et autant de nourriture que d'habitude ou davantage.

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans ayant souffert de diarrhée dans les 2 semaines précédant l'interview

Au cours des épisodes diarrhéiques, il est recommandé de donner plus de liquides et d'aliments à l'enfant. Cependant, les résultats obtenus indiquent que 39 % des enfants ayant eu la diarrhée ont reçu la même quantité de liquides qu'en temps normal et que pour plus d'un tiers des enfant (36 %), les quantités de liquides ont même été réduites. Enfin, 3 % des enfants n'ont reçu aucun liquide. Seulement 21 % des enfants malades ont reçu plus de liquides que d'habitude (**Tableau 10.10** et **Graphique 10.5**).

Graphique 10.5 **Pratiques alimentaires pendant la diarrhée**



En ce qui concerne la prise d'aliments, on constate que 46 % des enfants ayant eu la diarrhée ont été nourris conformément aux recommandations ; soit ils ont reçu la même quantité de nourriture que d'habitude (38 %), soit ils en ont reçu plus que d'habitude (8 %). Par contre, dans 43 % des cas, les enfants ont reçu moins d'aliments que d'habitude et dans 3 % des cas, aucune nourriture n'a été donnée.

10.5.3 Thérapie de réhydratation orale, zinc, alimentation continue et autres traitements

Thérapie de réhydratation orale

Les enfants souffrant de diarrhée reçoivent davantage de liquides, ou un liquide préparé à partir d'un sachet spécial de sels de réhydratation orale (SRO), ou une solution maison recommandée (SMR).

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans ayant souffert de diarrhée dans les 2 semaines précédant l'interview

Les maladies diarrhéiques, du fait de leurs conséquences (déshydratation et malnutrition), constituent, directement ou indirectement, une des principales causes de décès des jeunes enfants dans les pays en développement. Les décès dus à la diarrhée peuvent facilement être évités grâce à un traitement précoce et approprié. L'approche PCIME (prise en charge intégrée des maladies de l'enfant) est généralement préconisée pour diminuer la morbidité et la mortalité liées aux maladies diarrhéiques.

Les traitements administrés aux enfants ayant la diarrhée sont présentés au **Graphique 10.6**. Près d'un enfant sur trois a été traité avec une TRO (30 %). Près d'un enfant sur quatre a reçu une TRO et a continué à être alimenté (24 %). Dix pour cent ont reçu une solution d'un sachet SRO ou des liquides SRO préconditionnés ; 7 % ont été traités avec du zinc et 3 % ont reçu des SRO et du zinc. Dans 16 % des cas, on a eu recours à des antibiotiques et pour deux enfants sur cinq, on a utilisé des remèdes maison (40 %). Les médicaments anti-motilité n'ont été que faiblement utilisés (7 %). Cependant, un peu plus d'un enfant malade sur quatre (29 %) n'a reçu aucun traitement (**Tableau 10.11**).

***Graphique 10.6* Traitement de la diarrhée**

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines précédant l'interview



Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage d'enfants à qui on a administré une TRO pour traiter la diarrhée varie de 21 % dans la région de Mopti à 40 % dans celle de Gao. Ce pourcentage est de 48 % dans le District de Bamako.
- Le recours à la TRO pour traiter la diarrhée est plus fréquent parmi les enfants dont la mère a le niveau secondaire ou plus que pour les autres (39 % contre 30 % quand la mère a le niveau primaire et 27 % quand elle n'a aucun niveau d'instruction).
- Du quintile le plus bas au plus élevé, le pourcentage d'enfants traités avec une TRO augmente, passant de 25 % à 44 %. De même, le pourcentage d'enfants traités avec une TRO et qui ont continué à s'alimenter passe de 20 % à 37 %.

Source des conseils ou des traitements contre la diarrhée

Le **Tableau 10.12** présente les résultats concernant les sources auprès desquelles les conseils et traitements ont été recherchés. Au Mali, c'est au secteur public que l'on s'adresse surtout quand on recherche des conseils ou un traitement pour la diarrhée des enfants (33 %), en particulier dans les centres de santé communautaires (22%), suivis des centres de santé de référence (5 %). Une proportion significative d'enfants ayant reçu des sels de réhydratation orale (SRO) ou du zinc ont consulté des établissements médicaux publics (respectivement 52 % et 53 %). Le secteur privé a été consulté pour 18 % des enfants atteints de diarrhée pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement, essentiellement les pharmacies (11 %), suivis des hôpitaux/cliniques (5 %). Environ 27 % des enfants recevant des SRO et 24 % recevant du zinc ont reçu leur traitement dans des établissements privés. Par contre, pour très peu d'enfants on a sollicité un traitement auprès du secteur médical ONG, (0,1 %). D'autres sources (comme les guérisseurs/praticiens traditionnels et les vendeurs de médicaments ambulants) ont été également beaucoup consultées (respectivement 21 % et 14 %).

10.6 TRAITEMENT DES MALADIES DE L'ENFANT

Au Mali, deux pour cent des enfants de moins de 5 ans avaient eu des symptômes d'IRA dans les deux semaines avant l'interview et parmi ces enfants, 47 % ont bénéficié de conseils ou de traitement. En outre, 15 % des enfants de moins de 5 ans avaient eu de la fièvre la semaine avant l'interview et pour 51 % de ces enfants, des conseils ou traitements ont été recherchés. La diarrhée a affecté 17 % des enfants de moins de 5 ans la semaine avant l'interview et dans 37 % des cas, la démarche pour rechercher des conseils ou un traitement a été effectuée (**Graphique 10.7**).

Graphique 10.7 **Symptômes des maladies infantiles et recours aux soins**



10.7 DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE

Les données relatives au développement de la petite enfance permettront de savoir si les enfants du Mali sont sur la bonne voie en ce qui concerne la santé, l'apprentissage et le bien-être psychosocial. Le développement de la petite enfance est un processus multidimensionnel qui implique une progression ordonnée des compétences et des capacités motrices, cognitives, linguistiques, socio-émotionnelles et de régulation au cours des premières années de la vie. Bien que distincts, ces domaines du développement de la petite enfance sont interconnectés. Il est essentiel de nourrir et de soutenir toutes ces dimensions de manière holistique pour que les enfants aient les meilleures chances de réaliser tout leur potentiel. La croissance physique, les compétences en matière de lecture, d'écriture et de calcul, le développement socio-émotionnel et la préparation à l'apprentissage déterminent l'évolution de la santé, de l'apprentissage et du bien-être tout au long de la vie (Shonkoff et Phillips 2000).

10.7.1 Indice de développement de la petite enfance 2030

Indice de développement de la petite enfance 2030 (IDPE 2030)

L'IDPE 2030 comprend 20 rubriques organisées selon les trois domaines généraux de la santé, de l'apprentissage et du bien-être psychosocial. Chacun des trois domaines généraux se compose d'une gamme de sous-domaines fondamentaux :

- Sous-domaines de la santé : développement de la motricité globale, développement de la motricité fine et autogestion de la santé.
- Sous-domaines d'apprentissage : langage expressif, littératie, numératie, pré-écriture et fonction d'exécution.
- Sous-domaines du bien-être psychosocial : compétences affectives, compétences sociales, comportement intériorisé et comportement extériorisé.

La conception du module IDPE 2030 ne vise pas à rendre compte séparément des domaines individuels. Le module vise en revanche à produire un score synthétique saisissant les concepts développementaux interdépendants incorporés dans les trois domaines mentionnés dans l'ODD 4.2.1.

L'EDSM a inclus le module de développement de la petite enfance 2030 (IDPE 2030) développé par l'UNICEF pour le programme MICS qui permet d'élaborer l'indice de développement de la petite enfance (IDPE 2023). Ce module a été administré dans le cadre du questionnaire femme de l'EDSM-VII. Les personnes interrogées doivent répondre à 20 questions pour chaque enfant biologique de 24–59 mois vivant avec elles. Les questions portent sur le comportement des enfants dans certaines situations de la vie

quotidienne et sur les compétences et connaissances acquises, reflétant la difficulté croissante des connaissances que les enfants acquièrent en grandissant. Les données produites par l'IDPE 2030 peuvent servir à actualiser les efforts des gouvernements destinés à améliorer les résultats en matière de développement des enfants.

Enfants dont le développement correspond à l'indice de développement de la petite enfance (IDPE 2030)

Pourcentage d'enfants ayant atteint le nombre minimum d'étapes IDPE 2030 prévu pour leur groupe d'âge, comme suit :

- Enfants de 24–29 mois : au moins 7 étapes
- Enfants de 30–35 mois : au moins 9 étapes
- Enfants de 36–41 mois : au moins 11 étapes
- Enfants de 42–47 mois : au moins 13 étapes
- Enfants de 48–59 mois : au moins 15 étapes

Échantillon : Enfants de 24–59 mois

Dans l'ensemble, 40 % des enfants de 24–59 mois sont en bonne voie de développement, en termes de santé, d'apprentissage et de bien-être psychosocial (**Tableau 10.13**).

Répartition par caractéristiques sociodémographiques

- Quarante-trois pour cent des filles et 38 % des garçons de 24–59 mois en bonne voie de développement en termes de santé, d'apprentissage et de bien-être psychosocial.
- Un pourcentage plus élevé d'enfants en milieu urbain (51 %) qu'en milieu rural (37 %) est en bonne voie de développement.
- Le pourcentage d'enfants dont le développement est en bonne voie en matière de santé, d'apprentissage et de bien-être psychosocial passe de 59 % chez les enfants âgés de 24 à 35 mois à 23 % chez les enfants âgés de 48 à 59 mois.
- Le pourcentage d'enfants dont le développement est en bonne voie en matière de santé, d'apprentissage et de bien-être psychosocial augmente avec le niveau d'instruction de la mère, passant de 36 % chez les enfants dont la mère n'a aucun niveau d'instruction à 51 % chez ceux dont la mère a un niveau 'd'instruction secondaire ou plus.
- Le pourcentage d'enfants dont le développement est en bonne voie en matière de santé, d'apprentissage et de bien-être psychosocial augmente avec le quintile de bien-être économique, passant de 40 % chez les enfants du quintile le plus bas à 52 % chez les enfants du quintile le plus élevé.

10.8 BIEN-ÊTRE DE L'ENFANT ET STRUCTURE DU MÉNAGE

Pour les enfants qui ne vivent pas avec un parent biologique, l'EDSM 2023–2024 a recueilli des informations sur la personne qui s'occupe principalement d'eux. Pour les enfants dont les parents sont décédés, l'enquête a recueilli des informations sur la date du décès du parent. Les interactions fréquentes entre les enfants et leurs parents qui vivent ailleurs, ainsi que l'échange d'argent et de biens entre le parent et le ménage de l'enfant, peuvent indiquer que l'enfant continue à recevoir un soutien social, affectif et financier pendant la séparation.

10.8.1 Résidence des enfants et survie des parents

Au Mali, 70 % des enfants de 0 à 17 ans n'ont jamais été mariés et vivent avec leurs deux parents, tandis que 11 % ne vivent avec aucun de leurs parents biologiques. Treize pour cent ont leur mère biologique qui vit ailleurs, et 21 % ont leur père biologique qui vit ailleurs. En outre, 2 % des enfants de 0 à 17 ans sont

orphelins de mère (ce qui signifie que leur mère est décédée), 4 % sont orphelins de père (ce qui signifie que leur père est décédé) et moins de 1 % sont des orphelins doubles (ce qui signifie que leurs deux parents sont décédés). Il faut signaler qu'un pourcent des enfants de 0–17 ans est déjà marié. (**Tableau 10.14**).

10.8.2 Personnes s'occupant d'enfants ne vivant pas avec un parent biologique

La proximité de la relation familiale entre les enfants et la personne qui s'occupe d'eux est associée à la qualité des soins qu'ils reçoivent (Akashi-Ronquest 2009 ; Case et al. 1999 ; Lopus 2017). Dans l'EDSM 2023–2024, des questions ont été posées pour identifier la personne qui s'occupe principalement des enfants de 0 à 17 ans qui n'ont jamais été mariés et qui ne vivent pas avec l'un de leurs parents biologiques, ainsi que la relation de cette personne avec l'enfant.

La personne qui s'occupe principalement de l'enfant est définie comme la personne qui assure la majeure partie de la prise en charge quotidienne de l'enfant. Il ne s'agit pas nécessairement de la personne qui apporte la plus grande partie du soutien financier à l'enfant.

Le **Tableau 10.15** présente la répartition des enfants de 0 à 17 ans en fonction de leur état matrimonial, de leurs arrangements de vie et de leur relation avec la personne qui s'occupe principalement d'eux. Parmi les enfants de 0 à 17 ans (population de droit), 1 % ont déjà été mariés, tandis que 88 % n'ont jamais été mariés et vivent avec l'un ou les deux parents biologiques. Les 12 % restants n'ont jamais été mariés et ne vivent avec aucun de leurs parents biologiques. Parmi eux, 30 % vivent avec un grand-parent, 22 % avec un oncle ou une tante, 4 % avec un frère ou une sœur et 7 % avec un autre parent ; 3 % n'ont personne pour s'occuper d'eux (**Graphique 10.8**).

***Graphique 10.8* Personnes s'occupant d'enfants ne vivant pas avec un parent biologique**

Répartition (en %) des enfants de 0–17 ans n'ayant jamais été mariés et ne vivant avec aucun de leurs parents biologiques



Note : Autres personnes comprennent belle-mère/beau-père,parent du beau parent, ami, et information manquante. Le total de pourcentage depasse 100 % à cause des arrondissements.

10.8.3 Durée de la séparation parent-enfant

La durée de la séparation d'avec un parent vivant ailleurs et la durée du statut d'orphelin décrivent la période pendant laquelle un enfant a été exposé aux risques associés à ces séparations. Le **Tableau 10.16.1** présente d'une part, la répartition des enfants de 0 à 17 ans n'ayant jamais été mariés et dont la mère ou le père vit ailleurs en fonction des durées moyenne et médiane de la séparation d'avec leur mère ou leur père et d'autre part la répartition des enfants de 0–17 ans dont le parent est décédé de les durée moyenne et médiane de l'orphelinage. Les variations de la durée de la séparation en fonction des caractéristiques sociodémographiques sont présentées dans le **Tableau 10.16.3**.

Parmi la population de droit des enfants de 0 à 17 ans dont le parent est vivant et vit ailleurs, les séparations de moins de 6 mois sont les plus fréquentes (33 % parmi ceux dont la mère vit ailleurs et 40 % parmi ceux dont le père vit ailleurs) (**Tableau 10.16.1**). Parmi les enfants dont la mère est vivante mais vit ailleurs, la durée moyenne de la séparation est de 2,9 ans et la durée médiane s'établit à 1,6 années. Parmi les enfants dont le père est vivant mais vit ailleurs la durée moyenne et celle médiane sont plus courtes (respectivement 2,2 années et 0,8 années).

Quand un parent est décédé, la durée moyenne de l'orphelinage, qu'il soit maternel ou paternel est de 4,8 années et la durée médiane s'établit a 3,6 années. Le **Tableau 10.16.2** présente ces informations pour les doubles orphelins. La durée moyenne du double orphelinage est de 3,9 années et la durée médiane est de 2,7 ans.

10.8.4 Union des parents

Pour les enfants qui vivent séparés d'un parent biologique, il peut être utile de comprendre si la séparation parent-enfant se produit dans un contexte où l'union parentale est intacte ou dans lequel les parents ne sont pas ensemble. Les séparations dans lesquelles l'union parentale est intacte peuvent être associées à une plus grande implication du parent absent auprès de l'enfant que lorsque le parent absent a un autre partenaire ou n'est pas en union.

Parmi les enfants de 0–17 ans (population de droit) n'ayant jamais été mariés et dont la mère vit ailleurs, dans plus des trois quarts des cas, (78 %), la mère est marié : 61 % ont leur mère qui est mariée à leur père biologique et 17 % ont leur mère qui est mariée mais pas avec leur père biologique. Quinze pour cent ont une mère qui n'est pas mariée et 7 % ne savent pas si la mère est mariée ou non. (**Tableau 10.17.1**).

Parmi les enfants de 0–17 ans (population de droit) n'ayant jamais été mariés et dont le père vit ailleurs, 33 % ont leur père qui est mariée à leur mère biologique et 5 % ont leur père qui est marié à une autre personne que leur mère biologique, 18 % ont un père qui n'est pas marié et 4 % ne savent pas si leur père est marié ou non (**Tableau 10.17.2**).

10.8.5 Fréquence des contacts avec les parents qui vivent ailleurs

La fréquence des contacts peut servir d'indicateur du niveau d'implication des enfants avec leurs parents qui vivent ailleurs, ainsi que du soutien que le parent apporte à l'enfant. Pour les enfants dont le parent vit ailleurs, on a demandé au cours de l'EDSM 2023–2024 à quelle fréquence l'enfant avait des contacts avec ce parent. Les contacts comprennent les visites en personne ainsi que toute communication entre le parent et l'enfant, comme les appels, les messages et les e-mails.

Parmi la population de droit des enfants de 0 à 17 ans n'ayant jamais été mariés et dont la mère vit ailleurs, 47 % sont en contact avec leur mère au moins une fois par semaine, tandis que 20 % n'ont aucun contact avec elle (**Tableau 10.18.1** et **Graphique 10.9**). Parmi les enfants 0 à 17 ans n'ayant jamais été mariés et dont le père vit ailleurs, 52 % sont en contact avec leur père au moins une fois par semaine et 23 % n'ont aucun contact avec lui (**Tableau 10.18.2** et **Graphique 10.9**).

***Graphique 10.9* Fréquence des contacts avec les parents qui vivent ailleurs**

Parmi la population de droit des enfants de 0–17 ans n'ayant jamais été mariés et dont la mère/le père vit ailleurs, répartition en pourcentage selon la fréquence des contacts



10.8.6 Lieu de résidence des parents qui vivent ailleurs

La distance qui sépare les parents de leur enfant peut déterminer la facilité avec laquelle l'enfant et le parent se verront pendant la période de séparation. L'endroit où vit le parent peut également aider à comprendre la nature et les raisons de la séparation, ce qui peut influencer l'impact de la séparation sur le bien-être de l'enfant. L'EDSM 2023–2024 a demandé si les parents qui vivaient ailleurs vivaient dans la même région que l'enfant, dans une autre région du Mali, dans une institution au Mali telle qu'une prison ou un établissement pour personnes atteintes de maladie mentale, ou dans un autre pays.

Parmi la population de droit des enfants de 0 à 17 ans jamais mariés dont la mère vit ailleurs, 51 % ont leur mère qui réside dans un autre ménage dans la même région, 38 % ont leur mère qui réside dans une autre région et 5 % ont leur mère qui réside dans un autre pays. Un pour cent des enfants ont leur mère dans une institution située au Mali, tandis que le lieu de résidence de la mère est inconnu pour 1 % des enfants (**Tableau 10.19.1**).

Parmi la population de droit des enfants de 0 à 17 ans jamais mariés dont le père vit ailleurs, 40 % ont leur père qui réside dans un autre ménage dans la même région, 39 % ont leur père qui réside dans une autre région et 17 % ont leur père qui réside dans un autre pays. Deux pour cent de ces enfants ont leur père dans une institution située au Mali, tandis que le lieu de résidence du père est inconnu pour 1 % des enfants (**Tableau 10.19.2**).

10.8.7 Flux financiers entre le ménage de l'enfant et les parents qui vivent ailleurs

Les flux financiers entre le ménage d'un enfant et un parent vivant ailleurs permettent de savoir s'il existe une interdépendance financière entre le ménage et le parent de l'enfant. Au cours de l'EDSM 2023–2024, on a demandé si les mères ou les pères qui vivaient ailleurs envoyaient de l'argent ou des biens au ménage de leur enfant et s'ils recevaient de l'argent ou des biens du ménage de leur enfant.

Vingt-neuf pour cent de la population de droit des enfants de 0 à 17 ans n'ayant jamais été mariés et dont la mère vit ailleurs reçoivent de l'argent ou des biens envoyés par leur mère au ménage dans lequel ils vivent. Pour 23 % des enfants, c'est la mère qui reçoit de l'argent ou des biens envoyés par le ménage de l'enfant. Il est important de noter que les mères peuvent à la fois donner et recevoir de l'argent ou des biens. Pour 56 % des enfants, la mère n'envoie ni ne reçoit d'argent ou de biens.

Parmi la population de droit des enfants de 0 à 17 ans n'ayant jamais été mariés et dont le père vit ailleurs, 57 % ont leur père qui envoient de l'argent ou des biens au ménage dans lequel ils vivent et 16 % ont leur père qui reçoit de l'argent ou des biens du ménage dans lequel ils vivent. Pour 38 % des enfants, le père n'envoie ni ne reçoit d'argent ou de biens (**Tableau 10.20**).

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur la santé de l'enfant, consultez les tableaux suivants :

- **Tableau 10.1 Taille et poids de l'enfant à la naissance**
- **Tableau 10.2 Possession et observation des carnets de vaccination, selon certaines caractéristiques sociodémographiques**
- **Tableau 10.3 Vaccinations par source d'Information**
- **Tableau 10.4 Vaccinations selon certaines caractéristiques sociodémographiques**
- **Tableau 10.5 Source où ont été effectuées les vaccinations**
- **Tableau 10.6 Enfants avec des symptômes d'IRA et recherche de soins pour traiter les symptômes d'IRA**
- **Tableau 10.7 Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant présenté des symptômes d'IRA**
- **Tableau 10.8 Enfants avec de la fièvre et recherche de soins pour traiter la fièvre**
- **Tableau 10.9 Enfants avec diarrhée et recherche de soins pour traiter la diarrhée**
- **Tableau 10.10 Pratiques alimentaires durant la diarrhée**
- **Tableau 10.11 Thérapie de réhydratation par voie orale, supplémentation en zinc, poursuite de l'alimentation et administration d'autres traitements contre la diarrhée**
- **Tableau 10.12 Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant eu la diarrhée**
- **Tableau 10.13 Indice de développement de la petite enfance 2030**
- **Tableau 10.14 Résidence des enfants avec les parents et enfants orphelins**
- **Tableau 10.15 Personnes s'occupant des enfants qui ne vivent pas avec un parent biologique**
- **Tableau 10.16.1 Durée de la séparation parent-enfant**
- **Tableau 10.16.2 Durée du double orphelinage**
- **Tableau 10.16.3 Durée moyenne de la séparation parent-enfant selon certaines caractéristiques sociodémographiques**
- **Tableau 10.17.1 État matrimonial de la mère biologique de l'enfant**
- **Tableau 10.17.2 État matrimonial du père biologique de l'enfant**
- **Tableau 10.18.1 Fréquence des contacts avec la mère qui vit ailleurs**
- **Tableau 10.18.2 Fréquence des contacts avec le père qui vit ailleurs**
- **Tableau 10.19.1 Endroit où vivent les mères qui vivent ailleurs**
- **Tableau 10.19.2 Endroit où vivent les pères qui vivent ailleurs**
- **Tableau 10.20 Flux financiers entre le ménage de l'enfant et les parents qui vivent ailleurs**

Tableau 10.1 Taille et poids de l'enfant à la naissance

Répartition (en %) des naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête selon l'estimation, par la mère, de la grosseur de l'enfant à la naissance, et pourcentage de naissances vivantes des 2 années ayant précédé l'enquête pour lesquelles un poids à la naissance a été déclaré par source de l'information (enregistrement écrit ou déclaration de la mère), selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Répartition (en %) des naissances vivantes par grosseur de l'enfant à la naissance basée sur l'estimation de la mère					Pourcentage de naissances pour lesquelles un poids à la naissance a été déclaré selon :			
Caractéristique sociodémographique	Très petit	Plus petit que la moyenne	Moyen ou plus gros que la moyenne	Ne sait pas	Total	Un enregistrement écrit	La déclaration de la mère	L'un ou l'autre	Effectif de naissances
Âge de la mère à la naissance									
<20	3,5	11,9	82,8	1,7	100,0	25,9	22,1	48,0	1 011
20–34	2,8	10,5	85,4	1,2	100,0	26,1	26,4	52,5	4 402
35–49	3,3	11,7	83,8	1,2	100,0	20,9	27,8	48,7	1 000
Rang de naissance									
1	3,2	13,1	82,5	1,1	100,0	29,4	26,7	56,2	1 236
2–3	2,5	9,9	86,2	1,4	100,0	27,8	23,9	51,7	2 136
4–5	3,2	10,6	84,8	1,3	100,0	25,2	27,8	53,0	1 558
6+	3,5	11,0	84,4	1,1	100,0	18,1	26,3	44,4	1 483
Statut tabagique de la mère									
Fume des cigarettes/tabac	(2,8)	(6,7)	(90,5)	(0,0)	100,0	(16,2)	(20,9)	(37,1)	29
Ne fume pas	3,0	10,9	84,7	1,3	100,0	25,3	26,0	51,3	6 384
Résidence									
Bamako	2,1	10,2	86,8	0,9	100,0	47,1	31,3	78,4	751
Autre urbain	3,5	11,2	84,4	0,8	100,0	43,3	33,2	76,5	630
Ensemble urbain	2,8	10,6	85,7	0,9	100,0	45,3	32,2	77,5	1 381
Rural	3,1	11,0	84,5	1,4	100,0	19,7	24,3	44,0	5 032
Région									
Kayes	3,3	13,7	82,7	0,3	100,0	20,0	27,0	47,0	1 002
Koulikoro	3,0	9,3	87,1	0,6	100,0	27,6	28,0	55,6	1 527
Sikasso	1,1	9,6	87,6	1,7	100,0	34,5	19,7	54,1	1 262
Ségou	3,0	13,7	79,9	3,4	100,0	9,0	31,4	40,4	1 002
Mopti	4,9	7,6	87,2	0,3	100,0	12,3	20,3	32,6	608
Tombouctou	6,8	23,8	68,2	1,2	100,0	8,0	8,8	16,8	80
Gao	11,4	12,4	73,7	2,6	100,0	20,4	21,0	41,4	179
Kidal	†	†	†	†	100,0	†	†	†	3
Bamako	2,1	10,2	86,8	0,9	100,0	47,1	31,3	78,4	751
Niveau d'instruction de la mère									
Aucun	3,5	11,6	83,5	1,4	100,0	19,1	22,7	41,8	3 679
Primaire	2,9	9,9	85,7	1,5	100,0	24,5	25,6	50,1	1 117
Secondaire ou plus	2,2	10,1	86,9	0,8	100,0	39,7	33,6	73,3	1 617
Quintile de bien-être économique									
Le plus bas	3,1	11,4	84,4	1,1	100,0	14,2	21,0	35,1	1 343
Second	2,4	11,9	84,0	1,7	100,0	13,9	20,8	34,7	1 309
Moyen	3,2	11,5	83,4	1,8	100,0	18,7	23,4	42,1	1 289
Quatrième	4,0	10,2	84,8	0,9	100,0	34,7	31,7	66,4	1 314
Le plus élevé	2,4	9,4	87,5	0,7	100,0	47,4	34,0	81,3	1 158
Ensemble	3,0	10,9	84,8	1,3	100,0	25,2	26,0	51,2	6 413

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 10.2 Possession et observation des carnets de vaccination, selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Pourcentage d'enfants de 12–23 mois et d'enfants de 24–35 mois qui ont déjà eu un carnet de vaccination et pourcentage avec un carnet de vaccination qui a été vu, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Enfants de 12–23 mois			Enfants de 24–35 mois		
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant déjà eu un carnet de vaccination[1]	Pourcentage avec un carnet de vaccination qui a été vu[1]	Effectif d'enfants	Pourcentage ayant déjà eu un carnet de vaccination[1]	Pourcentage avec un carnet de vaccination qui a été vu[1]	Effectif d'enfants
Sexe						
Masculin	88,5	68,6	1 437	85,1	52,0	1 520
Féminin	86,9	67,2	1 455	85,5	51,1	1 498
Rang de naissance						
1	90,7	70,9	547	87,7	53,6	602
2–3	88,0	66,6	964	86,1	51,4	1 049
4–5	86,8	67,0	691	82,9	50,9	703
6+	85,7	68,2	690	84,5	50,6	664
Résidence						
Bamako	97,9	73,8	348	97,4	57,6	332
Autre urbain	90,6	66,8	277	88,3	54,9	307
Ensemble urbain	94,7	70,7	624	93,1	56,3	640
Rural	85,8	67,1	2 268	83,3	50,3	2 378
Région						
Kayes	78,1	55,7	450	75,6	42,6	453
Koulikoro	91,9	70,7	702	90,3	51,8	697
Sikasso	90,8	74,0	528	87,1	63,5	623
Ségou	90,5	73,6	441	85,0	50,8	504
Mopti	82,7	66,3	295	84,0	46,2	267
Tombouctou	47,9	25,5	47	53,1	10,7	50
Gao	67,1	46,3	81	62,9	32,9	90
Kidal	†	†	1	†	†	1
Bamako	97,9	73,8	348	97,4	57,6	332
Niveau d'instruction de la mère						
Aucun	83,7	66,2	1 654	82,3	49,2	1 802
Primaire	88,9	68,8	499	87,3	56,4	528
Secondaire ou plus	95,9	71,2	739	91,7	53,8	688
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	87,1	69,2	606	82,4	54,9	608
Second	82,1	66,5	589	82,1	50,3	687
Moyen	82,5	64,0	571	79,4	44,6	603
Quatrième	89,5	67,2	602	89,4	55,5	594
Le plus élevé	98,2	73,1	524	95,1	52,7	526
Ensemble	87,7	67,9	2 892	85,3	51,5	3 018

[1] Carnet, carte de vaccination, livret ou autre enregistrement écrit

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 10.3 Vaccinations par source d'information

Pourcentage d'enfants de 12–23 mois et d'enfants de 24–35 mois qui ont reçu certains vaccins à n'importe quel moment avant l'enquête, par source d'information (carnet de vaccination ou déclaration de la mère) et pourcentage qui ont reçu certains vaccins à l'âge approprié, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Enfants de 12–23 mois				Enfants de 24–35 mois			
	Vacciné à n'importe quel moment avant l'enquête selon :				Vacciné à n'importe quel moment avant l'enquête selon :			
Vaccin	Carnet de vaccination[1]	Déclaration de la mère	Les deux sources (couverture brute)	Vacciné à l'âge approprié[2,3]	Carnet de vaccination[1]	Déclaration de la mère	Les deux sources (couverture brute)	Vacciné à l'âge approprié[3,4]
BCG	65,0	18,6	83,6	82,9	49,8	31,9	81,7	79,6
DTC-HepB-Hib								
1	66,5	17,0	83,5	82,8	50,8	30,0	80,7	78,7
2	64,7	15,5	80,2	79,1	49,2	28,2	77,4	75,1
3	61,0	12,5	73,4	71,6	46,7	23,4	70,1	67,3
Polio								
VPO 0 (dose naissance)	52,6	15,3	67,9	67,2	39,3	25,7	65,0	62,9
VPO 1	65,9	12,5	78,4	77,7	50,1	22,4	72,5	70,7
VPO 2	64,2	7,9	72,1	70,8	48,4	14,2	62,6	60,5
VPO 3	60,8	1,8	62,6	61,2	45,5	3,7	49,2	47,0
VPI 1	56,0	16,4	72,5	70,5	43,4	29,7	73,1	68,7
VPI 2	30,6	12,7	43,3	38,7	20,1	22,2	42,4	36,2
Pneumocoque								
1	65,9	16,8	82,7	81,6	50,2	29,5	79,8	77,7
2	63,5	15,4	78,9	77,8	48,8	28,1	76,9	74,3
3	58,9	12,2	71,1	69,2	45,8	23,2	69,0	65,5
Rotavirus								
1	66,1	16,5	82,6	81,6	50,4	29,3	79,7	77,7
2	63,5	14,9	78,4	77,5	48,6	27,8	76,4	74,0
3	58,9	12,0	70,9	69,3	45,1	22,0	67,1	63,4
Vaccin antirougeoleux								
1	55,1	14,3	69,4	62,5	43,3	27,3	70,7	63,4
2	na	na	na	na	20,6	15,6	36,2	34,2
Vaccin contre la méningite[5]	53,0	12,9	65,9	59,4	41,2	25,8	67,0	59,5
Vaccin contre la fièvre jaune[6]	52,7	12,5	65,2	58,0	42,9	25,3	68,1	60,0
Complètement vacciné (antigènes de base)[7]	50,8	1,4	52,2	46,2	40,1	2,9	43,0	37,6
Complètement vacciné (conformément au calendrier national)[8]	32,4	0,6	33,0	27,9	13,5	0,7	14,1	11,0
Aucun vaccin	0,1	12,8	12,9	na	0,0	15,8	15,8	na
Effectif d'enfants	1 964	928	2 892	2 892	1 555	1 463	3 018	3 018

na = non applicable
BCG = Bacille Calmette-Guérin ; DTC = Diphthérie-Tétanos-coqueluche ; HepB = Hépatite B ; Hib = Haemophilus influenzae type b ; VPI = Vaccin contre la polio inactivé ; VPO = Vaccin contre la polio oral
[1] Carnet, carte de vaccination, livret ou autre enregistrement écrit
[2] Reçu avant l'âge de 12 mois
[3] Pour les enfants dont les informations sur la vaccination sont basées sur la déclaration de la mère, la date de la vaccination n'est pas collectée. On considère que les proportions de vaccins donnés au cours de la première et de la deuxième année sont les mêmes que pour les enfants possédant un enregistrement écrit des vaccins.
[4] Reçu avant l'âge de 12 mois pour tous les vaccins sauf pour le vaccin antirougeoleux 2, qui devrait être reçu avant l'âge de 24 mois
[5] A cause d'une erreur de saut dans le questionnaire, on n'a pas posé la question aux mères de 152 enfants âgés de 12–23 mois et de 167 enfants âgés 24–35 mois concernant la vaccination contre la méningite.
[6] A cause d'une erreur de saut dans le questionnaire, la question concernant la vaccination contre la fièvre jaune n'a pas été posée aux mères de 152 enfants de 12–23 mois et de 167 enfants de 24–35 mois.
[7] BCG, trois doses de DTC-HepB-Hib, trois doses du vaccin contre la polio (non compris le vaccin contre la polio donné à la naissance) et une dose de vaccin antirougeoleux.
[8] Pour les enfants de 12–23 mois : BCG, trois doses de DTC-HepB-Hib, quatre doses du VPO, une dose de VPI, trois doses du vaccin contre le pneumocoque, trois doses du vaccin contre le rotavirus, une dose de vaccin antirougeoleux, une dose de vaccin contre la méningite, et une dose de vaccin contre la fièvre jaune. Pour les enfants de 24–35 mois, tous ces vaccins plus une seconde dose de vaccin antirougeoleux. Le VPI 2 ayant été lancé en novembre 2021, tous les enfants éligibles n'avaient pas accès au vaccin au moment de l'enquête. Par conséquent, le VPI 2 a été exclu de cet indicateur.

Tableau 10.4 Vaccinations selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Pourcentage d'enfants de 12–23 mois et de 24–35 mois ayant reçu certains vaccins à n'importe quel moment avant l'enquête (selon le carnet de vaccination ou la déclaration de la mère), pourcentage complètement vacciné (antigènes de base), pourcentage complètement vacciné (conformément au calendrier national), et pourcentage n'ayant reçu aucun vaccin, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Enfants de 12–23 mois																						Enfants de 24–35 mois			
		DTC-HepB-Hib			VPO[1]						Pneumocoque			Rotavirus												
Caractéristique sociodémographique	BCG	1	2	3	VPO 0 (dose naissance)	VPO 1	VPO 2	VPO 3	VPI 1	VPI 2	1	2	3	1	2	3	Vaccin antirougeoleux 1ere dose	Vaccin contre la fièvre jaune[2]	Vaccin contre la méningite[3]	Complètement vacciné (antigènes de base)[4]	Complètement vacciné (conformément au calendrier national)[5]	Aucun vaccin	Effectif d'enfants	Vaccin antirougeoleux 2eme dose	Complètement vacciné (conformément au calendrier national)[6]	Effectif d'enfants
Sexe																										
Masculin	84,3	83,8	80,4	73,4	69,5	78,6	72,6	63,2	72,5	43,7	82,7	79,1	71,6	82,8	79,1	71,4	69,3	64,6	65,3	51,8	33,7	12,2	1 437	37,5	14,3	1 520
Féminin	82,9	83,3	80,1	73,4	66,4	78,1	71,5	62,1	72,5	42,9	82,7	78,8	70,7	82,4	77,8	70,4	69,6	65,7	66,4	52,5	32,4	13,5	1 455	34,9	14,0	1 498
Rang de naissance																										
1	85,8	87,0	84,4	76,9	71,1	81,1	76,5	66,6	75,5	43,9	86,9	83,6	75,4	86,0	83,4	75,7	75,0	71,0	72,0	55,0	33,0	10,5	547	39,0	15,1	602
2–3	84,3	83,1	80,1	74,7	70,6	78,8	72,2	61,9	72,8	43,0	82,2	79,4	71,5	82,6	78,6	72,1	70,1	66,3	66,5	52,8	36,2	12,7	964	35,6	14,0	1 049
4–5	82,6	83,4	80,0	72,1	66,4	77,0	70,2	61,4	71,9	42,9	82,4	78,0	69,2	82,8	78,2	69,5	66,8	63,2	64,3	49,7	29,8	13,8	691	35,2	12,5	703
6+	82,1	81,7	77,4	70,2	63,2	77,0	70,3	61,8	70,1	43,8	80,4	75,6	69,0	79,7	74,4	66,8	66,7	60,8	61,8	51,4	31,9	14,0	690	35,7	15,2	664
Carnet de vaccination[7]																										
Vu	95,8	98,0	95,3	89,8	77,5	97,0	94,5	89,6	82,5	45,0	97,1	93,5	86,8	97,3	93,5	86,7	81,2	77,6	78,0	74,8	47,8	0,1	1 964	39,9	26,1	1 555
Non vu ou n'a plus de carnet	87,0	80,9	73,8	60,3	72,5	58,2	38,2	8,6	78,2	60,7	79,8	73,5	58,7	78,4	71,4	58,0	68,6	60,0	62,2	6,9	3,0	10,8	572	43,8	2,0	1 020
N'a jamais eu de carnet	11,2	8,3	7,3	4,3	7,8	8,1	2,7	0,8	7,9	5,8	8,2	7,2	4,6	7,9	6,7	4,4	5,9	4,9	4,9	0,2	0,0	86,7	356	5,7	0,0	443
Résidence																										
Bamako	96,4	95,9	94,4	92,3	92,8	87,6	83,3	72,6	87,0	55,3	96,1	94,4	90,4	95,7	93,6	91,6	82,4	78,8	80,4	63,9	52,2	2,8	348	41,1	21,0	332
Autre urbain	89,1	86,0	81,4	71,5	76,4	80,0	71,6	60,0	76,5	47,3	86,2	80,7	69,6	84,2	78,0	68,1	70,8	64,4	64,1	50,0	27,8	8,1	277	35,1	13,0	307
Ensemble urbain	93,2	91,5	88,7	83,1	85,5	84,3	78,1	67,0	82,3	51,7	91,7	88,3	81,2	90,6	86,7	81,2	77,3	72,4	73,1	57,7	41,4	5,1	624	38,2	17,1	640
Rural	81,0	81,4	77,9	70,7	63,1	76,7	70,4	61,4	69,7	41,0	80,2	76,4	68,3	80,4	76,2	68,0	67,3	63,2	63,9	50,6	30,7	15,0	2 268	35,7	13,3	2 378
Région																										
Kayes	69,8	75,1	72,4	63,6	54,7	73,4	62,8	52,0	63,6	43,5	74,9	71,9	63,3	74,7	72,0	63,7	59,3	52,5	54,5	38,0	22,8	21,8	450	26,5	9,4	453
Koulikoro	87,7	85,4	82,1	75,3	77,3	78,5	74,0	64,3	76,1	45,7	84,4	81,8	74,4	84,3	82,1	74,2	70,7	68,4	69,6	54,7	40,9	10,1	702	33,4	15,0	697
Sikasso	88,1	85,8	81,2	74,9	67,2	80,2	75,2	66,5	75,7	49,8	83,8	77,0	68,3	84,4	78,6	71,4	69,4	66,1	66,6	55,4	31,0	10,5	528	40,7	16,9	623
Ségou	85,4	86,7	83,3	75,6	61,7	81,8	74,3	67,6	77,1	39,8	85,5	81,5	72,5	84,9	76,7	65,8	75,1	69,2	68,1	58,9	31,8	10,6	441	41,8	13,4	504
Mopti	79,2	79,7	78,0	69,9	56,8	78,4	73,5	62,3	58,9	26,9	79,8	77,5	69,4	80,4	78,0	70,6	69,1	63,3	63,7	50,0	21,0	15,6	295	39,4	11,0	267
Tombouctou	46,1	42,7	31,4	23,9	32,5	37,6	27,0	20,9	36,5	18,0	39,4	29,4	23,2	40,9	28,6	23,3	32,5	28,1	27,5	15,6	10,9	48,4	47	18,8	1,2	50
Gao	69,3	67,6	61,2	50,7	52,6	57,9	48,4	38,5	52,1	22,1	67,1	60,5	49,0	63,5	56,1	47,2	52,1	49,3	49,5	29,9	17,3	27,9	81	27,1	6,7	90
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	1	†	†	1
Bamako	96,4	95,9	94,4	92,3	92,8	87,6	83,3	72,6	87,0	55,3	96,1	94,4	90,4	95,7	93,6	91,6	82,4	78,8	80,4	63,9	52,2	2,8	348	41,1	21,0	332

À suivre…

Tableau 10.4—*Suite*

Caractéristique sociodémographique	Enfants de 12–23 mois																						Enfants de 24–35 mois		
		DTC-HepB-Hib			VPO[1]					Pneumocoque			Rotavirus												
	BCG	1	2	3	VPO 0 (dose naissance)	VPO 1	VPO 2	VPO 3	VPI 1	VPI 2	1	2	3	1	2	3	Vaccin antirougeoleux 1ere dose	Vaccin contre la fièvre jaune[2]	Vaccin contre la méningite[3]	Complètement vacciné (antigènes de base)[4]	Complètement vacciné (conformément au calendrier national)[5]	Aucun vaccin	Effectif d'enfants	Vaccin antirougeoleux 2eme dose	Complètement vacciné (conformément au calendrier national)[6]	Effectif d'enfants
Niveau d'instruction de la mère																									
Aucun	79,5	79,6	76,0	69,2	60,6	75,2	68,5	59,8	67,2	39,6	78,8	74,4	66,7	78,7	74,1	66,5	65,1	60,2	60,9	49,6	28,7	16,3	1 654	35,2	12,8	1 802
Primaire	83,5	83,5	80,1	71,3	70,4	77,9	72,3	63,6	73,3	43,3	83,1	80,1	72,1	82,3	78,6	71,2	69,8	65,6	67,1	53,6	37,4	13,5	499	35,9	15,3	528
Secondaire ou plus	92,9	92,4	89,8	84,3	82,7	85,7	79,9	68,3	83,6	51,7	91,2	88,2	80,2	91,4	87,9	80,5	78,9	76,0	76,3	57,0	39,9	4,8	739	39,2	16,8	688
Quintile de bien-être économique																									
Le plus bas	81,0	81,6	79,3	70,0	56,2	78,1	72,9	63,3	69,7	42,7	80,0	76,7	68,0	80,0	76,6	67,0	69,3	64,0	64,9	53,5	29,1	15,1	606	36,0	15,7	608
Second	76,4	78,7	75,0	68,9	55,7	75,3	68,1	60,4	66,9	42,3	78,2	74,4	67,5	77,7	74,2	68,0	65,3	62,8	62,6	51,3	31,7	18,9	589	38,4	12,8	687
Moyen	78,9	77,4	73,7	66,7	60,7	72,2	64,8	56,5	65,4	34,6	76,4	71,7	63,9	77,0	72,0	64,2	62,8	57,6	59,2	45,9	25,8	17,4	571	34,1	9,9	603
Quatrième	86,7	84,9	80,4	74,7	79,2	77,5	72,1	62,8	74,5	42,4	84,7	79,9	72,2	84,3	78,0	71,3	69,4	65,1	65,4	50,1	34,2	9,5	602	32,2	13,7	594
Le plus élevé	96,5	96,3	94,2	88,2	90,1	89,9	83,6	70,9	87,1	55,8	95,3	93,4	85,4	95,1	92,8	85,4	81,4	77,4	78,5	60,7	45,7	2,4	524	40,6	19,2	526
Ensemble	83,6	83,5	80,2	73,4	67,9	78,4	72,1	62,6	72,5	43,3	82,7	78,9	71,1	82,6	78,4	70,9	69,4	65,2	65,9	52,2	33,0	12,9	2 892	36,2	14,1	3 018

Note : On considère que les enfants sont vaccinés si l'information est inscrite sur le carnet de vaccination de l'enfant ou si c'est la mère qui le déclare. Pour les enfants dont l'information sur la vaccination est basée sur la déclaration de la mère, la date de la vaccination n'est pas collectée. On suppose que les proportions de vaccins effectués durant la première et la deuxième années sont les mêmes que pour les enfants pour lesquels on dispose d'un enregistrement écrit de la vaccination.
BCG = Bacille Calmette-Guérin ; DTC = Diphthérie-tétanos-coqueluche ; HepB = Hépatite B ; Hib = Haemophilus influenzae type b ; VPO = Vaccin contre la polio oral ; VPI = Vaccin contre la polio inactivé
[1] OPV 0 est le vaccin de la polio donné à la naissance.
[2] A cause d'une erreur de saut dans le questionnaire, la question concernant la vaccination contre la fièvre jaune n'a pas été posée aux mères de 152 enfants de 12–23 mois et de 167 enfants de 24–35 mois.
[3] A cause d'une erreur de saut dans le questionnaire, la question concernant la vaccination contre la méningite n'a pas été posée aux mères de 152 enfants de 12–23 mois et de 167 enfants de 24–35 mois.
[4] BCG, trois doses de DTC-HepB-Hib, trois doses du vaccin contre la polio (non compris le vaccin contre la polio donné à la naissance), et une dose de vaccin antirougeoleux.
[5] BCG, trois doses de DTC-HepB-Hib, quatre doses du VPO, une dose de VPI, trois doses du vaccin contre le pneumocoque, trois doses du vaccin contre le rotavirus, une dose de vaccin antirougeoleux, une dose de vaccin contre la méningite, et une dose de vaccin contre la fièvre jaune.
[6] BCG, trois doses de DTC-HepB-Hib, quatre doses du VPO, une dose de VPI, trois doses du vaccin contre le pneumocoque, trois doses du vaccin contre le rotavirus, deux doses de vaccin antirougeoleux, une dose de vaccin contre la méningite, et une dose de vaccin contre la fièvre jaune. Le VPI 2 ayant été lancé en novembre 2021, tous les enfants éligibles n'avaient pas accès au vaccin au moment de l'enquête. Par conséquent, le VPI 2 a été exclu de cet indicateur.
[7] Carnet, carte de vaccination, livret ou autre enregistrement écrit
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 10.5 Source où ont été effectuées les vaccinations

Parmi les enfants ayant reçu, au moins, une vaccination, répartition (en %) des enfants de 12–23 mois et des enfants de 24–35 mois par source de la plupart des vaccinations, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Enfants de 12–23 mois qui ont reçu au moins une vaccination						Enfants de 24–35 mois qui ont reçu au moins une vaccination					
	Source de la plupart des vaccinations						Source de la plupart des vaccinations					
Caractéristique sociodémographique	Secteur médical public	Secteur médical privé	Secteur médical (ONG)	Autre	Total	Effectif d'enfants	Secteur médical public	Secteur médical privé	Secteur médical (ONG)	Autre	Total	Effectif d'enfants
Sexe												
Masculin	91,0	5,8	0,1	3,1	100,0	1 262	91,4	5,8	0,0	2,8	100,0	1 277
Féminin	89,8	6,7	0,2	3,3	100,0	1 258	87,9	7,5	0,7	3,9	100,0	1 264
Rang de naissance												
1	89,5	7,4	0,4	2,7	100,0	490	90,7	6,9	0,4	2,0	100,0	522
2–3	90,9	7,1	0,0	2,0	100,0	842	88,6	7,9	0,4	3,1	100,0	890
4–5	88,8	6,8	0,2	4,3	100,0	596	89,8	5,9	0,5	3,8	100,0	578
6+	92,2	3,4	0,2	4,2	100,0	593	90,1	5,3	0,2	4,4	100,0	551
Résidence												
Bamako	76,9	22,6	0,0	0,5	100,0	338	78,1	21,6	0,0	0,3	100,0	321
Autre urbain	94,5	2,6	1,2	1,7	100,0	254	91,5	5,1	2,8	0,5	100,0	265
Ensemble urbain	84,5	14,0	0,5	1,0	100,0	592	84,2	14,1	1,3	0,4	100,0	586
Rural	92,3	3,8	0,0	3,8	100,0	1 928	91,3	4,4	0,1	4,2	100,0	1 955
Région												
Kayes	89,2	0,8	0,0	9,9	100,0	352	90,0	1,8	0,0	8,2	100,0	332
Koulikoro	88,3	9,6	0,1	2,0	100,0	632	88,4	10,5	0,0	1,1	100,0	626
Sikasso	94,6	2,6	0,6	2,2	100,0	472	91,3	4,0	1,6	3,1	100,0	519
Ségou	96,8	0,0	0,0	3,2	100,0	394	92,8	1,2	0,2	5,8	100,0	427
Mopti	95,6	1,9	0,0	2,5	100,0	249	97,3	1,3	0,0	1,5	100,0	226
Tombouctou	94,6	0,0	0,0	5,4	100,0	24	91,4	0,7	0,0	7,9	100,0	29
Gao	98,1	0,4	0,0	1,5	100,0	58	96,0	0,0	0,0	4,0	100,0	60
Kidal	†	†	†	†	100,0	1	†	†	†	†	100,0	1
Bamako	76,9	22,6	0,0	0,5	100,0	338	78,1	21,6	0,0	0,3	100,0	321
Niveau d'instruction de la mère												
Aucun	91,9	3,6	0,1	4,3	100,0	1 385	90,1	5,0	0,4	4,5	100,0	1 458
Primaire	92,1	5,7	0,5	1,8	100,0	431	90,6	5,8	0,4	3,2	100,0	455
Secondaire ou plus	86,6	11,6	0,0	1,8	100,0	704	87,8	11,2	0,3	0,7	100,0	628
Quintile de bien-être économique												
Le plus bas	92,4	1,1	0,2	6,3	100,0	515	92,0	1,1	0,0	7,0	100,0	486
Second	94,3	0,8	0,0	4,9	100,0	478	92,5	1,9	0,0	5,7	100,0	549
Moyen	95,9	1,3	0,0	2,8	100,0	472	95,6	1,9	0,0	2,4	100,0	483
Quatrième	87,8	10,5	0,5	1,1	100,0	544	84,8	13,3	0,9	1,0	100,0	531
Le plus élevé	82,6	16,4	0,0	1,0	100,0	511	83,6	15,1	0,9	0,4	100,0	492
Ensemble	90,4	6,2	0,2	3,2	100,0	2 520	89,6	6,7	0,4	3,3	100,0	2 541

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 10.6 Enfants avec des symptômes d'IRA et recherche de soins pour traiter les symptômes d'IRA

Parmi les enfants de moins de 5 ans, pourcentage ayant eu des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA) au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview ; parmi les enfants ayant présenté des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Parmi les enfants de moins de 5 ans :		Parmi les enfants de moins de 5 ans avec des symptômes d'IRA :		
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage avec des symptômes d'IRA[1]	Effectif d'enfants	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés[2]	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés le jour même ou le jour suivant[2]	Effectif d'enfants
Âge en mois					
<6	2,2	1 745	(45,6)	(18,8)	38
6–11	3,3	1 490	(54,6)	(26,1)	49
12–23	2,8	2 892	49,4	19,1	80
24–35	2,5	3 018	43,7	12,0	75
36–47	2,0	2 870	47,2	17,9	56
48–59	1,7	2 816	(44,3)	(10,2)	47
Sexe					
Masculin	2,2	7 456	50,2	18,4	167
Féminin	2,4	7 376	44,8	15,9	178
Statut tabagique de la mère					
Fume des cigarettes/tabac	4,3	70	*	*	3
Ne fume pas	2,3	14 761	47,8	17,3	341
Combustible et équipement pour cuisiner					
Combustible et équipement propre[3]	(0,0)	29	*	*	0
Combustible solide[4]	2,3	14 711	47,3	17,2	344
Autre combustible	*	2	*	*	0
Pas de repas préparé dans le ménage	1,0	89	*	*	1
Résidence					
Bamako	1,6	1 733	(69,2)	(32,9)	27
Autre urbain	3,7	1 462	54,9	28,7	54
Ensemble urbain	2,5	3 195	59,7	30,1	81
Rural	2,3	11 637	43,7	13,1	264
Région					
Kayes	3,0	2 265	45,0	16,7	67
Koulikoro	1,2	3 504	(41,2)	(20,5)	41
Sikasso	3,3	2 906	52,6	16,7	95
Ségou	2,3	2 330	(47,4)	(12,7)	54
Mopti	3,7	1 407	34,0	13,4	52
Tombouctou	1,7	253	(34,3)	(1,0)	4
Gao	0,8	428	*	*	3
Kidal	†	6	†	†	0
Bamako	1,6	1 733	(69,2)	(32,9)	27
Niveau d'instruction de la mère					
Aucun	2,2	8 851	38,4	10,8	195
Primaire	2,2	2 557	47,0	15,6	57
Secondaire ou plus	2,7	3 424	66,8	31,5	92
Quintile de bien-être économique					
Le plus bas	2,6	3 094	24,9	6,1	82
Second	2,2	3 103	43,8	20,7	69
Moyen	2,6	3 021	53,2	13,9	79
Quatrième	1,5	3 013	48,0	9,3	46
Le plus élevé	2,6	2 600	70,8	35,5	69
Ensemble	2,3	14 831	47,4	17,1	344

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.

[1] Les symptômes d'IRA incluent une respiration courte et rapide associée à des problèmes de congestion dans la poitrine et/ou des difficultés respiratoires associées à des problèmes de congestion dans la poitrine.

[2] Sont inclus les conseils ou traitements des sources suivantes : le secteur médical public, le secteur médical privé, le secteur médical ONG, les boutiques, les vendeurs de médicaments ambulants et le marché. Ne sont pas pris en compte ici les conseils ou traitements fournis par un praticien traditionnel ou un guérisseur.

[3] Comprend les cuisinières/cuiseurs utilisant l'électricité, GPL/gaz naturel /biogaz, énergie solaire et alcool/éthanol, et cuisinière à combustible liquide

[4] Y compris charbon/lignite, charbon de bois, bois, paille/branchages/herbes, résidus agricoles et bouse/déjections d'animaux, biomasse transformée (pellets) ou copeaux de bois, déchets/plastique, et sciure

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 10.7 Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant présenté des symptômes d'IRA

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant présenté des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques ; parmi les enfants de moins de 5 ans ayant présenté des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de chaque source :	
Source	Parmi les enfants avec des symptômes d'IRA[1]	Parmi les enfants avec des symptômes d'IRA pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés[1]
Secteur médical public	21,3	42,2
Hôpital régional	0,8	1,6
Centre de santé de référence	3,3	6,5
Centre de santé communautaire	14,6	29,0
Dispensaire/maternité	1,4	2,8
Infirmerie de garnison militaire	0,3	0,6
Agent de santé communautaire (ASC)/relais	1,7	3,3
Secteur médical privé	13,5	26,8
Hôpital/Clinique privé	4,8	9,6
Cabinet médical	0,3	0,5
Cabinet de soin privé	1,2	2,5
Pharmacie	7,2	14,2
Autre source	16,4	32,5
Boutique	7,9	15,7
Vendeur de médicaments ambulants	5,0	9,9
Guérisseur/praticien traditionnel	3,4	6,8
Marché	1,6	3,2
Autre	0,7	1,4
Effectif d'enfants	344	174

Note : Les conseils ou traitements pour les enfants avec des symptômes d'IRA peuvent avoir été recherchés auprès de plus d'une source.
[1] Les symptômes d'IRA incluent une respiration courte et rapide associée à des problèmes de congestion dans la poitrine et/ou des difficultés respiratoires associées à des problèmes de congestion dans la poitrine.

Tableau 10.8 Enfants avec de la fièvre et recherche de soins pour traiter la fièvre

Parmi les enfants de moins de 5 ans, pourcentage ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview ; parmi les enfants ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés, pourcentage pour lesquels des conseils ou traitements ont été recherchés le jour même ou le jour suivant la survenue de la fièvre, et pourcentage ayant reçu des antibiotiques comme traitement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Parmi les enfants de moins de 5 ans :		Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre :			
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant eu de la fièvre	Effectif d'enfants	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés[1]	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés le jour même ou le jour suivant[1]	Pourcentage ayant pris des antibiotiques	Effectif d'enfants ayant eu de la fièvre
Âge en mois						
<6	13,0	1 745	49,3	27,0	23,4	227
6–11	22,9	1 490	48,5	23,7	22,4	341
12–23	18,7	2 892	49,3	19,9	28,0	540
24–35	15,3	3 018	55,7	20,7	23,9	460
36–47	11,7	2 870	48,1	21,3	24,9	337
48–59	10,2	2 816	51,4	24,7	24,1	286
Sexe						
Masculin	15,2	7 456	53,2	23,8	23,6	1 130
Féminin	14,4	7 376	47,9	20,5	26,1	1 061
Résidence						
Bamako	15,8	1 733	55,4	31,5	31,0	274
Autre urbain	16,9	1 462	53,1	26,7	33,2	247
Ensemble urbain	16,3	3 195	54,3	29,2	32,0	521
Rural	14,4	11 637	49,5	20,1	22,5	1 671
Région						
Kayes	17,8	2 265	43,1	16,6	21,1	403
Koulikoro	11,2	3 504	55,6	29,4	21,7	394
Sikasso	18,7	2 906	51,2	18,3	30,9	543
Ségou	10,4	2 330	45,4	18,1	15,0	241
Mopti	15,0	1 407	53,3	24,9	28,2	211
Tombouctou	14,8	253	46,1	17,5	9,6	37
Gao	20,3	428	54,1	18,3	23,8	87
Kidal	†	6	†	†	†	1
Bamako	15,8	1 733	55,4	31,5	31,0	274
Niveau d'instruction de la mère						
Aucun	13,4	8 851	46,1	16,7	20,7	1 188
Primaire	16,9	2 557	53,7	22,4	22,9	432
Secondaire ou plus	16,7	3 424	57,6	33,7	34,7	571
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	12,2	3 094	42,3	10,7	19,3	378
Second	14,8	3 103	48,1	20,0	22,0	458
Moyen	16,0	3 021	50,6	19,0	20,6	482
Quatrième	13,8	3 013	49,4	26,4	26,7	416
Le plus élevé	17,6	2 600	61,1	33,7	34,8	457
Ensemble	14,8	14 831	50,6	22,2	24,8	2 192

[1] Sont inclus les conseils ou traitements des sources suivantes : le secteur médical public, le secteur médical privé, le secteur médical ONG, les boutiques, les vendeurs de médicaments ambulants et le marché. Ne sont pas pris en compte ici les conseils ou traitements fournis par un praticien traditionnel ou un guérisseur.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 10.9 Enfants avec diarrhée et recherche de soins pour traiter la diarrhée

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview et parmi les enfants ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant eu la diarrhée	Effectif d'enfants	Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée : Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés[1]	Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée : Effectif d'enfants ayant eu la diarrhée
Âge en mois				
<6	16,9	1 745	30,3	296
6–11	31,9	1 490	37,9	475
12–23	28,8	2 892	39,5	832
24–35	17,7	3 018	35,4	534
36–47	10,2	2 870	38,2	292
48–59	5,3	2 816	39,2	148
Sexe				
Masculin	18,3	7 456	38,6	1 363
Féminin	16,4	7 376	35,5	1 213
Source de l'eau de boisson[2]				
Améliorée	16,9	11 864	38,4	2 005
Non améliorée	18,7	2 853	32,0	533
Eau de surface	33,1	115	40,0	38
Types d'installations sanitaires[3]				
Toilettes améliorées	17,3	10 649	37,7	1 847
Toilettes non améliorées	17,2	3 349	34,7	575
Défécation en plein air	18,5	833	39,2	154
Résidence				
Bamako	15,1	1 733	38,3	261
Autre urbain	17,1	1 462	37,9	249
Ensemble urbain	16,0	3 195	38,1	511
Rural	17,8	11 637	36,9	2 065
Région				
Kayes	23,1	2 265	31,2	524
Koulikoro	11,6	3 504	39,0	406
Sikasso	18,5	2 906	35,2	537
Ségou	17,2	2 330	38,3	401
Mopti	24,6	1 407	42,6	346
Tombouctou	11,9	253	36,1	30
Gao	16,2	428	47,9	69
Kidal	†	6	†	1
Bamako	15,1	1 733	38,3	261
Niveau d'instruction de la mère				
Aucun	17,2	8 851	34,7	1 523
Primaire	19,3	2 557	37,8	494
Secondaire ou plus	16,3	3 424	43,2	559
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	17,1	3 094	31,2	528
Second	19,6	3 103	36,3	609
Moyen	18,5	3 021	39,5	558
Quatrième	14,8	3 013	34,8	445
Le plus élevé	16,8	2 600	44,7	436
Ensemble	17,4	14 831	37,1	2 576

Note : Des conseils ou des traitements pour les enfants ayant eu la diarrhée ont pu être recherchés auprès de plus d'une source.

[1] Sont inclus les conseils ou traitements des sources suivantes : le secteur médical public, le secteur médical privé, le secteur médical ONG, les boutiques, les vendeurs de médicaments ambulants et le marché. Ne sont pas pris en compte ici les conseils ou traitements fournis par un praticien traditionnel ou un guérisseur.

[2] Se référer au Tableau 16.1 pour la définition des catégories.

[3] Se référer au Tableau 16.6 pour la définition des catégories.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 10.10 Pratiques alimentaires durant la diarrhée

Répartition (en %) des enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview par quantité de liquides et d'aliments donnée par rapport aux quantités habituelles, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Quantité de liquide donnée							Quantité de nourriture donnée								Effectif d'enfants ayant eu la diarrhée
	Davantage	Même que d'habitude	Un peu moins	Beaucoup moins	Aucune	Ne sait pas/ Manquant	Total	Davantage	Même que d'habitude	Un peu moins	Beaucoup moins	Aucune	Jamais donné d'aliments	Ne sait pas/ Manquant	Total	
Âge en mois																
<6	11,3	46,1	21,7	8,8	11,9	0,3	100,0	5,3	35,4	14,0	6,7	1,3	37,3	0,0	100,0	296
6–11	20,7	38,8	22,7	15,4	2,4	0,1	100,0	5,5	38,9	32,9	8,9	3,0	10,3	0,5	100,0	475
12–23	22,7	41,0	18,4	16,0	1,6	0,4	100,0	8,6	40,0	34,1	10,5	5,2	1,4	0,2	100,0	832
24–35	23,0	37,1	18,9	18,6	1,9	0,4	100,0	10,0	39,1	36,0	11,8	2,4	0,4	0,2	100,0	534
36–47	22,7	35,1	23,5	16,7	1,2	0,7	100,0	11,5	37,7	36,5	11,7	2,4	0,0	0,2	100,0	292
48–59	22,4	31,3	22,7	19,7	2,1	1,8	100,0	7,7	30,1	39,7	18,3	4,0	0,0	0,2	100,0	148
Sexe																
Masculin	20,8	39,0	20,3	16,9	2,4	0,5	100,0	8,7	37,9	32,3	11,2	3,2	6,4	0,3	100,0	1 363
Féminin	21,3	39,2	20,7	14,7	3,6	0,4	100,0	7,7	38,7	32,9	9,9	3,6	7,1	0,1	100,0	1 213
Allaitement[1]																
Allaite	20,3	40,7	20,4	14,5	3,9	0,3	100,0	7,1	37,9	30,3	9,2	3,6	11,6	0,3	100,0	1 440
Non allaité	21,7	39,2	19,0	17,7	2,0	0,4	100,0	9,3	40,9	34,0	11,5	3,2	0,9	0,2	100,0	696
Résidence																
Bamako	39,0	40,6	13,0	4,3	1,8	1,3	100,0	13,8	40,4	28,6	4,7	1,5	9,8	1,2	100,0	261
Autre urbain	24,3	42,5	16,5	14,8	1,1	0,8	100,0	11,6	38,5	28,3	10,8	3,2	7,3	0,2	100,0	249
Ensemble urbain	31,8	41,5	14,7	9,4	1,5	1,1	100,0	12,7	39,5	28,5	7,7	2,3	8,6	0,7	100,0	511
Rural	18,4	38,5	21,9	17,5	3,4	0,3	100,0	7,1	38,0	33,6	11,3	3,6	6,3	0,1	100,0	2 065
Région																
Kayes	18,5	42,5	17,8	16,4	4,9	0,0	100,0	4,9	43,3	21,7	16,3	7,3	6,6	0,0	100,0	524
Koulikoro	20,4	36,0	19,8	23,8	0,0	0,0	100,0	11,1	31,9	44,6	7,7	0,8	3,9	0,0	100,0	406
Sikasso	20,7	38,2	11,0	26,6	3,2	0,3	100,0	12,2	38,2	29,0	13,6	2,2	4,8	0,0	100,0	537
Ségou	20,6	39,8	30,0	7,1	1,9	0,7	100,0	4,3	37,8	42,1	8,6	1,5	5,4	0,3	100,0	401
Mopti	14,9	38,2	31,3	9,6	5,2	0,7	100,0	3,6	37,2	33,8	8,5	5,4	11,5	0,0	100,0	346
Tombouctou	13,4	16,2	51,4	11,0	7,0	1,0	100,0	0,9	11,1	40,3	11,3	12,7	22,5	1,1	100,0	30
Gao	17,2	44,0	23,7	11,2	1,9	2,0	100,0	14,2	49,0	21,1	6,1	2,2	5,3	2,0	100,0	69
Kidal	†	†	†	†	†	†	100,0	†	†	†	†	†	†	†	100,0	1
Bamako	39,0	40,6	13,0	4,3	1,8	1,3	100,0	13,8	40,4	28,6	4,7	1,5	9,8	1,2	100,0	261
Niveau d'instruction de la mère																
Aucun	19,5	39,6	21,2	16,1	3,3	0,3	100,0	7,3	38,9	33,6	10,6	3,8	5,7	0,1	100,0	1 523
Primaire	20,9	40,2	20,4	14,6	3,1	0,8	100,0	8,9	40,1	28,9	9,8	3,6	8,8	0,0	100,0	494
Secondaire ou plus	25,6	36,9	18,6	16,3	1,9	0,6	100,0	10,1	34,9	33,0	11,3	2,0	7,9	0,7	100,0	559
Quintile de bien-être économique																
Le plus bas	18,5	36,4	20,8	18,6	5,5	0,1	100,0	9,7	34,8	35,4	10,4	3,3	6,4	0,0	100,0	528
Second	19,3	35,5	25,3	17,1	2,6	0,2	100,0	7,5	36,1	35,7	11,2	4,4	5,1	0,0	100,0	609
Moyen	18,0	44,8	18,7	16,2	1,9	0,4	100,0	4,4	45,0	28,5	12,1	3,7	6,0	0,3	100,0	558
Quatrième	21,8	40,8	19,5	14,7	2,5	0,7	100,0	8,3	40,3	30,7	12,7	1,8	5,9	0,3	100,0	445
Le plus élevé	30,0	38,5	16,6	11,8	2,3	0,9	100,0	12,2	34,7	31,9	5,9	3,3	11,3	0,7	100,0	436
Ensemble	21,1	39,1	20,5	15,9	3,0	0,4	100,0	8,2	38,3	32,6	10,6	3,4	6,7	0,2	100,0	2 576

Note : Il est recommandé, pendant les épisodes diarrhéiques, de donner davantage de liquides à l'enfant et de ne pas réduire les rations alimentaires.

[1] Le statut par rapport à l'allaitement concerne seulement les enfants de 0–35 mois.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 10.11 Thérapie de réhydratation par voie orale, supplémentation en zinc, poursuite de l'alimentation et administration d'autres traitements contre la diarrhée

Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, pourcentage à qui on a donné comme traitement une solution d'un sachet SRO ou des liquides SRO préconditionnés, du zinc, une SRO et du zinc, une SRO et la poursuite de l'alimentation, une SRO, du zinc, et la poursuite de l'alimentation, une SRO ou l'augmentation des liquides, des solutions maison recommandées (SMR), une thérapie de réhydratation par voie orale (TRO), la poursuite de l'alimentation et une TRO, et d'autres traitements et pourcentage à qui on n'a donné aucun traitement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Pourcentage d'enfants ayant eu la diarrhée à qui on a donné :														
										Autres traitements					
Caractéristique sociodémographique	Une solution d'un sachet SRO ou des liquides SRO	Zinc	SRO et zinc	SRO et poursuite de l'alimentation[1]	SRO, zinc, et poursuite de l'alimentation[1]	SRO ou augmentation des liquides	Solutions maison recommandées (SMR)	TRO (SRO, SMR ou augmentation des liquides)	Poursuite de l'alimentation et TRO[1]	Antibiotiques	Médicaments antimotilité	Solution intraveineuse	Remède maison/autre	Ne sait pas	Pourcentage à qui on n'a donné aucun traitement	Effectif d'enfants ayant eu la diarrhée
Âge en mois																
<6	4,5	2,2	0,3	1,8	0,0	13,7	0,1	13,8	7,2	13,3	7,2	0,0	41,1	0,0	35,2	296
6–11	9,8	7,9	4,3	7,9	3,8	27,7	3,3	29,4	22,0	16,7	6,3	0,6	37,6	0,0	31,8	475
12–23	10,0	5,8	3,3	8,1	2,8	30,1	3,2	31,6	24,6	18,7	8,8	0,1	44,9	0,0	23,7	832
24–35	10,0	5,9	2,8	8,1	2,4	31,2	5,0	33,9	29,2	14,7	5,5	0,5	36,8	0,0	28,2	534
36–47	13,0	11,2	4,9	11,9	3,9	31,1	5,4	32,2	27,6	17,1	5,7	0,2	31,7	0,0	32,5	292
48–59	13,0	13,5	6,5	10,6	4,9	33,9	7,7	36,5	26,9	12,6	6,7	0,7	40,4	0,5	27,0	148
Sexe																
Masculin	10,7	6,6	3,5	8,6	2,9	29,1	3,9	30,8	23,9	16,8	7,0	0,5	38,8	0,0	29,0	1 363
Féminin	8,9	7,1	3,3	7,2	2,8	27,5	3,5	29,1	23,2	15,9	7,0	0,2	40,7	0,1	28,2	1 213
Résidence																
Bamako	15,9	6,9	4,2	13,7	3,4	47,0	1,3	47,6	40,3	16,5	8,3	0,7	51,6	0,0	15,3	261
Autre urbain	14,5	8,6	4,4	10,6	4,0	35,6	3,6	36,8	29,3	20,3	12,1	0,1	36,1	0,3	24,4	249
Ensemble urbain	15,2	7,7	4,3	12,2	3,7	41,4	2,4	42,3	34,9	18,4	10,1	0,4	44,0	0,2	19,7	511
Rural	8,5	6,6	3,2	6,8	2,6	25,1	4,1	26,9	20,7	15,9	6,2	0,3	38,6	0,0	30,8	2 065
Région																
Kayes	8,2	4,9	2,2	5,7	1,6	24,1	7,2	28,7	19,6	14,1	4,9	0,5	36,6	0,0	34,4	524
Koulikoro	10,9	14,2	6,3	10,4	6,3	30,9	3,4	31,1	27,8	15,1	5,7	0,5	39,5	0,0	25,3	406
Sikasso	7,5	4,4	2,5	5,0	2,1	26,7	3,4	28,0	23,1	21,5	6,7	0,2	41,4	0,0	26,3	537
Ségou	8,5	6,8	2,8	7,7	2,0	26,6	3,8	28,1	21,8	9,2	6,4	0,0	43,7	0,2	29,7	401
Mopti	7,7	3,5	1,3	5,5	0,6	20,1	0,6	20,5	13,3	22,6	9,3	0,0	32,7	0,0	34,0	346
Tombouctou	18,7	10,8	9,0	10,3	5,1	28,7	3,7	31,3	16,0	5,9	5,5	1,4	34,5	0,0	41,5	30
Gao	26,3	13,2	11,2	22,8	10,3	38,7	7,0	39,5	32,6	14,9	21,0	0,3	20,5	0,0	33,9	69
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	1
Bamako	15,9	6,9	4,2	13,7	3,4	47,0	1,3	47,6	40,3	16,5	8,3	0,7	51,6	0,0	15,3	261
Niveau d'instruction de la mère																
Aucun	7,5	5,7	2,5	6,0	2,1	25,0	3,8	26,9	20,8	14,9	6,2	0,2	40,6	0,0	30,4	1 523
Primaire	10,7	6,8	4,5	8,6	3,4	29,1	3,3	29,9	23,1	15,2	6,8	0,2	36,6	0,0	31,5	494
Secondaire ou plus	15,6	10,1	4,8	12,6	4,3	36,9	3,8	38,5	31,4	21,3	9,5	0,7	40,0	0,1	21,2	559
Quintile de bien-être économique																
Le plus bas	5,4	4,7	2,6	4,7	2,1	22,1	4,4	24,6	20,2	15,6	4,9	0,4	41,0	0,0	31,6	528
Second	7,3	5,5	2,9	5,7	2,7	25,7	3,8	27,6	21,1	14,5	4,2	0,2	42,1	0,0	31,0	609
Moyen	10,1	7,7	3,1	7,8	2,3	25,0	3,4	25,9	18,6	14,7	8,5	0,2	34,4	0,0	32,9	558
Quatrième	9,6	7,4	3,2	7,5	2,2	28,9	4,2	30,6	24,2	17,9	6,9	0,0	41,5	0,0	27,0	445
Le plus élevé	18,7	9,7	5,7	15,3	5,2	43,3	2,8	44,3	36,7	20,5	11,6	1,0	39,6	0,2	17,8	436
Ensemble	9,9	6,8	3,4	7,9	2,8	28,3	3,7	30,0	23,6	16,4	7,0	0,3	39,7	0,0	28,6	2 576

SRO = Sels de réhydratation par voir orale

[1] Par poursuite de l'alimentation, on entend ici les enfants à qui on a donné davantage de nourriture que d'habitude, la même quantité ou un peu moins que d'habitude pendant les épisodes diarrhéiques.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 10.12 Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant eu la diarrhée

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques ; parmi les enfants ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques et parmi les enfants ayant eu la diarrhée qui ont reçu des SRO, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques ; et parmi les enfants ayant eu la diarrhée à qui on a donné du zinc en comprimés ou en sirop, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitements ont été recherchés auprès de sources spécifiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de chaque source :			
Source	Parmi les enfants ayant eu la diarrhée	Parmi les enfants ayant eu la diarrhée pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement	Parmi les enfants ayant eu la diarrhée qui ont reçu des SRO[1]	Parmi les enfants ayant eu la diarrhée à qui on a donné du zinc
Secteur médical public	**15,3**	**33,4**	**51,6**	**52,8**
Hôpital national	0,0	0,1	0,3	0,5
Hôpital régional	0,1	0,2	0,7	0,5
Centre de santé de référence	2,1	4,5	11,4	9,3
Centre de santé communautaire	10,0	21,8	32,6	35,8
Dispensaire/maternité	1,8	4,0	3,4	5,8
Infirmerie de garnison militaire	0,0	0,1	0,5	0,0
Centre médicaux inter-entreprises (CMIE)/Institut National de Prévoyance Sociale (INPS)	0,0	0,0	0,1	0,2
Agent de santé communautaire (ASC)/relais	1,3	2,9	3,0	1,3
Secteur médical privé	**8,2**	**17,9**	**27,4**	**23,5**
Hôpital/Clinique privé	2,2	4,7	9,9	9,5
Centre confessionnel	0,0	0,1	0,0	0,0
Cabinet médical	0,5	1,1	1,3	0,0
Cabinet de soin privé	0,7	1,4	2,8	2,7
Pharmacie	4,8	10,5	13,4	11,4
Secteur médical ONG	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,2**
Hôpital ONG	0,0	0,1	0,0	0,0
Clinique ONG	0,0	0,0	0,1	0,2
Autre source	**22,6**	**49,2**	**7,9**	**5,1**
Boutique	5,1	11,2	1,9	2,7
Vendeur de médicaments ambulants	6,4	14,1	2,9	1,4
Guérisseur/praticien traditionnel	9,8	21,4	3,6	1,8
Marché	2,5	5,5	0,0	0,0
Autre	0,4	0,8	0,3	0,5
Effectif d'enfants	2 576	1 182	254	176

Note : Les conseils ou traitements pour les enfants ayant eu la diarrhée peuvent avoir été recherchés auprès de plus d'une source.
ONG = Organisation non gouvernementale
SRO = Sels de réhydratation par voir orale
[1] Liquides de sachets SRO ou de sachets SRO préconditionnés

Tableau 10.13 Indice de développement de la petite enfance 2030

Pourcentage d'enfants âgés de 24 à 59 mois dont le développement est en bonne voie en matière de santé, d'apprentissage et de bien-être psychosocial, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Indice de développement de la petite enfance 2030[1]	Effectif d'enfants de 24–59 mois
Sexe		
Masculin	37,9	4 209
Féminin	42,5	4 153
Résidence		
Bamako	49,9	952
Autre urbain	51,2	823
Ensemble urbain	50,5	1 775
Rural	37,4	6 587
Région		
Kayes	30,8	1 244
Koulikoro	31,0	1 979
Sikasso	52,4	1 653
Ségou	43,7	1 326
Mopti	39,5	795
Tombouctou	24,9	170
Gao	35,1	240
Kidal	†	3
Bamako	49,9	952
Âge en mois		
24–35	58,7	2 950
36–47	37,2	2 734
48–59	22,8	2 679
Niveau d'instruction de la mère		
Aucun	35,9	5 156
Primaire	42,2	1 412
Secondaire ou plus	50,8	1 794
Quintile de bien-être économique		
Le plus bas	40,0	1 751
Second	37,0	1 798
Moyen	33,3	1 711
Quatrième	41,2	1 689
Le plus élevé	51,5	1 413
Ensemble	40,2	8 362

[1] ODD 4 : Indicateur 4.2.1

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 10.14 Résidence des enfants avec les parents et enfants orphelins

Pourcentage d'enfants de 0–17 ans (population de droit) qui ont déjà été mariés et pourcentage d'enfants qui n'ont jamais été mariés et dont les conditions de résidence avec les parents et l'état de survie des parents sont différentes, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'enfants déjà mariés	Vivant avec les deux parents	La mère vit ailleurs	Le père vit ailleurs	Ne vivent avec aucun parent biologique	Mère décédée	Père décédé	Les deux décédés	Effectif d'enfants
Âge de l'enfant									
0–1	0,0	79,0	1,0	20,0	0,8	0,2	0,6	0,0	6 379
2–4	0,0	77,9	6,4	18,8	4,9	0,5	1,4	0,0	9 746
5–8	0,0	73,1	12,6	19,6	10,0	1,4	3,4	0,1	12 215
9–11	0,0	69,6	16,2	20,0	13,0	2,4	5,0	0,3	7 473
12–14	0,0	62,5	22,5	24,5	19,6	3,2	6,8	0,5	7 282
15–17	12,3	49,7	23,9	24,0	22,6	3,5	9,1	0,9	4 975
Sexe de l'enfant									
Masculin	0,5	71,9	12,1	19,3	9,5	1,8	4,0	0,2	24 321
Féminin	2,1	68,6	14,0	22,3	12,5	1,6	3,9	0,3	23 748
Résidence									
Bamako	0,8	69,5	14,9	21,2	13,1	1,6	5,1	0,3	5 587
Autre urbain	1,1	66,0	16,5	25,1	15,2	2,1	4,5	0,3	4 890
Ensemble urbain	0,9	67,8	15,6	23,0	14,1	1,8	4,8	0,3	10 477
Rural	1,4	70,9	12,3	20,1	10,1	1,7	3,7	0,2	37 592
Région									
Kayes	2,0	67,5	12,1	21,8	9,3	1,8	4,2	0,2	7 280
Koulikoro	1,4	70,2	13,0	21,0	10,7	1,5	3,7	0,3	11 239
Sikasso	1,2	76,5	11,3	14,9	9,1	1,7	3,5	0,2	9 277
Ségou	0,8	70,5	14,0	22,5	12,5	1,6	3,1	0,2	7 630
Mopti	1,0	66,5	12,8	25,5	11,3	1,8	3,7	0,2	4 667
Tombouctou	1,4	72,5	12,6	17,0	12,1	2,8	5,7	0,5	881
Gao	2,2	58,0	18,1	27,6	15,6	2,9	6,7	0,2	1 492
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	†	16
Bamako	0,8	69,5	14,9	21,2	13,1	1,6	5,1	0,3	5 587
Quintile de bien-être économique									
Le plus bas	1,4	75,1	10,2	17,4	7,7	1,3	2,3	0,1	10 028
Second	1,3	73,3	10,9	17,9	8,6	1,5	3,6	0,2	9 964
Moyen	1,6	68,3	12,8	21,5	11,1	1,9	5,0	0,2	9 875
Quatrième	1,1	68,6	13,3	21,9	11,6	2,0	4,6	0,4	9 463
Le plus élevé	0,9	65,3	18,5	25,8	16,7	1,8	4,4	0,3	8 738
Ensemble	1,3	70,3	13,0	20,8	11,0	1,7	4,0	0,2	48 069

Note : Les colonnes ne sont pas mutuellement exclusives et la somme des pourcentages peut excéder 100 %.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 10.15 Personnes s'occupant des enfants qui ne vivent pas avec un parent biologique

Répartition (en %) de la population de droit des enfants de 0–17 ans par résidence avec les parents, état matrimonial et type de relation avec la personne qui s'occupe de l'enfant, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Enfant déjà marié	Enfant jamais marié et vivant avec un ou les deux parents biologiques	Personne qui s'occupe de l'enfant qui n'a jamais été marié et qui ne vit avec aucun des parents biologiques											Total	Population de droit des enfants de 0–17 ans
			Grand-parent	Tante/ oncle	Frère/ sœur	Autre parent	Belle-mère/ beau-père	Parent du beau-parent	Parent d'accueil officiel ou enfant adopté	Ami	Aucun lien de parenté	Manquant	Pas de personne qui s'occupe de l'enfant		
TOUS LES ENFANTS DE 0–17 ANS															
Âge de l'enfant															
0–1	0,0	99,2	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	100,0	6 379
2–4	0,0	95,1	3,0	0,7	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,6	0,2	100,0	9 746
5–8	0,0	90,0	4,4	2,1	0,2	0,5	0,1	0,2	0,2	0,0	0,3	1,7	0,3	100,0	12 215
9–11	0,0	87,0	4,5	2,9	0,4	0,9	0,1	0,2	0,4	0,0	0,5	2,7	0,3	100,0	7 473
12–14	0,0	80,4	3,7	4,6	0,9	1,4	0,2	0,2	0,7	0,1	3,3	4,1	0,4	100,0	7 282
15–17	12,3	65,2	2,5	5,1	1,1	2,0	0,1	0,2	0,8	0,1	4,5	5,4	0,6	100,0	4 975
Sexe de l'enfant															
Masculin	0,5	90,0	3,1	2,1	0,3	0,7	0,1	0,1	0,3	0,0	0,5	2,0	0,2	100,0	24 321
Féminin	2,1	85,4	3,5	2,6	0,5	0,8	0,1	0,2	0,3	0,0	1,8	2,3	0,3	100,0	23 748
État de survie des parents															
Les deux parents en vie	1,2	89,5	3,5	2,5	0,4	0,8	0,1	0,2	0,3	0,0	1,2	0,0	0,3	100,0	45 275
Seule la mère est en vie[1]	2,6	67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,6	0,0	100,0	1 914
Seul le père est en vie[2]	2,8	51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,5	0,0	100,0	731
Les deux parents décédés[3]	10,5	na	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5	0,0	100,0	150
Résidence															
Bamako	0,8	86,2	2,2	2,6	0,5	1,0	0,0	0,2	0,2	0,0	3,0	2,9	0,3	100,0	5 587
Autre urbain	1,1	83,7	3,0	4,7	0,7	0,9	0,1	0,2	0,4	0,0	1,6	3,1	0,3	100,0	4 890
Ensemble urbain	0,9	85,0	2,6	3,6	0,6	1,0	0,1	0,2	0,3	0,0	2,4	3,0	0,3	100,0	10 477
Rural	1,4	88,5	3,5	2,0	0,3	0,7	0,1	0,1	0,3	0,0	0,8	1,9	0,3	100,0	37 592
Région															
Kayes	2,0	88,7	2,5	2,5	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,0	0,6	2,0	0,2	100,0	7 280
Koulikoro	1,4	87,9	2,6	2,7	0,4	1,0	0,1	0,0	0,4	0,0	1,3	2,1	0,2	100,0	11 239
Sikasso	1,2	89,7	2,4	2,1	0,5	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,9	1,9	0,4	100,0	9 277
Ségou	0,8	86,6	5,2	1,8	0,3	1,2	0,1	0,4	0,4	0,1	1,0	2,0	0,2	100,0	7 630
Mopti	1,0	87,7	4,5	2,5	0,4	0,4	0,1	0,0	0,3	0,0	0,4	2,2	0,5	100,0	4 667
Tombouctou	1,4	86,5	6,7	1,8	0,8	0,3	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	1,9	0,2	100,0	881
Gao	2,2	82,2	6,6	3,1	0,4	0,7	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	4,1	0,4	100,0	1 492
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	100,0	16
Bamako	0,8	86,2	2,2	2,6	0,5	1,0	0,0	0,2	0,2	0,0	3,0	2,9	0,3	100,0	5 587
Quintile de bien-être économique															
Le plus bas	1,4	90,9	3,5	1,4	0,2	0,4	0,1	0,2	0,1	0,0	0,4	1,1	0,2	100,0	10 028
Second	1,3	90,1	3,8	1,5	0,1	0,4	0,1	0,1	0,3	0,0	0,4	1,7	0,2	100,0	9 964
Moyen	1,6	87,3	3,9	2,1	0,5	0,7	0,1	0,1	0,4	0,0	0,5	2,4	0,3	100,0	9 875
Quatrième	1,1	87,3	2,9	3,0	0,6	1,0	0,1	0,1	0,4	0,0	0,8	2,3	0,3	100,0	9 463
Le plus élevé	0,9	82,4	2,3	4,0	0,6	1,2	0,0	0,2	0,5	0,0	3,9	3,5	0,4	100,0	8 738
Ensemble des enfants de 0–17 ans (pop. de droit)	1,3	87,7	3,3	2,4	0,4	0,7	0,1	0,1	0,3	0,0	1,1	2,2	0,3	100,0	48 069
ENFANTS DE 0–17 ANS N'AYANT JAMAIS ÉTÉ MARIÉS ET NE VIVANT AVEC AUCUN DES PARENTS BIOLOGIQUES															
Âge de l'enfant															
0–1	na	na	58,3	9,6	0,0	5,9	0,0	0,0	1,6	0,0	2,2	22,0	0,4	100,0	53
2–4	na	na	60,1	14,1	1,2	5,0	0,4	1,6	1,5	0,0	1,2	11,3	3,7	100,0	479
5–8	na	na	44,4	21,1	2,1	5,1	1,0	1,6	2,5	0,0	2,7	16,8	2,7	100,0	1 223
9–11	na	na	34,4	22,4	3,4	7,0	1,0	1,6	3,0	0,1	3,8	20,9	2,2	100,0	975
12–14	na	na	18,9	23,6	4,6	7,1	1,1	1,0	3,6	0,3	16,7	20,8	2,2	100,0	1 429
15–17	na	na	11,2	22,6	5,0	8,9	0,6	1,0	3,3	0,4	20,1	24,1	2,8	100,0	1 123
Sexe de l'enfant															
Masculin	na	na	32,8	22,3	2,6	6,9	1,2	1,3	3,6	0,3	4,8	21,5	2,6	100,0	2 309
Féminin	na	na	28,1	21,0	4,2	6,8	0,6	1,3	2,4	0,1	14,5	18,4	2,6	100,0	2 973
État de survie des parents															
Les deux parents en vie	na	na	37,5	26,8	4,4	8,5	1,1	1,6	3,7	0,2	12,8	0,3	3,2	100,0	4 250
Seule la mère est en vie[1]	na	na	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	566
Seul le père est en vie[2]	na	na	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	333
Les deux parents décédés[3]	na	na	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	134

À suivre…

Tableau 10.15—*Suite*

Caractéristique sociodémographique	Enfant déjà marié	Enfant jamais marié et vivant avec un ou les deux parents biologiques	Personne qui s'occupe de l'enfant qui n'a jamais été marié et qui ne vit avec aucun des parents biologiques											Total	Population de droit des enfants de 0–17 ans
			Grand-parent	Tante/ oncle	Frère/ sœur	Autre parent	Belle-mère/ beau-père	Grand-parent	Tante/ oncle	Frère/ sœur	Aucun lien de parenté	Manquant	Grand-parent	Tante/ oncle	Frère/ sœur
Résidence															
Bamako	na	na	17,2	20,2	3,9	7,9	0,0	1,6	1,7	0,0	23,3	21,8	2,4	100,0	730
Autre urbain	na	na	19,9	30,7	4,6	6,0	1,0	1,6	2,8	0,2	10,8	20,6	2,0	100,0	745
Ensemble urbain	na	na	18,5	25,5	4,2	7,0	0,5	1,6	2,3	0,1	17,0	21,2	2,2	100,0	1 474
Rural	na	na	34,7	20,1	3,2	6,7	1,0	1,2	3,2	0,2	7,7	19,2	2,7	100,0	3 808
Région															
Kayes	na	na	27,2	26,5	2,5	4,6	1,7	2,2	5,4	0,1	6,1	21,2	2,4	100,0	677
Koulikoro	na	na	24,6	24,9	3,5	9,1	0,7	0,0	3,5	0,0	12,3	19,2	2,1	100,0	1 206
Sikasso	na	na	26,0	23,5	5,7	4,9	1,1	1,1	2,5	0,3	10,3	20,7	4,0	100,0	843
Ségou	na	na	41,7	14,1	2,1	9,4	1,1	3,1	2,8	0,6	7,6	16,1	1,4	100,0	957
Mopti	na	na	40,0	22,1	3,2	3,1	0,8	0,2	3,0	0,1	3,7	19,6	4,3	100,0	529
Tombouctou	na	na	55,2	14,8	6,8	2,4	0,2	0,0	1,3	0,5	1,7	15,6	1,5	100,0	107
Gao	na	na	42,2	20,1	2,8	4,6	0,5	0,6	0,0	0,0	0,5	26,3	2,4	100,0	233
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	100,0	2
Bamako	na	na	17,2	20,2	3,9	7,9	0,0	1,6	1,7	0,0	23,3	21,8	2,4	100,0	730
Quintile de bien-être économique															
Le plus bas	na	na	45,9	17,9	2,5	5,4	1,4	2,3	1,9	0,0	5,3	14,5	2,8	100,0	773
Second	na	na	44,2	18,0	1,3	4,9	1,1	1,3	3,0	0,3	4,5	19,6	1,9	100,0	854
Moyen	na	na	35,1	19,1	4,1	6,7	1,2	0,9	3,4	0,3	4,4	21,7	3,0	100,0	1 096
Quatrième	na	na	25,1	26,0	5,0	8,7	1,0	1,1	3,2	0,1	6,7	20,0	3,0	100,0	1 098
Le plus élevé	na	na	13,8	24,2	3,8	7,3	0,1	1,2	3,0	0,2	23,3	20,9	2,2	100,0	1 461
Ensemble des enfants n'ayant jamais été mariés et ne vivant avec aucun des parents biologiques	na	na	30,2	21,6	3,5	6,8	0,9	1,3	3,0	0,2	10,3	19,8	2,6	100,0	5 282

na = non applicable
[1] Y compris les enfants dont le père est décédé ou ceux dont l'état de survie du père est inconnu.
[2] Y compris les enfants dont la mère est décédée ou ceux dont l'état de survie de la mère est inconnu.
[3] Y compris les enfants dont les deux parents sont décédés, ceux dont un parent est décédé et l'état de survie de l'autre est inconnu, ou ceux dont l'état de survie des deux parents est inconnu.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 10.16.1 Durée de la séparation parent-enfant

Répartition (en %) des enfants de 0–17 ans n'ayant jamais été mariés (pop. de droit) qui ne vivent pas avec leur mère ou leur père, par durée de la séparation et durée moyenne de la séparation, selon l'état de survie du parent, EDSM-VII Mali 2023–2024

Durée de la séparation	Ne vit pas avec la mère	Ne vit pas avec le père
PARENTS EN VIE, VIVANT AILLEURS		
Temps écoulé depuis qu'ils vivaient ensemble		
0–1 mois	18,6	21,8
2–5 mois	14,4	18,1
6–11 mois	7,9	10,3
12–23 mois	10,2	12,2
2–4 ans	22,5	17,6
5+ ans	19,3	12,6
Ne sait pas	5,2	1,5
N'ont jamais vécu ensemble	2,0	6,0
Total	100,0	100,0
Effectif	6 089	9 557
Durée moyenne de la séparation (an années)	2,9	2,2
Durée médiane de la séparation (an années)	1,6	0,8
PARENT DÉCÉDÉ		
Années depuis le décès		
0–1	24,7	29,7
2–4	37,1	32,5
5–9	26,7	25,2
10+	11,4	12,6
Total	100,0	100,0
Effectif	818	1 900
Durée moyenne de l'orphelinage (en années)	4,8	4,8
Durée médiane de l'orphelinage (en années)	3,6	3,6

Note : Les mesures de la durée de la séparation excluent les enfants dont l'état de survie des parents a été déclaré comme étant inconnu.

Tableau 10.16.2 Durée du double orphelinage

Répartition (en %) des enfants de 0–17 ans (pop. de droit) n'ayant jamais été mariés et dont la mère et le père sont décédés, par années depuis le décès du parent qui a survécu le plus longtemps, et durée moyenne du double orphelinage, EDSM-VII Mali 2023–2024

Durée du double orphelinage	Double orphelins
Années depuis le décès du parent qui a survécu le plus longtemps	
0–1	38,2
2–4	31,0
5–9	22,2
10+	8,6
Total	100,0
Effectif	115
Durée moyenne du double orphelinage (en années)	3,9
Durée médiane du double orphelinage (en années)	2,7

Note : Le tableau exclut les enfants dont le statut des deux parents est inconnu.

Tableau 10.16.3 Durée moyenne de la séparation parent-enfant selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Parmi les enfants de 0–17 ans n'ayant jamais été mariés et qui ne vivent pas avec leur mère, durée moyenne, en années, de la séparation selon certaines caractéristiques sociodémographiques et selon l'état de survie de la mère ; et Parmi les enfants de 0–17 ans n'ayant jamais été mariés et qui ne vivent pas avec leur père, durée moyenne, en années, de la séparation, selon certaines caractéristiques sociodémographiques et selon l'état de survie du père, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Enfant ne vit pas avec la mère		Enfant ne vit pas avec le père	
Caractéristique sociodémographique	Durée moyenne de la séparation : mère en vie	Durée moyenne de l'orphelinage maternel	Durée moyenne de la séparation : père en vie	Durée moyenne de l'orphelinage paternel
Âge de l'enfant				
0–1	0,4	*	0,5	(0,8)
2–4	1,3	2,3	1,2	2,0
5–8	2,3	3,7	2,1	3,1
9–11	3,2	4,2	2,9	4,7
12–14	3,4	5,6	3,2	5,5
15–17	3,8	6,3	3,8	6,6
Sexe de l'enfant				
Masculin	3,0	5,0	2,2	4,8
Féminin	2,9	4,6	2,3	4,7
Résidence				
Bamako	3,3	5,4	2,8	5,2
Autre urbain	3,3	5,2	2,6	4,8
Ensemble urbain	3,3	5,3	2,7	5,1
Rural	2,8	4,6	2,1	4,6
Région				
Kayes	2,7	4,7	2,3	4,5
Koulikoro	2,5	3,9	2,0	4,5
Sikasso	3,4	4,6	2,6	4,7
Ségou	2,8	5,5	1,8	5,1
Mopti	2,9	5,3	2,0	4,4
Tombouctou	2,8	5,2	2,6	5,0
Gao	3,4	4,3	2,9	4,9
Kidal	†	†	†	†
Bamako	3,3	5,4	2,8	5,2
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	2,7	4,6	1,9	4,9
Second	3,0	4,7	2,0	4,2
Moyen	2,9	4,7	2,2	4,8
Quatrième	3,2	4,5	2,5	4,8
Le plus élevé	2,9	5,5	2,5	5,1
Ensemble	2,9	4,8	2,2	4,8

Note : Le tableau n'inclut pas la durée de séparation pour les enfants dont l'état de survie de la mère/père est inconnu. La durée moyenne de la séparation exclut les enfants pour lesquels il a été déclaré qu'ils n'avaient jamais vécu avec leurs parents ainsi que les enfants pour lesquels la durée de la séparation n'était pas connue. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 10.17.1 État matrimonial de la mère biologique de l'enfant

Parmi les enfants de 0–17 ans (pop. de droit) n'ayant jamais été mariés et dont la mère vit ailleurs, répartition (en %) selon l'état matrimonial de la mère, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Mère mariée au père biologique de l'enfant	Mère non mariée	Mère mariée mais pas au père biologique de l'enfant	Mère mariée mais ne sait pas si c'est le père de l'enfant	Ne sait pas si la mère est mariée	Total	Effectif d'enfants
Âge de l'enfant							
0–1	58,5	11,2	14,8	0,0	15,5	100,0	60
2–4	67,5	18,1	8,1	0,0	6,3	100,0	605
5–8	60,7	15,5	16,3	0,1	7,3	100,0	1 510
9–11	57,2	15,2	19,9	0,1	7,6	100,0	1 177
12–14	60,2	13,5	17,7	0,3	8,3	100,0	1 581
15–17	64,6	13,3	17,5	0,0	4,5	100,0	1 157
Sexe de l'enfant							
Masculin	57,0	16,3	19,0	0,0	7,7	100,0	2 861
Féminin	65,1	13,3	14,8	0,2	6,5	100,0	3 228
Résidence							
Bamako	57,4	19,4	17,0	0,2	6,0	100,0	822
Autre urbain	62,4	14,5	17,7	0,1	5,3	100,0	802
Ensemble urbain	59,9	17,0	17,3	0,1	5,7	100,0	1 624
Rural	61,8	13,9	16,6	0,1	7,6	100,0	4 465
Région							
Kayes	64,2	9,6	21,0	0,0	5,2	100,0	827
Koulikoro	59,7	16,0	15,7	0,0	8,6	100,0	1 402
Sikasso	58,9	16,8	16,1	0,3	7,9	100,0	1 035
Ségou	62,3	13,9	16,3	0,4	7,1	100,0	1 042
Mopti	68,7	10,2	14,7	0,0	6,4	100,0	580
Tombouctou	72,6	12,1	11,3	0,0	4,0	100,0	111
Gao	57,0	14,8	20,0	0,0	8,3	100,0	268
Kidal	†	†	†	†	†	100,0	2
Bamako	57,4	19,4	17,0	0,2	6,0	100,0	822
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	61,2	16,1	15,9	0,0	6,9	100,0	994
Second	59,6	13,1	19,0	0,1	8,2	100,0	1 046
Moyen	64,6	12,5	15,6	0,3	7,1	100,0	1 241
Quatrième	58,3	17,3	17,2	0,2	7,0	100,0	1 216
Le plus élevé	62,2	14,7	16,4	0,1	6,6	100,0	1 592
Ensemble	61,3	14,7	16,8	0,1	7,1	100,0	6 089

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 10.17.2 État matrimonial du père biologique de l'enfant

Parmi les enfants de 0–17 ans (pop. de droit) n'ayant jamais été mariés et dont le père vit ailleurs, répartition (en %) selon l'état matrimonial du père, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Père marié à la mère biologique de l'enfant	Père non marié	Père marié mais pas à la mère biologique de l'enfant	Père marié mais ne sait pas si c'est la mère de l'enfant	Ne sait pas si le père est marié	Total	Effectif d'enfants
Âge de l'enfant							
0–1	2,5	34,2	0,1	60,0	3,2	100,0	1 223
2–4	18,4	22,7	2,0	52,8	4,2	100,0	1 760
5–8	32,4	17,8	4,3	41,4	4,1	100,0	2 296
9–11	37,1	15,3	7,3	36,0	4,4	100,0	1 433
12–14	48,5	10,9	8,5	27,8	4,3	100,0	1 699
15–17	59,6	7,3	8,3	21,7	3,1	100,0	1 145
Sexe de l'enfant							
Masculin	28,5	19,5	5,3	42,6	4,0	100,0	4 490
Féminin	36,6	16,6	4,7	38,2	3,9	100,0	5 067
Résidence							
Bamako	37,0	20,6	5,0	33,0	4,3	100,0	1 162
Autre urbain	36,5	17,0	6,1	36,0	4,3	100,0	1 211
Ensemble urbain	36,8	18,8	5,6	34,6	4,3	100,0	2 373
Rural	31,5	17,7	4,8	42,2	3,8	100,0	7 184
Région							
Kayes	26,0	12,9	5,2	52,6	3,4	100,0	1 469
Koulikoro	32,0	23,9	4,4	36,2	3,6	100,0	2 216
Sikasso	36,3	19,2	4,7	35,5	4,4	100,0	1 364
Ségou	34,8	16,5	6,4	38,4	3,9	100,0	1 655
Mopti	30,6	12,6	3,8	50,1	2,9	100,0	1 130
Tombouctou	51,6	8,7	6,1	28,0	5,7	100,0	150
Gao	29,3	16,6	6,2	40,2	7,8	100,0	407
Kidal	†	†	†	†	†	100,0	4
Bamako	37,0	20,6	5,0	33,0	4,3	100,0	1 162
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	29,8	17,3	3,8	45,7	3,4	100,0	1 625
Second	28,9	18,2	5,2	44,0	3,8	100,0	1 685
Moyen	32,0	15,9	4,7	43,9	3,6	100,0	2 058
Quatrième	31,0	19,6	5,4	38,7	5,2	100,0	1 995
Le plus élevé	40,3	18,7	5,7	31,5	3,7	100,0	2 194
Ensemble	32,8	18,0	5,0	40,3	3,9	100,0	9 557

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 10.18.1 Fréquence des contacts avec la mère qui vit ailleurs

Parmi les enfants de 0–17 ans (pop. de droit) n'ayant jamais été mariés et dont la mère vit ailleurs, répartition (en %) par fréquence de contact, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Presque chaque jour	Au moins une fois par semaine	Au moins une fois par mois	Moins d'une fois par mois	Aucun contact	Ne sait pas	Manquant	Total	Pourcentage ayant été en contact au moins une fois par semaine	Effectif d'enfants
Âge de l'enfant										
0–1	34,3	16,9	16,6	2,3	22,5	0,0	7,4	100,0	51,2	60
2–4	34,3	21,2	12,5	6,5	20,8	0,3	4,4	100,0	55,5	605
5–8	24,0	24,8	15,4	10,5	20,5	0,4	4,4	100,0	48,8	1 510
9–11	19,0	24,2	17,1	12,4	21,9	0,9	4,5	100,0	43,2	1 177
12–14	17,9	25,7	18,6	13,3	19,5	0,9	4,1	100,0	43,6	1 581
15–17	18,1	29,8	16,5	16,0	16,2	1,4	2,1	100,0	47,9	1 157
Sexe de l'enfant										
Masculin	22,3	25,6	15,4	11,3	21,1	0,7	3,6	100,0	48,0	2 861
Féminin	20,7	25,2	17,4	13,0	18,6	0,9	4,2	100,0	45,9	3 228
Résidence										
Bamako	26,5	30,3	21,8	9,7	7,7	0,6	3,5	100,0	56,8	822
Autre urbain	17,7	27,5	19,6	11,9	18,4	1,6	3,3	100,0	45,2	802
Ensemble urbain	22,1	28,9	20,7	10,8	13,0	1,1	3,4	100,0	51,1	1 624
Rural	21,2	24,2	15,0	12,7	22,2	0,7	4,1	100,0	45,4	4 465
Région										
Kayes	20,3	40,3	15,0	8,1	13,1	0,8	2,4	100,0	60,6	827
Koulikoro	10,3	26,8	18,7	16,3	23,5	0,5	3,9	100,0	37,2	1 402
Sikasso	19,3	21,8	13,5	12,0	27,0	1,7	4,7	100,0	41,1	1 035
Ségou	26,5	19,2	15,9	11,8	21,6	0,7	4,2	100,0	45,6	1 042
Mopti	28,5	12,4	14,5	13,4	25,4	0,8	4,9	100,0	40,9	580
Tombouctou	40,3	26,0	14,8	9,0	6,3	0,0	3,6	100,0	66,4	111
Gao	33,2	23,2	12,1	11,2	15,9	0,0	4,3	100,0	56,4	268
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	100,0	82,8	2
Bamako	26,5	30,3	21,8	9,7	7,7	0,6	3,5	100,0	56,8	822
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	24,4	18,0	12,4	11,7	29,5	0,2	3,7	100,0	42,5	994
Second	22,1	22,7	13,8	13,5	22,2	0,9	4,9	100,0	44,9	1 046
Moyen	23,0	26,7	17,3	9,4	19,0	1,0	3,7	100,0	49,7	1 241
Quatrième	19,6	27,5	16,4	14,5	17,8	0,3	3,9	100,0	47,1	1 216
Le plus élevé	19,4	29,2	20,3	12,0	14,2	1,3	3,6	100,0	48,6	1 592
Ensemble	21,4	25,4	16,5	12,2	19,7	0,8	3,9	100,0	46,9	6 089

Note : Par « Contact », on entend tout type d'interaction, comme les visites en personne, les appels, les SMS ou toute autre forme de communication. Les catégories sont mutuellement exclusives. Par exemple, « au moins une fois par mois » signifie au moins une fois par mois mais moins d'une fois par semaine.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 10.18.2 Fréquence des contacts avec le père qui vit ailleurs

Parmi les enfants de 0–17 ans (pop. de droit) n'ayant jamais été mariés et dont le père vit ailleurs, répartition (en %) par fréquence de contact, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Presque chaque jour	Au moins une fois par semaine	Au moins une fois par mois	Moins d'une fois par mois	Aucun contact	Ne sait pas	Manquant	Total	Pourcentage ayant été en contact au moins une fois par semaine	Effectif d'enfants
Âge de l'enfant										
0–1	27,7	27,1	8,6	5,9	28,7	0,5	1,6	100,0	54,7	1 223
2–4	28,0	28,6	11,0	8,0	23,3	0,3	0,8	100,0	56,5	1 760
5–8	26,2	27,4	13,8	9,0	22,1	0,7	1,0	100,0	53,5	2 296
9–11	23,5	26,8	16,4	11,8	20,3	0,3	0,9	100,0	50,3	1 433
12–14	19,4	28,4	15,4	13,5	21,7	1,0	0,5	100,0	47,9	1 699
15–17	18,1	27,7	18,1	15,0	19,2	1,3	0,6	100,0	45,8	1 145
Sexe de l'enfant										
Masculin	25,6	27,9	13,3	9,6	22,2	0,6	0,7	100,0	53,5	4 490
Féminin	22,8	27,6	14,2	11,0	22,7	0,7	1,0	100,0	50,3	5 067
Résidence										
Bamako	27,9	25,7	19,7	9,8	15,6	0,8	0,4	100,0	53,6	1 162
Autre urbain	21,0	30,7	16,1	10,6	19,9	1,2	0,5	100,0	51,6	1 211
Ensemble urbain	24,4	28,2	17,9	10,2	17,8	1,0	0,5	100,0	52,6	2 373
Rural	24,0	27,5	12,4	10,4	24,0	0,5	1,0	100,0	51,6	7 184
Région										
Kayes	22,4	39,2	12,9	6,2	18,5	0,3	0,5	100,0	61,6	1 469
Koulikoro	20,2	31,5	12,0	11,8	23,0	0,3	1,2	100,0	51,7	2 216
Sikasso	26,1	23,7	9,4	11,2	27,7	1,2	0,7	100,0	49,8	1 364
Ségou	24,3	24,6	16,3	10,1	23,1	0,5	1,2	100,0	48,9	1 655
Mopti	24,1	20,5	13,6	13,5	25,8	1,2	1,2	100,0	44,6	1 130
Tombouctou	33,5	23,5	18,3	10,1	14,2	0,0	0,3	100,0	57,0	150
Gao	29,7	19,2	13,2	9,3	27,3	0,6	0,7	100,0	48,9	407
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	100,0	81,3	4
Bamako	27,9	25,7	19,7	9,8	15,6	0,8	0,4	100,0	53,6	1 162
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	21,0	22,3	14,3	9,8	31,3	0,4	0,9	100,0	43,3	1 625
Second	21,8	26,6	11,8	11,9	26,4	0,5	1,0	100,0	48,4	1 685
Moyen	24,8	31,2	12,3	9,3	20,9	0,6	1,1	100,0	55,9	2 058
Quatrième	25,0	30,2	14,1	10,3	18,8	0,8	0,9	100,0	55,1	1 995
Le plus élevé	26,8	27,1	16,1	10,7	17,8	0,9	0,6	100,0	53,9	2 194
Ensemble	24,1	27,7	13,8	10,4	22,5	0,7	0,9	100,0	51,8	9 557

Note : Par « Contact », on entend tout type d'interaction, comme les visites en personne, les appels, les SMS ou toute autre forme de communication. Les catégories sont mutuellement exclusives. Par exemple, « au moins une fois par mois » signifie au moins une fois par mois mais moins d'une fois par semaine.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 10.19.1 Endroit où vivent les mères qui vivent ailleurs

Parmi les enfants de 0–17 ans (pop. de droit) n'ayant jamais été mariés et dont la mère vit ailleurs, répartition (en %) selon l'endroit où vit la mère, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Dans un autre ménage dans la même région	Dans un autre ménage dans une autre région	Dans une institution dans ce pays	Dans un autre pays	Ne sait pas	Manquant	Total	Effectif d'enfants
Âge de l'enfant								
0–1	67,5	22,4	1,4	1,3	0,0	7,4	100,0	60
2–4	59,1	30,9	1,3	3,5	0,7	4,4	100,0	605
5–8	54,9	32,6	1,2	5,7	1,2	4,4	100,0	1 510
9–11	50,8	36,2	1,4	5,6	1,3	4,6	100,0	1 177
12–14	47,7	41,0	1,1	4,8	1,2	4,1	100,0	1 581
15–17	43,5	48,2	0,6	5,0	0,7	2,0	100,0	1 157
Sexe de l'enfant								
Masculin	53,4	35,0	1,3	5,3	1,4	3,6	100,0	2 861
Féminin	48,2	41,0	0,9	4,9	0,8	4,3	100,0	3 228
Résidence								
Bamako	34,6	55,6	0,0	5,7	0,6	3,5	100,0	822
Autre urbain	50,5	39,5	0,5	6,1	0,2	3,3	100,0	802
Ensemble urbain	42,5	47,7	0,2	5,9	0,4	3,4	100,0	1 624
Rural	53,6	34,7	1,5	4,7	1,3	4,1	100,0	4 465
Région								
Kayes	64,4	27,9	1,2	2,6	1,6	2,3	100,0	827
Koulikoro	37,7	51,3	0,4	5,0	1,6	3,9	100,0	1 402
Sikasso	52,4	32,7	1,2	7,9	1,3	4,5	100,0	1 035
Ségou	55,2	35,7	1,8	2,4	0,6	4,2	100,0	1 042
Mopti	57,4	26,6	3,7	6,4	0,3	5,4	100,0	580
Tombouctou	77,4	15,3	0,0	3,7	0,0	3,6	100,0	111
Gao	74,3	12,6	0,1	7,1	1,4	4,5	100,0	268
Kidal	†	†	†	†	†	†	100,0	2
Bamako	34,6	55,6	0,0	5,7	0,6	3,5	100,0	822
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	60,6	27,5	1,5	5,3	1,5	3,5	100,0	994
Second	58,3	29,9	1,0	4,3	1,7	4,9	100,0	1 046
Moyen	60,1	29,5	2,0	4,0	0,7	3,7	100,0	1 241
Quatrième	45,7	42,6	1,0	5,3	1,2	4,2	100,0	1 216
Le plus élevé	35,7	53,7	0,4	6,0	0,6	3,6	100,0	1 592
Ensemble	50,6	38,2	1,1	5,0	1,1	3,9	100,0	6 089

Note : Par institution, on entend des endroits comme les prisons ou des établissements pour malades mentaux.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 10.19.2 Endroit où vivent les pères qui vivent ailleurs

Parmi les enfants de 0–17 ans (pop. de droit) n'ayant jamais été mariés et dont le père vit ailleurs, répartition (en %) selon l'endroit où vit le père, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Dans un autre ménage dans la même région	Dans un ménage dans une autre région	Dans une institution dans ce pays	Dans un autre pays	Ne sait pas	Manquant	Total	Effectif d'enfants
Âge de l'enfant								
0–1	38,5	37,7	2,0	19,9	0,3	1,6	100,0	1 223
2–4	36,7	39,9	2,1	18,9	1,5	0,9	100,0	1 760
5–8	41,7	35,2	1,6	19,1	1,3	1,0	100,0	2 296
9–11	41,3	36,1	1,7	18,0	1,8	1,0	100,0	1 433
12–14	42,9	39,9	1,1	13,9	1,6	0,5	100,0	1 699
15–17	38,1	47,1	0,9	12,0	1,3	0,6	100,0	1 145
Sexe de l'enfant								
Masculin	39,8	37,4	1,6	19,0	1,4	0,7	100,0	4 490
Féminin	40,4	40,1	1,5	15,6	1,3	1,1	100,0	5 067
Résidence								
Bamako	31,5	48,6	0,2	18,5	0,8	0,4	100,0	1 162
Autre urbain	43,2	41,0	0,4	13,7	1,0	0,7	100,0	1 211
Ensemble urbain	37,5	44,7	0,3	16,0	0,9	0,5	100,0	2 373
Rural	41,0	36,8	2,0	17,6	1,5	1,0	100,0	7 184
Région								
Kayes	45,2	20,7	0,8	30,3	2,2	0,7	100,0	1 469
Koulikoro	28,2	50,3	0,4	19,2	0,8	1,2	100,0	2 216
Sikasso	47,4	37,9	0,7	10,3	2,9	0,7	100,0	1 364
Ségou	40,1	48,9	2,6	6,7	0,5	1,2	100,0	1 655
Mopti	44,3	25,3	6,2	21,8	1,1	1,3	100,0	1 130
Tombouctou	72,4	18,6	0,0	8,4	0,2	0,3	100,0	150
Gao	63,3	20,0	1,0	12,4	2,6	0,7	100,0	407
Kidal	†	†	†	†	†	†	100,0	4
Bamako	31,5	48,6	0,2	18,5	0,8	0,4	100,0	1 162
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	43,0	34,9	1,8	18,0	1,4	0,9	100,0	1 625
Second	44,0	35,7	2,5	15,1	1,7	1,0	100,0	1 685
Moyen	45,7	35,3	2,3	14,5	1,2	1,1	100,0	2 058
Quatrième	40,7	39,4	1,0	15,9	1,9	1,1	100,0	1 995
Le plus élevé	29,2	46,8	0,6	22,1	0,7	0,6	100,0	2 194
Ensemble	40,1	38,8	1,6	17,2	1,4	0,9	100,0	9 557

Note : Par institution, on entend des endroits comme les prisons ou des établissements pour malades mentaux.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 10.20 Flux financiers entre le ménage de l'enfant et les parents qui vivent ailleurs

Parmi les enfants de 0–17 ans (pop. de droit) n'ayant jamais été mariés et dont la mère vit ailleurs et parmi les enfants de 0–17 ans (pop. de droit) n'ayant jamais été mariés et dont le père vit ailleurs, pourcentage dont le parent envoie de l'argent ou des biens au ménage de l'enfant, pourcentage dont le parent reçoit de l'argent ou des biens du ménage de l'enfant et pourcentage dont le parent n'envoie, ni ne reçoit de l'argent ou des biens, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Mère vit ailleurs				Père vit ailleurs			
Caractéristique sociodémographique	Mère envoie de l'argent ou des biens au ménage de l'enfant	Mère reçoit de l'argent ou des biens du ménage de l'enfant	Mère n'envoie, ni ne reçoit de l'argent ou des biens	Effectif d'enfants	Père envoie de l'argent ou des biens au ménage de l'enfant	Père reçoit de l'argent ou des biens du ménage de l'enfant	Père n'envoie, ni ne reçoit de l'argent ou des biens	Effectif d'enfants
Âge de l'enfant								
0–1	21,8	19,5	64,8	60	73,2	14,3	23,2	1 223
2–4	37,0	26,6	50,8	605	66,1	16,1	31,2	1 760
5–8	32,6	22,5	54,7	1 510	61,1	16,6	35,6	2 296
9–11	28,4	21,0	57,6	1 177	55,0	16,2	41,1	1 433
12–14	26,7	22,9	56,4	1 581	44,7	16,2	48,8	1 699
15–17	24,8	22,7	59,4	1 157	38,2	19,6	51,7	1 145
Sexe de l'enfant								
Masculin	32,1	23,2	54,6	2 861	60,7	17,0	35,3	4 490
Féminin	26,5	22,3	57,8	3 228	53,7	15,9	40,9	5 067
Résidence								
Bamako	23,7	17,0	63,6	822	47,9	10,4	47,9	1 162
Autre urbain	30,1	20,4	55,3	802	55,4	15,5	38,2	1 211
Ensemble urbain	26,8	18,7	59,5	1 624	51,7	13,0	42,9	2 373
Rural	30,0	24,2	55,2	4 465	58,7	17,5	36,8	7 184
Région								
Kayes	40,7	19,5	51,5	827	65,1	14,8	32,6	1 469
Koulikoro	24,3	21,0	59,2	1 402	58,0	14,4	36,6	2 216
Sikasso	24,6	26,1	53,6	1 035	51,5	16,5	41,2	1 364
Ségou	28,9	22,5	59,3	1 042	56,9	20,6	38,4	1 655
Mopti	30,4	22,1	55,1	580	61,3	16,0	34,6	1 130
Tombouctou	32,1	26,6	55,4	111	42,4	19,2	54,4	150
Gao	50,0	47,0	36,1	268	60,3	33,8	35,4	407
Kidal	†	†	†	2	†	†	†	4
Bamako	23,7	17,0	63,6	822	47,9	10,4	47,9	1 162
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	27,7	22,5	58,4	994	62,0	16,6	34,3	1 625
Second	30,7	22,8	54,9	1 046	56,6	14,8	39,8	1 685
Moyen	35,7	26,4	50,9	1 241	61,5	18,5	34,6	2 058
Quatrième	30,6	21,5	56,6	1 216	58,6	18,1	36,1	1 995
Le plus élevé	22,7	21,0	59,9	1 592	48,0	14,0	45,5	2 194
Ensemble	29,1	22,7	56,3	6 089	57,0	16,4	38,3	9 557

Note : Les colonnes ne sont pas mutuellement exclusives et la somme peut excéder 100 %.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

NUTRITION DES ENFANTS ET DES ADULTES 11

Principaux résultats

- ***État nutritionnel des enfants :*** Au Mali, 25 % des enfants de moins de 5 ans accusent un retard de croissance, 15 % présentent une insuffisance pondérale, 1 % sont en surcharge pondérale et 5 % sont émaciés.
- ***Allaitement :*** Parmi les enfants de 0–23 mois, 46 % ont été mis au sein dans l'heure qui a suivi la naissance et 48 % ont été exclusivement allaités pendant les 2 jours qui ont suivi la naissance. Le pourcentage d'enfants de moins de 6 mois exclusivement allaités est de 40 %.
- ***Alimentation de complément :*** Parmi les enfants les plus jeunes de 6–23 mois, 17 % ont reçu une alimentation diversifiée le jour précédant l'interview et 34 % ont reçu des repas à la fréquence minimale recommandée. Trente-six pour cent des enfants de 6–23 mois ont consommé des boissons sucrées le jour précédant l'interview et 29 % des aliments considérés comme néfastes pour la santé.
- ***Supplémentation en fer, vitamine A et déparasitage :*** Au cours des 12 derniers mois, parmi les enfants de 6–59 mois, 23 % ont reçu des suppléments contenant du fer et 12 % des micronutriments multiples en poudre. Dans les 6 derniers mois, 61 % des enfants de 6–59 mois ont reçu des suppléments de vitamine A et 48 % des enfants de 12–59 mois ont été traités avec des médicaments pour le déparasitage.
- ***Anémie :*** Parmi les enfants de 6–59 mois, 74 % souffrent d'anémie et 44 % en souffrent sous la forme modérée ; la forme légère touche 27 % des enfants et 2 % souffrent d'anémie sévère.
- ***État nutritionnel des femmes :*** Sept pour cent des femmes de 20–49 ans et 18 % des jeunes femmes de 15–19 ans sont maigres. Trente-quatre pour cent des femmes de 20–49 ans présentent un surpoids ou sont obèses. Parmi les adolescentes de 15–19 ans, la prévalence du surpoids ou de l'obésité est de 14 %.
- ***Pratiques alimentaires des femmes :*** Le jour précédant l'interview, 34 % des femmes de 15–49 ans ont consommé des aliments provenant d'au moins cinq groupes alimentaires parmi dix groupes d'aliments spécifiés ; soixante-cinq pour cent ont consommé des boissons sucrées et 28 % des aliments considérés comme malsains.
- ***Anémie des femmes :*** Parmi les femmes de 15–49 ans, 53 % sont anémiées ; 27 % souffrent d'anémie modérée ; la forme légère touche 23 % des femmes et 2 % sont sévèrement anémiées.
- ***Sel iodé :*** Au Mali, 84 % des ménages dont le sel a été testé disposent de sel iodé.

La nutrition constitue le fondement de la santé et du développement des enfants et des adultes. Ce chapitre présente l'état nutritionnel et l'anémie chez les enfants et les adultes, les pratiques d'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (pratiques ANJE) et les pratiques en matière d'alimentation des femmes. De plus, ce chapitre présente les principales interventions nutritionnelles, notamment les conseils en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, la surveillance de la croissance des enfants, la supplémentation en micronutriments, le traitement avec des vermifuges pour les enfants et enfin le test pour la présence d'iode dans le sel de cuisine des ménages. Le Chapitre 9 présente des informations sur les interventions nutritionnelles effectuées pendant la période prénatale, telles que les conseils en nutrition maternelle, les conseils en allaitement, le traitement avec des vermifuges et la supplémentation en fer ainsi que les conseils et l'observation de l'allaitement postnatal. Le Chapitre 10 présente des informations sur les pratiques d'alimentation de l'enfant en cas de diarrhée.

11.1 ÉTAT NUTRITIONNEL DES ENFANTS

L'anthropométrie est couramment utilisée pour mesurer l'état nutritionnel des enfants. Les mesures anthropométriques permettent de rendre compte des indicateurs de croissance des enfants. La distribution de la taille et du poids des enfants de moins de 5 ans est comparée à celle de la population standard de référence de l'OMS (OMS 2006). La distribution d'une population bien nourrie sera similaire à la population de référence, contrairement à celle d'une population mal nourrie. Les indices Taille-pour-âge, Poids-pour-taille et Poids-pour âge sont exprimés en unités d'écart type (scores *z* ou score centré réduit) par rapport à la médiane de la population de référence. Les valeurs supérieures à deux écarts types en dessous de la médiane des normes de croissance de l'enfant de l'OMS servent à définir la malnutrition.

Le retard de croissance, ou une taille trop petite par rapport à l'âge, est une mesure du déficit de croissance. Le retard de croissance est un marqueur de l'environnement de croissance déficient dans lequel les enfants ont été exposés et reflète le bien-être général d'une population (Perumal, Bassani et Roth 2018). Une nutrition qui n'est pas optimale peut contribuer au retard de croissance ; en outre, les infections récurrentes, les maladies chroniques et bien d'autres encore, dont bon nombre sont complexes et inconnues, sont d'autres causes du retard de croissance (OMS 2014a).

L'émaciation, ou un poids trop faible par rapport à la taille, est une mesure de la sous-alimentation aiguë. Elle est le signe d'une alimentation inadaptée au cours de la période précédant immédiatement l'enquête. L'émaciation résulte d'un apport alimentaire insuffisant ou d'un épisode récent de maladie ou d'une infection entraînant une perte de poids.

L'insuffisance pondérale, ou un poids trop faible par rapport à l'âge, est un indice composite poids/taille et taille/âge. Cet indice englobe les enfants qui présentent un retard de croissance, une émaciation ou les deux.

L'excès pondéral, ou poids trop élevé par rapport à la taille, résulte d'un déséquilibre entre l'énergie consommée (trop) et l'énergie dépensée (trop peu).

Retard de croissance (évalué par l'indice Taille-pour-âge)

La taille-pour-âge est une mesure d'un trouble de la croissance. Les enfants dont le *z* score se situe en dessous de moins deux écarts types (−2 ET) de la médiane de la population de référence sont considérés comme trop petits par rapport à leur âge (retard de croissance). Les enfants dont le *z* score se situe en dessous de moins trois écarts types (−3 ET) sont considérés comme atteints de retard de croissance sévère.

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans

Émaciation (évaluée par l'indice poids-pour-taille)

L'indice poids-pour-taille mesure la masse corporelle par rapport à la taille ou à la longueur corporelle et permet de déceler une malnutrition aiguë. Les enfants dont le *z* score se situe en dessous de moins deux écarts types (−2 ET) par rapport à la médiane de la population de référence sont considérés comme maigres (émaciés). Les enfants dont le score *z* pour le poids-pour-taille se situe en dessous de moins trois écarts types (−3 ET) par rapport à la médiane de la population de référence sont considérés comme sévèrement émaciés.

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans

Insuffisance pondérale (évaluée par l'indice poids-pour-âge)

Le poids-pour-âge est un indice composite de la taille-pour-âge et du poids-pour-taille qui tient compte, à la fois, du retard de croissance et de l'émaciation. Les enfants dont le *z* score pour le poids-pour âge se situe en dessous de moins deux écarts types (−2 ET) par rapport à la médiane de la population de référence sont classés comme présentant une insuffisance pondérale. Les enfants dont le score *z* pour le poids-pour-âge se situe en dessous de moins trois écarts types (−3 ET) par rapport à la médiane de la population de référence sont considérés comme souffrant d'une insuffisance pondérale sévère.

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans

Surcharge pondérale (évaluée par l'indice poids-pour-taille)

Les enfants dont le *z* score pour le poids-pour-taille est supérieur à deux écarts types (+2 ET) par rapport à la médiane de la population de référence sont considérés comme présentant une surcharge pondérale.

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans

Les moyennes des *z* scores pour les indices taille-pour-âge (T/A), poids-pour-taille (P/T) et poids-pour-âge (P/A) sont également calculées à titre de statistiques résumées qui représentent l'état nutritionnel des enfants dans une population. Les scores moyens décrivent l'état nutritionnel de l'ensemble de la population d'enfants sans l'utilisation d'un seuil. Un *z* score moyen inférieur à 0 (valeur moyenne négative pour le retard de croissance, l'émaciation ou l'insuffisance pondérale) suggère un décalage vers le bas de l'état nutritionnel de l'ensemble de la population de l'échantillon par rapport à la population de référence. Plus les scores Z moyens s'écartent de 0, plus la prévalence de la malnutrition est élevée.

11.1.1 Mesures de la croissance de l'enfant et malnutrition

Les informations sur la formation pour la prise des mesures anthropométriques, la standardisation et la méthodologie de collecte des données figurent au Chapitre 1 (le Tableau C.7 en Annexe C présente les résultats de la standardisation). L'EDSM 2023–2024 a identifié 15 404 enfants de moins de 5 ans éligibles pour les mesures du poids et de la taille (Tableau C.8 en Annexe C). Pendant la prise de ces mesures, moins de 1 % des enfants étaient trop habillés ou portaient des accessoires permanents lourds qui interféraient avec la mesure de leur poids (Tableau C.10 en Annexe C). Des mesures valides de la taille-pour-âge ont été prises pour 97 % des enfants éligibles, des mesures valides du poids-pour taille ont été relevées pour 98 % des enfants éligibles, et des mesures valides du poids-pour-âge ont été prises pour 98 % des enfants éligibles (Tableau C.8 en Annexe C). Le Tableau C.8, en Annexe C, fournit des informations supplémentaires sur la complétude et la qualité des données anthropométriques pour les enfants.

La collecte des données comprenait la remesure des enfants comme décrit au Chapitre 1. Le calcul des *z* scores finaux est basé sur la première mesure parmi les enfants sélectionnés au hasard pour la remesure, alors que le calcul des *z* scores finaux s'est basé sur la deuxième mesure parmi les enfants signalés pour une remesure. Le taux de complétion de la remesure était de 100 % pour les enfants sélectionnés au hasard

pour la remesure de contrôle et de 100 % parmi les enfants signalés pour une remesure. Le Tableau C.9, en Annexe C, fournit des renseignements supplémentaires sur les données de contrôle de la remesure (OMS 2019).

Au Mali, un enfant sur quatre (25 %) souffre d'un retard de croissance ; 18 % sous la forme modérée et 7 % sous la forme sévère. Quant à la malnutrition aiguë ou émaciation, la prévalence est de 5 % dont 4 % sous la forme modérée et 1 % sous la forme sévère. Environ 15 % des enfants de moins de 5 ans sont atteints d'insuffisance pondérale dont 12 % sous la forme modérée et 3 % sous la forme sévère. La surcharge pondérale, quant à elle, affecte 1 % des enfants de moins de 5 ans (**Tableau 11.1**).

***Graphique 11.1* Indicateurs de mesure de la croissance de l'enfant : tendances**

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans atteints de malnutrition



***Graphique 11.2* Retard de croissance : tendances**

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans classés comme présentant un retard de croissance



Tendances : Globalement, de 1995–1996 à 2023–2024, on enregistre une baisse des pourcentages d'enfants atteints de malnutrition chronique (**Graphiques 11.1** et **11.2**) : après une augmentation sur la période 1995–1996 à 2001 (de 36 % à 42 %), la prévalence du retard de croissance s'est maintenue à un niveau assez élevé et à commencer à diminuer à partir de 2012–2013, passant de 38 % à 25 % en 2023–2024. Sous la forme sévère, la prévalence est passée de 19 % en 1995–1996 à 7 % en 2023–2024. La prévalence de l'émaciation a suivi la même tendance, enregistrant une baisse importante entre 1995–1996 et 2001 (de 27 % à 12 %) suivie d'une baisse plus modérée (15 % en 2006 à 9 % en 2018, suivie d'une chute puisqu'en 2023–2024 le pourcentage d'enfants émaciés est de 5 %). Quant au surpoids, sa prévalence est restée très faible tout au long de la période, bien que l'on note une augmentation entre 2001 et 2006 où la prévalence atteignait 4 %. Depuis, la tendance est à la baisse et le surpoids ne concerne que 1 % des enfants de moins de5 ans au Mali. Globalement**,** ces résultats traduisent une amélioration de l'état nutritionnel des enfants au Mali.

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Les pourcentages de garçons atteints de malnutrition selon les 3 indices sont légèrement plus élevés que ceux des filles : 27 % des garçons accusent un retard de croissance contre 24 % des filles ; l'émaciation touche 6 % des garçons contre 4 % des filles et 17 % des garçons souffrent d'insuffisance pondérale contre 13 % des filles.

- La malnutrition touche davantage les enfants du milieu rural que du milieu urbain : le retard de croissance touche 27 % des enfants du milieu rural contre 17 % en milieu urbain ; l'écart concernant

l'émaciation est plus faible : 6 % en milieu rural contre 4 % en milieu urbain ; l'insuffisance pondérale quant à elle affecte 16 % des enfants du milieu rural contre 10 % en milieu urbain.

- Parmi les enfants dont la grosseur à la naissance a été déclarée comme étant petite, 32 % accusent un retard de croissance, 9 % sont émaciés et 26 % présentent une insuffisance pondérale. En comparaison, parmi les enfants déclarés moyens ou plus gros que la moyenne à la naissance, ces pourcentages étaient plus faibles (respectivement 24 %, 6 % et 15 %).

- La malnutrition affecte davantage les enfants dont la mère n'a aucun niveau d'instruction que les autres : 28 % des enfants dont la mère n'a aucun niveau d'instruction accusent un retard de croissance contre 24 % chez ceux dont la mère a le niveau primaire et 17 % chez ceux dont la mère a le niveau secondaire ou plus ; l'émaciation touche respectivement 6 %, 5 % et 4 % des enfants et la prévalence de l'insuffisance pondérale est respectivement de 17 %, 15 % et 10 %.

- Du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, la prévalence de la malnutrition selon les trois indices anthropométriques, a tendance à diminuer, passant pour le retard de croissance de 31 % à 14 % (**Graphique 11.3**) et pour l'insuffisance pondérale de 18 % à 10 %.

Graphique 11.3 Retard de croissance chez les enfants par quintile de bien-être économique du ménage

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui présentent un retard de croissance



- L'état nutritionnel des enfants varie également selon celui de leur mère. La prévalence du retard de croissance, de l'émaciation et de l'insuffisance pondérale sont nettement plus faibles lorsque la mère est en surpoids/obèse et plus élevées lorsque la mère est maigre.

- C'est dans les régions de Gao, Mopti, Sikasso et de Tombouctou que la malnutrition affecte le plus les enfants de moins de 5 ans. Les prévalences y sont respectivement de 41 %, 34 %`, 31 % et 30 % pour le retard de croissance (**Carte 11.1**). Pour l'émaciation, les prévalences les plus élevées sont respectivement de 12 % à Gao, 11 % à Tombouctou, 6 % à Kayes et Koulikoro. Les prévalences les plus élevées de l'insuffisance pondérale sont enregistrées respectivement à Gao (30 %), Tombouctou (20 %), Mopti (18 %) et Sikasso (16 %). Le retard de croissance sous la forme sévère touche 18 % des enfants à Gao, 13 % à Tombouctou, 10 % à Mopti et Sikasso.

Carte 11.1 **Retard de croissance chez les enfants par région**

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans présentant un retard de croissance



11.2 SURVEILLANCE ET SOUTIEN DE LA CROISSANCE

Les programmes de surveillance, de suivi et de soutien de la croissance comprennent le suivi de l'état nutritionnel des enfants par la mesure des paramètres physiques et l'utilisation de ces informations pour fournir aux personnes qui s'occupent des enfants, des conseils et des références sur les enfants dont la croissance semble anormale (OMS 2013, OMS 2017a). La prise du poids, la mesure de la taille/longueur et/ou du périmètre brachial à mi-hauteur (PBMH) de façon régulière constituent une composante importante du suivi de la croissance de l'enfant.

Poids mesuré au cours des 3 derniers mois

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans dont le poids a été mesuré au cours des 3 derniers mois.

Poids et taille mesurés au cours des 3 derniers mois

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans dont le poids et la taille ont été mesurés au cours des 3 derniers mois.

Périmètre brachial à mi-hauteur (PBMH) mesuré au cours des 3 derniers mois

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans dont le périmètre brachial à mi-hauteur a été mesuré au cours des 3 derniers mois.

Poids, taille et PBMH mesurés au cours des 3 derniers mois

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans dont le poids, la taille et le périmètre brachial à mi-hauteur ont été mesurés au cours des 3 derniers mois.

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans

Dans les 3 mois ayant précédé l'enquête, les proportions d'enfants dont le poids, la taille et le périmètre brachial à mi-hauteur ont été mesurés par un prestataire de santé sont respectivement de 19 %, 19 % et 17 %. Pour 14 % des enfants, on a effectué ces trois mesures (**Tableau 11.2**).

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage d'enfants dont on a mesuré le poids, la taille et le périmètre brachial a tendance à diminuer avec l'âge, passant de 20 % à 6–11 mois à 10 % à 48–59 mois.

- Le suivi de la croissance varie entre les régions. Les plus fortes proportions d'enfants de moins de 5 ans pour lesquels on a effectué ces trois mesures dans les trois mois avant l'enquête, sont enregistrées dans les régions de Gao, Bamako et Mopti avec respectivement 27 %, 19 % et 18 %. En revanche, les plus faibles proportions sont observées dans les régions de Tombouctou (8 %), Sikasso (11 %) et Koulikoro (13 %).

- Les enfants dont la mère n'a aucun niveau d'instruction sont proportionnellement moins nombreux à avoir bénéficié d'un suivi de la croissance que les autres (12 % contre 16 % pour les enfants dont la mère a un niveau d'instruction primaire et 18 % pour ceux dont la mère a le niveau secondaire ou plus).

- Du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, le pourcentage d'enfants dont le poids, la taille et le périmètre brachial à mi-hauteur ont été mesurés augmente, passant de 11 % à 19 %.

11.3 PRATIQUES D'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT

Le suivi des pratiques optimales d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant est essentiel pour garantir la santé et la survie des jeunes enfants. Les pratiques recommandées d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant incluent l'initiation précoce à l'allaitement dans l'heure qui suit la naissance, l'allaitement exclusif dans les 2 jours qui suivent la naissance, l'allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois, la poursuite de l'allaitement pendant 2 ans ou plus et l'introduction à l'âge de 6 mois d'aliments de complément sains et appropriés. Cette section présente des indicateurs d'alimentation pour les enfants de moins de 2 ans (OMS et UNICEF 2021).

11.3.1 Allaitement maternel, initiation précoce de l'allaitement maternel et allaitement maternel exclusif dans les 2 jours suivant la naissance

L'allaitement maternel favorise la croissance et le développement de l'enfant et il est également bénéfique pour la santé de la mère. L'initiation de l'allaitement dans l'heure suivant la naissance est importante pour la mère et l'enfant. Le premier lait maternel contient du colostrum, hautement nutritif et qui contient des anticorps qui protègent le nouveau-né contre les infections. L'initiation précoce à l'allaitement favorise également le lien entre la mère et son nouveau-né, notamment grâce au contact peau contre peau, qui facilite la production de lait maternel. Une alimentation des nouveau-nés autre qu'au lait maternel dans les 2 jours qui suivent la naissance peut retarder l'initiation précoce de l'allaitement, interrompre l'allaitement exclusif et il n'est pas recommandé, sauf indication médicale (OMS et UNICEF 2021).

Enfants déjà allaités

Pourcentage d'enfants nés dans les 2 dernières années qui ont déjà été nourris au sein.

Initiation précoce à l'allaitement maternel

Pourcentage d'enfants nés dans les 2 dernières années qui ont été mis au sein dans l'heure qui a suivi leur naissance.

Allaitement maternel exclusif dans les 2 jours qui suivent la naissance

Pourcentage d'enfants nés dans les 2 dernières années qui sont nourris exclusivement au lait maternel pendant les 2 premiers jours suivant leur naissance.

Échantillon : Enfants nés dans les 2 dernières années

Dans l'ensemble, la grande majorité (96 %) des enfants de moins de 2 ans ont déjà été nourris au sein et cette proportion varie très peu selon les caractéristiques socio démographiques. Dans 46 % des cas, les enfants ont été mis au sein dans l'heure qui a suivi leur naissance et 48 % ont été exclusivement allaités pendant les deux premiers jours après la naissance (**Tableau 11.3**).

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage d'enfants allaités dans l'heure qui suit la naissance est plus élevé quand la mère a reçu le conseil sur l'allaitement pendant les soins prénatals que quand elle ne l'a pas reçu (49 % contre 43 %) ou quand la mère n'a pas suivi des soins prenatals (42 %). Par contre, cette intervention pendant les soins prénatals influence plus faiblement l'allaitement exclusif du nouveau-né pendant les deux premiers jours qui suivent la naissance (49 % contre 46 %).

- Les pourcentages d'enfants ayant commencé à être allaités dans l'heure qui a suivi la naissance ne varient pas notablement avec le lieu de l'accouchement (46 % quand l'accouchement a eu lieu dans un établissement contre 43 % quand il a eu lieu à la maison). Par contre, le pourcentage d'enfants exclusivement allaités dans les deux premiers jours est plus élevé quand l'accouchement a eu lieu à la maison (55 %) que dans un établissement de santé (47 %).

- Les pourcentages d'enfants allaités varient de manière importante entre les régions : très faibles dans la région de Mopti où seulement 32 % des enfants ont été allaités dans l'heure qui a suivi la naissance et dans la région de Koulikoro où 47 % des enfants ont été allaités exclusivement pendant les 2 jours suivants la naissance, ces pourcentages atteignent respectivement 77 % dans la région de Tombouctou et 60 % dans la région de Gao.

- Le pourcentage d'enfants exclusivement allaités durant les 2 jours qui suivent la naissance est plus faible en milieu urbain (34 %) qu'en milieu rural (52 %) surtout à Bamako où cette proportion n'est que de 27 %.

11.3.2 Allaitement exclusif et alimentation mixte lactée

Au cours des 6 premiers mois, les enfants doivent être exclusivement nourris au sein, c'est-à-dire ne recevoir rien d'autre que le lait maternel. L'allaitement exclusif pendant 6 mois réduit le risque d'infections pouvant entraîner des diarrhées et des maladies respiratoires et apporte tous les nutriments et liquides nécessaires à l'enfant pour lui garantir une croissance optimale et un bon développement. L'alimentation mixte lactée, où les enfants sont nourris à la fois avec le lait maternel et du lait maternisé ou du lait d'origine animale au cours des 6 premiers mois, a pour effet indésirable de réduire la production de lait maternel, car celle-ci est modulée par la fréquence et l'intensité de l'allaitement au sein. L'alimentation mixte lactée avant l'âge de 6 mois peut également augmenter le risque de diarrhée chez les enfants, altérer leur microflore intestinale et aboutir à l'arrêt précoce de l'allaitement (OMS et UNICEF 2021).

Allaitement exclusif des enfants de moins de 6 mois

Pourcentage d'enfants de 0–5 mois qui ont été nourris exclusivement au lait maternel au cours de la journée précédente.

Échantillon : Plus jeunes enfants de 0–5 mois vivant avec leur mère

Alimentation mixte lactée des enfants de moins de 6 mois

Pourcentage d'enfants de 0–5 mois nourris, à la fois, avec le lait maternel et du lait maternisé et/ou du lait d'origine animale au cours de la journée précédente.

Échantillon : Plus jeunes enfants de 0–5 mois vivant avec leur mère

Le **Graphique 11.4** présente les pratiques d'alimentation des enfants de 0–5 mois. L'allaitement exclusif diminue avec l'âge de l'enfant, tandis que l'introduction d'eau plate et d'autres aliments ou liquides augmente progressivement. À 0–1 mois, 62 % des enfants sont exclusivement nourris au sein conformément aux recommandations de l'OMS contre 38 % des enfants qui ne sont pas nourris selon ces recommandations. En effet, 22 % sont allaités mais reçoivent aussi de l'eau, 3 % sont allaités mais reçoivent des liquides non lactés ; 7 % reçoivent, en plus de l'allaitement, un lait maternisé et/ou du lait d'animal, 2 % sont déjà nourris avec des aliments de complément et 2 % ne sont pas allaités (**Tableaux 11.4** et **11.5**). À 2–3 mois, on observe une baisse importante du pourcentage d'enfants nourris exclusivement au sein (39 % par rapport à 62 % à 0–1 mois). Par rapport aux plus jeunes enfants, ceux âgés de 2–3 mois sont proportionnellement plus nombreux à recevoir de l'eau (37 % contre 22 %) en plus d'être allaités. À l'âge de 4 à 5 mois, le pourcentage d'enfants nourris exclusivement au sein n'est plus que de 20 % et la majorité des enfants reçoivent des liquides ou des aliments autres que le lait maternel. Ceux qui reçoivent de l'eau plate en plus du lait maternel représentent le pourcentage le plus élevé avec 58 %.

***Graphique 11.4* Pratiques d'alimentation des enfants, par âge**

Répartition (en %) des enfants derniers-nés de 0–5 mois



Tendances : La pratique de l'allaitement maternel exclusif est en nette progression au Mali. Entre 2001 et 2023–2024, la tendance générale montre une amélioration dans les pratiques d'allaitement exclusif de 2001 à 2006 (25 % en 2001 à 38 % en 2006), suivie d'une baisse en 2012–2013 (32 %), et d'une hausse en 2018 (40 %), qui se stabilise ensuite. Cette stabilité suggère que les efforts pour promouvoir l'allaitement exclusif ont réussi à maintenir un niveau relativement élevé, mais sans nouvelle amélioration significative.

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- La pratique de l'allaitement maternel exclusif dans les six premiers mois est plus répandue en milieu rural où 45 % des enfants de 0–5 mois sont exclusivement allaités au sein contre 23 % en milieu urbain ; à Bamako, ce pourcentage n'est que de 15 % (**Tableau 11.4**).
- La pratique de l'allaitement exclusif dans les six premiers mois, a tendance à diminuer avec le niveau d'instruction de la mère passant de 44 % chez les enfants dont la mère n'a aucun niveau d'instruction à 40 % quand elle a le niveau primaire et à 32 % parmi ceux dont la mère a le niveau secondaire ou plus.
- Le pourcentage d'enfants de 0–5 mois exclusivement allaités a est le plus élevé dans le quintile de bien-être économique le plus bas (54 %) et le plus bas dans le quintile de bien-être économique le plus élevé (21 %).
- La pratique de l'allaitement maternel durant les six premiers mois est suivie de manière inégale dans les régions : si, dans la région de Ségou, 52 % des enfants de 0–5 mois sont exclusivement allaités, ce pourcentage est seulement de 37 % dans la région de Kayes.

11.3.3 Poursuite de l'allaitement maternel et utilisation du biberon

L'allaitement maternel doit se poursuivre pendant les deux premières années ou au-delà, car le lait maternel réduit le risque de maladie chez l'enfant et favorise sa guérison en cas de maladie ; en outre, il continue d'être une source importante de nutriments pour garantir une croissance saine et un bon développement. Une durée d'allaitement plus longue présente de nombreux avantages pour la santé de la femme, notamment la réduction des risques de certains cancers du sein et des ovaires, et de diabète. L'utilisation du biberon pour nourrir l'enfant n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 2 ans. La tétine d'un biberon est susceptible d'être contaminée et augmente les risques de maladie chez les enfants nourris au biberon (OMS et UNICEF 2021).

Poursuite de l'allaitement maternel des enfants de 12–23 mois

Pourcentage d'enfants âgés de 12–23 mois qui ont été nourris au lait maternel le jour précédent

Échantillon : Enfants de 12–23 mois

Nourri au biberon

Pourcentage d'enfants de 0–23 mois qui ont été nourris au biberon le jour précédent.

Échantillon : Enfants de 0–23 mois

Les résultats du **Tableau 11.4** indiquent que parmi les enfants âgés de 12–23 mois, 76 % étaient encore allaités et, parmi ceux de 0–23 mois, 10 % étaient nourris au biberon.

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Parmi les enfants de 12–23 mois, le pourcentage d'enfants encore allaités diminue de manière importante avec l'âge : très élevé à 12–15 mois et 16–19 mois (respectivement 92 % et 84 %), il chute à 49 % à 20–23 mois.
- La pratique de l'allaitement jusqu'à l'âge de 12–23 mois est presque la même dans le milieu rural que dans le milieu urbain (76 % contre 73 %). Par contre, l'utilisation du biberon pour nourrir l'enfant est plus fréquente en milieu urbain (19 %) qu'en milieu rural (8 %). C'est à Bamako que le pourcentage d'enfants de 0–23 mois nourris au biberon est le plus élevé (23 %).
- Bien que les pourcentages restent élevés, la pratique de l'allaitement continu jusqu'à l'âge de 12–23 mois a tendance à diminuer avec le niveau d'instruction de la mère, passant de 78 % parmi les enfants dont la mère n'a aucun niveau d'instruction à 70 % parmi ceux dont la mère a le niveau secondaire ou plus. En revanche, le pourcentage d'enfants de 0–23 mois nourris au biberon est environ trois fois plus élevé quand la mère a le niveau d'instruction secondaire ou plus que quand elle n'a aucun niveau d'instruction (20 % contre 7 %).
- La poursuite de l'allaitement à 12–23 mois est plus répandue dans les régions de Sikasso, Tombouctou, Koulikoro et de Ségou (respectivement 81 %, 80 %, 76 % et 76 %). Dans celles de Kayes, Mopti et de Gao en revanche, cette pratique est moins fréquente (respectivement 73 %, 74 % et 70 %). Les régions de Tombouctou et Gao sont celles où le pourcentage d'enfants de 0–23 mois nourris au biberon est le plus élevé (16 % et 15 %). Par contre, les pourcentages les plus faibles (inférieur à 10 %) sont enregistrés dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti.
- Du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, le pourcentage d'enfants de 12–23 mois toujours nourris au lait maternel diminue, passant de 79 % à 69 %. En revanche, le pourcentage d'enfants de 0–23 mois nourris au biberon augmente, passant de 4 % à 25 %.

11.3.4 Introduction d'aliments de complément

Après les 6 premiers mois, le lait maternel seul ne suffit plus pour subvenir à tous les besoins nutritionnels du jeune enfant Après 6 mois, il convient d'introduire des aliments de complément adaptés tout en poursuivant l'allaitement jusqu'à l'âge de 2 ans ou plus. La transition entre l'allaitement maternel exclusif et l'introduction d'aliments de complément est le moment où les enfants sont les plus susceptibles de souffrir de sous-alimentation. Pendant cette période, il est important que les enfants reçoivent des aliments solides, semi-solides ou mous (OMS 2003, OMS et UNICEF 2021).

Introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous chez les enfants de 6–8 mois

Pourcentage d'enfants de 6–8 mois qui ont reçu des aliments solides, semi-solides ou mous le jour précédent.

Échantillon : Plus jeunes enfants de 6–8 mois vivant avec leur mère

Selon les résultats de l'EDSM 2023–2024, 38 % des enfants de 6–8 mois ont commencé à recevoir des aliments solides, semi-solides ou mous (**Tableau 11.10**).

11.3.5 Diversité alimentaire minimale, fréquence minimale des repas, fréquence minimale de l'alimentation lactée mixte, minimum alimentaire acceptable et consommation d'œufs et/ou produits carnés

Les nourrissons et les jeunes enfants doivent recevoir un apport alimentaire minimum acceptable, ce qui signifie qu'ils doivent recevoir des repas à une fréquence appropriée et comprenant une diversité d'aliments pour garantir leurs besoins en énergie et en nutriments. L'indicateur alimentation minimum acceptable est une combinaison de la diversité alimentaire minimale et de la fréquence minimale des repas pour les enfants nourris au sein ; pour les enfants qui ne sont pas nourris au sein, l'indicateur est basé sur la même combinaison plus la fréquence alimentaire lactée minimale.

La diversité alimentaire minimale est un indicateur indirect de la densité adéquate des aliments en micronutriments. En consommant des aliments appartenant à, au moins, cinq groupes alimentaires sur huit, l'enfant a davantage de chances de consommer au moins un aliment carné et au moins un fruit ou un légume, en plus d'un aliment de base comme des céréales, des tubéreuses ou des tubercules. Les cinq groupes alimentaires proviennent d'une liste de huit groupes alimentaires : lait maternel ; céréales, tubéreuses et tubercules ; légumineuses et noix ; produits laitiers (yaourt laitier, fromage) ; produit carné (viande, poisson, volaille et abats) ; œufs ; fruits et légumes riches en vitamine A ; et autres fruits et légumes.

La fréquence minimale des repas est un indicateur indirect de la consommation énergétique de l'enfant. On considère que les enfants de 6–8 mois allaités reçoivent le nombre minimum de repas s'ils consomment des aliments solides, semi-solides ou mous au moins deux fois par jour. On considère que les enfants de 9–23 mois allaités reçoivent le nombre minimum de repas s'ils consomment des aliments solides, semi-solides ou mous au moins 3 fois par jour. On considère que les enfants de 6–23 mois non allaités reçoivent le nombre minimum de repas s'ils consomment des aliments solides, semi-solides, mous ou des aliments lactés au moins 4 fois par jour et si au moins un des repas est constitué d'un aliment solide, semi-solide ou mou.

La fréquence minimale des repas lactés est un indicateur indirect de la satisfaction des besoins nutritionnels de l'enfant non allaité. Le lait et les produits laitiers sont des sources importantes de nutriments. On considère que les enfants de 6–23 mois sont nourris selon la fréquence minimale des repas lactés s'ils reçoivent au moins deux repas comprenant du lait et/ou des produits laitiers.

La consommation d'œufs et/ou de produits carnés par les enfants de 6–23 mois, allaités au sein ou pas, augmente l'apport énergétique, protéiné et en nutriments pour les enfants. Les œufs, la viande, le poisson, la volaille et les abats sont des sources importantes de nutriments qui favorisent une croissance saine des enfants (OMS et UNICEF 2021).

Diversité alimentaire minimale des enfants de 6–23 mois

Pourcentage d'enfants de 6–23 mois qui ont consommé un minimum de 5 des 8 groupes alimentaires le jour précédent. Les 8 groupes alimentaires sont les suivants : lait maternel ; céréales, tubéreuses et tubercules ; légumineuses et noix ; produits laitiers (yaourt laitier, fromage) ; produits carnés (viande, poisson, volaille et abats) ; œufs ; fruits et légumes riches en vitamine A ; et autres fruits et légumes.

Fréquence minimale des repas des enfants de 6–23 mois

Pourcentage d'enfants de 6–23 mois qui ont consommé des aliments solides, semi-solides ou mous (y compris les aliments lactés pour les enfants non allaités au sein) conformément au nombre minimum de fois recommandé ou davantage le jour précédent.

Fréquence minimale des repas lactés des enfants de 6–23 mois

Pourcentage d'enfants de 6–23 mois qui ne sont pas allaités et qui ont reçu au moins deux repas lactés le jour précédent.

Minimum alimentaire acceptable des enfants de 6–23 mois

Pourcentage d'enfants de 6–23 mois qui ont reçu un apport alimentaire minimum acceptable le jour précédent. Cet indicateur est un indicateur composite qui prend en compte les enfants nourris selon la fréquence minimale recommandée et la diversité alimentaire recommandée, avec une condition supplémentaire selon laquelle les enfants non allaités au sein auront bénéficié de la fréquence minimale d'alimentation lactée.

Échantillon : Plus jeunes enfants de 6–23 mois vivant avec leur mère

Consommation d'aliments à base d'œufs et/ou de produits carnés des enfants de 6–23 mois

Pourcentage d'enfants de 6–23 mois qui ont consommé des aliments à base d'œufs et/ou carnés le jour précédent.

Échantillon : Plus jeunes enfants de 6–23 mois vivant avec leur mère

Les résultats présentés au **Tableau 11.8** et au **Graphique 11.5** montrent que globalement, 17 % de tous les derniers-nés de 6–23 mois vivant avec leur mère ont reçu une alimentation diversifiée minimale et 34 % ont été nourris selon la fréquence minimale des repas. Seulement 9 % des enfants ont reçu l'apport alimentaire minimum acceptable. Le pourcentage d'enfants allaités ayant reçu l'apport alimentaire minimum acceptable est plus élevé que celui des enfants non allaités (10 % contre 6 %).

Graphique 11.5 **Indicateurs PANJE sur l'apport alimentaire minimal acceptable selon que l'enfant est allaité ou non**



Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage d'enfants ayant reçu l'apport alimentaire minimum acceptable augmente globalement avec l'âge de l'enfant, passant de 2 % chez les 6–8 mois à 13 % chez les 12–17 mois et à 11 % chez les 18–23 mois.
- Le pourcentage d'enfants ayant reçu l'apport alimentaire minimum acceptable varie peu entre les milieux urbain et rural (respectivement 10 % et 9 %).
- Le pourcentage d'enfants ayant reçu l'apport alimentaire minimum acceptable varie entre les régions : très faible dans les régions de Tombouctou (1%), Gao (2%), Kayes (6%), Sikasso (8%), ce pourcentage atteint 15 % dans la région de Mopti et 10% dans les régions de Koulikoro et Ségou et à Bamako.
- Du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, le pourcentage d'enfants ayant reçu l'apport alimentaire minimum acceptable augmente, passant de 9 % à 11 %.

11.3.6 Consommation de boissons sucrées, consommation d'aliments malsains et aucune consommation de légumes ou de fruits chez les enfants

Les pratiques d'alimentation malsaines pour les nourrissons et jeunes enfants doivent être évitées car elles peuvent remplacer des aliments nutritifs qui fournissent des nutriments importants pour les enfants et favoriser une prise de poids non saine. Pour les nourrissons et les jeunes enfants, la consommation d'aliments et de boissons sucrés augmente le risque de caries dentaires et d'obésité pendant l'enfance. En outre, une alimentation trop salée augmente le risque de maladies non transmissibles, et les graisses malsaines et les glucides raffinés contribuent à une prise de poids malsaine. Les régimes comportant une faible consommation de légumes et de fruits constituent un apport réduit en nutriments, ce qui peut avoir un impact négatif sur la croissance et le bon développement des jeunes enfants. Une faible consommation de légumes et de fruits est également associée à la survenue plus tard dans la vie de maladies non transmissibles. La définition de l'indicateur ci-dessous pour la consommation d'aliments malsains, décrit les « aliments malsains sentinelles » qui sont des aliments riches en sucre, en sel et/ou en graisses malsaines et sont couramment consommés par les nourrissons et les jeunes enfants (OMS et UNICEF 2021).

Consommation de boissons sucrées chez les enfants de 6–23 mois

Pourcentage d'enfants de 6–23 mois ayant consommé une boisson sucrée le jour précédent

Consommation d'aliments malsains chez les enfants de 6–23 mois

Pourcentage d'enfants âgés de 6 à 23 mois ayant consommé des aliments malsains sentinelles le jour précédent.

Aucune consommation de légumes ou de fruits chez les enfants de 6–23 mois

Pourcentage d'enfants de 6–23 mois qui n'ont pas consommé de légumes ou de fruits le jour précédent.

Échantillon : Plus jeunes enfants de 6–23 mois vivant avec leur mère

Le **Tableau 11.9** présente les pourcentages d'enfants les plus jeunes de 6–23 mois qui ont consommé, la nuit ou le jour précédant l'interview, des œufs et/ou des produits d'origine animale ainsi que le pourcentage de ceux dont les pratiques alimentaires sont malsaines parce qu'ils ont consommé, soit des boissons sucrées, soit des aliments malsains ou parce que leur régime alimentaire ne comportait pas de légumes ou de fruits. Un peu plus d'un tiers des enfants de 6–23 mois avaient consommé des œufs et/ou des produits carnés le jour avant l'interview (35 %) ; Trente-six pour cent avaient consommé des boissons sucrées, 29 % des nourritures malsaines et 58 % n'avaient consommé aucun légume ou fruit Les pratiques alimentaires varient selon que l'enfant est allaité ou non : la consommation de boissons sucrées et

d'aliments malsains est plus fréquente parmi ceux qui ne sont pas allaités que parmi les autres (respectivement 49 % contre 33 % et 41 % contre 27 %). Par contre, plus de la moitié des enfants allaités (60 %) n'avaient pas consommé de légumes ou de fruits contre 44 % parmi ceux qui ne sont pas allaités.

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Les résultats montrent une augmentation avec l'âge de la consommation d'œufs et/ou de produits carnés (de 11 % à 6–8 mois à 47 % à 18–23 mois) mais aussi des mauvaises pratiques alimentaires comme, la consommation de boissons sucrées (de respectivement 13 % à 48 %) et d'aliments malsains (de respectivement 9 % à 40 %). En revanche, la consommation de légumes et de fruits augmente globalement avec l'âge à partir de 6 mois puisque 86 % des enfants de 6–8 mois n'avaient pas mangé de fruits et de légumes contre 43 % des enfants de 18–23 mois.

- Les pratiques alimentaires des enfants varient selon le milieu de résidence. En effet, les pourcentages d'enfants ayant consommé des boissons sucrées et des aliments malsains sont plus élevés en milieu urbain qu'en milieu rural (respectivement 44 % contre 33 % pour les boissons sucrées et 35 % contre 27 % pour les aliments malsains). C'est à Bamako que la consommation de boissons sucrées est la plus fréquente (49 % contre 38 % dans les autres villes et 33 % en milieu rural). Par contre, la consommation de fruits et légumes ne présente pas de variations importantes entre les milieux de résidence ; c'est néanmoins à Bamako que le pourcentage d'enfants n'ayant consommé aucun fruit ou légume le jour avant l'interview est le plus faible (55 %) (**Graphique 11.6**). Par contre, la consommation d'œufs et/ou de produits d'origine animale est plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural (38 % contre 34 %).

Graphique 11.6 **Pratiques alimentaires malsaines parmi les enfants de 6–23 mois par résidence**



- Le pourcentage d'enfants ayant consommé des œufs et/ou des produits d'origine animale augmente avec le niveau d'instruction de la mère, passant de 32 % parmi ceux dont la mère n'a aucun niveau d'instruction à 42 % parmi ceux dont elle a le niveau secondaire ou plus. Parallèlement, les pourcentages d'enfants ayant des pratiques alimentaires néfastes pour la santé augmente aussi, passant pour la consommation de boissons sucrées de 33 % à 42 % et, pour celle d'aliments malsains de 25 % à 36 %.

- Du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, on note une augmentation des pourcentages d'enfants dont les pratiques alimentaires ne sont pas appropriées : en effet, le pourcentage de ceux qui ont consommé des boissons sucrées passe de 29 % à 47 % ; le pourcentage d'enfants ayant consommé des aliments malsains passe de 25 % à 41 %, cependant le pourcentage de ceux qui n'ont consommé aucun légume ou fruit est presque le même (54 % à 56 %). Par contre, le pourcentage d'enfants ayant consommé des aliments d'origine animale et/ou des œufs augmente, passant de 29 % dans le quintile le plus bas à 42 % dans le quintile le plus élevé. Le manque de moyens financiers dans les sous-populations les plus pauvres expliquent, en partie, que l'accès aux boissons sucrées et autres nourritures malsaines soit plus difficile.

11.3.7 Indicateurs (ANJE) de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant

Le **Tableau 11.10** récapitule les 17 indicateurs d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants établis par l'OMS-UNICEF.

11.4 CONSEIL SUR L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT (ANJE)

Le conseil sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant contribue à encourager des pratiques d'allaitement et d'alimentation complémentaire adaptées (OMS 2018, OMS 2003). Le conseil est un processus interactif qui contribue à donner aux mères et aux soignants les moyens de suivre les pratiques recommandées en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Le conseil peut se transmettre dans les établissements de santé et dans la communauté, et il est dispensé par des prestataires de santé formés à cet effet, des agents de santé communautaires et d'autres personnes de la communauté.

Mères ayant reçu le conseil sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant au cours des 6 derniers mois

Pourcentage de mères avec des enfants de 6–23 mois qui ont reçu le conseil ANJE au cours des 6 derniers mois dispensé par un prestataire de santé ou un agent de santé communautaire.

Échantillon : Femmes dont l'enfant le plus jeune enfant de 6–23 mois vit avec elles

Le **Tableau 11.11** indique que, 12 % des femmes de 15–49 ans dont l'enfant le plus jeune de 6–23 mois vit avec elles, ont reçu le conseil sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant au cours des 6 derniers mois, conseil dispensé par un prestataire de santé ou un agent de santé communautaire.

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage de femmes ayant reçu le conseil ANJE varie de 18 % à Bamako à 4 % à Tombouctou.
- Le pourcentage de femmes ayant reçu le conseil varie légèrement selon le niveau d'instruction des mères : 10 % parmi les femmes n'ayant aucun niveau d'instruction à 12 % parmi celles ayant le niveau primaire à 16 % parmi celles ayant le niveau secondaire ou plus.

11.5 PRÉVALENCE DE L'ANÉMIE CHEZ LES ENFANTS

L'anémie est un trouble caractérisé par un faible niveau d'hémoglobine dans le sang (Chaparro et Suchdev 2019). L'hémoglobine est une protéine responsable du transport de l'oxygène dans le sang. Chez les enfants, l'anémie peut entraver le développement cognitif et elle est associée à des conséquences à long terme pour la santé. Lorsque l'anémie est grave, elle peut entraîner la mort (Chaparro et Suchdev 2019).

Anémie chez les enfants

Anémie	Taux d'hémoglobine en grammes/décilitre*	
	Enfants de 6–23 mois	Enfants de 24–59 mois
Anémique	<10,5	<11,0
Anémie légère	9,5–10,4	10,0–10,9
Anémie modérée	7,0–9,4	7,0–9,9
Anémie grave	<7,0	<7,0
Non anémique	≥10,5	≥11,0

* Les taux d'hémoglobine sont ajustés en fonction de l'altitude selon OMS 2024.

Échantillon : *Enfants de 6–59 mois*

En 2024, l'OMS a publié de nouvelles directives sur les seuils d'hémoglobine pour définir l'anémie chez les enfants et les femmes (OMS 2024). En outre, les directives ont mis à jour la méthodologie permettant d'ajuster les taux d'hémoglobine en fonction de l'altitude et du tabagisme. Les nouvelles directives recommandent également d'utiliser du sang veineux pour mesurer les taux d'hémoglobine. En effet, des données récentes montrent que le type de source de sang (sang veineux ou sang capillaire) peut entraîner des taux d'hémoglobine différents et, par conséquent, influencer les estimations de l'anémie (Hackl et al. 2024 ; Namaste et al. 2024 ; Neufeld et al. 2019 ; Stevens et al. 2022). Les taux d'hémoglobine (et les estimations de l'anémie) basés sur différents types de sources de sang ne doivent pas être comparés.

Les résultats pour les enfants présentés dans ce rapport utilisent les nouveaux seuils pour définir l'anémie et ont été ajustés en fonction de l'altitude conformément aux dernières recommandations de l'OMS[1]. Cependant, au moment de la collecte des données de l'enquête, une goutte de sang capillaire avait été utilisée pour mesurer l'hémoglobine, conformément aux directives précédentes (OMS 2011a) (voir Chapitre 1). Il convient donc d'être prudent lors de l'interprétation des estimations de l'anémie dans cette enquête et dans toutes les autres qui ont utilisé une goutte de sang capillaire. Il n'est pas conseillé d'examiner les tendances des estimations de la prévalence de l'anémie obtenues à l'aide de différentes méthodes d'analyse du sang, de facteurs d'ajustement ou de seuils d'hémoglobine.

Les résultats de l'EDSM 2023–2024 indiquent que la prévalence de l'anémie parmi les enfants de 6–59 mois, selon les nouvelles directives de l'OMS de 2024, est élevée. En effet, 74 % des enfants souffrent d'anémie dont 44 % souffrent d'anémie modérée et 2 % d'anémie sévère (**Tableau 11.12**).

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage d'enfants de 6–59 mois anémiés varie selon le milieu de résidence, de 68 % en milieu urbain à 75 % en milieu rural.
- Dans les régions de Kayes (79 %), Koulikoro (76 %), Ségou (75 %), Sikasso (74 %) et Mopti (71 %), plus de sept enfants sur dix sont anémiés. Les proportions les plus faibles d'enfants anémiés sont enregistrées dans les régions de Gao (66 %), Tombouctou (67 %) et Bamako (68 %).
- La prévalence de l'anémie chez les enfants de 6–59 mois diminue avec le niveau d'instruction de la mère, passant de 76 % parmi ceux dont la mère n'a aucun niveau d'instruction à 67 % parmi ceux dont la mère a le niveau secondaire ou plus.
- La prévalence de l'anémie a tendance à diminuer avec l'amélioration du niveau de bien-être économique, passant de 76 %-78 % dans les trois premiers quintiles de bien-être économique à 66 % dans le quintile le plus élevé.

11.6 SUPPLÉMENTATION EN MICRONUTRIMENTS ET VERMIFUGATION DES ENFANTS

Les carences en micronutriments contribuent à la morbidité et à la mortalité infantiles. La carence en micronutriments peut provenir d'un manque de consommation d'aliments qui fournissent des vitamines et des minéraux, ou d'infections ou d'anomalies génétiques. Les stratégies pour prévenir ou enrayer les carences en micronutriments comprennent des interventions agricoles telles que la bio fortification, l'enrichissement des produits alimentaires, et s'il s'agit de stades vitaux et de groupes démographiques spécifiques, d'une supplémentation directe en micronutriments (USAID 2019).

[1] Les estimations de l'anémie basées sur les directives de l'OMS de 2024 devraient se traduire par des estimations plus faibles de l'anémie pour les enfants âgés de 6 à 23 mois par rapport aux estimations dérivées des directives de 2011. Pour les enfants de 24 à 59 mois, les estimations de l'anémie devraient être plus élevées par rapport aux directives de l'OMS de 2011. Pour référence, le **Tableau C.17.1** en Annexe C comprend les estimations de l'anémie basées sur les directives de l'OMS de 2011.

Le fer est un micronutriment qui remplit un rôle important dans de nombreux systèmes biologiques. La carence en fer est l'une des principales causes d'anémie. Les interventions visant la carence en fer et l'anémie consistent à donner périodiquement aux enfants des comprimés ou des sirops de fer et/ou des poudres de micronutriments contenant du fer (OMS 2011a, OMS 2016a, OMS 2016b).

La vitamine A est un micronutriment qui soutient le système immunitaire et joue un rôle important dans l'entretien du tissu épithélial de l'organisme. Une carence grave en vitamine A peut provoquer des lésions oculaires, augmenter la gravité des infections, comme celles de la rougeole, et ralentir la guérison à la suite d'une maladie. Les programmes de supplémentation en vitamine A contribuent à réduire la carence en vitamine A et la mortalité chez les enfants (OMS 2011b).

Les infections helminthiques transmises par le sol peuvent provoquer des hémorragies internes, des inflammations, des troubles de l'absorption des nutriments, des diarrhées, des vomissements et une diminution de l'appétit. Les programmes de vermifugation contribuent à réduire la charge des infections helminthiques (OMS 2017b).

Administration de fer sous forme de comprimés ou de sirops pour les enfants de 6–59 mois

Pourcentage d'enfants à qui on a donné du fer sous forme de comprimés ou de sirop au cours des 12 derniers mois.

Administration de poudres de multi-micronutriments pour les enfants de 6–59 mois

Pourcentage d'enfants ayant reçu des multi-micronutriments en poudre au cours des 12 derniers mois].

Administration de suppléments contenant du fer pour les enfants de 6–59 mois

Pourcentage d'enfants ayant reçu des suppléments contenant du fer au cours des 12 derniers mois, y compris des comprimés, du sirop ou des micronutriments en poudre.

Échantillon : Enfants de 6–59 mois

Administration de suppléments de vitamine A pour les enfants de 6–59 mois

Pourcentage d'enfants ayant reçu des suppléments de vitamine A au cours des 6 derniers mois

Échantillon : Enfants de 6–59 mois

Administration de vermifuges pour les enfants de 12–59 mois

Pourcentage d'enfants ayant reçu des vermifuges au cours des 6 derniers mois.

Échantillon : Enfants de 12–59 mois

Les résultats des interventions visant à lutter contre la carence en fer et l'anémie sont présentés dans le **Tableau 11.13**. Parmi les enfants de 6–59 mois, 17 % ont reçu, au cours des 12 derniers mois, du fer sous forme de sirop ou de comprimés, 23 % ont reçu des suppléments contenant du fer et 12 % des micronutriments multiples en poudre. En outre, dans les six derniers mois, 61 % ont reçu des suppléments de vitamine A. Parmi les enfants de 12–59 mois, 48 % avaient reçu dans les six derniers mois des médicaments pour le déparasitage.

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Les résultats par région montrent que c'est dans la région de Gao que les enfants ont le moins bénéficié des différentes interventions à l'exception de la supplémentation en vitamine A et du

déparasitage. Dans cette région, seulement 12 % des enfants de 6–59 mois ont reçu des suppléments contenant du fer dans les 12 derniers mois contre 32 % dans la région de Kayes. En outre, 36 % ont reçu un déparasitage contre 60 % à Kayes.

- Les pourcentages d'enfants ayant reçu les divers suppléments en micronutriments augmentent avec le niveau d'instruction de la mère, sauf pour les compléments de fer sous forme de comprimés ou de sirop. Pour les suppléments contenant du fer, le pourcentage est de 22 % chez les enfants dont la mère n'a aucun niveau d'instruction et 23 % pour ceux dont la mère a le niveau primaire ou secondaire ou plus. Pour la vitamine A, ils passent respectivement de 59 % à 66 %. Le pourcentage d'enfants ayant reçu des micronutriments multiples est respectivement de 11 % à 14 % et celui des enfants traités avec des médicaments contre les vers intestinaux qui passe respectivement de 46 % à 52 %.

11.7 ÉTAT NUTRITIONNEL DES ADULTES

La carence énergétique chronique est due à une alimentation insuffisante ou à un régime alimentaire déséquilibré pauvre en nutriments adéquats. Les femmes en âge de procréer (15 à 49 ans) sont particulièrement vulnérables à la carence énergétique chronique et à la malnutrition en raison d'un faible apport alimentaire, d'une répartition inéquitable de la nourriture au sein du foyer, d'une conservation et d'une préparation inappropriées des aliments, de tabous alimentaires, de maladies infectieuses et de pratiques de soins inadaptées. La carence énergétique chronique mène à une faible productivité chez les adultes et une morbidité et une mortalité accrues (OMS 1995). En outre, la sous-alimentation chez les femmes est un facteur de risque majeur d'effets indésirables lors de l'accouchement. Le surpoids et l'obésité ont également des conséquences néfastes sur la santé. Le surpoids et l'obésité sont des facteurs de risque importants de plusieurs maladies chroniques, notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer.

L'indice de masse corporelle (IMC) est le rapport entre le poids et la taille élevée au carré pour mesurer l'état nutritionnel des adultes de 20–49 ans. Les valeurs d'IMC ne dépendent ni de l'âge, ni du sexe. On admet généralement qu'une taille de <145 centimètres est une petite taille.

L'IMC/âge est le rapport entre le poids et la taille pour différents groupes d'âge. Il est utilisé chez les enfants et les adolescents de 15–19 ans pour mesurer l'état nutritionnel (OMS 2007). L'IMC/âge est spécifique au sexe et à l'âge. Cela s'explique par le fait que les adolescents sont encore en pleine croissance et que le pic de croissance n'est pas le même pour les garçons et les filles. Dans l'EDS, l'IMC/âge est indiqué pour les adolescents de 15–19 ans. De même, la petite taille chez les adolescentes (15–19 ans) est évaluée par une taille trop petite par rapport à l'âge.

Indice de masse corporelle (IMC)

L'IMC est calculé en divisant le poids en kilogrammes par la taille en mètres, au carré (kg/m^2).

Statut adulte	IMC
Trop maigre pour leur taille	Moins de 18,5
Normal	Entre 18,5 et 24,9
Surcharge pondérale	Entre 25,0 et 29,9
Obèse	Supérieur ou égal à 30,0

Échantillon : Femmes âgées de 20 à 49 ans qui ne sont pas enceintes et qui n'ont pas donné naissance dans les 2 mois précédant l'enquête, et hommes âgés de 20 à 49 ans

IMC/âge

L'IMC/âge est mesuré en écart type (ET) du score *z*.

Statut adolescent	IMC/âge
Trop minces pour leur taille	Moins de -1 ET
Normal	Entre -1 ET et +1 ET
Surcharge pondérale	Entre +1 ET et +2 ET
Obèse	Supérieur à +2 ET

Échantillon : Femmes âgées de 15–19 ans qui ne sont pas enceintes et qui n'ont pas donné naissance dans les 2 mois précédant l'enquête, et hommes de 15–19 ans

Petite taille

Pourcentage de femmes de 20–49 ans dont la taille est inférieure à 145 cm.

Échantillon : Femmes de 20–49 ans

Pourcentage de femmes de 15–19 ans ayant un *z* score pour la taille-pour âge inférieur à -2SD.

Échantillon : Femmes de 15–19 ans

11.7.1 État nutritionnel des femmes

Les données sur la taille et le poids ont été recueillies pour 98 % des femmes éligibles de 15–49 ans (Tableau C.6 en Annexe C). Pendant la prise des mesures, 3 % des femmes ne portaient pas de vêtements légers ou portaient des parures permanentes lourdes qui interféraient avec la mesure de leur poids (Tableau C.11 en Annexe C).

Chez les femmes de 20–49 ans, les données sur la taille et le poids ont servi à calculer deux mesures de l'état nutritionnel, la taille et l'IMC. Les résultats de l'état nutritionnel des femmes, présentés dans le **Tableau 11.14.1** montrent que moins d'1 % des femmes ont une taille inférieure à 145 centimètres, ce seuil étant considéré comme la taille limite critique. Plus de la moitié des femmes (59 %) ont un IMC normal, compris entre 18,5 et 24,9. Cependant, les résultats montrent aussi que 7 % des femmes de 20–49 ans ont un IMC inférieur à 18,5 et sont donc maigres, 5 % souffrant de maigreur légère et 2 % de maigreur modérée et sévère. À l'opposé, avec un IMC supérieur à 25, plus d'un tiers des femmes de 20–49 ans (34 %) présentent un surpoids ou sont obèses, 21 % étant en surpoids et 13 % étant obèses (**Graphique 11.7**).

***Graphique 11.7* État nutritionnel des femmes adolescentes et des femmes adultes**

Répartition (en %) des femmes de 15–19 ans et de 20–49 ans, par état nutritionnel



Parmi les adolescentes de 15–19 ans, 4 % ont une taille-pour-âge dont le *z* score se situe en dessous de moins 2 écarts type. La majorité ont un poids normal (68 %). En revanche, près d'une jeune femme sur cinq (18 %) est maigre, en majorité sous la forme légère (15 %) mais 3 % présentent un état de maigreur modérée ou sévère. À l'opposé, 12 % présentent une surcharge pondérale et 3 % sont obèses (**Graphique 11.7**).

Tendances : La comparaison des résultats des différentes enquêtes réalisées au Mali met en évidence une diminution du pourcentage de femmes de 20–49 ans qui sont maigres et, à l'opposé, une augmentation du pourcentage de femmes présentant un surpoids ou qui sont obèses, le pourcentage ayant plus que doublé entre 1995–1996 et 2023–2024 (**Graphique 11.8**).

***Graphique 11.8* État nutritionnel des femmes : tendances**

Pourcentage de femmes de 20–49 ans qui sont :



Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage de femmes de 20–49 ans atteintes de maigreur est de 6 % en milieu urbain et 7 % en milieu rural) ; par contre, chez les adolescentes, ce pourcentage est plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain (20 % contre 14 %). À l'opposé, les pourcentages de femmes présentant une surcharge pondérale ou obèses sont plus élevés en milieu urbain qu'en milieu rural (respectivement 48 % contre 29 % et 19 % contre 12 %). On note, en particulier que parmi les femmes de 20–49 ans, l'obésité touche deux fois plus les femmes du milieu urbain que celles du milieu rural (22 % contre 10 %).

- Le pourcentage de femmes de 20–49 ans atteintes d'obésité est plus élevé parmi les femmes instruites que parmi celles n'ayant aucun niveau d'instruction (17 % contre 10 %).

- Le pourcentage de femmes de 20–49 ans maigres varie de 1 % dans la région de Tombouctou à 13 % à Gao. Trois des huit régions présentent des proportions de femmes trop maigres supérieures à la moyenne nationale (7 %). Il s'agit de Gao (13 %), Kayes (9 %) et Koulikoro (8 %). En revanche, les régions de Tombouctou (43 %), Gao (39 %), sont celles ou les pourcentages de femmes en surpoids ou obèses sont les plus élevés. L'obésité touche 21 % des femmes de Tombouctou et 18 % de celles de Gao.

- Parmi les jeunes femmes de 15–19 ans, le pourcentage de celles qui sont maigres varie de 6 % à Tombouctou à 29 % dans la région de Gao. Cependant, c'est dans la région de Tombouctou que le pourcentage de jeunes femmes en surpoids est le plus élevé (18 %) ; c'est aussi dans cette région que la prévalence de l'obésité est la plus élevé (5 %).

- Du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, les pourcentages de femmes maigres, diminuent passant de 9 % à 5 % parmi celles de 20–49 ans et de 23 % à 15 % parmi celles de 15–19 ans. On constate la tendance inverse pour le surpoids/obésité ; les pourcentages de femmes (20–49 ans) et de jeunes femmes (15–19 ans) en surcharge pondérale ou obèses, augmentent, passant respectivement de 19 % à 52 % et de 7 % à 19 %.

11.8 PRATIQUES ALIMENTAIRES DES FEMMES

Les pratiques alimentaires favorisant une alimentation saine incluent la consommation d'une variété d'aliments et de groupes d'aliments différents et une consommation limitée de boissons sucrées et d'aliments malsains. La consommation d'une variété d'aliments non transformés aide les femmes à consommer la quantité adaptée de vitamines et de minéraux essentiels. Une alimentation saine protège également contre le surpoids, l'obésité et les maladies non transmissibles.

La diversité alimentaire minimale pour les femmes est un indicateur de diversité alimentaire validé pour les femmes non enceintes âgées de 15–49 ans. L'indicateur est basé sur 10 groupes d'aliments : céréales,

tubéreuses amylacées blanches/pâles, tubercules et plantains ; légumes secs (haricots, pois et lentilles) ; noix et graines ; produits laitiers (lait et produits laitiers), aliments carnés (viande, poisson, volaille et abats) ; œufs ; légumes à feuilles vert foncé ; fruits et légumes riches en vitamine A ; autres légumes ; et autres fruits. Les femmes qui consomment au minimum 5 des 10 groupes alimentaires possibles dans les 24 heures précédant l'enquête sont classées comme ayant une diversité alimentaire minimale adaptée. Les carences en micronutriments tels que le fer, l'iode, la vitamine A, le folate et le zinc peuvent avoir des conséquences néfastes pour le corps humain. Les femmes, principalement celles en âge de procréer, sont particulièrement vulnérables en raison de leurs besoins plus importants en vitamines et minéraux essentiels. Une alimentation qui respecte la diversité alimentaire minimale pour assurer la suffisance des besoins en micronutriments est importante (FAO 2021).

Il faut limiter la consommation d'aliments malsains et de boissons sucrées car ils sont associés au surpoids et à l'obésité et aux maladies non transmissibles (Askari et al. 2020). Chez les femmes, le surpoids et l'obésité peuvent affecter la santé génésique et accroître les complications pendant la grossesse (Mitchell et Shaw 2015). L'indicateur de consommation d'aliments malsains, décrit les « aliments malsains sentinelles » qui sont des aliments cuits en friture, riches en sucre, en sel et/ou en graisses malsaines couramment consommés par les femmes (FAO 2021).

Diversité alimentaire minimale pour les femmes

Pourcentage de femmes ayant consommé le jour précédent des aliments provenant d'au moins 5 des 10 groupes alimentaires définis. Les 10 groupes alimentaires sont les suivants : céréales, tubéreuses amylacées blanches/pâles, tubercules et plantains ; légumes secs (haricots, pois et lentilles) ; noix et graines ; produits laitiers (lait et produits laitiers), produits carnés (viande, poisson, volaille et abats) ; œufs ; légumes à feuilles vert foncé ; fruits et légumes riches en vitamine A ; autres légumes ; et autres fruits.

Échantillon : Femmes de 15–49 ans

Consommation de boissons sucrées

Pourcentage de femmes ayant consommé des boissons sucrées le jour précédent

Échantillon : Femmes de 15–49 ans

Consommation d'aliments malsains

Pourcentage de femmes ayant consommé des aliments malsains sentinelles précisés, le jour précédent

Échantillon : Femmes de 15–49 ans

Le **Tableau 11.15** présente les pourcentages de femmes ayant consommé divers types d'aliments et de liquides la nuit ou le jour précédant l'enquête et le **Tableau 11.16** présente le pourcentage de femmes dont l'alimentation satisfait au critère de diversité alimentaire minimale ainsi que les pourcentages de femmes dont les pratiques alimentaires ne sont pas appropriées parce qu'elles consomment des boissons sucrées ou des aliments malsains.

La nuit ou le jour avant l'enquête, la quasi-totalité des femmes (98 %) avait consommé des aliments à base de céréales, un peu plus des deux tiers (70 %) avait mangé de la viande, du poisson ou de la volaille, 43 % des légumes à feuille vert foncé et 42 % d'autres types de légumes ; la consommation de haricots, pois, lentilles (14 %), ou d'œufs (10 %) est plus faible.

Un peu plus d'un tiers des femmes de 15–49 ans (34 %) ont eu une alimentation diversifiée correspondant aux critères de diversité alimentaire minimale, c'est-à-dire que ces femmes ont consommé le jour ou la nuit

avant l'enquête, des aliments appartenant à au moins cinq groupes d'aliments parmi les dix qui sont recommandés. Cependant, 65 % ont consommé des boissons sucrées et 28 % des aliments malsains.

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage de femmes ayant eu une alimentation diversifiée correspondant au critère de diversification alimentaire minimale est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural (42 % contre 30 %) mais, la consommation d'aliments néfastes pour la santé est aussi plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural (72 % contre 63 % pour les boissons sucrées et 30 % contre 27 % pour les aliments malsains).

- La consommation de boissons sucrées est particulièrement élevée à Bamako (76 %) et dans les régions de Kayes (68 %) et Mopti (67 %). Concernant les aliments malsains, c'est dans les régions de Mopti (35 %), Koulikoro (30 %) et Kayes (29 %) que les pourcentages de femmes qui en ont consommé est le plus élevé et le plus faible est enregistré dans la région de Tombouctou (12 %).

- Le pourcentage de femmes dont l'alimentation est suffisamment diversifiée augmente avec le niveau d'instruction passant de 28 % parmi celles n'ayant aucun niveau d'instruction à 43 % parmi celles ayant le niveau secondaire ou plus, tout comme la consommation de boissons sucrées ou d'aliments malsains. Le pourcentage de femmes ayant consommé des boissons sucrées passe respectivement de 62 % à 70 % et le pourcentage ayant consommé des aliments malsains passe respectivement de 24 % à 35 %.

- Du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, le pourcentage de femmes dont l'alimentation satisfait aux critères de diversification alimentaire minimale augmente, passant de 26 % à 46 % (**Graphique 11.9**). Cependant, les résultats montrent que l'amélioration du niveau de vie s'accompagne aussi d'une consommation plus importante de boissons sucrées (61 % à 74 %) et d'aliments malsains (28 % à 34 %).

Graphique 11.9 **Diversité alimentaire minimale chez les femmes par bien-être économique du ménage**

Pourcentage de femmes de 15–49 ans dont l'alimentation, le jour avant l'interview, était conforme aux critères de diversité alimentaire minimale



11.9 PRÉVALENCE DE L'ANÉMIE CHEZ LES FEMMES

L'anémie chez les adultes peut entraîner une fatigue, une léthargie, une réduction de la productivité physique et un rendement médiocre au travail (Chaparro et Suchdev 2019). L'anémie est un problème important chez les femmes enceintes car elle peut entraîner une augmentation de la mortalité maternelle et des résultats défavorables lors de l'accouchement (Haider et al. 2013).

Anémie chez les femmes

Anémie	Taux d'hémoglobine en grammes/décilitre*			
	Femmes non enceintes de 15–49 ans	Femmes enceintes de 15–49 ans		
		Premier trimestre	Deuxième trimestre	Troisième trimestre
Anémique	<12.0	<11.0	<10.5	<11.0
Anémie légère	11.0–11.9	10.0–10.9	9.5–10.4	10.0–10.9
Anémie modérée	8.0–10.9	7.0–9.9	7.0–9.4	7.0–9.9
Anémie grave	<8.0	<7.0	<7.0	<7.0
Non anémique	≥12.0	≥11.0	≥10.5	≥11.0

* Les niveaux d'hémoglobine sont ajustés en fonction du statut tabagique et de l'altitude selon OMS 2024.

Échantillon : Femmes de 15–49 ans

Comme décrit dans la section 11.5, l'OMS a publié de nouvelles directives sur la source de sang préférée pour mesurer l'hémoglobine, la méthodologie pour ajuster les niveaux d'hémoglobine en fonction de l'altitude et du tabagisme, et les seuils d'hémoglobine utilisés pour définir l'anémie (OMS 2024). Dans le cadre de ces nouvelles directives, les seuils utilisés pour définir l'anémie chez les femmes enceintes ont été modifiés.

Les résultats pour les femmes présentés dans ce rapport utilisent les nouveaux seuils pour définir l'anémie et ont été ajustés en fonction de l'altitude et du tabagisme conformément aux dernières recommandations de l'OMS[2]. Cependant, au moment de la collecte des données de l'enquête, une goutte de sang capillaire avait été utilisée pour mesurer l'hémoglobine (voir Chapitre 1), il convient donc d'être prudent lors de l'interprétation des estimations de l'anémie dans cette enquête et dans toutes les autres qui ont utilisé une goutte de sang capillaire. En outre, il n'est pas conseillé d'examiner les tendances des estimations de la prévalence de l'anémie obtenues à l'aide de différentes méthodes d'analyse du sang, de facteurs d'ajustement ou de seuils d'hémoglobine.

Au Mali, 53 % des femmes de 15–49 ans sont anémiées : 23 % sont légèrement anémiées, 27 % sont anémiées sous la forme modérée et 2 % sont sévèrement anémiées (**Tableau 11.17**).

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- La prévalence de l'anémie augmente avec le nombre d'enfants déjà nés passant de 51 % chez les femmes sans enfant à 55 % chez les femmes avec six enfants ou plus.
- La prévalence de l'anémie est plus élevée parmi les femmes qui sont enceintes (57 %) que parmi celles qui ne le sont pas (52 %).
- La prévalence de l'anémie parmi les femmes est plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain (55 % contre 46 %).

[2] Les estimations de l'anémie basées sur les directives de l'OMS de 2024 devraient se traduire par des estimations plus faibles de l'anémie pour les femmes enceintes au deuxième trimestre par rapport par rapport aux estimations dérivées des directives de 2011. Pour les femmes non enceintes, les femmes enceintes aux premier et troisième trimestres, les estimations de l'anémie devraient être plus élevées par rapport aux directives de l'OMS de 2011. Pour référence, le Tableau C.17.2 en Annexe C comprend les estimations de l'anémie basées sur les directives de l'OMS de 2011.

- Cinq régions ont une prévalence de l'anémie supérieure ou égale à 50 % : Kayes (61 %), Koulikoro (56 %), Sikasso (53 %), Ségou (52 %) et Gao (50 %) contre 42 % pour la région de Tombouctou, 45 % à Bamako et 47 % pour Mopti.

- Du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, la prévalence de l'anémie a tendance à diminuer, passant de 56 % à 45 %.

11.10 PRÉSENCE DE SEL IODÉ DANS LES MÉNAGES

L'iode est un micronutriment qui joue un rôle important dans la fonction thyroïdienne, essentielle pour la fonction génésique, la croissance et le développement. Il est recommandé que le sel utilisé par les ménages soient enrichis en iode. Une quantité suffisante d'iode prévient les goitres, les lésions cérébrales et d'autres problèmes de santé liés à la thyroïde (OMS 2014b).

Iodation du sel des ménages
Pourcentage de ménages disposant de sel iodé
Échantillon : Ménages dans lesquels le sel a été testé pour sa teneur en iode

Au cours de l'EDSM-VII, le sel a été testé dans 71 % des ménages pour la présence d'iode. Parmi les ménages dans lesquels le test a été effectué, plus de huit ménages sur dix disposaient de sel iodé (84 %). On peut cependant souligner que ce pourcentage est un peu plus faible dans les ménages du quintile moyen (77 % contre 92 % dans le quintile le plus élevé) et dans la région de Gao (23 % contre 94 % à Bamako et dans les régions de Sikasso et de Ségou) (**Tableau 11.18**).

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur la nutrition des enfants et des adultes, consulter les tableaux suivants :

- **Tableau 11.1 État nutritionnel des enfants**
- **Tableau 11.2 Suivi de la croissance de l'enfant**
- **Tableau 11.3 Allaitement initial**
- **Tableau 11.4 Allaitement selon l'âge**
- **Tableau 11.5 Type d'allaitement selon l'âge**
- **Tableau 11.6 Liquides consommés par les enfants le jour ou la nuit ayant précédé l'interview**
- **Tableau 11.7 Aliments consommés par les enfants le jour ou la nuit ayant précédé l'interview**
- **Tableau 11.8 Diversification alimentaire minimum, nombre minimum de repas et apport alimentaire minimum acceptable parmi les enfants**
- **Tableau 11.9 Consommation d'œuf et/ou de produits d'originale animale et pratiques alimentaires malsaines parmi les enfants de 6–23 mois**
- **Tableau 11.10 Indicateurs d'évaluation des Pratiques d'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (PANJE)**
- **Tableau 11.11 Conseil sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant**
- **Tableau 11.12 Prévalence de l'anémie chez les enfants**
- **Tableau 11.13 Suppléments en micronutriments et déparasitage parmi les enfants**
- **Tableau 11.14.1 État nutritionnel des femmes de 20–49 ans**
- **Tableau 11.14.2 État nutritionnel des femmes adolescentes de 15–19 ans**
- **Tableau 11.15 Aliments et liquides consommés par les femmes le jour ou la nuit ayant précédé l'interview**
- **Tableau 11.16 Diversification alimentaire minimum et consommation d'aliments et de boissons malsaines parmi les femmes**
- **Tableau 11.17 Prévalence de l'anémie chez les femmes**
- **Tableau 11.18 Présence de sel iodé dans le ménage**

Tableau 11.1 État nutritionnel des enfants

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans considérés comme atteints de malnutrition selon les 3 indices anthropométriques de mesure de la croissance de l'enfant : la taille-pour-âge, le poids-pour-taille et le poids-pour-âge, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Taille-pour-âge[1]				Poids-pour-taille					Poids-pour-âge			
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage en dessous de -3 ET	Pourcentage en dessous de -2 ET[2]	*z* score moyen (ET)	Effectif d'enfants	Pourcentage en dessous de -3 ET	Pourcentage en dessous de -2 ET [2]	Pourcentage au-dessus de +2 ET	*z* score moyen (ET)	Effectif d'enfants	Pourcentage en dessous de -3 ET	Pourcentage en dessous de -2 ET[2]	*z* score moyen (ET)	Effectif d'enfants
Âge en mois													
<6	4,0	14,4	-0,6	1 809	0,4	3,9	5,6	0,0	1 810	2,5	10,6	-0,5	1 815
6–11	3,6	14,0	-0,9	1 557	1,4	10,3	2,1	-0,6	1 565	3,4	15,9	-0,9	1 562
12–23	8,5	30,8	-1,4	3 041	0,8	6,8	0,9	-0,6	3 060	3,7	19,4	-1,1	3 048
24–35	9,6	32,4	-1,5	3 262	0,6	4,6	0,8	-0,3	3 289	3,2	16,7	-1,0	3 266
36–47	9,0	29,7	-1,4	3 085	0,4	3,4	0,8	-0,3	3 111	2,9	14,9	-1,0	3 089
48–59	4,8	19,2	-1,1	3 063	0,7	5,1	0,5	-0,5	3 087	1,9	11,2	-1,0	3 065
0–23	6,0	22,1	-1,1	6 407	0,8	6,8	2,5	-0,4	6 435	3,3	16,1	-0,9	6 425
24–59	7,8	27,2	-1,3	9 410	0,6	4,4	0,7	-0,4	9 487	2,7	14,3	-1,0	9 420
Sexe													
Masculin	7,8	26,7	-1,3	7 968	0,9	6,3	1,6	-0,4	8 022	3,2	16,7	-1,0	7 988
Féminin	6,4	23,6	-1,2	7 849	0,4	4,4	1,3	-0,3	7 901	2,6	13,3	-0,9	7 857
Intervalle intergénésique en mois[3]													
Première naissance[4]	7,3	25,4	-1,2	2 466	0,7	5,6	1,3	-0,4	2 474	3,1	14,8	-1,0	2 469
<24	9,0	28,8	-1,4	3 045	0,6	5,3	1,4	-0,4	3 075	3,4	17,7	-1,0	3 055
24–47	6,5	24,7	-1,2	7 071	0,8	5,6	1,6	-0,4	7 095	2,9	14,9	-1,0	7 081
48+	5,0	19,5	-1,0	2 187	0,3	4,4	1,4	-0,4	2 194	1,9	11,3	-0,8	2 190
Grosseur à la naissance[3,5]													
Très petit	14,4	40,2	-1,8	232	4,5	13,7	2,3	-0,7	235	13,0	34,2	-1,6	233
Petit	9,6	32,0	-1,5	960	1,1	8,8	1,4	-0,7	965	5,4	25,5	-1,3	962
Moyen ou plus gros que la moyenne	6,4	24,0	-1,2	7 974	0,6	5,5	2,0	-0,3	8 003	2,6	14,5	-0,9	7 990
Ne sais pas	15,6	30,6	-1,3	110	0,0	3,8	1,1	-0,4	112	5,4	19,8	-1,1	112
Interview de la mère													
Interviewée	6,9	24,9	-1,2	14 768	0,6	5,4	1,5	-0,4	14 838	2,9	14,9	-1,0	14 794
Mère non interviewée et vivant dans le ménage	8,9	26,1	-1,2	348	0,6	5,6	1,7	-0,3	357	3,4	15,5	-1,0	348
Mère non interviewée et ne vivant pas dans le ménage[6]	10,1	29,8	-1,4	702	1,1	4,6	0,6	-0,4	728	4,0	16,8	-1,1	704
Âge de la mère à la naissance[3]													
<20	8,6	27,2	-1,3	2 375	0,7	5,0	1,3	-0,4	2 389	3,3	16,2	-1,0	2 378
20–34	6,6	24,4	-1,2	10 119	0,6	5,3	1,5	-0,4	10 160	2,6	14,5	-0,9	10 139
35–49	6,8	24,6	-1,2	2 273	0,7	6,1	1,3	-0,4	2 289	3,7	15,7	-1,0	2 277

À suivre...

Tableau 11.1—*Suite*

Caractéristique sociodémographique	Taille-pour-âge[1]				Poids-pour-taille					Poids-pour-âge			
	Pourcentage en dessous de -3 ET	Pourcentage en dessous de -2 ET[2]	*z* score moyen (ET)	Effectif d'enfants	Pourcentage en dessous de -3 ET	Pourcentage en dessous de -2 ET [2]	Pourcentage au-dessus de +2 ET	*z* score moyen (ET)	Effectif d'enfants	Pourcentage en dessous de -3 ET	Pourcentage en dessous de -2 ET [2]	*z* score moyen (ET)	Effectif d'enfants
État nutritionnel de la mère[7]													
Maigre	8,9	33,5	-1,5	408	1,7	12,3	0,3	-0,9	418	6,2	28,6	-1,5	412
Normal	8,1	26,7	-1,3	3 902	0,6	5,5	0,9	-0,4	3 913	3,2	16,2	-1,0	3 905
En surpoids/obèse	3,6	17,7	-0,9	1 790	0,6	3,7	1,7	-0,3	1 797	1,8	10,0	-0,7	1 794
Résidence													
Bamako	3,4	14,4	-0,8	1 809	0,3	4,6	1,1	-0,4	1 806	1,1	9,6	-0,7	1 808
Autre urbain	5,2	19,0	-1,0	1 527	0,5	3,9	1,8	-0,3	1 545	1,9	11,0	-0,8	1 528
Ensemble urbain	4,2	16,5	-0,9	3 335	0,3	4,3	1,4	-0,4	3 351	1,5	10,3	-0,8	3 336
Rural	7,9	27,4	-1,3	12 482	0,8	5,6	1,5	-0,4	12 571	3,3	16,3	-1,0	12 509
Région													
Kayes	6,0	22,7	-1,1	2 412	0,7	6,2	1,1	-0,5	2 413	3,5	15,4	-1,0	2 412
Koulikoro	6,0	24,6	-1,2	3 752	0,9	5,5	2,0	-0,4	3 767	2,8	15,4	-1,0	3 770
Sikasso	10,2	30,7	-1,5	3 088	0,4	4,5	1,5	-0,3	3 107	3,2	15,8	-1,0	3 089
Ségou	4,3	20,8	-1,2	2 543	0,4	4,4	1,1	-0,3	2 553	1,4	12,4	-0,9	2 544
Mopti	10,1	33,7	-1,5	1 486	0,6	4,5	1,0	-0,3	1 495	3,6	17,8	-1,1	1 488
Tombouctou	12,7	30,1	-1,2	287	3,1	10,9	4,0	-0,4	294	4,9	19,7	-1,0	292
Gao	18,4	40,6	-1,7	435	2,1	12,1	0,8	-0,7	480	11,6	30,4	-1,4	436
Kidal	†	†	†	6	†	†	†	†	6	†	†	†	6
Bamako	3,4	14,4	-0,8	1 809	0,3	4,6	1,1	-0,4	1 806	1,1	9,6	-0,7	1 808
Niveau d'instruction de la mère[8]													
Aucun	8,2	28,2	-1,3	9 066	0,8	5,8	1,4	-0,4	9 129	3,6	16,8	-1,0	9 083
Primaire	6,5	23,7	-1,2	2 600	0,5	5,4	1,1	-0,4	2 612	2,3	14,8	-1,0	2 606
Secondaire ou plus	4,2	17,2	-0,9	3 449	0,4	4,2	1,9	-0,3	3 453	1,3	10,4	-0,7	3 453
Quintile de bien-être économique													
Le plus bas	10,2	31,1	-1,4	3 368	0,7	5,3	1,3	-0,4	3 379	3,6	18,1	-1,1	3 375
Second	7,8	30,3	-1,4	3 324	0,4	5,2	1,1	-0,4	3 339	3,0	16,9	-1,1	3 330
Moyen	8,6	28,1	-1,3	3 230	1,2	6,4	1,6	-0,4	3 265	4,1	16,8	-1,0	3 236
Quatrième	4,6	19,7	-1,0	3 157	0,7	5,0	1,7	-0,4	3 195	2,2	12,2	-0,9	3 164
Le plus élevé	3,5	14,2	-0,8	2 738	0,3	4,7	1,6	-0,4	2 745	1,6	10,2	-0,7	2 740
Ensemble	7,1	25,1	-1,2	15 817	0,7	5,4	1,4	-0,4	15 922	2,9	15,0	-1,0	15 845

Note : Chaque indice est exprimé en termes d'unités d'écart type (ET) par rapport à la médiane des Normes OMS de la croissance de l'enfant.
[1] Les enfants de moins de 2 ans sont mesurés en position allongée alors que tous les autres enfants sont mesurés en position debout.
[2] Y compris les enfants qui se situent en-dessous de -3 ET de la médiane des Normes OMS de la croissance de l'enfant
[3] Non compris les enfants dont la mère n'a pas été interviewée
[4] Les premières naissances multiples (jumeaux, triplés, etc.) sont comptées comme première naissance parce qu'elles n'ont pas d'intervalle avec la naissance précédente.
[5] L'information n'est disponible que pour les enfants de 0–35 mois.
[6] Y compris les enfants dont la mère est décédée
[7] Non compris les enfants dont la mère n'a pas été pesée et mesurée, les enfants dont la mère n'a pas été interviewée et les enfants dont la mère est enceinte ou a donné naissance à un enfants dans les deux mois précédents. L'état nutritionnel de la mère, basé sur l'IMC (Indice de Masse Corporelle) pour les mères de 20–49 ans et sur l'IMC -pour-âge pour les mères de 15–19 ans tels qu'ils sont présentés aux Tableaux 11.14.1 et 11.14.2.
[8] Pour les femmes qui n'ont pas été interviewées, l'information provient du questionnaire Ménage. Non compris les enfants dont la mère n'est pas listée dans le questionnaire Ménage.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 11.2 Suivi de la croissance de l'enfant

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans pour lesquels un prestataire de santé a effectué certaines mesures dans les 3 mois ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Poids	Taille	Périmètre brachial (PB)	Poids et taille	Poids, taille et PB	Effectif d'enfants
Âge en mois						
<6	25,3	24,4	16,5	23,7	14,6	1 745
6–11	28,0	27,0	24,5	26,3	20,3	1 490
12–23	22,8	21,9	21,5	21,4	18,1	2 892
24–35	17,1	15,9	15,9	15,4	13,1	3 018
36–47	15,4	15,1	14,5	14,4	12,0	2 870
48–59	13,4	13,5	12,5	12,4	10,2	2 816
0–23	24,8	23,8	20,8	23,3	17,7	6 127
24–59	15,3	14,8	14,3	14,1	11,8	8 704
Sexe						
Masculin	19,7	18,8	17,0	18,2	14,2	7 456
Féminin	18,8	18,3	17,0	17,6	14,2	7 376
Âge de la mère						
15–19	19,1	17,9	16,3	17,3	13,3	2 415
20–29	19,4	18,9	17,3	18,2	14,4	7 589
30–39	19,4	18,7	17,1	18,0	14,5	4 148
40–49	16,3	15,8	15,8	15,7	13,9	679
Résidence						
Bamako	30,5	27,9	21,0	27,3	18,6	1 733
Autre urbain	22,9	22,3	19,5	21,6	17,0	1 462
Ensemble urbain	27,0	25,3	20,3	24,7	17,9	3 195
Rural	17,1	16,7	16,1	16,0	13,2	11 637
Région						
Kayes	21,2	21,3	16,7	20,1	14,2	2 265
Koulikoro	15,9	14,9	13,9	14,6	12,5	3 504
Sikasso	13,8	13,7	12,5	13,2	10,5	2 906
Ségou	19,0	18,7	21,3	17,2	14,3	2 330
Mopti	19,8	19,3	18,7	19,1	17,6	1 407
Tombouctou	10,2	9,8	14,8	9,4	8,3	253
Gao	31,7	31,3	30,3	30,5	27,4	428
Kidal	†	†	†	†	†	6
Bamako	30,5	27,9	21,0	27,3	18,6	1 733
Niveau d'instruction de la mère						
Aucun	15,9	15,4	14,9	14,7	12,0	8 851
Primaire	20,8	20,5	19,1	20,1	16,4	2 557
Secondaire ou plus	26,7	25,1	20,8	24,4	18,3	3 424
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	13,7	13,6	14,0	13,0	11,2	3 094
Second	17,5	17,2	17,7	16,3	13,8	3 103
Moyen	17,5	17,3	16,3	16,3	13,2	3 021
Quatrième	20,0	19,2	16,6	18,8	14,8	3 013
Le plus élevé	28,9	26,7	20,9	26,3	18,6	2 600
Ensemble	19,2	18,5	17,0	17,9	14,2	14 831

Note : « Taille » fait référence à la longueur (mesure en position couchée) ou taille (mesure en position debout).
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 11.3 Allaitement initial

Pourcentage d'enfants nés au cours des 2 dernières années ayant déjà été allaités, pourcentage ayant commencé à être allaité dans l'heure qui a suivi la naissance et pourcentage ayant été exclusivement allaité pendant les 2 premiers jours après la naissance, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant été allaité	Pourcentage ayant commencé à être allaité dans l'heure qui a suivi la naissance	Pourcentage exclusivement allaité pendant les 2 premiers jours après la naissance[1]	Effectif d'enfants nés au cours des 2 dernières années
Sexe				
Masculin	95,6	43,5	47,1	3 248
Féminin	96,2	47,5	49,4	3 165
Conseil sur l'allaitement au cours des soins prénatals[2]				
A reçu le conseil	95,6	48,6	48,9	2 883
N'a pas reçu de conseil/ne sait pas	97,3	43,2	45,6	2 438
N'a pas reçu de soins prénatals	93,5	42,2	52,6	1 092
Assistance à l'accouchement				
Personnel de santé[3]	95,7	45,8	43,2	4 202
Accoucheuse traditionnelle	93,8	42,8	49,1	466
Autre	96,8	48,0	59,3	1 501
Personne	97,1	28,8	65,4	243
Lieu de l'accouchement				
Établissement de santé	95,9	46,1	46,7	5 174
Maison	95,6	42,8	54,8	1 236
Autre	*	*	*	3
Type d'accouchement				
Accouchement par voie basse	95,8	46,4	48,9	6 084
Césarienne	96,8	28,8	36,8	329
Conseil sur l'allaitement durant les soins prénatals[2,4]				
A reçu le conseil	94,9	44,6	52,0	1 073
N'a pas reçu le conseil/ne sait pas	96,6	46,0	47,7	5 076
Observation de l'allaitement pendant les soins prénatals[2,4]				
Observé	95,3	46,1	53,2	1 119
Non observé/ne sait pas	96,5	45,7	47,4	5 030
Résidence				
Bamako	97,7	45,2	27,1	751
Autre urbain	95,2	49,1	42,4	630
Ensemble urbain	96,5	47,0	34,1	1 381
Rural	95,7	45,1	52,2	5 032
Région				
Kayes	93,4	50,4	49,3	1 002
Koulikoro	97,0	45,3	47,4	1 527
Sikasso	96,9	40,6	56,2	1 262
Ségou	95,8	52,5	52,4	1 002
Mopti	94,1	31,5	48,7	608
Tombouctou	96,0	76,9	45,5	80
Gao	91,3	49,3	59,9	179
Kidal	†	†	†	3
Bamako	97,7	45,2	27,1	751
Niveau d'instruction de la mère				
Aucun	96,0	45,1	53,4	3 679
Primaire	95,8	45,2	45,2	1 117
Secondaire ou plus	95,6	46,6	38,7	1 617
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	97,0	43,8	62,3	1 343
Second	95,3	45,9	52,9	1 309
Moyen	95,7	45,5	51,6	1 289
Quatrième	94,6	44,8	43,4	1 314
Le plus élevé	96,9	47,7	28,6	1 158
Ensemble	95,9	45,5	48,3	6 413

Note : Le tableau est basé sur les enfants dont la naissance a eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, cela qu'ils soient en vie ou décédés au moment de l'enquête. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

[1] Concerne les enfants qui n'ont reçu rien d'autre que le lait maternel pour manger et pour boire au cours des 2 premiers jours après l'accouchement

[2] L'information n'est disponible que pour la naissance vivante la plus récente.

[3] Médecin, infirmière/sage-femme

[4] On a demandé aux femmes si un prestataire de santé leur avait donné des conseils sur l'allaitement dans les 2 premiers jours après leur naissance vivante la plus récente, quel que soit le lieu de l'accouchement

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 11.4 Allaitement selon l'âge

Parmi les plus jeunes enfants de 0–5 mois vivant avec leur mère, pourcentage exclusivement allaité et pourcentage recevant une alimentation mixte lactée ; et, parmi tous les enfants de 12–23 mois, pourcentage actuellement allaité ; et, parmi tous les enfants de 0–23 mois, pourcentage nourri avec un biberon, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Parmi les plus jeunes enfants de 0–5 mois vivant avec leur mère :			Parmi tous les enfants de 12–23 mois :		Parmi tous les enfants de 0–23 mois :	
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage exclusivement allaité	Pourcentage recevant une alimentation mixte lactée[1]	Effectif d'enfants	Pourcentage actuellement allaité[2]	Effectif d'enfants	Pourcentage nourri avec un biberon	Effectif d'enfants
Âge en mois							
0–1	61,8	6,9	569	na	na	8,0	577
2–3	39,2	11,3	595	na	na	12,8	610
4–5	19,5	8,2	547	na	na	13,1	558
6–11	na	na	na	na	na	12,4	1 490
12–15	na	na	na	92,3	1 051	8,7	1 051
16–19	na	na	na	83,8	928	8,0	928
20–23	na	na	na	48,5	913	7,6	913
Sexe							
Masculin	40,4	7,8	870	75,5	1 437	10,4	3 092
Féminin	40,4	9,9	841	76,0	1 455	9,7	3 035
Résidence							
Bamako	15,3	26,1	206	73,7	348	22,5	731
Autre urbain	32,9	14,5	154	73,1	277	14,8	591
Ensemble urbain	22,8	21,1	360	73,4	624	19,1	1 322
Rural	45,1	5,5	1 351	76,4	2 268	7,6	4 805
Région							
Kayes	37,4	5,0	275	72,5	450	7,4	957
Koulikoro	38,8	8,4	418	76,1	702	9,2	1 458
Sikasso	48,2	4,1	329	81,2	528	6,7	1 200
Ségou	51,9	7,1	276	75,8	441	8,7	958
Mopti	47,4	6,9	143	73,6	295	7,9	573
Tombouctou	43,0	12,0	18	80,1	47	15,9	77
Gao	37,9	7,1	46	69,9	81	15,3	171
Kidal	†	†	1	†	1	†	3
Bamako	15,3	26,1	206	73,7	348	22,5	731
Niveau d'instruction de la mère							
Aucun	44,4	5,4	1 001	78,2	1 654	6,5	3 509
Primaire	39,8	6,6	288	76,5	499	8,0	1 070
Secondaire ou plus	31,5	18,5	422	69,8	739	19,7	1 548
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	53,7	3,2	354	79,1	606	3,7	1 287
Second	50,8	2,5	343	74,8	589	4,9	1 250
Moyen	36,1	5,4	360	77,8	571	7,2	1 227
Quatrième	37,6	8,7	361	77,0	602	11,0	1 244
Le plus élevé	20,7	27,5	291	69,4	524	25,3	1 119
Ensemble	40,4	8,8	1 710	75,8	2 892	10,1	6 127

Note : L'allaitement se réfère à une période de « 24-heures » (hier durant le jour ou la nuit).
na = non applicable
[1] A reçu le lait maternel et une préparation pour nourrissons et/ou du lait d'animal. Exclut les boissons au yaourt car elles ne sont généralement pas données comme un substitut au lait maternel. N'inclut pas les laits de soja et de noix.
[2] Corresponds à l'indicateur ANJE 'Allaitement continu'
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 11.5 Type d'allaitement selon l'âge

Répartition (en %) des plus jeunes enfants de 0–5 mois vivant avec leur mère, par catégorie d'alimentation, selon l'âge en mois, EDSM-VII Mali 2023–2024

Âge en mois	Allaité seulement (exclusivement allaité)	Allaité et eau plate seulement	Allaité et liquides non lactés[1]	Allaité et lait d'animal et/ou lait maternisé[2]	Allaité et aliments solides, semi-solides ou mous[3]	Non allaité	Ne sait pas[4]	Total	Effectifs d'enfants derniers-nés de 0–5 mois vivant avec leur mère
0–1	61,8	22,4	2,9	6,9	2,4	2,0	1,7	100,0	569
2–3	39,2	37,1	4,2	10,5	4,6	2,3	2,2	100,0	595
4–5	19,5	58,1	3,3	7,2	8,8	2,0	1,1	100,0	547
0–5	40,4	38,9	3,4	8,2	5,2	2,1	1,7	100,0	1 710

Note : La période de référence de l'allaitement est la période de « 24-heures » (hier durant le jour ou la nuit). Les catégories « Allaité seulement », « allaité et eau plate seulement », « allaité et liquides non lactés », « allaité et lait d'animal et/ou lait maternisé », « allaité et aliments solide, semi-solides, ou mous », et « non allaité » sont hiérarchiques et mutuellement exclusives. Lorsqu'ils sont combinés avec les enfants classés dans la catégorie d'alimentation « Ne sait pas », les pourcentages de chaque ligne atteignent 100 %.

[1] Enfants nourris au lait maternel et avec des liquides non lactés (tels que les jus, tisanes, eau sucrée, eau aromatisée, etc.). Dans cette catégorie, les enfants peuvent aussi avoir reçu de l'eau plate.

[2] Enfants nourris au lait maternel et au lait d'animal, et/ou avec une préparations pour nourrissons, et/ou avec des boissons à base de yaourt au lait d'animal. Dans cette catégorie, les enfants peuvent aussi avoir reçu des liquides non lactés et/ou de l'eau plate.

[3] Enfants nourris au lait maternel et avec des aliments solides, semi-solides ou des aliments mous de n'importe quel groupe alimentaire. Cela peut comprendre des céréales, de la viande, des œufs, fruits, légumes, etc. Dans cette catégorie, les enfants peuvent aussi avoir reçu de l'eau plate, des liquides non lactés et/ou du lait d'animal/préparation pour nourrisson/boissons à base de yaourt au lait d'animal.

[4] Non classifié à cause de réponses "Ne sait pas"

Tableau 11.6 Liquides consommés par les enfants le jour ou la nuit ayant précédé l'interview

Pourcentage d'enfants derniers-nés de moins de 2 ans vivant avec leur mère, par type de liquides consommés le jour ou la nuit ayant précédé l'interview, selon l'âge et selon qu'ils sont, ou non, allaités, EDSM-VII Mali 2023–2024

Âge en mois	Eau plate	Lait maternisé[1]	Lait d'animal		Yaourts à boire		Lait de soja et de noix		Jus de fruit ou boissons aromatisées au fruit	Sodas, boissons à base de malt, boissons énergétiques ou boissons énergisantes	Thé, café, ou tisane		Bouillon clair ou soupe claire	Autres liquides		Effectif d'enfants derniers-nés de moins de 2 ans vivant avec leur mère
			N'importe lequel	Sucré/ aromatisé	N'importe lequel	Sucré/ aromatisé	N'importe lequel	Sucré/ aromatisé			N'importe lequel	Sucré		N'importe lequel	Sucrés	
ENFANTS ALLAITÉS																
0–1	29,4	6,3	0,7	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,6	0,0	2,2	0,4	0,4	0,0	0,0	557
2–3	53,1	9,7	2,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	3,7	0,6	0,1	0,1	0,0	581
4–5	75,0	6,5	2,6	0,7	0,5	0,4	0,2	0,0	0,5	0,2	4,0	1,4	1,2	0,0	0,0	536
6–8	79,9	8,7	6,9	3,4	1,4	0,7	0,0	0,0	3,6	0,2	10,5	6,5	10,6	1,3	1,3	677
9–11	80,8	8,4	9,0	4,4	3,8	2,8	0,3	0,0	8,9	1,4	17,4	15,5	15,0	1,6	1,6	748
12–17	84,2	4,9	12,2	5,9	5,2	4,1	0,1	0,0	18,4	3,1	29,0	25,0	12,5	1,3	1,3	1 357
18–23	83,4	3,3	12,1	6,0	6,5	4,8	0,1	0,1	20,4	3,5	32,8	29,4	14,4	1,5	1,5	783
0–5	52,2	7,6	1,9	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0	0,8	0,1	3,3	0,8	0,6	0,0	0,0	1 674
6–11	80,4	8,6	8,0	3,9	2,7	1,8	0,2	0,0	6,4	0,8	14,1	11,2	12,9	1,5	1,5	1 426
12–23	83,9	4,3	12,2	5,9	5,7	4,4	0,1	0,1	19,1	3,3	30,4	26,6	13,2	1,4	1,4	2 140
6–23	82,5	6,0	10,5	5,1	4,5	3,3	0,1	0,0	14,0	2,3	23,9	20,5	13,1	1,4	1,4	3 565
Ensemble	72,8	6,5	7,8	3,7	3,1	2,3	0,1	0,0	9,8	1,6	17,3	14,2	9,1	1,0	1,0	5 240
ENFANTS NON ALLAITÉS																
0–1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11
2–3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14
4–5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11
6–8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12
9–11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	20
12–17	87,6	16,9	9,9	5,7	8,9	7,6	0,6	0,6	13,3	10,1	30,2	27,2	23,4	4,6	4,6	125
18–23	84,5	8,6	21,4	10,4	7,7	6,3	0,4	0,4	23,8	3,1	34,4	30,0	16,3	3,6	3,6	458
0–5	(51,6)	(5,2)	(6,9)	(0,0)	(0,3)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	36
6–11	(82,9)	(20,0)	(26,8)	(13,1)	(15,9)	(8,0)	(0,0)	(0,0)	(20,6)	(10,0)	(12,1)	(8,9)	(38,0)	(8,8)	(8,8)	32
12–23	85,2	10,4	18,9	9,4	8,0	6,6	0,4	0,4	21,6	4,6	33,5	29,4	17,8	3,8	3,8	583
6–23	85,1	10,9	19,3	9,6	8,4	6,7	0,4	0,4	21,5	4,9	32,4	28,4	18,9	4,1	4,1	615
Ensemble	83,2	10,5'	18,6	9,1	7,9	6,3	0,4	0,4	20,3	4,6	30,6	26,8	17,8	3,8	3,8	651

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés ; un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
[1] Le lait maternisé inclut du lait pour bébé comme Nursie, Blédina, Nan, ou Gallia.

Tableau 11.7 Aliments consommés par les enfants le jour ou la nuit ayant précédé l'interview

Pourcentage d'enfants derniers-nés de moins de 2 ans vivant avec leur mère, par type d'aliments consommés le jour ou la nuit ayant précédé l'interview, selon l'âge et selon qu'ils sont, ou non, allaités, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Aliments solides ou semi-solides													
Âge en mois	Céréales[1]	Racines, tubercules, et plantains[2]	Légumineuses (haricots, pois), lentilles), noix et graines[3]	Produits laitiers (lait, lait maternisé, yaourt, fromage)[4]	Aliments carnés (viande, poisson, poulet, abats)[5]	Œufs	Fruits et légumes riches en vitamine A[6]	Autres fruits et légumes[7]	Insectes et autres petits aliments protéinés[8]	Huile de palme rouge	Aliments sucrées[9]	Aliments salés et frits[10]	Autres aliments solides, semi-solides et mous	Effectif d'enfants derniers-nés de moins de 2 ans vivant avec leur mère
ENFANTS ALLAITÉS														
0–1	0,6	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,5	1,1	0,0	0,2	0,6	0,3	0,0	557
2–3	1,1	0,6	0,5	1,1	0,4	0,0	0,9	1,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	581
4–5	5,4	0,8	1,0	0,9	1,2	0,2	1,1	1,1	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	536
6–8	27,7	3,5	4,7	1,4	9,8	2,5	6,4	9,1	0,2	0,3	6,9	3,5	0,0	677
9–11	63,9	6,8	10,7	4,8	22,8	5,7	19,4	16,8	0,0	1,2	16,2	9,2	0,0	748
12–17	83,0	11,9	28,2	7,1	36,5	8,0	33,4	28,8	0,1	1,5	26,1	14,5	0,0	1 357
18–23	88,9	12,1	36,1	6,0	39,3	8,3	41,3	29,5	0,1	0,8	31,8	16,2	0,0	783
0–5	2,3	0,5	0,5	0,7	0,5	0,1	0,9	1,1	0,0	0,1	0,6	0,2	0,1	1 674
6–11	46,7	5,2	7,8	3,2	16,6	4,2	13,2	13,1	0,1	0,7	11,7	6,5	0,0	1 426
12–23	85,2	12,0	31,1	6,7	37,5	8,1	36,3	29,1	0,1	1,2	28,2	15,1	0,0	2 140
6–23	69,8	9,3	21,8	5,3	29,1	6,5	27,1	22,7	0,1	1,0	21,6	11,7	0,0	3 565
Ensemble	48,2	6,5	15,0	3,8	20,0	4,5	18,7	15,8	0,1	0,7	14,9	8,0	0,0	5 240
ENFANTS NON ALLAITÉS														
0–1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11
2–3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14
4–5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11
6–8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12
9–11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	20
12–17	80,9	14,3	26,0	9,2	36,5	13,9	27,2	25,8	0,0	0,0	25,6	20,3	0,0	125
18–23	92,2	18,6	39,4	8,1	50,2	11,4	40,3	38,1	0,2	2,5	37,1	18,1	0,0	458
0–5	(0,3)	(0,0)	(0,0)	(0,3)	(1,2)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	36
6–11	(65,6)	(10,8)	(18,0)	(3,7)	(29,0)	(9,0)	(25,1)	(19,4)	(0,0)	(3,3)	(32,7)	(13,7)	(0,0)	32
12–23	89,8	17,7	36,5	8,3	47,2	11,9	37,5	35,5	0,2	2,0	34,6	18,6	0,0	583
6–23	88,5	17,3	35,6	8,1	46,3	11,8	36,8	34,6	0,2	2,0	34,5	18,3	0,0	615
Ensemble	83,6	16,4	33,6	7,7	43,8	11,1	34,8	32,7	0,2	1,9	32,6	17,3	0,0	651

Note : se reporter au Questionnaire Femme pour la liste des liquides et aliments. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

[1] Inclut le riz, le pain, le macaroni, le spaghetti, le couscous, le tô, ou la bouillie

[2] Inclut le manioc, l'attiéké, l'igname, la patate douce à chair blanche, la pomme de terre, le taro, ou la banane plantain

[3] Inclut le haricot, le sô haricot, les petits pois, le voandzou, ou la bouillie de soja

[4] Inclut les arachides, cacahuètes, sauce d'arachide, ou noix de cajou

[5] Inclut le poisson frais, fumé ou séché, les sardines en boîte, le crabes, les crevettes, le foie, le poumon, le cœur, les rognons, les viandes séchées, les saucissons, le jambon, le corne bœuf, le pâté, le bœuf, le mouton, la chèvre, le porc, la viande de brousse, ou les autres oiseaux

[6] Inclut les carottes, les courges, ou patate douce à chair jaune ou orange, sauce feuille, feuilles de patate douce, feuilles de moringa, feuilles d'aubergine, fakoye ou d'autres légumes-feuilles vert foncé

[7] Autres fruits et légumes incluent la tomate, l'aubergine, le gombo, le concombre, le chou, ou d'autres légumes

[8] Inclut les criquets, les éphémères, le biti, les chenilles, les sauterelles

[9] Aliments sucrées sentinelle comme chocolat, bonbons, pâtisseries, gâteaux, biscuits, crèmes glacées et glaces à l'eau

[10] Aliments frits et salés sentinelle incluent des aliments comme les chips, les crisps, les choux, les frites, beignets ou les nouilles instantanées.

Tableau 11.8 Diversification alimentaire minimum, nombre minimum de repas et apport alimentaire minimum acceptable parmi les enfants

Pourcentage des plus jeunes enfants de 6–23 mois vivant avec leur mère qui ont reçu, durant le jour ou la nuit ayant précédé l'interview, la diversité alimentaire minimale, la fréquence minimale des repas et l'apport alimentaire minimum acceptable, par statut d'allaitement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Parmi les plus jeunes enfants de 6–23 mois, allaités, et vivant avec leur mère, pourcentage ayant reçu :				Parmi les plus jeunes enfants de 6–23 mois, non allaités, et vivant avec leur mère, pourcentage ayant reçu :					Parmi les plus jeunes enfants de 6–23 mois vivant avec leur mère, pourcentage ayant reçu :			
Caractéristique sociodémographique	Diversité alimentaire minimale[1]	Fréquence minimale des repas[2]	Apport alimentaire minimum acceptable[3]	Effectif d'enfants de 6–23 mois allaités	Fréquence minimale des repas lactés[4]	Diversité alimentaire minimale[1]	Fréquence minimale des repas[5]	Apport alimentaire minimum acceptable[6]	Effectif d'enfants de 6–23 mois non allaités	Diversité alimentaire minimale[1]	Fréquence minimale des repas[7]	Apport alimentaire minimum acceptable[8]	Effectif d'enfants de 6–23 mois
Âge en mois													
6–11	6,7	28,0	3,6	1 426	(33,3)	(4,5)	(32,4)	(4,5)	32	6,7	28,1	3,6	1 458
6–8	3,3	28,8	2,5	677	*	*	*	*	12	3,2	28,5	2,4	690
9–11	9,9	27,3	4,6	748	*	*	*	*	20	9,8	27,7	4,7	768
12–17	23,5	37,3	13,8	1 357	30,1	7,7	37,3	6,2	125	22,1	37,3	13,2	1 482
18–23	27,7	38,9	14,0	783	21,8	17,4	36,2	6,4	458	23,9	37,9	11,2	1 240
Sexe													
Masculin	17,6	33,5	9,7	1 786	25,5	15,2	34,6	7,2	303	17,2	33,6	9,4	2 089
Féminin	17,8	34,4	9,8	1 779	22,7	14,3	37,9	5,4	312	17,3	34,9	9,2	2 092
Résidence													
Bamako	17,4	42,8	9,5	417	34,6	17,2	58,1	9,9	82	17,4	45,3	9,6	499
Autre urbain	19,8	32,4	10,3	352	24,1	26,2	34,4	9,7	61	20,8	32,7	10,2	413
Ensemble urbain	18,5	38,0	9,9	769	30,1	21,0	48,0	9,8	143	18,9	39,6	9,9	912
Rural	17,5	32,8	9,7	2 796	22,2	12,8	32,7	5,2	472	16,8	32,8	9,1	3 268
Région													
Kayes	12,3	27,1	6,5	528	17,4	9,4	30,2	4,3	118	11,8	27,7	6,1	646
Koulikoro	17,7	35,4	10,7	845	28,0	20,9	39,8	8,0	142	18,2	36,1	10,3	987
Sikasso	16,6	31,3	8,9	739	15,3	15,2	23,4	3,1	78	16,5	30,6	8,3	817
Ségou	24,8	31,0	9,9	552	22,7	20,2	39,8	12,2	95	24,1	32,3	10,2	647
Mopti	23,2	46,2	18,2	337	28,5	6,7	30,7	0,0	68	20,4	43,6	15,1	405
Tombouctou	4,0	18,0	1,1	49	(14,8)	(0,0)	(13,5)	(0,0)	8	3,4	17,3	0,9	58
Gao	3,9	22,3	1,9	97	22,4	1,2	21,8	1,2	24	3,4	22,2	1,8	120
Kidal	†	†	†	1	†	†	†	†	0	†	†	†	2
Bamako	17,4	42,8	9,5	417	34,6	17,2	58,1	9,9	82	17,4	45,3	9,6	499
Niveau d'instruction de la mère													
Aucun	15,6	32,8	9,2	2 059	18,2	11,3	26,9	4,1	309	15,1	32,0	8,5	2 368
Primaire	17,4	33,9	10,1	636	18,0	11,2	40,8	3,8	109	16,5	34,9	9,2	745
Secondaire ou plus	22,8	36,6	10,8	870	36,6	22,0	48,4	11,1	197	22,6	38,8	10,9	1 067
Quintile de bien-être économique													
Le plus bas	17,5	34,6	9,4	778	16,0	7,5	26,7	2,6	105	16,3	33,7	8,6	883
Second	15,7	33,4	9,8	727	17,8	12,4	35,9	6,4	133	15,2	33,8	9,3	861
Moyen	16,1	29,7	9,4	711	21,7	12,4	26,6	5,9	109	15,6	29,3	8,9	819
Quatrième	17,9	35,3	9,6	711	18,4	16,4	32,3	2,4	127	17,7	34,9	8,5	837
Le plus élevé	21,8	36,9	10,8	638	42,8	22,6	54,4	12,6	142	21,9	40,1	11,1	780
Ensemble	17,7	33,9	9,8	3 565	24,1	14,7	36,3	6,3	615	17,3	34,3	9,3	4 180

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

[1] Les enfants qui ont reçu une diversité alimentaire minimale sont ceux qui ont consommé des aliments appartenant à, au moins, 5 groupes d'aliments parmi les 8 groupes suivants : a. lait maternel; b. céréales, racines, tubercules blancs/pâles et plantains ; c. haricots, pois, lentilles, noix et graines; d. produits laitiers (en boite, en poudre, ou lait d'animal frais, lait maternisé, yaourt, fromage); e. produits carnés (viande, poisson, volaille, abats); f. œufs; g. fruits et légumes riches en vitamine ; h. autres fruits et légumes.

[2] Les enfants allaités qui ont reçu la fréquence minimale des repas sont ceux qui ont consommé des aliments solides, semi-solides ou mous au moins 2 fois par jour dans le groupe d'âges 6–8 mois et au moins 3 fois par jour dans le groupe d'âges 9–23 mois.

[3] Sont considérés comme ayant reçu un apport alimentaire minimum acceptable les enfants allaités dont l'alimentation comprend la diversité alimentaire minimale (note de bas de page 1) et la fréquence minimale des repas (note de bas de page 2)

[4] Sont considérés comme ayant reçu la fréquence minimale des repas lactés, les enfants non allaités ayant reçu au moins 2 repas comprenant du lait maternisé, du lait en conserve ou en poudre, ou du lait frais d'animal ainsi que du yaourt solide ou à boire

[5] Les enfants non allaités qui ont reçu la fréquence minimale des repas sont ceux qui ont reçu des aliments solides, semi-solides ou mous ou des aliments lactés au moins 4 fois par jour. Au moins un de ces repas doit contenir de aliments solides, semi-solides, ou mous.

[6] Sont considérés comme ayant reçu un apport alimentaire minimum acceptable, les enfants non allaités dont l'alimentation comprend la diversité alimentaire minimale (note de bas de page 1), la fréquence minimale des repas lactés (note de bas de page 4), et la fréquence minimale des repas (note de bas de page 5)

[7] La fréquence minimale des repas consiste à recevoir le nombre minimum recommandé de repas par jour en fonction de l'âge de l'enfant et selon qu'il est, ou non, allaité tel que défini aux notes de bas de page 2 et 5.

[8] Sont considérés comme ayant reçu un apport alimentaire minimum acceptable, les enfants dont l'alimentation comprend la diversité alimentaire minimale (note de bas de page 1), la fréquence minimale des repas (note de bas de page 2 pour ceux allaités et note de bas de page 5 pour ceux non allaités), et la fréquence minimale des repas lactés (note de bas de page 4 pour les enfants non allaités)

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 11.9 Consommation d'œuf et/ou de produits d'originale animale et pratiques alimentaires malsaines parmi les enfants de 6–23 mois

Pourcentage d'enfants les plus jeunes de 6–23 mois vivant avec leur mère et qui ont consommé des œufs et/ou des produits carnés, et pourcentage ayant eu des pratiques alimentaires malsaines spécifiées, durant le jour ou la nuit ayant précédé l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Œufs et/ou produits carnés (viande, poisson, poulet, abats)	Pratiques alimentaires malsaines :			Effectif d'enfants derniers-nés de 6–23 mois vivant avec leur mère
		Boissons sucrées[1]	Nourritures malsaines[2]	Aucun légume ou fruit[3]	
Âge en mois					
6–11	19,2	20,3	15,1	77,1	1 458
6–8	11,0	13,4	8,7	86,1	690
9–11	26,7	26,4	20,9	69,1	768
12–17	40,2	40,1	33,2	50,4	1 482
18–23	47,0	48,3	40,2	43,0	1 240
Sexe					
Masculin	34,4	36,1	28,6	58,3	2 089
Féminin	35,4	35,1	29,4	56,8	2 092
Allaitement					
Allaité	32,1	33,2	26,9	59,9	3 565
Non allaité	51,1	49,3	41,0	43,7	615
Résidence					
Bamako	35,9	49,4	34,1	55,2	499
Autre urbain	41,4	38,4	35,2	58,4	413
Ensemble urbain	38,4	44,4	34,6	56,6	912
Rural	33,9	33,1	27,4	57,8	3 268
Région					
Kayes	26,1	33,0	18,9	62,7	646
Koulikoro	33,1	28,2	35,3	56,6	987
Sikasso	31,4	35,6	24,1	54,8	817
Ségou	47,4	40,6	29,1	54,6	647
Mopti	43,9	38,5	38,9	55,5	405
Tombouctou	33,7	28,4	9,1	84,6	58
Gao	20,3	19,7	19,5	75,5	120
Kidal	†	†	†	†	2
Bamako	35,9	49,4	34,1	55,2	499
Niveau d'instruction de la mère					
Aucun	32,2	33,0	25,1	58,8	2 368
Primaire	33,5	34,2	30,9	58,7	745
Secondaire ou plus	42,0	42,3	36,3	53,9	1 067
Quintile de bien-être économique					
Le plus bas	28,9	28,8	24,5	54,0	883
Second	31,7	32,1	23,2	56,7	861
Moyen	33,2	32,7	25,6	61,9	819
Quatrième	40,0	38,8	31,6	59,1	837
Le plus élevé	41,5	46,8	41,2	56,2	780
Ensemble	34,9	35,6	29,0	57,5	4 180

[1] Boissons sucrées incluant lait sucré/aromatisé et yaourts à boire, laits à base de soja ou de noix sucrés/aromatisés, jus de fruit et boissons aromatisées aux fruits, boissons aromatisées au chocolat, sodas, boissons à base de malt, boissons énergétiques, et boissons énergisantes, thé, café, tisane sucré et autres boissons sucrées.
[2] Les aliments malsains comprennent des types d'aliments courants incluant des aliments sucrés comme le chocolat, les bonbons, les pâtisseries, gâteaux, biscuits, crèmes glacées, glaces à l'eau ; et des aliments frits at salés comme les chips, crisps, chips soufflés, les frites et les beignets frits.
[3] Pas de fruits ou de légumes riches en vitamine A et aucun autre fruit ou légume
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 11.10 Indicateurs d'évaluation des Pratiques d'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (PANJE)

Pourcentage d'enfants nourris en suivant les différentes pratiques PANJE, EDSM-VII Mali 2023–2024

Indicateur	%	N
Pourcentage d'enfants nés au cours des 2 dernières années ayant déjà été allaités	95,9	6 413
Pourcentage d'enfants nés au cours des 2 dernières années qui ont été mis au sein dans l'heure qui a suivi leur naissance	45,5	6 413
Pourcentage d'enfants nés au cours des 2 dernières années exclusivement allaités au lait maternel pendant les 2 jours qui ont suivi la naissance	48,3	6 413
Pourcentage d'enfants de 0–5 mois qui ont été exclusivement allaités au lait maternel le jour précédent	40,4	1 710
Pourcentage d'enfants de 0–5 mois ayant reçu le lait maternel et un lait maternisé et/ou du lait d'animal le jour précédent	8,8	1 710
Pourcentage d'enfants de 12–23 mois ayant reçu du lait maternel le jour précédent	75,8	2 892
Pourcentage d'enfants de 6–8 mois ayant consommé des aliments solides, semi-solides ou mous le jour précédent	38,3	690
Pourcentage d'enfants de 6–23 mois ayant consommé le jour précédent des aliments et des boissons d'au moins 5 groupes parmi les 8 groupes définis	17,3	4 180
Pourcentage d'enfants de 6–23 mois qui ont consommé, au moins le nombre minimum de fois le jour précédent, des aliments solides, semi-solides ou mous (incluant aussi les produits laitiers pour les enfants non allaités)	34,3	4 180
Pourcentage d'enfants de 6–23 mois non allaités qui ont reçu, le jour précédent, au moins 2 repas lactés	24,1	615
Pourcentage d'enfants de 6–23 mois ayant reçu, le jour précédent, l'apport alimentaire minimum acceptable	9,3	4 180
Pourcentage d'enfants de 6–23 mois ayant consommé, le jour précédent, des œufs et/ou des produits carnés	34,9	4 180
Pourcentage d'enfants de 6–23 mois qui ont consommé, le jour précédent, des boissons sucrés	35,6	4 180
Pourcentage d'enfants de 6–23 mois qui ont consommé, le jour précédent, des aliments malsains courants	29,0	4 180
Pourcentage d'enfants de 6–23 mois qui n'ont consommé aucun légume ou fruit le jour précédent	57,5	4 180
Pourcentage d'enfants de 0–23 mois nourris avec un biberon le jour précédent	10,1	6 127

[1] Y compris les enfants nés au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, que les enfants soient en vie ou décédés au moment de l'enquête

Tableau 11.11 Conseil sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant

Parmi les femmes de 15–49 ans dont l'enfant le plus jeune de 6–23 mois vit avec elles, pourcentage ayant parlé, dans les 6 derniers mois, avec un prestataire de santé ou un agent de santé communautaire de la façon ou de quoi nourrir leur enfant, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Conseillée dans les 6 derniers mois sur l'alimentation de leur enfant	Effectif de femmes dont l'enfant le plus jeune de 6–23 mois vit avec elles
Âge de l'enfant en mois		
6–11	11,1	1 458
12–23	12,0	2 723
Sexe de l'enfant		
Masculin	11,7	2 089
Féminin	11,6	2 092
Âge		
15–19	7,5	369
20–29	11,1	2 204
30–39	13,5	1 315
40–49	13,3	293
Résidence		
Bamako	17,7	499
Autre urbain	19,0	413
Ensemble urbain	18,2	912
Rural	9,8	3 268
Région		
Kayes	11,6	646
Koulikoro	11,1	987
Sikasso	9,7	817
Ségou	11,4	647
Mopti	11,1	405
Tombouctou	3,7	58
Gao	12,7	120
Kidal	†	2
Bamako	17,7	499
Niveau d'instruction		
Aucun	9,6	2 368
Primaire	12,1	745
Secondaire ou plus	16,0	1 067
Quintile de bien-être économique		
Le plus bas	7,2	883
Second	11,2	861
Moyen	8,6	819
Quatrième	14,4	837
Le plus élevé	17,5	780
Ensemble	11,7	4 180

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 11.12 Prévalence de l'anémie chez les enfants

Pourcentage d'enfants de 6–59 mois considérés comme étant atteints d'anémie en utilisant les nouvelles directives de l'OMS, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	6–23 mois 24–59 mois	Anémie selon le niveau d'hémoglobine Anémie <10.5 g/dl <11.0 g/dl	Légère 9.5–10.4 g/dl 10.0–10.9 g/dl	Modérée 7.0–9.4 g/dl 7.0–9.9 g/dl	Sévère <7.0 g/dl <7.0 g/dl	Effectif d'enfants de 6–59 mois
Âge en mois						
6–11		70,7	27,1	41,4	2,1	783
12–23		80,1	27,2	49,8	3,1	1 568
24–35		83,9	25,9	55,3	2,6	1 681
36–47		71,8	27,3	42,3	2,2	1 563
48–59		60,3	29,2	30,5	0,6	1 560
6–23		77,0	27,2	47,0	2,8	2 350
24–59		72,3	27,4	43,0	1,8	4 803
Sexe						
Masculin		75,5	26,4	46,8	2,2	3 603
Féminin		72,1	28,3	41,8	2,0	3 551
Interview de la mère						
Interviewée		74,2	27,4	44,8	2,0	6 628
Mère non interviewée et vivant dans le ménage		65,8	27,3	37,6	0,9	168
Mère non interviewée et ne vivant pas dans le ménage[1]		70,4	27,2	38,8	4,3	358
Résidence						
Bamako		67,7	34,8	31,8	1,1	791
Autre urbain		68,0	27,2	39,0	1,8	651
Ensemble urbain		67,8	31,4	35,0	1,4	1 442
Rural		75,3	26,3	46,7	2,3	5 711
Région						
Kayes		79,4	27,3	49,1	3,0	1 037
Koulikoro		75,6	24,8	49,4	1,3	1 718
Sikasso		73,7	27,8	43,3	2,6	1 430
Ségou		74,8	27,1	45,5	2,3	1 150
Mopti		70,5	25,6	42,7	2,3	654
Tombouctou		66,6	27,4	37,7	1,5	143
Gao		65,5	24,5	37,2	3,8	227
Kidal		†	†	†	†	3
Bamako		67,7	34,8	31,8	1,1	791
Niveau d'instruction de la mère[2]						
Aucun		76,5	26,7	47,6	2,2	4 047
Primaire		74,5	27,5	44,9	2,1	1 204
Secondaire ou plus		67,0	28,9	36,7	1,4	1 545
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas		75,6	25,4	47,8	2,4	1 629
Second		77,7	26,0	49,6	2,1	1 524
Moyen		76,1	27,1	45,8	3,1	1 407
Quatrième		71,8	27,2	42,7	1,8	1 362
Le plus élevé		66,3	32,0	33,3	0,9	1 231
Ensemble		73,8	27,3	44,3	2,1	7 154

Notes : Le tableau est basé sur les enfants qui ont passé la nuit ayant précédé l'interview dans le ménage et qui ont été testés pour l'anémie. La prévalence de l'anémie, basée sur le niveau d'hémoglobine, est ajustée en fonction de l'altitude en utilisant les formules du CDC, 1998 et seuils définis dans OMS, 2024. Hémoglobine est en grammes par décilitre (g/dl) en utilisant l'appareil HemoCue 201+.

[1] Y compris les enfants dont la mère est décédée

[2] Pour les femmes qui n'ont pas été interviewées, l'information provient du questionnaire Ménage. Non compris les enfants dont la mère n'est pas listée dans le questionnaire Ménage.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 11.13 Suppléments en micronutriments et déparasitage parmi les enfants

Parmi les enfants de 6–59 mois, pourcentage à qui on a donné, dans les 12 derniers mois, du fer, en comprimés ou en sirop, des micronutriments en poudre et des suppléments contenant du fer et pourcentage à qui on a donné, dans les 6 derniers mois, des suppléments de vitamine A ; parmi les enfants de 12–59 mois, pourcentage à qui on a donné, dans les 6 derniers mois, des médicaments pour le déparasitage, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Parmi les enfants de 6–59 mois :					Parmi les enfants de 12–59 mois :	
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage à qui on a donné du fer, en sirop ou en comprimés, dans les 12 derniers mois[1]	Pourcentage à qui on a donné des micronutriments multiples en poudre dans les 12 derniers mois[1,2]	Pourcentage à qui on a donné des suppléments contenant du fer dans les 12 derniers mois[1,3]	Pourcentage à qui on a donné des suppléments de vitamine A dans les 6 derniers mois[4]	Effectif d'enfants	Pourcentage à qui on a donné des médicaments pour le déparasitage dans les 6 derniers mois[1,5]	Effectif d'enfants
Âge en mois							
6–8	15,1	12,4	23,6	60,4	704	na	na
9–11	14,3	14,6	23,4	72,1	786	na	na
12–17	17,7	17,2	27,4	69,7	1 536	46,3	1 536
18–23	19,2	16,9	28,5	64,1	1 356	48,0	1 356
24–35	19,2	13,0	25,1	60,7	3 018	48,1	3 018
36–47	17,3	9,2	20,5	59,1	2 870	50,0	2 870
48–59	14,3	7,2	16,5	54,4	2 816	45,8	2 816
6–23	17,2	15,9	26,4	66,9	4 382	47,1	2 892
24–59	17,0	9,9	20,8	58,1	8 704	48,0	8 704
Sexe							
Masculin	16,8	12,3	22,8	62,0	6 569	48,5	5 800
Féminin	17,3	11,4	22,5	60,2	6 518	47,0	5 796
Allaitement[6]							
Allaite	16,8	15,7	25,7	67,0	3 897	46,4	2 443
N'allaite pas	19,4	13,6	26,0	61,5	3 503	48,5	3 467
Âge de la mère							
15–19	19,3	15,3	26,3	60,3	666	44,6	511
20–29	16,4	11,7	22,2	60,7	6 559	46,4	5 760
30–39	17,2	12,0	22,5	61,1	4 603	48,7	4 161
40–49	18,9	10,4	23,7	63,5	1 259	52,5	1 165
Résidence							
Bamako	11,5	10,1	16,9	65,3	1 523	44,2	1 350
Autre urbain	15,4	13,6	23,4	57,3	1 305	46,2	1 147
Ensemble urbain	13,3	11,7	19,9	61,6	2 828	45,1	2 497
Rural	18,1	11,9	23,4	60,9	10 258	48,5	9 100
Région							
Kayes	28,0	9,8	32,4	70,2	1 982	60,2	1 758
Koulikoro	13,3	8,4	17,0	67,9	3 081	55,2	2 748
Sikasso	15,1	15,6	23,6	57,3	2 568	42,2	2 234
Ségou	22,7	13,8	28,2	58,9	2 050	44,0	1 813
Mopti	13,2	16,2	22,0	48,8	1 260	43,8	1 128
Tombouctou	14,4	14,2	15,6	21,6	235	4,1	222
Gao	9,7	7,4	11,6	44,1	382	36,3	338
Kidal	†	†	†	†	5	†	5
Bamako	11,5	10,1	16,9	65,3	1 523	44,2	1 350
Niveau d'instruction de la mère							
Aucun	17,5	10,7	22,2	58,5	7 828	46,2	6 996
Primaire	17,2	12,5	23,4	63,7	2 265	47,9	1 985
Secondaire ou plus	15,9	14,4	23,4	65,8	2 993	52,0	2 615
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	17,2	12,0	23,5	62,1	2 733	51,1	2 414
Second	19,6	11,9	24,6	61,4	2 754	49,7	2 442
Moyen	20,1	12,7	25,5	58,5	2 653	44,9	2 364
Quatrième	13,9	10,1	18,4	59,5	2 645	46,4	2 371
Le plus élevé	13,9	12,7	20,9	64,3	2 301	46,4	2 005
Ensemble	17,1	11,9	22,7	61,1	13 086	47,8	11 596

na = non applicable
[1] Basé sur la déclaration de la mère
[2] Le/les noms de poudres de micronutriments multiples incluent MOUGOU-DLANIN.
[3] Les suppléments contenant du fer incluent les comprimés, le sirop ou les poudres de micronutriments.
[4] Basé sur la déclaration de la mère et le carnet de vaccination (quand il est disponible)
[5] Les médicaments pour les parasites intestinaux sont couramment donnés pour traiter les helminthes et la schistosomiase.
[6] Information disponible pour les enfants de 0–35 mois seulement
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 11.14.1 État nutritionnel des femmes de 20–49 ans

Parmi les femmes de 20–49 ans, pourcentage ayant une taille inférieure à 145 cm, Indice de Masse Corporelle (IMC) moyen et pourcentage ayant certains niveaux d'IMC, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Petite taille		Indice de Masse Corporelle[1]								
Caractéristique sociodémographique	Taille inférieure à 145 cm	Effectif de femmes	Indice de Masse Corporelle moyen (IMC)	18,5–24,9 (total normal)	<18,5 (total maigre)	17,0–18,4 (maigreur légère)	<17,0 (maigreur modérée et sévère)	≥25,0 (total en surpoids ou obèse)	25,0–29,9 (en surpoids)	≥30.0 (obèse)	Effectif de femmes
Âge											
20–29	0,4	3 176	22,9	68,3	8,8	6,2	2,7	22,9	16,1	6,7	2 553
30–39	0,3	2 220	25,1	52,8	4,6	3,5	1,1	42,6	26,1	16,5	1 887
40–49	0,3	1 370	25,5	49,4	6,1	4,9	1,2	44,5	24,8	19,7	1 316
Résidence											
Bamako	0,2	974	26,0	44,5	5,3	3,5	1,8	50,2	29,2	21,0	884
Autre urbain	0,2	728	25,5	49,1	6,2	4,3	1,9	44,7	22,4	22,3	619
Ensemble urbain	0,2	1 702	25,8	46,4	5,7	3,8	1,9	48,0	26,4	21,5	1 503
Rural	0,4	5 063	23,6	63,3	7,2	5,4	1,8	29,4	19,6	9,8	4 254
Région											
Kayes	0,2	996	23,3	62,4	9,4	6,2	3,3	28,2	19,9	8,2	858
Koulikoro	0,4	1 583	24,0	58,9	8,0	5,8	2,1	33,1	21,3	11,9	1 345
Sikasso	0,3	1 253	23,5	65,8	5,8	5,3	0,5	28,5	18,0	10,4	1 025
Ségou	0,1	1 074	24,1	61,9	5,9	4,7	1,2	32,2	19,4	12,7	879
Mopti	0,7	590	24,2	63,1	4,7	3,3	1,4	32,2	20,6	11,6	509
Tombouctou	1,4	106	25,9	55,2	1,4	1,4	0,0	43,4	22,2	21,2	90
Gao	0,8	188	24,4	48,6	12,9	7,4	5,4	38,5	21,0	17,5	164
Kidal	†	2	†	†	†	†	†	†	†	†	2
Bamako	0,2	974	26,0	44,5	5,3	3,5	1,8	50,2	29,2	21,0	884
Niveau d'instruction											
Aucun	0,4	3 990	23,7	62,2	7,7	5,7	2,0	30,1	19,9	10,3	3 358
Primaire	0,2	1 083	24,7	58,5	5,0	4,1	0,9	36,5	21,3	15,2	930
Secondaire ou plus	0,3	1 692	25,0	51,7	6,0	4,0	2,0	42,3	24,9	17,4	1 469
Quintile de bien-être économique											
Le plus bas	0,6	1 345	22,5	72,2	8,5	6,7	1,7	19,3	14,4	5,0	1 103
Second	0,4	1 300	22,8	69,4	9,0	6,6	2,4	21,6	15,6	6,0	1 061
Moyen	0,1	1 274	23,9	62,7	6,1	4,4	1,6	31,3	20,9	10,4	1 068
Quatrième	0,1	1 378	25,0	51,3	6,0	4,3	1,7	42,7	26,7	16,0	1 213
Le plus élevé	0,4	1 468	26,3	43,2	5,0	3,3	1,7	51,7	27,4	24,3	1 312
Ensemble	0,3	6 765	24,2	58,9	6,8	5,0	1,8	34,3	21,4	12,9	5 757

Note : L'Indice de Masse Corporelle (IMC) est le ratio du poids en kilogrammes par rapport au carré de la taille en mètres (kg/m2) pour les adultes de 20–49 ans.
[1] Sont exclues les femmes enceintes et les femmes ayant eu une naissance dans les 2 mois précédents
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 11.14.2 État nutritionnel des femmes adolescentes de 15–19 ans

Parmi les femmes de 15–19 ans, pourcentage dont la taille-pour-âge est inférieure à -2 écart type (ET), *z* score moyen de l'Indice de Masse Corporelle (IMC) pour-âge, et pourcentage avec des niveaux spécifiques d'IMC pour l'âge, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Petite taille		Indice de Masse Corporelle-pour-âge[1]								
Caractéristique sociodémographique	Taille-pour-âge en dessous de -2 ET	Effectif de femmes	*z* score moyen de l'IMC-pour-âge	-1 ET to +1 ET (total normal)	< -1 ET (total maigre) [2]	< -1 ET to -2 ET (maigreur légère)	< -2 ET (Maigreur modérée ou sévère)	> +1 ET (total en surpoids ou obèse)[3]	> +1 ET à +2 ET (Surpoids)	> +2 ET (obèse)	Effectif de femmes
Résidence											
Bamako	3,7	381	0,1	65,8	14,0	10,1	4,0	20,2	16,4	3,8	360
Autre urbain	2,5	264	0,1	69,8	14,0	12,9	1,1	16,2	12,4	3,8	247
Ensemble urbain	3,2	644	0,1	67,4	14,0	11,2	2,8	18,6	14,8	3,8	606
Rural	4,0	1 290	-0,2	68,2	20,3	16,7	3,5	11,5	9,7	1,8	1 137
Région											
Kayes	1,7	328	-0,2	65,4	23,0	18,4	4,6	11,6	9,3	2,3	285
Koulikoro	2,9	451	-0,0	69,4	17,1	14,3	2,8	13,5	11,2	2,3	401
Sikasso	6,6	317	-0,2	72,7	17,2	14,7	2,5	10,1	8,5	1,6	272
Ségou	3,3	229	-0,2	68,1	21,1	18,6	2,5	10,8	8,1	2,7	216
Mopti	2,9	142	-0,0	67,3	17,3	14,9	2,4	15,4	15,4	0,0	130
Tombouctou	11,6	33	0,5	71,5	5,7	5,7	0,0	22,8	18,0	4,8	30
Gao	6,1	53	-0,3	59,2	29,2	22,0	7,2	11,5	7,3	4,3	48
Kidal	†	1	†	†	†	†	†	†	†	†	0
Bamako	3,7	381	0,1	65,8	14,0	10,1	4,0	20,2	16,4	3,8	360
Niveau d'instruction											
Aucun	5,0	661	-0,1	73,9	14,8	11,7	3,1	11,3	10,5	0,8	581
Primaire	3,8	430	-0,1	64,9	21,6	16,8	4,8	13,6	11,4	2,2	376
Secondaire ou plus	2,7	844	-0,0	65,0	18,9	16,1	2,7	16,1	12,3	3,9	786
Quintile de bien-être économique											
Le plus bas	5,5	224	-0,3	69,9	22,7	16,8	5,9	7,4	6,2	1,2	181
Second	4,7	292	-0,2	68,8	19,3	16,8	2,6	11,8	10,4	1,5	239
Moyen	5,2	360	-0,2	70,6	19,9	16,9	3,0	9,5	8,0	1,6	323
Quatrième	1,0	437	-0,1	67,3	18,7	15,7	3,0	14,0	11,3	2,7	404
Le plus élevé	3,7	622	0,1	66,0	14,8	11,6	3,2	19,2	15,6	3,6	596
Ensemble	3,7	1 935	-0,1	68,0	18,1	14,8	3,3	14,0	11,5	2,5	1 743

Note : La taille-pour âge et l'Indice de Masse Corporelle (IMC)-pour-âge sont exprimés en termes d'unités d'écart type (ET) par rapport à la médiane des normes OMS de croissance des femmes adolescentes de 15–19 ans.

[1] Non compris les femmes enceintes et les femmes ayant eu une naissance dans les 2 mois précédents

[2] Y compris les femmes adolescentes de 15–19 ans qui sont en dessous de -2 écart type (ET) par rapport à la médiane de la population de référence de croissance de l'OMS

[3] Y compris les adolescentes de 15–19 ans qui sont au-dessus de +2 écart type (ET) par rapport à la médiane de la population de référence de croissance de l'OMS

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 11.15 Aliments et liquides consommés par les femmes le jour ou la nuit ayant précédé l'interview

Pourcentage de femmes de 15–49 ans par type d'aliments et de liquides consommés le jour ou la nuit ayant précédé l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Céréales[1]	Racines, tubercules et plantains[2]	Légumineuses (haricots, pois, lentilles)[3]	Noix et graines[4]	Produits laitiers (lait, yaourt, fromage)	Aliments carnés (viande, poisson, volaille, abats)[5]	Œufs	Légumes à feuille vert foncé[6]	Fruits et légumes riches en vitamine A[7]	Autres légumes[8]	Autres fruits[9]	Insectes et autres petits aliments contenant des protéines[10]	Huile de palme rouge	Aliments sucrés[11]	Aliments frits[12]	Jus de fruit ou boissons aromatisées au fruit	Sodas, boissons à base de malt, boissons énergétiques ou boissons énergisantes	Thé, café et tisanes sucrés ou autres boissons sucrées[13]	Effectif de femmes
Âge																			
15–19	98,3	28,7	13,4	41,2	22,2	72,6	12,9	39,9	24,9	44,1	24,7	0,6	4,1	24,1	14,8	22,9	10,4	48,9	3 862
20–29	98,2	24,2	13,2	42,0	22,2	69,5	11,4	42,1	23,9	41,4	23,0	0,6	3,7	18,7	12,8	18,1	10,2	56,7	6 283
30–39	98,5	23,9	13,6	43,8	22,0	69,6	8,1	43,6	23,4	40,0	21,8	0,6	3,3	17,4	12,3	18,1	9,6	62,9	4 446
40–49	97,7	24,5	16,0	48,8	24,4	70,5	8,4	45,3	24,7	41,6	22,3	0,7	3,5	15,7	13,1	16,3	8,9	63,7	2 755
Maternité																			
Enceinte	98,5	22,9	10,0	41,3	20,7	64,9	8,6	46,2	22,6	41,0	21,7	0,5	3,5	16,0	11,7	16,3	8,0	53,4	1 814
Non enceinte[14]	98,2	25,4	14,2	43,6	22,7	71,0	10,6	42,1	24,3	41,8	23,1	0,6	3,7	19,4	13,3	19,2	10,1	58,2	15 533
Résidence																			
Bamako	97,1	38,4	13,3	32,9	23,5	82,5	24,3	34,4	30,3	58,7	38,2	0,5	9,1	15,6	16,6	24,5	18,3	62,4	2 675
Autre urbain	98,1	32,7	12,4	34,9	23,4	78,3	13,9	35,6	26,5	52,5	32,2	0,9	4,6	25,5	15,1	24,3	13,8	54,9	2 048
Ensemble urbain	97,6	35,9	12,9	33,8	23,5	80,7	19,8	34,9	28,7	56,0	35,6	0,7	7,2	19,9	16,0	24,4	16,4	59,2	4 723
Rural	98,5	21,1	14,1	46,9	22,1	66,5	6,9	45,3	22,4	36,3	18,2	0,6	2,3	18,8	12,1	16,8	7,5	57,1	12 624
Région																			
Kayes	99,3	21,8	18,9	61,7	20,5	65,3	7,0	49,4	18,8	36,3	16,6	0,7	2,8	18,9	13,7	13,4	8,0	64,0	2 635
Koulikoro	99,1	23,5	11,6	39,5	20,7	69,6	10,3	40,7	25,5	39,0	24,4	0,2	3,7	19,5	15,6	17,1	8,3	54,3	4 018
Sikasso	98,5	25,4	13,6	45,9	18,2	59,8	6,4	40,9	23,8	40,6	23,4	0,3	1,7	17,9	7,7	19,1	7,9	55,8	3 143
Ségou	98,8	21,7	13,8	50,0	23,9	73,4	8,5	48,3	23,8	41,1	20,1	0,5	2,5	22,5	10,2	20,4	8,7	58,9	2 574
Mopti	98,4	19,4	14,2	41,0	39,0	80,0	7,2	44,5	20,4	41,8	14,1	2,1	2,6	22,5	20,5	24,7	9,4	58,4	1 530
Tombouctou	99,3	18,2	4,2	10,8	21,9	76,5	3,4	33,9	16,6	13,7	10,2	0,1	1,1	10,7	2,2	4,7	4,3	42,0	281
Gao	85,2	23,7	12,5	7,4	11,2	56,9	4,2	42,8	27,6	26,2	8,5	1,6	1,2	20,4	5,7	12,4	9,8	37,5	485
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	6
Bamako	97,1	38,4	13,3	32,9	23,5	82,5	24,3	34,4	30,3	58,7	38,2	0,5	9,1	15,6	16,6	24,5	18,3	62,4	2 675
Niveau d'instruction																			
Aucun	98,4	20,0	13,9	46,0	20,3	64,8	6,1	44,5	20,9	36,4	17,0	0,5	2,5	16,4	10,6	14,5	5,9	57,6	9 382
Primaire	98,0	25,0	14,8	46,8	22,6	72,0	9,3	43,3	23,9	42,9	23,2	0,6	3,7	19,0	13,9	19,8	9,7	58,6	2 926
Secondaire ou plus	98,0	34,9	12,9	36,4	26,5	79,8	19,1	38,4	30,3	50,8	33,9	0,7	5,7	24,1	17,5	26,5	17,4	57,3	5 039
Quintile de bien-être économique																			
Le plus bas	98,8	16,1	16,4	51,6	20,8	56,6	2,6	53,1	17,3	31,9	15,0	0,9	1,2	21,3	10,8	13,8	3,5	57,4	3 036
Second	98,8	18,7	15,2	53,3	21,6	57,5	3,5	50,0	20,0	31,8	13,2	0,2	1,3	17,5	9,4	12,6	5,3	55,8	3 143
Moyen	98,7	19,9	13,8	46,3	22,1	67,1	5,3	44,0	22,2	36,3	18,2	0,5	2,1	16,5	10,9	15,8	7,7	57,2	3 318
Quatrième	97,3	27,8	12,0	37,1	20,1	78,8	12,0	35,4	27,2	47,6	25,7	0,7	4,4	19,0	12,5	22,5	11,6	57,1	3 676
Le plus élevé	97,8	38,5	12,4	33,0	26,8	85,3	23,9	34,1	31,1	55,2	37,4	0,7	7,8	20,9	20,0	26,6	18,2	60,1	4 174
Ensemble	98,2	25,2	13,8	43,3	22,5	70,4	10,4	42,5	24,1	41,7	22,9	0,6	3,7	19,1	13,2	18,9	9,9	57,7	17 347

Note : Se reporter au Questionnaire Femme pour la liste des liquides et aliments.
[1] Inclut le riz, le pain, le macaroni, le spaghetti, le couscous, le tô, ou la bouillie
[2] Inclut le manioc, l'attiéké, l'igname, la patate douce à chair blanche, la pomme de terre, le taro, ou la banane plantain
[3] Inclut le haricot, le sô haricot, les petits pois, le voandzou, ou soja
[4] Inclut les arachides, cacahuètes, sauce d'arachide, ou noix de cajou
[5] Inclut le poisson frais, fumé ou séché, les sardines en boîte, le crabes, les crevettes, le foie, le poumon, le cœur, les rognons, les viandes séchées, les saucissons, le jambon, le corne bœuf, le pâté, le bœuf, le mouton, la chèvre, le porc, la viande de brousse, ou les autres oiseaux
[6] Inclut la sauce feuille, feuilles de patate douce, feuilles de moringa, feuilles d'aubergine, fakoye ou d'autres légumes-feuilles vert foncé
[7] Inclut les carottes, les courges, ou patate douce à chair jaune ou orange
[8] Autres légumes incluent la tomate, l'aubergine, le gombo, le concombre, le chou, ou d'autres légumes.
[9] Autres fruits incluent la banane, avocat, pastèque, jujubier, orange, ou d'autres fruits.
[10] Inclut les criquets, les éphémères, le biti, les chenilles, les sauterelles
[11] Aliments sucrées sentinelle comme chocolat, bonbons, pâtisseries, gâteaux, biscuits, crèmes glacées et glaces à l'eau
[12] Aliments frits et salés sentinelle incluent des aliments comme les chips, les crisps, les choux, les frites, beignets ou les nouilles instantanées.
[13] Autres boissons sucrées incluent des boissons comme les laits sucrés/aromatisés et les yaourts à boire, les laits sucrés/aromatisés à base de soja ou de noix et les boissons aromatisées au chocolat.
[14] Y compris les femmes qui ne savent pas si elles sont enceintes
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 11.16 Diversification alimentaire minimum et consommation d'aliments et de boissons malsaines parmi les femmes

Pourcentage de femmes de 15–49 ans qui consomment des boissons sucrées, pourcentage qui consomment des aliments malsaines sentinelles et pourcentage dont l'alimentation correspond aux critère de la diversification alimentaire minimum pour les femmes, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Diversification alimentaire minimum pour les femmes[1]	Consommation de boissons sucrées[2]	Consommation d'aliments malsaines[3]	Effectif de femmes
Âge				
15–19	34,8	60,7	33,2	3 862
20–29	32,7	64,0	27,1	6 283
30–39	32,5	68,3	26,1	4 446
40–49	35,1	68,8	24,7	2 755
Maternité				
Enceinte	29,4	59,3	23,7	1 814
Non enceinte[4]	34,0	65,8	28,3	15 533
Résidence				
Bamako	46,0	75,8	27,5	2 675
Autre urbain	37,8	67,1	34,3	2 048
Ensemble urbain	42,4	72,0	30,4	4 723
Rural	30,2	62,5	26,9	12 624
Région				
Kayes	32,1	67,5	29,2	2 635
Koulikoro	29,5	60,6	30,4	4 018
Sikasso	29,7	63,3	22,0	3 143
Ségou	37,7	65,6	28,1	2 574
Mopti	35,7	66,9	35,4	1 530
Tombouctou	10,2	47,5	12,1	281
Gao	15,4	44,9	22,7	485
Kidal	†	†	†	6
Bamako	46,0	75,8	27,5	2 675
Niveau d'instruction				
Aucun	28,2	62,4	23,8	9 382
Primaire	33,9	66,0	28,3	2 926
Secondaire ou plus	43,1	69,7	35,1	5 039
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	25,7	61,1	27,6	3 036
Second	26,8	60,0	24,2	3 143
Moyen	30,6	62,5	24,1	3 318
Quatrième	34,5	65,4	27,3	3 676
Le plus élevé	45,7	73,7	34,1	4 174
Ensemble	33,5	65,1	27,8	17 347

[1] Par définition, la diversification alimentaire minimum pour les femmes comprend la consommation d'aliments d'au moins 5 groupes d'aliments parmi les 10 groupes : a. Céréales, racines, tubercules, et plantains ; b. Légumes secs (haricots, pois , lentilles) ; c. Noix et graines ; d. Produits laitiers (lait, fromage, yaourt) ; e. Aliments carnés (viande, poisson, volaille, abats) ; f. Œufs; g. Légumes à feuille vert foncé ; h. Légumes et fruits riches en vitamine A ; i. Autres légumes ; j. Autres fruits.
[2] Les boissons sucrées incluent les laits sucrés/aromatisés et les yaourts à boire, les laits sucrés/aromatisés à base de soja ou de noix, les jus de fruit et boissons aromatisées au fruit, boissons aromatisées au chocolat, les sodas, boissons à base de malt, boissons énergétiques et boissons énergisantes, thé, café, et tisane sucrés et d'autres liquides sucrés.
[3] Les aliments malsains sont un groupe de types d'aliments sentinelles incluent les aliments sucrés comme les chocolats, bonbons, pâtisseries, gâteaux, biscuits, crèmes glacées, ou glaces à l'eau ; et des aliments fris et salés comme les chips, crisps, chips soufflés, frites, beignets frits, ou les nouilles instantanées.
[4] Y compris les femmes qui ne savent pas si elles sont enceintes
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 11.17 Prévalence de l'anémie chez les femmes

Pourcentage de femmes de 15–49 ans considérés comme étant atteintes d'anémie en utilisant les nouvelles directives de l'OMS, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique		Anémie selon le niveau d'hémoglobine				Effectif de femmes
		Anémie	Légère	Modérée	Sévère	
	Non enceinte	<12.0 g/dl	11.0–11.9 g/dl	8.0–10.9 g/dl	<8.0 g/dl	
	Enceinte 1er trimestre	<11.0 g/dl	10.0–10.9 g/dl	7.0–9.9 g/dl	<7.0 g/dl	
	Enceinte 2d trimestre	<10.5 g/dl	9.5–10.4 g/dl	7.0–9.4 g/dl	<7.0 g/dl	
	Enceinte 3e trimestre	<11.0 g/dl	10.0–10.9 g/dl	7.0–9.9 g/dl	<7.0 g/dl	
Âge						
15–19		53,8	23,5	28,2	2,1	1 924
20–29		52,2	23,3	27,2	1,7	3 168
30–39		51,8	23,2	26,5	2,1	2 206
40–49		53,4	24,0	27,0	2,5	1 362
Nombre d'enfants déjà nés						
0		50,9	22,2	26,0	2,7	2 125
1		51,1	20,6	29,0	1,5	1 095
2–3		53,6	24,1	27,7	1,8	1 959
4–5		52,4	25,3	25,4	1,7	1 569
6+		54,7	24,1	28,5	2,1	1 912
Maternité						
Enceinte		57,2	24,0	31,6	1,6	902
Non enceinte[1]		52,1	23,4	26,7	2,1	7 758
Utilise un DIU						
Oui		60,6	27,4	28,6	4,6	63
Non		52,6	23,4	27,2	2,0	8 597
Résidence						
Bamako		44,8	23,1	19,7	2,0	1 344
Autre urbain		47,1	22,4	23,1	1,6	984
Ensemble urbain		45,8	22,8	21,1	1,8	2 328
Rural		55,2	23,7	29,4	2,1	6 333
Région						
Kayes		61,0	23,4	34,0	3,6	1 317
Koulikoro		56,1	23,3	31,5	1,3	2 016
Sikasso		52,5	25,3	25,6	1,6	1 569
Ségou		51,8	23,5	26,3	2,0	1 297
Mopti		47,4	24,1	21,9	1,4	734
Tombouctou		42,2	15,6	22,3	4,3	139
Gao		50,1	17,0	30,4	2,7	241
Kidal		†	†	†	†	3
Bamako		44,8	23,1	19,7	2,0	1 344
Niveau d'instruction						
Aucun		55,9	23,5	30,0	2,4	4 637
Primaire		52,1	24,4	25,9	1,8	1 507
Secondaire ou plus		46,9	22,7	22,9	1,4	2 516
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas		56,3	23,3	30,9	2,1	1 566
Second		58,7	23,3	33,0	2,4	1 591
Moyen		54,0	24,0	27,9	2,1	1 631
Quatrième		52,2	24,2	26,2	1,8	1 818
Le plus élevé		44,6	22,5	20,3	1,7	2 054
Ensemble		52,7	23,4	27,2	2,0	8 660

Note : La prévalence, de l'anémie, basée sur le niveau d'hémoglobine, est ajustée en fonction de l'altitude et du fait de fumer, ou non, des cigarettes, si l'information est disponible, en utilisant les formules du CDC, 1998 et les seuils définis dans WHO, 2024. L'hémoglobine est mesurée en grammes par décilitre (g/dl) en utilisant l'appareil HemoCue 201+.

[1] Y compris les femmes qui ne savent pas si elles sont enceintes

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 11.18 Présence de sel iodé dans le ménage

Parmi tous les ménages, pourcentage dont le sel a été testé pour la présence d'iode, pourcentage disposant de sel mais dont le sel n'a pas été testé et pourcentage ne disposant pas de sel dans le ménage et, parmi les ménages dont le sel a été testé, pourcentage ayant du sel iodé selon certaines caractéristiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Parmi tous les ménages, pourcentage :			Parmi les ménages dans lesquels le sel a été testé :	
Caractéristique sociodémographique	Dont le sel a été testé	Ne disposant pas de sel dans le ménage	Effectif de ménages	Pourcentage disposant de sel iodé	Effectif de ménages
Résidence					
Bamako	68,5	31,5	1 509	94,4	1 034
Autre urbain	65,1	34,9	1 171	83,1	762
Ensemble urbain	67,0	33,0	2 680	89,6	1 796
Rural	73,1	26,9	6 987	82,4	5 110
Région					
Kayes	85,4	14,6	1 305	73,4	1 114
Koulikoro	72,2	27,8	2 053	87,8	1 482
Sikasso	76,2	23,8	1 631	93,9	1 243
Ségou	61,3	38,7	1 632	93,6	1 001
Mopti	59,3	40,7	895	90,5	531
Tombouctou	97,0	3,0	248	32,1	241
Gao	66,1	33,9	387	22,6	256
Kidal	†	†	7	†	4
Bamako	68,5	31,5	1 509	94,4	1 034
Quintile de bien-être économique					
Le plus bas	68,1	31,9	1 487	88,2	1 013
Second	72,2	27,8	1 751	82,7	1 264
Moyen	76,1	23,9	2 062	76,6	1 569
Quatrième	71,0	29,0	2 318	83,6	1 646
Le plus élevé	68,9	31,1	2 050	92,0	1 413
Ensemble	71,4	28,6	9 667	84,2	6 905

Note : Le sel a été testé pour la présence d'iodate/iodure de potassium.
[1] Y compris les ménages dans lesquels le sel n'a pas pu être testé pour des raisons techniques ou logistiques incluant la disponibilité de kits de tests
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

PALUDISME 12

Principaux résultats

- ***Possession de MII :*** Près de neuf ménages sur dix (89 %) disposent d'au moins une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII). En moyenne, un ménage a 3,8 MII et 50 % des ménages ont au moins une MII pour deux personnes qui ont passé la nuit avant l'interview dans le ménage.
- ***Source d'obtention de moustiquaires :*** Trois quarts (75 %) des MII ont été obtenues lors des campagnes de distribution.
- ***Accès aux MII :*** Soixante-douze pour cent (72 %) de la population des ménages ont accès à une MII.
- ***Utilisation des MII :*** Les pourcentages d'enfants de moins de 5 ans et de femmes enceintes ayant dormi sous une MII la nuit précèdent l'interview sont respectivement de 68 % et 69 %.
- ***Utilisation du TPIg :*** Seulement 28 % des femmes de 15–49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années ayant précédé l'enquête ont déclaré avoir reçu trois doses ou plus de SP pendant la grossesse de leur dernière naissance vivante.
- ***Recherche de soins pour les enfants avec de la fièvre :*** Des conseils ou un traitement ont été recherchés pour 51 % des enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines avant l'interview. Parmi les enfants ayant eu de la fièvre, seulement 18 % ont eu un prélèvement sanguin au doigt ou au talon pour être testé.

Ce chapitre présente des données utiles pour évaluer la qualité de la mise en œuvre des stratégies de lutte contre le paludisme, notamment la disponibilité, la provenance et l'utilisation de moustiquaires, l'utilisation prophylactique de médicaments antipaludiques chez les femmes enceintes, le recours aux soins de santé et l'utilisation thérapeutique des médicaments antipaludiques pour les enfants présentant de la fièvre.

Au Mali, le paludisme est un problème majeur de santé publique et demeure la première cause de mortalité et de morbidité ayant des répercussions socio-économiques sur les populations vivant dans les zones endémiques. Selon le rapport 2024 de l'OMS sur le paludisme dans le monde, le Mali représentait 3,1 % des cas mondiaux et 2,4 % des décès dus au paludisme en 2023. Le Mali fait partie des 11 pays les plus touchés au monde et il fait partie des huit pays ayant connu une hausse marquée des cas entre 2019 et 2023[1].

La mission du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) est d'assurer à toute la population un accès universel et équitable aux interventions de lutte antipaludique dans le cadre de la politique nationale de santé.

[1] Rapport mondial sur le paludisme 2023. Genève. Organisation mondiale de la santé

Le Mali a élaboré et mis en œuvre cinq plans stratégiques depuis son engagement dans l'initiative « Roll Back Malaria » en 1998. Le dernier plan vise à atteindre la couverture universelle des interventions de prévention et de prise en charge du paludisme pour la période 2024–2028.

Le programme s'est fixé trois objectifs :

(i) Réduire le taux de mortalité lié au paludisme d'au moins 30 % par rapport à 2023 ;

(ii) Réduire l'incidence du paludisme d'au moins 30 % par rapport à 2023 ;

(iii) Renforcer les capacités de coordination et de gestion du programme à tous les niveaux.

Par le biais du plan stratégique national de lutte contre le paludisme (PSN) 2024–2028[2], le PNLP s'inscrit dans l'accélération du contrôle du paludisme avec pour objectif d'atteindre le seuil épidémiologique de pré élimination. Pour ce faire, les actions de lutte vont stratégiquement s'orienter vers le ciblage des interventions en fonction des caractéristiques épidémiologiques. Globalement, trois zones à niveaux différents d'endémicité ont été identifiées : les zones d'endémicité faible où les objectifs visent une consolidation des acquis en vue d'atteindre la pré-élimination ; les zones d'endémicité moyenne et les zones d'endémicité élevée où l'intensification de la mise à l'échelle des interventions permettra d'assurer rapidement le renforcement du contrôle de la maladie.

12.1 POSSESSION DE MOUSTIQUAIRES IMPRÉGNÉES D'INSECTICIDE

Possession de moustiquaires imprégnées d'insecticide

Ménages possédant au moins une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII). Une MII est une moustiquaire traitée industriellement par le fabricant qui n'exige aucun autre traitement.

Échantillon : Ménages

Couverture universelle en MII par les ménages

Pourcentage de ménages possédant au moins une MII pour deux personnes.

Échantillon : Ménages (avec au moins une personne ayant passé la nuit précédant l'interview dans le ménage)

Le Mali a commencé la couverture universelle en MII dans les ménages en 2011. À cause de difficultés de mobilisation de la totalité des besoins en MII en 2011, les campagnes de distribution gratuite des MII aux ménages sont organisées région par région selon le plan d'action national. L'intervalle de 3 ans entre les campagnes est respecté pour chaque région. À cet effet, le PNLP a organisé au moins une campagne dans chaque région et à Bamako de 2011 à 2020. Dans l'ordre, la région de Sikasso a bénéficié de 4 campagnes de couverture universelle dont la dernière date de juillet 2020, les régions de Ségou, Kayes, Mopti et Koulikoro en ont eu trois dont la dernière date de 2019 pour Ségou, 2020 pour Kayes, Mopti, et Koulikoro. Le District de Bamako et les régions de Tombouctou, Gao, et Kidal n'ont organisé qu'une campagne : en 2015 pour Bamako et 2019 pour les autres régions.

En 2023, une campagne nationale de distribution universelle de MII a été planifiée. Cinq régions ont bénéficié de la réalisation de cette campagne, à savoir, Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. Les autres régions, notamment Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudenni et Ménaka n'ont pas bénéficié de la campagne de 2023, mais bénéficieront de cette campagne en 2024.

[2] PNLP-Mali Programme national de lutte contre le paludisme. Ministère de la Santé

Au Mali, 89 % des ménages possèdent au moins une MII. Le nombre moyen de MII par ménage est estimé à 3,8. Cependant, malgré ce pourcentage élevé, la disponibilité de moustiquaires dans les ménages est loin d'être satisfaisante. En effet, seulement 50 % des ménages disposent d'au moins une MII pour deux personnes qui ont passé la nuit avant l'interview dans le ménage (**Tableau 12.1** et **Graphique 12.1**).

Tendances : Le pourcentage de ménages qui possèdent au moins une MII a nettement augmenté, passant de 50 % en 2006 à 91 % en 2021 puis a légèrement baissé en 2023–2024 (89 %) (**Graphique 12.2**).

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage de ménages possédant au moins une MII est plus élevé en milieu rural (91 %) qu'en milieu urbain (83 %). Ce taux est plus élevé dans les autres villes urbaines (88 %) par rapport à Bamako (79 %).
- La possession d'au moins une MII varie d'une région à l'autre ; c'est dans les régions de Ségou (97 %), Mopti (94 %) et de Sikasso (93 %) que l'on observe les pourcentages les plus élevés. À l'opposé, les régions de Gao (63 %) et Tombouctou (70 %) enregistrent les pourcentages les plus faibles (**Carte 12.1**).

***Graphique 12.1* Possession de MII par les ménages**

Répartition (en %) des ménages



***Graphique 12.2* Possession de MII dans les ménages : tendances**

Pourcentage de ménages possédant au moins une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)



Note : Dans les EDSM de 2012–2013 et de 2006, les MII étaient appelées Moustiquaires Imprégnées à Longue Durée d'Action (MILDA). Depuis 2012 au Mali, toutes les moustiquaires imprégnées d'insecticides sont presque exclusivement des MILDA.

Carte 12.1 Possession de MII par région

Pourcentage de ménages possédant au moins une MII



Note : Pour des raisons d'insécurité, les données de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région et ne sont pas présentées séparément.

- Du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, le pourcentage de ménages possédant, au moins, une MII diminue, passant de 97 % à 82 % (**Graphique 12.3**).
- Le pourcentage de ménages ayant, au moins, une MII pour deux personnes qui ont passé la nuit avant l'interview dans le ménage est plus élevé en milieu rural (53 %) qu'en milieu urbain (42 %).
- Dans les régions, le pourcentage de ménages ayant, au moins, une MII pour deux personnes qui ont passé la nuit avant l'interview dans le ménage varie de 20 % dans la région de Tombouctou à 65 % dans la région de Ségou.

Graphique 12.3 Possession de MII par bien-être économique du ménage

Pourcentage de ménages possédant au moins une MII



Provenance des moustiquaires

La source d'obtention des MII la plus fréquente est la campagne de distribution (75 %). Dans 5 % des cas, c'est durant les consultations prénatales que sont distribuées les MII et dans 3 % des cas, lors de séances de vaccination. Dans 13 % des cas, les MII sont obtenues sur le marché ou dans des boutiques (**Tableau 12.2** et **Graphique 12.4**).

Graphique 12.4 **Sources d'approvisionnement des MII**



12.2 ACCÈS ET UTILISATION DES MII PAR LES MÉNAGES

Accès à une MII

Pourcentage de la population qui aurait pu dormir sous une MII si chaque MII du ménage était utilisée par deux personnes au maximum.

Échantillon : Population de fait des ménages

Utilisation des MII

Pourcentage de la population ayant dormi sous une MII la nuit précédant l'interview.

Échantillon : Population de fait des ménage

Les MII constituent une barrière physique et chimique contre les moustiques. En réduisant la population des vecteurs, les MII contribuent à réduire le risque de paludisme pour les communautés et pour les particuliers qui les utilisent.

L'accès à une MII est mesuré par le pourcentage de la population qui aurait pu dormir sous une MII si chaque MII du ménage était utilisée par deux personnes au maximum. La comparaison des indicateurs d'accès aux MII et d'utilisation des MII peut mettre en évidence un écart de comportement montrant que les MII disponibles ne sont pas utilisées. Si la différence entre ces indicateurs est importante, le programme devra sans doute se focaliser sur une modification des comportements et sur la façon d'identifier les principaux motifs ou obstacles entravant l'utilisation des MII dans le but d'élaborer une intervention appropriée. Cette analyse aide les programmes de MII à déterminer s'il est nécessaire d'atteindre une couverture de MII plus nombreuses, de promouvoir l'utilisation des MII, ou les deux.

Dans l'ensemble, 72 % de la population des ménages ont accès à une MII (**Graphique 12.5**). Par ailleurs, 62 % de la population ont dormi sous une MII la nuit précédant l'interview. Dans les ménages ayant au moins une MII, le pourcentage ayant dormi sous une MII atteint 69 % (**Tableau 12.4**). En outre, le pourcentage de MII existantes utilisées la nuit précédant l'interview est de 80 % (**Tableau 12.5**).

Tendances : Entre 2006 et 2018, le pourcentage de la population ayant accès à une MII a nettement augmenté, passant de 30 % à 75 %, suivie d'une légère baisse entre 2018 et 2023–2024 (72 %). Dans la même période, le pourcentage de la population ayant dormi sous une MII la nuit précédant l'interview a également augmenté, passant de 21 % à 73 % puis a diminué entre 2018 et 2023–2024 (62 %). Dans l'ensemble, l'écart entre l'accès aux MII et leur utilisation est faible (**Graphique 12.6**).

Graphique 12.5 Accès et utilisation des MII

Pourcentage de la population des ménages ayant accès aux MII et pourcentage ayant dormi sous une MII la nuit précédant l'interview



Graphique 12.6 Accès aux MII et utilisation des MII : tendances

Pourcentage de la population des ménages ayant accès aux MII et pourcentage de la population ayant dormi sous une MII la nuit précédant l'interview



Note : Dans les EDSM de 2012–2013 et de 2006, les MII étaient appelées Moustiquaires Imprégnées à Longue Durée d'Action (MILDA). Depuis 2012 au Mali, toutes les moustiquaires imprégnées d'insecticides sont presque exclusivement des MILDA.

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage de la population de fait ayant accès à une MII dans le ménage est plus élevé en milieu rural (76 %) qu'en milieu urbain (61%). De même, le pourcentage de la population de fait ayant dormi sous une MII la nuit avant l'interview est plus élevé milieu rural qu'en milieu urbain (64 % contre 56 %).

- Le pourcentage le plus élevé de la population ayant accès à une MII dans le ménage est enregistré dans les régions de Ségou (86 %), Sikasso (79 %), Kayes et Mopti (76 % chacune). La région de Gao est celle qui enregistre le taux d'accès le plus faible (44%) (**Carte 12.2**).

- L'accès aux MII et leur utilisation diminuent avec le niveau de bien-être économique du ménage, passant, pour l'accès à une MII, de 80 % dans le quintile le plus bas à 61 % dans le plus élevé, et pour l'utilisation de la MII respectivement de 64 % à 54 %.

Carte 12.2 Accès aux MII par région

Pourcentage de la population des ménages qui aurait pu dormir sous une MII si chaque MII du ménage était utilisée par 2 personnes au maximum



Note : Pour des raisons d'insécurité, les données de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région et ne sont pas présentées séparément.

12.3 UTILISATION DES MII PAR LES ENFANTS ET LES FEMMES ENCEINTES

Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes sont des cibles prioritaires pour les interventions en matière de santé et plus particulièrement dans la lutte contre le paludisme du fait d'une plus grande vulnérabilité en zone endémique comme le Mali. À cet effet, plusieurs interventions sont mises en œuvre de façon intégrée pour prévenir la survenue du paludisme et réduire ainsi la morbidité et la mortalité dans ces populations cibles. Au nombre de ces actions, la couverture universelle en moustiquaire imprégnée d'insecticide peut être citée.

Dans l'ensemble, environ sept enfants de moins de 5 ans sur dix (68 %) ont dormi sous une MII la nuit ayant précédé l'interview. Ce pourcentage est de 73 % chez les enfants dans les ménages possédant au moins une MII (**Tableau 12.6** et **Graphique 12.7**). En outre, environ sept femmes enceintes de 15–49 ans sur dix (69 %) ont dormi sous une MII la nuit précédant l'interview. Dans les ménages possédant au moins une MII, ce pourcentage atteint 75 % (**Tableau 12.7** et **Graphique 12.7**).

Tendances : Le pourcentage d'enfants de moins de cinq ans ayant dormi sous MII a nettement augmenté, passant de 27 % en 2006 à 79 % en 2018 avec une baisse en 2023–2024 (68 %). Dans la

Graphique 12.7 Utilisation des MII

Pourcentage ayant dormi sous une MII la nuit précédant l'interview



même période, la même tendance a été observée chez les femmes enceintes, le pourcentage passant de 29 % en 2006 à 84 % en 2018 avec une baisse en 2023–2024 (69 %).

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Parmi les enfants de moins de 5 ans, l'utilisation des MII est légèrement plus élevée en milieu rural (68 %) qu'en milieu urbain (65 %). Chez les femmes enceintes, l'utilisation des MII est aussi légèrement plus élevée en milieu rural (70 %) qu'en milieu urbain (65 %).

- Le taux d'utilisation des MII, que ce soit parmi les enfants de moins de 5 ans ou parmi les femmes enceintes, est plus bas dans le quintile de bien-être économique le plus élevé que dans les autres. Ainsi, il est de 63 % parmi les enfants de moins de cinq ans et de 60 % parmi les femmes enceintes dans le quintile le plus élevé contre respectivement 67 % et 70 % dans le quintile le plus bas.

12.4 RAISONS DE NON-UTILISATION DES MOUSTIQUAIRES

Dix-neuf pour cent des MII n'ont pas été utilisées la nuit avant l'interview. La raison principale de non-utilisation de ces MII citée par 63 % des ménages est la conservation de la MII pour une utilisation supplémentaire ou ultérieure ; pour 19 % de personnes, l'absence de moustiques/paludisme a été citée comme explication et 7 % ont déclaré que l'utilisateur habituel n'avait pas dormi dans le ménage la nuit dernière (**Tableau 12.8** et **Graphique 12.8**).

Graphique 12.8 **Raison de non-utilisation des MII**

Parmi les MII qui n'ont pas été utilisées la nuit avant l'interview, raison principale de non-utilisation des MII (pourcentage)



Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage de non-utilisation des MII est plus élevé en milieu rural (20 %) qu'en milieu urbain (15 %). Le fait que la MII soit conservée pour une utilisation future ou qu'elle constitue une moustiquaire supplémentaire est plus fréquemment cité en milieu urbain (67 %) qu'en milieu rural (62 %).

- Les résultats selon les régions montrent que c'est dans la région de Sikasso que le taux de non-utilisation des MII est le plus élevé (25 %) suivi des régions de Kayes et Ségou (22 %). À l'opposé, la région de Gao a le plus faible pourcentage de non-utilisation (6 %).

- Le pourcentage de non-utilisation des MII diminue du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, passant de 24 % à 15 %.

12.5 PALUDISME PENDANT LA GROSSESSE

Traitement préventif intermittent pendant la grossesse

Pourcentage de femmes ayant pris au moins 3 doses de SP au cours de leur dernière grossesse.

Échantillon : Femmes de 15–49 ans ayant eu une naissance vivante ou un mort-né au cours des 2 années précédant l'enquête.

L'infection paludéenne pendant la grossesse est un important problème de santé publique au Mali, comportant des risques graves pour la mère, le fœtus et le nouveau-né. Le traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse est un traitement thérapeutique intégral composé de médicaments antipaludiques administrés aux femmes enceintes lors des visites de routine des soins prénatals à des fins de prévention du paludisme. Ce traitement préventif intermittent vise la prévention d'épisodes de paludisme maternel, l'anémie maternelle et fœtale, la parasitémie placentaire, l'insuffisance pondérale à la naissance et la mortalité néonatale.

L'indicateur utilisé au cours de l'enquête pour mesurer la couverture de cette intervention est le pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des deux années ayant précédé l'enquête qui ont reçu trois doses ou plus de Sulfadoxine-pyriméthamine (SP) au cours de leur grossesse la plus récente (TPIg3+).

Dans l'ensemble, 56 % des femmes de 15–49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des deux années ayant précédé l'enquête ont déclaré avoir reçu deux doses ou plus de SP. Seuls 28 % ont déclaré en avoir reçu trois doses et plus pendant leur dernière grossesse (**Tableau 12.9**).

Tendances : Le pourcentage des femmes de 15–49 ans ayant eu une naissance vivante et ayant reçu trois doses ou plus au cours des deux années précédant l'enquête a nettement augmenté, passant de 6 % en 2006 à 34 % en 2021 et baissé à 28 % en 2023–2024 (**Graphique 12.9**).

Graphique 12.9 **Utilisation du traitement préventif intermittent du paludisme par les femmes enceintes : tendances**

Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années précédant l'enquête qui ont reçu au moins 1, 2, ou 3 doses de SP/Fansidar



Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage de femmes enceintes qui ont reçu 3 doses ou plus de SP varie peu entre les milieux urbain et rural (28 % contre 27 %).
- La prise de trois doses ou plus de SP augmente avec le niveau d'instruction de la femme, passant de 25 % chez les femmes qui n'ont aucun niveau d'instruction à 35 % chez celles qui ont un niveau d'instruction secondaire ou plus.
- Du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, le pourcentage de femmes ayant pris trois doses ou plus de SP augmente, passant de 25 % à 36 %.

12.6 PRISE EN CHARGE DES CAS DE PALUDISME DES ENFANTS

Recherche de traitements pour les enfants de moins de 5 ans avec de la fièvre

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines précédant l'interview et pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès d'un prestataire de santé, un établissement de santé ou une pharmacie.

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre dans les 2 semaines précédant l'enquête

Diagnostic du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans avec de la fièvre

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines précédant l'interview et à qui on a prélevé du sang au doigt ou au talon pour être analysé. Ce test est une méthode indirecte du test de diagnostic du paludisme.

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre dans les 2 semaines précédant l'interview

Combinaison thérapeutique à base d'artémisinine (CTA) pour les enfants de moins de 5 ans avec de la fièvre

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines précédant l'interview et à qui on a administré une combinaison thérapeutique à base d'artémisinine (CTA).

Échantillon : Enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines précédant l'interview et ayant pris un médicament antipaludéen.

Au Mali, l'initiative de la gratuité du diagnostic par un test de diagnostic rapide (TDR) et du traitement chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes a été mise en place au mois de juin 2007. Les CTA ont effectivement remplacé la chloroquine à partir du 1er juin 2007 (Lettre N° 1774 – MG-SG du 18 décembre 2006 et Lettre N°597 MS-SG du 21 mai 2007 sur le traitement du paludisme simple à base de combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine). Cela en réponse à la résistance élevée de l'agent pathogène du paludisme à la chloroquine qui jusque-là était le médicament de 1ère intention pour le traitement du paludisme. Le décret portant gratuité des moyens de prévention et de traitement du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans et chez la femme enceinte dans les établissements de santé a été ratifié en novembre 2010 (décret N° 10-628/P-RM du 29 novembre 2010).

Globalement, 15 % des enfants de moins de 5 ans ont eu de la fièvre dans les deux semaines ayant précédé l'interview. Parmi ceux-ci, des conseils ou un traitement ont été recherchés pour un enfant sur deux (51 %) et, dans 22 % des cas, le traitement a été recherché rapidement, c'est-à-dire le jour même ou le jour suivant. En outre, pour 18 % des enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre, un prélèvement sanguin au doigt ou au talon a été effectué et 29 % ont été diagnostiqués avec le paludisme par un prestataire de santé (**Tableau 12.10**).

Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des deux semaines précédant l'interview et pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchées, cette démarche a été effectué, dans 45 % des cas, dans le secteur médical public, plus particulièrement dans les centres de santé communautaires (CSCOM) (27 %) (**Tableau 12.11**).

Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des deux semaines précédant l'interview et qui ont été traités avec un antipaludique, 45 % ont pris, pour le traitement, une CTA, 20 % ont été traités avec de l'artésunate injectable et 18 % avec de l'Artéméther injectable. En outre 12 % ont pris de l'Amodiaquine (**Tableau 12.12**).

Tendances : Le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview et ayant été traités avec une combinaison thérapeutique à base d'artémisinine a augmenté, passant de 19 % en 2012–2013 à 45 % en 2023–2024. Cependant, une diminution a été observée en 2021 (15 %) (**Graphique 12.10**).

***Graphique 12.10* Utilisation d'une combinaison thérapeutique à base d'artémisinine par les enfants présentant de la fièvre**

Chez les enfants ayant eu récemment de la fièvre, pourcentage ayant reçu une combinaison thérapeuthique à base d'artémisinine



Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Des conseils ou un traitement ont été plus fréquemment recherchés pour les enfants du milieu urbain que pour ceux du milieu rural (54 % contre 50 %).
- Les résultats par région indiquent que c'est dans la région de Koulikoro (56 %) et dans le District de Bamako (55 %) que des conseils ou un traitement ont été les plus fréquemment recherchés. C'est dans la région de Kayes que cette démarche a été la moins fréquemment effectuée (43 %).
- Le pourcentage d'enfants pour lesquels on a recherché des soins ou des conseils augmente avec le niveau d'instruction de la mère, passant de 46 % chez les enfants de mère n'ayant aucun niveau d'instruction à 58 % parmi ceux dont la mère a le niveau secondaire ou plus.
- Le pourcentage d'enfants pour lesquels on a recherché des soins ou des conseils augmente avec le quintile de bien-être économique passant de 42 % (quintile le plus bas) à 61 % (quintile le plus élevé).
- Le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans dont la fièvre at été traitée avec un antipaludique et qui ont pris une CTA est plus élevé dans les régions de Kayes (66 %) et Ségou (56 %) que dans celle de Koulikoro (36 %) et de Tombouctou (24 %).

LISTE DES TABLEAUX

- **Tableau 12.1 Possession de moustiquaires par les ménages**
- **Tableau 12.2 Source d'obtention des moustiquaires**
- **Tableau 12.3 Accès à une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII)**
- **Tableau 12.4 Utilisation des moustiquaires par les personnes dans le ménage**
- **Tableau 12.5 Utilisation des MII existantes**
- **Tableau 12.6 Utilisation des moustiquaires par les enfants**
- **Tableau 12.7 Utilisation des moustiquaires par les femmes enceintes**
- **Tableau 12.8 Raison principale pour laquelle la moustiquaire n'a pas été utilisée la nuit avant l'interview**
- **Tableau 12.9 Utilisation du Traitement Préventif Intermittent (TPIg) par les femmes au cours de la grossesse**
- **Tableau 12.10 Prévalence, diagnostic et traitement précoce des enfants avec de la fièvre**
- **Tableau 12.11 Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant de la fièvre**
- **Tableau 12.12 Type d'antipaludiques utilisés**

Tableau 12.1 Possession de moustiquaires par les ménages

Pourcentage de ménages avec au moins une moustiquaire (traitée ou non) et pourcentage avec une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) ; nombre moyen de moustiquaires et de MII par ménage ; pourcentage de ménages avec au moins une moustiquaire et pourcentage avec au moins une MII pour 2 personnes qui ont passé la nuit avant l'interview dans le ménage, selon certaines caractéristiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de ménages ayant, au moins, une moustiquaire		Nombre moyen de moustiquaires par ménage		Effectif de ménages	Pourcentage de ménages ayant, au moins, une moustiquaire pour deux personnes qui ont passé la nuit avant l'interview dans le ménage[1]		Effectif de ménages avec au moins une personne qui a passé la nuit avant l'interview dans le ménage
	Une moustiquaire quelconque	Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)[2]	Une moustiquaire quelconque	Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)[2]		Une moustiquaire quelconque	Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)[2]	
Résidence								
Bamako	83,8	78,7	2,4	2,1	1 509	40,4	33,9	1 505
Autre urbain	90,7	87,5	3,7	3,5	1 171	55,4	52,1	1 170
Ensemble urbain	86,8	82,5	3,0	2,7	2 680	47,0	41,9	2 674
Rural	92,3	90,9	4,3	4,2	6 987	54,6	52,5	6 983
Région								
Kayes	92,1	90,8	4,4	4,3	1 305	56,8	54,8	1 303
Koulikoro	90,5	88,8	4,1	4,0	2 053	48,8	46,9	2 053
Sikasso	95,3	93,4	4,9	4,8	1 631	59,8	57,8	1 628
Ségou	97,9	97,1	4,5	4,4	1 632	67,7	65,0	1 631
Mopti	95,1	93,6	4,1	4,0	895	54,4	51,4	895
Tombouctou	73,4	70,3	1,7	1,5	248	22,5	19,8	248
Gao	67,9	62,9	1,8	1,6	387	25,8	21,5	387
Kidal	†	†	†	†	7	†	†	7
Bamako	83,8	78,7	2,4	2,1	1 509	40,4	33,9	1 505
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	97,0	96,5	5,5	5,4	1 487	58,5	57,2	1 486
Second	95,0	94,6	4,5	4,5	1 751	55,7	54,8	1 751
Moyen	90,3	88,5	3,7	3,6	2 062	51,0	48,7	2 061
Quatrième	88,2	85,3	3,2	3,0	2 318	50,8	47,2	2 314
Le plus élevé	86,0	81,7	3,3	3,0	2 050	48,9	43,0	2 046
Ensemble	90,8	88,6	3,9	3,8	9 667	52,5	49,5	9 657

[1] Population de fait des ménages

[2] Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Dans l'EIPM 2015 et l'EIPM 2021, ce type de moustiquaire correspond à la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action (MILDA).

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 12.2 Source d'obtention des moustiquaires

Répartition (en %) des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII), des moustiquaires qui ne sont pas des MII et de toutes les moustiquaires par source d'obtention des moustiquaires, selon certaines caractéristiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique	Campagne de distribution de masse	Visite prénatale	Visite vaccination	Centre de santé du gouverne-ment	Centre de santé privé	Pharmacie	Boutique/ marché	Agent de santé communau-taire	Institution religieuse	École	Autre	Ne sait pas	Total	Nombre de mousti-quaires
							MII[1]							
Résidence														
Bamako	8,6	14,9	9,0	2,5	0,1	1,9	54,9	0,5	0,0	0,0	7,0	0,5	100,0	3 149
Autre urbain	70,9	4,4	1,7	0,6	0,0	0,9	18,5	0,2	0,0	0,1	2,5	0,2	100,0	4 126
Ensemble urbain	44,0	9,0	4,9	1,4	0,0	1,3	34,3	0,3	0,0	0,1	4,5	0,3	100,0	7 275
Rural	83,0	4,0	2,2	0,9	0,1	0,2	7,6	0,3	0,0	0,2	1,3	0,2	100,0	29 283
Région														
Kayes	88,9	2,2	1,2	0,4	0,0	0,2	5,1	0,4	0,0	0,0	1,5	0,0	100,0	5 671
Koulikoro	76,1	5,5	3,2	0,9	0,4	0,5	12,0	0,1	0,1	0,1	1,2	0,2	100,0	8 231
Sikasso	83,5	4,1	2,4	1,9	0,1	0,2	4,8	0,3	0,0	0,5	1,8	0,3	100,0	7 832
Ségou	88,3	3,2	1,8	0,2	0,0	0,2	5,0	0,2	0,0	0,0	0,9	0,1	100,0	7 104
Mopti	83,8	3,7	1,0	0,3	0,0	0,3	9,5	0,3	0,0	0,0	1,1	0,0	100,0	3 569
Tombouctou	9,4	10,6	3,7	0,1	0,0	1,0	68,1	3,1	0,1	0,0	3,9	0,1	100,0	384
Gao	12,4	10,6	4,1	1,9	0,2	0,7	62,7	1,4	0,0	0,0	5,3	0,9	100,0	610
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	100,0	7
Bamako	8,6	14,9	9,0	2,5	0,1	1,9	54,9	0,5	0,0	0,0	7,0	0,5	100,0	3 149
Quintile de bien-être économique														
Le plus bas	90,4	3,5	1,6	0,9	0,0	0,0	1,9	0,1	0,0	0,1	1,3	0,1	100,0	8 071
Second	89,0	3,8	2,1	0,5	0,0	0,0	3,4	0,3	0,0	0,0	0,7	0,2	100,0	7 827
Moyen	78,9	4,6	2,4	1,4	0,2	0,1	10,4	0,2	0,0	0,2	1,6	0,1	100,0	7 397
Quatrième	66,6	6,3	3,1	1,0	0,2	0,3	19,1	0,6	0,1	0,2	2,5	0,1	100,0	7 054
Le plus élevé	43,5	7,7	4,9	1,3	0,2	2,1	35,3	0,4	0,0	0,1	3,9	0,6	100,0	6 211
Ensemble	75,2	5,0	2,7	1,0	0,1	0,4	12,9	0,3	0,0	0,1	1,9	0,2	100,0	36 558
							MOUSTIQUAIRES QUI NE SONT PAS DES MII[1]							
Ensemble	na	na	na	na	0,0	1,1	85,2	0,7	0,0	0,3	7,6	5,1	100,0	1 400
							TOUTES LES MOUSTIQUAIRES							
Ensemble	72,4	4,8	2,6	1,0	0,1	0,5	15,6	0,3	0,0	0,1	2,1	0,4	100,0	37 958

na = non applicable

[1] Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Dans l'EIPM 2015 et l'EIPM 2021, ce terme correspond à la moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MIILDA).

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 12.3 Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)

Pourcentage de la population de fait ayant accès à une MII dans le ménage, selon certaines caractéristiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique	Pourcentage de la population de fait ayant accès à une MII[1,2]	Effectif de personnes
Résidence		
Bamako	51,4	11 162
Autre urbain	72,7	9 166
Ensemble urbain	61,0	20 328
Rural	75,7	65 125
Région		
Kayes	75,6	12 651
Koulikoro	71,1	19 988
Sikasso	78,8	16 077
Ségou	86,0	13 412
Mopti	76,1	7 995
Tombouctou	45,7	1 569
Gao	43,8	2 568
Kidal	†	30
Bamako	51,4	11 162
Quintile de bien-être économique		
Le plus bas	79,6	17 115
Second	78,0	17 076
Moyen	72,7	17 079
Quatrième	69,4	17 025
Le plus élevé	61,1	17 158
Ensemble	72,2	85 454

[1] Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Dans l'EIPM 2015 et l'EIPM 2021, ce terme correspond à la moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MIILDA).

[2] Pourcentage de la population de fait des ménages qui aurait pu dormir sous une MII si chaque MII du ménage était utilisée par deux personnes au maximum

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 12.4 Utilisation des moustiquaires par les personnes dans le ménage

Pourcentage de la population de fait des ménages ayant dormi sous une moustiquaire (traitée ou non) et pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) la nuit avant l'interview ; parmi la population de fait des ménages dans les ménages ayant au moins une MII, pourcentage ayant dormi sous une MII la nuit avant l'interview, selon certaines caractéristiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Population des ménages			Population des ménages dans les ménages avec au moins une MII[1]	
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII[1] la nuit dernière	Effectif de personnes	Pourcentage ayant dormi sous une MII[1] la nuit dernière	Effectif de personnes
Âge					
<5	69,7	67,5	16 220	73,4	14 915
5–14	59,2	57,1	26 853	62,8	24 397
15–34	61,7	59,3	23 590	65,8	21 275
35–49	71,0	68,3	9 739	75,5	8 811
50+	73,0	70,3	9 020	77,4	8 187
Ne sait pas/manquant	(64,8)	(64,7)	33	(68,9)	31
Sexe					
Masculin	61,2	58,9	40 975	64,9	37 190
Féminin	67,9	65,5	44 479	72,1	40 427
Résidence					
Bamako	54,9	48,9	11 162	60,1	9 084
Autre urbain	67,3	64,5	9 166	72,4	8 163
Ensemble urbain	60,5	55,9	20 328	65,9	17 247
Rural	66,0	64,3	65 125	69,4	60 369
Région					
Kayes	63,8	63,1	12 651	68,0	11 743
Koulikoro	62,7	61,2	19 988	67,7	18 067
Sikasso	64,7	63,1	16 077	66,7	15 207
Ségou	74,0	71,9	13 412	73,4	13 130
Mopti	76,0	73,9	7 995	77,8	7 589
Tombouctou	50,4	47,4	1 569	67,4	1 102
Gao	51,1	45,4	2 568	69,6	1 675
Kidal	†	†	30	†	20
Bamako	54,9	48,9	11 162	60,1	9 084
Quintile de bien-être économique					
Le plus bas	64,7	63,8	17 115	66,0	16 548
Second	66,2	65,5	17 076	69,1	16 188
Moyen	67,0	64,7	17 079	71,9	15 373
Quatrième	66,9	63,6	17 025	73,0	14 847
Le plus élevé	58,6	54,1	17 158	63,3	14 661
Ensemble	64,7	62,3	85 454	68,6	77 616

[1] Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Dans l'EIPM 2015 et l'EIPM 2021, ce terme correspond à la moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MIILDA).

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 12.5 Utilisation des MII existantes

Répartition (en %) des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) qui ont été utilisées par quelqu'un la nuit avant l'interview, selon certaines caractéristiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique	Pourcentage de MII[1] existantes utilisées la nuit dernière	Effectif de MII[1]
Résidence		
Bamako	90,1	3 149
Autre urbain	80,5	4 126
Ensemble urbain	84,6	7 275
Rural	78,8	29 283
Région		
Kayes	77,5	5 671
Koulikoro	83,4	8 231
Sikasso	73,1	7 832
Ségou	77,7	7 104
Mopti	83,6	3 569
Tombouctou	90,3	384
Gao	93,2	610
Kidal	†	7
Bamako	90,1	3 149
Quintile de bien-être économique		
Le plus bas	75,5	8 071
Second	77,6	7 827
Moyen	80,3	7 397
Quatrième	83,4	7 054
Le plus élevé	84,6	6 211
Ensemble	80,0	36 558

[1] Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Dans l'EIPM 2015 et l'EIPM 2021, ce terme correspond à la moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MIILDA).

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 12.6 Utilisation des moustiquaires par les enfants

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous une moustiquaire (traitée ou non) et pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) la nuit avant l'interview ; Parmi les enfants dans les ménages avec au moins une MII, pourcentage ayant dormi sous une MII la nuit avant l'interview, selon certaines caractéristiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Enfants de moins de 5 ans dans tous les ménages			Enfants de moins de 5 ans dans les ménages ayant au moins une MII[1]	
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII[1] la nuit dernière	Effectif d'enfants	Pourcentage ayant dormi sous une MII[1] la nuit dernière	Effectif d'enfants
Âge en mois					
<12	71,8	69,7	3 437	75,5	3 173
12–23	71,4	69,2	3 108	75,2	2 861
24–35	70,8	68,6	3 338	74,3	3 083
36–47	68,3	65,7	3 148	72,1	2 872
48–59	66,0	63,9	3 189	69,6	2 927
Sexe					
Masculin	69,0	66,4	8 163	72,3	7 506
Féminin	70,4	68,5	8 056	74,5	7 409
Résidence					
Bamako	67,6	60,5	1 838	71,3	1 560
Autre urbain	72,1	69,1	1 580	76,2	1 433
Ensemble urbain	69,7	64,5	3 419	73,7	2 992
Rural	69,7	68,3	12 801	73,3	11 923
Région					
Kayes	65,8	65,1	2 452	69,7	2 290
Koulikoro	67,9	66,3	3 833	73,1	3 475
Sikasso	68,4	66,8	3 160	70,6	2 993
Ségou	77,9	75,9	2 602	77,1	2 561
Mopti	78,7	77,0	1 533	79,7	1 481
Tombouctou	59,5	55,8	300	78,1	214
Gao	55,2	51,5	494	75,8	336
Kidal	†	†	6	†	5
Bamako	67,6	60,5	1 838	71,3	1 560
Quintile de bien-être économique					
Le plus bas	67,4	66,5	3 445	68,5	3 345
Second	70,5	70,0	3 411	73,4	3 255
Moyen	70,7	68,5	3 319	76,3	2 978
Quatrième	72,1	68,7	3 251	77,6	2 877
Le plus élevé	67,6	62,9	2 793	71,4	2 461
Ensemble	69,7	67,5	16 220	73,4	14 915

Note : Le tableau est basé sur les enfants ayant passé la nuit précédant l'interview dans le ménage.
[1] Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Dans l'EIPM 2015 et l'EIPM 2021, ce terme correspond à la moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MIILDA).
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 12.7 Utilisation des moustiquaires par les femmes enceintes

Pourcentage de femmes enceintes de 15–49 ans ayant dormi sous une moustiquaire (traitée ou non) et pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) la nuit avant l'interview ; parmi les femmes enceintes de 15–49 ans dans les ménages avec au moins une MII, pourcentage ayant dormi sous une MII la nuit avant l'interview, selon certaines caractéristiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Parmi les femmes de 15–49 ans enceintes dans tous les ménages			Parmi les femmes de 15–49 ans enceintes dans les ménages ayant au moins une MII[1]	
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII[1] la nuit dernière	Effectif de femmes enceintes	Pourcentage ayant dormi sous une MII[1] la nuit dernière	Effectif de femmes enceintes
Résidence					
Bamako	63,8	56,7	193	62,6	175
Autre urbain	76,1	72,7	204	83,8	177
Ensemble urbain	70,1	64,9	397	73,2	352
Rural	71,5	70,2	1 498	75,3	1 396
Région					
Kayes	68,7	68,7	283	73,8	263
Koulikoro	59,7	58,7	445	66,0	395
Sikasso	78,2	76,2	409	80,0	390
Ségou	81,6	79,1	313	81,4	304
Mopti	82,4	81,1	170	84,5	163
Tombouctou	61,6	59,0	36	82,6	26
Gao	60,8	56,8	46	81,5	32
Kidal	†	†	1	†	1
Bamako	63,8	56,7	193	62,6	175
Niveau d'instruction					
Aucun	70,9	69,4	1 081	75,2	998
Primaire	74,8	71,8	344	77,6	318
Secondaire ou plus	69,2	66,4	470	72,2	432
Quintile de bien-être économique					
Le plus bas	71,4	69,9	435	71,9	423
Second	73,0	72,3	445	76,1	422
Moyen	75,3	73,9	381	81,7	345
Quatrième	69,7	66,9	323	75,5	286
Le plus élevé	64,8	59,7	311	68,4	272
Ensemble	71,2	69,1	1 895	74,9	1 748

Note : Le tableau est basé sur les femmes ayant passé la nuit précédant l'interview dans le ménage.
[1] Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Dans l'EIPM 2015 et l'EIPM 2021, ce terme correspond à la moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MIILDA).
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 12.8 Raison principale pour laquelle la moustiquaire n'a pas été utilisée la nuit avant l'interview

Parmi les MII, les moustiquaires qui ne sont pas des MII et parmi toutes les moustiquaires, pourcentage qui n'ont été utilisées par personne la nuit avant l'interview, et parmi les moustiquaires qui n'ont été utilisées par personne la nuit avant l'enquête, répartition (en %) selon la raison principale pour laquelle chaque moustiquaire n'a pas été utilisée, selon certaines caractéristiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique	Pourcentage de moustiquaires non utilisées la nuit avant l'interview	Nombre total de moustiquaires	Raison principale pour laquelle chaque moustiquaire n'a pas été utilisée la nuit avant l'interview												Nombre de moustiquaires non utilisées la nuit avant l'interview
			Trop chaud	N'aime pas la forme, la couleur et/ou la taille de la moustiquaire	N'aime pas l'odeur	N'a pas réussi à suspendre la moustiquaire	A dormi dehors	Utilisateur habituel n'a pas dormi dans le ménage la nuit dernière	Pas de moustiques/ pas de paludisme	Moustiquaire supplémentaire/gardée pour plus tard	Moustiquaire défectueuse/ mauvais état	Pense qu'inutile d'utiliser	Préfère utiliser ventilateur/ climatiseur/ insecticide	Total	
			MII[1]												
Résidence															
Bamako	9,3	3 149	5,2	1,6	5,4	5,9	2,1	5,8	4,3	54,4	1,4	3,1	10,8	100,0	292
Autre urbain	19,0	4 126	0,1	0,3	1,5	0,6	0,4	5,6	10,2	71,3	3,0	3,2	3,9	100,0	785
Ensemble urbain	14,8	7 275	1,5	0,6	2,6	2,0	0,9	5,6	8,6	66,7	2,6	3,1	5,8	100,0	1 078
Rural	20,0	29 283	0,3	0,1	0,5	1,6	1,3	7,6	20,4	62,4	2,5	3,0	0,4	100,0	5 861
Région[2]															
Kayes	21,8	5 671	0,9	0,1	1,2	0,7	0,6	9,2	32,9	47,2	1,5	5,5	0,1	100,0	1 234
Koulikoro	15,6	8 231	0,3	0,1	0,6	3,4	1,0	8,9	19,7	56,7	5,4	2,4	1,6	100,0	1 283
Sikasso	25,0	7 832	0,1	0,1	0,7	0,9	0,9	4,1	15,4	72,1	2,4	1,9	1,5	100,0	1 954
Ségou	21,5	7 104	0,0	0,1	0,2	1,5	1,8	9,7	12,6	68,4	1,9	3,7	0,2	100,0	1 528
Mopti	15,9	3 569	0,0	0,2	0,3	0,4	1,1	4,7	18,7	73,3	0,8	0,5	0,2	100,0	569
Tombouctou	9,7	384	3,7	0,0	0,0	3,0	6,8	5,7	15,3	41,3	3,3	16,0	4,7	100,0	37
Gao	6,2	610	1,9	0,0	3,0	0,9	8,4	8,2	30,0	43,6	1,5	2,5	0,0	100,0	38
Kidal	†	7	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	100,0	2
Bamako	9,3	3 149	5,2	1,6	5,4	5,9	2,1	5,8	4,3	54,4	1,4	3,1	10,8	100,0	292
Quintile de bien-être économique															
Le plus bas	23,7	8 071	0,0	0,1	0,6	1,1	0,6	9,0	23,2	59,0	3,0	3,3	0,2	100,0	1 914
Second	21,5	7 827	0,2	0,2	0,3	1,4	1,1	7,7	24,7	57,9	2,6	3,7	0,1	100,0	1 684
Moyen	18,4	7 397	0,8	0,2	0,6	0,8	1,3	6,2	17,9	67,3	2,4	2,4	0,2	100,0	1 357
Quatrième	15,4	7 054	0,4	0,1	0,6	1,8	2,3	6,1	11,1	72,0	2,1	2,3	1,2	100,0	1 085
Le plus élevé	14,5	6 211	1,8	0,5	2,7	4,3	1,1	5,9	7,4	64,1	1,6	3,1	7,4	100,0	899
Ensemble	19,0	36 558	0,5	0,2	0,8	1,6	1,2	7,3	18,6	63,0	2,5	3,1	1,3	100,0	6 939
			MOUSTIQUAIRES QUI NE SONT PAS DES MII[1]												
Ensemble	14,6	1 400	1,3	0,6	2,0	7,5	1,1	11,2	4,0	39,5	12,1	9,9	10,9	100,0	205
			TOUTES LES MOUSTIQUAIRES												
Ensemble	18,8	37 958	0,5	0,2	0,8	1,8	1,2	7,4	18,2	62,4	2,8	3,2	1,5	100,0	7 144

[1] Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Dans l'EIPM 2015 et l'EIPM 2021, ce terme correspond à la moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MIILDA).

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 12.9 Utilisation du Traitement Préventif Intermittent (TPIg) par les femmes au cours de la grossesse

Percentage de femmes de 15–49 ans ayant eu une naissance vivante et/ou un mort-né au cours des 2 années ayant précédé l'enquête qui, durant la grossesse qui a abouti a une naissance vivante ou à un mort-né, ont reçu une dose ou plus de SP/Fansidar, deux doses ou plus de SP/Fansidar et pourcentage en ayant reçu trois doses ou plus, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique socioéconomique	Pourcentage ayant reçu une dose ou plus de SP/Fansidar	Pourcentage ayant reçu deux doses ou plus de SP/Fansidar	Pourcentage ayant reçu trois doses ou plus de SP/Fansidar	Effectif de femmes ayant eu une naissance vivante et/ou un mort-né au cours des 2 années ayant précédé l'enquête
NAISSANCES VIVANTES				
Rang de naissance[1]				
1	81,2	57,1	28,5	1 189
2–3	82,0	57,4	27,4	2 050
4–5	80,5	56,5	26,7	1 497
6+	76,4	53,1	27,7	1 413
Résidence				
Bamako	91,0	60,5	27,7	724
Autre urbain	89,2	60,9	28,4	602
Ensemble urbain	90,2	60,7	28,0	1 326
Rural	77,4	54,9	27,3	4 822
Région				
Kayes	75,8	55,8	26,5	958
Koulikoro	85,2	61,1	29,8	1 466
Sikasso	77,8	53,8	25,1	1 202
Ségou	76,0	55,8	31,3	963
Mopti	81,9	54,5	28,5	580
Tombouctou	45,5	18,8	5,9	79
Gao	66,8	37,8	15,1	174
Kidal	†	†	†	3
Bamako	91,0	60,5	27,7	724
Niveau d'instruction				
Aucun	75,4	52,7	25,0	3 513
Primaire	81,5	54,1	25,3	1 078
Secondaire ou plus	90,0	65,2	34,7	1 558
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	71,3	49,6	24,6	1 290
Second	73,1	51,2	27,4	1 253
Moyen	78,6	53,8	23,7	1 237
Quatrième	86,4	60,2	26,8	1 264
Le plus élevé	93,3	67,2	35,9	1 104
Ensemble	80,2	56,1	27,5	6 148
MORT-NÉS				
Ensemble	65,3	44,0	15,1	143
NAISSANCES VIVANTES ET MORT-NÉS[2]				
Ensemble	80,0	55,9	27,3	6 257

Note : Les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits après une grossesse de 28 semaines ou plus. Quand la durée de la grossesse est déclarée en mois, les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits après une grossesse de 7 mois ou plus.

[1] Le rang de naissance fait référence au rang de naissance parmi les naissances vivantes de l'enquêtée.

[2] Pour les femmes ayant eu une naissance vivante et un enfant mort-né dans les 2 années ayant précédé l'enquête, les données sont calculées sur la naissance la plus récente seulement.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 12.10 Prévalence, diagnostic et traitement précoce des enfants avec de la fièvre

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview; parmi ces enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés le jour même ou le jour suivant le début de la fièvre, pourcentage pour lesquels on a prélevé du sang au doigt ou au talon pour être testé et pourcentage ayant été diagnostiqué avec le paludisme par un prestataire de santé, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Enfants de moins de 5 ans		Enfants de moins de 5 ans avec de la fièvre				
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines précédant l'interview	Effectif d'enfants	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés [1]	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés le jour même ou le jour suivant	Pourcentage pour lesquels on a prélevé du sang au doigt ou au talon pour être testé	Pourcentage ayant été diagnostiqué avec le paludisme par un prestataire de santé	Effectif d'enfants
Âge en mois							
<12	17,6	3 235	48,8	25,0	14,2	19,7	569
12–23	18,7	2 892	49,3	19,9	17,0	28,0	540
24–35	15,3	3 018	55,7	20,7	20,4	31,2	460
36–47	11,7	2 870	48,1	21,3	18,4	33,7	337
48–59	10,2	2 816	51,4	24,7	26,4	39,4	286
Sexe							
Masculin	15,2	7 456	53,2	23,8	20,7	30,2	1 130
Féminin	14,4	7 376	47,9	20,5	16,0	27,5	1 061
Résidence							
Bamako	15,8	1 733	55,4	31,5	20,8	22,8	274
Autre urbain	16,9	1 462	53,1	26,7	14,9	30,4	247
Ensemble urbain	16,3	3 195	54,3	29,2	18,0	26,4	521
Rural	14,4	11 637	49,5	20,1	18,5	29,7	1 671
Région							
Kayes	17,8	2 265	43,1	16,6	14,4	24,3	403
Koulikoro	11,2	3 504	55,6	29,4	17,6	27,9	394
Sikasso	18,7	2 906	51,2	18,3	14,9	29,1	543
Ségou	10,4	2 330	45,4	18,1	24,3	29,3	241
Mopti	15,0	1 407	53,3	24,9	25,6	43,3	211
Tombouctou	14,8	253	46,1	17,5	14,7	31,1	37
Gao	20,3	428	54,1	18,3	23,0	35,7	87
Kidal	†	6	†	†	†	†	1
Bamako	15,8	1 733	55,4	31,5	20,8	22,8	274
Niveau d'instruction de la mère							
Aucun	13,4	8 851	46,1	16,7	17,5	29,5	1 188
Primaire	16,9	2 557	53,7	22,4	17,2	28,1	432
Secondaire ou plus	16,7	3 424	57,6	33,7	21,2	28,2	571
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	12,2	3 094	42,3	10,7	16,6	29,6	378
Second	14,8	3 103	48,1	20,0	20,3	33,3	458
Moyen	16,0	3 021	50,6	19,0	20,5	30,7	482
Quatrième	13,8	3 013	49,4	26,4	12,7	22,3	416
Le plus élevé	17,6	2 600	61,1	33,7	20,9	27,9	457
Ensemble	14,8	14 831	50,6	22,2	18,4	28,9	2 192

[1] Sont inclus les conseils ou traitements des sources suivantes : le secteur médical public, le secteur médical privé, le secteur médical ONG, les boutiques, les vendeurs de médicaments ambulants et le marché. Ne sont pas pris en compte ici les conseils ou traitements fournis par un praticien traditionnel ou un guérisseur.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 12.11 Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant de la fièvre

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques ; parmi les enfants ayant eu de la fièvre dans les 2 dernières semaines avant l'interview et pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement, pourcentage pour lesquels les conseils ou le traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de chacune des sources :	
Source	Parmi les enfants avec de la fièvre	Parmi les enfants avec de la fièvre pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés
Secteur médical public	24,5	44,7
Hôpital national	0,1	0,2
Hôpital régional	0,2	0,5
Centre de santé de référence	4,8	8,7
Centre de santé communautaire	14,7	26,8
Dispensaire/maternité	2,9	5,2
Infirmerie de garnison militaire	0,1	0,2
ASC/relais	1,9	3,5
Secteur médical privé	14,0	25,5
Hôpital/Clinique privé	3,8	7,0
Centre confessionnel	0,1	0,1
Cabinet médical	1,0	1,8
Cabinet de soin privé	1,4	2,6
Pharmacie	7,7	14,1
Secteur médical ONG	0,2	0,3
Hôpital ONG	0,0	0,0
Clinique ONG	0,1	0,1
Autre secteur médical ONG	0,1	0,2
Autre source	16,1	29,4
Boutique	5,6	10,3
Vendeur de médicaments ambulants	6,0	10,9
Guérisseur/praticien traditionnel	4,6	8,4
Marché	1,3	2,3
Autre	1,0	1,9
Effectif d'enfants	2 192	1 202

Note : Les conseils ou traitements pour les enfants avec de la fièvre peuvent avoir été recherchés auprès de plus d'une source.
ASC = Agent de santé communautaire
ONG = Organisation non gouvernementale

Tableau 12.12 Type d'antipaludiques utilisés

Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview et qui ont pris des antipaludiques, pourcentage qui ont pris des antipaludiques spécifiques, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'enfants ayant pris :										Effectif d'enfants avec de la fièvre ayant pris des anti-paludiques
	N'importe quelle CTA	SP/ Fansidar	Chloro-quine	Amodia-quine	Comprimés de quinine	Quinine par injection/IV	Artésunate par voie rectale	Artésunate par injection/IV	Artéméther injection/IV	Autre anti-paludique	
Âge en mois											
<6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23
6–11	51,7	6,5	5,7	10,4	1,3	7,1	6,8	13,7	9,0	0,0	68
12–23	45,4	6,2	4,5	16,1	2,8	5,5	3,1	18,8	19,4	0,0	121
24–35	46,7	9,7	6,7	10,6	3,5	7,6	0,9	23,4	12,7	1,4	118
36–47	47,8	7,3	6,4	12,0	5,1	7,3	2,0	26,6	18,3	0,0	93
48–59	36,0	14,3	4,3	9,5	4,2	7,0	5,1	17,2	27,8	1,6	90
Sexe											
Masculin	45,3	9,5	5,7	11,2	4,4	8,7	3,3	24,8	17,0	0,3	278
Féminin	45,3	7,6	5,3	13,4	2,3	4,1	3,5	14,5	18,4	1,0	235
Résidence											
Bamako	43,7	4,4	0,0	15,5	1,9	6,7	6,4	27,4	9,3	1,2	65
Autre urbain	47,6	17,9	5,5	10,5	4,6	2,7	2,9	11,7	14,5	0,0	70
Ensemble urbain	45,7	11,4	2,8	12,9	3,3	4,6	4,6	19,3	12,0	0,6	135
Rural	45,2	7,7	6,5	11,9	3,5	7,3	3,0	20,4	19,7	0,6	378
Région											
Kayes	66,2	8,0	5,2	7,4	3,7	1,6	3,6	24,7	4,5	0,0	67
Koulikoro	36,3	11,3	9,5	11,1	6,9	8,8	0,0	16,8	23,7	1,3	107
Sikasso	46,0	9,5	5,0	13,7	1,2	5,8	3,0	13,3	26,1	0,0	105
Ségou	56,4	10,9	2,4	13,9	0,0	4,9	2,8	17,6	12,6	0,0	84
Mopti	25,3	5,1	9,5	12,5	8,3	14,3	7,1	24,4	26,8	1,8	50
Tombouctou	24,1	21,5	0,0	3,5	0,0	4,2	10,4	18,5	30,1	0,0	10
Gao	40,6	0,0	11,0	11,7	3,9	3,9	3,2	32,6	6,6	0,0	24
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	0
Bamako	43,7	4,4	0,0	15,5	1,9	6,7	6,4	27,4	9,3	1,2	65
Niveau d'instruction de la mère											
Aucun	45,7	10,5	3,6	10,9	4,6	7,2	4,7	21,7	15,2	0,3	265
Primaire	44,0	6,5	6,4	18,5	1,5	7,9	0,2	16,4	13,9	1,6	90
Secondaire ou plus	45,5	6,8	8,2	10,8	2,5	4,8	3,0	19,4	23,9	0,5	159
Quintile de bien-être économique											
Le plus bas	49,1	9,4	4,4	7,2	4,6	7,5	1,7	20,3	12,1	1,2	75
Second	41,3	13,7	4,6	8,3	6,5	5,4	0,3	21,9	22,5	0,0	103
Moyen	51,7	4,1	5,6	11,2	1,2	7,4	4,6	20,6	17,6	1,2	122
Quatrième	45,7	8,5	4,8	17,5	5,8	7,8	7,6	11,4	18,3	1,0	83
Le plus élevé	40,1	8,5	7,3	15,8	0,8	5,3	3,0	23,6	16,6	0,0	129
Ensemble	45,3	8,6	5,5	12,2	3,4	6,6	3,4	20,1	17,6	0,6	513

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
CTA = Combinaison thérapeutique à base d'artémisinine
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

CONNAISSANCES, ATTITUDES ET COMPORTEMENTS FACE AU VIH ET AU SIDA 13

Principaux résultats

- ***Connaissances des médicaments pour le traitement ou la prévention du VIH :*** Au Mali 32 % des femmes et 35 % des hommes de 15–49 ans ont entendu parler des ARV qui traitent le VIH.
- ***Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH :*** Trois femmes de 15–49 ans sur quatre (75 %) et 61 % des hommes de 15–49 ans auraient eu, dans certaines situations, des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH.
- ***Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois :*** Parmi les femmes de 15–49 ans, 5 % ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec un partenaire non-cohabitant, c'est-à-dire, une personne qui n'était ni leur époux, ni le partenaire avec qui elles vivaient. Parmi les hommes de 15–49 ans, ce pourcentage est de 15 %. Dix pour cent des femmes contre 36 % des hommes ont utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels avec un partenaire non-cohabitant.
- ***Dépistage du VIH chez les femmes enceintes :*** Un peu plus d'un quart des femmes de 15–49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des 2 dernières années ont fait un test du VIH au cours d'une visite prénatale ou pendant l'accouchement et ont eu connaissance du résultat (27 %).
- ***Connaissance des moyens de prévention parmi les jeunes :*** Parmi les jeunes femmes et les jeunes hommes de 15–24 ans, respectivement, 13 % et 15 % connaissent les moyens de prévention du VIH.

L'épidémie du VIH/sida constitue encore un problème de santé publique malgré les multiples efforts réalisés dans la lutte contre la maladie. Le Syndrome de l'Immunodéficience Acquise (sida) se caractérise par l'apparition d'un ensemble de signes consécutifs à l'effondrement du système immunitaire du corps humain. Le sida est la phase ultime de l'infection par le VIH. Celui-ci se transmet essentiellement par voie sexuelle, au contact du sang contaminé ou de la mère à l'enfant. Le premier cas de sida au Mali a été découvert en 1986.

En 2001, la riposte à l'épidémie a pris une dimension multisectorielle. C'est dans ce cadre que des politiques et des stratégies ont été développées parmi lesquelles :

- Le Haut Conseil National de Lutte contre le Sida (HCNLS), a été créé par décret N°106 P-RM du 31 mars 2004 en tant qu'organe d'orientation et de coordination politique et multisectorielle de lutte contre le VIH et le sida. Par la suite, les cellules sectorielles de lutte contre le sida au niveau de chaque département ministériel ainsi que d'autres ONG et associations ont été créées.

- La gratuité de la prise en charge du traitement (antirétroviral (ARV), suivi biologique) en 2004

- La mise en œuvre de l'Option B « plus » pour la Prévention de la transmission mère-enfant (PTME) en Novembre 2013

- La délégation de tâches au personnel infirmier.

En 2011, la réunion de haut niveau des Nations Unis sur le VIH et le sida a adopté pour les cinq prochaines années la Déclaration de Politique sur le VIH/sida : « Intensifier nos efforts pour éliminer le VIH/sida » avec « l'Objectif zéro décliner en trois points : zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination, zéro décès lié au sida ».

Suivant les recommandations de l'ONUSIDA, le HCNLS a mis en place en 2014, une stratégie des actions pour l'effectivité de l'élimination pour atteindre l'objectif zéro. La stratégie d'intervention se décline comme suit : (i) 90 % de toutes les personnes infectées connaissent leur statut sérologique ; (ii) 90 % de toutes les personnes diagnostiquées séropositives reçoivent un traitement antirétroviral ; et (iii) le VIH est indétectable chez 90 % de toutes les personnes qui reçoivent un traitement antirétroviral.

En 2021, au cours de la réunion de haut niveau, les États membres des Nations Unies ont adopté un nouveau texte ambitieux et réalisable, la Déclaration politique sur le VIH et le sida : Mettre fin aux inégalités et agir pour vaincre le sida d'ici à 2030. Cette déclaration repose sur des données probantes et les droits humains, et servira de feuille de route importante pour faire avancer la riposte mondiale au VIH au cours des cinq prochaines années. La déclaration appelle également les États membres à veiller à ce que 95 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, que 95 % des personnes connaissant leur statut reçoivent un traitement anti-VIH et que 95 % des personnes sous traitement soient viralement supprimées (ONUSIDA 2021).

Dans le cadre de la réforme du système de santé, le Gouvernement de la République du Mali a promulgué la Loi N°2019–021 du 03 juillet 2019 portant création de la Cellule Sectorielle de Lutte contre le VIH/sida, la Tuberculose et les Hépatites Virales (CSLS-TBH) avec pour mission de veiller au respect de la mise en œuvre des protocoles médicaux et psycho sociaux de lutte contre le VIH/sida, la Tuberculose et les Hépatites virales ; ainsi un Plan Stratégique National Intégré (PSNI) de lutte contre le VIH/sida, la Tuberculose et les Hépatites virales au Mali pour 2023–2026 a été élaboré (CSLS-TBH 2021).

Au cours de l'EDSM-VII, des données concernant le niveau de connaissance du VIH/sida, des moyens de prévention et de transmission, des attitudes et du comportement des hommes et des femmes vis-à-vis de cette maladie ont été collectées. Ces données sont utiles pour renforcer le programme de prévention et pour évaluer les résultats des interventions en cours.

13.1 CONNAISSANCE ET ATTITUDES CONCERNANT LES MÉDICAMENTS POUR LE TRAITEMENT OU LA PRÉVENTION DU VIH

La connaissance du VIH ou du sida est très largement répandue au Mali puisque 90 % des femmes de 15–49 ans et 93 % des hommes de 15–49 ans en ont entendu parler (données non présentées).

Les médicaments antirétroviraux (ARV) sont un outil efficace pour lutter contre le VIH. Les ARV sont destinés aux personnes vivant avec le VIH pour les garder en bonne santé en évitant que le virus n'évolue en sida. En prenant des ARV, les personnes vivant avec le VIH réduisent nettement leur risque de transmission du virus à d'autres. Les femmes vivant avec le VIH qui prennent des ARV pendant la grossesse et l'allaitement diminuent leurs risques de transmission du virus à leurs enfants. De plus, les personnes séronégatives peuvent prendre des ARV pour diminuer leur risque de contracter le VIH. Il s'agit là de ce que l'on appelle la prophylaxie avant exposition (PrEP). Les informations sur ces mesures de traitement et de prévention ainsi que des attitudes positives à leur égard contribuent à encourager leur utilisation.

Au Mali, 32 % des femmes et 35 % des hommes de 15–49 ans ont entendu parler des ARV. En outre, 43 % des femmes et 36 % des hommes de 15-49 ans savent que le risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant (TME) peut être réduit par la prise de certains médicaments spéciaux par la mère. Par contre, la PrEP est un moyen de prévention moins connu, que ce soit par les femmes (19 %) ou par les hommes (18 %). Parmi les personnes de 15-49 ans ayant entendu parler de la PrEP, près de sept femmes sur dix (65 %) et plus des trois quarts des hommes (76 %) approuvent son utilisation pour éviter de contracter le VIH (**Tableau 13.1** et **Graphique 13.1**).

Tendances : La proportion de femmes de 15–49 ans qui savent que le risque de TME peut être réduit par la prise des médicaments spéciaux par la mère a augmenté entre 2006 et 2023–2024, passant de 25 % (2006), à 37 % en 2012–2013 puis à 43 % (2023–2024). Parmi les hommes la tendance montre une amélioration entre 2006 et 2018 passant de 29 % à 38 % avant de baisser légèrement pour se situer à 36 % en 2023–2024 (**Graphique 13.2**).

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Parmi les femmes de 15–49, la connaissance des moyens de traitement et de prévention du VIH, qu'il s'agisse des ARV, de la PTME ou de la PrEP, est plus répandue en milieu urbain qu'en milieu rural.
- Parmi les hommes de 15–49 ans, on observe la même tendance pour les ARV (43 % en milieu urbain contre 32 % en milieu rural) et la PTME (44 % en milieu urbain contre 33 % en milieu rural). Par contre, pour la connaissance de la PrEP, il n'y a pratiquement pas d'écart (18 %) et en milieu urbain (16 %).
- Le pourcentage de femmes qui approuvent l'utilisation de la PrEP est légèrement plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural (69 % contre 62 %). On constate l'inverse parmi les hommes puisque 79 % en milieu rural approuvent l'utilisation de cette prophylaxie contre 66 % en milieu urbain.

Graphique 13.1 **Connaissance des traitements du VIH et des médicaments pour prévenir la transmission du VIH**

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans qui :



Graphique 13.2 **Connaissance de la prévention de la transmission mère-enfant (PTME) : tendances**

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans qui savent que le risque de TME peut être réduit si la mère prend des médicaments spéciaux



13.2 ATTITUDES DISCRIMINATOIRES ENVERS LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

La stigmatisation et la discrimination largement répandues dans une population peuvent avoir un effet négatif sur la volonté des personnes à se faire dépister et sur leur adhésion à des programmes thérapeutiques antirétrovirale (TAR). Ainsi, la réduction de la stigmatisation et de la discrimination au sein d'une population constitue un indicateur important de la réussite des programmes de prévention et de contrôle du VIH.

Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH

Deux questions posées aux femmes et aux hommes visent à évaluer les attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH. Les personnes interrogées ayant des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH sont celles qui déclarent ne pas acheter des légumes frais à un commerçant ou à un vendeur si elles savent que cette personne est séropositive, ou encore que les enfants vivant avec le VIH ne devraient pas être autorisés à aller à l'école avec les enfants qui n'ont pas le VIH.

Échantillon : Femmes et hommes de 15–49 ans qui ont entendu parler du VIH ou du sida

Au Mali, trois quarts des femmes de 15–49 ans (75 %) et 61 % des hommes de 15–49 ans ont des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH. Parmi les femmes, 71 % n'achèteraient pas des légumes frais à un commerçant ayant le VIH et 66 % pensent que les enfants séropositifs au VIH ne devraient pas fréquenter l'école avec les enfants VIH négatifs. Ces pourcentage sont respectivement de 58 % et 51 % chez les hommes (**Tableau 13.2**).

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Les pourcentages de femmes et d'hommes qui ont des comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH varient selon le milieu de résidence. Chez les femmes, il est de 63 % en milieu urbain et de 80 % en milieu rural. Chez les hommes, il est de 47 % en milieu urbain et de 68 % en milieu rural.

- Les attitudes discriminatoires sont plus répandues dans les régions de Mopti (80 %) et de Koulikoro (79 %) parmi les femmes et dans celles de Ségou (74 %) et de Gao (71 %) parmi les hommes. Elles sont moins répandues dans la région de Tombouctou aussi bien parmi les femmes (73 %) que parmi les hommes (53 %).

- Les pourcentages de femmes et d'hommes qui ont des comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH diminuent avec le niveau d'instruction, passant de 81 % chez les femmes n'ayant aucun niveau d'instruction à 62 % parmi celles ayant le niveau secondaire ou plus. Parmi les hommes, ce pourcentage passe de respectivement 69 % à 52 % (**Graphique 13.3**).

Graphique 13.3 **Attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH, par niveau d'instruction**

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans ayant entendu parler du VIH



Note : Les enquêtés ayant des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH sont ceux qui déclarent que les enfants vivant avec le VIH ne devraient pas être autorisées à aller à l'école avec les enfants séronégatifs ou qu'ils n'achèteraient pas des légumes frais à un commerçant ou un vendeur séropositif.

- Les pourcentages de femmes et d'hommes qui ont des comportements discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH diminuent également avec l'augmentation du niveau de bien-être économique du ménage. Chez les femmes, ce pourcentage passe de 88 % dans le quintile de bien-être le plus bas à 61 % dans le quintile de bien-être le plus élevé et, parmi les hommes, de respectivement 73 % à 46 %.

13.3 MULTIPLICITÉ DE PARTENAIRES SEXUELS

Le multipartenariat dans les rapports sexuels accroit le risque d'infection par les IST, en particulier le risque de contracter le VIH. Pour évaluer l'exposition au risque de contracter le virus du sida, lors de

l'EDSM-VII, des questions sur le nombre de partenaires sexuels au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête et sur l'utilisation du condom au cours des derniers rapports sexuels ont été posées.

Le **Tableau 13.3.1** montre qu'au cours des 12 mois précédant l'enquête, 1 % des femmes de 15–49 ans ont déclaré avoir eu des rapports sexuels avec deux partenaires sexuels ou plus et 5 % ont déclaré avoir eu des rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient. Parmi celles ayant eu deux partenaires ou plus au cours des 12 derniers mois, 12 % ont déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels. En outre, parmi celles ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec un partenaire non-cohabitant, 10 % ont déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels avec cette personne (**Graphique 13.4**).

Graphique 13.4 **Rapports sexuels et utilisation du condom avec un partenaire non cohabitant**



Chez les hommes de 15–49 ans, les résultats montrent que le multipartenariat est plus fréquent ; 14 % ont eu au moins deux partenaires sexuelles et 15 % ont eu des rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la personne avec qui ils vivaient. Parmi ceux-ci, 36 % ont utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels avec cette personne. Le pourcentage d'utilisation de condom chez les hommes ayant eu au moins deux partenaires sexuels est de 12 % (**Tableau 13.3.2** et **Graphique 13.4**).

Le nombre moyen de partenaires sexuels sur la durée de vie est estimé à 1,3 parmi les femmes de 15–49 ans et à 3,1 parmi les hommes de 15–49 ans.

Tendances : Depuis 2018, le pourcentage de femmes de 15–49 ans ayant eu au moins deux partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois et qui ont utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels a plus que doublé, passant de 5 % à 12 % ; celui des hommes, est resté stable (11 % en 2018 il était de 10 % et en 2023–2024 de 12 %. Sur la même période, le nombre moyens de partenaires sexuels sur la durée de vie a légèrement diminué. Chez les femmes, il est passé de 1,7 à 1,3 et chez les hommes, de 3,4 à 3,1.

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage des femmes et des hommes de 15–49 ans ayant eu, au cours des 12 derniers mois, des rapports sexuels avec un/une partenaire qui n'était ni leur mari/épouse, ni le/la partenaire avec qui elles/ils vivaient augmente avec le niveau d'instruction. Chez les femmes, il passe de 3 % chez celles n'ayant aucun niveau d'instruction à 9 % chez celles ayant le niveau secondaire ou plus. Chez les hommes, il passe respectivement de 9 % à 21 %.

- Le pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans ayant eu, au cours des 12 derniers mois, des rapports sexuels avec un partenaire non-cohabitant varie selon le milieu de résidence. Parmi les femmes, il varie de 4 % en milieu rural à 9 % en milieu urbain et, parmi les hommes, de respectivement 13 % à 22 %.

- Le pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans ayant eu, au cours des 12 derniers mois, des rapports sexuels avec un partenaire non-cohabitant varie selon les régions. Chez les femmes, c'est dans

la capitale Bamako (9 %) et la région de Gao (8 %) que ce pourcentage est le plus élevé. Il est plus faible dans les régions de Mopti (3 %) et Tombouctou (3 %). Chez les hommes, les pourcentages les plus élevés sont observés dans la capitale Bamako (24 %) suivie de la région de Kayes (21 %) et les plus faibles, dans les régions de Tombouctou (7 %) et Gao (8 %).

- Le pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans ayant eu, au cours des 12 derniers mois, des rapports sexuels avec un partenaire non-cohabitant augmente avec le niveau de bien-être économique. Parmi les femmes, il passe de 2 % dans le quintile de bien-être le plus bas à 8 % dans le quintile de bien-être le plus élevé et, parmi les hommes, de respectivement 8 % à 22 %.

13.4 COUVERTURE DES SERVICES DE DÉPISTAGE DU VIH

Les programmes de dépistage du VIH permettent de diagnostiquer les personnes vivant avec le VIH pour qu'elles puissent être orientées vers des soins et accéder à une thérapie antirétrovirale (TAR). La connaissance du statut sérologique permet aux personnes séronégatives de réduire leur risque de contracter le VIH et de rester négative.

Au cours de l'EDSM-VII, des questions ont été posées aux enquêtés pour savoir s'ils avaient déjà effectué ou non un test de dépistage du VIH et s'ils avaient reçu, ou non, les résultats du test.

13.4.1 Dépistage du VIH chez les femmes enceintes

Parmi les femmes de 15–49 ans ayant eu une naissance au cours des deux années avant l'enquête, environ un quart (26 %) avait fait un test du VIH durant une visite prénatale et avait reçu le résultat. En outre, 27 % avaient fait un test du VIH durant une visite prénatale ou pendant l'accouchement et avaient reçu le résultat. Dans 2 % des cas, les femmes n'avaient pas reçu le résultat du test (**Tableau 13.4**).

Tendances : Depuis 2006, le pourcentage de femmes de 15–49 ans ayant eu une naissance dans les deux années avant l'enquête et qui ont fait un test du VIH pendant une visite prénatale et qui ont reçu le résultat a nettement augmenté, passant de 4 % en 2006 à 12 % en 2018 puis à 26 % en 2023–2024 (**Graphique 13.5**).

***Graphique 13.5* Dépistage du VIH pendant la grossesse : tendances**

Pourcentage de femmes de 15–49 ans ayant eu une naissance au cours des 2 années précédant l'enquête qui ont fait un test du VIH au cours des soins prénatals et reçu le résultat



Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage de femmes enceintes ayant effectué un test de dépistage du VIH au cours des soins prénatals et reçu les résultats est plus élevé en milieu urbain (51 %) qu'en milieu rural (19 %).
- Le pourcentage de femmes enceintes ayant effectué un test de dépistage du VIH au cours des soins prénatals et reçu le résultat augmente avec le niveau d'instruction et le quintile de bien-être économique passant, pour le niveau d'instruction de 18 % chez les femmes sans instruction à 44 % chez celles ayant le niveau secondaire ou plus et, pour le niveau de bien-être économique, de 11 % dans le quintile le plus bas à 54 % dans le plus élevé.
- Ce pourcentage varie en outre de 60 % à Bamako à 4 % à Tombouctou (**Carte 13.1**).

Carte 13.1 Dépistage du VIH chez les femmes enceintes au cours des soins prénatals, par région

Pourcentage de femmes de 15–49 ans ayant eu une naissance au cours des 2 années précédant l'enquête qui ont fait un test de dépistage du VIH au cours des soins prénatals et reçu le résultat



Note : Pour des raisons d'insécurité, les données de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région et ne sont pas présentées séparément.

13.4.2 Test de dépistage du VIH antérieur

Au cours de l'EDSM-VII, des questions ont été posées aux enquêtés pour savoir s'ils avaient déjà effectué ou non un test de dépistage du VIH et s'ils avaient reçu, ou non, les résultats de leur test.

Parmi les femmes de 15–49 ans, 79 % n'ont jamais effectué un test du VIH et 20 % ont déclaré en avoir fait un et reçu le résultat. Chez les hommes de 15–49 ans, 89 % n'ont jamais fait de test et 10 % en ont fait un et ont reçu le résultat. Au cours des 12 derniers mois, 5 % des femmes et 2 % des hommes de 15–49 ans ont déclaré avoir effectué un test de dépistage du VIH et reçu le résultat du dernier test (**Tableaux 13.5.1** et **13.5.2** et **Graphique 13.6**).

Graphique 13.6 Dépistage du VIH

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans



Onze pour cent des femmes de 15–49 ans, ont fait un test de VIH au cours de leur vie et 5 % en ont fait deux. Parmi les hommes, ces pourcentages sont plus faibles (respectivement 7 % et 2 %). Environ 2 % des femmes et 1 % des hommes de 15–49 ans ont effectué 5 tests ou plus au cours de leur vie (**Tableau 13.6**).

Tendances : Entre 2018 et 2023–2024, le pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans ayant fait un test de VIH au cours de l'année précédant l'enquête et ayant reçu le résultat a diminué, passant de 9 % à 5 % pour les femmes et de 5 % à 2 % pour les hommes (**Graphique 13.7**).

***Graphique 13.7* Dépistage du VIH : tendances**

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans ayant fait un test du VIH au cours de l'année précédant l'enquête et ayant reçu le résultat



Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage de femmes qui ont déjà fait un test du VIH et qui connaissent le résultat est nettement plus faible parmi les célibataires (8 %) que parmi les autres (24 % parmi les femmes actuellement en union et 25 % parmi celles en rupture d'union). On note ces mêmes variations chez les hommes célibataires ou actuellement en union avec, respectivement, 5 % et 15 %.

- Les pourcentages de femmes et d'hommes ayant déjà fait un test du VIH et connaissant le résultat sont plus élevés en milieu urbain qu'en milieu rural (33 % contre 16 % chez les femmes et 15 % contre 8 % chez les hommes).

- Les pourcentages de femmes et d'hommes ayant déjà fait un test du VIH et connaissant le résultat augmentent avec le niveau d'instruction. Parmi les femmes, ce pourcentage passe de 15 % parmi celles n'ayant aucun niveau d'instruction à 31 % parmi celles ayant le niveau secondaire ou plus. Parmi les hommes, il passe respectivement de 4 % à 16 % (**Graphique 13.8**). En ce qui concerne le dépistage récent du VIH, on constate la même tendance, puisque le pourcentage de femmes qui connaissent leur statut sérologique récent passe de 3 % à 8 % et celui des hommes de 1 % à 4 %.

***Graphique 13.8* Dépistage du VIH par niveau d'instruction**

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans ayant déjà fait un test du VIH et reçu le résultat



- Le pourcentage de femmes et d'hommes ayant fait un test du VIH et ayant reçu le résultat augmente du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, passant de 10 % à 34 % chez les femmes et, de 4 % à 18 % chez les hommes.

Connaissance des autotests et couverture

Huit pourcents des femmes et 7 % des hommes ont entendu parler des autotests de dépistage du VIH et environ 1 % des femmes et autant d'hommes les ont déjà utilisés (**Tableau 13.7**).

La connaissance des autotests de dépistage augmente avec le niveau d'instruction aussi bien parmi les femmes que parmi les hommes. Le pourcentage passe de 5 % parmi les femmes n'ayant aucun niveau d'instruction à 13 % parmi celles ayant le niveau secondaire et plus et, parmi les hommes, de respectivement, 4 % à 11 %

Les pourcentages de personnes ayant entendu parler de l'autotest du VIH demeurent légèrement plus élevés en milieu urbain qu'en milieu rural, quel que soit le sexe : 10 % parmi les femmes du milieu urbain contre 7 % parmi celles du milieu rural et parmi les hommes, 9 % contre 6 %.

13.5 RÉVÉLATION, OPPROBRE ET STIGMATISATION DES PERSONNES AYANT DÉCLARÉ LEUR SÉROPOSITIVITÉ

La stigmatisation intériorisée et vécue a une incidence négative sur la santé physique et mentale et le bien-être des personnes vivant avec le VIH et constituent des facteurs structurels de l'épidémie du VIH. Au cours de l'EDSM-VII, on a demandé aux personnes interrogées qui avaient déjà eu un test de dépistage du VIH d'indiquer le résultat de leur test le plus récent. À celles qui ont déclaré que le résultat de leur test était positif, on a posé plusieurs questions sur la façon dont elles vivaient cette situation, y compris une question sur l'intériorisation de leur séropositivité ainsi que des questions sur des comportements auxquels elles avaient été confrontées du fait de leur statut positif dans les établissement de soins et en milieu communautaire. Le calcul d'un indicateur sur l'expérience de la stigmatisation dans le milieu communautaire est tiré des trois questions incluses sur ce sujet.

Tous ces indicateurs sont basés sur la population des personnes qui savent qu'elles ont le VIH et qui ont choisi de révéler leur séropositivité pendant l'interview. Il ne faut pas oublier que ce groupe peut exclure certaines personnes interviewées qui savent qu'elles ont le VIH, et les résultats doivent donc être interprétés avec prudence.

Stigmatisation et discrimination subies par les personnes vivant avec le VIH dans l'environnement communautaire au cours des 12 derniers mois

Les femmes et les hommes vivant avec le VIH qui ont reconnu avoir vécu l'une ou plusieurs des trois situations suivantes à cause de leur séropositivité, au cours des 12 derniers mois : (1) des personnes ont dit du mal d'eux ; (2) un tiers a révélé leur état sérologique sans leur permission ; (3) ils ont été insultés, harcelés ou menacés en raison de leur état sérologique.

Échantillon : Femmes et hommes âgés de 15–49 ans qui se sont déclarés séropositifs

Seuls 14 femmes et 2 hommes ont accepté de divulguer leur statut sérologique positif vis-à-vis du VIH. Le nombre de cas non pondérés est de 14 chez les femmes et 2 chez les hommes et on ne peut donc tirer aucun renseignement de ces résultats. Les tableaux ne sont donc pas présentés.

13.6 CIRCONCISION

Circoncision traditionnelle

Une entaille, une ablation partielle ou complète du prépuce par un praticien traditionnel, un membre de la famille ou un ami pour des motifs religieux, de santé ou culturels. Peut être pratiquée à tout âge.

Circoncision médicale

Ablation complète du prépuce exécutée par un professionnel de santé. Peut être pratiquée à tout âge.

Échantillon : Hommes de 15–49 ans

On a demandé à tous les hommes s'ils étaient circoncis. Dans le cas d'une réponse positive, on leur a demandé si leur circoncision était de type traditionnel ou médical et leur âge à chaque intervention. Dans certains contextes, la circoncision traditionnelle peut laisser suffisamment de prépuce intact pour qu'il soit possible d'effectuer une circoncision médicale par la suite, il est donc possible qu'un homme ait pu avoir subi une circoncision traditionnelle et une circoncision médicale.

Le **Tableau 13.8** présente les pourcentages d'hommes de 15–64 ans qui ont déclaré être circoncis, par type de circoncision,

Dans l'ensemble, la quasi-totalité des hommes de 15–49 ans sont circoncis traditionnellement ou médicalement (98 %) et dans la majorité des cas, ils ont été circoncis de manière traditionnelle (67 %). Cependant, près d'un tiers des hommes (29 %) ont été circoncis médicalement et à peine 1 % a été circoncis traditionnellement et médicalement.

Tendances : Depuis 2006, le pourcentage d'hommes circoncis est demeuré très élevé et constant (98 %).

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage d'hommes circoncis traditionnellement ou médicalement varie peu avec l'âge. Cependant, des générations anciennes aux plus récentes, on note, une augmentation du pourcentage des hommes ayant été circoncis médicalement seulement et une diminution du pourcentage de ceux circoncis seulement de manière traditionnelle. Le pourcentage d'hommes circoncis médicalement qui est de 15 % parmi ceux de 45–49 ans a tendance à augmenter pour concerner 27 % parmi ceux de 30–34 ans et 33 % parmi ceux de 15–19 ans. Par contre, le pourcentage de ceux qui ont été circoncis traditionnellement seulement suit la tendance inverse, passant respectivement de 80 % à 70 % et à 59 % (**Graphique 13.9**). Cette tendance traduit une médicalisation de la pratique de la circoncision.

***Graphique 13.9* Circoncision, par âge et par type de circoncision**

Pourcentage d'hommes de 15–49 ans qui sont circoncis



- Le pourcentage d'hommes circoncis de manière traditionnelle est plus élevé dans les régions de Gao (90 %), de Tombouctou (88 %) et de Koulikoro (79 %) qu'à Mopti et Sikasso (51 %) où les pourcentages sont les plus faibles.

- C'est parmi les Touaregs/Bellas (90 %), les Arabes/Maures (80 %) et les Bozo (76 %) que la circoncision traditionnelle est la plus fréquente. Dans les ethnies Sénoufo et Minianka (43 %) ou Dogon (49 %), la pratique traditionnelle est moins courante ; dans ces ethnies, la moitié des hommes sont circoncis médicalement (50 % parmi les Sénoufos/Miniankas et les Dogons (50 %)

13.7 DÉCLARATION VOLONTAIRE DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

Infections sexuellement transmissibles (IST) et symptômes

On a demandé aux enquêtés ayant déjà eu des rapports sexuels s'ils/ elles avaient eu une IST ou des symptômes d'une IST (un écoulement anormal et malodorant du vagin/pénis ou une plaie ou un ulcère génital) au cours des 12 mois précédant l'enquête.

Échantillon : Femmes et hommes de 15–49 ans ayant déjà eu des rapports sexuels

Dans l'ensemble, 45 % des femmes de 15–49 ans ayant déjà eu des rapports sexuels ont déclaré, avoir eu une IST ou des symptômes d'IST au cours des 12 derniers mois. Ce pourcentage est de 11 % parmi les hommes (**Tableau 13.9**).

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage de femmes ayant déclaré avoir eu une IST ou des symptômes d'IST au cours des 12 derniers mois est plus élevé dans les régions de Kayes (62 %), de Sikasso (55 %) et de Gao (33 %) et plus faible dans la région de Tombouctou (22 %). Parmi les hommes, les pourcentages les plus élevés sont observés dans les régions de Gao (15 %) et de Mopti (16 %).

- Parmi les femmes, la prévalence autodéclarée des IST ou des symptômes associés augmente avec le niveau d'instruction, passant de 42 % parmi celles sans niveau d'instruction à 48 % parmi celles ayant le niveau secondaire ou plus. Elle augmente également avec le quintile de bien-être économique, passant de 42 % dans le plus bas à 50 % dans le plus élevé. Parmi les hommes, on ne note pas d'écart important avec le niveau d'instruction. En fonction du quintile de bien-être économique, la prévalence déclarée augmente légèrement, passant de 8 % dans le second quintile à 13 % dans le plus élevé.

13.8 CONNAISSANCE ET COMPORTEMENTS DES JEUNES FACE AU VIH ET AU SIDA

Cette section traite des connaissances relatives au VIH chez les jeunes de 15–24 ans et évalue également dans quelle mesure les jeunes ont des comportements susceptibles de les exposer au risque de contracter le VIH.

13.8.1 Connaissance de la prévention du VIH

Connaissance concernant la prévention du VIH

La connaissance signifie ici : savoir que l'utilisation régulière de condoms lors des rapports sexuels et avoir un seul partenaire fidèle non infecté peuvent réduire les risques de contracter le VIH et savoir qu'une personne qui semble en bonne santé peut cependant avoir le VIH, et rejeter deux principales idées fausses concernant la transmission du VIH, à savoir que le VIH peut être transmis par une piqûre de moustique et qu'une personne peut être infectée en partageant des repas avec une personne séropositive.

Échantillon : Femmes et hommes de 15–24 ans

La connaissance des moyens de transmission du VIH reste essentielle pour permettre aux personnes d'éviter l'infection par le VIH, en particulier parmi les jeunes, car, à cette période de la vie, ils sont souvent plus exposés au risque à cause de relations de plus courte durée avec une multiplicité de partenaires ou encore parce qu'ils sont plus susceptibles d'adopter d'autres comportements à risque.

***Graphique 13.10* Connaissance des moyens de prévention du VIH parmi les jeunes**

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–24 ans possédant des informations spécifiques sur la prévention et la transmission du VIH



Treize pour cent des femmes et 15 % des hommes de 15–24 ans ont une connaissance des moyens de prévention du VIH. (**Tableau 13.10.1**, **Tableau 13.10.2** et **Graphique 13.10**). En d'autres termes, ils savent non seulement que l'utilisation régulière de condoms au cours de chaque rapport sexuel et la limitation des rapports sexuels à un seul partenaire qui n'a pas contracté le VIH et qui n'a pas d'autres partenaires peuvent réduire les risques de contracter le VIH mais aussi qu'une personne paraissant en bonne santé peut néanmoins avoir le VIH. En outre, ils rejettent les deux conceptions erronées sur la transmission du VIH selon lesquelles le VIH peut être transmis par des piqûres de moustiques et en partageant le repas d'une personne ayant le VIH.

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- C'est parmi les célibataires ayant déjà eu des rapports sexuels que les pourcentages de celles et ceux qui connaissent les moyens de prévention du VIH sont les plus élevés (17 % chez les femmes et 20 % chez les hommes). À l'opposé, c'est parmi les jeunes femmes actuellement en union ou l'ayant déjà été (11 %) et parmi les jeunes hommes célibataires n'ayant jamais eu de rapports sexuels (12 %) que ces pourcentages sont les plus faibles.

- Les jeunes de 15–24 ans qui connaissent les moyens de prévention du VIH sont plus élevés en milieu urbain qu'en milieu rural (19 % contre 10 % parmi les femmes et 25 % contre 10 % parmi les hommes).

- Parmi les jeunes femmes, le pourcentage de celles qui connaissent les moyens de prévention varie de 15 % dans la région de Koulikoro à 7 % dans celles de Gao et Tombouctou. Chez les jeunes hommes, ce pourcentage varie de 19 % dans la région de Tombouctou à 3 % dans celle de Gao.

- Le pourcentage de jeunes de 15–24 ans qui ont une connaissance des moyens de prévention du VIH augmente avec le niveau d'instruction, passant de 7 % parmi les jeunes femmes sans niveau

d'instruction à 19 % parmi celles ayant le niveau secondaire ou plus et parmi les jeunes hommes de, respectivement, 8 % à 21 %.

- Du quintile moyen au plus élevé, les pourcentages de jeunes de 15–24 ans qui connaissent les moyens de prévention augmentent, passant, parmi les femmes de 9 % à 20 % et, parmi les hommes de 6 % à 24 %.

13.8.2 Premier rapport sexuel

Les jeunes qui ont des rapports sexuels à un âge précoce courent généralement davantage de risques de grossesse ou de contracter une IST que les jeunes qui ont des rapports sexuels plus tardifs. L'utilisation systématique de préservatifs contribue à réduire ces risques.

Parmi les femmes de 15–24 ans, 15 % ont déjà eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans et parmi celles de 18–24 ans, 64 % ont déjà eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans. Chez les jeunes hommes, l'âge aux premiers rapports sexuels est plus tardif : parmi ceux de 15–24 ans, seuls 5 % ont eu des rapports sexuels avant 15 ans et parmi ceux de 18–24 ans, 20 % ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans (**Tableau 13.11**).

Tendances : Entre 2006 et 2023–2024, le pourcentage de jeunes femmes de 15–24 ans ayant eu leur premier rapport sexuel à un âge précoce (avant 15 ans) a diminué, passant de 25 % en 2006 à 15 % en 2023–2024. Ce pourcentage n'a pas varié pour les hommes (5 %). Le pourcentage de jeunes de 18–24 ans ayant eu leurs premiers rapports sexuels avant 18 ans diminue au cours de la même période, passant, parmi les jeunes femmes, de 73 % en 2006 à 64 % en 2023–2024, et de 28 % à 20 % pour les hommes.

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Parmi les jeunes femmes, l'entrée dans la vie sexuelle est plus précoce en milieu rural qu'en milieu urbain avec des écarts très prononcés. En milieu rural, 71 % des femmes de 18–24 ans ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans contre 46 % en milieu urbain. Les pourcentages de femmes de 15–24 ans, ayant déjà eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans sont respectivement de 18 % et de 9 %. Parmi les jeunes hommes de 18–24 ans, que ce soit en milieu urbain ou rural, le pourcentage de ceux qui ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans est le même (20 %).

- La précocité des rapports sexuels parmi les jeunes femmes de 15–24 ans diminue avec le niveau d'instruction, passant de 22 % parmi celles sans niveau d'instruction à 8 % parmi celles ayant le niveau secondaire ou plus. Il en est de même parmi les femmes de 18–24 ans, le pourcentage passant respectivement de 76 % à 46 %. Parmi les jeunes hommes, c'est parmi ceux de niveau primaire que la précocité du premier rapport sexuel est la plus fréquente.

13.8.3 Rapports sexuels avant le mariage

Le **Tableau 13.12** montre que parmi les célibataires de 15–24 ans, 76 % des jeunes femmes et 71 % des jeunes hommes n'ont jamais eu de rapports sexuels. Ces pourcentages ont tendance à diminuer avec l'âge, que ce soit parmi les jeunes femmes ou les jeunes hommes, passant de 87 % chez les 15–17 ans à 43 % chez les 23–24 ans parmi les femmes et, respectivement, de 90 % à 37 % parmi les hommes des mêmes tranches d'âges.

Si les pourcentages de jeunes femmes célibataires n'ayant jamais eu de rapports sexuels sont proches en milieu rural (76 %) et en milieu urbain (75 %), il n'en est pas ainsi des jeunes hommes célibataires puisque 73 % d'entre eux en milieu rural n'avaient jamais eu de rapports sexuels contre 67 % en milieu urbain.

Les pourcentages de célibataires n'ayant jamais eu de rapports sexuels ont tendance à diminuer avec le niveau d'instruction chez les jeunes hommes, passant de 78 % parmi les hommes n'ayant aucun niveau

d'instruction à 70 % parmi ceux ayant le niveau secondaire ou plus. Parmi les jeunes femmes, le pourcentage le plus faible est observé parmi celles de niveau primaire (73 %).

13.8.4 Multiplicité des partenaires sexuels

Les **Tableaux 13.13.1** et **13.13.2** présentent les pourcentages de femmes et d'hommes de 15–24 ans qui ont eu plusieurs partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois et les pourcentages de ceux qui ont utilisé un condom au cours de ces rapports sexuels.

Parmi les femmes de 15–24 ans, 1 % ont eu, au cours des 12 derniers mois, au moins deux partenaires sexuels et 9 % ont eu des rapports sexuels avec un partenaire non-cohabitant. Parmi les hommes, ces pourcentages sont plus élevés (respectivement 5 % et 21 %). Parmi les femmes et les hommes ayant eu au moins deux partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois, respectivement 13 % et 38 % ont utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels. Parmi celles et ceux qui ont eu des rapports sexuels avec un partenaire non-cohabitant, les pourcentages ayant utilisé un condom sont respectivement de 9 % et de 33 %.

Que ce soit parmi les hommes ou les femmes, le multipartenariat sexuel est plus élevé chez ceux ayant le niveau secondaire ou plus. Le pourcentage de femmes et d'hommes ayant eu des rapports sexuels avec un partenaire non-cohabitant est plus élevé parmi les célibataires (18 % parmi les femmes et 21 % parmi les hommes) que parmi ceux en union ou qui l'ont été (respectivement 2 % et 8 %). Le multipartenariat est aussi plus fréquent en milieu urbain que rural. L'utilisation du condom suit les mêmes tendances.

13.8.5 Dépistage récent du VIH

Il peut parfois être plus difficile pour les jeunes que pour les adultes de demander un test de dépistage du VIH, car de nombreux jeunes n'ont pas encore acquis suffisamment d'expérience pour accéder aux services de santé pour eux-mêmes et parce qu'il existe souvent des obstacles à l'obtention de services par les jeunes.

Le **Tableau 13.14** présente les pourcentages de jeunes femmes et de jeunes hommes de 15–24 ans qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois et qui ont été testés pour le VIH au cours des 12 derniers mois et qui ont reçu le résultat du dernier test. La proportion de jeunes qui connaissent leur statut sérologique récent est 5 fois plus élevée chez les femmes que chez les hommes (5 % contre 1 %).

Tendances : De 2012–2013 à 2023–2024, on constate que le pourcentage de jeunes femmes de 15–24 ans, sexuellement actives et qui ont effectué un test de dépistage du VIH dans les 12 derniers mois et qui ont reçu le résultat montre une tendance en dents de scie, passant de 7 % en 2012–2013 à 0 % en 2018 puis à 5 % en 2023–2024. Parmi les jeunes hommes, ce pourcentage a diminué régulièrement sur la période passant, respectivement, de 7 % à 6 % puis à 1 %.

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur le savoir, les attitudes et les comportements liés au VIH et au sida, consultez les tableaux suivants :

- **Tableau 13.1 Connaissance et opinions concernant des médicaments pour traiter le VIH ou prévenir sa transmission**
- **Tableau 13.2 Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH**
- **Tableau 13.3.1 Partenaires sexuels multiples et rapport sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois : Femme**
- **Tableau 13.3.2 Partenaires sexuels multiples et rapport sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois : Homme**
- **Tableau 13.4 Femmes enceintes ayant fait un test du VIH**
- **Tableau 13.5.1 Couverture du test du VIH antérieur à l'enquête : Femme**
- **Tableau 13.5.2 Couverture du test du VIH antérieur à l'enquête : Homme**
- **Tableau 13.6 Nombre de fois testé pour le VIH au cours de la vie**
- **Tableau 13.7 Connaissance et couverture de l'autotest de dépistage du VIH**
- **Tableau 13.8 Circoncision**
- **Tableau 13.9 Prévalence déclarée des infections sexuellement transmissibles (IST) et symptômes déclarés d'IST**
- **Tableau 13.10.1 Connaissance des moyens de prévention du VIH parmi les jeunes : Femme**
- **Tableau 13.10.2 Connaissance des moyens de prévention du VIH parmi les jeunes: Homme**
- **Tableau 13.11 Âge aux premiers rapports sexuels parmi les jeunes**
- **Tableau 13.12 Rapports sexuels prénuptiaux parmi les jeunes**
- **Tableau 13.13.1 Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois parmi les jeunes : Femme**
- **Tableau 13.13.2 Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois parmi les jeunes : Homme**
- **Tableau 13.14 Tests du VIH récents parmi les jeunes**

Tableau 13.1 Connaissance et opinions concernant des médicaments pour traiter le VIH ou prévenir sa transmission

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans qui ont entendu parler des médicaments antirétroviraux (ARV) qui traitent le VIH, pourcentage qui savent que le risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant (TME) peut être réduit si la mère prend des médicaments spéciaux et pourcentage qui ont entendu parler de la prophylaxie préexposition (PrEP), et parmi les femmes et les hommes de 15–49 ans qui ont entendu parler de la PrEP, pourcentage qui approuve les personnes qui utilisent la PrEP pour éviter de contracter le VIH, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant entendu parler des ARV qui traitent le VIH	Pourcentage sachant que le risque de TME peut être réduit par la prise de médicaments spéciaux par la mère	Pourcentage ayant entendu parler de la PrEP	Effectif d'enquêtés	Pourcentage qui approuve que les gens utilisent la PrEP pour éviter de contracter le VIH	Effectif d'enquêtés qui ont entendu parler de la PrEP
			FEMME			
Âge						
15–24	22,5	33,7	13,8	7 240	63,1	999
15–19	18,1	27,2	11,2	3 862	64,9	432
20–24	27,6	41,0	16,8	3 378	61,7	567
25–29	36,0	47,4	21,2	2 905	68,3	615
30–39	39,6	50,9	22,6	4 446	64,3	1 005
40–49	39,4	46,8	22,6	2 755	63,8	622
État matrimonial						
Célibataire	24,5	33,8	14,0	3 585	63,5	503
A déjà eu des rapports sexuels	35,9	48,3	20,8	1 027	66,8	214
N'a jamais eu de rapports sexuels	19,9	27,9	11,3	2 558	61,0	289
Actuellement en union	33,4	44,5	19,7	13 237	64,1	2 611
En rupture d'union	41,6	51,2	24,1	525	80,7	126
Résidence						
Bamako	46,3	57,1	20,8	2 675	71,4	555
Autre urbain	37,4	53,0	25,3	2 048	67,2	519
Ensemble urbain	42,4	55,3	22,7	4 723	69,4	1 074
Rural	27,9	37,7	17,2	12 624	62,2	2 166
Région						
Kayes	41,8	45,6	24,3	2 635	61,1	639
Koulikoro	18,1	28,1	12,0	4 018	68,8	481
Sikasso	27,5	43,3	18,3	3 143	56,4	576
Ségou	35,4	47,0	24,0	2 574	55,0	619
Mopti	33,0	47,8	14,9	1 530	86,4	228
Tombouctou	19,3	22,4	12,4	281	84,4	35
Gao	25,2	29,3	22,1	485	78,3	107
Kidal	†	†	†	6	†	0
Bamako	46,3	57,1	20,8	2 675	71,4	555
Ensemble 15–49	31,8	42,5	18,7	17 347	64,6	3 241
			HOMME			
Âge						
15–24	18,5	24,7	9,6	2 833	78,9	272
15–19	13,2	20,5	6,8	1 669	80,6	113
20–24	26,1	30,6	13,6	1 165	77,7	159
25–29	42,0	40,2	19,0	930	81,1	177
30–39	49,7	46,8	24,2	1 693	74,4	409
40–49	49,8	46,5	26,9	1 230	71,3	331
État matrimonial						
Célibataire	22,6	27,8	10,5	3 127	79,0	328
A déjà eu des rapports sexuels	34,1	39,0	14,9	1 124	79,6	168
N'a jamais eu de rapports sexuels	16,1	21,4	8,0	2 003	78,4	160
Actuellement en union	46,7	44,1	24,2	3 512	74,1	850
En rupture d'union	(48,2)	(44,9)	(24,4)	47	*	11
Résidence						
Bamako	46,6	47,7	14,9	1 177	66,2	176
Autre urbain	37,5	37,8	18,2	795	65,7	145
Ensemble urbain	42,9	43,7	16,2	1 971	66,0	320
Rural	32,3	33,4	18,4	4 714	79,1	869
Région						
Kayes	20,2	26,4	11,4	920	81,3	105
Koulikoro	35,5	36,1	25,3	1 637	93,5	414
Sikasso	41,5	35,7	23,7	1 215	61,8	288
Ségou	31,8	42,9	11,1	939	54,9	104
Mopti	36,5	30,1	13,4	505	77,1	67

À suivre...

Tableau 13.1—*Suite*

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant entendu parler des ARV qui traitent le VIH	Pourcentage sachant que le risque de TME peut être réduit par la prise de médicaments spéciaux par la mère	Pourcentage ayant entendu parler de la PrEP	Effectif d'enquêtés	Pourcentage qui approuve que les gens utilisent la PrEP pour éviter de contracter le VIH	Effectif d'enquêtés qui ont entendu parler de la PrEP
Tombouctou	16,9	15,2	11,6	128	84,2	15
Gao	28,4	19,7	12,8	163	(50,7)	21
Kidal	†	†	†	2	†	0
Bamako	46,6	47,7	14,9	1 177	66,2	176
Ensemble 15–49	35,4	36,4	17,8	6 686	75,6	1 189
50–64	47,4	44,6	23,9	1 143	76,2	273
Ensemble 15–64	37,2	37,6	18,7	7 829	75,7	1 462

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 13.2 Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH

Parmi les femmes et des hommes de 15–49 ans qui ont entendu parler du VIH ou du sida, pourcentage qui ne pense pas que les enfants vivant avec le VIH doivent pouvoir fréquenter l'école avec les enfants qui sont VIH négatifs, pourcentage qui n'achèteraient pas des légumes frais à un commerçant qui a le VIH et pourcentage ayant des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH, selon certaines caractéristiques sociodémographiques EDSM-VII Mali 2023–2024

	Femme				Homme			
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage qui ne pense pas que les enfants vivant avec le VIH doivent pouvoir fréquenter l'école avec les enfants VIH négatifs	Pourcentage qui n'achèterait pas des légumes frais à un commerçant qui a le VIH	Pourcentage ayant des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH[1]	Effectif de femmes qui ont entendu parler du VIH ou du sida	Pourcentage qui ne pense pas que les enfants vivant avec le VIH doivent pouvoir fréquenter l'école avec les enfants VIH négatifs	Pourcentage qui n'achèterait pas des légumes frais à un commerçant qui a le VIH	Pourcentage ayant des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH[1]	Effectif d'hommes qui ont entendu parler du VIH ou du sida
Âge								
15–24	69,4	74,9	78,7	6 244	60,9	66,4	71,0	2 474
15–19	73,0	78,6	82,4	3 164	66,7	70,9	74,6	1 376
20–24	65,7	71,1	74,8	3 080	53,5	60,7	66,6	1 098
25–29	65,5	69,8	73,0	2 684	45,6	55,4	58,0	894
30–39	63,6	68,4	71,6	4 138	43,7	50,5	53,3	1 644
40–49	64,8	69,3	71,8	2 541	44,4	50,3	54,2	1 183
État matrimonial								
Célibataire	62,7	69,3	73,4	3 059	57,9	64,0	68,2	2 751
A déjà eu des rapports sexuels	56,2	61,5	65,4	954	52,2	58,3	63,5	1 087
N'a jamais eu de rapports sexuels	65,7	72,8	77,0	2 105	61,6	67,7	71,3	1 664
Actuellement en union	67,9	72,5	75,6	12 071	45,6	52,4	55,8	3 402
En rupture d'union	53,3	58,4	61,5	477	(28,9)	(44,3)	(44,3)	41
Résidence								
Bamako	54,2	59,4	63,8	2 582	33,0	39,0	44,8	1 133
Autre urbain	50,7	59,0	62,1	1 962	42,4	46,3	50,0	752
Ensemble urbain	52,7	59,2	63,1	4 544	36,8	41,9	46,9	1 885
Rural	72,1	76,4	79,5	11 062	57,2	64,3	67,5	4 309
Région								
Kayes	69,3	74,2	77,5	2 421	47,1	54,8	57,9	869
Koulikoro	70,1	74,7	78,6	3 447	58,9	64,7	68,4	1 456
Sikasso	65,5	73,3	75,6	2 741	51,5	56,9	60,0	1 131
Ségou	66,4	71,1	73,7	2 436	59,6	71,9	74,3	906
Mopti	75,8	77,0	79,7	1 465	57,1	57,0	61,7	471
Tombouctou	61,5	67,9	72,6	207	49,1	52,9	55,3	110
Gao	73,9	74,8	77,7	303	60,1	69,2	70,8	116
Kidal	†	†	†	4	†	†	†	2
Bamako	54,2	59,4	63,8	2 582	33,0	39,0	44,8	1 133

À suivre...

Tableau 13.2—*Suite*

Caractéristique sociodémographique	Femme				Homme			
	Pourcentage qui ne pense pas que les enfants vivant avec le VIH doivent pouvoir fréquenter l'école avec les enfants VIH négatifs	Pourcentage qui n'achèterait pas des légumes frais à un commerçant qui a le VIH	Pourcentage ayant des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH[1]	Effectif de femmes qui ont entendu parler du VIH ou du sida	Pourcentage qui ne pense pas que les enfants vivant avec le VIH doivent pouvoir fréquenter l'école avec les enfants VIH négatifs	Pourcentage qui n'achèterait pas des légumes frais à un commerçant qui a le VIH	Pourcentage ayant des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH[1]	Effectif d'hommes qui ont entendu parler du VIH ou du sida
Niveau d'instruction								
Aucun	73,9	78,5	81,2	8 134	59,8	65,8	69,0	2 245
Primaire	70,5	75,1	78,1	2 627	58,8	64,5	68,5	1 214
Secondaire ou plus	51,8	57,5	61,9	4 846	40,2	47,6	51,7	2 735
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	82,3	85,6	88,0	2 604	63,2	70,5	72,8	1 063
Second	75,6	80,0	82,7	2 794	57,1	64,1	67,2	1 086
Moyen	72,5	75,8	78,9	2 899	60,5	66,4	70,0	1 064
Quatrième	60,7	66,5	69,8	3 371	47,9	53,7	58,5	1 347
Le plus élevé	50,0	56,8	61,4	3 938	35,2	42,0	46,3	1 635
Ensemble 15–49	66,4	71,4	74,7	15 606	51,0	57,5	61,2	6 194
50–64	na	na	na	na	44,8	53,0	56,1	1 102
Ensemble 15–64	na	na	na	na	50,0	56,8	60,5	7 297

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.
na = non applicable
[1] Pourcentage qui ne pense pas que les enfants vivant avec le VIH doivent pouvoir fréquenter l'école avec les enfants VIH négatifs et/ou qui n'achèterait pas des légumes frais à un commerçant qui a le VIH
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 13.3.1 Partenaires sexuels multiples et rapport sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois : Femme

Parmi toutes les femmes de 15–49 ans, pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois et pourcentage ayant eu, au cours des 12 derniers mois, des rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient; parmi les femmes ayant eu, au cours des 12 derniers mois, plus d'un partenaire sexuel, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels ; parmi les femmes de 15–49 ans qui ont eu, au cours des 12 derniers mois, des rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels avec cette personne ; parmi les femmes ayant déjà eu des rapports sexuels, nombre moyen de partenaires sexuels sur la durée de vie, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Toutes les femmes			Femmes ayant eu 2 partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois		Femmes ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient		Femmes ayant déjà eu des rapports sexuels[1]	
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant eu 2 partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient	Effectif de femmes	Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels	Effectif de femmes	Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels avec cette personne	Effectif de femmes	Nombre moyen de partenaires sexuels sur la durée de vie	Effectif de femmes
Âge									
15–24	1,3	9,1	7 240	13,3	92	9,0	655	1,3	4 700
15–19	1,2	10,1	3 862	(15,0)	48	8,9	390	1,2	1 732
20–24	1,3	7,9	3 378	(11,5)	44	9,3	266	1,3	2 968
25–29	1,1	4,0	2 905	(3,4)	31	10,6	116	1,3	2 839
30–39	1,0	2,2	4 446	(20,3)	45	11,9	97	1,4	4 411
40–49	0,9	1,0	2 755	*	24	(8,8)	28	1,4	2 735
État matrimonial									
Célibataire	2,1	20,7	3 585	25,1	74	10,0	742	1,7	999
Actuellement en union	0,7	0,5	13 237	2,8	96	6,4	63	1,3	13 166
En rupture d'union	4,2	17,6	525	*	22	8,4	92	1,9	519
Résidence									
Bamako	1,5	9,3	2 675	(28,3)	40	14,3	249	1,5	1 967
Autre urbain	1,2	8,1	2 048	(11,4)	26	7,4	166	1,4	1 607
Ensemble urbain	1,4	8,8	4 723	21,8	66	11,5	415	1,5	3 574
Rural	1,0	3,8	12 624	6,5	127	7,8	481	1,3	11 110
Région									
Kayes	1,8	5,4	2 635	(10,2)	47	11,0	142	1,5	2 321
Koulikoro	0,7	4,4	4 018	*	27	8,0	177	1,3	3 416
Sikasso	0,5	3,8	3 143	*	17	4,3	119	1,3	2 774
Ségou	2,0	4,7	2 574	(1,8)	51	7,4	121	1,2	2 269

À suivre...

Tableau 13.3.1—*Suite*

Caractéristique sociodémographique	Toutes les femmes			Femmes ayant eu 2 partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois		Femmes ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient		Femmes ayant déjà eu des rapports sexuels[1]	
	Pourcentage ayant eu 2 partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient	Effectif de femmes	Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels	Effectif de femmes	Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels avec cette personne	Effectif de femmes	Nombre moyen de partenaires sexuels sur la durée de vie	Effectif de femmes
Mopti	0,4	2,6	1 530	*	6	6,0	40	1,2	1 337
Tombouctou	0,9	3,3	281	*	3	7,6	9	1,3	226
Gao	0,3	8,4	485	*	1	7,9	41	1,5	369
Kidal	†	†	6	†	0	†	0	†	5
Bamako	1,5	9,3	2 675	(28,3)	40	14,3	249	1,5	1 967
Niveau d'instruction									
Aucun	0,9	2,6	9 382	3,8	86	4,2	240	1,3	8 676
Primaire	1,3	6,2	2 926	(14,7)	39	12,1	182	1,4	2 438
Secondaire ou plus	1,3	9,4	5 039	20,1	67	11,3	475	1,4	3 570
Quintile de bien-être économique									
Le plus bas	0,7	2,2	3 036	*	20	2,8	68	1,2	2 839
Second	0,8	2,7	3 143	*	24	5,0	85	1,3	2 900
Moyen	1,3	4,9	3 318	(9,5)	42	8,7	161	1,3	2 937
Quatrième	1,5	6,7	3 676	(15,3)	56	9,5	245	1,4	3 000
Le plus élevé	1,2	8,1	4 174	19,8	51	12,5	337	1,4	3 007
Ensemble 15–49	1,1	5,2	17 347	11,7	193	9,5	897	1,3	14 684

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

[1] Les moyennes sont calculées en excluant les enquêtées qui ont donné des réponses non numériques.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 13.3.2 Partenaires sexuels multiples et rapport sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois : Homme

Parmi tous les hommes de 15–49 ans, pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec plus d'une partenaire sexuelle au cours des 12 derniers mois et pourcentage ayant eu, au cours des 12 derniers mois, des rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient; parmi les hommes ayant eu, au cours des 12 derniers mois, plus d'une partenaire sexuelle, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels; parmi les hommes de 15–49 ans qui ont eu, au cours des 12 derniers mois, des rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels avec cette personne; parmi les hommes ayant déjà eu des rapports sexuels, nombre moyen de partenaires sexuelles sur la durée de vie, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Tous les hommes			Hommes ayant eu 2 partenaires sexuelles ou plus au cours des 12 derniers mois		Hommes ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient		Hommes ayant déjà eu des rapports sexuels[1]	
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant eu 2 partenaires sexuelles ou plus au cours des 12 derniers mois	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient	Effectif d'hommes	Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels	Effectif d'hommes	Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels avec cette personne	Effectif d'hommes	Nombre moyen de partenaires sexuelles sur la durée de vie	Effectif d'hommes
Âge									
15–24	4,7	20,6	2 833	38,2	132	32,9	583	3,0	937
15–19	1,2	11,3	1 669	*	20	31,7	189	2,2	274
20–24	9,6	33,8	1 165	35,9	112	33,5	394	3,3	663
25–29	10,7	24,0	930	30,7	99	38,2	223	3,2	800
30–39	17,4	10,0	1 693	7,4	295	40,7	169	3,0	1 592
40–49	32,0	3,8	1 230	1,8	394	(46,5)	46	3,3	1 173
État matrimonial									
Célibataire	6,0	26,8	3 127	45,2	186	33,3	839	3,6	1 094
Actuellement en union	20,8	4,7	3 512	3,2	730	49,2	166	2,9	3 363
En rupture d'union	(8,3)	(35,9)	47	*	4	*	17	(6,1)	44
Type d'union									
En union polygame	77,8	2,8	731	1,0	569	*	21	3,4	694
En union non polygame	5,8	5,2	2 781	11,0	161	51,1	145	2,8	2 670
Non en union actuellement	6,0	27,0	3 174	45,6	190	33,4	856	3,7	1 138
Résidence									
Bamako	12,3	23,7	1 177	25,5	145	44,9	279	4,0	784
Autre urbain	14,5	19,4	795	21,3	115	47,1	154	4,3	500
Ensemble urbain	13,2	22,0	1 971	23,7	261	45,7	433	4,1	1 284
Rural	14,0	12,5	4 714	7,3	659	28,8	589	2,7	3 218
Région									
Kayes	16,5	20,7	920	14,3	152	32,8	190	3,4	687
Koulikoro	9,1	12,5	1 637	13,4	149	31,7	205	2,7	1 113
Sikasso	15,4	9,7	1 215	4,9	188	27,7	118	2,4	781
Ségou	19,3	15,3	939	7,7	181	31,4	144	3,6	636
Mopti	16,6	12,4	505	8,1	84	46,0	62	2,8	322
Tombouctou	4,8	6,5	128	(13,2)	6	(46,8)	8	2,1	80

À suivre...

Tableau 13.3.2—*Suite*

Caractéristique sociodémographique	Tous les hommes			Hommes ayant eu 2 partenaires sexuelles ou plus au cours des 12 derniers mois		Hommes ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient		Hommes ayant déjà eu des rapports sexuels[1]	
	Pourcentage ayant eu 2 partenaires sexuelles ou plus au cours des 12 derniers mois	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient	Effectif d'hommes	Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels	Effectif d'hommes	Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels avec cette personne	Effectif d'hommes	Nombre moyen de partenaires sexuelles sur la durée de vie	Effectif d'hommes
Gao	9,4	8,4	163	(4,7)	15	(26,5)	14	2,1	98
Kidal	†	†	2	†	0	†	0	†	2
Bamako	12,3	23,7	1 177	25,5	145	44,9	279	4,0	784
Niveau d'instruction									
Aucun	18,2	8,5	2 476	4,9	449	27,0	211	2,6	1 881
Primaire	12,9	16,6	1 352	10,0	174	28,4	224	3,3	908
Secondaire ou plus	10,4	20,6	2 858	23,8	296	42,1	587	3,6	1 713
Quintile de bien-être économique									
Le plus bas	15,9	8,2	1 179	1,3	188	14,8	97	2,5	803
Second	14,6	9,9	1 174	5,4	172	20,0	116	2,3	820
Moyen	15,3	13,7	1 190	13,0	183	32,1	164	3,2	782
Quatrième	12,1	18,9	1 446	15,6	174	38,4	274	3,3	971
Le plus élevé	12,0	21,9	1 697	23,4	203	46,4	371	4,0	1 126
Ensemble 15–49	13,8	15,3	6 686	12,0	920	36,0	1 022	3,1	4 502
50–64	30,5	1,8	1 143	1,0	349	*	21	2,9	1 072
Ensemble 15–64	16,2	13,3	7 829	9,0	1 269	35,9	1 043	3,1	5 574

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

[1] Les moyennes sont calculées en excluant les enquêtées qui ont donné des réponses non numériques.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 13.4 Femmes enceintes ayant fait un test du VIH

Parmi toutes les femmes de 15–49 ans ayant eu une naissance au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant fait un test du VIH pendant une visite prénatale pour leur naissance la plus récente selon qu'elles ont reçu, ou non, le résultat et pourcentage ayant fait un test du VIH pendant une visite prénatale ou l'accouchement pour leur naissance la plus récente, selon qu'elles ont reçu, ou non, le résultat du test, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant fait un test du VIH durant une visite prénatale et qui :		Pourcentage ayant fait un test du VIH pendant une visite prénatale ou pendant l'accouchement et qui[1]		Effectif de femmes qui ont eu une naissance dans les 2 dernières années[2]
	Ont reçu les résultats	N'ont pas reçu les résultats	Ont reçu les résultats	N'ont pas reçu les résultats	
Âge					
15–24	22,9	1,8	23,7	1,9	2 319
15–19	19,5	2,4	20,3	2,7	673
20–24	24,3	1,6	25,1	1,6	1 646
25–29	25,9	1,5	27,0	1,8	1 555
30–39	28,9	1,5	30,2	1,4	1 900
40–49	23,6	0,5	24,8	1,0	374
État matrimonial					
Célibataire	39,8	0,8	41,1	0,8	192
Actuellement en union	25,1	1,5	26,1	1,7	5 884
En rupture d'union	22,5	2,9	26,7	4,0	71
Résidence					
Bamako	60,0	0,6	61,0	0,6	724
Autre urbain	39,2	1,5	40,3	1,8	602
Ensemble urbain	50,6	1,0	51,6	1,1	1 326
Rural	18,6	1,7	19,7	1,8	4 822
Région					
Kayes	23,6	3,8	25,5	4,3	958
Koulikoro	25,6	0,6	26,9	1,0	1 466
Sikasso	19,2	1,9	19,9	2,0	1 202
Ségou	16,6	1,1	17,3	0,8	963
Mopti	17,3	1,3	18,0	1,3	580
Tombouctou	3,9	0,2	4,2	0,2	79
Gao	22,5	1,7	23,2	2,0	174
Kidal	†	†	†	†	3
Bamako	60,0	0,6	61,0	0,6	724
Niveau d'instruction					
Aucun	17,6	1,5	18,4	1,7	3 513
Primaire	24,3	2,3	25,3	2,4	1 078
Secondaire ou plus	44,2	1,0	45,8	1,0	1 558
Quintile de bien-être économique					
Le plus bas	10,7	1,1	11,8	1,4	1 290
Second	12,4	2,2	13,5	2,0	1 253
Moyen	18,1	2,1	18,9	2,3	1 237
Quatrième	36,3	1,4	37,4	1,5	1 264
Le plus élevé	53,8	0,8	55,0	1,0	1 104
Ensemble	25,5	1,5	26,6	1,7	6 148

[1] La question concernant le test du VIH pendant l'accouchement n'a été posée qu'aux femmes qui ont accouché en établissement de santé.
[2] Sont incluses dans le dénominateur les femmes qui n'ont pas reçu de soins prénatals pour leur dernière naissance ayant eu lieu au cours des 2 dernières années
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 13.5.1 Couverture du test du VIH antérieur à l'enquête : Femme

Répartition (en %) des femmes de 15–49 ans selon qu'elles ont fait, ou non, un test du VIH et selon qu'elles ont reçu, ou non, les résultats du dernier test ; pourcentage de femmes de 15–49 ans ayant déjà fait un test du VIH et pourcentage de femmes ayant fait un test du VIH au cours des 12 derniers mois et ayant reçu les résultats du dernier test, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Répartition (en %) des femmes selon qu'elles ont fait, ou non, un test du VIH et selon qu'elles ont reçu, ou non, les résultats du dernier test			Total	Pourcentage ayant déjà fait un test du VIH	Pourcentage ayant fait un test du VIH au cours des 12 derniers mois et ayant reçu le résultat du dernier test	Effectif de femmes
	A fait un test et a reçu le résultat	A fait un test mais n'a pas reçu le résultat	N'a jamais fait de test du VIH[1]				
Âge							
15–24	12,7	1,1	86,3	100,0	13,7	3,7	7 240
15–19	5,9	0,7	93,4	100,0	6,6	1,8	3 862
20–24	20,4	1,5	78,1	100,0	21,9	5,7	3 378
25–29	26,9	1,4	71,7	100,0	28,3	7,2	2 905
30–39	29,3	1,6	69,1	100,0	30,9	6,1	4 446
40–49	19,1	0,7	80,3	100,0	19,7	2,0	2 755
État matrimonial							
Célibataire	7,6	0,2	92,1	100,0	7,9	2,3	3 585
A déjà eu des rapports sexuels	21,5	0,5	78,0	100,0	22,0	5,9	1 027
N'a jamais eu de rapports sexuels	2,1	0,1	97,8	100,0	2,2	0,8	2 558
Actuellement en union	23,6	1,5	75,0	100,0	25,0	5,2	13 237
En rupture d'union	25,3	0,5	74,1	100,0	25,9	4,5	525
Résidence							
Bamako	35,6	0,8	63,7	100,0	36,3	7,4	2 675
Autre urbain	29,7	1,0	69,3	100,0	30,7	7,0	2 048
Ensemble urbain	33,0	0,9	66,1	100,0	33,9	7,2	4 723
Rural	15,6	1,3	83,1	100,0	16,9	3,6	12 624
Région							
Kayes	17,6	2,5	79,8	100,0	20,2	4,3	2 635
Koulikoro	21,1	0,7	78,2	100,0	21,8	4,7	4 018
Sikasso	16,8	1,7	81,6	100,0	18,4	4,0	3 143
Ségou	15,3	0,8	83,9	100,0	16,1	3,7	2 574
Mopti	16,4	0,8	82,8	100,0	17,2	3,4	1 530
Tombouctou	4,2	0,3	95,5	100,0	4,5	0,5	281
Gao	16,6	0,9	82,5	100,0	17,5	5,0	485
Kidal	†	†	†	100,0	†	†	6
Bamako	35,6	0,8	63,7	100,0	36,3	7,4	2 675
Niveau d'instruction							
Aucun	14,7	1,3	84,0	100,0	16,0	3,0	9 382
Primaire	19,9	1,4	78,7	100,0	21,3	4,1	2 926
Secondaire ou plus	31,0	0,9	68,0	100,0	32,0	7,9	5 039
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	9,7	1,1	89,2	100,0	10,8	2,3	3 036
Second	11,3	1,3	87,4	100,0	12,6	2,3	3 143
Moyen	14,4	1,6	83,9	100,0	16,1	3,7	3 318
Quatrième	26,8	1,3	71,9	100,0	28,1	5,6	3 676
Le plus élevé	33,8	0,8	65,4	100,0	34,6	7,9	4 174
Ensemble	20,3	1,2	78,5	100,0	21,5	4,6	17 347

[1] Y compris les enquêtées qui n'ont pas entendu parler du VIH ou qui ont refusé de répondre aux questions sur le test
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 13.5.2 Couverture du test du VIH antérieur à l'enquête : Homme

Répartition (en %) des hommes de 15–49 ans selon qu'ils ont fait, ou non, un test du VIH et selon qu'ils ont reçu, ou non, les résultats du dernier test; pourcentage d'hommes de 15–49 ans ayant déjà fait un test du VIH et pourcentage d'hommes ayant fait un test au cours des 12 derniers mois et ayant reçu le résultat du dernier test, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Répartition (en %) des hommes selon qu'ils ont fait, ou non, un test du VIH et selon qu'ils ont reçu, ou non, les résultats du dernier test			Total	Pourcentage ayant déjà fait un test du VIH	Pourcentage ayant fait un test du VIH au cours des 12 derniers mois et ayant reçu le résultat du dernier test	Effectif d'hommes
	A fait un test et a reçu le résultat	A fait un test mais n'a pas reçu le résultat	N'a jamais fait de test du VIH[1]				
Âge							
15–24	3,1	0,5	96,3	100,0	3,7	0,8	2 833
15–19	0,7	0,3	99,0	100,0	1,0	0,1	1 669
20–24	6,6	0,8	92,6	100,0	7,4	1,7	1 165
25–29	12,6	1,1	86,3	100,0	13,7	2,7	930
30–39	16,2	0,8	83,0	100,0	17,0	3,3	1 693
40–49	15,4	0,5	84,2	100,0	15,8	2,2	1 230
État matrimonial							
Célibataire	4,7	0,6	94,7	100,0	5,3	0,8	3 127
A déjà eu des rapports sexuels	10,0	0,9	89,0	100,0	11,0	1,3	1 124
N'a jamais eu de rapports sexuels	1,8	0,4	97,9	100,0	2,1	0,5	2 003
Actuellement en union	14,6	0,8	84,6	100,0	15,4	2,9	3 512
En rupture d'union	(13,9)	(0,0)	(86,1)	100,0	(13,9)	(6,1)	47
Résidence							
Bamako	16,1	0,9	83,0	100,0	17,0	2,5	1 177
Autre urbain	12,8	1,1	86,1	100,0	13,9	1,8	795
Ensemble urbain	14,7	1,0	84,3	100,0	15,7	2,2	1 971
Rural	8,0	0,6	91,4	100,0	8,6	1,8	4 714
Région							
Kayes	7,2	0,2	92,6	100,0	7,4	1,2	920
Koulikoro	8,6	0,5	90,9	100,0	9,1	2,3	1 637
Sikasso	8,1	0,5	91,4	100,0	8,6	1,5	1 215
Ségou	11,9	1,8	86,2	100,0	13,8	1,8	939
Mopti	6,0	0,0	94,0	100,0	6,0	1,4	505
Tombouctou	8,3	1,3	90,4	100,0	9,6	1,4	128
Gao	12,1	0,2	87,7	100,0	12,3	3,4	163
Kidal	†	†	†	100,0	†	†	2
Bamako	16,1	0,9	83,0	100,0	17,0	2,5	1 177
Niveau d'instruction							
Aucun	4,2	0,3	95,5	100,0	4,5	0,5	2 476
Primaire	7,7	0,5	91,8	100,0	8,2	0,8	1 352
Secondaire ou plus	16,1	1,1	82,8	100,0	17,2	3,7	2 858
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	4,1	0,7	95,2	100,0	4,8	0,5	1 179
Second	5,8	0,3	93,8	100,0	6,2	1,0	1 174
Moyen	8,2	0,7	91,1	100,0	8,9	1,5	1 190
Quatrième	10,6	0,5	88,9	100,0	11,1	2,5	1 446
Le plus élevé	17,7	1,0	81,2	100,0	18,8	3,3	1 697
Ensemble 15–49	10,0	0,7	89,3	100,0	10,7	1,9	6 686
50–64	14,5	0,5	85,0	100,0	15,0	1,0	1 143
Ensemble 15–64	10,6	0,7	88,7	100,0	11,3	1,8	7 829

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.
[1] Y compris les enquêtées qui n'ont pas entendu parler du VIH ou qui ont refusé de répondre aux questions sur le test
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 13.6 Nombre de fois testé pour le VIH au cours de la vie

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15–49 ans par nombre de fois qu'ils ont effectué un test du VIH dans leur vie, selon l'âge, EDSM-VII Mali 2023–2024

Âge	Nombre de fois testé pour le VIH au cours de la vie							Jamais testé	Total	Effectif d'enquêtés
	1	2	3	4	5–9	10–19	20+			
					FEMME					
15–24	9,5	3,2	0,7	0,2	0,2	0,0	0,0	86,3	100,0	7 240
15–19	5,7	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	93,4	100,0	3 862
20–24	13,8	6,0	1,3	0,4	0,3	0,0	0,0	78,1	100,0	3 378
25–29	13,3	7,8	4,1	1,9	0,9	0,2	0,1	71,7	100,0	2 905
30–39	13,0	7,4	4,9	2,4	2,9	0,2	0,1	69,1	100,0	4 446
40–49	8,1	3,6	3,3	2,1	2,2	0,3	0,2	80,3	100,0	2 755
Ensemble 15–49	10,8	5,1	2,8	1,3	1,3	0,2	0,1	78,5	100,0	17 347
					HOMME					
15–24	3,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	96,3	100,0	2 833
15–19	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	100,0	1 669
20–24	6,1	0,5	0,5	0,2	0,0	0,1	0,0	92,6	100,0	1 165
25–29	9,8	1,8	1,0	0,2	0,8	0,0	0,0	86,3	100,0	930
30–39	9,9	2,7	1,9	1,0	1,0	0,3	0,1	83,0	100,0	1 693
40–49	8,6	3,4	1,6	0,6	1,2	0,2	0,3	84,2	100,0	1 230
Ensemble 15–49	6,8	1,7	1,0	0,4	0,6	0,1	0,1	89,3	100,0	6 686
50–64	8,9	2,1	2,2	0,1	1,1	0,4	0,1	85,0	100,0	1 143
Ensemble 15–64	7,1	1,7	1,2	0,4	0,7	0,2	0,1	88,7	100,0	7 829

Tableau 13.7 Connaissance et couverture de l'autotest de dépistage du VIH

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans qui ont entendu parler des autotests de dépistage du VIH et pourcentage qui ont utilisé un autotest de dépistage du VIH, selon certaines caractéristiques socio-économiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Femme			Homme		
	A entendu parler de l'autotest du VIH	A utilisé un autotest du VIH	Effectif de femmes	A entendu parler de l'autotest du VIH	A utilisé un autotest du VIH	Effectif d'hommes
Âge						
15–19	4,3	0,1	3 862	2,9	0,0	1 669
20–24	7,7	0,6	3 378	8,2	0,3	1 165
25–29	9,3	0,9	2 905	6,3	0,6	930
30–34	10,9	1,5	2 382	8,0	0,5	909
35–39	8,2	0,6	2 065	10,2	1,4	784
40–44	9,0	1,0	1 586	8,8	1,6	663
45–49	7,6	0,8	1 169	10,5	1,0	568
Résidence						
Bamako	9,5	0,5	2 675	10,8	0,3	1 177
Autre urbain	10,9	1,1	2 048	6,4	0,9	795
Ensemble urbain	10,1	0,8	4 723	9,0	0,5	1 971
Rural	7,0	0,7	12 624	6,3	0,7	4 714
Niveau d'instruction						
Aucun	5,1	0,4	9 382	3,9	0,3	2 476
Primaire	8,0	0,4	2 926	4,3	0,2	1 352
Secondaire ou plus	12,9	1,5	5 039	11,2	1,1	2 858
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	4,1	0,3	3 036	3,0	0,0	1 179
Second	4,7	0,4	3 143	4,4	0,6	1 174
Moyen	7,6	0,5	3 318	5,3	0,5	1 190
Quatrième	9,4	0,9	3 676	8,7	0,6	1 446
Le plus élevé	11,7	1,2	4 174	11,6	1,1	1 697
Ensemble 15–49	7,8	0,7	17 347	7,1	0,6	6 686
50–64	na	na	na	9,7	0,9	1 143
Ensemble 15–64	na	na	na	7,5	0,7	7 829

na = non applicable

Tableau 13.8 Circoncision

Répartition (en %) d'hommes de 15–49 ans par statut vis-à-vis de la circoncision, et pourcentage circoncis traditionnellement ou médicalement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristiques sociodémographique	Statut vis-à-vis de la circoncision						Total	Pourcentage circoncis traditionnellement ou médicalement[1]	Pourcentage circoncis médicalement[2]	Effectif d'hommes
	Circoncis traditionnellement seulement	Circoncis médicalement seulement	Circoncis traditionnellement et médicalement	Circoncis, ne connaît pas le type	Non circoncis	Ne connaît pas le statut concernant la circoncision				
Âge										
15–19	59,2	33,2	0,3	4,8	2,1	0,5	100,0	97,4	33,6	1 669
20–24	61,4	32,7	0,2	3,5	2,0	0,1	100,0	97,9	33,3	1 165
25–29	61,9	33,2	1,2	2,0	1,6	0,1	100,0	98,3	34,4	930
30–34	70,0	26,8	0,4	1,7	1,1	0,0	100,0	98,9	27,2	909
35–39	72,7	23,7	0,6	1,8	1,0	0,1	100,0	98,9	24,6	784
40–44	76,3	21,8	0,4	1,0	0,5	0,0	100,0	99,5	22,2	663
45–49	80,4	15,2	1,1	1,1	2,2	0,0	100,0	97,8	16,3	568
Ethnie										
Bambara	73,5	21,8	0,3	3,1	1,2	0,0	100,0	98,7	22,2	2 045
Malinke	64,2	33,1	0,5	1,2	1,1	0,0	100,0	98,9	33,9	800
Peulh	73,2	21,7	0,6	4,1	0,3	0,1	100,0	99,6	22,4	816
Sarakole/Soninke/ Marka	72,8	22,9	0,8	2,0	0,4	1,0	100,0	98,6	23,8	620
Kassonke	57,2	36,1	0,0	1,5	5,1	0,0	100,0	94,9	36,1	53
Sonraï	73,4	22,1	0,5	1,0	3,0	0,0	100,0	97,0	22,6	262
Dogon	48,7	49,6	0,0	0,9	0,6	0,2	100,0	99,2	49,6	456
Touareg/Bella	89,8	3,8	0,0	2,9	3,2	0,4	100,0	96,4	3,8	161
Sénoufo/Minianka	42,5	49,6	0,8	4,9	1,9	0,2	100,0	97,9	50,7	811
Bobo	51,5	29,0	1,0	1,1	17,3	0,0	100,0	82,7	30,1	157
Bozo	75,8	23,7	0,6	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	24,2	177
Arabe/Maure	80,3	14,0	0,0	2,4	2,8	0,5	100,0	96,7	14,3	46
Autre ethnie malienne	72,4	20,5	1,9	2,3	2,9	0,0	100,0	97,1	22,7	215
Pays CEDEAO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	23
Autres pays africains	(48,4)	(45,7)	(0,0)	(5,9)	(0,0)	(0,0)	(100,0)	(100,0)	(45,7)	36
Autres nationalités	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7
Religion										
Musulmane	67,1	28,3	0,5	2,8	1,2	0,2	100,0	98,6	28,9	6 278
Chrétienne	46,1	42,8	0,7	1,7	8,6	0,0	100,0	91,4	43,6	189
Animiste	51,1	34,6	0,0	3,5	10,8	0,0	100,0	89,2	34,6	96
Autre	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2
Sans religion	81,5	13,3	0,0	0,0	5,3	0,0	100,0	94,7	13,3	121
Résidence										
Bamako	65,6	31,2	0,8	1,1	1,2	0,1	100,0	98,8	32,1	1 177
Autre urbain	52,4	41,9	0,1	4,3	1,3	0,1	100,0	98,6	42,3	795
Ensemble urbain	60,3	35,5	0,5	2,4	1,2	0,1	100,0	98,7	36,2	1 971
Rural	69,1	25,6	0,5	2,8	1,8	0,2	100,0	98,0	26,2	4 714

À suivre...

Tableau 13.8—*Suite*

Caractéristiques sociodémographique	Statut vis-à-vis de la circoncision						Total	Pourcentage circoncis traditionnellement ou médicalement[1]	Pourcentage circoncis médicalement[2]	Effectif d'hommes
	Circoncis traditionnellement seulement	Circoncis médicalement seulement	Circoncis traditionnellement et médicalement	Circoncis, ne connaît pas le type	Non circoncis	Ne connaît pas le statut concernant la circoncision				
Région										
Kayes	65,1	31,7	1,0	1,4	0,7	0,3	100,0	99,1	32,6	920
Koulikoro	79,3	15,0	0,9	2,6	2,0	0,2	100,0	97,8	16,0	1 637
Sikasso	51,1	40,4	0,0	7,3	1,1	0,2	100,0	98,8	40,7	1 215
Ségou	67,7	27,0	0,0	1,7	3,6	0,1	100,0	96,3	27,1	939
Mopti	51,4	47,3	0,2	0,8	0,2	0,2	100,0	99,6	47,5	505
Tombouctou	88,1	7,1	0,0	0,9	3,9	0,0	100,0	96,1	7,3	128
Gao	89,9	5,1	0,8	2,1	1,5	0,5	100,0	98,0	6,0	163
Kidal	†	†	†	†	†	†	100,0	†	†	2
Bamako	65,6	31,2	0,8	1,1	1,2	0,1	100,0	98,8	32,1	1 177
Niveau d'instruction										
Aucun	73,8	21,5	0,2	2,6	1,5	0,4	100,0	98,1	21,9	2 476
Primaire	69,7	25,1	0,6	2,7	1,9	0,0	100,0	98,1	25,9	1 352
Secondaire ou plus	58,7	36,1	0,7	2,9	1,6	0,1	100,0	98,4	36,9	2 858
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	67,8	26,1	0,5	2,6	2,6	0,5	100,0	96,9	26,5	1 179
Second	66,4	28,3	0,2	3,0	1,9	0,2	100,0	98,0	28,6	1 174
Moyen	73,5	21,6	0,7	3,0	1,2	0,0	100,0	98,8	22,3	1 190
Quatrième	68,1	27,6	0,5	2,8	0,9	0,1	100,0	98,9	28,3	1 446
Le plus élevé	59,4	35,9	0,8	2,3	1,6	0,1	100,0	98,3	36,8	1 697
Ensemble 15–49	66,5	28,5	0,5	2,7	1,6	0,2	100,0	98,2	29,1	6 686
50–64	83,5	12,1	0,6	0,6	2,9	0,3	100,0	96,8	12,7	1 143
Ensemble 15–64	69,0	26,1	0,5	2,4	1,8	0,2	100,0	98,0	26,7	7 829

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

[1] Y compris tous les hommes ayant déclaré être circoncis

[2] Y compris tous les hommes ayant déclaré être circoncis médicalement : ceux qui sont aussi circoncis de manière traditionnelle, ceux qui ne sont pas circoncis de manière traditionnelle et ceux qui ne savent pas s'ils sont, ou non, traditionnellement circoncis

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 13.9 Prévalence déclarée des infections sexuellement transmissibles (IST) et symptômes déclarés d'IST

Parmi les femmes et les hommes de 15–49 ans ayant déjà eu des rapports sexuels, pourcentage ayant déclaré avoir eu une IST et/ou des symptômes d'IST au cours des 12 derniers mois, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	FEMME					HOMME				
	Pourcentage de femmes ayant déclaré avoir eu au cours des 12 derniers mois :				Effectif de femmes ayant déjà eu des rapports sexuels	Pourcentage d'hommes ayant eu au cours des 12 derniers mois :				Effectif d'hommes ayant déjà eu des rapports sexuels
Caractéristique sociodémographique	IST	Pertes vaginales anormales/ malodo-rantes	Plaie/ ulcère génital	IST/ pertes génitales/ plaie ou ulcère		IST	Écoulement anormal du pénis	Plaie/ ulcère génital	IST/ écoulement anormal du pénis/plaie ou ulcère	
Âge										
15–24	16,3	40,9	18,5	46,5	4 735	5,1	8,4	4,2	12,9	950
15–19	14,8	39,9	18,3	46,2	1 751	3,8	10,1	3,7	13,9	275
20–24	17,2	41,5	18,7	46,6	2 984	5,6	7,7	4,4	12,5	675
25–29	19,2	42,2	20,6	47,7	2 858	7,7	7,4	5,1	13,7	832
30–39	18,8	39,7	20,5	45,6	4 434	7,1	5,9	3,4	10,7	1 671
40–49	15,6	31,7	16,5	37,6	2 754	5,4	6,0	3,5	9,5	1 230
État matrimonial										
Célibataire	16,5	41,8	16,9	47,8	1 027	5,4	9,0	5,0	13,3	1 124
Actuellement en union	17,6	39,2	19,5	44,9	13 229	6,6	5,9	3,5	10,7	3 511
En rupture d'union	15,8	31,2	14,2	37,0	525	(8,0)	(9,9)	(9,9)	(16,0)	47
Circoncision										
Circoncis traditionnellement ou médicalement[1]	na	na	na	na	na	6,4	6,7	3,9	11,4	4 621
Circoncis traditionnellement seulement	na	na	na	na	na	6,4	6,7	4,4	11,6	3 289
Circoncis médicalement seulement	na	na	na	na	na	6,4	6,8	2,8	10,9	1 213
Circoncis à la fois traditionnellement et médicalement	na	na	na	na	na	(7,9)	(3,6)	(0,0)	(11,5)	30
Autre[2]	na	na	na	na	na	4,2	9,2	1,5	11,5	89
Non circoncis ou ne sait pas	na	na	na	na	na	4,6	5,0	3,7	9,5	61
Résidence										
Bamako	16,4	50,5	17,4	56,4	1 974	6,1	6,8	2,6	9,6	807
Autre urbain	22,1	37,5	19,0	44,9	1 623	7,4	6,3	3,5	12,0	538
Ensemble urbain	19,0	44,6	18,1	51,2	3 596	6,6	6,6	3,0	10,6	1 345
Rural	17,0	37,3	19,5	42,7	11 185	6,2	6,8	4,3	11,7	3 337
Région										
Kayes	26,2	53,6	27,0	62,3	2 322	3,9	5,7	1,8	9,6	707
Koulikoro	17,9	30,4	16,2	36,4	3 422	5,3	5,4	6,6	10,7	1 134
Sikasso	21,6	48,4	28,3	54,7	2 778	7,3	7,7	2,7	12,4	819
Ségou	8,3	29,8	12,9	32,9	2 276	9,5	6,3	3,8	12,4	653
Mopti	11,7	22,6	11,8	26,1	1 338	8,0	10,6	5,2	15,6	361
Tombouctou	4,7	18,8	6,2	21,5	229	6,9	3,5	5,1	11,1	82
Gao	18,5	28,6	11,8	33,4	437	3,0	11,3	4,6	14,8	117
Kidal	†	†	†	†	5	†	†	†	†	2
Bamako	16,4	50,5	17,4	56,4	1 974	6,1	6,8	2,6	9,6	807
Niveau d'instruction										
Aucun	15,8	37,2	19,6	42,3	8 739	6,0	6,3	3,6	10,7	1 945
Primaire	19,7	42,8	21,1	49,4	2 447	5,3	6,9	4,0	10,9	940
Secondaire ou plus	20,0	41,1	16,5	47,6	3 595	7,3	7,1	4,2	12,4	1 798
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	13,3	37,0	23,0	42,2	2 839	5,2	4,7	3,2	9,6	824
Second	16,0	39,4	21,1	44,8	2 905	3,9	5,2	2,0	7,7	838
Moyen	18,4	37,4	18,4	42,6	2 954	8,7	8,9	4,4	14,8	818
Quatrième	19,8	38,6	17,2	44,3	3 057	5,3	7,2	4,2	11,6	1 024
Le plus élevé	19,5	42,8	16,3	49,8	3 027	8,2	7,2	5,2	12,7	1 178
Ensemble 15–49	17,5	39,1	19,1	44,8	14 782	6,4	6,7	3,9	11,4	4 682
50–64	na	na	na	na	na	2,3	3,0	2,1	5,5	1 140
Ensemble 15–64	na	na	na	na	na	5,6	6,0	3,6	10,2	5 822

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.
na = non applicable
[1] Y compris tous les hommes ayant déclaré être circoncis
[2] Y compris les hommes qui sont (1) circoncis médicalement mais qui ne savent pas s'ils sont circoncis traditionnellement, (2) circoncis traditionnellement mais qui ne savent pas s'ils sont médicalement circoncis, ou (3) circoncis mais qui ne connaissent pas le type de circoncision
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 13.10.1 Connaissance des moyens de prévention du VIH parmi les jeunes : Femme

Pourcentages de jeunes femmes de 15–24 ans qui, en réponse à des questions déterminées, ont déclaré que les gens peuvent réduire leur risque de contracter le VIH en utilisant des condoms au cours de chaque rapport sexuel et en n'ayant des rapports sexuels qu'avec un seul partenaire sexuel qui n'a pas contracté le virus et qui n'a pas d'autres partenaires, qui savent aussi qu'une personne en bonne santé peut néanmoins avoir contracté le VIH, que le VIH ne peut pas être transmis par les piqûres de moustiques et qu'une personne ne peut pas contracter le VIH en partageant les repas d'une personne ayant le VIH, et pourcentage considéré comme ayant une connaissance des moyens de prévention du VIH, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Pourcentage qui savent que :						
	Les gens peuvent réduire leur risque de contracter le VIH :						
Caractéristique sociodémographique	En utilisant un condom au cours de chaque rapport sexuel	En ayant des rapports sexuels qu'avec un seul partenaire qui n'a pas le VIH et qui n'a pas d'autres partenaires	Une personne paraissant en bonne santé peut avoir le VIH	Le VIH ne peut pas être transmis par des piqûres de moustiques	Une personne ne peut pas devenir infectée en partageant les repas avec une personne ayant le VIH	Pourcentage avec une connaissance des moyens de prévention du VIH[1]	Effectif de femmes
Âge							
15–19	47,4	53,0	40,7	43,9	42,7	10,3	3 862
15–17	44,4	48,7	38,3	42,6	39,4	9,9	2 324
18–19	51,9	59,6	44,2	45,9	47,8	11,1	1 538
20–24	61,6	67,2	47,1	50,8	53,6	14,9	3 378
20–22	59,9	66,2	44,8	49,6	53,0	13,5	2 137
23–24	64,4	68,9	51,0	52,9	54,7	17,3	1 241
État matrimonial							
Célibataire	52,1	56,6	45,0	48,3	48,7	14,1	3 308
A déjà eu des rapports sexuels	63,8	67,0	50,6	55,2	54,8	16,8	810
N'a jamais eu de rapports sexuels	48,3	53,2	43,2	46,1	46,8	13,3	2 499
Déjà ou actuellement en union	55,6	62,2	42,5	46,1	47,0	11,1	3 932
Résidence							
Bamako	60,1	71,6	57,3	52,0	54,6	17,7	1 296
Autre urbain	68,6	71,7	52,1	60,8	61,0	20,4	980
Ensemble urbain	63,8	71,7	55,1	55,8	57,4	18,9	2 277
Rural	49,5	54,1	38,4	43,1	43,4	9,6	4 963
Région							
Kayes	57,5	62,0	38,9	45,3	44,7	9,8	1 156
Koulikoro	51,4	49,6	41,6	44,6	47,4	15,2	1 731
Sikasso	50,4	60,1	40,4	44,5	38,4	8,8	1 202
Ségou	58,3	65,4	44,4	47,2	52,3	9,5	972
Mopti	53,5	61,0	42,6	58,1	58,2	14,1	536
Tombouctou	38,1	34,8	28,0	37,1	39,6	7,1	130
Gao	32,0	38,6	31,0	40,8	38,0	6,5	214
Kidal	†	†	†	†	†	†	3
Bamako	60,1	71,6	57,3	52,0	54,6	17,7	1 296
Niveau d'instruction							
Aucun	44,0	50,0	33,0	38,4	37,9	6,8	2 797
Primaire	49,7	56,4	41,0	42,2	40,9	9,9	1 502
Secondaire ou plus	65,7	70,5	55,1	57,9	60,7	19,2	2 942
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	45,5	55,8	34,3	38,2	39,6	8,8	1 011
Second	50,0	54,6	35,8	43,4	40,3	8,1	1 118
Moyen	49,5	56,3	35,9	43,9	40,9	7,5	1 368
Quatrième	57,6	62,6	46,7	49,0	52,5	12,1	1 658
Le plus élevé	60,4	64,0	55,0	54,0	56,6	20,3	2 085
Ensemble 15–24	54,0	59,6	43,6	47,1	47,8	12,5	7 240

[1] Connaître les moyens de prévention du VIH signifie que l'enquêtée sait non seulement que l'utilisation régulière de condoms au cours de chaque rapport sexuel et la limitation des rapports sexuels à un seul partenaire qui n'a pas contracté le VIH et qui n'a pas d'autres partenaires peuvent réduire les risques de contracter le VIH mais aussi qu'une personne paraissant en bonne santé peut néanmoins avoir le VIH et qui rejettent les deux conceptions erronées sur la transmission du VIH selon lesquelles le VIH peut être transmis par des piqûres de moustiques et en partageant le repas d'une personne ayant le VIH

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 13.10.2 Connaissance des moyens de prévention du VIH parmi les jeunes: Homme

Pourcentages de jeunes hommes de 15–24 ans qui, en réponse à des questions déterminées, ont déclaré que les gens peuvent réduire leur risque de contracter le VIH en utilisant des condoms au cours de chaque rapport sexuel et en n'ayant des rapports sexuels qu'avec un seul partenaire sexuel qui n'a pas contracté le virus et qui n'a pas d'autres partenaires, qui savent aussi qu'une personne en bonne santé peut néanmoins avoir contracté le VIH, que le VIH ne peut pas être transmis par les piqûres de moustiques et qu'une personne ne peut pas contracter le VIH en partageant les repas d'une personne ayant le VIH, et pourcentage considéré comme ayant une connaissance des moyens de prévention du VIH, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Pourcentage qui savent que :						
	Les gens peuvent réduire leur risque de contracter le VIH :						
Caractéristique sociodémographique	En utilisant un condom au cours de chaque rapport sexuel	En ayant des rapports sexuels qu'avec un seul partenaire qui n'a pas le VIH et qui n'a pas d'autres partenaires	Une personne paraissant en bonne santé peut avoir le VIH	Le VIH ne peut pas être transmis par des piqûres de moustiques	Une personne ne peut pas devenir infectée en partageant les repas avec une personne ayant le VIH	Pourcentage avec une connaissance des moyens de prévention du VIH[1]	Effectif d'hommes
Âge							
15–19	49,7	49,4	40,2	42,8	44,6	10,6	1 669
15–17	42,6	43,0	35,3	37,6	39,7	8,2	1 041
18–19	61,4	60,2	48,4	51,3	52,7	14,6	627
20–24	67,7	65,5	56,5	54,0	61,1	20,4	1 165
20–22	65,7	64,1	54,6	54,7	60,9	20,2	737
23–24	71,1	67,8	59,9	52,9	61,5	20,7	428
État matrimonial							
Célibataire	56,1	55,1	46,3	47,5	51,0	14,4	2 650
A déjà eu des rapports sexuels	74,1	69,3	59,2	54,7	58,8	19,7	766
N'a jamais eu de rapports sexuels	48,8	49,3	41,0	44,6	47,8	12,3	1 883
Déjà ou actuellement en union	70,8	69,8	56,4	46,0	56,8	17,1	183
Résidence							
Bamako	72,9	68,6	61,3	69,6	72,7	29,2	531
Autre urbain	61,1	55,3	46,3	60,1	62,8	18,8	372
Ensemble urbain	68,0	63,2	55,2	65,7	68,6	24,9	903
Rural	52,0	52,7	43,1	38,8	43,3	9,8	1 930
Région							
Kayes	56,0	57,1	53,8	55,0	53,4	15,2	403
Koulikoro	45,8	48,2	46,4	41,4	42,8	8,8	673
Sikasso	51,4	50,7	39,7	42,1	44,5	13,2	518
Ségou	72,5	75,9	40,1	34,6	53,2	9,8	413
Mopti	51,6	30,2	38,3	39,0	40,6	9,7	178
Tombouctou	43,0	44,4	51,5	61,8	61,2	19,1	54
Gao	23,8	22,0	10,5	14,4	16,2	2,5	61
Kidal	†	†	†	†	†	†	1
Bamako	72,9	68,6	61,3	69,6	72,7	29,2	531
Niveau d'instruction							
Aucun	38,6	41,2	32,7	34,8	36,7	8,3	698
Primaire	51,2	49,4	36,9	37,8	42,7	6,9	638
Secondaire ou plus	68,2	65,8	57,8	57,3	61,9	20,8	1 497
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	44,3	44,9	34,0	32,6	37,4	5,9	479
Second	49,9	48,5	41,5	41,8	47,0	11,6	450
Moyen	49,8	50,8	37,5	31,7	40,4	6,8	515
Quatrième	61,6	61,9	54,4	55,3	53,4	18,3	606
Le plus élevé	70,3	66,1	58,3	63,9	68,1	24,0	784
Ensemble 15–24	57,1	56,0	46,9	47,4	51,4	14,6	2 833

[1] Connaître les moyens de prévention du VIH signifie que l'enquêté sait non seulement que l'utilisation régulière de condoms au cours de chaque rapport sexuel et la limitation des rapports sexuels à un seul partenaire qui n'a pas contracté le VIH et qui n'a pas d'autres partenaires peuvent réduire les risques de contracter le VIH mais aussi qu'une personne paraissant en bonne santé peut néanmoins avoir le VIH et qui rejettent les deux conceptions erronées sur la transmission du VIH selon lesquelles le VIH peut être transmis par des piqûres de moustiques et en partageant le repas d'une personne ayant le VIH

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 13.11 Âge aux premiers rapports sexuels parmi les jeunes

Pourcentage de jeunes femmes et de jeunes hommes de 15–24 ans qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans et pourcentage de jeunes femmes et de jeunes hommes de 18–24 ans qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Femme de 15–24 ans		Femme de 18–24 ans		Homme de 15–24 ans		Homme de 18–24 ans	
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans	Effectif de femmes	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	Effectif de femmes	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans	Effectif d'hommes	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	Effectif d'hommes
Âge								
15–19	12,6	3 862	na	na	4,0	1 669	na	na
15–17	11,3	2 324	na	na	3,5	1 041	na	na
18–19	14,4	1 538	59,2	1 538	4,8	627	18,8	627
20–24	18,6	3 378	65,5	3 378	5,1	1 165	20,3	1 165
20–22	18,0	2 137	63,7	2 137	5,0	737	20,1	737
23–24	19,6	1 241	68,6	1 241	5,3	428	20,8	428
Résidence								
Bamako	7,3	1 296	42,1	828	1,9	531	20,5	367
Autre urbain	11,6	980	51,8	661	3,7	372	19,6	254
Ensemble urbain	9,1	2 277	46,4	1 489	2,6	903	20,1	620
Rural	18,2	4 963	71,0	3 427	5,3	1 930	19,6	1 172
Niveau d'instruction								
Aucun	21,8	2 797	75,6	2 032	3,2	698	16,3	442
Primaire	17,1	1 502	73,2	959	6,8	638	27,5	386
Secondaire ou plus	8,4	2 942	46,0	1 925	4,1	1 497	18,3	964
Ensemble	15,4	7 240	63,5	4 916	4,5	2 833	19,8	1 792

na = non applicable

Tableau 13.12 Rapports sexuels prénuptiaux parmi les jeunes

Parmi les femmes et les hommes de 15–24 ans célibataires, pourcentage qui n'ont jamais eu de rapports sexuels, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Femme de 15–24 ans		Homme de 15–24 ans	
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage n'ayant jamais eu de rapports sexuels	Effectif de femmes célibataires	Pourcentage n'ayant jamais eu de rapports sexuels	Effectif d'hommes célibataires
Âge				
15–19	81,1	2 598	83,9	1 662
15–17	86,5	1 879	90,4	1 039
18–19	67,0	719	72,9	622
20–24	55,2	710	49,6	988
20–22	59,1	540	55,1	684
23–24	42,8	170	37,0	304
Résidence				
Bamako	75,8	890	66,9	513
Autre urbain	72,7	572	66,5	359
Ensemble urbain	74,6	1 462	66,8	872
Rural	76,2	1 847	73,2	1 778
Niveau d'instruction				
Aucun	76,0	817	77,8	628
Primaire	73,3	643	67,8	579
Secondaire ou plus	76,1	1 848	69,5	1 443
Ensemble	75,5	3 308	71,1	2 650

Tableau 13.13.1 Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois parmi les jeunes : Femme

Parmi toutes les jeunes femmes de 15–24 ans, pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois; et pourcentage ayant eu, au cours des 12 derniers mois, des rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient; parmi les femmes ayant eu plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé pendant les derniers rapports sexuels; parmi les jeunes femmes de 15–24 ans qui ont eu, au cours des 12 derniers mois, des rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels avec cette personne, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Femmes de 15–24 ans			Femmes de 15–24 ans ayant eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois		Femmes de 15–24 ans ayant eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient	
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient	Effectif de femmes	Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels	Effectif de femmes	Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels avec ce partenaire	Effectif de femmes
Âge							
15–19	1,2	10,1	3 862	(15,0)	48	8,9	390
15–17	1,0	8,9	2 324	*	23	9,6	206
18–19	1,6	11,9	1 538	*	25	8,0	184
20–24	1,3	7,9	3 378	(11,5)	44	9,3	266
20–22	1,5	8,5	2 137	(16,1)	31	10,2	182
23–24	1,0	6,8	1 241	*	13	7,3	84
État matrimonial							
Célibataire	1,6	17,9	3 308	(20,9)	53	9,5	593
Déjà ou actuellement en union	1,0	1,6	3 932	(3,1)	39	4,3	62
Résidence							
Bamako	1,3	12,3	1 296	*	17	10,9	159
Autre urbain	1,0	12,2	980	*	9	7,2	119
Ensemble urbain	1,2	12,2	2 277	(18,4)	27	9,3	279
Rural	1,3	7,6	4 963	11,3	65	8,8	376
Niveau d'instruction							
Aucun	1,2	6,2	2 797	(6,7)	34	4,8	175
Primaire	1,7	9,4	1 502	*	25	7,9	141
Secondaire ou plus	1,1	11,5	2 942	(23,3)	33	11,7	340
Ensemble 15–24	1,3	9,1	7 240	13,3	92	9,0	655

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 13.13.2 Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois parmi les jeunes : Homme

Parmi tous les jeunes hommes de 15–24 ans, pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec plus d'une partenaire sexuelle au cours des 12 derniers mois, et pourcentage ayant eu, au cours des 12 derniers mois, des rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient; parmi les hommes ayant eu plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé pendant les derniers rapports sexuels; parmi les jeunes hommes de 15–24 ans qui ont eu, au cours des 12 derniers mois, des rapports sexuels avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels avec cette personne, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Hommes de 15–24 ans			Hommes de 15–24 ans ayant eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois		Hommes de 15–24 ans ayant eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient	
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient	Effectif d'hommes	Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels	Effectif d'hommes	Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels avec cette personne	Effectif d'hommes
Âge							
15–19	1,2	11,3	1 669	*	20	31,7	189
15–17	0,3	5,8	1 041	*	3	29,2	60
18–19	2,8	20,6	627	*	17	32,9	129
20–24	9,6	33,8	1 165	35,9	112	33,5	394
20–22	9,2	33,4	737	33,5	68	32,3	246
23–24	10,2	34,5	428	(39,5)	44	35,5	148
État matrimonial							
Célibataire	4,4	21,4	2 650	43,5	116	32,4	568
Déjà ou actuellement en union	8,7	8,1	183	*	16	*	15
Résidence							
Bamako	7,2	25,3	531	(33,0)	38	43,2	134
Autre urbain	5,7	24,0	372	(45,6)	21	42,4	89
Ensemble urbain	6,6	24,8	903	37,5	59	42,9	224
Rural	3,8	18,6	1 930	38,8	72	26,7	359
Niveau d'instruction							
Aucun	3,3	15,2	698	*	23	20,4	106
Primaire	4,0	21,9	638	*	26	19,0	140
Secondaire ou plus	5,5	22,5	1 497	44,1	83	42,6	338
Ensemble 15–24	4,7	20,6	2 833	38,2	132	32,9	583

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 13.14 Tests du VIH récents parmi les jeunes

Parmi les jeunes femmes et les jeunes hommes de 15–24 ans qui ont eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois, pourcentage ayant été testé pour le VIH au cours des 12 derniers mois et qui ont reçu les résultats du dernier test, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Femmes de 15–24 ans ayant eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois		Hommes de 15–24 ans ayant eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant été testé pour le VIH dans les 12 derniers mois et ayant reçu le résultat du dernier test	Effectif de femmes	Pourcentage ayant été testé pour le VIH dans les 12 derniers mois et ayant reçu le résultat du dernier test	Effectif d'hommes
Âge				
15–19	3,8	1 581	0,0	193
15–17	2,7	626	0,0	60
18–19	4,5	956	0,0	133
20–24	6,2	2 761	1,9	557
20–22	6,4	1 677	1,5	292
23–24	5,8	1 083	2,3	264
État matrimonial				
Célibataire	5,7	621	0,7	572
Déjà ou actuellement en union	5,2	3 721	3,5	177
Ensemble 15–24	5,3	4 342	1,4	750

MALADIES CHRONIQUES 14

Principaux résultats

- ***Pression artérielle élevée ou hypertension :*** Au Mali 11 % des femmes et 3 % des hommes de 15–49 ans ont déjà été informés par un médecin ou un autre prestataire de santé que leur tension artérielle était élevée ou qu'ils avaient de l'hypertension. Parmi eux, 27 % des femmes et 26 % des hommes sont sous traitement.
- ***Hyperglycémie ou diabète :*** Au Mali 2 % des femmes et 1 % des hommes de 15–49 ans ont déjà été informés par un médecin ou un autre prestataire de santé que leur taux de sucre était élevé ou qu'ils étaient atteints de diabète. Parmi eux, 36 % de femmes et 57 % d'hommes sont sous traitement.
- ***Maladie cardiaque ou affection cardiaque chronique :*** Au Mali 3 % des femmes et 1 % des hommes de 15–49 ans ont déjà été informés par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'ils souffraient d'une maladie cardiaque ou d'une maladie cardiaque à l'état chronique. Parmi eux, 45 % de femmes et 40 % des hommes sont sous traitement.
- ***Maladie pulmonaire ou affection pulmonaire chronique :*** Au Mali 2 % des femmes et 1 % des hommes de 15–49 ans ont déjà été informés par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'ils souffraient d'une maladie pulmonaire ou d'une affection pulmonaire chronique. Parmi eux, 39 % de femmes et 61 % des hommes sont sous traitement.
- ***Dépression et anxiété :*** Au Mali 3 % des femmes et 2 % des hommes de 15–49 ans ont déjà été informés par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'ils souffraient de dépression ou d'anxiété. Parmi eux, 15 % de femmes et 10 % des hommes sont sous traitement.
- ***Vaccination contre la COVID-19 :*** Au Mali 22 % des femmes et 22 % des hommes de 15–49 ans ont déjà reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19.

Les maladies chroniques représentent un problème majeur et en augmentation qui pèse sur la santé des individus et des populations dans le monde entier. Le dépistage et la prévention sont des outils clés dans la lutte contre les maladies chroniques. L'EDSM-VII 2023–2024 a collecté des informations sur les maladies chroniques auprès de toutes les femmes et de tous les hommes de 15 à 64 ans. Ce chapitre présente des informations sur le dépistage et le traitement de la pression artérielle élevée ou hypertension artérielle, de l'hyperglycémie ou diabète, des maladies cardiaques ou des affections cardiaques chroniques, des maladies pulmonaires ou des affections pulmonaires chroniques, de la dépression ou de l'anxiété ainsi que de l'arthrite.

14.1 ACTIVITÉ PHYSIQUE

Activité physique

L'activité physique est définie comme tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques et nécessitant une dépense d'énergie.

On a demandé aux enquêté(e)s pendant combien de jours ils/elles avaient pratiqué une activité d'intensité modérée à vigoureuse et pendant combien de minutes ils/elles avaient fait une activité d'intensité modérée à vigoureuse au cours d'une semaine.

Échantillon : Femmes de 15 à 49 ans et hommes de 15 à 49 ans

Temps sédentaire

Le comportement sédentaire est tout comportement d'éveil caractérisé par une dépense énergétique de 1,5 METS ou moins en position assise, allongée ou couchée.

On a demandé aux enquêté(e)s combien d'heures ils/elles passaient assis(es) au cours d'une journée normale.

Échantillon : Femmes de 15 à 49 ans et hommes de 15 à 49 ans

L'activité physique est connue pour avoir des effets bénéfiques sur la santé, notamment sur la réduction de mortalité toutes causes confondues, la mortalité due aux maladies cardiovasculaires, l'hypertension, les cancers spécifiques (vessie, sein, colon, endomètre, adénocarcinome œsophagien, gastrique et rénal), le diabète de type 2, la santé mentale (réduction des symptômes d'anxiété et de dépression), la santé cognitive, le sommeil et l'amélioration des mesures de l'adiposité. Il est important de noter que le niveau d'activité physique auto-déclarée est surestimé.

Au Mali, la durée moyenne de l'activité physique quotidienne est de 112,5 min par jour chez les femmes et de 227,0 min par jour chez les hommes. La durée moyenne des activités sédentaires en minutes par jour est de 197min chez les femmes et 240 min chez les hommes de 15–49 ans (**Tableau 14.1**).

Le pourcentage effectuant moins de 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine ou équivalent est de 68 % chez les femmes et de 82 % chez les hommes.

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage d'hommes effectuant moins de 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine ou équivalent diminue avec l'âge passant de 88 % chez les 15–19 ans à 76 % chez les 45–49 ans. Chez les femmes, ce pourcentage varie peu avec l'âge.
- Le pourcentage d'hommes effectuant moins de 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine ou équivalent varie en fonction du milieu résidence, passant de 71 % en milieu urbain à 86 % en milieu rural. Chez les femmes, le pourcentage varie de 66 % en milieu urbain à 69 % en milieu rural.
- Du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, le pourcentage de femmes et d'hommes effectuant moins de 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine ou équivalent diminue, passant de 74 % à 66 % chez les femmes et de 92 % à 69 % chez les hommes.

14.2 HYPERTENSION ARTÉRIELLE

Pression artérielle élevée ou hypertension

On a demandé aux enquêté(e)s si un médecin ou un autre professionnel de santé leur avait déjà dit qu'ils/elles souffraient d'hypertension artérielle. Si oui, prennent-ils/elles des médicaments pour contrôler leur tension artérielle.

Échantillon : Femmes de 15 à 49 ans et hommes de 15 à 49 ans

Une pression artérielle élevée, ou hypertension artérielle, est une maladie chronique dans laquelle la force du sang contre les parois des artères est suffisamment élevée pour endommager ces dernières, ce qui entraîne des problèmes de santé. L'hypertension est un facteur de risque majeur pour les maladies rénales et les maladies cardiovasculaires telles que les accidents vasculaires cérébraux et les cardiopathies ischémiques.

***Graphique 14.1* Diagnostic et traitement de l'hypertension artérielle et de l'hyperglycémie**



Onze pour cent des femmes et 3 % des hommes de 15–49 ans ont déclaré qu'ils ont déjà été informés par un médecin ou un autre prestataire de santé que leur tension artérielle était élevée ou qu'ils souffraient d'hypertension artérielle. Parmi eux, 27 % des femmes et 26 % des hommes prenaient des médicaments pour contrôler la pression artérielle (**Tableau 14.2.1**, **Tableau 14.2.2** et **Graphique 14.1**).

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage de femmes ayant déjà été informé par un médecin ou un autre prestataire de santé que leur tension artérielle était élevée ou qu'elles souffraient d'hypertension artérielle diminue avec le niveau d'instruction, passant de 12 % chez les femmes n'ayant aucun niveau à 9 % parmi celles ayant le niveau secondaire ou plus.

- Le pourcentage d'hommes ayant déjà été informé par un médecin ou un autre prestataire de santé que leur tension artérielle était élevée ou qu'ils souffraient d'hypertension artérielle augmente avec le quintile de bien-être économique, passant de 3 % dans le quintile le plus bas à 5 % dans le plus élevé.

- Le pourcentage de femmes ayant déjà été informé par un médecin ou un autre prestataire de santé que leur tension artérielle était élevée ou qu'elles souffraient d'hypertension artérielle varie de 15 % dans la région de Mopti à 6 % dans celle de Tombouctou. Chez les hommes, on observe le pourcentage le plus élevé dans la région de Gao (8 %) et le plus faible dans la région de Tombouctou (1 %).

14.3 HYPERGLYCÉMIE

Hyperglycémie ou diabète

On a demandé aux enquêté(e)s si un médecin ou un autre professionnel de la santé leur avait déjà dit qu'ils/elles souffraient d'hyperglycémie ou de diabète. Et si oui, s'ils/elles prennent des médicaments pour contrôler leur glycémie ou leur diabète.

Échantillon : Femmes de 15 à 49 ans et hommes de 15 à 49 ans

Le diabète sucré est un trouble métabolique caractérisé par une hyperglycémie chronique (augmentation du taux de sucre dans le sang) due à des défauts de sécrétion d'insuline, d'action de l'insuline ou des deux (Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes mellitus 1997).

Deux pour cent des femmes et 1 % des hommes de 15–49 ans ont déclaré qu'ils ont déjà été informés par un médecin ou un autre prestataire de santé que leur taux de sucre était élevé ou qu'ils étaient diabétiques. Parmi eux, 36 % des femmes et 57 % des hommes prenaient des médicaments pour contrôler l'hyperglycémie (**Tableau 14.3.1**, **Tableau 14.3.2** et **Graphique 14.1**).

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Les pourcentages de femmes et d'hommes ayant déjà été informés par un médecin ou un autre prestataire de santé que leur taux de sucre était élevé ou qu'ils étaient diabétiques augmentent avec l'âge, passant de 0 % chez les femmes et les hommes de 15–19 ans à 4 % chez les femmes et les hommes de 45–49 ans.

  Les pourcentages de femmes et d'hommes ayant déjà été informés par un médecin ou un autre prestataire de santé que leur taux de sucre était élevé ou qu'ils étaient diabétiques augmentent avec double du quintile du bien-être économique le plus faible au plus élevé.

14.4 MALADIE CARDIAQUE OU AFFECTION CARDIAQUE CHRONIQUE

Maladie cardiaque ou affection cardiaque chronique

On a demandé aux enquêté(e)s si un médecin ou un autre professionnel de santé leur avait déjà dit qu'ils/elles souffraient d'une maladie cardiaque ou d'une affection cardiaque chronique. Et si oui, s'ils/elles reçoivent un traitement pour leur maladie cardiaque ou leur maladie cardiaque chronique.

Échantillon : Femmes de 15 à 49 ans et hommes de 15 à 49 ans

Les maladies cardiaques et les affections cardiaques chroniques comprennent les maladies coronariennes, les crises cardiaques, l'insuffisance cardiaque et les arythmies. Les facteurs de risque sont l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, le tabagisme, le diabète, le surpoids et l'obésité, une mauvaise alimentation, la sédentarité et la consommation excessive d'alcool (CDC).

Dans l'ensemble, le pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans qui ont déjà été informés par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'ils souffraient d'une maladie cardiaque ou d'une maladie cardiaque chronique est de 3 % chez les femmes et de 1 % chez les hommes. Parmi eux, le pourcentage de femmes et d'hommes recevant un traitement est respectivement de 45 % et 40 % (**Tableau 14.4**).

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage de femmes ayant déjà été informées par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'elles souffraient d'une maladie cardiaque ou d'une maladie cardiaque chronique augmente avec l'âge, passant de 1 % chez les femmes de 15–19 ans à 6 % chez les femmes de 45–49 ans. Cette tendance est moins nette chez les hommes.

- Les pourcentages de femmes ayant déjà été informées par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'elles souffraient d'une maladie cardiaque ou d'une maladie cardiaque chronique sont les plus élevés dans les régions de Kayes et Sikasso (4 %) et le plus bas dans les régions de Tombouctou et Koulikoro (1 %). Chez les hommes, ces pourcentages varient de 2 % dans les régions de Sikasso et Gao à moins d'un pour cent dans les régions de Koulikoro et de Mopti ainsi que dans le district de Bamako.

- Le pourcentage de femmes qui ont déjà été informées par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'elles souffraient d'une maladie cardiaque ou d'une maladie cardiaque à l'état chronique diminue avec le niveau d'instruction, passant de 3 % chez les femmes n'ayant aucun niveau d'instruction à 1 % chez celles qui ont le niveau d'instruction secondaire ou plus. On n'observe pas de variation très nette chez l'homme en fonction du niveau d'instruction.

- Du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, le pourcentage de femmes informées de leur état cardiaque passe de 4 % à 1 %. Cette tendance n'est pas observée chez l'homme.

14.5 MALADIE PULMONAIRE ET AFFECTION PULMONAIRE CHRONIQUE

Maladie pulmonaire ou affection pulmonaire chronique

On a demandé aux enquêté(e)s si un médecin ou un autre professionnel de la santé leur avait déjà dit qu'ils/elles souffraient d'une maladie pulmonaire ou d'une affection pulmonaire chronique. Et si oui, s'ils/elles reçoivent un traitement pour leur maladie pulmonaire ou leur affection pulmonaire chronique.

Échantillon : Femmes de 15 à 49 ans et hommes de 15 à 49 ans

À l'échelle mondiale, les deux maladies pulmonaires et affections pulmonaires chroniques les plus courantes sont la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et l'asthme (Labaki and Han, 2020). Les autres affections pulmonaires les plus répandues sont l'œdème pulmonaire, l'emphysème, le cancer du poumon, la tuberculose et la pneumonie.

Au Mali, le pourcentage de femmes et d'hommes qui ont déjà été informés par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'ils souffraient d'une maladie pulmonaire ou d'une affection pulmonaire chronique est respectivement de 2 % et 1 % (**Tableau 14.5**). Parmi eux, le pourcentage de femmes et d'hommes recevant un traitement est respectivement de 39 % et 61 %.

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage de femmes ayant déjà été informé par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'elles souffraient d'une maladie pulmonaire ou d'une affection pulmonaire chronique est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural (3 % contre 2 %), en particulier à Bamako (5 %). On n'observe peu de variation chez les hommes.

- Le pourcentage de femmes qui ont déjà été informées par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'elles souffraient d'une maladie pulmonaire ou d'une affection pulmonaire chronique augmente avec le niveau d'instruction, passant de 2 % chez les femmes n'ayant aucun niveau d'instruction à 3 % chez celles qui ont le niveau d'instruction secondaire ou plus.

- Chez les femmes comme chez les hommes, ces pourcentages augmentent avec le quintile du bien-être économique du ménage.

14.5.1 Cancer ou tumeur

Les cancers sont des maladies dans lesquelles les cellules se développent de manière incontrôlée et peuvent apparaître presque partout dans le corps. On parle de tumeurs lorsque des cellules se développent de manière incontrôlée dans des parties solides telles que les organes, les muscles ou les os. Les tumeurs peuvent être malignes (cancéreuses) ou bénignes (non cancéreuses). Les cancers les plus courants sont ceux du sein, du poumon, du côlon et du rectum, de la prostate, de la peau, de l'estomac et du foie (OMS).

Dans l'ensemble le pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans qui ont déjà été informés par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'ils avaient un cancer ou une tumeur est de moins d'un pour cent (**Tableau 14.6**).

14.5.2 Dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus

Dépistage du cancer du sein

On a demandé aux femmes si un médecin ou un autre prestataire de soins de santé avait examiné leurs seins pour dépister un éventuel cancer.

Cet examen peut consister en un examen clinique des seins, où le prestataire de soins de santé effectue une palpation manuelle des grosseurs ou d'autres changements, ou encore un examen par le biais d'un équipement médical pour prendre une image du tissu mammaire, par exemple une mammographie.

Dépistage du cancer du col de l'utérus

On a demandé aux femmes si elles ont subi un test de dépistage du cancer du col de l'utérus réalisé par un médecin ou un autre prestataire de soins de santé. Le type de test de dépistage n'est pas recueilli.

Pour le dépistage du cancer du col de l'utérus, on demande à la femme de s'allonger sur le dos, jambes écartées. Ensuite, l'agent de santé prélève à l'aide d'une brosse ou d'un écouvillon un spécimen dans le vagin. Le spécimen est envoyé à un laboratoire pour analyse. Ce test se nomme frottis ou test de dépistage du virus du papillome humain. Une autre méthode consiste en une inspection visuelle après application d'acide acétique. Pour ce test, l'agent de santé dépose du vinaigre sur le col de l'utérus pour voir s'il y a une éventuelle réaction.

Échantillon : Femmes de 15–49 ans

La détection précoce du cancer est l'un des moyens les plus efficaces pour améliorer les résultats du traitement. Elle aide les professionnels de la santé à mettre en place un traitement précoce qui ralentit la progression du cancer et, en fin de compte, à intervenir pour traiter les tumeurs cancéreuses.

Le dépistage du cancer du sein consiste à palper les tissus mammaires à la main afin de détecter toute croissance anormale. Cette opération peut être effectuée par un professionnel de la santé ou par des particuliers. Si une croissance anormale est détectée, un morceau du tissu affecté est prélevé chirurgicalement et examiné en laboratoire pour confirmer la présence de cellules cancéreuses.

Le dépistage du cancer du col de l'utérus consiste à détecter une croissance anormale du col de l'utérus par une inspection visuelle ou un test chimique. Toute masse anormale détectée dans le col de l'utérus est enlevée chirurgicalement avant qu'elle ne devienne cancéreuse.

Une femme de 15–49 ans sur dix (10 %) a déjà été examinée pour le cancer du sein et 5 % ont déjà effectué un test de dépistage du cancer col de l'utérus (**Tableau 14.7** et **Tableau 14.8**).

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- L'examen pour le dépistage du cancer du sein et le test pour le dépistage du cancer du col de l'utérus sont plus fréquents en milieu urbain (respectivement 13 % et 7 %) qu'en milieu rural (respectivement 9 % et 4 %).

- Le pourcentage de femmes examinées pour le cancer du sein augmente avec le niveau d'instruction, passant de 9 % chez celles qui n'ont aucun niveau d'instruction à 13 % chez celles qui ont le niveau secondaire ou plus. La tendance est similaire pour le test pour le cancer du col de l'utérus, le pourcentage passant respectivement de 3 % à 7 % (**Graphique 14.2**).

- Du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, le pourcentage de femmes examinées pour le cancer du sein augmente, passant de 9 % à 15 % et le pourcentage de femmes examinées pour le cancer du col de l'utérus passe de 2 % à 9 %.

- Les régions où le pourcentage de femmes de 15 à 49 ans examinées pour le cancer du sein est le plus élevé sont Bamako (15 %), Sikasso (14 %) et Koulikoro (12 %), tandis que Tombouctou et Mopti ont les pourcentages les plus faibles (5 %) (**Carte 14.1**).

Graphique 14.2 **Examens pour le dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus par niveau d'instruction**

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans ayant déjà été examinées par un prestataire de santé pour :



Carte 14.1 **Examens pour le cancer du sein et pour le cancer du col de l'utérus par région**

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans ayant déjà été examinées par un médecin ou un professionnel de la santé pour le cancer du sein



Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans ayant déjà été examinées par un médecin ou un professionnel de la santé pour le cancer du col de l'utérus



Note : Pour des raisons d'insécurité, les données de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région et ne sont pas présentées séparément.

14.6 DÉPRESSION ET ANXIÉTÉ

Les troubles dépressifs et les troubles d'anxiété sont les deux principales catégories diagnostiques des troubles mentaux courants et sont les principales causes de morbidité dans le monde (GBD 2019). Ces troubles sont des affections qui peuvent être diagnostiquées et se distinguent des sentiments de tristesse, de stress ou de peur que chacun peut éprouver de temps à autre dans sa vie. On estime que 4,4 % de la population mondiale souffre de troubles dépressifs et 3,6 % de troubles d'anxiété (OMS 2017).

Les troubles dépressifs se caractérisent par une tristesse, une perte d'intérêt ou de plaisir, un sentiment de culpabilité ou de dévalorisation, des troubles du sommeil ou de l'appétit, une sensation de fatigue et un manque de concentration. La dépression peut être durable ou récurrente et entraver considérablement la capacité d'un individu à fonctionner au travail ou à l'école, ou à faire face à la vie quotidienne. Dans les cas les plus graves, la dépression peut conduire au suicide.

Les troubles dépressifs comprennent deux sous-catégories principales :

- trouble dépressif majeur / épisode dépressif, qui implique des symptômes tels qu'une humeur dépressive, une perte d'intérêt et de plaisir, et une baisse d'énergie ; en fonction du nombre et de la gravité des symptômes, un épisode dépressif peut être classé comme léger, modéré ou sévère ;

- et la dysthymie, une forme persistante ou chronique de dépression légère ; les symptômes de la dysthymie sont similaires à ceux d'un épisode dépressif, mais tendent à être moins intenses et à durer plus longtemps (OMS 2017).

Les troubles d'anxiété font référence à un groupe de troubles mentaux caractérisés par des sentiments d'anxiété et de peur, notamment le trouble anxieux généralisé (TAG), le trouble panique, les phobies, le trouble d'anxiété sociale, le trouble obsessionnel-compulsif (TOC) et le trouble de stress post-traumatique (TSPT). Comme pour la dépression, les symptômes peuvent varier de légers à graves. La durée des symptômes généralement ressentis par les personnes souffrant de troubles d'anxiété en fait un trouble plus chronique qu'épisodique (OMS 2017).

Une personne peut souffrir simultanément de dépression et d'anxiété.

Dans l'EDSM-VII 2023–2024 on a demandé aux femmes et aux hommes si un médecin ou un autre professionnel de santé leur avait déjà dit qu'il/elle souffrait de dépression et/ou d'anxiété et s'il/elle recevait un traitement pour la dépression ou l'anxiété.

Le pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans qui ont déjà été informés par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'ils souffraient de dépression ou d'anxiété est respectivement de 3 % et 2 %. Le pourcentage de femmes et d'hommes recevant un traitement est respectivement de 15 % et 10 % (**Tableau 14.8**).

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage de femmes et les hommes qui ont déjà été informés par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'ils souffraient de dépression ou d'anxiété, augmente avec l'âge, passant de 2 % chez les femmes de 15–19 ans à 5 % chez celles de 45–49 ans. Chez les hommes, les écarts sont plus faibles.

- Le pourcentage de femmes qui ont déjà été informées par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'elles souffraient de dépression ou d'anxiété est plus élevé en milieu urbain que rural (6 % contre 2 %). Chez les hommes, il n'y a pas d'écart entre les milieux urbains et rural (2 %).

- Le pourcentage de femmes et les hommes qui ont déjà été informés par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'ils souffraient de dépression ou d'anxiété varie selon les régions. Parmi les

femmes, c'est à Bamako que l'on observe le pourcentage le plus élevé, avec 9 %, et à Tombouctou et Mopti, les plus faibles avec 1 %. Parmi les hommes, le pourcentage le plus élevé concerne la région de Gao (6 %) et le plus faible est enregistré dans les régions de Kayes et de Sikasso, avec moins d'un pour cent.

14.7 ÉPILEPSIE

Il s'agit d'une maladie neurologique caractérisée par une activité électrique anormale provoquant des convulsions ou un comportement inhabituel, des sensations et parfois une perte de conscience. L'épilepsie touche des personnes de toutes les classes d'âge, mais des pics sont observés chez les enfants et chez les plus de 60 ans. Elle a des conséquences neurologiques, cognitives, psychologiques et sociales. Près de 80 % des personnes souffrant d'épilepsie vivent dans les pays à revenu intermédiaire. Près des trois-quarts des personnes épileptiques dans les pays à revenu faible ou intermédiaire ne bénéficient pas du traitement dont elles ont besoin.

Le pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans qui ont déjà été informés par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'ils souffraient de troubles épileptiques ou d'épilepsie est très faible (moins d'un pour cent) (**Tableau 14.9**).

14.8 ARTHRITE

L'arthrite désigne l'inflammation ou le gonflement d'une ou de plusieurs articulations.

Le pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans qui ont déjà été informés par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'ils souffraient d'arthrite est de 4 % parmi les femmes et 2 % parmi les hommes. Parmi les personnes informées de leur état, 40 % des femmes et 48 % des hommes étaient sous traitement (**Tableau 14.10**).

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans qui ont déjà été informés par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'ils souffraient d'arthrite augmente avec l'âge, passant de 1 % chez les femmes de 15–19ans à 11 % chez celles de 45–49 ans. Parmi les hommes, ce pourcentage varie de respectivement 1 % à 3 %.

- Le pourcentage de femmes de 15–49 ans qui ont déjà été informées par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'elles souffraient d'arthrite varie selon les régions. Les régions de Gao (8 %), Bamako et Kayes (5 %) ont les pourcentages les plus élevés tandis que la région de Tombouctou (2 %) a le pourcentage le plus bas. Chez les hommes, le pourcentage le plus élevé est observé dans la région de Sikasso (4 %) et le plus bas dans les régions de Mopti, Kayes et Gao (1 %).

14.9 VACCIN CONTRE LA COVID-19

La maladie à coronavirus (COVID-19) est une maladie infectieuse due au virus SARS-CoV-2. La plupart des personnes infectées par le virus présentent une maladie respiratoire d'intensité légère à modérée et se rétablissent sans avoir besoin d'un traitement particulier.

Le pourcentage de femmes ou d'hommes de 15–49 ans ayant déjà reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 est de 22 % (**Tableau 14.12**).

Répartition en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage de femmes et d'hommes ayant déjà reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 varie avec l'âge. Parmi les femmes, ce pourcentage passe de 13 % à 15–19 ans à 26 % à

45–49 ans. Ce taux est plus élevé à 35–39 ans avec 28 %. Parmi les hommes ce pourcentage passe de 13 % à 15–19 ans à 31 % à 45–49 ans.

- Le pourcentage de femmes et d'hommes ayant déjà reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 est plus élevé en milieu rural par rapport au milieu urbain : 24 % contre 17 % parmi les femmes et 23 % contre 19 % parmi les hommes.

- Le pourcentage de femmes et d'hommes ayant déjà reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 varie selon les régions. Le pourcentage le plus élevé est observé dans la région de Sikasso (32 % chez les femmes et 34 % chez les hommes) tandis que le pourcentage le plus bas a été observé dans la région de Tombouctou (11 % chez les femmes et 15 % chez les hommes).

- Le pourcentage de femmes et d'hommes ayant déjà reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 varie avec le quintile de bien-être économique. Parmi les femmes, il passe de 30 % dans le quintile plus bas à 17 % dans le plus élevé. Il passe respectivement, respectivement de 27 % à 21 %parmi les hommes.

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur les maladies chroniques, voir les tableaux suivants :

- **Tableau 14.1 Activité physique**
- **Tableau 14.2.1 Diagnostic de la tension artérielle et traitement : Femme**
- **Tableau 14.2.2 Diagnostic de la tension artérielle et traitement : Homme**
- **Tableau 14.3.1 Diagnostic de l'hyperglycémie et traitement : Femme**
- **Tableau 14.3.2 Diagnostic de l'hyperglycémie et traitement : Homme**
- **Tableau 14.4 Diagnostic et traitement des maladies cardiaques et des maladies cardiaques à l'état chronique**
- **Tableau 14.5 Diagnostic et traitement des maladies pulmonaires et des affections pulmonaires à l'état chronique**
- **Tableau 14.6 Diagnostic et traitement d'un cancer ou d'une tumeur**
- **Tableau 14.7 Examens pour le cancer du sein**
- **Tableau 14.8 Cancer du col de l'utérus**
- **Tableau 14.9 Diagnostic et traitement de la dépression ou de l'anxiété**
- **Tableau 14.10 Diagnostic et traitement d'épilepsie**
- **Tableau 14.11 Diagnostic et traitement de l'arthrite**
- **Tableau 14.12 Vaccin contre la COVID-19**

Tableau 14.1 Activité physique

Durée moyenne de l'activité physique quotidienne, pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans faisant moins de 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine ou équivalent, et durée moyenne des activités sédentaires, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Femme				Homme			
Caractéristique sociodémographique	Durée moyenne de l'activité physique quotidienne (minutes par jour)	Pourcentage de femmes faisant moins de 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine ou équivalent	Durée moyenne des activités sédentaires (minutes par jour)	Effectif de femmes	Durée moyenne de l'activité physique quotidienne (minutes par jour)	Pourcentage de femmes faisant moins de 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine ou équivalent	Durée moyenne des activités sédentaires (minutes par jour)	Effectif de femmes
Âge								
15–19	104,7	69,9	207,8	3 862	207,1	88,3	239,3	1 669
20–24	110,6	66,8	196,5	3 378	245,9	83,3	237,0	1 165
25–29	117,1	68,9	193,7	2 905	250,7	82,0	229,0	930
30–34	116,9	69,5	188,1	2 382	230,8	79,7	247,3	909
35–39	115,9	67,0	190,6	2 065	215,8	75,8	238,9	784
40–44	120,9	68,3	196,9	1 586	229,8	76,9	248,2	663
45–49	105,9	66,7	202,4	1 169	213,8	75,9	246,9	568
Résidence								
Bamako	140,5	75,8	352,7	2 675	249,6	69,6	231,4	1 177
Autre urbain	84,4	54,2	171,2	2 048	162,0	73,5	250,0	795
Ensemble urbain	116,2	66,4	274,0	4 723	214,3	71,2	238,9	1 971
Rural	111,1	69,1	168,4	12 624	232,3	86,1	240,5	4 714
Région								
Kayes	99,4	71,5	201,2	2 635	284,1	87,2	259,6	920
Koulikoro	148,8	79,4	168,0	4 018	183,1	79,4	264,7	1 637
Sikasso	75,6	60,4	150,2	3 143	209,2	82,2	222,6	1 215
Ségou	123,9	64,6	199,0	2 574	234,0	93,5	192,2	939
Mopti	87,7	60,6	108,5	1 530	259,7	81,8	243,5	505
Tombouctou	27,0	38,1	257,9	281	189,2	85,7	262,5	128
Gao	34,9	33,0	97,7	485	205,2	87,9	322,0	163
Kidal	†	†	†	6	†	†	†	2
Bamako	140,5	75,8	352,7	2 675	249,6	69,6	231,4	1 177
Niveau d'instruction								
Aucun	120,1	69,0	176,1	9 382	242,1	83,0	229,7	2 476
Primaire	121,5	71,3	197,1	2 926	256,1	85,7	225,5	1 352
Secondaire ou plus	93,1	65,4	236,2	5 039	200,1	78,7	255,8	2 858
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	117,3	73,6	145,0	3 036	258,0	92,0	205,7	1 179
Second	120,3	73,2	173,6	3 143	259,6	89,5	230,3	1 174
Moyen	105,8	66,4	169,4	3 318	256,8	89,7	221,2	1 190
Quatrième	106,7	64,3	201,3	3 676	207,8	75,1	267,1	1 446
Le plus élevé	113,4	66,1	271,0	4 174	178,3	69,2	260,8	1 697
Ensemble 15–49	112,5	68,4	197,1	17 347	227,0	81,7	240,0	6 686
50–64	88,4	55,1	244,9	3 007	209,1	73,3	269,2	1 143
Ensemble 15–64	108,9	66,4	204,2	20 354	224,4	80,5	244,3	7 829

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 14.2.1 Diagnostic de la tension artérielle et traitement : Femme

Pourcentage de femmes de 15–49 ans dont la tension artérielle a déjà été mesurée et pourcentage ayant été informées par un professionnel de santé que leur tension était élevée ou qu'elles souffraient d'hypertension artérielle ; parmi les femmes ayant été informées qu'elles souffraient d'hypertension artérielle, pourcentage qui l'ont été dans les 12 derniers mois, pourcentage à qui on a prescrit des médicaments pour contrôler la tension artérielle, et pourcentage qui prennent des médicaments pour contrôler leur tension artérielle, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Parmi toutes les femmes : pourcentage			Parmi les femmes ayant été informées par un médecin ou un autre prestataire de santé que leur tension artérielle était élevée ou qu'elles avaient de l'hypertension, pourcentage :			
Caractéristique sociodémographique	ayant déjà eu leur tension artérielle mesurée par un professionnel de santé	ayant déjà été informées par un médecin ou un autre prestataire de santé que leur tension artérielle était élevée ou qu'elles souffraient d'hypertension artérielle	Effectif de femmes	Ayant été informées dans les 12 derniers mois que leur tension était élevée ou qu'elles faisaient de l'hypertension artérielle	À qui on a prescrit des médicaments pour contrôler leur tension artérielle	Prenant des médicaments pour contrôler leur tension artérielle	Effectif de femmes
Âge							
15–19	27,8	2,7	3 862	58,7	53,7	15,1	105
20–24	58,5	7,1	3 378	52,5	49,4	14,1	240
25–29	66,0	9,8	2 905	55,8	53,1	19,8	286
30–34	70,6	13,4	2 382	60,4	62,6	28,1	320
35–39	68,6	17,2	2 065	65,5	68,9	30,3	356
40–44	70,1	21,2	1 586	62,1	71,2	29,9	336
45–49	68,3	25,1	1 169	66,6	69,9	38,3	294
Résidence							
Bamako	60,6	10,3	2 675	72,5	65,3	34,1	275
Autre urbain	61,5	12,3	2 048	61,7	66,1	30,5	251
Ensemble urbain	61,0	11,1	4 723	67,4	65,7	32,4	526
Rural	56,2	11,2	12 624	58,4	61,8	24,6	1 411
Région							
Kayes	59,6	11,5	2 635	51,0	50,7	27,0	303
Koulikoro	58,5	7,4	4 018	55,3	65,7	32,5	296
Sikasso	57,6	14,0	3 143	60,3	74,4	23,1	441
Ségou	59,0	12,3	2 574	52,6	63,6	19,8	317
Mopti	48,3	15,4	1 530	76,1	47,0	23,7	235
Tombouctou	28,3	6,1	281	72,9	64,9	33,2	17
Gao	57,0	10,7	485	68,2	72,2	37,0	52
Kidal	†	†	6	†	†	†	0
Bamako	60,6	10,3	2 675	72,5	65,3	34,1	275
Niveau d'instruction							
Aucun	56,5	12,4	9 382	60,4	63,6	25,6	1 166
Primaire	59,9	10,8	2 926	61,7	66,6	29,4	316
Secondaire ou plus	57,9	9,0	5 039	61,3	58,4	27,8	455
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	54,2	11,8	3 036	50,9	55,1	16,7	359
Second	55,0	13,1	3 143	57,6	58,2	21,0	411
Moyen	56,8	11,3	3 318	62,8	69,2	29,6	375
Quatrième	59,7	9,6	3 676	66,1	69,4	34,2	355
Le plus élevé	60,4	10,5	4 174	66,0	62,8	31,8	436
Ensemble 15–49	57,5	11,2	17 347	60,8	62,8	26,7	1 937
50–64	74,8	35,6	3 007	73,7	78,6	48,5	1 071
Ensemble 15–64	60,0	14,8	20 354	65,4	68,5	34,5	3 009

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 14.2.2 Diagnostic de la tension artérielle et traitement : Homme

Pourcentage d'hommes de 15–49 ans dont la tension artérielle a déjà été mesurée et pourcentage ayant été informés par un professionnel de santé que leur tension était élevée ou qu'ils souffraient d'hypertension artérielle ; parmi les hommes ayant été informés qu'ils souffraient d'hypertension artérielle, pourcentage qui l'ont été dans les 12 derniers mois, pourcentage à qui on a prescrit des médicaments pour contrôler la tension artérielle, et pourcentage qui prenne des médicaments pour contrôler leur tension artérielle, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Parmi tous les hommes : pourcentage			Parmi les hommes ayant été informés par un médecin ou un autre prestataire de santé que leur tension artérielle était élevée ou qu'ils avaient de l'hypertension, pourcentage :			
Caractéristique sociodémographique	ayant déjà eu leur tension artérielle mesurée par un professionnel de santé	ayant déjà été informés par un médecin ou un autre prestataire de santé que leur tension artérielle était élevée ou qu'ils souffraient d'hypertension artérielle	Effectif d'hommes	Ayant été informés dans les 12 derniers mois que leur tension était élevée ou qu'ils faisaient de l'hypertension artérielle	À qui on a prescrit des médicaments pour contrôler leur tension artérielle	Prenant des médicaments pour contrôler leur tension artérielle	Effectif d'hommes
Âge							
15–19	7,0	0,7	1 669	*	*	*	12
20–24	21,4	1,6	1 165	*	*	*	19
25–29	30,7	2,3	930	*	*	*	22
30–34	38,4	3,1	909	(51,0)	(53,0)	(25,5)	28
35–39	40,9	5,1	784	(58,6)	(71,2)	(20,0)	40
40–44	45,7	7,2	663	58,0	66,5	37,4	48
45–49	45,6	8,3	568	68,5	65,1	42,4	47
Résidence							
Bamako	48,2	3,5	1 177	(59,4)	(58,1)	(35,3)	41
Autre urbain	26,0	5,1	795	(62,7)	(55,5)	(24,5)	40
Ensemble urbain	39,3	4,1	1 971	61,1	56,8	29,9	81
Rural	23,5	2,9	4 714	59,5	62,7	24,0	135
Région							
Kayes	21,8	3,4	920	(51,5)	(60,2)	(39,1)	31
Koulikoro	27,2	1,6	1 637	*	*	*	27
Sikasso	19,0	4,1	1 215	(70,9)	(53,4)	(15,4)	50
Ségou	28,9	3,8	939	(46,4)	(73,4)	(13,7)	36
Mopti	19,9	3,5	505	*	*	*	18
Tombouctou	21,0	1,3	128	(95,0)	(92,7)	(84,6)	2
Gao	24,3	7,6	163	(60,9)	(42,8)	(30,3)	12
Kidal	†	†	2	†	†	†	0
Bamako	48,2	3,5	1 177	(59,4)	(58,1)	(35,3)	41
Niveau d'instruction							
Aucun	23,9	3,2	2 476	60,1	70,9	22,9	79
Primaire	22,4	2,6	1 352	(45,7)	(56,5)	(26,1)	35
Secondaire ou plus	34,5	3,6	2 858	65,0	53,8	28,8	102
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	16,4	2,8	1 179	(59,9)	(75,1)	(24,6)	33
Second	19,7	2,1	1 174	(53,4)	(65,3)	(12,5)	24
Moyen	21,1	2,5	1 190	60,2	58,8	23,4	30
Quatrième	31,4	3,6	1 446	57,9	62,6	19,2	52
Le plus élevé	44,3	4,5	1 697	63,7	52,0	37,0	77
Ensemble 15–49	28,1	3,2	6 686	60,1	60,5	26,2	216
50–64	50,2	14,7	1 143	69,5	74,7	46,4	168
Ensemble 15–64	31,4	4,9	7 829	64,2	66,7	35,0	384

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 14.3.1 Diagnostic de l'hyperglycémie et traitement : Femme

Pourcentage de femmes de 15–49 ans dont le taux de sucre dans le sang a déjà été mesuré et pourcentage ayant été informées par un prestataire de santé que leur taux de sucre dans le sang était élevé ou qu'elles avaient du diabète ; parmi les femmes informées que leur taux de sucre dans le sang était élevé, pourcentage qui ont été informées dans les 12 derniers mois que leur taux de sucre était élevé ou qu'elles avaient du diabète, pourcentage à qui on a prescrit des médicaments pour contrôler leur taux de sucre et pourcentage qui prenne des médicaments pour contrôler leur taux de sucre dans le sang, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Parmi toutes les femmes : pourcentage			Parmi les femmes ayant été informées par un médecin ou un autre prestataire de santé que leur taux de sucre était élevé ou qu'elles avaient du diabète, pourcentage :			
Caractéristique sociodémographique	ayant déjà eu leur taux de sucre dans le sang mesuré par un professionnel de santé	ayant déjà été informées par un médecin ou un autre prestataire de santé que leur taux de sucre était élevé ou qu'elles avaient du diabète	Effectif de femmes	Ayant été informées dans les 12 derniers mois que leur taux de sucre était élevé ou qu'elles avaient du diabète	À qui on a prescrit des médicaments pour contrôler leur taux de sucre dans le sang	Prenant des médicaments pour contrôler leur taux de sucre dans le sang	Effectif de femmes
Âge							
15–19	6,8	0,4	3 862	*	*	*	14
20–24	15,8	1,1	3 378	(43,3)	(46,5)	(24,5)	37
25–29	20,0	1,1	2 905	(52,2)	(36,6)	(20,1)	33
30–34	21,8	1,1	2 382	(45,7)	(23,4)	(16,4)	27
35–39	21,6	2,4	2 065	(53,3)	(47,6)	(35,3)	49
40–44	23,7	2,7	1 586	(50,9)	(60,8)	(43,7)	43
45–49	26,0	4,3	1 169	70,5	67,7	56,9	50
Résidence							
Bamako	30,4	1,7	2 675	(58,2)	(51,6)	(37,9)	45
Autre urbain	23,0	2,7	2 048	59,8	53,3	41,1	55
Ensemble urbain	27,2	2,1	4 723	59,1	52,5	39,6	100
Rural	13,8	1,2	12 624	49,7	46,9	33,2	153
Région							
Kayes	18,2	1,1	2 635	(68,0)	(56,9)	(46,0)	29
Koulikoro	18,0	0,9	4 018	*	*	*	36
Sikasso	10,9	1,5	3 143	(50,7)	(51,4)	(37,4)	48
Ségou	15,7	2,0	2 574	(48,9)	(48,4)	(24,6)	53
Mopti	8,2	2,2	1 530	(49,6)	(32,8)	(24,0)	33
Tombouctou	11,7	1,6	281	*	*	*	4
Gao	20,5	1,1	485	*	*	*	5
Kidal	†	†	6	†	†	†	0
Bamako	30,4	1,7	2 675	(58,2)	(51,6)	(37,9)	45
Niveau d'instruction							
Aucun	14,3	1,4	9 382	51,5	50,2	38,3	128
Primaire	18,4	1,5	2 926	(60,5)	(53,3)	(40,6)	43
Secondaire ou plus	22,6	1,6	5 039	52,7	45,1	29,2	82
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	10,6	0,9	3 036	*	*	*	28
Second	12,8	1,3	3 143	(44,1)	(34,1)	(15,2)	40
Moyen	14,1	1,0	3 318	(47,1)	(57,3)	(43,5)	33
Quatrième	17,8	1,7	3 676	53,0	49,4	37,3	63
Le plus élevé	28,3	2,1	4 174	59,4	51,5	40,7	90
Ensemble 15–49	17,4	1,5	17 347	53,4	49,1	35,7	253
50–64	26,7	5,9	3 007	81,0	78,3	74,5	177
Ensemble 15–64	18,8	2,1	20 354	64,8	61,1	51,7	430

Notes : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 14.3.2 Diagnostic de l'hyperglycémie et traitement : Homme

Pourcentage d'hommes de 15–49 ans dont le taux de sucre dans le sang a déjà été mesuré et pourcentage ayant été informés par un prestataire de santé que leur taux de sucre dans le sang était élevé ou qu'ils avaient du diabète; parmi les hommes informés que leur taux de sucre dans le sang était élevé, pourcentage qui ont été informés dans les 12 derniers mois que leur taux de sucre était élevé ou qu'ils avaient du diabète, pourcentage à qui on a prescrit des médicaments pour contrôler leur taux de sucre et pourcentage qui prenne des médicaments pour contrôler leur taux de sucre dans le sang, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Parmi tous les hommes : pourcentage			Parmi les hommes ayant été informés par un médecin ou un autre prestataire de santé que leur taux de sucre était élevé ou qu'ils avaient du diabète, pourcentage :			
Caractéristique sociodémographique	ayant déjà eu leur taux de sucre dans le sang mesuré par un professionnel de santé	ayant déjà été informés par un médecin ou un autre prestataire de santé que leur taux de sucre était élevé ou qu'ils avaient du diabète	Effectif d'hommes	Ayant été informés dans les 12 derniers mois que leur taux de sucre était élevé ou qu'ils avaient du diabète	À qui on a prescrit des médicaments pour contrôler leur taux de sucre dans le sang	Prenant des médicaments pour contrôler leur taux de sucre dans le sang	Effectif d'hommes
Âge							
15–19	1,8	0,0	1 669	*	*	*	0
20–24	7,0	0,3	1 165	*	*	*	4
25–29	9,5	0,5	930	*	*	*	4
30–34	12,4	0,4	909	*	*	*	3
35–39	13,6	1,0	784	*	*	*	8
40–44	17,0	1,6	663	*	*	*	11
45–49	17,1	4,3	568	*	*	*	24
Résidence							
Bamako	16,9	1,4	1 177	*	*	*	17
Autre urbain	10,5	0,7	795	*	*	*	6
Ensemble urbain	14,3	1,1	1 971	*	*	*	22
Rural	7,4	0,7	4 714	(68,5)	(62,2)	(50,7)	32
Région							
Kayes	7,4	0,4	920	*	*	*	4
Koulikoro	9,4	0,8	1 637	*	*	*	13
Sikasso	6,5	0,3	1 215	*	*	*	4
Ségou	7,6	0,6	939	*	*	*	6
Mopti	6,6	1,9	505	*	*	*	10
Tombouctou	11,1	0,4	128	*	*	*	0
Gao	6,9	0,3	163	*	*	*	0
Kidal	†	†	2	†	†	†	0
Bamako	16,9	1,4	1 177	*	*	*	17
Niveau d'instruction							
Aucun	6,7	0,8	2 476	*	*	*	21
Primaire	7,0	0,9	1 352	*	*	*	13
Secondaire ou plus	12,9	0,7	2 858	*	*	*	21
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	2,9	0,7	1 179	*	*	*	8
Second	7,2	0,3	1 174	*	*	*	3
Moyen	6,3	0,5	1 190	*	*	*	6
Quatrième	10,1	0,8	1 446	*	*	*	11
Le plus élevé	17,1	1,5	1 697	(77,1)	(73,6)	(68,2)	26
Ensemble 15–49	9,4	0,8	6 686	71,4	67,5	56,6	54
50–64	20,0	3,3	1 143	(63,0)	(64,7)	(47,3)	38
Ensemble 15–64	11,0	1,2	7 829	68,0	66,4	52,8	92

Notes : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 14.4 Diagnostic et traitement des maladies cardiaques et des maladies cardiaques à l'état chronique

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans qui ont été informés par un prestataire de santé qu'ils souffraient d'une maladie cardiaque ou d'une maladie cardiaque chronique et, parmi celles et ceux qui ont été informés de leur état, pourcentage recevant un traitement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Femme				Homme			
	Ont déjà été informées par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'elles souffraient d'une maladie cardiaque ou d'une maladie cardiaque à l'état chronique		Déjà informées par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'elles avaient une maladie cardiaque ou une maladie cardiaque à l'état chronique		Ont déjà été informés par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'ils souffraient d'une maladie cardiaque ou d'une maladie cardiaque à l'état chronique		Déjà informés par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'ils avaient une maladie cardiaque ou une maladie cardiaque à l'état chronique	
Caractéristique sociodémographique		Effectif de femmes	Pourcentage recevant un traitement	Effectif de femmes		Effectif d'hommes	Pourcentage recevant un traitement	Effectif d'hommes
Âge								
15–19	0,7	3 862	*	26	0,3	1 669	*	5
20–24	1,5	3 378	44,1	52	0,7	1 165	*	8
25–29	2,0	2 905	52,6	57	0,8	930	*	8
30–34	2,3	2 382	48,3	54	1,4	909	*	13
35–39	4,6	2 065	37,0	95	0,8	784	*	6
40–44	4,7	1 586	46,0	75	1,6	663	*	11
45–49	5,9	1 169	43,2	69	1,1	568	*	6
Résidence								
Bamako	1,5	2 675	(41,8)	41	0,2	1 177	*	2
Autre urbain	1,8	2 048	49,8	37	1,0	795	*	8
Ensemble urbain	1,7	4 723	45,6	78	0,5	1 971	*	11
Rural	2,8	12 624	44,2	351	1,0	4 714	(42,9)	45
Région								
Kayes	3,7	2 635	46,8	98	0,4	920	*	4
Koulikoro	1,4	4 018	(48,7)	56	0,2	1 637	*	3
Sikasso	4,4	3 143	44,4	138	2,4	1 215	*	29
Ségou	2,0	2 574	(35,7)	50	1,3	939	*	12
Mopti	2,2	1 530	(46,8)	34	0,2	505	*	1
Tombouctou	1,0	281	*	3	0,9	128	*	1
Gao	1,8	485	*	9	2,0	163	*	3
Kidal	†	6	†	0	†	2	†	0
Bamako	1,5	2 675	(41,8)	41	0,2	1 177	*	2
Niveau d'instruction								
Aucun	3,2	9 382	47,0	298	1,2	2 476	(49,8)	30
Primaire	2,2	2 926	31,7	64	0,4	1 352	*	6
Secondaire ou plus	1,3	5 039	45,4	68	0,7	2 858	*	20
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	4,0	3 036	43,7	121	0,7	1 179	*	9
Second	3,7	3 143	48,3	115	1,3	1 174	*	16
Moyen	2,0	3 318	38,8	68	0,8	1 190	*	9
Quatrième	1,8	3 676	42,8	66	0,8	1 446	*	12
Le plus élevé	1,4	4 174	46,9	59	0,6	1 697	*	10
Ensemble 15–49	2,5	17 347	44,5	429	0,8	6 686	40,2	56
50–64	9,7	3 007	45,5	293	3,3	1 143	(52,3)	38
Ensemble 15–64	3,5	20 354	44,9	722	1,2	7 829	45,1	94

Notes : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 14.5 Diagnostic et traitement des maladies pulmonaires et des affections pulmonaires à l'état chronique

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans qui ont été informés par un prestataire de santé qu'ils souffraient d'une maladie pulmonaire ou d'une affection pulmonaire à l'état chronique et, parmi celles et ceux qui ont été informés de leur état, pourcentage recevant un traitement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Femme				Homme			
	Ont déjà été informées par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'elles souffraient d'une maladie pulmonaire ou d'une affection pulmonaire à l'état chronique		Déjà informées par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'elles avaient une maladie pulmonaire ou une affection pulmonaire à l'état chronique		Ont déjà été informés par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'ils souffraient d'une maladie pulmonaire ou d'une affection pulmonaire à l'état chronique		Déjà informés par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'ils avaient une maladie pulmonaire ou une affection pulmonaire à l'état chronique	
Caractéristique sociodémographique		Effectif de femmes	Pourcentage recevant un traitement	Effectif de femmes		Effectif d'hommes	Pourcentage recevant un traitement	Effectif d'hommes
Âge								
15–19	2,2	3 862	38,5	84	1,1	1 669	*	18
20–24	1,8	3 378	35,7	62	0,9	1 165	*	10
25–29	1,9	2 905	27,5	56	1,0	930	*	9
30–34	1,9	2 382	(48,4)	45	1,9	909	*	17
35–39	1,5	2 065	(38,1)	30	1,4	784	*	11
40–44	2,2	1 586	(49,6)	35	3,0	663	*	20
45–49	4,0	1 169	(41,4)	46	1,5	568	*	8
Résidence								
Bamako	4,8	2 675	25,7	128	1,5	1 177	*	18
Autre urbain	1,7	2 048	44,6	34	1,1	795	*	9
Ensemble urbain	3,4	4 723	29,7	162	1,3	1 971	(62,7)	26
Rural	1,5	12 624	46,6	196	1,4	4 714	60,5	68
Région								
Kayes	2,3	2 635	44,3	61	0,9	920	*	9
Koulikoro	0,8	4 018	*	34	1,1	1 637	*	18
Sikasso	1,6	3 143	(49,4)	50	1,9	1 215	*	23
Ségou	1,7	2 574	(39,6)	45	1,0	939	*	9
Mopti	2,0	1 530	(46,3)	31	0,4	505	*	2
Tombouctou	0,9	281	(27,1)	3	0,5	128	*	1
Gao	1,5	485	*	7	8,8	163	(53,7)	14
Kidal	†	6	†	0	†	2	†	0
Bamako	4,8	2 675	25,7	128	1,5	1 177	*	18
Niveau d'instruction								
Aucun	1,7	9 382	38,2	156	1,2	2 476	(46,6)	30
Primaire	1,9	2 926	20,8	56	1,9	1 352	*	26
Secondaire ou plus	2,9	5 039	46,8	145	1,3	2 858	(66,1)	38
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	1,4	3 036	(46,8)	42	0,8	1 179	*	10
Second	1,7	3 143	(33,3)	53	0,8	1 174	*	9
Moyen	1,3	3 318	49,9	44	1,6	1 190	(55,8)	19
Quatrième	2,3	3 676	35,9	86	1,9	1 446	(59,2)	28
Le plus élevé	3,2	4 174	37,1	132	1,7	1 697	(60,7)	29
Ensemble 15–49	2,1	17 347	39,0	358	1,4	6 686	61,1	94
50–64	3,7	3 007	47,7	112	3,6	1 143	(68,3)	41
Ensemble 15–64	2,3	20 354	41,1	470	1,7	7 829	63,3	135

Notes : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 14.6 Diagnostic et traitement d'un cancer ou d'une tumeur

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans qui ont été informés par un prestataire de santé qu'ils avaient un cancer ou une tumeur et, parmi celles et ceux qui ont été informés de leur état, pourcentage recevant un traitement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Femme				Homme			
	Ont déjà été informées par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'elles avaient un cancer ou une tumeur		Déjà informées par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'elles avaient un cancer ou une tumeur		Ont déjà été informés par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'ils avaient un cancer ou une tumeur		Déjà informés par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'ils avaient un cancer ou une tumeur	
Caractéristique sociodémographique		Effectif de femmes	Pourcentage recevant un traitement	Effectif de femmes		Effectif d'hommes	Pourcentage recevant un traitement	Effectif d'hommes
Âge								
15–19	0,1	3 862	*	4	0,0	1 669	*	0
20–24	0,2	3 378	*	7	0,1	1 165	*	1
25–29	0,7	2 905	*	20	0,2	930	*	2
30–34	0,3	2 382	*	8	0,1	909	*	1
35–39	0,3	2 065	*	7	0,1	784	*	1
40–44	0,7	1 586	*	12	0,3	663	*	2
45–49	0,8	1 169	*	9	0,5	568	*	3
Résidence								
Bamako	0,2	2 675	*	6	0,0	1 177	*	0
Autre urbain	0,4	2 048	*	9	0,0	795	*	0
Ensemble urbain	0,3	4 723	*	15	0,0	1 971	*	0
Rural	0,4	12 624	(37,9)	52	0,2	4 714	*	9
Région								
Kayes	0,7	2 635	*	17	0,1	920	*	1
Koulikoro	0,1	4 018	*	4	0,0	1 637	*	0
Sikasso	0,3	3 143	*	8	0,1	1 215	*	1
Ségou	1,0	2 574	*	26	0,1	939	*	1
Mopti	0,3	1 530	*	5	0,2	505	*	1
Tombouctou	0,0	281	*	0	2,2	128	*	3
Gao	0,2	485	*	1	1,8	163	*	3
Kidal	†	6	†	0	†	2	†	0
Bamako	0,2	2 675	*	6	0,0	1 177	*	0
Niveau d'instruction								
Aucun	0,4	9 382	(44,3)	41	0,2	2 476	*	5
Primaire	0,3	2 926	*	10	0,2	1 352	*	3
Secondaire ou plus	0,3	5 039	*	15	0,1	2 858	*	2
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	0,4	3 036	*	13	0,1	1 179	*	1
Second	0,6	3 143	*	19	0,2	1 174	*	3
Moyen	0,4	3 318	*	15	0,2	1 190	*	2
Quatrième	0,2	3 676	*	9	0,3	1 446	*	4
Le plus élevé	0,3	4 174	*	12	0,0	1 697	*	0
Ensemble 15–49	0,4	17 347	36,5	67	0,1	6 686	*	10
50–64	0,6	3 007	*	18	0,7	1 143	*	7
Ensemble 15–64	0,4	20 354	36,9	84	0,2	7 829	(48,2)	17

Notes : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 14.7 Examens pour le cancer du sein

Pourcentage de femmes de 15–49 ans qui ont déjà été examinées par un médecin ou du personnel de santé pour le cancer du sein et pourcentage ayant déjà été testées par un médecin ou du personnel de santé pour le cancer du col de l'utérus, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage examiné pour le cancer du sein	Effectif de femmes
Âge		
15–29	8,4	10 145
30–49	13,2	7 202
30–34	13,7	2 382
35–39	13,9	2 065
40–44	11,6	1 586
45–49	12,9	1 169
30–44	13,2	6 032
40–49	12,2	2 755
Nombre d'enfants vivants		
0	3,6	4 462
1–2	12,7	4 581
3–4	13,4	3 928
5+	12,1	4 376
État matrimonial		
Célibataire	3,4	3 585
Actuellement en union	12,2	13 237
En rupture d'union	12,5	525
Emploi (dans les 12 derniers mois)		
N'a pas travaillé	7,5	6 587
A travaillé et a été rémunérée en argent	13,2	8 724
A travaillé mais n'a pas été rémunérée en argent	7,2	2 036
Résidence		
Bamako	14,9	2 675
Autre urbain	11,6	2 048
Ensemble urbain	13,4	4 723
Rural	9,2	12 624
Région		
Kayes	6,7	2 635
Koulikoro	11,7	4 018
Sikasso	14,3	3 143
Ségou	7,3	2 574
Mopti	4,9	1 530
Tombouctou	4,7	281
Gao	6,5	485
Kidal	†	6
Bamako	14,9	2 675
Niveau d'instruction		
Aucun	9,0	9 382
Primaire	9,6	2 926
Secondaire ou plus	13,4	5 039
Quintile de bien-être économique		
Le plus bas	9,2	3 036
Second	7,7	3 143
Moyen	8,3	3 318
Quatrième	10,5	3 676
Le plus élevé	14,8	4 174
Ensemble	10,4	17 347

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 14.8 Cancer du col de l'utérus

Pourcentage de femmes de 15–49 ans ayant entendu parler du cancer du col de l'utérus, pourcentage ayant entendu parler d'un test de dépistage du cancer du col de l'utérus et pourcentage ayant effectué un test de dépistage du cancer du col de l'utérus ; pourcentage de femmes de 15–49 ans qui ont été testées pour le cancer du col de l'utérus selon le moment du dernier test et selon les résultats du test, en fonction de certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Parmi toutes les femmes pourcentage :				Parmi les femmes de 15–49 ans ayant effectué un test pour le cancer du col de l'utérus :									
					Moment du dernier test pour le cancer du col de l'utérus				Résultats du dernier test pour le cancer du col de l'utérus					
Caractéristique sociodémographique	Ayant entendu parler du cancer du col de l'utérus	Ayant entendu parler d'un test de dépistage du cancer du col de l'utérus	Ayant effectué un test de dépistage du cancer du col de l'utérus	Effectif de femmes	Il y a <1 an	Il y a 1–3 ans	Il y a >3 ans	Ne sait pas	Anormal/ positif/ suspect	Normal/ négatif	Pas clair/non concluant	N'a pas reçu les résultats	Ne sait pas	Effectif de femmes
Âge														
15–19	17,8	11,2	0,7	3 862	*	*	*	*	*	*	*	*	*	27
20–24	34,2	23,6	2,9	3 378	36,9	47,7	14,0	1,4	6,9	82,2	1,2	9,6	0,0	97
25–29	40,4	29,0	4,9	2 905	19,3	52,2	27,7	0,8	3,4	94,6	0,0	2,0	0,0	142
30–34	42,5	32,9	7,4	2 382	19,0	58,9	19,8	2,3	7,7	89,0	0,6	1,4	1,4	176
35–39	44,3	33,8	6,3	2 065	15,6	63,6	18,2	2,7	5,9	91,2	1,0	0,9	1,0	131
40–44	44,2	33,7	7,9	1 586	9,9	58,0	32,1	0,0	6,4	91,4	0,0	2,2	0,0	125
45–49	43,5	31,6	8,1	1 169	11,1	50,0	38,8	0,0	12,0	86,5	0,0	1,4	0,0	95
Résidence														
Bamako	51,0	42,3	8,6	2 675	13,4	61,8	24,8	0,0	0,8	98,3	0,0	0,9	0,0	229
Autre urbain	37,2	28,7	5,5	2 048	30,3	46,6	21,8	1,3	10,7	85,9	0,0	3,4	0,0	112
Ensemble urbain	45,0	36,4	7,2	4 723	18,9	56,8	23,8	0,4	4,0	94,2	0,0	1,7	0,0	341
Rural	31,9	21,7	3,6	12 624	18,5	55,5	23,8	2,2	9,0	85,2	0,8	4,2	0,8	452
Région														
Kayes	35,6	25,7	3,1	2 635	26,4	64,0	9,6	0,0	4,6	93,9	1,6	0,0	0,0	81
Koulikoro	38,5	26,9	6,1	4 018	21,0	53,2	23,5	2,2	4,4	91,2	0,4	2,8	1,1	247
Sikasso	31,0	23,2	4,2	3 143	22,5	43,8	29,3	4,3	20,9	66,3	0,0	12,1	0,8	133
Ségou	36,3	23,1	2,5	2 574	12,3	59,4	28,3	0,0	13,6	84,7	1,7	0,0	0,0	65
Mopti	13,9	9,9	1,6	1 530	(11,7)	(66,1)	(22,2)	(0,0)	(4,0)	(96,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	25
Tombouctou	12,3	8,6	1,7	281	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5
Gao	30,0	13,7	1,6	485	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8
Kidal	†	†	†	6	†	†	†	†	†	†	†	†	†	0
Bamako	51,0	42,3	8,6	2 675	13,4	61,8	24,8	0,0	0,8	98,3	0,0	0,9	0,0	229
Niveau d'instruction														
Aucun	30,7	21,0	3,2	9 382	14,9	56,1	26,9	2,2	9,1	85,7	0,8	3,7	0,8	298
Primaire	33,7	24,9	4,8	2 926	18,6	57,7	22,8	0,8	8,2	85,5	0,0	5,4	1,0	141
Secondaire ou plus	45,4	34,9	7,0	5 039	21,9	55,4	21,5	1,1	4,5	93,3	0,3	1,9	0,0	353
Quintile de bien-être économique														
Le plus bas	26,1	16,8	1,9	3 036	(13,1)	(55,1)	(27,5)	(4,2)	(24,1)	(57,6)	(0,0)	(16,6)	(1,7)	58
Second	28,5	19,1	2,5	3 143	19,0	56,7	24,3	0,0	9,9	79,8	1,4	7,1	1,7	79
Moyen	31,0	21,5	2,6	3 318	18,9	55,3	23,4	2,4	12,3	82,2	0,0	3,9	1,6	86
Quatrième	38,6	27,5	5,4	3 676	20,1	54,5	23,7	1,7	7,1	89,6	1,2	2,1	0,0	199
Le plus élevé	48,4	39,0	8,9	4 174	18,7	57,1	23,2	1,0	2,1	97,2	0,0	0,6	0,0	371
Ensemble 15–49	35,5	25,7	4,6	17 347	18,7	56,1	23,8	1,4	6,9	89,1	0,4	3,2	0,5	793
50–64	37,1	26,2	5,5	3 007	11,8	44,8	42,9	0,5	11,6	87,5	0,0	0,9	0,0	164
Ensemble 15–64	35,7	25,8	4,7	20 354	17,5	54,1	27,1	1,3	7,7	88,8	0,4	2,8	0,4	957

Notes : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 14.9 Diagnostic et traitement de la dépression ou de l'anxiété

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans qui ont été informés par un prestataire de santé qu'ils souffraient de dépression ou d'anxiété et, parmi celles et ceux qui ont été informés de leur état, pourcentage recevant un traitement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Femme				Homme			
			Déjà informées par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'elles souffraient de dépression ou d'anxiété				Déjà informés par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'ils souffraient de dépression ou d'anxiété	
Caractéristique sociodémographique	Ont déjà été informées par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'elles souffraient de dépression ou d'anxiété	Effectif de femmes	Pourcentage recevant un traitement	Effectif de femmes	Ont déjà été informés par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'ils souffraient de dépression ou d'anxiété	Effectif d'hommes	Pourcentage recevant un traitement	Effectif d'hommes
Âge								
15–19	2,1	3 862	7,7	81	1,0	1 669	*	16
20–24	2,7	3 378	8,2	91	2,9	1 165	(9,2)	34
25–29	3,1	2 905	12,2	91	2,2	930	*	20
30–34	3,0	2 382	22,0	72	1,9	909	*	18
35–39	3,6	2 065	17,3	75	1,4	784	*	11
40–44	4,6	1 586	15,8	72	1,7	663	*	11
45–49	5,3	1 169	24,1	62	2,6	568	*	15
Résidence								
Bamako	8,9	2 675	8,1	238	2,0	1 177	*	23
Autre urbain	2,0	2 048	19,1	41	2,3	795	*	18
Ensemble urbain	5,9	4 723	9,7	279	2,1	1 971	(5,5)	42
Rural	2,1	12 624	19,9	266	1,8	4 714	11,5	84
Région								
Kayes	3,1	2 635	27,2	82	0,3	920	*	3
Koulikoro	1,5	4 018	(18,0)	60	3,5	1 637	(7,9)	57
Sikasso	1,8	3 143	(24,6)	56	0,8	1 215	*	10
Ségou	2,2	2 574	13,4	58	1,4	939	*	14
Mopti	1,2	1 530	*	18	0,8	505	*	4
Tombouctou	1,1	281	*	3	3,7	128	*	5
Gao	6,1	485	5,3	30	6,0	163	(0,0)	10
Kidal	†	6	†	0	†	2	†	0
Bamako	8,9	2 675	8,1	238	2,0	1 177	*	23
Niveau d'instruction								
Aucun	2,7	9 382	14,9	257	1,9	2 476	7,4	48
Primaire	3,1	2 926	14,9	91	2,5	1 352	(14,7)	34
Secondaire ou plus	3,9	5 039	14,3	197	1,5	2 858	(7,8)	43
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	2,4	3 036	24,4	72	2,5	1 179	*	29
Second	2,0	3 143	22,6	62	1,6	1 174	*	19
Moyen	2,1	3 318	22,0	70	2,8	1 190	(10,0)	33
Quatrième	3,3	3 676	9,1	121	1,4	1 446	(0,0)	20
Le plus élevé	5,3	4 174	10,0	220	1,5	1 697	*	25
Ensemble 15–49	3,1	17 347	14,7	545	1,9	6 686	9,5	125
50–64	5,3	3 007	20,5	159	2,0	1 143	(14,1)	23
Ensemble 15–64	3,5	20 354	16,0	705	1,9	7 829	10,2	148

Notes : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 14.10 Diagnostic et traitement d'épilepsie

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans qui ont été informés par un prestataire de santé qu'ils souffraient de troubles épileptiques ou d'épilepsie et, parmi celles et ceux qui ont été informés de leur état, pourcentage recevant un traitement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Femme				Homme			
Caractéristique sociodémographique	Ont déjà été informées par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'elles souffraient de troubles épileptiques ou d'épilepsie	Effectif de femmes	Pourcentage recevant un traitement	Effectif de femmes	Ont déjà été informés par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'ils souffraient de troubles épileptiques ou d'épilepsie	Effectif d'hommes	Pourcentage recevant un traitement	Effectif d'hommes
Âge								
15–19	0,6	3 862	*	24	0,4	1 669	*	6
20–24	0,5	3 378	*	18	0,1	1 165	*	1
25–29	0,6	2 905	*	18	0,2	930	*	2
30–34	0,7	2 382	*	17	0,1	909	*	1
35–39	0,6	2 065	*	12	0,4	784	*	3
40–44	0,8	1 586	*	13	0,3	663	*	2
45–49	1,2	1 169	*	14	0,6	568	*	3
Résidence								
Bamako	0,3	2 675	*	7	0,1	1 177	*	1
Autre urbain	0,3	2 048	*	6	0,3	795	*	3
Ensemble urbain	0,3	4 723	*	13	0,2	1 971	*	4
Rural	0,8	12 624	49,9	101	0,3	4 714	*	15
Région								
Kayes	1,0	2 635	(33,8)	27	0,5	920	*	5
Koulikoro	0,8	4 018	*	32	0,6	1 637	*	9
Sikasso	0,7	3 143	*	23	0,1	1 215	*	1
Ségou	0,4	2 574	*	11	0,1	939	*	1
Mopti	0,5	1 530	*	7	0,1	505	*	0
Tombouctou	0,5	281	*	1	0,2	128	*	0
Gao	1,1	485	*	5	0,8	163	*	1
Kidal	†	6	†	0	†	2	†	0
Bamako	0,3	2 675	*	7	0,1	1 177	*	1
Niveau d'instruction								
Aucun	0,8	9 382	52,4	76	0,3	2 476	*	8
Primaire	0,7	2 926	*	20	0,4	1 352	*	6
Secondaire ou plus	0,4	5 039	*	19	0,2	2 858	*	5
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	1,2	3 036	*	35	0,1	1 179	*	1
Second	0,7	3 143	*	23	0,4	1 174	*	5
Moyen	0,6	3 318	(51,8)	20	0,5	1 190	*	6
Quatrième	0,6	3 676	*	23	0,4	1 446	*	6
Le plus élevé	0,3	4 174	*	14	0,1	1 697	*	1
Ensemble 15–49	0,7	17 347	51,1	114	0,3	6 686	*	19
50–64	1,3	3 007	(40,1)	38	0,4	1 143	*	5
Ensemble 15–64	0,7	20 354	48,3	153	0,3	7 829	(48,0)	24

Notes : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 14.11 Diagnostic et traitement de l'arthrite

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans qui ont été informés par un prestataire de santé qu'ils souffraient d'arthrite et, parmi celles et ceux qui ont été informés de leur état, pourcentage recevant un traitement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Femme				Homme			
	Ont déjà été informées par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'elles souffraient d'arthrite		Déjà informées par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'elles souffraient d'arthrite		Ont déjà été informés par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'ils souffraient d'arthrite		Déjà informés par un médecin ou un autre prestataire de santé qu'ils souffraient d'arthrite	
Caractéristique sociodémographique		Effectif de femmes	Pourcentage recevant un traitement	Effectif de femmes		Effectif d'hommes	Pourcentage recevant un traitement	Effectif d'hommes
Âge								
15–19	1,1	3 862	(30,6)	43	0,9	1 669	*	15
20–24	1,7	3 378	26,7	58	1,3	1 165	*	15
25–29	2,6	2 905	35,9	75	1,4	930	*	13
30–34	4,0	2 382	33,9	96	2,0	909	*	19
35–39	5,5	2 065	40,6	114	2,2	784	*	17
40–44	9,5	1 586	44,6	151	3,2	663	*	21
45–49	10,5	1 169	51,4	122	3,0	568	*	17
Résidence								
Bamako	5,0	2 675	45,7	133	1,5	1 177	*	17
Autre urbain	2,7	2 048	45,1	54	1,7	795	*	13
Ensemble urbain	4,0	4 723	45,5	187	1,5	1 971	(43,7)	30
Rural	3,7	12 624	38,0	472	1,8	4 714	49,8	87
Région								
Kayes	4,6	2 635	26,5	121	0,8	920	*	8
Koulikoro	2,7	4 018	43,5	110	1,6	1 637	*	27
Sikasso	4,4	3 143	53,9	140	3,6	1 215	(39,4)	44
Ségou	2,7	2 574	17,1	69	1,6	939	*	15
Mopti	2,9	1 530	(54,8)	45	0,5	505	*	3
Tombouctou	1,7	281	*	5	1,1	128	*	1
Gao	7,6	485	28,6	37	1,6	163	*	3
Kidal	†	6	†	0	†	2	†	0
Bamako	5,0	2 675	45,7	133	1,5	1 177	*	17
Niveau d'instruction								
Aucun	4,3	9 382	38,8	404	2,0	2 476	(36,9)	49
Primaire	3,9	2 926	42,1	114	2,2	1 352	(73,0)	29
Secondaire ou plus	2,8	5 039	42,5	142	1,3	2 858	(43,9)	38
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	4,6	3 036	45,5	141	1,8	1 179	*	22
Second	4,6	3 143	32,6	143	1,6	1 174	*	19
Moyen	2,8	3 318	36,4	92	1,9	1 190	(58,9)	22
Quatrième	3,3	3 676	37,8	122	2,1	1 446	(46,8)	30
Le plus élevé	3,9	4 174	46,0	161	1,5	1 697	*	25
Ensemble 15–49	3,8	17 347	40,1	660	1,8	6 686	48,2	117
50–64	20,0	3 007	45,8	600	5,3	1 143	52,1	60
Ensemble 15–64	6,2	20 354	42,8	1 260	2,3	7 829	49,6	178

Notes : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 14.12 Vaccin contre la COVID-19

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans ayant déjà reçu une dose, au moins, de vaccin, contre la COVID-19, pourcentage ayant reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 selon le moment ou la dernière vaccination a eu lieu, en fonction de certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Femme							Homme							
			Pourcentage ayant reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19							Pourcentage ayant reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19					
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant déjà reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19	Effectif de femmes	En 2023–2024	En 2022	En 2021	Ne sait pas quand	Effectif de femmes	Pourcentage ayant déjà reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19	Effectif d'hommes	En 2023–2024	En 2022	En 2021	En 2020	Ne sait pas quand	Effectif d'hommes
Âge															
15–19	12,8	3 862	36,7	39,7	23,3	0,3	493	12,7	1 669	33,5	32,4	21,7	12,1	0,4	212
20–24	20,6	3 378	38,0	37,4	24,4	0,2	694	18,4	1 165	21,5	36,5	26,9	14,5	0,5	215
25–29	24,1	2 905	34,6	39,8	25,5	0,1	700	23,3	930	19,4	38,9	27,7	14,0	0,0	216
30–34	27,0	2 382	34,3	43,6	21,9	0,2	644	23,4	909	22,0	33,9	32,7	10,8	0,6	213
35–39	27,8	2 065	33,9	41,7	24,1	0,3	575	28,5	784	21,9	34,2	31,5	11,9	0,5	223
40–44	26,6	1 586	29,7	43,2	27,1	0,1	423	31,3	663	20,6	36,9	29,1	11,1	2,3	207
45–49	26,4	1 169	35,1	43,8	20,6	0,5	309	31,3	568	18,6	37,5	34,7	9,2	0,0	178
Résidence															
Bamako	15,1	2 675	25,6	35,7	38,7	0,0	404	16,2	1 177	13,3	26,7	39,9	20,2	0,0	190
Autre urbain	18,6	2 048	30,7	37,6	31,2	0,5	380	23,4	795	13,1	31,4	37,4	17,7	0,4	186
Ensemble urbain	16,6	4 723	28,1	36,6	35,1	0,2	784	19,1	1 971	13,2	29,0	38,7	18,9	0,2	376
Rural	24,2	12 624	36,6	42,1	21,1	0,2	3 053	23,1	4 714	25,9	38,0	25,7	9,6	0,8	1 087
Région															
Kayes	18,8	2 635	28,5	40,0	31,3	0,2	495	17,9	920	28,4	26,4	23,6	21,6	0,0	165
Koulikoro	21,4	4 018	28,5	47,0	24,3	0,2	858	17,6	1 637	15,0	46,2	25,3	13,1	0,4	288
Sikasso	31,5	3 143	44,2	36,2	19,4	0,2	990	34,0	1 215	29,5	32,3	27,1	9,4	1,7	413
Ségou	28,1	2 574	37,3	43,9	18,7	0,1	724	25,0	939	19,9	39,5	32,7	7,6	0,3	235
Mopti	13,9	1 530	33,7	43,1	23,1	0,0	213	19,7	505	24,5	38,2	31,6	5,7	0,0	99
Tombouctou	11,4	281	23,6	41,4	35,0	0,0	32	15,4	128	21,2	54,9	21,6	2,3	0,0	20
Gao	24,7	485	50,7	37,8	9,7	1,8	120	32,8	163	34,4	38,8	24,5	2,0	0,4	53
Kidal	†	6	†	†	†	†	0	†	2	†	†	†	†	†	0
Bamako	15,1	2 675	25,6	35,7	38,7	0,0	404	16,2	1 177	13,3	26,7	39,9	20,2	0,0	190
Niveau d'instruction															
Aucun	21,2	9 382	35,9	43,4	20,7	0,1	1 986	20,4	2 476	27,9	35,5	27,4	8,2	1,0	505
Primaire	23,9	2 926	35,0	39,7	25,1	0,2	701	18,9	1 352	17,1	44,2	24,3	14,4	0,0	256
Secondaire ou plus	22,8	5 039	32,9	37,7	29,0	0,4	1 151	24,6	2 858	20,8	32,8	32,0	13,9	0,6	703
Quintile de bien-être économique															
Le plus bas	29,5	3 036	37,2	46,1	16,6	0,1	894	26,9	1 179	30,7	36,2	22,6	9,5	1,1	317
Second	26,9	3 143	41,1	37,9	21,0	0,0	844	24,0	1 174	21,9	38,4	29,5	9,8	0,4	282
Moyen	22,0	3 318	34,7	43,4	21,7	0,2	731	22,4	1 190	28,3	38,4	26,9	6,4	0,0	267
Quatrième	18,2	3 676	31,4	38,9	29,4	0,2	670	16,6	1 446	22,5	35,3	26,7	15,4	0,1	240
Le plus élevé	16,7	4 174	27,7	37,7	34,1	0,5	698	21,1	1 697	11,8	31,5	37,6	17,9	1,2	358
Ensemble 15–49	22,1	17 347	34,8	41,0	24,0	0,2	3 837	21,9	6 686	22,6	35,7	29,1	12,0	0,6	1 463
50–64	32,3	3 007	35,5	40,2	24,2	0,2	972	29,8	1 143	23,2	37,2	29,1	10,2	0,4	340
Ensemble 15–64	23,6	20 354	35,0	40,8	24,0	0,2	4 809	23,0	7 829	22,7	36,0	29,1	11,7	0,6	1 803

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

POUVOIR D'ACTION DES FEMMES 15

Principaux résultats

- ***Emploi et type de rémunération :*** Au Mali, 66 % et 98 % des hommes de 15–49 ans en union avaient travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête. Parmi ceux ayant travaillé, 16 % des femmes et 23 % des hommes n'ont pas été rémunérés pour leur travail.
- ***Contrôle de l'utilisation de l'argent gagné par la femme :*** Près de neuf femmes sur dix (88 %) actuellement en union ayant été rémunérées en argent décident elles-mêmes de l'utilisation de leurs revenus.
- ***Possession de biens par les femmes :*** Globalement, 14 % des femmes et 38 % des hommes possèdent une maison (seuls ou avec quelqu'un). Pour ce qui est des terres, les pourcentages sont de respectivement 16 % et 32 %.
- ***Possession d'un téléphone portable et utilisation d'un téléphone portable pour des transactions financières :*** Au Mali, plus de six femmes de 15-49 ans sur dix (66 %) et environ neuf hommes de 15-49 ans sur dix (87 %) possèdent un téléphone portable ; parmi ces femmes et ces hommes, respectivement 39 % et 69 % l'avaient utilisé au cours des 12 derniers mois pour effectuer des transactions financières.
- ***Possession et utilisation d'un compte bancaire :*** Au cours des 12 derniers mois,3 % des femmes et 10 % des hommes de 15–49 ans avaient déposé ou retiré de l'argent de leur propre compte bancaire.
- ***Participation dans la prise de décision :*** Les décisions concernant les soins de santé de la femme, les achats importants pour le ménage et les visites de la femme à sa famille ou à ses parents sont prises, dans la grande majorité des cas, par l'homme (respectivement 80 %, 74 % et 65 %). Dans seulement 6 % des cas, la femme décide seule pour ses propres soins de santé et dans 5 % des cas pour les achats importants du ménage.
- ***Opinion concernant le fait de battre son épouse/partenaire :*** Près de sept femmes sur dix (69 %) pensent que pour, au moins une des raisons citées, un homme a le droit de battre sa femme ou partenaire contre quatre hommes sur dix (40 %).

Ce chapitre porte sur le pouvoir d'action des femmes en termes d'emploi, de revenus, de contrôle sur leurs revenus et il fournit aussi des informations sur la perception des femmes concernant l'importance de leurs revenus par rapport à ceux de leurs conjoints. Ce chapitre examine ensuite la possession de biens par les femmes et par les hommes, comme une maison, des terrains et un téléphone portable, ainsi que l'utilisation de comptes bancaires et le recours à des prestataires de services en ligne ou à l'utilisation de téléphones portables pour effectuer des transferts financiers. De plus, les réponses à des questions spécifiques servent à définir trois indicateurs du pouvoir d'action des femmes : la participation des femmes à la prise de décisions concernant le ménage, l'opinion des femmes concernant le recours à la violence conjugale et la participation des femmes à la prise de décisions en matière de santé sexuelle et de procréation.

15.1 EMPLOI DES FEMMES ET DES HOMMES EN UNION

Emploi

Les femmes et les hommes enquêtés sont considérés comme travaillant s'ils/elles ont effectué un travail autre que leurs tâches ménagères/domestiques au cours des 12 mois précédant l'enquête.

Échantillon : Femmes et hommes actuellement en union de 15–49 ans

Rémunération en argent

On a demandé aux enquêtés s'ils sont payés en argent ou en nature pour leur travail. Seules les personnes qui reçoivent un paiement seulement en argent ou en argent et en nature sont considérées comme ayant travaillé et étant rémunérées.

Échantillon : Femmes et hommes de 15–49 ans actuellement en union et qui ont travaillé au cours des 12 mois précédant l'enquête.

Le **Tableau 15.1** montre que plus de six femmes de 15–49 ans sur dix (66 %) et la quasi-totalité des hommes de la même tranche d'âges (98 %) actuellement en union ont travaillé au cours des 12 mois précédant l'enquête. Le pourcentage d'hommes ayant travaillé au cours des 12 derniers mois sans être rémunéré est plus élevé que les femmes (23 % contre 16 %) ; le pourcentage d'hommes payés uniquement en argent est aussi plus faible que celui des femmes (64 % contre 68 %).

Tendances : Le pourcentage de femmes en union ayant travaillé au cours des 12 mois précédant l'enquête a légèrement augmenté entre les deux dernières EDS, passant de 61 % en 2018 à 66 % en 2023–2024. Chez les hommes, ce pourcentage a peu varié et est resté très élevé. Les proportions de femmes et d'hommes en union ayant fait un travail non rémunéré ont diminué entre 2018 et 2023–2024, passant de 27 % à 16 % chez les femmes et 29 % à 23 % chez les hommes.

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Globalement, la proportion de femmes en union ayant travaillé au cours des 12 derniers mois augmente avec l'âge, passant de 46 % chez les 15–19 ans à 77 % chez les 40–44 ans pour diminuer à 75 % chez les 45–49 ans. Chez les hommes de 15-49 ans, on ne constate pratiquement pas de variation avec l'âge (**Graphique 15.1**).
- Le pourcentage de femmes en union ayant travaillé sans aucune rémunération diminue avec l'âge, passant de 25 % parmi celles de 15–19 ans à 14 % parmi celles de 45–49 ans. On note la même tendance chez les hommes de 15-49 ans en union, le pourcentage passant de 39 % parmi ceux de 20–24 ans à 19 % parmi ceux de 40–44 ans et 22 % à 45–49 ans (**Tableau 15.1**).

Graphique 15.1 **Emploi par âge**

Pourcentage de femmes et d'hommes actuellement en union qui ont travaillé à un moment quelconque au cours des 12 mois précédant l'enquête



15.2 CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES REVENUS DES FEMMES

Contrôle de l'utilisation de l'argent gagné

On considère que les femmes et les hommes enquêtés contrôlent l'utilisation de l'argent qu'ils ont gagné s'ils décident, soit seuls, soit ensemble avec leur conjoint de l'utilisation de leur propre argent.

Échantillon : Femmes et hommes de 15–49 ans actuellement en union ayant été rémunérés en argent pour leur travail au cours des 12 mois précédant l'enquête.

L'accès des femmes à un revenu est primordial pour leur autonomie mais le contrôle de l'utilisation de leurs revenus l'est tout autant. Ainsi, on a cherché à savoir, si les femmes de 15–49 ans qui ont travaillé au cours des 12 mois précédant l'enquête et qui ont gagné de l'argent, ont décidé elles-mêmes principalement de l'utilisation de cet argent.

Au Mali, près de neuf femmes sur dix (88 %) qui ont été rémunérées en argent pour leur travail, ont décidé principalement elles-mêmes de l'utilisation de leurs gains et seulement 3 % ont décidé en accord avec leur conjoint (**Tableau 15.2.1**). Globalement, un peu plus de neuf femmes sur dix (91 %) qui ont travaillé et qui ont été rémunérées en argent ont participé à la décision d'utilisation de leurs revenus. À l'opposé, 9 % ont déclaré que c'est leur conjoint qui décidait principalement de l'utilisation de leur revenu (**Graphique 15.2**).

***Graphique 15.2* Contrôle des gains de la femme**

Répartition des femmes actuellement en union qui ont été rémunérées en argent pour leur travail selon la personne qui a décidé principalement de l'utilisation de ces revenus



Au cours de l'enquête, on a aussi demandé aux femmes si elles pensaient gagner, plus, moins ou à peu près la même chose que leur conjoint, en termes d'argent. Dans 87 % des cas, les femmes pensent qu'elles gagnent moins que leur conjoint. Seulement, 4 % pensent qu'elles gagnent à peu près la même chose et 6 % pensent qu'elles gagnent plus (**Tableau 15.2.1**).

Tendances : Entre 2018 et 2023–2024, la proportion de femmes de 15–49 ans actuellement en union qui décident principalement de l'utilisation de leurs revenus a augmenté, passant de 83 % à 88 %. En outre, dans la même période, on note une diminution, non seulement de la proportion de femmes qui décident en accord avec leur conjoint, de 6 % à 3 %, mais aussi du pourcentage de femmes dont c'est le conjoint qui décide principalement de l'utilisation de leur revenu, de 11 % à 9 %. Globalement, le pourcentage de femmes qui sont impliquées dans la décision d'utilisation de leur revenu a augmenté, passant de 88 % à 91 %.

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- La proportion de femmes de 15–49 ans actuellement en union qui décident elles-mêmes de l'utilisation de leurs revenus est légèrement élevée dans le milieu urbain (91 %) que rural (87 %).
- La répartition selon la région montre que plus de neuf femmes sur dix décident elles-mêmes de l'utilisation de leurs revenus à Mopti (94 %), à Sikasso (92 %) et dans le district de Bamako (93 %). Par contre, la proportion des femmes qui déclarent que c'est leur conjoint qui décide principalement de

l'utilisation de leurs revenus est un peu plus élevée dans les régions de Kayes (19 %), Tombouctou (15 %) et Gao (14 %).

- Le pourcentage de femmes qui pensent qu'elles gagnent plus d'argent que leur conjoint est plus élevé parmi les femmes de 45–49 ans (11 %) et de 40–44 ans (10 %).
- Le pourcentage de femmes qui pensent qu'elles gagnent plus d'argent que leur conjoint est plus élevé dans les régions de Ségou (11 %) et Gao (7 %) et dans le district de Bamako (8 %) et plus faible dans la région de Sikasso (3 %).
- Le pourcentage de femmes qui pensent qu'elles gagnent moins d'argent que leur conjoint a tendance à diminué avec le nombre d'enfants, passant de 90 % quand la femme n'a pas d'enfant à 84 % parmi celles ayant 5 enfants et plus.

15.3 CONTRÔLE SUR L'UTILISATION DES REVENUS DES HOMMES

Au cours de l'enquête, on a demandé aux hommes en union qui ont travaillé au cours des 12 derniers mois contre une rémunération en argent, qui décide de l'utilisation de leur argent. La même question a été posée aux femmes en union dont le conjoint a gagné de l'argent. Les résultats présentés au **Tableau 15.2.2** permettent de comparer les opinions des femmes et des hommes.

Au Mali, près de neuf hommes de 15–49 ans en union sur dix (88 %) ont déclaré décider seuls de l'utilisation de leur revenu. Ce pourcentage est le même que celui basé sur les déclarations des femmes. Par ailleurs, 6 % des femmes ont déclaré qu'elles décidaient principalement de l'utilisation de l'argent gagné par le conjoint contre 2 % d'après la déclaration des hommes. Dans 5 % des cas selon les femmes, la décision d'utilisation est conjointe contre 7 % selon la déclaration des hommes.

15.4 POSSESSION DE BIENS PAR LES FEMMES ET LES HOMMES

15.4.1 Propriété d'une maison ou d'un terrain et documentation des titres de propriété

Propriété d'une maison ou de terres

Les enquêtés qui possèdent une maison ou de la terre, soit seuls ou ensemble avec leur conjoint, ou quelqu'un d'autre, ou à la fois avec leur conjoint et quelqu'un d'autre.

Possession de titres de propriété d'une maison ou de terres

Les enquêtés dont le nom figure sur le titre de propriété ou tout autre document reconnu par l'administration.

Échantillon : Femmes et hommes de 15–49 ans

Possession de biens par les femmes et les hommes

La possession de certains biens comme des terres et des maisons peut conférer une certaine autonomie financière, sociale et peut avoir aussi un effet bénéfique pour les ménages. Pour les femmes, être propriétaires de biens peut renforcer leur autonomie, leur niveau de revenu, voire leur pouvoir d'achat et aussi leur permettre d'accéder aux instances de décision et les protéger en cas de rupture d'union.

Le **Tableau 15.3.1** présente les proportions de femmes de 15–49 ans qui possèdent, soit seules, soit avec quelqu'un d'autre, une maison ou des terres. Dans l'ensemble, près de neuf femmes sur dix (86 %) ne possèdent pas de maison. À l'opposé, 5 % en possèdent une en commun avec le conjoint ou quelqu'un d'autre.

En outre, on constate que 84 % des femmes ne possèdent pas de terres. Seulement 8 % des femmes possèdent de la terre, seule et 3 % en commun avec le conjoint et quelqu'un d'autre.

Le **Tableau 15.3.2** présente les proportions d'hommes de 15–49 ans qui possèdent, soit seuls, soit avec quelqu'un d'autre, une maison ou des terres. Environ six hommes sur dix (62 %) ne possèdent pas de maison. Cependant, 16 % en possèdent seul et 18 % en commun avec le conjoint ou quelqu'un d'autres

La proportion d'hommes de 15-49 ans qui possède des terres est un peu plus faible comparativement à la possession d'une maison. En effet 10 % en possèdent seul et 18 % en commun avec quelqu'un d'autre seulement (18 %).

***Graphique 15.3* Possession de biens**

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans qui :



La proportion d'hommes de 15–49 ans qui possèdent une maison est plus élevée que celle des femmes (38 % contre 14 %). Plus précisément, la proportion d'hommes possédant, seul, une maison est nettement plus élevée que celle des femmes (16 % contre 3 %). En outre, 32 % des hommes possèdent de la terre, soit une proportion plus élevée que celle des femmes (16 %) (**Graphique 15.3**).

Possession d'un titre de propriété pour une maison et/ou une terre

Globalement, 69 % des femmes et 67 % des hommes de 15–49 ans possédant une maison n'ont pas de titre de propriété ou de document officiel prouvant la possession de ce bien (**Tableau 15.4.1** et **Tableau 15.4.2**). À l'opposé, 15 % des femmes possèdent une maison avec un titre de propriété et leur nom figure sur l'acte de propriété contre 17 % parmi les hommes. Par ailleurs, dans 90 % des cas, les femmes de 15–49 ans possédant des terres n'ont pas de titre de propriété contre 83 % parmi les hommes de 15–49 ans. Seulement 5 % des femmes et 9 % des hommes de 15–49 ans possèdent des terres avec un titre de propriété et leur nom qui figure sur le titre (**Tableau 15.5.1** et **Tableau 15.5.2**).

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage de femmes ne possédant pas de maison est un peu plus important en milieu urbain (89 %) qu'en milieu rural (85 %). De même, le pourcentage de femmes ne possédant pas de terres est plus élevé en milieu urbain (95 %) qu'en milieu rural (80 %).

- Le pourcentage d'hommes qui possèdent une maison ou une terre seul est plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain : 9 % des hommes du milieu urbain possèdent, seuls, une maison contre 19 % en milieu rural et 7 % des hommes du milieu urbain possèdent des terres contre 11 % en milieu rural.

- Le pourcentage de femmes et d'hommes ne possédant pas de maison ou des terres augmente avec le niveau d'instruction. En effet, le pourcentage de femmes ne possédant pas de maison passe de 84 % chez celles n'ayant aucun niveau d'instruction à 88 % chez celles ayant un niveau d'instruction secondaire ou plus. De même, le pourcentage de celles ne possédant pas de terres passe de respectivement 79 % à 94 %. Parmi les hommes, ces pourcentages passent respectivement de 52 % à 70 % pour les maisons et de 56 % à 80 % pour les terres.

- Le pourcentage de femmes et d'hommes ne possédant pas de maison ou pas de terres a tendance à diminuer avec l'âge, surtout parmi les hommes : parmi les femmes, Le pourcentage ne possédant pas de maison passe de 94 % chez les femmes de 15–19 ans à 75 % chez celles de 45–49 ans. De même, Le pourcentage de celles ne possédant pas de terres varie, passant de 95 % à 15–19 ans à 74 % chez celles de 45–49 ans. Parmi les hommes, ces pourcentages passent respectivement de 84 % à 33 % pour les maisons et de 88 % à 43 % pour les terres.

- Disposer d'un titre de propriété, que ce soit pour une maison ou de la terre, est plus courant en milieu urbain qu'en milieu rural. En effet, près de la moitié (45 %) des femmes en milieu urbain contre seulement 6 % en milieu rural possèdent une maison avec un titre de propriété comportant leur nom. Parmi les hommes, les pourcentages sont de 33 % en milieu urbain contre 13 % en milieu rural.

- Le pourcentage de femmes et d'hommes possédant une maison ou des terres qui disposent d'un titre de propriété pour ces biens et sur lequel figure leur nom a tendance à augmenter avec l'âge. En effet, 7 % des femmes âgées de 15–19 ans possèdent une maison et ont un document prouvant cette possession contre 23 % pour celles de 45–49 ans. De même, le pourcentage passe de 2 % parmi les hommes de 15–19 ans à 25 % à 45–49 ans.

- Les pourcentages de femmes et d'hommes possédant une maison ou des terres et qui disposent de document prouvant qu'ils sont légalement propriétaires ont tendance à augmenter avec le quintile de bien-être économique, passant, chez les femmes, pour la possession d'une maison de 1 % dans le quintile le plus bas à 46 % dans le plus élevé et parmi les hommes, respectivement de 4 % à 38 %. Pour la possession des terres, ce pourcentage passe chez les femmes de moins d'un pour cent dans le quintile le plus bas à 51 % dans le plus élevé et parmi les hommes, respectivement de 2 % à 42 %.

15.4.2 Possession et utilisation de téléphones portables et de comptes bancaires

Utilisation de comptes bancaires ou utilisation de téléphone portable pour des transactions financières. Les enquêtés qui possèdent et utilisent un compte bancaire ou qui ont utilisé un téléphone portable pour des transactions financières au cours des 12 derniers mois avant l'enquête.

Échantillon : Femmes et hommes e 15–49 ans

Près de sept femmes de 15-49 an sur dix (66 %) possèdent un téléphone portable ; parmi les hommes de 15-49 ans, ce pourcentage est de 87 %. Les pourcentages de ceux qui possèdent un smartphone sont respectivement de 44 % et 64 % (**Tableau 15.6.1**, **Tableau 15.6.2** et **Graphique 15.3**). Parmi les femmes, 39 % avaient utilisé un téléphone portable pour effectuer des transactions financières au cours des 12 mois précédant l'enquête. Parmi les hommes, ce pourcentage est plus élevé (67 %). En outre, seulement 4 % des femmes de 15–49 ans possèdent et utilisent un compte bancaire contre 12 % parmi les hommes de la même tranche d'âge. Au cours des 12 derniers mois, 3 % des femmes et 10 % des hommes de 15–49 ans ont déposé ou retiré de l'argent de leur propre compte bancaire. Le pourcentage d'hommes de 15–49 ans qui possèdent et utilisent un compte bancaire ou qui ont utilisé un téléphone portable pour effectuer des transactions financières au cours des 12 derniers mois est beaucoup plus élevé que celui des femmes (68 % contre 40 %).

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- La possession d'un compte bancaire et l'utilisation d'un téléphone portable au cours des 12 derniers mois pour effectuer des transactions financières sont plus fréquentes parmi les femmes dans les régions de Koulikoro (46 %) et Kayes (38 %) et plus faibles dans les régions de Tombouctou (17 %) et Gao (18 %). Parmi les hommes, ce pourcentage est plus élevé dans les régions de Kayes (71 %) et Mopti (70 %) et dans le district de Bamako (83 %) qu'à Gao (39 %).

- La possession et l'utilisation d'un compte bancaire ainsi que la possession d'un téléphone portable sont plus répandues en milieu urbain que rural, aussi bien chez les femmes que chez les hommes : en milieu urbain, 80 % des femmes et 91 % des hommes possèdent un téléphone portable contre respectivement 61 % et 85 % en milieu rural. De même, en milieu urbain, 8 % des femmes et 21 % des hommes disposent d'un compte bancaire et l'utilisent contre respectivement 2 % et 8 % en milieu rural.

- Les pourcentages de femmes et d'hommes qui possèdent et qui utilisent un compte bancaire ou qui ont utilisé un téléphone portable pour effectuer des transactions financières au cours des 12 derniers mois augmentent avec le niveau d'instruction, passant, parmi les femmes, de 32 % parmi celles sans niveau d'instruction à 59 % parmi celles ayant le niveau secondaire ou plus et, parmi les hommes, de respectivement 64 % à 75 %.

- Du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, les pourcentages de femmes et d'hommes qui possèdent et qui utilisent un compte bancaire ou qui ont utilisé un téléphone portable pour effectuer des transactions financières au cours des 12 derniers mois augmentent passant, parmi les femmes, de 32 % à 59 % et parmi les hommes de respectivement 55 % à 84 %.

15.5 PARTICIPATION À LA PRISE DE DÉCISION

Participation aux principales décisions du ménage

On considère que les femmes participent dans la prise de décision du ménage si elles décident seules ou ensemble avec leur conjoint dans les trois domaines suivants : (1) les propres soins de santé de la femme, (2) les achats importants du ménage et (3) les visites à la famille ou aux parents de la femme.

Échantillon : Femmes de 15–49 ans actuellement en union

On considère que les hommes participent dans la prise de décision du ménage s'ils prennent des décisions seuls ou ensemble avec leur conjoint dans les deux domaines suivants : (1) les soins de santé de l'homme, (2) les achats importants du ménage.

Échantillon : Hommes de 15–49 ans actuellement en union

Pour évaluer le rôle et le niveau d'implication des femmes et des hommes dans les prises de décision au niveau du ménage, on a demandé aux enquêtés, quelle était la personne qui avait le dernier mot dans la prise de certaines décisions. Les questions adressées aux femmes de 15–49 ans en union portaient sur trois sujets : les décisions concernant leurs soins de santé, les achats importants pour le ménage et les visites à la famille ou aux parents de la femme.

Les résultats du **Tableau 15.7** montrent qu'au Mali, il n'est pas courant que les femmes prennent, principalement, certaines décisions au niveau du ménage. Même pour leurs propres soins de santé, la décision est prise principalement par l'homme dans 80 % des cas. D'après les femmes, quand il s'agit de décision concernant les achats importants pour le ménage, c'est l'homme qui décide principalement dans 74 % des cas, la femme n'étant impliquée dans cette décision que dans 21 % des cas. Même s'il décide principalement dans 65 % des cas, on note que l'implication de l'homme dans la prise de décision concernant les visites de la femme à sa famille ou à ses parents est moins importante puisque dans 32 % des cas, la femme est associée à cette prise de décision (**Graphique 15.4**).

Une femme de 15–49 ans actuellement en union sur dix (10 %) a déclaré participer (seule ou avec son conjoint) à la prise des 3 décisions citées précédemment. À l'opposé, 60 % des femmes n'ont été associées à la prise d'aucune de ces décisions (**Tableau 15.8.1** et **Graphique 15.5**).

Le **Tableau 15.8.2** montre que les hommes sont davantage impliqués dans la prise de décision que les femmes. En effet, environ neuf hommes de 15–49 ans sur dix (89 %) ont principalement pris les décisions concernant leurs propres soins de santé et 84 % des décisions concernant les achats importants du ménage. Dans l'ensemble, 82 % des hommes de 15–49 ans actuellement en union ont participé à la prise des 2 décisions et seulement 9 % n'ont été associés à la prise d'aucune décision.

Graphique 15.4 Participation des femmes dans la prise de décision

Pourcentage de femmes de 15–49 ans actuellement en union qui ont participé à la prise de certaines décisions



Graphique 15.5 Autonomisation des femmes

Répartition (en %) des femmes de 15–49 ans actuellement en union



Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

Participation des femmes dans la prise de décision selon certaines caractéristiques

- Le pourcentage de femmes de 15–49 ans, actuellement en union, impliquées seules ou conjointement dans la prise des trois décisions augmente avec l'âge, passant de 7 % à 15–19 ans à 16 % à 40–44 ans.
- Les femmes ayant travaillé au cours des 12 derniers mois et qui ont été rémunérées en argent sont plus fréquemment impliquées dans la prise des trois décisions (13 % contre 6 % parmi celles qui n'ont pas travaillé et 12 % parmi celles dont le travail n'a pas été rémunéré en argent).
- Les femmes du milieu urbain (15 %), surtout celles résidant dans le district de Bamako (17 %), sont plus fréquemment impliquées dans la prise des trois décisions que celles du milieu rural (9 %).
- L'implication des femmes dans la prise de décision varie entre les régions, de 17 % à Tombouctou à 14 % à Mopti et 13 % à Ségou. Par contre, ce pourcentage est nettement plus faible à Koulikoro (7 %), Sikasso et Gao (8 % dans les deux cas).

- Le pourcentage de femmes impliquées dans la prise des trois décisions augmente avec le niveau d'instruction passant de 9 % parmi celles n'ayant aucun niveau d'instruction à 13 % parmi celles qui ont le niveau secondaire ou plus.
- Le pourcentage de femmes ayant participé aux trois décisions augmente avec le quintile de bien-être économique passant de 9 % dans le quintile le plus bas à 15 % dans le quintile le plus élevé.

Participation des hommes dans la prise de décision selon certaines caractéristiques

- Le pourcentage des hommes impliqués seuls ou conjointement dans la prise des deux décisions augmente avec l'âge, passant de 61 % à 20–24 ans à 90 % à 40–44 ans.
- Les hommes ayant travaillé au cours des 12 derniers mois et qui ont été rémunérés en argent sont plus fréquemment impliqués dans la prise des deux décisions (85 % contre 70 % parmi ceux qui n'ont pas travaillé et 75 % parmi ceux dont le travail n'a pas été rémunéré en argent).
- Les hommes du milieu urbain (89 %) sont plus fréquemment impliqués dans la prise des deux décisions que ceux du milieu rural (80 %).
- Le pourcentage d'hommes ayant participé aux deux décisions augmente avec le quintile de bien-être économique passant de 75 % dans le quintile le plus bas à 90 % dans le quintile le plus élevé.

15.6 OPINION CONCERNANT LE FAIT DE BATTRE SON ÉPOUSE/PARTENAIRE

Opinion concernant le fait de battre son épouse/partenaire

On a demandé aux femmes et aux hommes enquêtés s'ils pensaient qu'il était justifié qu'un homme batte son épouse ou partenaire dans les situations suivantes : elle brûle la nourriture, elle se dispute avec lui, elle sort sans le prévenir, elle néglige les enfants et elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui. Si les enquêtés répondent « oui » à, au moins, l'une de ces situations, on considère qu'ils justifient le recours à la violence contre leur conjoint.

Échantillon : Femmes et hommes de 15–49 ans

Pour évaluer le degré d'acceptation de la violence conjugale, on a demandé aux femmes et aux hommes s'ils pensent qu'il est justifié que, pour certaines raisons citées, un homme batte sa femme. Ces raisons, au nombre de cinq, sont les suivantes : sortir sans le lui dire, négliger les enfants, argumenter avec lui, refuser d'avoir des rapports sexuels avec lui et brûler la nourriture.

Près de sept femmes de 15–49 ans sur dix (69 %) pensent que pour, au moins une des raisons citées, il est justifié qu'un homme frappe ou batte sa femme. Pour près de six femmes sur dix (58 %), argumenter avec son époux /partenaire justifie le recours à la violence conjugale. Le refus de rapports sexuels à son époux est une justification de la violence conjugale pour 55 % des femmes. Près de la moitié des femmes (48 %) pensent qu'il est justifié qu'un homme frappe sa femme quand elle néglige les enfants. Vingt-quatre pour cent des femmes considèrent que brûler la nourriture est une raison suffisante qui justifie qu'un homme batte sa femme (**Tableau 15.9.1**).

Le **Tableau 15.9.2** présente les résultats concernant l'opinion des hommes. En effet, 40 % des hommes de 15–49 ans considèrent que, pour au moins une des cinq raisons citées, il est justifié qu'un homme frappe ou batte sa femme. Tout comme chez les femmes, le fait que la femme argumente avec son époux/partenaire est la raison qui a été la plus fréquemment citée par les hommes pour justifier le recours à la violence conjugale (27 %). Les hommes justifient ce comportement dans 14 % des cas quand la femme brûle la nourriture (**Graphique 15.6**).

Graphique 15.6 **Opinion concernant le fait de battre sa femme**

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans qui pensent qu'il est justifié que, pour des raisons spécifiques, un homme batte sa femme



Tendances : Entre 2018 et 2023–2024, le pourcentage de femmes qui pensent que pour, au moins une des cinq raisons, il est justifié qu'un homme batte sa femme a diminué, passant de 79 % à 69 %. Même constat chez les hommes de 15–49 ans, le pourcentage passant de 47 % à 40 %.

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans pour qui le recours à la violence conjugale est justifié, pour au moins une raison, est plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain (72 % contre 61 % parmi les femmes et 42 % contre 37 % parmi les hommes).
- L'acceptabilité de la violence conjugale varie avec le statut matrimonial : elle est plus élevée parmi les femmes actuellement en union (72 %) que parmi les célibataires (60 %) ou que les femmes en rupture d'union (62 %). Parmi les hommes, c'est chez les célibataires que l'on note le pourcentage le plus élevé de ceux qui justifient ce type de comportement conjugal (44 % contre 38 % parmi ceux actuellement en union).
- Le pourcentage de femmes et d'hommes pour qui le recours à la violence conjugale est justifié, pour au moins une raison, diminue avec le niveau d'instruction, passant chez les femmes de 74 % parmi celles sans niveau d'instruction à 60 % parmi celles ayant le niveau secondaire ou plus. Chez les hommes ce pourcentage passe respectivement de 42 % à 37 %.
- Du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, le pourcentage de femmes et d'hommes qui pensent qu'il est justifié de battre son épouse ou partenaire pour, au moins, une raison diminue, passant chez les femmes de 78 % à 57 % et chez les hommes, de 48 % à 37 %.
- Dans les régions, on constate que le pourcentage de femmes et d'hommes pour qui le recours à la violence conjugale est justifié, pour au moins une raison, est plus élevé à Sikasso chez les femmes (83 %) et à Ségou chez les hommes (49 %) et plus faible à Tombouctou chez les femmes (44 %) et à Gao chez les hommes (11 %).

15.7 NÉGOCIATION DES RAPPORTS SEXUELS

Pour évaluer les attitudes concernant la négociation de pratiques sexuelles à moindre risque entre conjoints, on a demandé aux femmes et aux hommes s'ils pensaient qu'une femme est en droit de refuser d'avoir des rapports sexuels avec son mari/partenaire si elle sait qu'il a des rapports avec d'autres femmes

ou de demander qu'il utilise un préservatif si elle sait qu'il a une infection sexuellement transmissible (IST).

Il ressort que plus de la moitié des femmes (53 %) et 64 % des hommes de 15–49 ans pensent qu'il est justifié qu'une femme demande à ce qu'un condom soit utilisé au cours des rapports sexuels si elle sait que son mari/partenaire a une IST. En outre, 21 % des femmes et 31 % des hommes pensent qu'il est justifié qu'une femme refuse d'avoir des relations sexuelles avec son mari si elle sait qu'il a des relations sexuelles avec d'autres femmes (**Tableau 15.10**).

Le pourcentage de femmes qui pensent qu'il est justifié qu'une femme demande à ce qu'un condom soit utilisé au cours des rapports sexuels quand le mari/partenaire a une IST est plus élevé en milieu urbain (65 %) qu'en milieu rural (49 %). La même tendance s'observe parmi les hommes (70 % contre 61 %).

L'adoption de comportements sexuels à moindre risque varie selon le niveau d'instruction : 19 % des femmes n'ayant aucun niveau d'instruction contre 25 % des femmes ayant le niveau secondaire ou plus justifient le refus de rapports sexuels dans le cas où le mari/partenaire a des rapports sexuels avec d'autres femmes. De même, 49 % des femmes n'ayant aucun niveau d'instruction contre 61 % parmi celles ayant le niveau secondaire ou plus pensent qu'il est justifié qu'une femme demande l'utilisation de condom au cours des rapports sexuels quand le mari/partenaire a une IST.

Le pourcentage de femmes qui justifient l'utilisation du condom au cours des rapports sexuels dans le cas où le mari/partenaire a une IST augmente du quintile le plus bas au plus élevé, passant de 50 % à 61 %. On observe la même tendance chez les hommes, le pourcentage passant respectivement de 55 % à 73 %.

Pour évaluer la capacité des femmes à négocier véritablement des rapports sexuels à moindre risque avec leur mari, on a demandé aux femmes si elles pouvaient dire « non » à leur mari si elles ne voulaient pas avoir de rapports sexuels. On a également demandé aux femmes si elles pouvaient demander à leur mari d'utiliser un préservatif.

Dix-huit pour cent des femmes ont déclaré qu'elles pouvaient refuser des rapports sexuels à leur mari/partenaire si elles ne souhaitaient pas en avoir et 22 % ont déclaré qu'elles pouvaient demander à leur mari/partenaire d'utiliser un condom si elles le souhaitent (**Tableau 15.11**).

Les proportions de femmes ayant déclaré pouvoir refuser des rapports sexuels à leur mari/partenaire ou pouvoir lui demander d'utiliser un condom sont plus élevées en milieu urbain qu'en milieu rural (respectivement 22 % contre 17 % et 29 % contre 20 %). Ces proportions augmentent avec le niveau d'instruction de la femme et avec le quintile de bien-être économique.

15.8 PARTICIPATION DES FEMMES À LA PRISE DE DÉCISIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ SEXUELLE ET DE REPRODUCTION

Prise de décisions éclairées concernant les relations sexuelles, l'utilisation de contraceptifs et la santé reproductive

On considère que les femmes prennent leurs propres décisions en toute connaissance de cause sur les relations sexuelles, l'utilisation de contraceptifs et la santé reproductive si : (1) elles peuvent dire « non » à leur mari/partenaire si elles ne veulent pas avoir de rapports sexuels, (2) elles prennent des décisions sur l'utilisation de la planification familiale seules ou ensemble avec leur mari/partenaire, et (3) elles prennent des décisions sur leurs propres soins de santé seules ou ensemble avec leur mari/partenaire.

Échantillon : Femmes de 15–49 ans actuellement en union

Le résultat du **Tableau 15.12** montre que seulement 3 % des femmes de 15–49 ans en union prennent leurs propres décisions concernant les relations sexuelles, l'utilisation de la contraception et les soins de santé reproductive (**Tableau 15.12**).

Le pourcentage de femmes qui prennent ces décisions d'elles-mêmes de manière informée a tendance à augmenter avec l'âge, passant de 1 % parmi les 15–19 ans à 4 % parmi les 45–49 ans.

Parmi les femmes ayant le niveau secondaire ou plus, seulement 5 % prennent des décisions éclairées en ce qui concerne leur vie reproductive contre 3 % parmi celles ayant le niveau primaire et 2 % parmi celles n'ayant aucun niveau d'instruction (**Graphique 15.7**).

Les femmes ayant travaillé au cours des 12 derniers mois et qui ont été rémunérées en argent prennent fréquemment plus des décisions concernant les relations sexuelles, l'utilisation de la contraception et les soins de santé reproductive (4 %) contre 2 % parmi celles qui n'ont pas travaillé ou dont le travail n'a pas été rémunéré en argent.

Graphique 15.7 Participation des femmes à la prise de décision en matière de santé sexuelle et de procréation par niveau d'instruction

Pourcentage de femmes actuellement en union qui prennent leurs propres décisions informées sur les rapports sexuels, l'utilisation de contraceptifs et la santé génésique



Les résultats montrent aussi que le pourcentage de femmes qui prennent des décisions en matière de santé reproductive est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural (5 % contre 3 %).

Ce pourcentage est plus faible dans les régions de Mopti (1 %) et Sikasso (2 %) que dans les régions de Tombouctou (5 %) et le district de Bamako (6 %) ou les femmes prennent plus fréquemment des décisions informées en matière de relations sexuelles, d'utilisation de la contraception et de soins de santé reproductive.

Du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, le pourcentage de femmes qui décident de manière éclairée de leur santé reproductive augmente, passant de 2 % à 5 %.

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur l'autonomisation des femmes, voir les tableaux suivants :

- **Tableau 15.1 Emploi et type de rémunération des femmes et des hommes actuellement en union**
- **Tableau 15.2.1 Contrôle de l'utilisation de l'argent gagné par les femmes et importance de l'argent gagné par les femmes par rapport à celui gagné par leur conjoint**
- **Tableau 15.2.2 Contrôle de l'argent gagné par les hommes**
- **Tableau 15.3.1 Possession de maison et de terre : Femme**
- **Tableau 15.3.2 Possession de maison et de terre : Homme**
- **Tableau 15.4.1 Possession de maison et documents prouvant la propriété : Femme**
- **Tableau 15.4.2 Possession de maison et documents prouvant la propriété : Homme**
- **Tableau 15.5.1 Possession de terres et documents prouvant la propriété : Femme**
- **Tableau 15.5.2 Possession de terres et documents prouvant la propriété : Homme**
- **Tableau 15.6.1 Possession et utilisation de téléphone portable et de compte bancaire : Femme**
- **Tableau 15.6.2 Possession et utilisation de téléphone portable et de comptes bancaire : Homme**
- **Tableau 15.7 Participation dans la prise de décision**
- **Tableau 15.8.1 Participation des femmes dans la prise de décision selon certaines caractéristiques sociodémographiques**
- **Tableau 15.8.2 Participation des hommes dans la prise de décision selon certaines caractéristiques sociodémographiques**
- **Tableau 15.9.1 Opinion des femmes concernant le fait qu'un mari batte sa femme**
- **Tableau 15.9.2 Opinion des hommes concernant le fait qu'un mari batte sa femme**
- **Tableau 15.10 Opinions concernant la négociation de rapports sexuels sans risque avec le mari/partenaire**
- **Tableau 15.11 Capacité des femmes à négocier les rapports sexuels avec leur mari**
- **Tableau 15.12 Participation des femmes dans la prise de décision concernant la santé sexuelle et reproductive**

Tableau 15.1 Emploi et type de rémunération des femmes et des hommes actuellement en union

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans, actuellement en union, ayant travaillé à n'importe quel moment, au cours des 12 derniers mois et répartition (en %) des femmes et des hommes actuellement en union et ayant travaillé au cours des 12 derniers mois par type de rémunération, selon l'âge, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Parmi les enquêtés actuellement en union :		Répartition des enquêtés actuellement en union ayant travaillé au cours des 12 derniers mois par type de rémunération					
Âge	Pourcentage ayant travaillé au cours des 12 derniers mois	Effectif d'enquêtés	Argent uniquement	Argent et en nature	En nature seulement	Non rémunéré	Total	Effectif d'enquêtés
				FEMME				
15–19	46,3	1 241	59,1	11,0	5,2	24,7	100,0	575
20–24	56,8	2 592	66,3	12,9	2,8	18,0	100,0	1 471
25–29	64,1	2 677	70,0	11,7	2,8	15,5	100,0	1 715
30–34	71,9	2 243	70,0	14,4	1,5	14,1	100,0	1 614
35–39	72,1	1 935	68,0	15,0	2,7	14,4	100,0	1 396
40–44	76,6	1 472	71,7	13,8	1,9	12,5	100,0	1 127
45–49	74,5	1 077	67,3	16,3	2,8	13,6	100,0	802
Ensemble 15–49	65,7	13 237	68,3	13,6	2,6	15,5	100,0	8 700
				HOMME				
15–19	*	7	*	*	*	*	100,0	7
20–24	98,1	175	49,8	9,6	1,6	39,0	100,0	172
25–29	98,0	578	62,0	9,9	1,8	26,3	100,0	567
30–34	98,7	794	65,8	10,7	1,4	22,0	100,0	784
35–39	97,8	753	63,6	13,1	3,3	20,0	100,0	737
40–44	98,2	648	68,7	10,2	2,1	18,9	100,0	636
45–49	98,0	557	60,3	15,0	3,0	21,7	100,0	545
Ensemble 15–49	98,2	3 512	63,6	11,7	2,3	22,5	100,0	3 448
50–64	93,4	1 121	59,8	16,2	4,4	19,6	100,0	1 047
Ensemble 15–64	97,0	4 633	62,7	12,7	2,8	21,8	100,0	4 495

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 15.2.1 Contrôle de l'utilisation de l'argent gagné par les femmes et importance de l'argent gagné par les femmes par rapport à celui gagné par leur conjoint

Répartition (en %) des femmes de 15–49 ans, actuellement en union, qui ont gagné de l'argent pour leur travail au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête en fonction de la personne qui décide comment est utilisé l'argent gagné par la femme et répartition selon que les femmes gagnent plus ou moins que leur conjoint, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Personne qui décide comment est utilisé l'argent gagné par la femme :					Gains de la femme par rapport à ceux du conjoint :						
Caractéristique sociodémographique	Principalement la femme	Femme et conjoint ensemble	Principalement le conjoint	Autre	Total	Plus que le conjoint	Moins que le conjoint	À peu près la même chose	Le conjoint ne gagne pas d'argent	Ne sait pas	Total	Effectif de femmes
Âge												
15–19	85,6	2,7	10,2	1,5	100,0	1,9	93,5	1,9	0,4	2,2	100,0	403
20–24	85,1	4,0	10,3	0,5	100,0	2,9	93,3	2,2	0,7	0,9	100,0	1 166
25–29	87,0	3,1	9,5	0,3	100,0	3,7	91,9	2,4	0,5	1,6	100,0	1 401
30–34	89,6	1,6	8,7	0,2	100,0	5,4	88,2	3,9	0,6	2,0	100,0	1 362
35–39	86,4	4,4	9,0	0,2	100,0	8,1	84,9	4,4	1,2	1,5	100,0	1 158
40–44	89,6	3,4	7,0	0,0	100,0	10,1	78,7	5,7	2,5	3,1	100,0	964
45–49	89,2	3,4	7,4	0,0	100,0	10,5	79,6	5,5	2,6	1,8	100,0	670
Nombre d'enfants vivants												
0	86,3	3,8	8,7	1,2	100,0	4,6	89,7	3,0	0,4	2,3	100,0	424
1–2	87,0	2,6	9,7	0,7	100,0	3,3	90,9	3,6	0,6	1,5	100,0	1 934
3–4	88,3	3,0	8,6	0,1	100,0	6,1	87,6	3,4	1,0	1,9	100,0	2 233
5+	87,6	3,8	8,5	0,0	100,0	8,2	84,2	4,1	1,7	1,8	100,0	2 533
Résidence												
Bamako	92,8	0,3	6,7	0,2	100,0	7,8	85,0	5,1	0,2	1,9	100,0	1 062
Autre urbain	87,8	3,8	8,3	0,2	100,0	5,4	87,9	3,9	0,7	2,1	100,0	727
Ensemble urbain	90,7	1,7	7,4	0,2	100,0	6,9	86,2	4,6	0,4	2,0	100,0	1 789
Rural	86,5	3,7	9,4	0,3	100,0	5,7	87,8	3,3	1,4	1,7	100,0	5 335
Région												
Kayes	78,5	1,8	19,4	0,4	100,0	5,9	86,2	3,3	1,4	3,2	100,0	980
Koulikoro	90,7	1,7	7,1	0,6	100,0	4,7	89,4	3,6	1,2	1,2	100,0	1 819
Sikasso	92,4	2,3	5,2	0,1	100,0	2,6	92,5	1,3	1,7	1,8	100,0	1 392
Ségou	76,9	11,1	11,7	0,3	100,0	10,8	80,1	6,4	1,3	1,5	100,0	1 097
Mopti	93,8	2,0	4,1	0,0	100,0	6,1	90,8	2,3	0,4	0,5	100,0	664
Tombouctou	72,9	12,5	14,6	0,0	100,0	5,7	78,9	3,1	1,1	11,2	100,0	47
Gao	75,7	9,0	14,2	1,2	100,0	6,7	76,6	7,8	1,5	7,4	100,0	63
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	100,0	1
Bamako	92,8	0,3	6,7	0,2	100,0	7,8	85,0	5,1	0,2	1,9	100,0	1 062
Niveau d'instruction												
Aucun	87,2	3,9	8,7	0,2	100,0	6,2	87,1	3,3	1,4	2,0	100,0	4 211
Primaire	87,6	3,2	8,9	0,3	100,0	6,7	86,5	3,8	1,0	2,0	100,0	1 239
Secondaire ou plus	88,5	1,7	9,3	0,6	100,0	4,9	89,0	4,6	0,3	1,2	100,0	1 674

À suivre...

Tableau 15.2.1—*Suite*

Caractéristique sociodémographique	Personne qui décide comment est utilisé l'argent gagné par la femme : Principalement la femme	Femme et conjoint ensemble	Principalement le conjoint	Autre	Total	Gains de la femme par rapport à ceux du conjoint : Plus que le conjoint	Moins que le conjoint	À peu près la même chose	Le conjoint ne gagne pas d'argent	Ne sait pas	Total	Effectif de femmes
Quintile de bien-être économique												
Le plus bas	86,7	3,3	9,9	0,2	100,0	5,7	90,2	2,7	0,5	0,9	100,0	1 390
Second	86,0	4,5	9,4	0,1	100,0	4,1	89,5	2,7	2,3	1,4	100,0	1 350
Moyen	86,1	4,8	8,7	0,4	100,0	7,7	85,0	3,4	1,0	2,9	100,0	1 394
Quatrième	88,3	2,4	9,0	0,4	100,0	6,9	84,3	5,4	1,2	2,3	100,0	1 514
Le plus élevé	90,5	1,4	7,6	0,5	100,0	5,6	88,4	4,0	0,4	1,5	100,0	1 477
Ensemble	87,6	3,2	8,9	0,3	100,0	6,0	87,4	3,7	1,1	1,8	100,0	7 125

Note : Le terme conjoint inclut un partenaire avec qui une femme vit comme s'ils étaient mariés.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 15.2.2 Contrôle de l'argent gagné par les hommes

Répartition (en %) des hommes de 15–49 ans actuellement en union qui ont été rémunérés en argent et répartition (en %) des femmes de 15–49 ans actuellement en union dont le conjoint a été rémunéré en argent, en fonction de la personne qui décide comment est utilisé l'argent gagné par le conjoint, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Homme						Femme					
	Personne qui décide comment est utilisé l'argent gagné par le conjoint :						Personne qui décide comment est utilisé l'argent gagné par le conjoint :					
Caractéristique sociodémographique	Principalement la femme	Femme et conjoint ensemble	Principalement le conjoint	Autre	Total	Effectif d'hommes	Principalement la femme	Femme et conjoint ensemble	Principalement le conjoint	Autre	Total	Effectif de femmes
Âge												
15–19	*	*	*	*	100,0	6	6,6	3,2	88,1	2,1	100,0	1 232
20–24	1,8	12,1	71,9	14,1	100,0	102	5,9	5,3	86,6	2,2	100,0	2 580
25–29	3,5	9,0	81,5	6,0	100,0	408	5,0	4,5	89,0	1,5	100,0	2 668
30–34	1,0	6,7	89,3	3,0	100,0	600	6,1	4,0	88,7	1,2	100,0	2 233
35–39	1,5	5,4	90,0	3,1	100,0	565	6,2	4,6	87,5	1,7	100,0	1 921
40–44	1,1	6,2	92,4	0,4	100,0	502	5,8	4,6	88,5	1,0	100,0	1 447
45–49	4,0	8,0	87,4	0,5	100,0	411	7,1	6,3	85,5	1,2	100,0	1 056
Nombre d'enfants vivants												
0	0,9	6,3	86,6	6,2	100,0	266	6,1	4,4	87,1	2,4	100,0	1 159
1–2	1,9	8,7	85,3	4,1	100,0	774	5,9	4,6	87,8	1,7	100,0	4 024
3–4	2,1	6,5	88,4	3,1	100,0	681	5,7	4,3	88,6	1,5	100,0	3 769
5+	2,5	6,6	89,9	1,1	100,0	874	6,2	4,9	87,5	1,4	100,0	4 185
Résidence												
Bamako	0,4	14,1	84,9	0,7	100,0	488	6,9	4,1	89,0	0,0	100,0	1 551
Autre urbain	2,4	6,0	90,1	1,6	100,0	353	3,5	6,1	90,2	0,2	100,0	1 333
Ensemble urbain	1,2	10,7	87,1	1,1	100,0	841	5,3	5,0	89,6	0,1	100,0	2 884
Rural	2,4	5,5	88,1	4,0	100,0	1 754	6,1	4,5	87,4	2,0	100,0	10 252
Région												
Kayes	0,2	6,1	92,1	1,7	100,0	362	4,8	3,0	91,6	0,6	100,0	2 071
Koulikoro	2,7	4,7	89,8	2,8	100,0	569	6,2	3,0	85,0	5,9	100,0	3 102
Sikasso	1,8	8,2	82,7	7,4	100,0	489	4,9	4,0	90,8	0,3	100,0	2 532
Ségou	6,2	3,7	86,7	3,4	100,0	373	7,3	10,6	82,0	0,2	100,0	2 093
Mopti	0,4	5,9	91,9	1,8	100,0	182	7,5	2,8	89,3	0,3	100,0	1 226
Tombouctou	2,4	5,4	92,2	0,0	100,0	62	2,1	9,4	88,5	0,0	100,0	198
Gao	0,5	0,6	96,8	2,1	100,0	69	2,8	3,0	93,7	0,5	100,0	358
Kidal	†	†	†	†	100,0	2	†	†	†	†	100,0	5
Bamako	0,4	14,1	84,9	0,7	100,0	488	6,9	4,1	89,0	0,0	100,0	1 551
Niveau d'instruction												
Aucun	2,1	5,4	88,8	3,7	100,0	1 153	6,1	4,2	88,4	1,3	100,0	8 128
Primaire	1,4	5,8	88,1	4,7	100,0	481	6,1	4,9	87,5	1,5	100,0	2 147
Secondaire ou plus	2,3	9,9	86,4	1,4	100,0	960	5,5	5,6	86,4	2,5	100,0	2 862

À suivre…

Tableau 15.2.2—*Suite*

Caractéristique sociodémographique	Homme						Femme					
	Personne qui décide comment est utilisé l'argent gagné par le conjoint :						Personne qui décide comment est utilisé l'argent gagné par le conjoint :					
	Principalement la femme	Femme et conjoint ensemble	Principalement le conjoint	Autre	Total	Effectif d'hommes	Principalement la femme	Femme et conjoint ensemble	Principalement le conjoint	Autre	Total	Effectif de femmes
Quintile de bien-être économique												
Le plus bas	1,8	8,1	84,3	5,8	100,0	381	6,0	3,9	89,9	0,2	100,0	2 710
Second	1,9	7,5	85,7	4,8	100,0	424	6,8	4,7	87,1	1,3	100,0	2 709
Moyen	1,9	4,5	89,7	3,9	100,0	458	5,6	5,0	87,5	1,8	100,0	2 666
Quatrième	2,1	4,4	91,6	1,9	100,0	641	5,8	3,8	87,8	2,7	100,0	2 619
Le plus élevé	2,2	10,7	86,2	0,9	100,0	691	5,4	5,7	86,8	2,1	100,0	2 431
Ensemble 15–49	2,0	7,2	87,8	3,0	100,0	2 594	5,9	4,6	87,8	1,6	100,0	13 136
50–64	2,2	6,8	91,0	0,0	100,0	796	na	na	na	na	na	na
Ensemble 15–64	2,1	7,1	88,5	2,3	100,0	3 390	na	na	na	na	na	na

na = non applicable
Note : Le terme conjoint inclut un partenaire avec qui une femme vit comme s'ils étaient mariés, et le terme femme inclut une partenaire avec qui un homme vit comme s'ils étaient mariés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 15.3.1 Possession de maison et de terre : Femme

Répartition (en %) des femmes de 15–49 ans selon qu'elles possèdent, ou non, une maison et des terres, en fonction de leur état matrimonial actuel, EDSM-VII Mali 2023–2024

	État matrimonial				
Type de possession	Célibataire	Mariée/vivant ensemble	Divorcée/ séparée	Veuve	Total
POSSESSION DE MAISON					
Seule	0,9	2,9	5,9	14,3	2,7
En commun avec conjoint seulement	na	5,5	0,3	0,0	4,2
En commun avec quelqu'un d'autre seulement	2,8	1,4	1,9	7,2	1,8
En commun avec conjoint et quelqu'un d'autre	na	6,9	0,0	0,4	5,3
Seule et en commun	0,2	0,2	0,2	1,1	0,2
N'en possède pas	96,1	83,1	91,7	77,0	85,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes	3 585	13 237	276	249	17 347
POSSESSION DE TERRE					
Seule	0,7	10,6	3,2	11,2	8,4
En commun avec conjoint seulement	na	3,1	0,0	0,1	2,4
En commun avec quelqu'un d'autre seulement	1,4	1,5	1,0	3,7	1,5
En commun avec conjoint et quelqu'un d'autre	na	4,2	0,0	0,4	3,2
Seule et en commun	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2
N'en possède pas	97,9	80,5	95,9	84,5	84,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes	3 585	13 237	276	249	17 347

Note : Le terme conjoint inclut un partenaire avec qui une femme vit comme s'ils étaient mariés.
na = non applicable

Tableau 15.3.2 Possession de maison et de terre : Homme

Répartition (en %) des hommes de 15–49 ans selon qu'ils possèdent, ou non, une maison et des terres, en fonction de leur état matrimonial actuel, EDSM-VII Mali 2023–2024

Type de possession	État matrimonial				Total
	Célibataire	Marié/vivant ensemble	Divorcé/ séparé	Veuf	
POSSESSION DE MAISON					
Seule	2,3	27,8	(9,3)	*	15,7
En commun avec conjoint seulement	na	1,0	(1,9)	*	0,5
En commun avec quelqu'un d'autre seulement	13,6	22,5	(21,0)	*	18,3
En commun avec conjoint et quelqu'un d'autre	na	1,3	(0,0)	*	0,7
Seule et en commun	1,0	5,1	(0,9)	*	3,2
N'en possède pas	83,1	42,3	(66,9)	*	61,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif d'hommes	3 127	3 512	40	7	6 686
POSSESSION DE TERRE					
Seule	1,4	17,6	(11,5)	*	10,0
En commun avec conjoint seulement	na	0,6	(0,0)	*	0,3
En commun avec quelqu'un d'autre seulement	11,0	23,5	(5,6)	*	17,5
En commun avec conjoint et quelqu'un d'autre	na	1,2	(0,0)	*	0,6
Seule et en commun	1,1	5,0	(0,9)	*	3,2
N'en possède pas	86,4	52,1	(82,1)	*	68,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif d'hommes	3 127	3 512	40	7	6 686

Note : Le terme femme inclut la partenaire avec qui un homme vit comme s'ils étaient mariés. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
na = non applicable

Tableau 15.4.1 Possession de maison et documents prouvant la propriété : Femme

Répartition (en %) des femmes de 15–49 ans par possession de maison ; parmi les femmes possédant une maison, répartition (en %) selon que la maison a un titre de propriété et que le nom de la femme y figure, ou non, en fonction de certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Pourcentage possédant une maison :						La maison a un titre de propriété[1] et :					
Caractéristique sociodémographique	Seule	En commun[2]	Seule et en commun	Pourcentage ne possédant pas de maison	Total	Effectif de femmes	Le nom de la femme figure sur le titre[1]	Le nom de la femme ne figure pas sur le titre[1]	N'a pas de titre de propriété[1]	Ne sait pas[3]	Total	Effectif de femmes possédant une maison[4]
Âge												
15–19	0,7	5,2	0,1	94,0	100,0	3 862	6,6	12,6	73,8	7,0	100,0	234
20–24	1,0	10,7	0,2	88,1	100,0	3 378	9,0	8,6	75,3	7,1	100,0	402
25–29	2,4	12,9	0,1	84,6	100,0	2 905	11,3	10,2	72,5	6,1	100,0	447
30–34	3,3	11,7	0,3	84,7	100,0	2 382	15,4	12,8	65,7	6,1	100,0	364
35–39	4,0	13,7	0,1	82,2	100,0	2 065	16,6	11,8	67,7	3,9	100,0	367
40–44	6,2	15,8	0,4	77,7	100,0	1 586	19,8	10,7	65,5	4,0	100,0	354
45–49	6,8	17,7	0,4	75,1	100,0	1 169	23,4	10,8	62,5	3,3	100,0	291
Résidence												
Bamako	2,9	9,4	0,3	87,5	100,0	2 675	52,5	30,0	4,7	12,8	100,0	335
Autre urbain	3,1	5,8	0,2	90,9	100,0	2 048	30,9	17,4	49,3	2,3	100,0	186
Ensemble urbain	3,0	7,8	0,2	89,0	100,0	4 723	44,8	25,5	20,6	9,1	100,0	522
Rural	2,6	12,6	0,2	84,7	100,0	12 624	6,4	7,0	82,3	4,4	100,0	1 937
Région												
Kayes	2,2	22,1	0,3	75,4	100,0	2 635	3,5	3,2	92,7	0,6	100,0	648
Koulikoro	2,9	11,2	0,1	85,7	100,0	4 018	10,7	14,1	62,3	12,9	100,0	575
Sikasso	2,1	7,2	0,0	90,7	100,0	3 143	10,1	3,7	85,0	1,2	100,0	292
Ségou	1,7	14,2	0,1	83,9	100,0	2 574	5,3	4,7	89,4	0,6	100,0	413
Mopti	2,8	1,7	0,2	95,3	100,0	1 530	34,8	7,4	56,2	1,6	100,0	72
Tombouctou	1,0	11,9	0,1	87,0	100,0	281	17,6	57,5	24,9	0,0	100,0	37
Gao	11,3	4,5	2,0	82,2	100,0	485	15,2	11,2	68,8	4,7	100,0	86
Kidal	†	†	†	†	100,0	6	†	†	†	†	100,0	0
Bamako	2,9	9,4	0,3	87,5	100,0	2 675	52,5	30,0	4,7	12,8	100,0	335
Niveau d'instruction												
Aucun	2,5	13,1	0,2	84,2	100,0	9 382	8,5	8,2	79,3	4,0	100,0	1 481
Primaire	2,2	11,0	0,2	86,6	100,0	2 926	14,1	9,0	73,2	3,7	100,0	391
Secondaire ou plus	3,3	8,1	0,2	88,4	100,0	5 039	30,1	19,0	41,0	9,9	100,0	586
Quintile de bien-être économique												
Le plus bas	2,5	18,0	0,1	79,4	100,0	3 036	1,4	1,9	94,3	2,4	100,0	627
Second	1,9	14,8	0,0	83,3	100,0	3 143	1,0	4,3	93,3	1,4	100,0	525
Moyen	2,3	10,3	0,3	87,1	100,0	3 318	8,7	9,3	78,0	4,0	100,0	427
Quatrième	2,7	6,5	0,2	90,6	100,0	3 676	17,8	17,4	56,2	8,6	100,0	346
Le plus élevé	3,7	8,8	0,3	87,2	100,0	4 174	45,9	25,2	17,2	11,7	100,0	533
Ensemble	2,7	11,3	0,2	85,8	100,0	17 347	14,5	10,9	69,2	5,4	100,0	2 458

[1] Un titre de propriété ou un document reconnu par le gouvernement
[2] En commun avec le conjoint, en commun avec quelqu'un d'autre ou en commun avec le mari et quelqu'un d'autre
[3] Y compris les femmes qui ont une maison avec un titre de propriété ou un autre document reconnu par le gouvernement mais qui ne savent pas si leur nom figure sur le titre et les femmes qui ne savent pas s'il y a un titre de propriété ou un document reconnu par le gouvernement
[4] Y compris les femmes qui possèdent une maison, seules, en commun avec leur conjoint seulement, en commun avec quelqu'un d'autre seulement, en commun avec leur conjoint et quelqu'un d'autre ou seules et en commun
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 15.4.2 Possession de maison et documents prouvant la propriété : Homme

Répartition (en %) des hommes de 15–49 ans par possession de maison ; parmi les hommes possédant une maison, répartition (en %) selon que la maison a un titre de propriété et que le nom de l'homme y figure, ou non, en fonction de certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Pourcentage possédant une maison :						La maison a un titre de propriété[1] et:					
Caractéristique sociodémographique	Seule	En commun[2]	Seule et en commun	Pourcentage ne possédant pas de maison	Total	Effectif d'hommes	Le nom de l'homme figure sur le titre[1]	Le nom de l'homme ne figure pas sur le titre[1]	N'a pas de titre de propriété[1]	Ne sait pas[3]	Total	Effectif d'hommes possédant une maison[4]
Âge												
15–19	1,3	13,2	1,1	84,4	100,0	1 669	2,1	21,2	70,2	6,4	100,0	260
20–24	3,7	15,0	1,1	80,2	100,0	1 165	6,8	26,0	62,6	4,6	100,0	231
25–29	12,5	19,9	3,3	64,3	100,0	930	9,0	19,7	70,1	1,3	100,0	332
30–34	18,4	23,9	6,2	51,5	100,0	909	14,3	19,5	65,6	0,6	100,0	440
35–39	30,1	25,3	4,0	40,6	100,0	784	25,1	9,1	64,3	1,5	100,0	465
40–44	36,9	27,0	5,3	30,8	100,0	663	22,5	9,2	67,8	0,5	100,0	459
45–49	39,3	23,4	4,6	32,7	100,0	568	25,0	7,0	67,9	0,1	100,0	382
Résidence												
Bamako	5,8	21,4	0,4	72,5	100,0	1 177	27,2	35,1	33,4	4,3	100,0	324
Autre urbain	12,5	10,0	0,8	76,7	100,0	795	42,6	21,2	31,3	4,9	100,0	186
Ensemble urbain	8,5	16,8	0,6	74,2	100,0	1 971	32,8	30,0	32,6	4,5	100,0	509
Rural	18,8	20,7	4,2	56,3	100,0	4 714	12,7	10,9	75,3	1,0	100,0	2 060
Région												
Kayes	14,8	17,7	0,5	67,0	100,0	920	16,0	10,0	73,2	0,8	100,0	304
Koulikoro	12,8	23,0	3,8	60,4	100,0	1 637	20,6	15,5	63,2	0,7	100,0	649
Sikasso	17,6	14,3	0,9	67,2	100,0	1 215	16,0	6,0	75,1	2,9	100,0	398
Ségou	19,8	29,5	8,0	42,6	100,0	939	6,8	16,9	75,7	0,7	100,0	539
Mopti	25,5	9,6	6,6	58,2	100,0	505	13,6	3,1	83,0	0,3	100,0	211
Tombouctou	42,9	6,0	0,2	50,9	100,0	128	24,3	0,7	74,9	0,1	100,0	63
Gao	33,7	5,4	11,5	49,5	100,0	163	18,2	13,5	59,6	8,6	100,0	82
Kidal	†	†	†	†	100,0	2	†	†	†	†	100,0	0
Bamako	5,8	21,4	0,4	72,5	100,0	1 177	27,2	35,1	33,4	4,3	100,0	324
Niveau d'instruction												
Aucun	24,1	20,3	4,0	51,6	100,0	2 476	13,2	6,2	79,6	0,9	100,0	1 199
Primaire	13,4	20,6	3,8	62,2	100,0	1 352	16,2	14,0	67,8	2,0	100,0	511
Secondaire ou plus	9,6	18,4	2,1	69,9	100,0	2 858	21,9	26,9	48,5	2,6	100,0	859
Quintile de bien-être économique												
Le plus bas	19,7	26,6	5,1	48,6	100,0	1 179	3,5	3,4	92,5	0,6	100,0	606
Second	20,7	22,0	4,7	52,5	100,0	1 174	5,2	6,0	88,1	0,7	100,0	557
Moyen	20,2	19,3	5,2	55,4	100,0	1 190	12,0	11,1	74,6	2,4	100,0	531
Quatrième	12,1	14,0	1,2	72,6	100,0	1 446	33,6	23,8	41,1	1,5	100,0	396
Le plus élevé	9,5	17,7	1,0	71,8	100,0	1 697	38,1	35,5	22,5	3,8	100,0	479
Ensemble 15–49	15,7	19,5	3,2	61,6	100,0	6 686	16,7	14,7	66,9	1,7	100,0	2 569
50–64	54,6	21,8	4,2	19,4	100,0	1 143	30,3	5,4	63,5	0,7	100,0	921
Ensemble 15–64	21,4	19,9	3,3	55,4	100,0	7 829	20,3	12,3	66,0	1,5	100,0	3 490

[1] Un titre de propriété ou un document reconnu par le gouvernement
[2] En commun avec une femme, en commun avec quelqu'un d'autre ou en commun avec une femme et quelqu'un d'autre
[3] Y compris les hommes qui ont une maison avec un titre de propriété ou un autre document reconnu par le gouvernement mais qui ne savent pas si leur nom figure sur le titre et les hommes qui ne savent pas s'il y a un titre de propriété ou un document reconnu par le gouvernement
[4] Y compris les hommes qui possèdent une maison, seuls, en commun avec une femme seulement, en commun avec quelqu'un d'autre seulement, en commun avec leur femme et quelqu'un d'autre ou seuls et en commun
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 15.5.1 Possession de terres et documents prouvant la propriété : Femme

Répartition (en %) des femmes de 15–49 ans par possession de terres ; parmi les femmes possédant des terres, répartition (en %) selon que la terre a un titre de propriété et que le nom de la femme y figure, ou non, en fonction de certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage possédant des terres :						Les terres ont un titre de propriété[1] et :					
	Seule	En commun[2]	Seule et en commun	Pourcentage ne possédant pas de terres	Total	Effectif de femmes	Le nom de la femme figure sur le titre[1]	Le nom de la femme ne figure pas sur le titre[1]	N'a pas de titre de propriété[1]	Ne sait pas[3]	Total	Effectif de femmes possédant des terres[4]
Âge												
15–19	2,1	2,9	0,1	94,8	100,0	3 862	3,2	0,8	91,0	4,9	100,0	200
20–24	6,2	6,8	0,2	86,8	100,0	3 378	3,5	2,3	91,0	3,3	100,0	445
25–29	8,4	7,9	0,1	83,6	100,0	2 905	4,2	4,6	90,0	1,3	100,0	476
30–34	11,0	7,2	0,1	81,7	100,0	2 382	5,4	3,0	89,9	1,8	100,0	437
35–39	13,1	8,2	0,2	78,5	100,0	2 065	5,4	1,6	90,3	2,6	100,0	444
40–44	14,7	10,3	0,2	74,8	100,0	1 586	6,3	3,0	89,2	1,5	100,0	399
45–49	14,0	11,7	0,2	74,1	100,0	1 169	8,0	2,5	88,0	1,6	100,0	303
Résidence												
Bamako	1,5	2,6	0,1	95,8	100,0	2 675	63,5	16,0	11,9	8,6	100,0	113
Autre urbain	2,6	2,5	0,2	94,8	100,0	2 048	14,9	8,7	75,6	0,8	100,0	107
Ensemble urbain	2,0	2,5	0,1	95,3	100,0	4 723	39,8	12,4	42,9	4,8	100,0	220
Rural	10,8	8,7	0,2	80,3	100,0	12 624	2,1	1,8	94,1	2,0	100,0	2 483
Région												
Kayes	9,0	11,0	0,5	79,5	100,0	2 635	2,3	2,7	94,2	0,8	100,0	540
Koulikoro	7,7	6,6	0,0	85,7	100,0	4 018	2,8	2,2	88,4	6,6	100,0	576
Sikasso	8,6	4,3	0,1	87,0	100,0	3 143	3,2	2,2	93,7	0,9	100,0	408
Ségou	10,0	15,9	0,2	73,9	100,0	2 574	1,3	2,0	96,3	0,4	100,0	671
Mopti	20,4	2,5	0,0	77,1	100,0	1 530	2,9	0,7	96,1	0,2	100,0	350
Tombouctou	0,1	1,0	0,0	98,9	100,0	281	*	*	*	*	100,0	3
Gao	7,4	0,5	0,7	91,5	100,0	485	17,0	3,7	78,5	0,8	100,0	41
Kidal	†	†	†	†	100,0	6	†	†	†	†	0,0	0
Bamako	1,5	2,6	0,1	95,8	100,0	2 675	63,5	16,0	11,9	8,6	100,0	113
Niveau d'instruction												
Aucun	11,8	8,9	0,2	79,1	100,0	9 382	1,9	2,1	94,2	1,7	100,0	1 957
Primaire	6,5	7,6	0,3	85,6	100,0	2 926	6,8	2,5	87,5	3,1	100,0	421
Secondaire ou plus	3,3	3,1	0,1	93,5	100,0	5 039	22,2	6,3	67,0	4,4	100,0	325
Quintile de bien-être économique												
Le plus bas	17,7	13,8	0,3	68,3	100,0	3 036	0,3	1,2	96,7	1,7	100,0	963
Second	15,3	11,1	0,1	73,5	100,0	3 143	1,2	1,4	95,6	1,8	100,0	834
Moyen	8,9	7,3	0,2	83,7	100,0	3 318	2,5	2,3	93,5	1,7	100,0	542
Quatrième	2,1	2,6	0,1	95,1	100,0	3 676	9,8	7,8	78,7	3,7	100,0	179
Le plus élevé	1,7	2,6	0,1	95,6	100,0	4 174	51,0	12,6	29,7	6,8	100,0	185
Ensemble	8,4	7,0	0,2	84,4	100,0	17 347	5,1	2,7	89,9	2,2	100,0	2 703

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
[1] Un titre ou un autre document reconnu par le gouvernement
[2] En commun avec un conjoint, en commun avec quelqu'un d'autre ou en commun avec un conjoint ou quelqu'un d'autre
[3] Y compris les femmes qui ont une maison avec un titre de propriété ou un autre document reconnu par le gouvernement mais qui ne savent pas si leur nom figure sur le titre et les femmes qui ne savent pas s'il y a un titre de propriété ou un document reconnu par le gouvernement pour cette terre
[4] Y compris les femmes qui possèdent une maison, seules, en commun avec leur conjoint seulement, en commun avec quelqu'un d'autre seulement, en commun avec leur conjoint et quelqu'un d'autre ou seule et en commun
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 15.5.2 Possession de terres et documents prouvant la propriété : Homme

Répartition (en %) des hommes de 15–49 ans par possession de terres ; parmi les hommes possédant des terres, répartition (en %) selon que la terre a un titre de propriété et que le nom de l'homme y figure, ou non, en fonction de certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Pourcentage possédant des terres :						Les terres ont un titre de propriété[1] et :					
Caractéristique sociodémographique	Seule	En commun[2]	Seule et en commun	Pourcentage ne possédant pas de terres	Total	Effectif d'hommes	Le nom de l'homme figure sur le titre[1]	Le nom de l'homme ne figure pas sur le titre[1]	N'a pas de titre de propriété[1]	Ne sait pas[3]	Total	Effectif d'hommes possédant des terres[4]
Âge												
15–19	0,7	10,7	1,2	87,5	100,0	1 669	2,0	4,2	87,6	6,2	100,0	208
20–24	2,4	12,3	1,6	83,7	100,0	1 165	7,4	6,9	79,5	6,1	100,0	190
25–29	6,0	20,3	3,1	70,6	100,0	930	6,9	8,0	83,8	1,3	100,0	273
30–34	11,5	24,4	5,1	59,0	100,0	909	8,5	8,8	81,4	1,3	100,0	372
35–39	19,0	24,6	4,1	52,2	100,0	784	13,8	6,0	79,2	1,0	100,0	374
40–44	24,8	25,3	5,9	44,0	100,0	663	10,2	4,6	84,5	0,7	100,0	371
45–49	27,2	25,1	5,0	42,7	100,0	568	11,3	2,1	85,1	1,6	100,0	326
Résidence												
Bamako	6,8	6,6	0,3	86,3	100,0	1 177	38,0	11,1	49,8	1,1	100,0	161
Autre urbain	6,6	8,6	0,5	84,3	100,0	795	33,1	12,3	48,0	6,5	100,0	125
Ensemble urbain	6,7	7,4	0,4	85,5	100,0	1 971	35,9	11,6	49,0	3,5	100,0	286
Rural	11,4	23,1	4,3	61,2	100,0	4 714	5,1	4,9	88,2	1,9	100,0	1 829
Région												
Kayes	13,5	22,7	0,1	63,7	100,0	920	3,1	4,9	88,5	3,5	100,0	334
Koulikoro	6,7	17,7	2,9	72,7	100,0	1 637	9,6	2,6	86,6	1,3	100,0	446
Sikasso	11,3	17,1	2,6	69,0	100,0	1 215	9,7	2,6	84,1	3,6	100,0	376
Ségou	10,3	35,8	7,0	46,9	100,0	939	3,5	11,3	84,3	0,9	100,0	499
Mopti	13,4	19,7	8,9	58,0	100,0	505	5,4	1,2	92,5	0,8	100,0	212
Tombouctou	22,5	6,1	0,0	71,4	100,0	128	22,2	0,9	77,0	0,0	100,0	37
Gao	13,5	4,8	12,2	69,6	100,0	163	14,6	16,3	58,1	11,1	100,0	49
Kidal	†	†	†	†	100,0	2	†	†	†	†	100,0	0
Bamako	6,8	6,6	0,3	86,3	100,0	1 177	38,0	11,1	49,8	1,1	100,0	161
Niveau d'instruction												
Aucun	14,6	24,9	4,7	55,8	100,0	2 476	4,8	3,0	90,2	2,0	100,0	1 094
Primaire	8,3	20,4	3,5	67,9	100,0	1 352	7,1	5,4	85,5	1,9	100,0	435
Secondaire ou plus	6,8	12,0	1,7	79,5	100,0	2 858	19,0	11,4	67,2	2,3	100,0	587
Quintile de bien-être économique												
Le plus bas	13,5	35,0	5,5	46,0	100,0	1 179	2,3	1,8	94,9	1,0	100,0	637
Second	14,7	28,3	5,7	51,3	100,0	1 174	3,9	4,8	89,0	2,3	100,0	571
Moyen	11,4	22,7	4,6	61,3	100,0	1 190	3,7	5,8	87,7	2,8	100,0	461
Quatrième	6,3	7,8	1,5	84,4	100,0	1 446	21,4	13,2	61,2	4,2	100,0	225
Le plus élevé	6,4	6,3	0,3	87,0	100,0	1 697	42,2	12,6	44,4	0,8	100,0	220
Ensemble 15–49	10,0	18,5	3,2	68,4	100,0	6 686	9,2	5,8	82,9	2,1	100,0	2 115
50–64	44,5	19,9	3,4	32,2	100,0	1 143	16,5	2,8	80,0	0,7	100,0	775
Ensemble 15–64	15,0	18,7	3,2	63,1	100,0	7 829	11,2	5,0	82,1	1,7	100,0	2 890

[1] Un titre de propriété ou un document reconnu par le gouvernement.
[2] En commun avec une femme, en commun avec quelqu'un d'autre ou en commun avec une femme et quelqu'un d'autre
[3] Y compris les hommes qui ont une maison avec un titre de propriété ou un autre document reconnu par le gouvernement mais qui ne savent pas si leur nom figure sur le titre et les hommes qui ne savent pas s'il y a un titre de propriété ou un document reconnu par le gouvernement pour cette terre
[4] Y compris les hommes qui possèdent une maison, seuls, en commun avec leur femme seulement, en commun avec quelqu'un d'autre seulement, en commun avec leur femme et quelqu'un d'autre ou seuls et en commun
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 15.6.1 Possession et utilisation de téléphone portable et de compte bancaire : Femme

Pourcentage de femmes de 15–49 ans qui possèdent un téléphone portable, pourcentage qui possèdent un smartphone et pourcentage ayant utilisé un téléphone portable pour effectuer une transaction financière au cours des 12 derniers mois; pourcentage de femmes qui possèdent un compte en banque et qui l'utilisent, pourcentage ayant effectué un dépôt ou un retrait d'argent de leur propre compte en banque au cours des 12 derniers mois et pourcentage qui possèdent et qui utilisent un compte bancaire ou qui ont utilisé un téléphone portable pour effectuer des transactions financières au cours des 12 derniers mois, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Possession d'un téléphone portable :		Pourcentage ayant utilisé un téléphone portable pour effectuer des transactions financières au cours des 12 derniers mois[1]	Possession et utilisation d'un compte bancaire :		Pourcentage qui possède et qui utilisent un compte bancaire ou qui ont utilisé un téléphone portable pour effectuer des transactions financières au cours des 12 derniers	Effectif de femmes
	Pourcentage possédant un téléphone portable	Pourcentage possédant un smartphone		Pourcentage qui possède et utilisent un compte bancaire	Pourcentage ayant déposé ou retiré de l'argent de leur propre compte bancaire au cours des 12 derniers mois		
Âge							
15–19	52,7	43,0	25,1	0,6	0,4	25,3	3 862
20–24	72,0	56,2	43,1	2,9	2,3	43,6	3 378
25–29	69,9	47,3	42,3	4,2	3,6	42,9	2 905
30–34	70,6	45,3	45,4	6,2	5,0	45,8	2 382
35–39	67,8	36,7	42,0	5,8	4,8	42,7	2 065
40–44	66,2	30,9	42,4	5,9	5,3	43,7	1 586
45–49	67,1	27,4	44,9	5,0	4,2	45,7	1 169
Résidence							
Bamako	81,8	68,6	59,3	9,1	7,8	59,6	2 675
Autre urbain	77,0	57,9	50,4	7,2	6,0	51,8	2 048
Ensemble urbain	79,7	64,0	55,4	8,3	7,0	56,2	4 723
Rural	60,6	36,1	33,2	2,1	1,7	33,6	12 624
Région							
Kayes	63,4	50,2	38,4	2,6	1,9	38,8	2 635
Koulikoro	67,4	46,3	45,8	3,1	2,8	46,3	4 018
Sikasso	63,6	28,4	28,9	2,9	2,3	29,8	3 143
Ségou	57,4	35,3	33,9	3,2	2,5	34,5	2 574
Mopti	64,0	37,6	29,4	2,3	1,8	29,6	1 530
Tombouctou	55,4	22,8	17,1	2,9	2,6	17,1	281
Gao	47,5	24,5	17,9	1,4	1,1	18,2	485
Kidal	†	†	†	†	†	†	6
Bamako	81,8	68,6	59,3	9,1	7,8	59,6	2 675
Niveau d'instruction							
Aucun	58,4	29,6	31,2	1,2	0,9	31,6	9 382
Primaire	65,5	46,0	37,6	1,6	1,1	37,7	2 926
Secondaire ou plus	79,7	68,7	55,1	10,0	8,6	56,0	5 039
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	50,8	20,1	31,4	0,6	0,4	31,6	3 036
Second	53,9	25,6	27,6	0,8	0,6	27,9	3 143
Moyen	58,5	33,9	28,2	1,2	1,0	28,4	3 318
Quatrième	74,7	54,3	44,9	2,9	2,3	45,5	3 676
Le plus élevé	83,6	73,0	57,4	11,3	9,5	58,5	4 174
Ensemble	65,8	43,7	39,2	3,8	3,2	39,7	17 347

[1] La question concernant l'utilisation d'un téléphone portable pour des transactions financières a été posée, que les enquêtées possèdent, ou non, un téléphone portable.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 15.6.2 Possession et utilisation de téléphone portable et de comptes bancaire : Homme

Pourcentage d'hommes de 15–49 ans qui possèdent un téléphone portable, pourcentage qui possèdent un smartphone et pourcentage ayant utilisé un téléphone portable pour effectuer une transaction financière au cours des 12 derniers mois; pourcentage d'hommes qui possèdent un compte en banque et qui l'utilisent, pourcentage ayant effectué un dépôt ou un retrait d'argent de leur propre compte en banque au cours des 12 derniers mois et pourcentage qui possèdent et qui utilisent un compte bancaire ou qui ont utilisé un téléphone portable pour effectuer des transactions financières au cours des 12 derniers mois, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Possession d'un téléphone portable :		Pourcentage ayant utilisé un téléphone portable pour effectuer des transactions financières au cours des 12 derniers mois[1]	Possession et utilisation d'un compte bancaire :		Pourcentage qui possède et qui utilisent un compte bancaire ou qui ont utilisé un téléphone portable pour effectuer des transactions financières au cours des 12 derniers	Effectif d'hommes
	Pourcentage possédant un téléphone portable	Pourcentage possédant un smartphone		Pourcentage qui possède et utilisent un compte bancaire	Pourcentage qui ont déposé ou retiré de l'argent de leur propre compte bancaire au cours des 12 derniers mois		
Âge							
15–19	61,8	48,5	31,3	1,2	0,7	31,6	1 669
20–24	91,7	77,3	67,5	5,2	4,1	67,9	1 165
25–29	96,7	77,5	80,8	13,9	11,8	81,0	930
30–34	95,7	71,4	84,0	17,2	14,6	84,2	909
35–39	97,3	67,3	82,4	23,6	20,1	82,5	784
40–44	96,9	58,1	84,9	21,9	19,9	85,6	663
45–49	94,6	47,4	80,6	18,5	14,7	81,8	568
Résidence							
Bamako	92,4	81,4	82,8	21,1	18,4	82,9	1 177
Autre urbain	89,4	72,8	74,3	19,6	16,1	74,6	795
Ensemble urbain	91,2	77,9	79,4	20,5	17,4	79,6	1 971
Rural	85,1	57,8	62,0	8,4	7,0	62,5	4 714
Région							
Kayes	85,2	67,1	70,8	5,6	5,2	71,0	920
Koulikoro	87,1	63,3	64,5	13,0	10,4	65,7	1 637
Sikasso	86,4	54,1	54,5	10,7	9,0	54,7	1 215
Ségou	84,4	60,4	69,2	9,8	8,3	69,2	939
Mopti	89,5	59,7	69,9	9,5	7,6	70,2	505
Tombouctou	75,8	38,0	59,3	7,8	6,3	59,8	128
Gao	74,7	45,9	39,0	5,8	4,2	39,2	163
Kidal	†	†	†	†	†	†	2
Bamako	92,4	81,4	82,8	21,1	18,4	82,9	1 177
Niveau d'instruction							
Aucun	86,7	51,0	63,1	5,7	4,6	63,5	2 476
Primaire	83,9	58,0	58,5	5,6	4,8	58,7	1 352
Secondaire ou plus	88,5	77,5	74,7	20,4	17,3	75,2	2 858
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	82,6	44,8	53,8	3,0	1,8	54,6	1 179
Second	84,2	50,2	57,4	3,8	3,5	57,5	1 174
Moyen	82,7	56,6	59,1	5,4	4,5	60,0	1 190
Quatrième	89,4	71,1	73,3	11,2	9,2	73,6	1 446
Le plus élevé	92,6	85,0	83,4	29,2	25,0	83,6	1 697
Ensemble 15–49	86,9	63,7	67,1	12,0	10,1	67,5	6 686
50–64	91,8	38,2	80,5	18,8	16,3	81,3	1 143
Ensemble 15–64	87,6	60,0	69,1	13,0	11,0	69,5	7 829

[1] La question concernant l'utilisation d'un téléphone portable pour des transactions financières a été posée que les enquêtés possèdent, ou non, un téléphone portable.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 15.7 Participation dans la prise de décision

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15–49 ans, actuellement en union, en fonction de la personne qui prend, habituellement, les décisions dans certains domaines, EDSM-VII Mali 2023–2024

Décision	Principalement la femme	Femme et conjoint en commun	Principalement le conjoint	Quelqu'un d'autre	Autre	Total	Effectif
			FEMME				
Propres soins de santé	6,3	11,9	79,5	2,2	0,2	100,0	13 237
Achats importants du ménage	5,4	15,3	73,8	5,0	0,5	100,0	13 237
Visites à sa famille ou à ses parents	11,7	20,7	65,2	2,2	0,3	100,0	13 237
			HOMME				
Propres soins de santé	3,8	8,8	79,6	7,0	0,7	100,0	3 512
Achats importants du ménage	5,2	8,7	75,7	9,4	0,9	100,0	3 512

Note : Le terme conjoint inclut un partenaire avec qui une femme vit comme s'ils étaient mariés, et le terme femme inclut une partenaire avec qui un homme vit comme s'ils étaient mariés.

Tableau 15.8.1 Participation des femmes dans la prise de décision selon certaines caractéristiques

Pourcentage de femmes de 15–49 ans, actuellement en union, qui habituellement prennent certaines décisions, soit seules, soit en commun avec leur conjoint, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Décisions			Les trois décisions	Aucune des trois décisions	Effectif de femmes
	Propres soins de santé de la femme	Faire les achats importants du ménage	Visites à sa famille ou parents			
Âge						
15–19	11,9	14,2	24,5	6,5	69,5	1 241
20–24	14,8	17,5	29,7	7,3	62,8	2 592
25–29	16,2	19,8	33,2	9,7	60,7	2 677
30–34	18,2	21,8	33,6	10,4	58,0	2 243
35–39	20,3	21,2	33,0	11,6	59,4	1 935
40–44	25,3	27,3	36,7	15,7	54,6	1 472
45–49	24,6	25,8	36,0	15,1	55,1	1 077
Emploi (dans les 12 derniers mois)						
N'a pas travaillé	11,7	14,5	28,9	6,0	66,2	4 537
A travaillé et a été rémunérée en argent	21,7	24,5	35,8	12,8	55,2	7 125
A travaillé mais n'a pas été rémunérée en argent	21,0	21,2	27,0	12,2	65,0	1 576
Nombre d'enfants vivants						
0	14,2	14,8	26,6	6,8	66,5	1 165
1–2	16,2	19,5	31,1	9,5	62,0	4 042
3–4	18,3	21,6	32,7	10,4	59,4	3 796
5+	21,0	22,6	34,8	12,4	57,3	4 234
Résidence						
Bamako	24,9	29,6	43,8	17,4	49,4	1 553
Autre urbain	20,0	25,5	31,0	12,4	58,6	1 339
Ensemble urbain	22,6	27,7	37,9	15,1	53,7	2 892
Rural	16,9	18,7	30,8	9,1	62,0	10 345
Région						
Kayes	18,7	23,2	22,2	8,6	62,9	2 094
Koulikoro	15,9	16,8	35,7	7,2	58,2	3 130
Sikasso	11,4	16,3	26,4	8,0	69,6	2 558
Ségou	21,0	20,4	35,4	12,5	57,5	2 109
Mopti	25,3	24,8	36,3	14,0	54,5	1 230
Tombouctou	18,2	33,2	37,7	16,6	58,6	199
Gao	12,5	13,4	20,6	8,3	75,7	360
Kidal	†	†	†	†	†	5
Bamako	24,9	29,6	43,8	17,4	49,4	1 553
Niveau d'instruction						
Aucun	17,2	19,1	30,7	9,3	61,9	8 200
Primaire	18,7	23,2	32,7	11,6	59,3	2 167
Secondaire ou plus	20,6	23,2	36,8	12,6	55,7	2 870
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	14,9	17,0	31,1	8,5	63,7	2 720
Second	16,7	17,3	28,4	8,3	63,9	2 745
Moyen	18,8	20,9	30,6	9,9	60,5	2 692
Quatrième	18,9	22,8	33,5	10,8	58,4	2 642
Le plus élevé	22,0	26,0	38,9	15,1	53,4	2 438
Ensemble	18,2	20,7	32,4	10,4	60,1	13 237

Note : Le terme conjoint inclut un partenaire avec qui une femme vit comme s'ils étaient mariés et le terme femme inclut une partenaire avec qui un homme vit comme s'ils étaient mariés.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 15.8.2 Participation des hommes dans la prise de décision selon certaines caractéristiques

Pourcentage des hommes de 15–49 ans, actuellement en union, qui habituellement prennent certaines décisions, soit seuls, soit en commun avec leur femme, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Décisions				
	Propres soins de santé de l'homme	Faire les achats importants du ménage	Les deux décisions	Aucune des deux décisions	Effectif d'hommes
Âge					
15–19	*	*	*	*	7
20–24	70,0	65,1	61,1	26,0	175
25–29	83,4	77,5	75,4	14,6	578
30–34	87,9	82,9	80,7	9,9	794
35–39	88,7	86,5	82,5	7,2	753
40–44	94,2	91,9	89,9	3,8	648
45–49	93,6	88,6	87,8	5,6	557
Emploi (dans les 12 derniers mois)					
N'a pas travaillé	73,0	70,5	69,9	26,4	64
A travaillé et a été rémunérée en argent	91,4	87,0	84,5	6,2	2 594
A travaillé mais n'a pas été rémunérée en argent	80,8	77,8	75,1	16,6	853
Nombre d'enfants vivants					
0	79,7	73,6	71,3	18,1	389
1–2	86,1	81,9	78,8	10,9	1 013
3–4	90,0	86,4	83,8	7,4	908
5+	92,2	88,6	86,7	5,9	1 201
Résidence					
Bamako	95,2	94,3	92,3	2,7	503
Autre urbain	88,4	87,4	83,7	7,9	365
Ensemble urbain	92,3	91,4	88,7	4,9	868
Rural	87,2	82,1	79,8	10,4	2 644
Région					
Kayes	95,1	95,1	91,3	1,1	474
Koulikoro	89,0	84,3	82,5	9,3	884
Sikasso	73,9	68,1	63,6	21,7	689
Ségou	92,3	86,9	85,4	6,2	493
Mopti	87,8	81,5	80,6	11,3	298
Tombouctou	97,2	83,4	82,5	2,0	72
Gao	96,6	95,5	94,7	2,5	97
Kidal	†	†	†	†	2
Bamako	95,2	94,3	92,3	2,7	503
Niveau d'instruction					
Aucun	88,3	84,2	82,0	9,5	1 710
Primaire	85,0	80,9	78,3	12,3	679
Secondaire ou plus	90,8	86,9	84,1	6,5	1 123
Quintile de bien-être économique					
Le plus bas	83,4	77,8	75,3	14,1	708
Second	84,0	78,9	76,5	13,6	704
Moyen	88,9	84,1	81,3	8,3	636
Quatrième	91,2	88,7	85,8	5,9	718
Le plus élevé	94,5	92,1	90,3	3,7	747
Ensemble 15–49	88,5	84,4	82,0	9,1	3 512
50–64	95,3	92,5	90,7	2,9	1 121
Ensemble 15–64	90,1	86,4	84,1	7,6	4 633

Note : Le terme femme inclut une partenaire avec qui un homme vit comme s'ils étaient mariés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 15.9.1 Opinion des femmes concernant le fait qu'un mari batte sa femme

Pourcentage de toutes les femmes de 15–49 ans qui pensent qu'il est justifié que, pour certaines raisons, un mari batte sa femme, par raison particulière et selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Il est justifié qu'un mari batte sa femme quand elle :					Pourcentage d'accord avec au moins une des raisons citées	Effectif de femmes
	Sort sans le lui dire	Néglige les enfants	Argumente avec lui	Refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui	Brûle la nourriture		
Âge							
15–19	44,6	46,2	56,5	47,3	23,9	66,3	3 862
20–24	46,9	47,4	58,1	53,7	22,6	69,0	3 378
25–29	45,9	48,5	57,7	56,3	23,6	69,4	2 905
30–34	48,0	47,5	58,2	56,7	23,5	69,9	2 382
35–39	49,3	49,6	58,9	57,5	25,2	70,7	2 065
40–44	51,3	51,5	61,0	60,4	25,4	72,2	1 586
45–49	49,7	48,5	58,7	57,6	25,1	71,7	1 169
Emploi (dans les 12 derniers mois)							
N'a pas travaillé	45,6	45,8	55,0	50,7	25,9	65,1	6 587
A travaillé et a été rémunérée en argent	48,2	49,1	60,6	57,0	21,8	72,0	8 724
A travaillé mais n'a pas été rémunérée en argent	48,8	51,0	57,2	56,0	26,5	71,3	2 036
Nombre d'enfants vivants							
0	40,4	42,1	51,9	43,9	21,3	62,7	4 462
1–2	48,2	49,3	60,5	56,2	23,5	71,1	4 581
3–4	47,3	48,4	57,0	57,1	24,0	68,8	3 928
5+	53,3	52,5	62,9	61,2	27,0	74,6	4 376
État matrimonial							
Célibataire	38,3	39,8	49,4	40,6	19,2	59,5	3 585
Actuellement en union	50,0	50,7	60,9	58,5	25,4	72,2	13 237
En rupture d'union	38,5	38,8	47,3	47,6	19,0	61,9	525
Résidence							
Bamako	35,4	36,3	48,6	43,8	13,3	60,1	2 675
Autre urbain	40,2	43,6	53,4	46,7	22,0	63,0	2 048
Ensemble urbain	37,5	39,5	50,7	45,1	17,1	61,3	4 723
Rural	50,9	51,3	60,9	58,0	26,5	72,2	12 624
Région							
Kayes	48,0	51,6	53,9	55,3	23,4	68,7	2 635
Koulikoro	49,3	50,7	58,3	47,5	21,2	65,6	4 018
Sikasso	57,8	59,5	72,8	67,0	25,9	83,0	3 143
Ségou	48,0	44,8	63,2	64,3	30,7	76,7	2 574
Mopti	41,1	42,5	49,5	53,6	31,1	62,7	1 530
Tombouctou	29,0	29,2	36,2	30,4	20,6	43,9	281
Gao	50,0	44,4	49,1	51,4	38,7	61,0	485
Kidal	†	†	†	†	†	†	6
Bamako	35,4	36,3	48,6	43,8	13,3	60,1	2 675
Niveau d'instruction							
Aucun	52,7	52,5	62,8	60,7	27,5	73,7	9 382
Primaire	49,2	50,7	59,4	55,8	24,4	71,2	2 926
Secondaire ou plus	36,0	38,3	48,7	42,1	16,9	60,0	5 039
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	57,1	58,8	66,9	65,3	30,4	77,9	3 036
Second	53,1	53,5	63,7	61,6	27,6	75,0	3 143
Moyen	52,0	51,1	62,4	60,5	28,9	74,1	3 318
Quatrième	44,9	44,7	55,6	50,3	21,7	66,8	3 676
Le plus élevé	34,1	36,7	46,2	40,1	14,4	57,0	4 174
Ensemble	47,3	48,1	58,1	54,5	23,9	69,3	17 347

Note : Le terme mari englobe un partenaire avec qui une femme vit comme s'ils étaient mariés.
Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 15.9.2 Opinion des hommes concernant le fait qu'un mari batte sa femme

Pourcentage de tous les hommes de 15–49 ans qui pensent qu'il est justifié que, pour certaines raisons, un mari batte sa femme, par raison particulière et selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Il est justifié qu'un mari batte sa femme quand elle :					Pourcentage d'accord avec au moins une des raisons citées	Effectif d'hommes
	Sort sans le lui dire	Néglige les enfants	Argumente avec lui	Refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui	Brûle la nourriture		
Âge							
15–19	19,8	23,1	34,4	22,1	18,9	45,9	1 669
20–24	16,0	21,2	28,8	19,9	15,1	43,8	1 165
25–29	10,1	17,5	22,2	13,5	13,1	36,3	930
30–34	13,5	18,8	26,2	17,8	12,8	39,7	909
35–39	11,2	16,7	22,3	12,2	11,7	35,5	784
40–44	12,9	15,2	19,3	16,0	11,7	35,3	663
45–49	14,2	15,2	22,7	16,4	11,8	37,7	568
Emploi (dans les 12 derniers mois)							
N'a pas travaillé	16,7	20,4	24,4	17,8	15,0	36,9	602
A travaillé et a été rémunérée en argent	12,8	17,3	25,0	15,3	11,7	37,7	4 147
A travaillé mais n'a pas été rémunérée en argent	18,3	22,9	31,1	22,7	20,1	47,1	1 937
Nombre d'enfants vivants							
0	16,6	21,4	29,9	19,8	16,7	43,1	3 445
1–2	12,3	17,8	23,5	15,2	10,5	37,4	1 124
3–4	11,7	17,6	22,5	13,6	12,0	35,7	913
5+	14,1	15,4	23,7	17,1	13,3	38,9	1 204
État matrimonial							
Célibataire	17,4	21,5	30,6	20,5	17,2	43,5	3 127
Actuellement en union	12,5	17,2	23,3	15,2	12,0	37,7	3 512
En rupture d'union	(8,8)	(18,1)	(21,9)	(17,7)	(10,0)	(30,1)	47
Résidence							
Bamako	14,9	28,7	22,9	16,5	8,0	42,2	1 177
Autre urbain	10,4	12,3	22,2	11,8	10,1	29,4	795
Ensemble urbain	13,1	22,1	22,6	14,6	8,8	37,0	1 971
Rural	15,4	18,0	28,4	19,0	16,8	41,8	4 714
Région							
Kayes	17,2	16,0	31,4	15,6	15,8	45,9	920
Koulikoro	13,1	16,1	23,3	18,1	11,8	33,5	1 637
Sikasso	13,4	17,6	28,0	14,4	17,9	40,7	1 215
Ségou	18,3	20,8	36,5	22,9	14,0	48,8	939
Mopti	15,8	21,1	26,2	25,2	30,3	44,5	505
Tombouctou	12,3	9,9	16,3	18,6	18,1	28,3	128
Gao	4,8	4,9	5,8	4,3	4,7	10,8	163
Kidal	†	†	†	†	†	†	2
Bamako	14,9	28,7	22,9	16,5	8,0	42,2	1 177
Niveau d'instruction							
Aucun	16,1	18,2	27,9	19,9	14,9	42,2	2 476
Primaire	16,7	20,0	30,9	20,2	17,0	43,9	1 352
Secondaire ou plus	12,7	19,7	23,7	14,6	12,9	37,1	2 858
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	17,9	20,4	33,5	20,4	20,5	47,8	1 179
Second	14,9	17,0	26,5	20,4	17,0	41,0	1 174
Moyen	16,1	17,8	30,8	19,7	14,6	42,8	1 190
Quatrième	13,9	19,2	23,7	15,8	12,0	36,4	1 446
Le plus élevé	12,3	20,9	21,8	14,2	10,5	36,5	1 697
Ensemble 15–49	14,8	19,2	26,7	17,7	14,4	40,4	6 686
50–64	12,4	14,7	20,4	14,1	12,1	33,5	1 143
Ensemble 15–64	14,4	18,5	25,8	17,2	14,1	39,4	7 829

Note : Le terme femme inclut une partenaire avec qui un homme vit comme s'ils étaient mariés.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 15.10 Opinions concernant la négociation de rapports sexuels sans risque avec le mari/partenaire

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans qui pensent qu'il est justifié qu'une femme refuse d'avoir des relations sexuelles avec son mari si elle sait qu'il a des relations sexuelles avec d'autres femmes et pourcentage qui pensent qu'il est justifié qu'une femme demande à ce qu'un condom soit utilisé au cours des rapports sexuels si elle sait que son mari a une infection sexuellement transmissible (IST), selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Femme			Homme		
	Il est justifié qu'une femme :			Il est justifié qu'une femme :		
Caractéristique sociodémographique	Refuse d'avoir des relations sexuelles avec son mari si elle sait qu'il a des relations sexuelles avec d'autres femmes	Demande à ce qu'un condom soit utilisé au cours des rapports sexuels si elle sait que son mari a une IST	Effectif de femmes	Refuse d'avoir des relations sexuelles avec son mari si elle sait qu'il a des relations sexuelles avec d'autres femmes	Demande à ce qu'un condom soit utilisé au cours des rapports sexuels si elle sait que son mari a une IST	Effectif d'hommes
Âge						
15–24	21,6	49,5	7 240	25,7	53,9	2 833
15–19	19,4	43,8	3 862	22,8	47,8	1 669
20–24	24,1	56,0	3 378	29,9	62,6	1 165
25–29	22,7	55,2	2 905	34,2	72,0	930
30–39	21,0	57,6	4 446	36,7	71,7	1 693
40–49	20,2	51,8	2 755	32,6	68,9	1 230
État matrimonial						
Célibataire	22,2	49,3	3 585	26,7	56,3	3 127
A déjà eu des rapports sexuels	26,2	60,7	1 027	30,8	71,4	1 124
N'a jamais eu de rapports sexuels	20,6	44,7	2 558	24,4	47,9	2 003
Actuellement en union	21,1	53,7	13 237	34,7	70,2	3 512
En rupture d'union	24,6	58,0	525	(31,3)	(64,7)	47
Résidence						
Bamako	29,0	67,9	2 675	40,8	74,2	1 177
Autre urbain	23,1	60,2	2 048	33,4	64,7	795
Ensemble urbain	26,4	64,5	4 723	37,8	70,4	1 971
Rural	19,5	48,6	12 624	28,1	60,8	4 714
Région[1]						
Kayes	24,8	53,3	2 635	17,0	66,1	920
Koulikoro	15,2	47,6	4 018	28,6	59,2	1 637
Sikasso	18,3	60,6	3 143	27,3	57,0	1 215
Ségou	19,8	43,4	2 574	36,2	70,5	939
Mopti	24,4	48,2	1 530	44,0	63,2	505
Tombouctou	31,5	45,6	281	19,7	56,3	128
Gao	25,6	31,8	485	26,7	35,3	163
Kidal	†	†	6	†	†	2
Bamako	29,0	67,9	2 675	40,8	74,2	1 177
Niveau d'instruction						
Aucun	19,3	48,8	9 382	29,0	58,3	2 476
Primaire	21,7	52,5	2 926	28,8	59,5	1 352
Secondaire ou plus	25,2	60,8	5 039	33,6	70,3	2 858
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	23,5	49,7	3 036	24,0	55,1	1 179
Second	21,1	49,3	3 143	28,3	60,3	1 174
Moyen	18,8	51,7	3 318	28,6	59,3	1 190
Quatrième	19,4	50,5	3 676	31,5	65,8	1 446
Le plus élevé	24,0	61,1	4 174	38,7	73,2	1 697
Ensemble 15–49	21,4	52,9	17 347	30,9	63,7	6 686
50–64	na	na	na	32,1	71,5	1 143
Ensemble 15–64	na	na	na	31,1	64,8	7 829

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.
na = non applicable
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 15.11 Capacité des femmes à négocier les rapports sexuels avec leur mari

Pourcentage de femmes de 15–49 ans, actuellement en union, qui peuvent refuser des rapports sexuels à leur mari quand elles ne souhaitent pas en avoir et pourcentage qui peuvent demander à leur mari d'utiliser un condom quand elles le souhaitent, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage pouvant refuser des rapports sexuels à leur mari quand elles ne souhaitent pas en avoir	Pourcentage pouvant demander à leur mari d'utiliser un condom si elles le souhaitent	Effectif de femmes
Âge			
15–24	17,8	22,0	3 833
15–19	17,2	18,3	1 241
20–24	18,0	23,8	2 592
25–29	20,0	24,2	2 677
30–39	17,5	22,3	4 179
40–49	16,1	18,4	2 549
Résidence			
Bamako	25,0	30,3	1 553
Autre urbain	18,9	28,3	1 339
Ensemble urbain	22,2	29,4	2 892
Rural	16,6	19,7	10 345
Région			
Kayes	15,1	12,8	2 094
Koulikoro	20,0	21,3	3 130
Sikasso	15,3	21,2	2 558
Ségou	16,9	29,4	2 109
Mopti	9,3	15,5	1 230
Tombouctou	29,1	27,8	199
Gao	28,8	22,2	360
Kidal	†	†	5
Bamako	25,0	30,3	1 553
Niveau d'instruction			
Aucun	15,4	17,7	8 200
Primaire	18,8	23,4	2 167
Secondaire ou plus	24,0	32,4	2 870
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	18,2	21,4	2 720
Second	15,7	17,2	2 745
Moyen	15,9	18,7	2 692
Quatrième	17,3	23,2	2 642
Le plus élevé	22,3	29,6	2 438
Ensemble	17,8	21,8	13 237

Note : Le terme mari englobe un partenaire avec qui une femme vit comme s'ils étaient mariés.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 15.12 Participation des femmes dans la prise de décision concernant la santé sexuelle et reproductive

Pourcentage de femmes de 15–49 ans actuellement en union qui prennent leur propres décisions informées concernant les relations sexuelles, l'utilisation de la contraception et les soins de santé reproductive, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage qui prennent des décisions concernant les relations sexuelles, l'utilisation de la contraception et les soins de santé reproductive[1]	Effectif de femmes actuellement en union
Âge		
15–19	1,4	1 241
20–24	2,3	2 592
25–29	3,1	2 677
30–34	3,7	2 243
35–39	3,4	1 935
40–44	4,2	1 472
45–49	4,3	1 077
Emploi (dans les 12 derniers mois)		
N'a pas travaillé	1,8	4 537
A travaillé et a été rémunérée en argent	4,3	7 125
A travaillé mais n'a pas été rémunérée en argent	2,0	1 576
Résidence		
Bamako	6,2	1 553
Autre urbain	4,5	1 339
Ensemble urbain	5,4	2 892
Rural	2,5	10 345
Région		
Kayes	3,5	2 094
Koulikoro	3,3	3 130
Sikasso	1,5	2 558
Ségou	3,3	2 109
Mopti	1,1	1 230
Tombouctou	4,9	199
Gao	3,4	360
Kidal	†	5
Bamako	6,2	1 553
Niveau d'instruction		
Aucun	2,4	8 200
Primaire	3,1	2 167
Secondaire ou plus	5,1	2 870
Quintile de bien-être économique		
Le plus bas	1,6	2 720
Second	2,3	2 745
Moyen	2,8	2 692
Quatrième	3,9	2 642
Le plus élevé	5,4	2 438
Ensemble	3,1	13 237

[1] Les pourcentages de femmes actuellement en union qui prennent des décisions concernant les relations sexuelles, l'utilisation de la contraception et les soins de santé reproductive sont présentés respectivement aux tableaux 15.11, 7.17, et 15.8.1.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

EAU ET ASSAINISSEMENT DANS LES MÉNAGES 16

Principaux résultats

- ***Accès à l'eau de boisson :*** 75 % de la population a accès à, au moins, un service élémentaire en eau de boisson et 6 % à un service limité.
- ***Disponibilité de l'eau :*** 81 % de la population a déclaré avoir eu de l'eau, en quantité suffisante, pour sa consommation au cours du dernier mois avant l'enquête.
- ***Assainissement :*** 72 % des ménages utilisent des installations sanitaires améliorées et 21 % des installations sanitaires non améliorées ; 7 % n'ont pas de toilettes et pratiquent la défécation en plein air.
- ***Accès à l'assainissement :*** Plus de la moitié (55 %) de la population a accès à, au moins, un service élémentaire d'assainissement. Ce pourcentage est plus élevé en milieu urbain (60 %) qu'en milieu rural (54 %).
- ***Évacuation des selles des enfants :*** Pour 59 % des enfants de moins de 2 ans, les matières fécales ont été évacuées de manière appropriée.
- ***Produits d'hygiène menstruelle adaptés :*** La quasi-totalité des femmes (97 %) ont pu se laver ou se changer en privé et 95 % ont pu se changer en privé et utilisé des matériaux appropriés pendant leurs dernières périodes menstruelles.

L'accès et l'utilisation d'une eau de boisson salubre, d'installations d'assainissement et d'hygiène ont de profondes répercussions sur la santé, la sécurité et le bien-être général des populations.

Ce chapitre présente des informations sur les sources d'approvisionnement de l'eau de boisson, le type d'assainissement, l'évacuation des excréments, y compris celle des selles des jeunes enfants, le lavage des mains et l'hygiène menstruelle.

16.1 SOURCES DE L'EAU DE BOISSON, DISPONIBILITÉ ET TRAITEMENT

Sources améliorées d'eau pour la boisson

Il s'agit de l'eau canalisée, des robinets publics, des bornes-fontaines, des puits tubulaires, des forages, des puits creusés protégés et des sources protégées, de l'eau de pluie, de l'eau livrée par un camion-citerne ou un chariot avec un petit réservoir, et de l'eau en bouteille.

Échantillon : Ménages et population de droit

Au Mali, plus de quatre ménages sur cinq (83 %) consomment de l'eau de boisson provenant d'une source améliorée, essentiellement de l'eau provenant d'un puits à pompe/forage (25 %), de robinet dans leur logement/concession/cour/parcelle (21 %) et d'un robinet public/borne fontaine (21 %). Seize pour cent des ménages consomment de l'eau ne provenant pas d'une source améliorée, principalement de l'eau d'un puits creusé non protégé (15 %) (**Tableau 16.1**).

On constate des disparités dans l'approvisionnement en eau de boisson entre les milieux de résidence. En milieu urbain, la grande majorité des ménages ont accès à de l'eau provenant d'une source améliorée (96 % contre 78 % en milieu rural). En milieu rural, 21 % des ménages consomment de l'eau provenant d'une source non améliorée contre 4 % en milieu urbain. En outre, en milieu urbain, l'eau consommée provient en grande partie d'un robinet qui se trouve dans le logement, concession, cour ou parcelle (50 %) ou d'un robinet public ou borne fontaine (18 %). En milieu rural, les puits à pompe ou forage (30 %) et le robinet public ou borne fontaine (22 %) sont les sources d'approvisionnement en eau de boisson les plus courantes. Les mêmes variations sont observées pour la population.

Un peu plus de deux ménages sur cinq (43 %) dispose d'eau de boisson sur place et pour près de la moitié (49 %), le temps d'approvisionnement est de 30 minutes ou moins. Cependant, 8 % des ménages mettent plus de 30 minutes pour s'approvisionner en eau de boisson (**Tableau 16.1**).

Les résultats concernant la population montrent également que 81 % de la population ont accès à une source améliorée d'approvisionnement en eau de boisson. On note aussi que 43 % de la population disposent d'eau pour la consommation sur place ; dans 49 % des cas, le temps d'approvisionnement en eau est évalué à 30 minutes ou moins, et dans 8 % des cas, ce temps est évalué à plus de 30 minutes. L'accès à l'eau de boisson provenant de sources améliorées est plus élevé en milieu urbain (95 %) qu'en milieu rural (77 %).

Tendances : Entre 1995–1996 et 2023–2024, on constate une tendance à l'amélioration de l'accès des ménages à l'eau de boisson provenant d'une source améliorée. En effet, le pourcentage de ménages utilisant de l'eau de boisson provenant d'une source améliorée est passé de 30 % en 1995–1996 à 69 % en 2018 puis à 83 % en 2023–2024. Par ailleurs, durant cette période, le pourcentage de ménages disposant d'eau sur place est passé de 25 % en 1995–1996 à 33 % en 2018 puis à 43 % en 2023–2024.

16.1.1 Échelle des services pour l'eau de boisson

Échelle des services d'eau pour la boisson

Gérée en toute sécurité

Eau de boisson provenant d'une source d'eau améliorée située sur place, disponible en cas de besoin et respectant les normes concernant les matières fécales et les produits chimiques d'intérêt prioritaire

Élémentaire

Eau de boisson provenant d'une source améliorée, située sur place ou dont le temps de collecte incluant l'aller-retour est de 30 minutes ou moins

Limité

Eau de boisson provenant d'une source améliorée avec un temps de collecte aller-retour de plus de 30 minutes

Non améliorée

Eau de boisson provenant de puits creusés non protégés ou de sources non protégées

Eau de surface

Eau de boisson provenant directement d'un cours d'eau, barrage, lac, étang, ruisseau, conduit, canal d'irrigation

Échantillon : Population de droit

En s'appuyant sur la classification des sources d'eau de boisson améliorées et non améliorées, le Programme commun de suivi de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et de l'hygiène (JMP) a établi une échelle des services d'eau de boisson à cinq niveaux pour servir de référence et comparer les progrès réalisés pour atteindre les cibles des Objectifs du Développement Durable (ODD) (OMS/UNICEF, 2018). L'EDSM-VII a collecté des informations sur quatre des cinq niveaux. Par ailleurs, il convient de

préciser que l'EDSM-VII n'a pas inclus l'analyse de l'eau potable en termes de contamination fécale ou chimique. Ainsi, les services d'eau potable gérés de manière sûre et les services d'eau potable de base ne peuvent donc pas être distingués et sont regroupés dans le **Tableau 16.2** sous la rubrique « Au moins un service élémentaire ».

Globalement, au Mali,75 % de la population des ménages ont accès à, au moins un service élémentaire en eau de boisson. Six pour cent de la population des ménages utilisent un service limité d'approvisionnement en eau de boisson, 18 % consomment de l'eau provenant d'une source non améliorée et 1 % boivent de l'eau de surface (**Tableau 16.2** et **Graphique 16.1**).

Graphique 16.1 **Services d'eau de boisson pour la population des ménages par milieu de résidence**



Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- L'accès à, au moins un service élémentaire est plus élevé en milieu urbain (91 %) qu'en milieu rural (70 %). À Bamako, il atteint 94 %.
- C'est dans les régions de Tombouctou (82 %), Ségou (75 %), Sikasso (74 %) et Koulikoro (74 %) que les pourcentages de la population des ménages ayant accès à un service élémentaire d'eau de boisson sont les plus élevés. À l'opposé, ces pourcentages sont plus faibles dans les régions de Gao (67 %) et de Kayes (65 %) (**Carte 16.1**).
- Le pourcentage de la population ayant accès à un service élémentaire en eau de boisson augmente du quintile du bien-être économique le plus bas au plus élevé, passant de 55 % à 97 %.

Carte 16.1 Au moins un service élémentaire d'eau de boisson par région

Pourcentage de la population des ménages disposant d'au moins un service élémentaire d'eau de boisson



Note : Pour des raisons d'insécurité, les données de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région et ne sont pas présentées séparément.

16.1.2 Personne chargée de la collecte de l'eau de boisson

Au Mali, la majorité de la population ne dispose pas d'eau de boisson sur place (57 %). Pour près de trois quarts de cette population (72 %), l'eau de boisson est collectée par des femmes adultes âgées de 15 ans ou plus et dans 11 % des cas par des jeunes filles de moins de 15 ans. Dans 9 % des cas, ce travail est assuré par un homme adulte de 15 ans ou plus et, dans 6 % des cas, par un jeune garçon de moins de 15 ans (**Tableau 16.3** et **Graphique 16.2**).

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage de la population de droit qui ne dispose pas d'eau de boisson sur place est plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain (67 % contre 25 %).
- Dans les régions, le pourcentage de la population de droit ne disposant pas d'eau de boisson sur place varie d'un minimum de 29 % à Bamako à 77 % dans celle de Mopti.

Graphique 16.2 Personne chargée de la collecte de l'eau de boisson

Dans la population de droit des ménages qui ne disposent pas d'eau de boisson sur place, répartition (en %) par la personne chargée de la collecte de l'eau de boisson



- En milieu rural, 72 % des femmes adultes de 15 ans ou plus sont habituellement chargées d'aller chercher l'eau destinée à la boisson contre 69 % en milieu urbain.

16.1.3 Disponibilité de l'eau de boisson

Disponibilité de l'eau de boisson en quantité suffisante

Pourcentage de la population ayant eu de l'eau de boisson en quantités suffisantes au cours du dernier mois

Échantillon : Population de droit

Au Mali, 81 % de la population de droit ont déclaré avoir eu de l'eau de boisson en quantité suffisante dans le ménage au cours du dernier mois avant l'enquête (**Tableau 16.4**).

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage de la population de droit qui dispose d'eau de boisson en quantité suffisante ne varie pratiquement pas entre le milieu rural (81 %) et le milieu urbain (80 %). Par contre, on note un écart entre les autres villes et Bamako (75 % contre 84 %) (**Graphique 16.3**).
- Les disparités entre régions sont importantes. C'est dans les régions de Ségou (91 %) et de Sikasso (89 %) que la disponibilité de l'eau en quantités suffisantes a été la plus élevée au cours du mois dernier. À l'opposé, c'est dans les régions de Gao (61 %), Mopti (72 %) et Tombouctou (73 %) qu'elle a été la plus faible.
- La majorité de la population utilisant de l'eau provenant d'une source améliorée ont déclaré avoir eu de l'eau en quantités suffisantes au cours du mois dernier (80 %)

Graphique 16.3 **Disponibilité de l'eau à boire en quantités suffisantes par milieu de résidence**

Pourcentage de la population des ménages qui disposaient de quantités suffisantes d'eau à boire le mois dernier



- Parmi les personnes qui mettent plus de 30 minutes pour s'approvisionner en eau de boisson, 65 % disposaient d'eau potable en quantité suffisante au cours du mois dernier. En comparaison, 83 % de la population disposant d'eau sur place et 81 % de la population dont le temps d'approvisionnement est de 30 minutes ou moins disposaient d'eau potable en quantités suffisantes.

16.1.4 Traitement de l'eau de boisson

Au Mali, seulement 16 % de la population ont déclaré utiliser une méthode appropriée de traitement de l'eau de boisson (**Tableau 16.5**). Traiter l'eau de boisson est une pratique plus fréquente quand l'eau provient d'une source non améliorée (32 %) que quand la source est améliorée (12 %) ou que l'eau consommée est de l'eau de surface (23 %).

Dans les régions, le pourcentage de la population utilisant une méthode appropriée de traitement de l'eau varie de (26 %) dans la région de Sikasso à (5 %) dans la région de Tombouctou.

L'ajout de javel/chlore dans l'eau (16 %) ou le filtrage à travers un linge (7 %) sont les moyens appropriés de traitement de l'eau les plus fréquemment utilisés.

16.2 ASSAINISSEMENT

Installation sanitaire améliorée

Toilette avec chasse d'eau/chasse d'eau manuelle qui évacue l'eau et les déchets dans un système d'égout canalisé, une fosse septique, une latrine à fosse ou une destination inconnue ; latrine à fosse améliorée ventilée ; latrine à fosse avec dalle ; ou toilettes à compostage.

Échantillon : Ménages et population de droit

Globalement, 72 % des ménages utilisent des installations sanitaires améliorées (**Tableau 16.6**). Ce pourcentage varie de 64 % en milieu rural à 91 % en milieu urbain. Les fosses d'aisances avec dalles (62 %) et, dans une moindre proportion, la chasse d'eau/chasse manuelle reliée à une fosse septique (5 %) sont les équipements sanitaires les plus fréquemment utilisés. À l'opposé, 21 % des ménages utilisent des installations sanitaires non améliorées, en majorité des fosses d'aisances sans dalle ou trou ouvert (20 %). Enfin, 7 % des ménages n'utilisent pas de toilettes et pratiquent la défécation en plein air.

Pour 84 % des ménages, ces installations sanitaires se trouvent dans la cour/concession/parcelle.

Tendances : Le pourcentage de ménages utilisant des installations sanitaires améliorées a augmenté entre 1995–1996 et 2023–2024. En effet, il est passé de 1 % en 1995–1996 à 55 % en 2018 puis à 72 % en 2023–2024. Parallèlement, on note une nette régression du pourcentage de ménages qui n'utilisent pas de toilettes et qui pratiquent la défécation en plein air, puisqu'il est passé de 30 % en 1995–1996 à 7 % en 2023–2024, la situation s'étant particulièrement améliorée en milieu rural (39 % en 1995–1996 contre 10 % en 2023–2024).

16.2.1 Échelle des services d'assainissement

Échelle des services d'assainissement

Géré en toute sécurité

Utilisation d'installations d'assainissement améliorées qui ne sont pas partagées par plusieurs ménages et dans lesquelles les excréments sont traités en toute sécurité sur place ou acheminés et traités hors site.

Élémentaire

Utilisation d'Installations d'assainissement améliorées qui ne sont pas partagées par plusieurs ménages

Limité

Utilisation d'Installations d'assainissement améliorées partagées par deux ou plusieurs ménages

Non amélioré

Utilisation de latrines à fosse sans dalle ou plateforme, latrines suspendues ou latrines à seau

Défécation en plein air

Évacuation d'excréments humains dans les champs, les forêts, les buissons, les étendues d'eau ouvertes, les plages ou autres espaces ouverts, ou avec les déchets solides.

Échantillon : Population de droit

Le JMP a également établi une échelle de services d'assainissement à cinq échelons pour servir de référence et comparer les progrès réalisés pour atteindre les cibles des ODD concernant l'assainissement. L'EDSM-VII intègre les informations concernant les cinq échelons. Cependant, pour les ménages dont les excréments sont évacués hors site, il n'est pas possible de savoir si ces derniers ont été traités de manière

adaptée et donc gérés en toute sécurité. Les services d'assainissement élémentaire sont regroupés dans le **Tableau 16.7** sous la rubrique « Au moins, un service élémentaire ».

Les résultats montrent que 55 % de la population de droit des ménages ont accès à, au moins, un service élémentaire d'assainissement et 17 % à un service limité.

Tendances : Le niveau d'accès de la population de droit à, au moins, un service élémentaire d'assainissement a augmenté entre 2001 et 2023–2024, passant de 8 % à 55 %.

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- L'accès à, au moins, un service élémentaire d'assainissement est plus élevé en milieu urbain (60 %) qu'en milieu rural (54 %) (**Graphique 16.4**).

***Graphique 16.4* Population des ménages et service d'assainissement, par résidence**

Répartition (en %) de la population de droit par échelle des services d'assainissement



- Le pourcentage de la population ayant accès à, au moins, un service d'assainissement élémentaire varie selon la région d'un maximum de 63 % à Koulikoro à un minimum de 28 % à Tombouctou, région où on observe aussi le pourcentage le plus élevé de population ne disposant d'aucun type de toilettes (26 %).

- L'accès à, au moins, un service élémentaire d'assainissement augmente du quintile le plus bas au quintile le plus élevé, passant de 42 % à 75 %.

16.2.2 Enlèvement et évacuation des excréments

Évacuation des excréments des installations sur place

Excréments évacués en toute sécurité sur les lieux

Y compris les fosses septiques et les latrines où les déchets ont été enterrés dans une fosse couverte, qui n'ont jamais été vidées et dont on ne sait si elles ont déjà été vidées auparavant.

Excréments évacués sans sécurité

Y compris les fosses septiques et les latrines dont les déchets ont été vidés dans des fosses non couvertes, un terrain découvert, une étendue d'eau ou d'autres lieux.

Excréments évacués pour traitement

Y compris les fosses septiques et les latrines dans lesquelles les détritus ont été enlevés par un prestataire de services vers une usine de traitement ou un lieu inconnu ou qui ont été enlevés par un non-prestataire de services vers un lieu inconnu.

Échantillon : Population de droit avec des installations sanitaires sur place (fosses septiques, latrines à fosse et toilettes par compostage)

Les informations sur l'évacuation des excréments provenant d'installations sanitaires qui ne sont pas reliées à un système d'égouts sont essentielles pour évaluer le pourcentage de la population utilisant des services d'assainissement gérés en toute sécurité.

Parmi la population des ménages qui disposent de fosses septiques et d'installations sanitaires améliorées, 64 % n'avaient jamais vidé leur fosse septique ou latrines, 1 % avait eu leurs déchets évacués par un prestataire de services à la station d'épuration, 25 % avaient eu leurs déchets évacués par un prestataire de services, mais ne savaient pas où et, enfin, 2 % ne savaient pas si la fosse ou les latrines avaient déjà été vidées (**Tableau 16.8**).

Au Mali, les excréments sont évacués en toute sécurité sur place pour 67 % de la population disposant d'installations sanitaires sur place ; pour 6 %, les excréments ne sont pas évacués de manière sécurisée et pour 27 %, ils sont évacués pour être traités.

Le pourcentage de la population ayant des installations sanitaires connectées à un système d'égout est très faible (1 %) (**Tableau 16.9**).

Près de la moitié de la population (49 %) évacue leurs excréments en toute sécurité sur place et 10 % ont leurs excréta évacués pour être traités hors site (**Graphique 16.5**). Globalement, 60 % de la population ont accès à des installations sanitaires connectées à un système d'égout dont les excréments sont évacués en toute sécurité sur place ou évacués pour être traités hors site. À l'opposé, pour 40 % de la population, il n'y a pas de gestion adaptée d'évacuation des excréments du ménage, y compris 22 % qui utilisent des installations sanitaires non améliorées et 6 % qui pratiquent la défécation en plein air.

Graphique 16.5 Gestion adaptée d'évacuation des excréments du ménage

Répartition (en %) de la population des ménages par gestion d'évacuation des excrément du ménage



Répartition selon les variables sociodémographiques

- Le pourcentage de population connecté à un système d'égout, dont les excréments sont évacués en toute sécurité sur place ou évacués pour être traités hors site est nettement plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural (73 % contre 56 %).
- Le pourcentage de population dont la gestion des excréments est appropriée varie de 69 % dans la région de Kayes à 32 % dans celle de Tombouctou.
- Du quintile de bien-être économique le plus bas au plus élevé, le pourcentage de population qui évacue de manière appropriée leurs excréments et dont les installations sanitaires sont connectées à des égouts augmente, passant de 40 % à 79 % (**Graphique 16.6**).

Graphique 16.6 **Gestion adaptée de l'évacuation des excréments du ménage par quintile de bien-être économique**

Pourcentage de la population des ménages raccordés aux égouts ou utilisant des installations sanitaires améliorées sur site permettant l'évacuation des excréments en toute sécurité sur site ou leur enlèvement pour un traitement hors site



16.3 ÉVACUATION DES SELLES D'ENFANTS

Évacuation adaptée des selles des enfants

Les dernières selles de l'enfant ont été jetées ou rincées dans des toilettes ou des latrines, ou l'enfant a utilisé des toilettes ou des latrines.

Échantillon : L'enfant le plus jeune de moins de 2 ans vivant avec la mère

Globalement, dans 59 % des cas, les matières fécales des plus jeunes enfants de moins de 2 ans vivant avec leur mère ont été évacuées de manière appropriée : soit l'enfant a utilisé des toilettes ou des latrines (4 %), soit les selles ont été jetées dans des toilettes ou des latrines (55 %). En revanche, d'autres méthodes moins appropriées ont été employées, telles que l'enfouissement (1 %), le dépôt à l'air libre (4 %), l'évacuation dans les égouts ou caniveaux (4 %), ou encore aux ordures (31 %), augmentant ainsi le risque de propagation des maladies (**Tableau 16.10**).

Répartition selon les variables sociodémographiques

- La proportion d'enfants dont les matières fécales ont été évacuées de manière appropriée a tendance à augmenter avec l'âge de l'enfant, passant de 41 % parmi ceux de 0 à 1 mois à 66 % de 18 à 23 mois.
- La proportion d'enfants dont les matières fécales ont été évacuées de manière appropriée est légèrement plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural (65 % contre 57 %).
- La proportion d'enfants dont les matières fécales ont été éliminées de manière appropriée augmente avec le niveau d'instruction de la mère, passant de 55 % lorsque celle-ci n'a aucun niveau d'instruction à 67 % lorsqu'elle a atteint le niveau secondaire ou plus.

16.4 LAVAGE DES MAINS

Installation de lavage des mains

Élémentaire

Disponibilité d'une installation de lavage des mains sur place avec de l'eau et du savon

Limitée

Disponibilité d'une installation de lavage des mains sur place sans eau ni savon

Échantillon : Population de droit pour laquelle un endroit pour se laver les mains a été observé ou sans endroit pour se laver les mains dans le logement, la cour ou la parcelle. Exclut la population de droit pour laquelle la permission d'observer l'installation n'a pas été accordée.

Le lavage des mains est une étape importante pour la surveillance de l'hygiène et pour la prévention de la transmission de maladies. En lieu et place de questions directes posées sur la pratique du lavage des mains, pouvant donner lieu à des surestimations, les enquêteurs ont demandé à voir l'endroit où les membres du ménage se lavent le plus souvent les mains. Un endroit pour se laver les mains a été observé pour 79 % de la population de droit ; dans 8 %, il s'agissait d'un endroit fixe et dans 71 % des cas d'un endroit mobile (**Tableau 16.11**).

Conformément aux descriptions des installations de lavage des mains conçues par le JMP, 19 % de la population disposent d'une installation élémentaire de lavage des mains et 61 % d'une installation limitée.

Répartition selon les variables sociodémographiques

- Le pourcentage de population disposant d'installation élémentaire pour le lavage des mains varie de 16 % en milieu rural à 30 % en milieu urbain.
- Le pourcentage de la population disposant d'une installation élémentaire pour le lavage des mains est plus élevé dans la capitale, Bamako (36 %), la région de Koulikoro (29 %) et nettement plus faible dans la région de Tombouctou (7 %).
- Le pourcentage de la population disposant d'une installation élémentaire pour le lavage des mains augmente en fonction du quintile de bien-être économique, passant de 4 % pour le quintile le plus bas à 44 % pour le quintile le plus élevé.

16.5 HYGIÈNE MENSTRUELLE

Produits d'hygiène menstruelle adaptés

Serviettes hygiéniques réutilisables, serviettes hygiéniques jetables, tampons, coupe menstruelle, tissu, papier hygiénique et/ou ouate.

Échantillon : Femmes de 15–49 ans ayant eu leurs règles au cours de la dernière année

Intimité et utilisation de produits d'hygiène menstruelle adaptés

Pourcentage de femmes qui ont pu se laver et se changer en toute intimité et ayant utilisé des produits adaptés lors de leurs dernières règles.

Échantillon : Femmes de 15–49 ans ayant eu leurs règles au cours de la dernière année et qui étaient chez elles lors de leurs dernières règles.

Parmi les femmes de 15–49 ans dont la période menstruelle la plus récente a eu lieu au cours de la dernière année, 55 % ont utilisé un vêtement, 25 % des serviettes hygiéniques réutilisables, 17 % de la laine ou du

coton, 8 % des serviettes hygiéniques jetables, et 4 % utilisaient des sous-vêtements seulement (**Tableau 16.12**).

Parmi les femmes dont la dernière période menstruelle a eu lieu dans la dernière année et qui se trouvaient chez elles durant leur dernière période menstruelle, la quasi-totalité (97 %) ont pu se laver ou se changer en privé et 95 % ont pu se changer en privé et utilisé des produits appropriés pendant leurs dernières périodes menstruelles.

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- L'utilisation d'un vêtement lors de la période menstruelle augmente avec l'âge, passant de 51 % parmi les femmes de 15–19 ans à 62 % parmi celles de 45–49 ans.
- L'utilisation des serviettes hygiéniques jetables lors des périodes menstruelles est deux fois plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural (12 % contre 6 %) ; L'utilisation de ce produit augmente avec le niveau d'instruction des femmes, passant de 4 % parmi celles sans niveau d'instruction à 15 % parmi celles ayant le niveau secondaire ou plus. De même, du quintile le plus bas au plus élevé, l'utilisation de serviettes hygiéniques jetables passe de 3 % à 14 %.
- Le pourcentage de femmes qui utilisent un vêtement est plus élevé dans les régions de Sikasso (85 %) et de Mopti (66 %) tandis que le recours aux serviettes hygiéniques jetables est plus élevé dans les régions de Mopti (12 %) et de Ségou (10 %) ainsi que dans le district da Bamako (13 %).

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur les caractéristiques de l'eau et de l'assainissement, consultez les tableaux suivants :

- **Tableau 16.1 Eau utilisée par les ménages pour boire**
- **Tableau 16.2 Échelle des services d'eau de boisson**
- **Tableau 16.3 Personne qui collecte l'eau de boisson**
- **Tableau 16.4 Disponibilité d'eau à boire en quantités suffisantes**
- **Tableau 16.5 Moyen de traitement de l'eau de boisson des ménages**
- **Tableau 16.6 Types d'installations sanitaires utilisées par les ménages**
- **Tableau 16.7 Échelle des services d'assainissement**
- **Tableau 16.8 Vidange et évacuation des excréments des installations sanitaires sur place**
- **Tableau 16.9 Gestion des excréments humains des ménages**
- **Tableau 16.10 Évacuation des selles des enfants**
- **Tableau 16.11 Lavage des mains**
- **Tableau 16.12 Hygiène menstruelle**

Tableau 16.1 Eau utilisée par les ménages pour boire

Répartition (en %) des ménages et de la population de droit par provenance de l'eau pour boire et en fonction du temps pour s'approvisionner en eau, selon le milieu de résidence, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Ménages					Population				
Caractéristique	Bamako	Autre urbain	Ensemble urbain	Rural	Ensemble	Bamako	Autre urbain	Ensemble urbain	Rural	Ensemble
Source d'approvisionnement en eau de boisson										
Source améliorée	99,6	91,3	96,0	78,2	83,1	99,7	88,8	94,8	76,8	81,1
Robinet dans logement/ concession/cour/parcelle	54,1	44,3	49,9	10,1	21,1	57,1	45,1	51,7	10,5	20,3
Robinet chez le voisin	7,2	10,1	8,5	3,4	4,8	7,1	8,3	7,6	2,9	4,0
Robinet public/fontaine	22,5	12,4	18,1	22,1	21,0	20,7	11,9	16,8	20,2	19,4
Puits à pompe/forage	10,1	7,2	8,8	30,4	24,5	10,6	6,5	8,8	31,0	25,7
Puits creusé protégé	1,0	15,4	7,3	10,5	9,6	1,7	15,8	8,1	11,1	10,4
Source protégée	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,3	0,2
Eau de pluie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Camion-citerne/charrette avec petite citerne	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,4	0,5	0,4	0,4
Eau en bouteille/en sachet	4,1	1,3	2,9	0,7	1,3	1,9	0,7	1,4	0,3	0,6
Source non-améliorée	0,4	8,7	4,0	20,7	16,1	0,3	11,2	5,2	22,2	18,2
Puits creusé non protégé	0,3	8,4	3,8	19,8	15,3	0,3	10,9	5,1	21,4	17,5
Source d'eau non protégée	0,1	0,3	0,2	0,9	0,7	0,0	0,4	0,2	0,8	0,7
Eau de surface	0,0	0,0	0,0	1,1	0,8	0,0	0,0	0,0	1,0	0,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Temps de trajet pour s'approvisionner en eau de boisson (aller-retour)										
Eau sur place[1]	68,7	78,1	72,8	31,3	42,8	71,2	78,6	74,6	32,8	42,8
30 minutes ou moins	25,2	19,3	22,6	59,1	49,0	23,3	19,0	21,4	57,9	49,2
Plus de 30 minutes	4,4	2,2	3,4	9,5	7,8	4,1	2,1	3,2	9,1	7,7
Ne sait pas	1,8	0,4	1,2	0,2	0,4	1,3	0,3	0,9	0,1	0,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de ménages/population	1 509	1 171	2 680	6 987	9 667	11 261	9 246	20 507	65 843	86 350

[1] Y compris l'eau provenant d'un robinet chez le voisin et un temps d'approvisionnement aller-retour de zéro minute.

Tableau 16.2 Échelle des services d'eau de boisson

Répartition (en %) de la population de droit par échelle de service d'eau de boisson, selon certaines caractéristiques socio-économiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique socio-économique	Au moins un service élémentaire[1]	Service limité[2]	Non amélioré[3]	Eau de surface	Total	Effectif de personnes
Résidence						
Bamako	94,2	5,4	0,3	0,0	100,0	11 261
Autre urbain	86,4	2,4	11,2	0,0	100,0	9 246
Ensemble urbain	90,7	4,1	5,2	0,0	100,0	20 507
Rural	69,9	6,9	22,2	1,0	100,0	65 843
Région						
Kayes	64,8	7,2	26,0	2,1	100,0	12 728
Koulikoro	73,8	4,9	21,3	0,0	100,0	20 164
Sikasso	73,9	3,5	22,6	0,0	100,0	16 286
Ségou	75,3	4,6	20,1	0,0	100,0	13 691
Mopti	68,7	13,2	16,9	1,1	100,0	8 044
Tombouctou	81,5	7,9	6,1	4,5	100,0	1 561
Gao	66,6	18,7	5,9	8,9	100,0	2 586
Kidal	†	†	†	†	100,0	30
Bamako	94,2	5,4	0,3	0,0	100,0	11 261
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	55,1	6,0	38,9	0,0	100,0	17 282
Second	63,5	6,7	29,2	0,6	100,0	17 276
Moyen	72,3	8,4	16,3	2,9	100,0	17 254
Quatrième	86,1	7,8	5,9	0,3	100,0	17 272
Le plus élevé	97,2	2,3	0,5	0,0	100,0	17 266
Ensemble	74,8	6,2	18,2	0,8	100,0	86 350

Note : Le concept/définition de l'échelle des services d'eau de boisson a été créé par le Programme Commun OMS/UNICEF de suivi de l'eau, de l'assainissement et de l'Hygiène (WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation, and Hygiene (JMP)).
[1] Définie comme de l'eau de boisson provenant d'une source améliorée, qu'elle se trouve sur place ou que le temps de collecte, incluant l'aller-retour, soit de 30 minutes ou moins. Y compris l'eau de boisson gérée en toute sécurité, qui n'est pas présentée séparément.
[2] Définie comme l'eau de boisson provenant d'une source améliorée, que le temps de collecte dépasse 30 minutes ou qu'il soit inconnu
[3] L'eau de boisson provient de puits creusés non protégés ou sources non protégées.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 16.3 Personne qui collecte l'eau de boisson

Pourcentage de la population de droit dans les ménages qui ne disposent pas d'eau à boire sur place et répartition (en %) de la population de droit dans les ménages sans eau potable sur place par la personne qui habituellement collecte l'eau de boisson utilisée dans le ménage, selon certaines caractéristiques socio-économiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique socioéconomique	Pourcentage de la population de droit ne disposant pas d'eau potable sur place[1]	Effectif de personnes	Personne qui habituellement collecte l'eau de boisson					Total	Nombre de personnes sans eau à boire sur place[1]
			Femme adulte de 15 ans ou plus	Homme adulte de 15 ans ou plus	Jeune fille de moins de 15 ans	Jeune garçon de moins de 15 ans	Personne qui n'est pas du ménage		
Résidence									
Bamako	28,8	11 261	66,1	10,5	7,9	6,4	9,1	100,0	3 238
Autre urbain	21,4	9 246	72,7	9,5	9,0	4,2	4,6	100,0	1 979
Ensemble urbain	25,4	20 507	68,6	10,1	8,3	5,5	7,4	100,0	5 217
Rural	67,2	65 843	72,2	8,4	11,0	5,8	2,6	100,0	44 214
Région									
Kayes	66,2	12 728	75,5	6,9	9,8	4,1	3,6	100,0	8 427
Koulikoro	51,9	20 164	77,9	6,8	9,4	5,3	0,7	100,0	10 459
Sikasso	52,2	16 286	72,6	7,1	13,8	6,3	0,2	100,0	8 509
Ségou	70,6	13 691	70,3	9,3	9,7	7,0	3,7	100,0	9 671
Mopti	77,4	8 044	68,3	10,1	12,9	7,0	1,8	100,0	6 230
Tombouctou	73,0	1 561	65,8	18,3	9,6	4,1	2,1	100,0	1 139
Gao	66,9	2 586	49,1	15,6	11,9	4,5	18,9	100,0	1 731
Kidal	†	30	†	†	†	†	†	100,0	28
Bamako	28,8	11 261	66,1	10,5	7,9	6,4	9,1	100,0	3 238
Source de l'eau de boisson									
Améliorée	56,6	69 992	71,0	8,3	11,2	5,9	3,5	100,0	39 605
Non améliorée	58,6	15 700	75,7	9,3	8,2	5,2	1,5	100,0	9 197
Eau de surface	95,5	659	60,9	16,9	12,9	8,8	0,5	100,0	629
Quintile de bien-être économique									
Le plus bas	78,2	17 282	72,7	9,4	11,3	4,9	1,7	100,0	13 516
Second	78,9	17 276	76,2	6,4	9,8	6,3	1,3	100,0	13 623
Moyen	69,0	17 254	71,9	8,1	11,2	5,1	3,6	100,0	11 913
Quatrième	44,0	17 272	63,8	11,1	10,6	7,2	7,2	100,0	7 604
Le plus élevé	16,1	17 266	67,3	10,5	10,0	6,6	5,6	100,0	2 775
Ensemble	57,2	86 350	71,8	8,6	10,7	5,8	3,1	100,0	49 432

[1] Exclut l'eau canalisée chez un voisin et ceux ayant déclaré un temps de collecte, incluant l'aller-retour, de zéro minutes.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 16.4 Disponibilité d'eau à boire en quantités suffisantes

Pourcentage de la population de droit disposant de quantités suffisantes d'eau à boire, à la demande, selon certaines caractéristiques socio-économiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique socio-économique	Pourcentage avec de l'eau à boire disponible en quantités suffisantes[1]	Effectif de personnes
Résidence		
Bamako	83,8	11 261
Autre urbain	74,7	9 246
Ensemble urbain	79,7	20 507
Rural	81,0	65 843
Région		
Kayes	75,1	12 728
Koulikoro	75,5	20 164
Sikasso	88,8	16 286
Ségou	91,0	13 691
Mopti	71,8	8 044
Tombouctou	73,0	1 561
Gao	61,4	2 586
Kidal	†	30
Bamako	83,8	11 261
Source de l'eau de boisson		
Améliorée	79,9	69 992
Non améliorée	84,0	15 700
Eau de surface	81,3	659
Temps de trajet pour s'approvisionner en eau de boisson (aller-retour)		
Eau sur place[2]	83,0	36 919
30 minutes ou moins	81,2	42 516
Plus de 30 minutes	64,7	6 673
Ne sait pas	84,3	242
Quintile de bien-être économique		
Le plus bas	85,4	17 282
Second	82,5	17 276
Moyen	81,2	17 254
Quatrième	76,3	17 272
Le plus élevé	78,0	17 266
Ensemble	80,7	86 350

[1] Défini comme ayant eu des quantités d'eau à boire suffisantes au cours du mois dernier.
[2] Comprend l'eau connectée à un voisin et ceux ayant déclaré un temps de collecte de l'eau aller-retour de zéro minute.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 16.5 Moyen de traitement de l'eau de boisson des ménages

Pourcentage de la population de droit utilisant diverses méthodes pour traiter l'eau de boisson, et pourcentage utilisant une méthode appropriée pour le traitement de l'eau, selon certaines caractéristiques socio-économiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique socio-économique	Ébullition	Ajout de javel/chlore	Passée à travers un linge	Céramique, sable ou autre filtre	Désinfection solaire	Laisser reposer et se déposer	Ne sait pas	Aucun traitement	Pourcentage utilisant une méthode appropriée de traitement[1]	Effectif de personnes
Résidence										
Bamako	0,3	5,3	1,5	0,3	0,0	1,6	0,2	92,1	5,8	11 261
Autre urbain	0,1	22,2	4,1	0,4	0,0	0,0	0,0	76,4	22,4	9 246
Ensemble urbain	0,2	12,9	2,6	0,4	0,0	0,9	0,1	85,0	13,2	20 507
Rural	0,2	16,3	7,7	0,4	0,0	0,7	0,0	77,9	16,7	65 843
Région										
Kayes	0,5	13,5	10,7	0,6	0,0	0,4	0,1	77,3	14,2	12 728
Koulikoro	0,0	15,1	8,5	0,3	0,0	0,6	0,0	78,6	15,4	20 164
Sikasso	0,0	26,3	5,5	0,3	0,0	0,7	0,0	71,2	26,3	16 286
Ségou	0,2	17,0	7,1	0,0	0,0	0,4	0,0	78,4	17,1	13 691
Mopti	0,3	14,1	3,7	0,7	0,0	1,1	0,0	83,5	14,7	8 044
Tombouctou	0,1	4,6	0,7	0,0	0,1	0,5	0,1	94,0	4,8	1 561
Gao	0,0	8,3	8,8	1,6	0,1	2,2	0,2	81,7	10,0	2 586
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	†	†	30
Bamako	0,3	5,3	1,5	0,3	0,0	1,6	0,2	92,1	5,8	11 261
Source de l'eau de boisson										
Améliorée	0,1	12,1	3,2	0,3	0,0	0,5	0,0	85,3	12,3	69 992
Non améliorée	0,6	30,7	20,9	0,8	0,0	1,8	0,1	54,9	31,5	15 700
Eau de surface	1,2	20,0	16,1	2,4	0,0	3,4	0,1	61,7	22,5	659
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	0,1	17,4	8,4	0,4	0,0	0,8	0,0	75,6	17,8	17 282
Second	0,1	15,8	10,8	0,4	0,0	0,9	0,1	77,1	16,0	17 276
Moyen	0,2	18,2	8,3	0,2	0,0	0,8	0,0	75,6	18,6	17 254
Quatrième	0,2	18,3	3,4	0,5	0,0	0,4	0,0	79,1	18,6	17 272
Le plus élevé	0,2	7,7	1,6	0,3	0,0	1,0	0,1	90,3	8,2	17 266
Ensemble	0,2	15,5	6,5	0,4	0,0	0,8	0,0	79,6	15,8	86 350

Note : Les enquêtés peuvent déclarer plusieurs méthodes de traitement de l'eau et, par conséquent, la somme des pourcentages peut dépasser 100 %.
[1] Les méthodes appropriées de traitement de l'eau sont l'ébullition, l'ajout de chlore, le filtrage et la désinfection solaire.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 16.6 Types d'installations sanitaires utilisées par les ménages

Répartition (en %) des ménages et de la population de droit par type d'installations sanitaires et répartition (en %) des ménages et de la population de droit disposant d'installations sanitaires par endroit où se trouvent ces installations, selon le milieu de résidence, EDSM-VII Mali 2023–2024

Type d'installations sanitaires et endroit où elles sont situées	Ménages					Population				
	Bamako	Autre urbain	Ensemble urbain	Rural	Ensemble	Bamako	Autre urbain	Ensemble urbain	Rural	Ensemble
Installations sanitaires améliorées	97,6	83,3	91,3	64,4	71,9	98,0	80,7	90,2	66,6	72,2
Chasse d'eau/chasse d'eau manuelle connectée à un système d'égout	4,0	1,4	2,9	0,2	0,9	4,7	1,7	3,3	0,1	0,9
Chasse d'eau/chasse d'eau manuelle reliée à une fosse septique	20,1	4,9	13,4	2,2	5,3	18,0	3,8	11,6	1,8	4,1
Chasse d'eau/chasse d'eau manuelle reliée à une fosse d'aisances	5,8	2,6	4,4	0,6	1,6	6,9	2,3	4,8	0,5	1,5
Chasse d'eau/chasse d'eau manuelle, mais ne sait pas où	0,1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1
Fosse d'aisances améliorée ventilée	2,1	1,7	1,9	1,1	1,3	1,9	2,0	1,9	0,9	1,1
Fosse d'aisances avec dalle	65,5	72,3	68,5	60,1	62,4	66,5	70,6	68,3	63,2	64,4
Toilettes à compostage	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Installations sanitaires non améliorées	2,3	15,5	8,1	26,2	21,1	1,9	18,6	9,4	26,1	22,1
Chasse d'eau/chasse d'eau manuelle non reliée à des égouts/fosse septiques/fosse d'aisances	0,0	0,3	0,1	0,2	0,2	0,0	0,4	0,2	0,1	0,1
Fosse d'aisances sans dalle/trou ouvert	2,3	14,9	7,8	24,3	19,8	1,9	18,0	9,2	24,4	20,7
Seau	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Toilettes/latrines suspendues	0,0	0,1	0,1	1,6	1,2	0,0	0,1	0,0	1,6	1,2
Défécation en plein air (pas de toilettes/nature)	0,1	1,2	0,6	9,5	7,0	0,1	0,8	0,4	7,3	5,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de ménages/ population	1 509	1 171	2 680	6 987	9 667	11 261	9 246	20 507	65 843	86 350
Endroit où se trouvent les installations sanitaires										
Dans le logement	24,7	14,1	20,1	7,6	11,3	23,1	14,8	19,3	7,7	10,6
Dans la cour/concession/ parcelle	74,8	84,4	79,0	86,6	84,4	76,5	83,9	79,8	87,6	85,6
Ailleurs	0,5	1,5	0,9	5,8	4,4	0,5	1,3	0,8	4,8	3,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de ménages/ population disposant d'installations sanitaires	1 507	1 157	2 665	6 326	8 991	11 253	9 175	20 428	61 049	81 477

Tableau 16.7 Échelle des services d'assainissement

Répartition (en %) de la population de droit par type de service d'assainissement, selon certaines caractéristiques socio-économiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique socio-économique	Au moins un service élémentaire[1]	Un service limité[2]	Non amélioré[3]	Défécation en plein air	Total	Effectif de personnes
Résidence						
Bamako	61,1	36,9	1,9	0,1	100,0	11 261
Autre urbain	57,8	22,8	18,6	0,8	100,0	9 246
Ensemble urbain	59,7	30,5	9,4	0,4	100,0	20 507
Rural	54,0	12,7	26,1	7,3	100,0	65 843
Région						
Kayes	61,1	15,4	18,0	5,5	100,0	12 728
Koulikoro	62,6	10,6	23,1	3,6	100,0	20 164
Sikasso	49,1	13,3	34,7	2,9	100,0	16 286
Ségou	58,3	11,8	27,4	2,5	100,0	13 691
Mopti	38,5	21,1	18,8	21,6	100,0	8 044
Tombouctou	27,5	5,1	41,7	25,7	100,0	1 561
Gao	37,0	29,7	14,4	18,8	100,0	2 586
Kidal	†	†	†	†	100,0	30
Bamako	61,1	36,9	1,9	0,1	100,0	11 261
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	41,9	8,5	39,7	9,9	100,0	17 282
Second	47,7	10,8	31,8	9,7	100,0	17 276
Moyen	54,0	15,2	23,1	7,7	100,0	17 254
Quatrième	57,8	30,1	11,2	0,9	100,0	17 272
Le plus élevé	75,3	19,8	4,9	0,0	100,0	17 266
Ensemble	55,3	16,9	22,1	5,6	100,0	86 350

Note : Le concept/définition de l'échelle des services d'assainissement a été créé par le Programme Commun OMS/UNICEF de suivi de l'eau, de l'assainissement et de l'Hygiène (WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation, and Hygiene (JMP)).
[1] Définie comme l'utilisation d'installations sanitaires améliorées qui ne sont pas partagées avec d'autres ménages. Y compris des installations sanitaires gérées en toute sécurité, et qui ne sont pas présentées séparément.
[2] Définie comme l'utilisation d'installations sanitaire améliorées partagées par 2 ménages ou plus.
[3] Utilisation de toilettes à chasse d'eau/chasse d'eau manuelle non connectée à des égouts ou des fosses septiques ou les fosses d'aisances, les fosses d'aisances sans dalle/trou ouvert, toilettes/latrines suspendues ou seaux.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 16.8 Vidange et évacuation des excréments des installations sanitaires sur place

Répartition (en %) de la population de droit dans les ménages disposant de fosses septiques et de latrines améliorées par méthode de vidange et d'évacuation des excréments, et pourcentage de la population avec des installations sanitaires sur place dont les excréments ont été éliminés en toute sécurité sur place, pourcentage avec des installations sanitaires sur place dont les excréments ont été éliminés de manière non sécuritaire et pourcentage avec des installations sanitaires sur place dont les excréments ont été éliminés pour être traités, selon certaines caractéristiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Répartition (en%) des méthodes de vidange et d'évacuation des excréments des fosses septiques ou d'autres installations sanitaires sur place								Pourcentage de population avec des installations sanitaires sur place dont :			
Caractéristique socioéconomique	Évacués par un prestataire de services à la station d'épuration	Évacués par un prestataire de services, mais ne sait pas où	Enterrés dans une fosse recouverte	Évacués dans une fosse non recouverte, un terrain à l'air libre, un plan d'eau ou ailleurs	Ne sait pas où les excréments ont été emmenés	Jamais vidés	Ne sait pas si les excréments ont déjà été vidés	Total	Les excréments sont évacués en toute sécurité sur place[1]	Les excréments sont évacués de manière non sécuritaire[2]	Les excréments sont évacués pour être traités[3]	Effectif de personnes disposant d'installations sanitaires améliorées sur place
Type d'installation sanitaire												
Chasse d'eau connectée à fosse septique	0,6	44,0	0,0	0,0	1,6	49,9	3,9	100,0	53,8	0,0	46,2	3 573
Latrines et autres installations améliorées	1,0	23,4	1,2	6,3	1,1	65,2	1,9	100,0	68,3	6,3	25,4	57 945
Chasse d'eau connectée à fosse latrines	1,2	54,2	0,3	1,9	0,0	42,1	0,3	100,0	42,6	1,9	55,5	1 304
Fosses Latrines ventilées améliorées	0,0	26,7	3,1	8,1	1,1	60,5	0,4	100,0	64,0	8,1	27,8	976
Fosse latrines avec dalle	1,0	22,6	1,2	6,4	1,1	65,9	1,9	100,0	69,0	6,4	24,7	55 608
Toilettes à compostage	0,0	20,2	0,0	29,5	0,0	48,4	2,0	100,0	50,3	29,5	20,2	57
Résidence												
Bamako	3,4	61,4	0,2	1,2	2,4	29,5	1,9	100,0	31,6	1,2	67,2	10 506
Autre urbain	1,4	34,4	2,0	1,9	2,1	55,0	3,3	100,0	60,3	1,9	37,8	7 277
Ensemble urbain	2,6	50,3	0,9	1,5	2,3	39,9	2,5	100,0	43,4	1,5	55,2	17 784
Rural	0,3	14,1	1,2	7,8	0,6	74,3	1,8	100,0	77,2	7,8	15,0	43 734
Région												
Kayes	0,2	10,1	0,7	4,2	0,2	81,0	3,6	100,0	85,2	4,2	10,5	9 661
Koulikoro	1,1	19,9	1,6	4,2	0,7	70,3	2,3	100,0	74,2	4,2	21,6	14 683
Sikasso	0,2	17,1	1,6	7,9	0,2	72,2	0,8	100,0	74,7	7,9	17,4	10 138
Ségou	0,1	16,7	0,5	15,7	0,7	65,5	0,9	100,0	66,8	15,7	17,4	9 544
Mopti	0,5	22,6	0,6	4,5	3,2	66,8	1,8	100,0	69,2	4,5	26,3	4 769
Tombouctou	0,0	18,5	4,2	0,3	1,3	73,8	2,0	100,0	79,9	0,3	19,8	499
Gao	0,0	16,4	5,4	0,1	3,0	70,8	4,1	100,0	80,4	0,1	19,5	1 695
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	†	97,0	†	†	23
Bamako	3,4	61,4	0,2	1,2	2,4	29,5	1,9	100,0	31,6	1,2	67,2	10 506
Quintile de bien-être économique												
Le plus bas	0,0	6,9	1,0	14,4	0,1	77,3	0,4	100,0	78,7	14,4	6,9	8 694
Second	0,0	6,0	1,3	12,2	0,5	79,1	0,9	100,0	81,3	12,2	6,5	10 109
Moyen	0,0	13,3	1,8	4,8	0,7	77,6	1,7	100,0	81,1	4,8	14,1	11 944
Quatrième	0,7	29,9	1,1	3,5	2,0	59,3	3,5	100,0	63,9	3,5	32,6	15 076
Le plus élevé	3,2	49,7	0,4	0,5	1,4	42,5	2,3	100,0	45,3	0,5	54,3	15 696
Ensemble	1,0	24,6	1,1	6,0	1,1	64,4	2,0	100,0	67,4	6,0	26,6	61 517

Note : Les installations sanitaires sur place comprennent les installations dans lesquelles les excréments sont conservés dans une fosse septique, fosse latrines ou des toilettes à compostage.
[1] Y compris les fosses septiques et les latrines dans lesquelles les excréments ont été enterrés dans une fosse couverte, les déchets jamais vidés et ne sait pas où ils ont été vidés.
[2] Y compris les fosses septiques et les latrines dans lesquelles les excréments ont été vidés dans des fosses non recouvertes, des terrains à l'air libre, des plans d'eau ou d'autres locations.
[3] Y compris les fosses septiques et les latrines dans lesquelles les excréments ont été évacués par un prestataire de services à la station d'épuration ou dans un endroit inconnu ou qui ont été évacués par un non-professionnel dans un endroit inconnu
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 16.9 Gestion des excréments humains des ménages

Répartition (en %) de la population de droit par gestion des excréments humains d'installations sanitaires des ménages, selon certaines caractéristiques socio-économiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique socioéconomique	Connectées à un système d'égout	Utilisation d'installations sanitaires améliorées sur place et			Utilisation d'installations sanitaires améliorées, location sur place inconnue	Utilisation d'installations sanitaires non améliorées	Défécation en plein air	Total	Pourcentage connecté à un système d'égout, dont les excréments sont évacués en toute sécurité sur place ou évacués pour être traités hors site	Effectif de personnes
		Évacuation en toute sécurité sur place des excréments d'installations sanitaires situées sur place	Évacuation non sécuritaire des excréments humains des installations sanitaires sur place	Évacuation des excréments humains pour être traités hors site						
Résidence										
Bamako	4,7	31,3	20,0	42,0	0,0	1,9	0,1	100,0	78,0	11 261
Autre urbain	1,7	50,0	13,9	14,8	0,3	18,6	0,8	100,0	66,5	9 246
Ensemble urbain	3,3	39,7	17,2	29,7	0,1	9,4	0,4	100,0	72,8	20 507
Rural	0,1	51,9	10,3	4,2	0,1	26,1	7,3	100,0	56,2	65 843
Région										
Kayes	0,7	64,7	7,1	4,1	0,0	18,0	5,5	100,0	69,4	12 728
Koulikoro	0,4	54,3	8,9	9,6	0,1	23,1	3,6	100,0	64,3	20 164
Sikasso	0,0	47,8	10,1	4,3	0,2	34,7	2,9	100,0	52,2	16 286
Ségou	0,3	47,3	19,9	2,5	0,1	27,4	2,5	100,0	50,1	13 691
Mopti	0,2	42,2	11,7	5,4	0,2	18,8	21,6	100,0	47,8	8 044
Tombouctou	0,4	28,6	0,5	2,9	0,3	41,7	25,7	100,0	31,8	1 561
Gao	0,1	56,4	2,8	6,3	1,1	14,4	18,8	100,0	62,8	2 586
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	†	†	30
Bamako	4,7	31,3	20,0	42,0	0,0	1,9	0,1	100,0	78,0	11 261
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	0,0	39,7	10,1	0,5	0,1	39,7	9,9	100,0	40,2	17 282
Second	0,0	48,1	9,8	0,6	0,0	31,8	9,7	100,0	48,7	17 276
Moyen	0,0	56,8	10,1	2,3	0,0	23,1	7,7	100,0	59,1	17 254
Quatrième	0,4	57,5	14,0	15,8	0,3	11,2	0,9	100,0	73,7	17 272
Le plus élevé	4,0	42,8	15,8	32,3	0,2	4,9	0,0	100,0	79,1	17 266
Ensemble	0,9	49,0	12,0	10,3	0,1	22,1	5,6	100,0	60,1	86 350

Note : Les installations sanitaires sur place comprennent les installations dans lesquelles les excréments sont conservés dans une fosse septique, fosse latrines ou des toilettes à compostage.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 16.10 Évacuation des selles des enfants

Répartition (en %) des enfants les plus jeunes de moins de 2 ans vivant avec leur mère par moyen d'évacuation des dernières matières fécales de l'enfant et pourcentage d'enfants dont les matières fécales ont été évacuées de manière appropriée, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Moyen d'évacuation des matières fécales							Total	Pourcentage d'enfants les matières fécales ont été évacuées de manière appropriée[1]	Effectif d'enfants
	L'enfant a utilisé les toilettes ou latrines	Jetées/ rincées dans toilettes ou latrines	Enterrées	Jetées/ rincées dans égouts ou caniveaux	Jetées aux ordures	Laissées à l'air libre	Autre			
Âge de l'enfant en mois										
0–1	1,3	39,7	1,3	5,4	41,8	6,9	3,5	100,0	41,1	569
2–3	2,5	42,3	1,0	4,9	43,5	4,4	1,4	100,0	44,9	595
4–5	2,5	50,5	1,6	5,8	35,2	4,0	0,4	100,0	53,0	547
6–8	1,9	59,8	1,0	3,5	29,6	3,8	0,3	100,0	61,8	690
9–11	3,7	57,0	0,5	4,7	31,2	2,8	0,2	100,0	60,7	768
12–17	4,8	60,4	1,2	3,7	27,0	2,9	0,1	100,0	65,1	1 482
18–23	5,0	61,4	1,1	3,2	25,6	3,6	0,0	100,0	66,4	1 240
6–23	4,2	60,0	1,0	3,7	27,8	3,2	0,1	100,0	64,1	4 180
Types d'installations sanitaires[2]										
Installations sanitaires améliorées	3,9	59,3	0,7	4,0	28,8	2,5	0,7	100,0	63,1	4 278
Installations sanitaires non améliorées	3,4	51,7	1,8	5,5	34,7	2,9	0,1	100,0	55,0	1 289
Défécation en plein air	0,6	18,1	3,1	1,1	52,4	23,7	1,0	100,0	18,7	323
Résidence										
Bamako	1,4	57,0	0,2	4,6	35,9	0,8	0,2	100,0	58,3	705
Autre urbain	4,1	68,4	0,7	4,6	20,9	1,0	0,3	100,0	72,5	567
Ensemble urbain	2,6	62,1	0,4	4,6	29,2	0,9	0,3	100,0	64,6	1 272
Rural	3,8	53,5	1,3	4,1	32,0	4,6	0,7	100,0	57,3	4 619
Région										
Kayes	0,3	59,1	0,5	6,2	28,4	5,3	0,1	100,0	59,5	920
Koulikoro	5,2	54,0	0,5	1,3	35,9	1,9	1,2	100,0	59,2	1 406
Sikasso	5,5	61,1	0,4	4,1	25,3	2,7	0,8	100,0	66,7	1 145
Ségou	0,7	55,1	2,4	6,3	33,0	2,2	0,3	100,0	55,8	923
Mopti	9,0	45,7	0,5	2,0	30,3	12,2	0,4	100,0	54,6	548
Tombouctou	1,2	48,1	3,5	2,1	28,4	16,7	0,0	100,0	49,4	76
Gao	3,1	35,4	11,9	12,4	29,4	6,5	1,3	100,0	38,5	166
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	100,0	†	2
Bamako	1,4	57,0	0,2	4,6	35,9	0,8	0,2	100,0	58,3	705
Niveau d'instruction de la mère										
Aucun	3,1	51,4	1,3	4,4	34,5	4,7	0,7	100,0	54,5	3 369
Primaire	4,1	58,4	0,9	3,6	27,9	4,4	0,7	100,0	62,5	1 033
Secondaire ou plus	4,4	62,2	0,7	4,2	27,0	1,2	0,4	100,0	66,5	1 489
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	3,1	45,4	0,7	4,2	39,7	5,7	1,4	100,0	48,4	1 237
Second	3,2	49,2	0,8	4,1	34,6	7,4	0,7	100,0	52,4	1 204
Moyen	3,5	58,6	3,0	3,9	27,2	3,5	0,4	100,0	62,1	1 180
Quatrième	4,0	64,1	0,8	5,6	23,9	1,4	0,2	100,0	68,1	1 199
Le plus élevé	4,2	60,4	0,2	3,0	31,4	0,6	0,1	100,0	64,7	1 071
Ensemble	3,6	55,3	1,1	4,2	31,4	3,8	0,6	100,0	58,9	5 891

[1] On considère que les matières fécales des enfants sont évacuées de manière appropriée si l'enfant utilise les toilettes ou les latrines ou si les matières fécales sont jetées ou rincées dans des toilettes ou les latrines.
[2] Se référer au tableau 16.6 pour la définition des catégories.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 16.11 Lavage des mains

Pourcentage de la population de droit pour laquelle l'endroit le plus souvent utilisé pour se laver les mains a été observé selon que l'endroit est fixe ou mobile et pourcentage de l'ensemble la population pour laquelle l'endroit pour se laver les mains a été observé; et parmi la population de droit pour laquelle l'endroit pour se laver les mains a été observé, pourcentage disposant d'eau, pourcentage disposant de savon et pourcentage disposant d'autres produits nettoyants autre que le savon; pourcentage de la population de droit disposant d'installation de lavage des mains de base et pourcentage disposant d'installation de lavage limitée, selon certaines caractéristiques socio-économiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique socioéconomique	Pourcentage de la population de droit pour laquelle l'endroit utilisé pour se laver les mains a été observé et dont:			Effectif de la population	L'endroit pour se laver les mains a été observé et :			Effectif de la population pour laquelle l'endroit utilisé pour se laver les mains a été observé	Pourcentage de la population de droit disposant d'installation élémentaire pour le lavage des mains[3]	Pourcentage de la population de droit disposant d'installation limité pour le lavage des mains[4]	Effectif de la population pour laquelle l'endroit utilisé pour se laver les mains a été observé ou sans endroit dans l'habitation, la cour ou la parcelle pour se laver les mains
	L'endroit pour se laver les mains est fixe	L'endroit pour se laver les mains est mobile	Ensemble		Eau disponible	Savon disponible[1]	Des produits nettoyants autres que le savon disponibles[2]				
Résidence											
Bamako	17,9	70,6	88,5	11 261	52,0	44,9	0,5	9 968	35,8	52,7	11 258
Autre urbain	12,9	61,7	74,6	9 246	51,7	35,8	0,9	6 900	22,3	53,0	9 155
Ensemble urbain	15,7	66,6	82,3	20 507	51,9	41,1	0,6	16 868	29,8	52,9	20 413
Rural	5,4	72,4	77,7	65 843	56,6	21,2	1,6	51 174	15,6	62,9	65 250
Région											
Kayes	5,6	82,4	88,0	12 728	54,4	13,7	0,3	11 199	9,9	79,3	12 555
Koulikoro	5,7	75,8	81,5	20 164	72,2	35,5	0,1	16 433	28,7	53,4	20 030
Sikasso	6,1	59,8	65,9	16 286	50,3	19,0	0,7	10 726	10,3	56,1	16 164
Ségou	6,7	61,8	68,5	13 691	45,3	18,2	4,1	9 379	11,3	58,0	13 535
Mopti	9,2	84,1	93,2	8 044	47,1	21,5	1,0	7 501	18,7	74,9	8 014
Tombouctou	6,3	44,8	51,2	1 561	53,3	17,1	17,3	798	7,1	44,7	1 541
Gao	4,4	73,8	78,1	2 586	47,1	21,8	8,6	2 021	16,3	63,4	2 536
Kidal	†	†	†	30	†	†	†	17	†	†	30
Bamako	17,9	70,6	88,5	11 261	52,0	44,9	0,5	9 968	35,8	52,7	11 258
Quintile de bien-être économique											
Le plus bas	3,9	71,3	75,2	17 282	50,5	5,8	0,3	12 995	4,1	71,7	17 142
Second	3,3	72,5	75,8	17 276	52,0	11,7	1,3	13 089	7,6	68,9	17 103
Moyen	3,8	73,3	77,1	17 254	52,8	20,0	2,5	13 302	13,9	64,1	17 056
Quatrième	7,1	71,5	78,6	17 272	56,4	34,4	2,2	13 577	25,2	54,2	17 112
Le plus élevé	21,1	66,3	87,3	17 266	63,9	54,0	0,8	15 079	43,8	43,6	17 250
Ensemble	7,8	71,0	78,8	86 350	55,4	26,1	1,4	68 042	19,0	60,5	85 663

[1] Comprend le savon ou un produit nettoyant en morceau, liquide, en poudre ou sous forme de pâte.
[2] Les produits nettoyants autres que le savon comprennent des produits disponibles localement comme la cendre, la boue ou le sable.
[3] Disponibilité d'installation pour le lavage des mains avec du savon et de l'eau.
[4] Disponibilité d'installation pour le lavage des mains sans du savon et/ou de l'eau.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 16.12 Hygiène menstruelle

Parmi les femmes de 15–49 ans dont la période menstruelle la plus récente a eu lieu l'année dernière, pourcentage ayant utilisé des produits spécifiques pour recueillir ou absorber le sang de leur dernière période menstruelle; parmi les femmes de 15–49 ans dont la période menstruelle la plus récente a eu lieu l'année dernière et qui se trouvaient à la maison durant leur dernière période menstruelle, pourcentage qui pouvaient se laver et se changer en privé pendant qu'elles étaient à la maison et pourcentage qui pouvaient se laver et s'habiller en privé et qui ont utilisé des produits appropriés durant leur dernière période menstruelle, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Parmi les femmes dont la période menstruelle la plus récente a eu lieu au cours de l'année dernière, pourcentage ayant utilisé des produits spécifiques pour recueillir ou absorber le sang de leur dernière période menstruelle											Parmi les femmes dont la période menstruelle la plus récente a eu lieu au cours de l'année dernière et qui se trouvaient à la maison durant leur dernière période menstruelle		
Caractéristique socioéconomique	Serviettes hygiéniques réutilisables	Serviettes hygiéniques jetables	Tampons	Coupe menstruelle	Vêtement	Papier toilette	Coton, laine	Sous-vêtement seulement	Autre	Rien	Effectif de femmes	Pourcentage ayant pu se laver ou se changer en privé	Pourcentage ayant pu se laver ou se changer en privé et qui ont utilisé des produits appropriés au cours de leur dernière période menstruelle[1]	Effectif de femmes
Âge														
15–19	23,5	8,8	0,1	0,1	51,0	0,3	21,3	4,8	0,0	0,3	3 419	95,8	93,4	3 412
20–24	24,9	9,8	0,2	0,0	50,1	0,2	21,2	4,1	0,0	0,1	2 694	97,0	95,3	2 691
25–29	25,8	7,4	0,2	0,0	55,5	0,2	16,6	3,9	0,0	0,0	2 216	97,6	95,7	2 213
30–34	26,0	8,0	0,1	0,1	55,1	0,3	14,9	4,1	0,0	0,0	1 873	96,9	95,1	1 871
35–39	24,2	6,5	0,0	0,1	59,9	0,2	13,0	3,4	0,0	0,1	1 673	96,8	94,9	1 670
40–44	26,7	4,8	0,2	0,1	60,6	0,1	11,1	3,8	0,0	0,1	1 303	96,1	94,1	1 303
45–49	25,9	5,7	0,3	0,1	61,8	0,0	8,2	4,0	0,0	0,0	846	95,5	93,7	846
Résidence														
Bamako	29,4	12,7	0,2	0,0	46,7	0,4	21,7	0,5	0,0	0,1	2 376	98,1	97,7	2 367
Autre urbain	20,0	9,7	0,3	0,0	43,5	0,1	33,0	3,3	0,0	0,1	1 759	97,6	95,9	1 757
Ensemble urbain	25,4	11,5	0,2	0,0	45,4	0,3	26,5	1,7	0,0	0,1	4 135	97,9	96,9	4 124
Rural	24,8	6,3	0,1	0,1	58,6	0,2	13,0	5,2	0,0	0,1	9 890	96,1	93,6	9 882
Région														
Kayes	43,4	5,8	0,0	0,1	42,5	0,2	15,2	12,3	0,0	0,0	2 068	94,9	92,4	2 068
Koulikoro	33,4	6,8	0,0	0,1	46,2	0,4	17,2	1,0	0,0	0,1	3 274	98,6	98,0	3 267
Sikasso	3,9	1,6	0,2	0,0	84,5	0,0	13,4	1,7	0,0	0,2	2 303	96,6	95,8	2 302
Ségou	24,7	10,4	0,3	0,0	56,1	0,2	16,3	1,1	0,0	0,1	2 100	98,6	98,2	2 100
Mopti	9,2	12,0	0,2	0,1	66,3	0,0	10,6	7,2	0,0	0,0	1 222	96,8	90,0	1 222
Tombouctou	20,5	2,3	1,3	0,7	41,6	0,1	29,4	11,3	0,0	0,2	243	92,4	83,6	242
Gao	10,3	9,8	0,2	0,0	29,6	0,2	30,4	23,3	0,1	0,5	434	74,4	58,0	434
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	†	†	†	5	†	†	5
Bamako	29,4	12,7	0,2	0,0	46,7	0,4	21,7	0,5	0,0	0,1	2 376	98,1	97,7	2 367

À suivre...

Tableau 16.12—*Suite*

Caractéristique socioéconomique	Parmi les femmes dont la période menstruelle la plus récente a eu lieu au cours de l'année dernière, pourcentage ayant utilisé des produits spécifiques pour recueillir ou absorber le sang de leur dernière période menstruelle										Effectif de femmes	Parmi les femmes dont la période menstruelle la plus récente a eu lieu au cours de l'année dernière et qui se trouvaient à la maison durant leur dernière période menstruelle		Effectif de femmes
	Serviettes hygiéniques réutilisables	Serviettes hygiéniques jetables	Tampons	Coupe menstruelle	Vêtement	Papier toilette	Coton, laine	Sous-vêtement seulement	Autre	Rien		Pourcentage ayant pu se laver ou se changer en privé	Pourcentage ayant pu se laver ou se changer en privé et qui ont utilisé des produits appropriés au cours de leur dernière période menstruelle[1]	
Niveau d'instruction														
Aucun	25,2	4,0	0,1	0,1	63,5	0,1	7,7	5,2	0,0	0,1	7 281	95,7	92,8	7 274
Primaire	29,6	6,4	0,2	0,0	54,2	0,2	15,0	5,3	0,0	0,1	2 338	97,2	95,2	2 334
Secondaire ou plus	22,2	14,9	0,2	0,1	40,3	0,4	33,4	1,7	0,0	0,1	4 406	97,8	97,2	4 398
Quintile de bien-être économique														
Le plus bas	22,8	2,5	0,2	0,1	72,5	0,1	2,6	3,3	0,0	0,2	2 208	96,2	94,4	2 207
Second	27,4	4,0	0,0	0,1	64,6	0,1	4,7	5,6	0,0	0,1	2 377	95,7	93,1	2 370
Moyen	26,5	5,8	0,1	0,1	56,7	0,1	12,7	8,9	0,0	0,0	2 612	95,5	91,8	2 611
Quatrième	26,8	8,7	0,2	0,1	50,1	0,1	21,8	3,0	0,0	0,1	3 110	96,4	94,7	3 108
Le plus élevé	22,3	14,2	0,2	0,0	40,2	0,5	32,2	1,3	0,0	0,1	3 718	98,4	97,6	3 709
Ensemble	25,0	7,8	0,2	0,1	54,7	0,2	17,0	4,1	0,0	0,1	14 025	96,6	94,6	14 006

[1] Serviettes hygiéniques réutilisables, serviettes hygiéniques jetables, tampons, coupe menstruelle, vêtement, papier toilette et/ou coton laine

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

EXCISION 17

Principaux Résultats

- ***Prévalence de l'excision :*** Environ neuf femmes de 15–49 ans sur dix (89 %) et 70 % des filles de 0–14 ans sont excisées.
- ***Âge à l'excision :*** Pour 36 % des filles de 0–14 ans excisées, l'excision a eu lieu avant l'âge d'un an ; pour 28 % d'entre elles, elle a été effectuée entre 1–4 ans et pour 5 % d'entre elles, entre 5–9 ans.
- ***Personne ayant effectué excision :*** Les excisions sont effectuées principalement par une exciseuse traditionnelle : 97 % des filles de 0–14 ans et 93 % des femmes de 15–49 ans ont été excisées par des exciseuses traditionnelles.
- ***Opinion concernant l'excision :*** L'excision est perçue comme étant une nécessité religieuse pour 66 % des femmes et 53 % des hommes de 15–49 ans. De plus, 80 % des femmes et 72 % des hommes de 15–49 ans ont déclaré que la pratique de l'excision doit continuer.

Les mutilations génitales féminines/excision (MGF/E), définies par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), regroupent toutes les pratiques qui entrainent une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme et/ou des lésions aux organes génitaux pour des raisons culturelles ou à des fins non médicales (OMS, UNICEF, et UNFPA 1997). Les MGF/E, considérées comme une violation des droits humains, constituent une pratique séculaire profondément enracinée dans les croyances et perceptions.

Par son ampleur et ses conséquences graves sur la santé, l'excision au Mali constitue un réel problème de santé publique. Plusieurs services techniques, associations et organisations non gouvernementales (ONG) mènent depuis plusieurs années la lutte pour l'abandon de la pratique de l'excision. En 1996, un Comité national d'action pour l'abandon des pratiques néfastes à la santé de la femme et de l'enfant (CNAPN) a été créé sous l'égide du Commissariat à la promotion de la femme. Ce comité a été remanié en juin 1999 par le décret N° 99–157/PM-RM. Il est composé de représentants des départements ministériels, des institutions de la République, des services techniques et des associations /ONG. Ce comité a élaboré un plan quinquennal d'action pour la période 1999–2003. Le CNAPN est représenté dans les régions administratives par les comités régionaux. En juin 2002, la volonté politique du Gouvernement à faire face au problème de l'excision s'est concrétisée par la création du Programme national de lutte contre la pratique de l'excision (PNLE).

La loi N°2019–014 du 3 juillet 2019, a été adoptée par les autorités maliennes pour créer le Programme national pour l'abandon des violences basés sur le genre (PNVBG) en vue de prévenir toutes les formes de violence basées sur le genre.

L'OMS classifie les mutilations génitales féminines en quatre catégories principales :

Type I: Ablation partielle ou totale du gland clitoridien et/ou du prépuce /capuchon clitoridien.

Type II: Ablation totale ou partielle du gland clitoridien et des petites lèvres.

Type III: Rétrécissement de l'orifice vaginal par recouvrement, réalisé en sectionnant et en repositionnant les petites lèvres, ou les grandes lèvres, parfois par suture (infibulation).

Type IV : Toutes les formes d'interventions néfastes au niveau des organes génitaux féminins à des fins non médicales comme piquer, percer, inciser racler et cautériser les organes génitaux.

Au cours de l'EDSM-VII 2023–2024, des informations ont été collectées sur l'excision auprès de toutes les femmes de 15–49 ans et de tous les hommes de 15–64 ans. Les questions posées aux femmes portaient sur la connaissance et la prévalence de l'excision et sur l'opinion concernant cette pratique. Il a aussi été demandé aux femmes de 15–49 ans si elles étaient excisées, l'âge au moment de l'excision et le type d'excision pratiquée. En outre, on a demandé aux femmes qui avaient des filles de 0–14 ans si leurs filles étaient déjà excisées et on a posé des questions sur l'excision pour chacune des filles. Les questions posées aux hommes concernaient leur connaissance et leurs opinions concernant cette pratique.

17.1 CONNAISSANCE DES ENQUÊTÉS SUR L'EXCISION

La quasi-totalité des femmes de 15–49 ans (98 %) et des hommes de 15–64 ans (93 %) ont entendu parler de l'excision (**Tableau 17.1**).

Les pourcentages de femmes et d'hommes qui ont entendu parler de l'excision sont très élevés dans toutes les régions, à l'exception de Gao où ils sont de 55 % parmi les femmes et de 57 % parmi les hommes.

17.2 EXCISION PARMI LES FEMMES

17.2.1 Prévalence et type d'excision

Au Mali, 89 % des femmes de 15–49 ans ont déclaré être excisées (**Tableau 17.2**). Le type d'excision le plus fréquemment effectué consiste à pratiquer une entaille et à enlever des chairs qui renvoie au type II (54 %) et dans 25 % des cas, une entaille a été pratiquée mais des chairs n'ont pas été enlevées (type I). Enfin, 3 % des femmes ont eu leur vagin fermé par une suture (type III). Il faut aussi mentionner que 17 % des femmes n'ont pas été en mesure de répondre (**Graphique 17.1**).

***Graphique 17.1* Type d'excision**

Pourcentage parmi les femmes de 15–49 ans excisées



Répartition selon certaines caractéristiques sociodémographiques

- La prévalence de l'excision est très élevée, quelle que soit la caractéristique sociodémographique. Elle ne varie pas avec l'âge, ni avec le niveau d'instruction ou le quintile de bien-être économique
- À l'exception des régions de Mopti (77 %), de Tombouctou (12 %) et surtout de Gao où la prévalence est extrêmement faible (1 %), le pourcentage de femmes excisées dépasse 90 % dans toutes les régions (**Carte 17.1**).

La prévalence de l'excision est faible dans les ethnies Sonrai (29 %) et Touareg/Bella (15 %).

Carte 17.1 Prévalence de l'excision, par région

Pourcentage de femmes de 15–49 ans qui sont excisées



Note : Pour des raisons d'insécurité, les données de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région et ne sont pas présentées séparément.

Tendances : La comparaison des résultats des enquêtes réalisées depuis 1995–1996 ne fait pas apparaître de variation importante de la pratique de l'excision. En effet, de 94 % en 1995–1996 (EDSM-II), la prévalence est passée à 89 % en 2023–2024 (EDSM-VII) (**Graphique 17.2**).

Graphique 17.2 Excision : tendances

Pourcentage de femmes de 15–49 ans qui sont excisées

EDSM-II 1995–1996	EDSM-III 2001	EDSM-IV 2006	EDSM-V 2012–2013	EDSM-VI 2018	EDSM-VII 2023–2024

17.2.2 Âge à l'excision parmi les femmes

La répartition des femmes de 15–49 ans excisées selon l'âge au moment de l'excision montre que près des trois quarts (73 %) des femmes l'ont été avant l'âge de 5 ans (**Tableau 17.3**). En outre, 19 % des femmes ont été excisées entre 5–9 ans, 6 % entre 10 et 14 ans, et enfin, moins de 1 % des femmes à un âge plus tardif, c'est-à-dire à 15 ans ou plus (**Graphique 17.3**).

Graphique 17.3 Âge à l'excision



Répartition selon certaines caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage de femmes excisées avant l'âge de 5 ans tend à augmenter des générations anciennes aux plus récentes passant de 63 % parmi les femmes de 45–49 ans à 71 % parmi celles de 30–34 ans et à 82 % parmi celles de 15–19 ans.
- Le pourcentage de femmes excisées avant l'âge de 5 ans est légèrement élevé en milieu urbain qu'en milieu rural (77 % contre 72 %).
- Quelle que soit la région, l'excision se pratique, dans la majorité des cas, avant l'âge de 10 ans.
- Le pourcentage de femmes excisées avant l'âge de 5 ans augmente du quintile de bien être le plus bas (62%) au quintile de bien être le plus élevé (80%).

17.3 EXCISION DES FILLES

En plus de déclarer si elles étaient elles-mêmes excisées, les femmes ont été interviewées sur l'excision de leurs filles : on leur a posé une série de questions pour chacune des filles vivantes de 0–14 ans. Si une femme déclarait qu'elle n'avait jamais entendu parler de l'excision, on supposait que leurs filles n'étaient pas excisées.

Prévalence et l'âge à l'excision des filles de 0–14 ans

Dans l'ensemble, 70 % des filles de 0–14 ans ont été excisées. La plupart des filles ont été excisées avant l'âge de 5 ans (36 % avant d'atteindre un an et 28 % entre l'âge de 1–4 ans). C'est seulement dans 5 % des cas que les filles ont été excisées entre 5 et 14 ans (**Tableau 17.4**).

Répartition selon certaines caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage de filles excisées varie de manière importante selon que la mère est excisée ou pas. Quand la mère est excisée, 77 % des filles ont aussi subi cette pratique contre seulement 9 % quand la mère n'est pas excisée.
- Le pourcentage de filles excisées varie selon les régions (de 5 % dans la région de Tombouctou à 88 % dans celle de Kayes) (**Tableau 17.5**).

Les questions posées au cours de l'EDSM-VII 2023–2024 ont permis d'estimer la prévalence de différentes formes d'excision parmi les filles. Aux femmes ayant déclaré que leur fille était excisée, on a demandé si leur orifice vaginal avait été cousu (procédure connue sous le nom d'infibulation).

- Dans l'ensemble 5 % des filles de 0–14 ans excisées ont subi une infibulation (**Tableau 17.6**).

- Le pourcentage de filles de 0–14 ans ayant subi une infibulation varie selon les régions, de 1 % dans le District de Bamako et la région de Ségou à 22 % dans la région de Tombouctou (**Tableau 17.6**).

17.4 PERSONNE QUI A EFFECTUÉ L'EXCISION

L'enquête a inclus des questions sur la personne qui a effectué l'excision. Le **Tableau 17.7** présente le pourcentage de filles de 0–14 ans et de femmes de 15–49 ans excisées par âge actuel selon la personne qui a effectué l'excision, par type d'excision.

Qu'il s'agisse des femmes ou des filles, l'excision a été effectuée par un praticien traditionnel, en grande majorité, une exciseuse traditionnelle (93 % parmi les femmes et 97 % parmi les filles)

17.5 EXCISION DANS LE TEMPS

Le **Graphique 17.4** présente l'intérêt de pouvoir comparer directement le pourcentage de femmes de 15–49 ans excisées à chaque âge selon leur déclaration et le pourcentage de filles excisées (statut actuel) à chaque âge.

Graphique 17.4 **Âge à l'excision parmi les femmes et les filles**



On constate qu'à l'âge de 5 ans, près des deux-tiers des femmes de 15–49 ans étaient déjà excisées (65 %) alors que parmi les filles de 0–14 ans, les trois quarts le sont actuellement (75 %). À 10 ans, 81 % des femmes de 15–49 ans avaient subi cette pratique contre 85 % des filles de 10 ans qui l'ont déjà subi. Cette tendance se maintient jusqu'à l'âge de 11 ans, âge auquel la proportion de femmes excisées devient pratiquement la même que pour les filles excisées (84 % et 85 %). Ce rapprochement de l'âge à l'excision entre les femmes et les filles continue au-delà de l'âge de 11 ans : à l'âge de 14 ans, 87 % des femmes de 15–49 ans étaient excisées contre 88 % des filles au même âge.

Ces résultats ne montrent pas une tendance à la baisse de la pratique de l'excision.

17.6 OPINION CONCERNANT L'EXCISION

On a demandé aux femmes de 15–49 ans et aux hommes de 15–64 ans qui ont déclaré avoir entendu parler de l'excision si, selon eux, cette pratique était exigée par la religion et si elle devait continuer.

Globalement, 66 % des femmes et 53 % des hommes de 15–49 ans pensent que l'excision est une pratique exigée par la religion. De plus, 80 % des femmes et 72 % des hommes ont déclaré que la pratique de l'excision doit continuer (**Tableaux 17.8** et **17.9**).

Répartition selon certaines caractéristiques sociodémographiques

- Les pourcentages de femmes qui pensent que l'excision est une pratique exigée par la religion et qui sont favorables au maintien de cette pratique sont plus élevés parmi celles qui sont excisées que parmi celles qui ne le sont pas. Parmi les femmes excisées, 71 % pensent que l'excision est une pratique exigée par la religion et 86 % pensent que cette pratique doit continuer. Parmi les femmes non excisées, 16 % pensent que l'excision est une pratique religieuse et 15 % pensent que cette pratique doit continuer (**Graphique 17.5**).

- L'opinion des femmes selon laquelle l'excision est une nécessité religieuse est plus répandue dans les régions de Kayes (77 %), de Ségou (73 %) et de Koulikoro (70 %) que dans celle de Mopti (59 %). De même, le pourcentage de femmes favorables au maintien de la pratique est plus élevé dans des régions comme celles de Kayes (87 %), Koulikoro et Ségou (84 %), Sikasso (83 %) qui sont aussi des régions de forte prévalence d'excision. Par contre, dans les régions de Gao, et Tombouctou, les pourcentages de femmes qui pensent que la pratique de l'excision doit continuer sont nettement plus faibles, respectivement 2 % et 6 %.

Graphique 17.5 **Opinion concernant l'excision, selon que la femme est excisée ou non**



LISTE DES TABLEAUX

Pour des informations plus détaillées sur les MGF/E, consulter les tableaux ci-dessous :

- **Tableau 17.1 Connaissance de l'excision**
- **Tableau 17.2 Prévalence de l'excision**
- **Tableau 17.3 Âge à l'excision**
- **Tableau 17.4 Prévalence de l'excision et âge à l'excision: Filles de 0–14 ans**
- **Tableau 17.5 Excision des filles de 0–14 ans selon les caractéristiques sociodémographiques de la mère**
- **Tableau 17.6 Infibulation parmi les filles de 0–14 ans excisées**
- **Tableau 17.7 Aspects de l'excision parmi les filles excisées de 0 14 ans et les femmes de 15–49 ans**
- **Tableau 17.8 Opinion des femmes et des hommes sur l'excision, en tant que nécessité religieuse**
- **Tableau 17.9 Opinion des femmes et des hommes sur la poursuite ou non de cette pratique**

Tableau 17.1 Connaissance de l'excision

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans qui ont entendu parler de l'excision, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Femme		Homme	
Caractéristique sociodémographique	Ont entendu parler de l'excision	Effectif de femmes	Ont entendu parler de l'excision	Effectif d'hommes
Âge				
15–19	96,9	3 862	86,4	1 669
20–24	97,7	3 378	93,3	1 165
25–29	98,1	2 905	95,4	930
30–34	98,1	2 382	95,8	909
35–39	98,5	2 065	94,6	784
40–44	97,9	1 586	96,9	663
45–49	98,3	1 169	95,5	568
Religion				
Musulmane	97,8	16 439	93,0	6 278
Chrétienne	98,6	480	95,5	189
Animiste	(100,0)	52	91,9	96
Sans religion/autre	98,3	377	85,0	123
Ethnie				
Bambara	99,6	5 384	93,0	2 045
Malinke	99,7	1 780	97,5	800
Peulh	98,9	2 281	94,2	816
Sarakole/Soninke/Marka	99,7	1 898	93,3	620
Kassonke	100,0	153	86,8	53
Sonraï	86,3	711	85,3	262
Dogon	97,9	1 286	98,4	456
Touareg/Bella	62,2	410	60,8	161
Sénoufo/Minianka	99,2	1 868	92,3	811
Bobo	99,1	437	93,5	157
Bozo	99,7	592	99,3	177
Arabe/Maure	90,2	158	86,7	46
Autre ethnie malienne	99,5	230	88,3	215
Pays CEDEAO	96,7	70	*	23
Autres pays africains	(96,0)	47	(100,0)	36
Autres nationalités	(98,2)	40	*	7
Résidence				
Bamako	99,4	2 675	97,7	1 177
Autre urbain	97,4	2 048	91,4	795
Ensemble urbain	98,5	4 723	95,2	1 971
Rural	97,5	12 624	92,0	4 714
Région				
Kayes	99,4	2 635	95,1	920
Koulikoro	99,3	4 018	87,7	1 637
Sikasso	99,1	3 143	93,6	1 215
Ségou	99,6	2 574	98,3	939
Mopti	98,3	1 530	96,1	505
Tombouctou	87,7	281	87,1	128
Gao	55,2	485	57,0	163
Kidal	†	6	†	2
Bamako	99,4	2 675	97,7	1 177
Niveau d'instruction				
Aucun	97,2	9 382	91,7	2 476
Primaire	98,1	2 926	91,3	1 352
Secondaire ou plus	98,7	5 039	94,7	2 858
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	99,2	3 036	92,4	1 179
Second	99,2	3 143	93,3	1 174
Moyen	95,7	3 318	89,4	1 190
Quatrième	96,2	3 676	92,3	1 446
Le plus élevé	98,7	4 174	96,0	1 697
Ensemble 15–49	97,8	17 347	92,9	6 686
50–64	na	na	95,5	1 143
Ensemble 15–64	na	na	93,3	7 829

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.
na = non applicable
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 17.2 Prévalence de l'excision

Pourcentage de femmes de 15–49 ans excisées et répartition (en %) des femmes excisées par type d'excision, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes excisées	Effectif de femmes	Type d'excision				Total	Effectif de femmes excisées
			Entaille, pas de chair enlevée	Entaille, chair enlevée	Vagin fermé par couture	Ne sait pais		
Âge								
15–19	86,5	3 862	23,0	52,6	3,1	21,3	100,0	3 339
20–24	88,5	3 378	25,7	53,2	3,8	17,4	100,0	2 991
25–29	89,4	2 905	25,4	55,6	3,5	15,5	100,0	2 597
30–34	89,3	2 382	24,6	56,6	3,4	15,4	100,0	2 126
35–39	88,6	2 065	27,1	54,0	3,5	15,3	100,0	1 830
40–44	90,4	1 586	24,6	55,4	2,7	17,4	100,0	1 433
45–49	89,6	1 169	25,7	53,0	3,9	17,5	100,0	1 048
Religion								
Musulmane	89,2	16 439	24,8	54,1	3,5	17,6	100,0	14 669
Chrétienne	63,6	480	23,9	56,2	2,2	17,7	100,0	305
Animiste	(95,1)	52	(18,3)	(72,7)	(2,7)	(6,3)	100,0	49
Sans religion/autre	90,5	377	34,7	53,9	2,1	9,4	100,0	341
Ethnie								
Bambara	97,5	5 384	20,2	58,4	2,8	18,6	100,0	5 248
Malinke	96,6	1 780	26,0	54,1	4,9	15,0	100,0	1 718
Peulh	94,1	2 281	17,9	56,5	4,5	21,0	100,0	2 147
Sarakole/Soninke/Marka	97,1	1 898	23,1	52,9	3,9	20,1	100,0	1 843
Kassonke	97,5	153	23,4	51,8	2,9	22,0	100,0	150
Sonraï	29,2	711	19,8	56,7	3,2	20,3	100,0	207
Dogon	73,1	1 286	47,9	35,1	3,1	13,8	100,0	941
Touareg/Bella	15,3	410	19,7	47,9	13,4	19,1	100,0	63
Sénoufo/Minianka	92,5	1 868	39,1	47,6	2,4	11,0	100,0	1 728
Bobo	71,9	437	22,2	56,7	3,7	17,4	100,0	314
Bozo	95,6	592	16,5	63,7	2,0	17,8	100,0	566
Arabe/Maure	56,8	158	14,3	58,3	3,5	23,9	100,0	90
Autre ethnie malienne	97,5	230	41,2	45,8	1,8	11,2	100,0	225
Pays CEDEAO	86,6	70	34,0	59,2	0,0	6,7	100,0	61
Autres pays africains	(73,5)	47	(35,9)	(56,2)	(0,0)	(7,8)	100,0	34
Autres nationalités	(73,6)	40	*	*	*	*	100,0	30
Résidence								
Bamako	91,7	2 675	36,8	44,4	1,2	17,5	100,0	2 454
Autre urbain	85,1	2 048	31,0	56,0	3,1	9,9	100,0	1 743
Ensemble urbain	88,9	4 723	34,4	49,2	2,0	14,4	100,0	4 197
Rural	88,5	12 624	21,4	56,1	3,9	18,5	100,0	11 168
Région								
Kayes	95,7	2 635	30,5	50,7	7,1	11,8	100,0	2 523
Koulikoro	95,2	4 018	5,1	69,0	4,6	21,4	100,0	3 825
Sikasso	93,8	3 143	32,4	49,6	1,8	16,2	100,0	2 948
Ségou	93,0	2 574	24,7	51,2	1,3	22,8	100,0	2 394
Mopti	77,4	1 530	34,1	53,0	4,2	8,6	100,0	1 184
Tombouctou	11,7	281	57,6	20,8	12,7	8,9	100,0	33
Gao	0,5	485	*	*	*	*	100,0	3
Kidal	†	6	†	†	†	†	100,0	1
Bamako	91,7	2 675	36,8	44,4	1,2	17,5	100,0	2 454
Niveau d'instruction								
Aucun	88,8	9 382	24,5	55,8	3,6	16,1	100,0	8 332
Primaire	89,6	2 926	23,5	54,4	3,6	18,5	100,0	2 622
Secondaire ou plus	87,5	5 039	26,7	51,0	3,0	19,3	100,0	4 410
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	93,7	3 036	27,1	56,2	3,2	13,6	100,0	2 843
Second	90,2	3 143	25,1	52,9	4,4	17,6	100,0	2 835
Moyen	83,8	3 318	21,4	57,6	3,4	17,5	100,0	2 781
Quatrième	87,7	3 676	22,4	55,0	3,6	18,9	100,0	3 224
Le plus élevé	88,2	4 174	28,2	50,5	2,6	18,8	100,0	3 681
Ensemble	88,6	17 347	25,0	54,2	3,4	17,4	100,0	15 364

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 17.3 Âge à l'excision

Répartition (en %) des femmes de 15–49 ans qui ont été excisées par âge à l'excision selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristiques sociodémographiques	Âge à l'excision					Total	Effectif de femmes excisées
	<5	5–9	10–14	15+	Ne sait pais		
Âge							
15–19	82,0	13,3	3,0	0,1	1,5	100,0	3 339
20–24	76,9	16,8	4,1	0,4	1,9	100,0	2 991
25–29	72,7	19,7	6,4	0,3	1,0	100,0	2 597
30–34	70,8	20,4	6,7	0,3	1,8	100,0	2 126
35–39	67,5	21,3	8,9	0,4	1,9	100,0	1 830
40–44	64,8	22,9	10,3	0,4	1,7	100,0	1 433
45–49	62,7	23,1	11,7	0,9	1,5	100,0	1 048
Religion							
Musulmane	73,8	18,2	6,0	0,3	1,6	100,0	14 669
Chrétienne	63,8	20,2	13,2	1,5	1,2	100,0	305
Animiste	(57,1)	(15,3)	(27,6)	(0,0)	(0,0)	100,0	49
Sans religion/autre	58,0	30,9	9,3	0,3	1,5	100,0	341
Ethnie							
Bambara	65,3	25,1	7,9	0,3	1,5	100,0	5 248
Malinke	85,4	9,7	3,3	0,2	1,3	100,0	1 718
Peulh	75,9	16,7	5,6	0,3	1,6	100,0	2 147
Sarakole/Soninke/Marka	87,9	7,9	2,7	0,1	1,5	100,0	1 843
Kassonke	93,7	3,3	2,4	0,0	0,6	100,0	150
Sonraï	79,5	9,9	8,2	0,0	2,4	100,0	207
Dogon	76,7	18,5	3,5	0,0	1,4	100,0	941
Touareg/Bella	82,0	9,0	5,4	0,0	3,6	100,0	63
Sénoufo/Minianka	63,3	23,6	9,9	0,9	2,2	100,0	1 728
Bobo	65,9	21,5	10,3	0,6	1,8	100,0	314
Bozo	68,9	20,0	8,5	0,6	2,0	100,0	566
Arabe/Maure	89,6	8,6	0,0	0,0	1,8	100,0	90
Autre ethnie malienne	72,6	20,4	5,1	0,4	1,5	100,0	225
Pays CEDEAO	80,2	15,7	2,9	0,0	1,2	100,0	61
Autres pays africains	(70,8)	(17,2)	(7,3)	(0,0)	(4,7)	100,0	34
Autres nationalités	*	*	*	*	*	100,0	30
Résidence							
Bamako	78,4	14,0	6,1	0,2	1,3	100,0	2 454
Autre urbain	75,1	17,9	4,7	0,2	2,1	100,0	1 743
Ensemble urbain	77,0	15,6	5,5	0,2	1,6	100,0	4 197
Rural	71,8	19,7	6,6	0,4	1,6	100,0	11 168
Région							
Kayes	95,0	3,6	1,2	0,1	0,2	100,0	2 523
Koulikoro	73,9	20,0	4,3	0,4	1,4	100,0	3 825
Sikasso	60,1	26,6	10,5	0,6	2,3	100,0	2 948
Ségou	61,7	25,8	10,1	0,5	2,0	100,0	2 394
Mopti	69,6	20,9	5,8	0,2	3,4	100,0	1 184
Tombouctou	87,7	11,2	0,6	0,0	0,5	100,0	33
Gao	*	*	*	*	*	100,0	3
Kidal	†	†	†	†	†	100,0	1
Bamako	78,4	14,0	6,1	0,2	1,3	100,0	2 454
Niveau d'instruction							
Aucun	68,8	21,4	7,6	0,4	1,8	100,0	8 332
Primaire	75,1	17,7	5,8	0,3	1,1	100,0	2 622
Secondaire ou plus	80,5	13,6	4,0	0,3	1,5	100,0	4 410
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	62,4	26,0	10,0	0,5	1,0	100,0	2 843
Second	71,4	20,3	6,7	0,4	1,2	100,0	2 835
Moyen	70,9	20,9	5,8	0,3	2,1	100,0	2 781
Quatrième	78,6	14,3	4,7	0,2	2,1	100,0	3 224
Le plus élevé	80,1	13,3	4,8	0,3	1,5	100,0	3 681
Ensemble	73,2	18,5	6,3	0,3	1,6	100,0	15 364

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 17.4 Prévalence de l'excision et âge à l'excision: Filles de 0–14 ans

Répartition (en %) des filles de 0–14 ans par âge à l'excision et pourcentage des filles excisées selon l'âge actuel, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Âge à l'excision								
Âge actuel	<1	1–4	5–9	10–14	Ne sait pas	Pourcentage non excisé	Total	Effectif de filles	Pourcentage de filles excisées
Âge actuel									
0–4	33,6	17,7	na	na	0,2	48,6	100,0	7 376	51,4
5–9	38,3	35,7	5,3	na	0,3	20,3	100,0	6 053	79,7
10–14	36,2	35,9	12,0	0,6	0,8	14,6	100,0	4 714	85,4
0–14	35,8	28,4	4,9	0,2	0,4	30,3	100,0	18 143	69,7

Note : L'information sur l'excision de la fille est basée sur la déclaration de la mère.
na = Non applicable pour cause de troncature.

Tableau 17.5 Excision des filles de 0–14 ans selon les caractéristiques sociodémographiques de la mère

Pourcentage de filles de 0–14 ans qui sont excisées, selon l'âge et les caractéristiques sociodémographiques de la mère, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristiques sociodémographiques	Âge actuel			Total
	0–4	5–9	10–14	0–14
Religion				
Musulmane	52,8	81,0	86,5	71,0
Chrétienne	15,7	38,7	48,1	31,8
Animiste	*	*	*	51,6
Sans religion	36,6	72,0	83,0	59,3
Ethnie				
Bambara	49,6	87,9	95,0	74,0
Malinke	69,8	92,0	97,8	84,9
Peulh	59,9	85,1	90,4	75,7
Sarakole/Soninke/Marka	73,2	91,9	94,4	85,2
Kassonke	84,3	96,5	91,3	90,3
Sonraï	10,1	20,3	22,2	17,0
Dogon	42,2	66,8	68,9	57,7
Touareg/Bella	6,1	8,0	10,3	7,7
Sénoufo/Minianka	43,8	77,9	87,7	66,7
Bobo	24,4	45,2	49,3	37,4
Bozo	47,4	85,5	92,4	71,7
Arabe/Maure	42,5	52,2	52,4	48,3
Autre ethnie malienne	56,0	85,7	(98,3)	74,7
Pays CEDEAO	*	*	*	74,9
Autres pays africains	(61,8)	*	*	(68,3)
Autres nationalités	*	*	*	(46,5)
Résidence				
Bamako	52,6	81,6	86,3	70,6
Autre urbain	46,5	72,2	80,4	63,5
Ensemble urbain	49,8	77,4	83,5	67,3
Rural	51,9	80,2	86,0	70,3
Région				
Kayes	80,0	93,0	94,4	88,3
Koulikoro	56,0	88,9	95,2	76,7
Sikasso	42,4	75,9	89,1	65,8
Ségou	49,6	85,6	89,9	72,5
Mopti	40,1	69,0	69,5	57,7
Tombouctou	4,1	6,3	4,2	4,9
Gao	*	*	*	*
Kidal	†	†	†	†
Bamako	52,6	81,6	86,3	70,6
Niveau d'instruction de la mère				
Aucun	52,2	80,2	86,3	71,6
Primaire	51,4	78,9	85,4	68,2
Secondaire ou plus	49,5	78,4	80,6	64,1
Excision de la mère				
Excisée	57,1	87,6	94,2	77,0
Non excisée	5,6	11,4	9,4	8,5
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	49,8	82,6	90,6	71,7
Second	52,4	82,9	87,5	72,4
Moyen	50,4	75,1	82,8	67,2
Quatrième	52,2	77,2	83,8	68,2
Le plus élevé	52,7	80,3	80,8	68,6
Ensemble	51,4	79,7	85,4	69,7

Note : L'information sur l'excision des filles est basée sur la déclaration de la mère. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 17.6 Infibulation parmi les filles de 0–14 ans excisées

Répartition (en %) des filles de 0–14 ans qui sont excisées selon qu'elles sont ou non infibulées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Infibulation		Total	Effectif de filles
	Vagin fermé par couture	Vagin non fermé par couture		
Religion				
Musulmane	4,7	95,3	100,0	12 208
Chrétienne	0,0	100,0	100,0	133
Animiste	(0,0)	(100,0)	100,0	39
Sans religion	0,8	99,2	100,0	264
Ethnie				
Bambara	3,9	96,1	100,0	4 318
Malinke	11,2	88,8	100,0	1 544
Peulh	4,6	95,4	100,0	1 749
Sarakole/Soninke/Marka	3,0	97,0	100,0	1 651
Kassonke	4,8	95,2	100,0	155
Sonraï	1,6	98,4	100,0	119
Dogon	3,0	97,0	100,0	824
Touareg/Bella	(10,9)	(89,1)	100,0	31
Sénoufo/Minianka	2,3	97,7	100,0	1 271
Bobo	5,7	94,3	100,0	162
Bozo	3,8	96,2	100,0	447
Arabe/Maure	4,1	95,9	100,0	90
Autre ethnie malienne	3,1	96,9	100,0	190
Pays CEDEAO	(0,0)	(100,0)	100,0	47
Autres pays africains	(0,0)	(100,0)	100,0	33
Autres nationalités	*	*	100,0	17
Résidence				
Bamako	0,9	99,1	100,0	1 458
Autre urbain	2,2	97,8	100,0	1 119
Ensemble urbain	1,5	98,5	100,0	2 577
Rural	5,4	94,6	100,0	10 068
Région				
Kayes	4,9	95,1	100,0	2 499
Koulikoro	11,5	88,5	100,0	3 164
Sikasso	1,5	98,5	100,0	2 371
Ségou	0,8	99,2	100,0	2 086
Mopti	2,1	97,9	100,0	1 053
Tombouctou	21,7	78,3	100,0	14
Gao	*	*	100,0	0
Kidal	†	†	100,0	1
Bamako	0,9	99,1	100,0	1 458
Niveau d'instruction de la mère				
Aucun	4,5	95,5	100,0	8 551
Primaire	4,9	95,1	100,0	1 910
Secondaire ou plus	4,5	95,5	100,0	2 184
Excision de la mère				
Excisée	4,5	95,5	100,0	12 513
Non excisée	7,7	92,3	100,0	132
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	2,3	97,7	100,0	2 804
Second	4,5	95,5	100,0	2 798
Moyen	5,8	94,2	100,0	2 540
Quatrième	5,7	94,3	100,0	2 444
Le plus élevé	4,9	95,1	100,0	2 059
Ensemble	4,6	95,4	100,0	12 645

Note : L'information sur l'excision des filles est basée sur la déclaration de la mère. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 17.7 Aspects de l'excision parmi les filles excisées de 0 14 ans et les femmes de 15–49 ans

Répartition (en %) des filles excisées de 0–14 ans par âge actuel et des femmes de 15–49 ans selon la personne qui a procédé à l'excision et selon le type d'excision, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Âge actuel				
Caractéristique d'excision	0–4	5–9	10–14	Filles de 0–14 ans	Femmes de 15–49 ans
Personne qui a procédé à l'excision					
Traditionnel	98,2	98,3	98,4	98,3	96,7
Exciseuse traditionnelle	96,6	97,1	97,1	96,9	93,2
Accoucheuse traditionnelle	1,6	1,1	1,3	1,3	1,2
Autre traditionnel	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
Professionnel de la santé	1,7	1,7	1,6	1,7	0,4
Médecin	0,3	0,4	0,3	0,4	0,1
Infirmière/sage-femme	1,4	1,3	1,3	1,3	0,3
Autre professionnel de la santé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ne sait pas/manquant	0,1	0,0	0,0	0,0	2,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Type d'excision					
Vagin fermé par couture	4,2	4,6	4,9	4,6	3,4
Vagin non fermé par couture	95,8	95,4	95,1	95,4	85,7
Ne sait pas/manquant	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ensemble	3 795	4 822	4 028	12 645	15 364

Note : L'information sur l'excision des filles est basée sur la déclaration de la mère.

Tableau 17.8 Opinion des femmes et des hommes sur l'excision, en tant que nécessité religieuse

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15–49 ans qui ont entendu parler de l'excision, selon qu'ils pensent ou non que l'excision est une exigence religieuse, en fonction de certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Femme					Homme				
Caractéristique sociodémographique	Exigée	Non exigée	Ne sait pas	Total	Effectif de femmes qui ont entendu parler de l'excision	Exigée	Non exigée	Ne sait pas	Total	Effectif d'hommes qui ont entendu parler de l'excision
Excision										
Excisée	71,3	19,8	8,9	100,0	15 364	na	na	na	na	na
Non excisée	15,9	67,4	16,6	100,0	1 601	na	na	na	na	na
Âge										
15–19	66,0	23,0	10,9	100,0	3 742	45,1	23,7	31,2	100,0	1 442
20–24	67,0	23,7	9,3	100,0	3 299	48,2	26,8	25,1	100,0	1 086
25–29	66,8	23,5	9,7	100,0	2 851	53,0	27,1	19,9	100,0	887
30–34	64,2	25,9	9,9	100,0	2 335	55,4	27,4	17,2	100,0	871
35–39	66,8	24,3	8,9	100,0	2 034	57,4	27,2	15,4	100,0	742
40–44	64,0	27,0	9,0	100,0	1 553	59,6	25,5	14,9	100,0	642
45–49	67,2	24,6	8,2	100,0	1 150	60,6	26,5	12,9	100,0	542
Religion										
Musulmane	68,0	23,1	9,0	100,0	16 070	55,1	25,6	19,3	100,0	5 839
Chrétienne	24,0	64,3	11,6	100,0	473	14,4	46,7	38,9	100,0	181
Animiste	(26,5)	(40,6)	(32,9)	100,0	52	8,0	22,3	69,6	100,0	88
Sans religion/Autre	44,1	20,9	35,0	100,0	370	12,4	21,9	65,6	100,0	105
Ethnie										
Bambara	71,1	18,3	10,6	100,0	5 361	56,2	22,9	20,8	100,0	1 903
Malinke	72,1	21,2	6,6	100,0	1 774	56,3	25,5	18,2	100,0	780
Peulh	71,5	19,1	9,4	100,0	2 256	58,0	20,4	21,6	100,0	769
Sarakole/Soninke/Marka	79,0	12,6	8,5	100,0	1 892	58,5	25,0	16,5	100,0	579
Kassonke	61,5	29,2	9,2	100,0	153	(46,8)	(37,9)	(15,3)	(100,0)	46
Sonraï	25,7	59,8	14,5	100,0	613	31,2	53,9	14,9	100,0	223
Dogon	47,8	42,8	9,5	100,0	1 259	49,7	34,5	15,8	100,0	449
Touareg/Bella	19,2	67,4	13,4	100,0	255	41,2	39,7	19,1	100,0	98
Sénoufo/Minianka	64,4	26,6	9,0	100,0	1 853	40,6	28,0	31,3	100,0	749
Bobo	36,6	53,9	9,5	100,0	433	21,3	26,6	52,1	100,0	146
Bozo	74,9	16,2	8,9	100,0	591	67,7	12,2	20,1	100,0	176
Arabe/Maure	41,9	40,9	17,2	100,0	143	62,1	29,3	8,6	100,0	40
Autre ethnie malienne	76,0	16,1	8,0	100,0	229	62,1	21,9	16,0	100,0	190
Pays CEDEAO	46,4	36,7	16,8	100,0	68	*	*	*	*	23
Autres pays africains	(60,7)	(32,6)	(6,8)	100,0	45	(16,8)	(60,0)	(23,3)	(100,0)	36
Autres nationalités	(59,4)	(20,1)	(20,5)	100,0	40	*	*	*	*	6
Résidence										
Bamako	60,7	27,9	11,5	100,0	2 658	55,1	31,2	13,7	100,0	1 149
Autre urbain	65,2	25,4	9,4	100,0	1 994	54,0	26,1	19,9	100,0	727
Ensemble urbain	62,6	26,8	10,6	100,0	4 651	54,7	29,2	16,1	100,0	1 876
Rural	67,4	23,3	9,3	100,0	12 314	51,6	24,7	23,7	100,0	4 336
Région										
Kayes	76,6	18,3	5,1	100,0	2 619	62,7	18,8	18,5	100,0	875
Koulikoro	70,2	18,0	11,8	100,0	3 990	51,0	39,4	9,6	100,0	1 435
Sikasso	64,6	25,9	9,5	100,0	3 114	41,9	18,9	39,2	100,0	1 138
Ségou	72,9	16,2	10,9	100,0	2 563	52,5	8,6	38,9	100,0	923
Mopti	58,9	35,7	5,4	100,0	1 503	67,8	20,7	11,5	100,0	485
Tombouctou	7,9	77,4	14,7	100,0	246	32,0	66,1	1,8	100,0	112
Gao	2,0	83,0	15,0	100,0	268	23,5	67,2	9,4	100,0	93
Kidal	†	†	†	100,0	4	†	†	†	†	2
Bamako	60,7	27,9	11,5	100,0	2 658	55,1	31,2	13,7	100,0	1 149
Niveau d'instruction										
Aucun	68,0	22,3	9,8	100,0	9 122	54,6	22,2	23,1	100,0	2 271
Primaire	68,1	23,0	8,9	100,0	2 870	53,3	22,6	24,1	100,0	1 235
Secondaire ou plus	61,5	28,6	9,9	100,0	4 973	50,4	30,9	18,7	100,0	2 706

À suivre...

Tableau 17.8—*Suite*

Caractéristique sociodémographique	Femme					Homme				
	Exigée	Non exigée	Ne sait pas	Total	Effectif de femmes qui ont entendu parler de l'excision	Exigée	Non exigée	Ne sait pas	Total	Effectif d'hommes qui ont entendu parler de l'excision
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	66,0	23,0	11,0	100,0	3 013	53,2	20,9	25,9	100,0	1 089
Second	68,1	23,6	8,2	100,0	3 118	53,1	23,5	23,4	100,0	1 095
Moyen	66,6	24,7	8,7	100,0	3 176	50,1	21,9	28,0	100,0	1 064
Quatrième	68,0	23,0	9,0	100,0	3 538	51,6	29,8	18,6	100,0	1 335
Le plus élevé	62,5	26,4	11,1	100,0	4 120	54,0	31,0	15,0	100,0	1 629
Ensemble 15–49	66,1	24,2	9,7	100,0	16 965	52,5	26,1	21,4	100,0	6 212
50–64	na	na	na	na	na	58,0	25,8	16,2	100,0	1 092
Ensemble 15–64	na	na	na	na	na	53,3	26,0	20,6	100,0	7 304

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.
na = non applicable
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 17.9 Opinion des femmes et des hommes sur la poursuite ou non de cette pratique

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15–49 ans qui ont entendu parler de l'excision selon qu'ils pensent que cette pratique doit continuer ou non, par certaines caractéristique sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Femme					Homme				
Caractéristique sociodémographique	Doit continuer	Ne doit pas continuer	NSP/ça dépend	Total	Effectif de femmes qui ont entendu parler de l'excision	Doit continuer	Ne doit pas continuer	NSP/ça dépend	Total	Effectif d'hommes qui ont entendu parler de l'excision
Excision										
Excisée	86,2	10,5	3,4	100,0	15 364	na	na	na	na	na
Non excisée	15,0	74,3	10,7	100,0	1 601	na	na	na	na	na
Âge										
15–19	77,9	16,9	5,1	100,0	3 742	62,4	18,3	19,3	100,0	1 442
20–24	80,4	16,4	3,2	100,0	3 299	66,8	19,7	13,5	100,0	1 086
25–29	81,0	15,3	3,7	100,0	2 851	75,5	14,6	9,9	100,0	887
30–34	79,5	17,0	3,5	100,0	2 335	79,3	12,8	7,9	100,0	871
35–39	79,0	16,6	4,4	100,0	2 034	78,4	14,6	7,0	100,0	742
40–44	80,1	15,1	4,7	100,0	1 553	77,1	14,6	8,3	100,0	642
45–49	77,4	18,9	3,7	100,0	1 150	77,0	14,7	8,3	100,0	542
Religion										
Musulmane	80,6	15,4	3,9	100,0	16 070	73,6	15,6	10,9	100,0	5 839
Chrétienne	38,8	53,3	7,8	100,0	473	39,4	44,0	16,6	100,0	181
Animiste	(85,4)	(14,6)	(0,0)	100,0	52	64,7	11,3	24,0	100,0	88
Sans religion/autre	78,8	15,3	5,9	100,0	370	53,7	2,4	44,0	100,0	105
Ethnie										
Bambara	85,7	10,6	3,7	100,0	5 361	74,2	12,9	12,9	100,0	1 903
Malinke	85,4	11,8	2,8	100,0	1 774	76,1	13,5	10,4	100,0	780
Peulh	82,5	12,3	5,2	100,0	2 256	73,1	13,7	13,2	100,0	769
Sarakole/Soninke/Marka	86,2	10,1	3,7	100,0	1 892	75,6	13,2	11,2	100,0	579
Kassonke	77,5	20,4	2,1	100,0	153	(69,3)	(23,1)	(7,6)	(100,0)	46
Sonraï	27,1	65,5	7,4	100,0	613	38,6	53,4	7,9	100,0	223
Dogon	68,0	28,1	4,0	100,0	1 259	70,8	20,9	8,4	100,0	449
Touareg/Bella	23,6	66,6	9,8	100,0	255	42,9	43,7	13,4	100,0	98
Sénoufo/Minianka	83,7	13,4	3,0	100,0	1 853	76,4	10,6	13,0	100,0	749
Bobo	47,6	43,5	8,8	100,0	433	47,1	31,0	21,9	100,0	146
Bozo	87,9	8,8	3,3	100,0	591	82,7	13,3	3,9	100,0	176
Arabe/Maure	56,3	33,1	10,7	100,0	143	70,4	24,9	4,7	100,0	40
Autre ethnie malienne	89,1	9,8	1,1	100,0	229	76,7	12,0	11,4	100,0	190
Pays CEDEAO	87,1	12,9	0,0	100,0	68	*	*	*	*	23
Autres pays africains	(76,5)	(21,8)	(1,8)	100,0	45	(41,0)	(38,7)	(20,3)	(100,0)	36
Autres nationalités	(55,6)	(41,4)	(3,0)	100,0	40	*	*	*	*	6
Résidence										
Bamako	75,9	20,3	3,8	100,0	2 658	63,6	28,5	7,9	100,0	1 149
Autre urbain	75,9	21,1	3,0	100,0	1 994	66,9	20,3	12,8	100,0	727
Ensemble urbain	75,9	20,6	3,4	100,0	4 651	64,9	25,3	9,8	100,0	1 876
Rural	80,8	14,9	4,3	100,0	12 314	75,3	12,1	12,6	100,0	4 336
Région										
Kayes	86,9	9,8	3,3	100,0	2 619	80,1	9,2	10,7	100,0	875
Koulikoro	83,9	12,1	4,0	100,0	3 990	76,3	12,4	11,3	100,0	1 435
Sikasso	83,3	11,7	5,0	100,0	3 114	75,0	6,4	18,6	100,0	1 138
Ségou	83,5	12,0	4,5	100,0	2 563	73,5	12,7	13,9	100,0	923
Mopti	71,9	26,3	1,9	100,0	1 503	74,4	17,8	7,7	100,0	485
Tombouctou	6,4	82,1	11,5	100,0	246	40,8	56,2	3,0	100,0	112
Gao	2,0	91,8	6,2	100,0	268	15,8	79,6	4,6	100,0	93
Kidal	†	†	†	100,0	4	†	†	†	†	2
Bamako	75,9	20,3	3,8	100,0	2 658	63,6	28,5	7,9	100,0	1 149
Niveau d'instruction										
Aucun	83,1	12,8	4,1	100,0	9 122	79,2	8,9	11,9	100,0	2 271
Primaire	81,5	14,5	4,0	100,0	2 870	75,8	12,9	11,3	100,0	1 235
Secondaire ou plus	71,6	24,4	4,1	100,0	4 973	64,5	23,6	11,9	100,0	2 706
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	85,1	11,1	3,8	100,0	3 013	79,6	5,9	14,5	100,0	1 089
Second	81,0	14,6	4,4	100,0	3 118	77,9	9,3	12,8	100,0	1 095
Moyen	79,4	16,7	3,9	100,0	3 176	71,7	14,5	13,9	100,0	1 064
Quatrième	81,8	14,7	3,5	100,0	3 538	72,9	18,2	8,8	100,0	1 335
Le plus élevé	72,1	23,2	4,6	100,0	4 120	62,9	26,8	10,3	100,0	1 629

À suivre...

Tableau 17.9—*Suite*

Caractéristique sociodémographique	Femme					Homme				
	Doit continuer	Ne doit pas continuer	NSP/ça dépend	Total	Effectif de femmes qui ont entendu parler de l'excision	Doit continuer	Ne doit pas continuer	NSP/ça dépend	Total	Effectif d'hommes qui ont entendu parler de l'excision
Ensemble 15–49	79,5	16,5	4,1	100,0	16 965	72,1	16,1	11,8	100,0	6 212
50–64	na	na	na	na	na	80,0	12,5	7,4	100,0	1 092
Ensemble 15–64	na	na	na	na	na	73,3	15,6	11,1	100,0	7 304

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.
na = non applicable
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

VIOLENCE DOMESTIQUE 18

Principaux résultats

Expérience de violence physique :

- Au Mali, 32 % des femmes et 18 % des hommes de 15–49 ans ont subi des actes de violence physique depuis l'âge de 15 ans causés par n'importe quel auteur.

Expérience de violence sexuelle :

- Au Mali, 11 % des femmes et 3 % des hommes de 15–49 ans ont subi, à un moment quelconque, des actes de violence sexuelle causés par n'importe quel auteur.

Comportements de contrôle :

- Près d'une femme de 15–49 ans sur cinq (19 %) a déclaré que son mari ou partenaire intime actuel ou le plus récent a déjà manifesté au moins trois des comportements de contrôle cités au cours de l'enquête. À l'opposé, 39 % des femmes ont déclaré que leur mari/partenaire intime n'avait manifesté aucun comportement de contrôle.
- Neuf pour cent des hommes de 15–49 ans ont déclaré que leur femme ou partenaire intime actuelle ou la plus récente a déjà manifesté au moins trois des comportements de contrôle cités au cours de l'enquête ; près de la moitié ont déclaré, par contre (48 %) que leur femme ou partenaire intime actuelle ou la plus récente n'avait manifesté aucun de ces comportements de contrôle.

Violence par un partenaire intime :

- Trente-huit pour cent des femmes qui ont déjà eu un mari ou un partenaire intime ont déjà subi des actes de violence émotionnelle, physique ou sexuelle de la part de leur mari ou partenaire intime.
- Neuf pour cent des hommes ayant déjà eu une épouse ou une partenaire intime ont déjà subi des actes de violence émotionnelle, physique ou sexuelle de la part de leur épouse ou partenaire intime.

Les Nations Unies définissent la violence basée sur le genre comme tout acte de violence entraînant un préjudice ou une souffrance physique, sexuelle ou psychologique pour les femmes, les filles, les hommes et les garçons ainsi que les menaces de tels actes, la coercition ou la privation arbitraire de liberté. Des recherches de plus en plus nombreuses ont mis en évidence les conséquences sur la santé, les effets intergénérationnels et les conséquences démographiques de ce type de violence (Nations Unies 2006).

Une forme courante de violence basée sur le genre est la violence entre partenaires intimes qui fait référence à un comportement dans une relation intime qui cause un préjudice physique, sexuel ou psychologique, et comprend des actes d'agression physique, de coercition sexuelle, d'abus psychologique et peut inclure un comportement de contrôle. Cette définition englobe non seulement la violence exercée par les conjoints et partenaires actuels mais aussi par les conjoints et partenaires antérieurs (OMS 2017).

Jusqu'à une date récente, the DHS program ne recueillait des informations détaillées sur la violence entre partenaires intimes à l'encontre des femmes qu'auprès des femmes déjà mariées, c'est-à-dire les femmes actuellement mariées ou vivant avec un homme comme si elles étaient mariées et les femmes précédemment mariées ou ayant vécu précédemment avec un homme comme si elles étaient mariées. Plus récemment, le module sur la violence domestique du DHS a été révisé pour prendre en compte également la violence exercée par un partenaire intime à l'encontre des femmes qui n'ont jamais été mariées et qui ont déclaré avoir actuellement ou avoir déjà eu un partenaire intime.

Dans l'EDSM 2023–2024, la version révisée du module sur la violence domestique a été utilisée pour la première fois, et par conséquent, les indicateurs sur la violence entre partenaires intimes sont basés sur les femmes et les hommes qui ont déjà eu un mari/une femme ou un autre partenaire intime. Dans le contexte du module révisé et dans ce rapport, le terme « petit ami » exclut toute personne déclarée à titre de partenaire intime.

Dans l'EDSM 2023–2024, le module de questions sur la violence domestique a été administré aux femmes uniquement dans le sous-échantillon de 50 % des ménages qui n'avaient pas d'enquête homme, et aux hommes, uniquement dans le sous-échantillon de 50 % des ménages qui avaient une enquête homme.

En outre, conformément aux directives de l'Organisation mondiale de la santé sur la collecte éthique d'informations sur la violence domestique (OMS 2001), seule une femme/un homme par ménage a été interrogé à l'aide du module et le module n'a été administré que s'il était possible d'assurer une totale confidentialité de l'interview. Sur l'ensemble des femmes éligibles au module sur la violence domestique un total de 4 175 (effectif non pondéré), soit 97 %, ont été interrogées avec succès ; 2 % n'ont pas pu être interrogées parce qu'il n'était pas possible de respecter la confidentialité et les 1 % restants n'ont pas pu être interrogées pour d'autres raisons. Parmi les hommes éligibles, 3 799 hommes de 15–49 ans (effectif non pondéré), soit 96 %, ont été interrogés avec succès et 4 % n'ont pu être interrogés en raison de l'impossibilité de respecter la confidentialité de l'interview. Par ailleurs, des poids de pondération spécialement construits ont été utilisés pour tenir compte de la sélection d'une seule femme/d'un seul homme par ménage et pour garantir la représentativité nationale du sous-échantillon sur la violence domestique.

Ce chapitre présente les résultats concernant les femmes et les hommes qui ont déclaré avoir subi différentes formes de violence (physique, sexuelle et psychologique/émotionnelle). Il fournit également des informations détaillées sur les formes de contrôle et de violence entre partenaires intimes, les blessures causées par la violence entre partenaires intimes, la violence contre les conjoints/partenaires intimes et la recherche d'aide parmi les femmes et les hommes qui ont été victimes de violence.

18.1 MESURE DE LA VIOLENCE

Terminologie utilisée dans ce chapitre

Mari : un homme avec lequel une femme est mariée ou avec lequel elle vit comme si elle était mariée.

Partenaire intime pour une femme : un homme avec lequel une femme qui n'a jamais été mariée entretient une relation qui implique une intimité physique et/ou sentimentale qui dure et dont on s'attend à ce qu'elle dure. Dans la définition utilisée dans ce chapitre, un partenaire intime n'est ni un mari, ni un homme avec lequel une femme vit comme si elle était mariée, ni un compagnon avec lequel elle a une relation occasionnelle, ni encore un homme qu'elle a rencontré seulement une fois.

Épouse : une femme avec laquelle un homme est marié ou avec laquelle il vit comme s'il était marié.

Partenaire intime pour un homme : une femme avec laquelle un homme qui n'a jamais été marié entretient une relation qui implique une intimité physique et/ou sentimentale qui dure et dont on s'attend à ce qu'elle dure. Dans la définition utilisée dans ce chapitre, une partenaire intime n'est ni une épouse, ni une femme avec laquelle un homme vit comme s'il était marié, ni une compagne avec laquelle il a une relation occasionnelle, ni encore une femme qu'il a rencontrée seulement une fois.

Mari/partenaire intime se réfère au mari actuel pour les femmes actuellement mariées, au mari le plus récent pour les femmes divorcées, séparées ou veuves, au partenaire intime actuel pour les femmes jamais mariées qui ont actuellement un partenaire intime, et au partenaire intime le plus récent pour les femmes jamais mariées qui n'ont pas actuellement de partenaire intime mais en ont eu un dans le passé.

Épouse/partenaire intime se réfère à l'épouse actuelle pour les hommes actuellement mariés, à l'épouse la plus récente pour les hommes divorcés, séparés ou veufs, à la partenaire intime actuelle pour les hommes jamais mariés qui ont actuellement une partenaire intime, et à la partenaire intime la plus récente pour les hommes jamais mariés qui n'ont pas actuellement de partenaire intime mais en ont eu une dans le passé.

Petit ami : un homme avec qui la femme entretient une relation occasionnelle et qu'elle n'a pas déclaré comme étant un partenaire intime.

Petite amie : une femme avec qui l'homme entretient une relation occasionnelle et qu'il n'a pas déclaré comme étant une partenaire intime.

Dans l'EDSM 2023–2024, des informations ont été obtenues auprès des femmes et des hommes sur les actes de violence qu'elles/ils ont subis de la part d'un auteur, y compris le mari/l'épouse actuel(le), un mari/une épouse précédent(e) ou d'autres partenaires intimes.

Pour capturer la violence exercée par le partenaire intime, on a demandé aux femmes ayant déjà été mariées si elles avaient subi des actes de violence causée par leur mari/partenaire actuel ou ancien et, le cas échéant, aux femmes jamais mariées si elles avaient subi des actes de violence de la part de leur partenaire intime actuel ou ancien. Spécifiquement, la violence du partenaire intime a été mesurée en demandant aux femmes/hommes si leur mari/épouse ou partenaire intime actuel(le) ou ancien(ne) leur avait fait subir les actes suivants :

- ***Violence physique :*** vous a-t-il/elle déjà poussé, secoué, lancé un objet à la figure, giflé, tordu le bras, tiré les cheveux, frappé de son poing ou à l'aide d'un objet pouvant blesser, donné des coups de pied, traîné de force, infligé des coups, tenté de vous étrangler, infligé des brûlures, attaqué avec un couteau, une arme à feu ou une autre arme.

- ***Violence sexuelle :*** vous a-t-il/elle déjà forcé physiquement à avoir des rapports sexuels avec lui/elle que vous ne souhaitiez pas, forcé physiquement à accomplir tout autre acte sexuel que vous ne souhaitiez pas, forcé par la menace ou de toute autre façon à accomplir des actes sexuels que vous ne souhaitiez pas.

- ***Violence émotionnelle :*** vous a-t-il/elle déjà dit ou fait quoi que ce soit pour vous humilier devant d'autres, menacé de vous blesser ou de vous faire du mal ou de faire du mal à une personne proche, insulté ou mis mal à l'aise.

En plus des questions sur les différentes formes de violence entre partenaires intimes, des informations ont également été collectées auprès de toutes les femmes et de tous les hommes sur la violence physique commise par une personne autre que le mari/l'épouse ou le/la partenaire intime depuis l'âge de 15 ans, en leur demandant si quelqu'un/une les avait frappés(e)s, giflé(e)s, battu(e)s ou avait fait quelque chose d'autre pour les blesser physiquement. De même, on a demandé à toutes les femmes et à tous les hommes si elles/ils avaient subi des violences sexuelles de la part d'une personne autre que leur mari/leur épouse/partenaire intime, en leur demandant si, à un moment de leur vie, en tant qu'enfant ou adulte, elles/ils avaient été forcé(e)s d'une manière ou d'une autre à avoir des rapports sexuels ou à accomplir tout autre acte sexuel qu'elles/ils ne souhaitaient pas.

18.2 EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE VIOLENCE PHYSIQUE

Violence physique de la part de n'importe quel auteur

Femmes

Pourcentage de femmes ayant subi des violences physiques (commises par un mari, un partenaire intime ou toute autre personne) depuis l'âge de 15 ans et au cours des 12 mois précédant l'enquête.

Échantillon : Femmes de 15–49 ans

Hommes

Pourcentage d'hommes ayant subi des violences physiques (commises par une épouse, une partenaire intime ou toute autre personne) depuis l'âge de 15 ans et au cours des 12 mois précédant l'enquête.

Échantillon : Hommes de 15–49 ans

Environ une femme de 15–49 ans sur trois (32 %) a subi des actes de violence physique depuis l'âge de 15 ans et 14 % ont subi de tels actes de violence souvent ou parfois au cours des 12 derniers mois. Parmi les hommes de 15–49 ans, 18 % ont subi des actes de violence physique depuis l'âge de 15 ans et 7 % en ont souvent ou parfois subi au cours des 12 derniers mois (**Tableau 18.1**).

Tendances : Entre 2006 et 2018, le pourcentage de femmes ayant déclaré avoir subi des actes de violence physique depuis l'âge de 15 ans a augmenté, passant de 32 % à 43 % avant de baisser pour s'établir à 32 % en 2023–2024.

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage de femmes ayant subi des actes de violence physique depuis l'âge de 15 ans est nettement plus élevé parmi celles qui ont déjà été mariées (34 % pour celles qui sont actuellement mariées et 41 % que celles qui sont veuves, séparées ou divorcées) que parmi les femmes qui n'ont jamais été mariées (21 %) (**Graphique 18.1**).

Graphique 18.1 **Violence subie par les femmes, par état matrimonial**



- Le pourcentage de femmes ayant subi des actes de violence physique depuis l'âge de 15 ans augmente avec l'âge, de 25 % à 15 à 19 ans à 37 % à 40 à 49 ans.

- Les résultats selon la région montrent que le pourcentage de femmes ayant subi des actes de violence physique depuis l'âge de 15 ans varie d'un maximum de 40 % à Kayes à un minimum de 13 % à Gao.

18.2.1 Auteurs des violences physiques

En ce qui concerne les femmes déjà mariées/ayant déjà eu un partenaire intime, les résultats montrent que les auteurs d'actes de violence physique les plus fréquents sont leur mari/partenaire intime actuel (75 %), suivi d'un ancien mari/partenaire intime (15 %).

En ce qui concerne celles qui n'ont jamais été mariées ou qui n'ont jamais eu de partenaire intime, on constate que les auteurs les plus fréquemment cités sont la mère/la belle-mère (42 %), l'enseignant (28 %), et le père/ beau-père (22 %).

Parmi les hommes (mariés ou non mariés), les auteurs d'actes de violence physique les plus fréquemment cités sont la sœur/le frère (34 % et 39 %) suivi par le père/mari de la mère (32 % et 30 %) (**Tableau 18.2**).

18.2.2 Expérience de violences physiques pendant la grossesse

Violence physique pendant la grossesse
Pourcentage des femmes ayant subi des violences physiques (commises par un mari, un partenaire intime ou toute autre personne) au cours d'une grossesse.
Échantillon : Femmes de 15–49 ans ayant déjà été enceintes

Six pour cent des femmes de 15–49 ans ayant déjà été enceintes ont subi des actes de violence physique pendant une grossesse (**Tableau 18.3**).

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage de femmes ayant subi des actes de violence physique pendant la grossesse varie selon les régions. Les pourcentages les plus élevés sont observés à Ségou et Bamako (8 %) et le plus faible à Gao (2 %).

- Le pourcentage de femmes ayant subi des actes de violence physique au cours d'une grossesse augmente avec le nombre d'enfants vivants : de 3 % parmi celles n'ayant aucun enfant vivant, à 6 % parmi celles en ayant 5 enfants ou plus (**Graphique 18.2**).

Graphique 18.2 **Violence subie durant une grossesse, par nombre d'enfants vivants**

Pourcentage ayant subi des violences physiques au cours d'une grossesse parmi les femmes de 15–49 ans ayant déjà été enceintes



18.3 EXPÉRIENCE DE VIOLENCE SEXUELLE

Violence sexuelle de la part de n'importe quel auteur

Femmes

Pourcentage de femmes ayant subi des violences sexuelles (commises par un mari, un partenaire intime ou toute autre personne) au cours des 12 mois précédant l'enquête.

Échantillon : Femmes de 15–49 ans

Hommes

Pourcentage d'hommes ayant subi des violences sexuelles (commises par une épouse, une partenaire intime ou toute autre personne) au cours des 12 mois précédant l'enquête.

Échantillon : Hommes de 15–49 ans

18.3.1 Prévalence de la violence sexuelle

Onze pour cent des femmes et 3 % des hommes ont déjà subi des actes de violence sexuelle causés par n'importe quel auteur à un moment quelconque de leur vie. Au cours des 12 mois précédant l'enquête, les pourcentages sont de 5 % parmi les femmes et 1 % parmi les hommes (**Tableau 18.4**).

Tendance : Le pourcentage des femmes ayant subi des actes de violence sexuelle quel qu'en soit l'auteur, qui était demeuré stable autour de 13 % entre 2012-2013, a légèrement baissé en 2023-2024.

Répartition selon les caractéristiques sociodémographiques

- Le pourcentage de femmes ayant subi des actes de violence sexuelle est plus élevé chez les femmes divorcées/séparées/veuves (20 %) que chez les femmes actuellement mariées (11 %) et les femmes jamais mariées n'ayant jamais eu de partenaire intime (4 %) ou les femmes jamais mariées ayant déjà eu un partenaire intime (12 %) (**Graphique 18.1**).

- Le pourcentage de femmes ayant subi des actes de violence sexuelle au cours de leur vie est plus élevé chez les femmes qui travaillaient mais qui n'étaient pas payées en argent (13 %) que parmi les femmes qui ne travaillaient pas (8 %).

- Le pourcentage de femmes ayant subi des actes de violence sexuelle est plus élevé à Kayes (15 %), à Sikasso (14 %) et à Bamako (12 %) et plus faible à Mopti et à Gao (5 % dans les deux cas).

18.3.2 Auteurs des violences sexuelles

Les auteurs de violences sexuelles les plus fréquemment déclarés par les femmes qui ont déjà été mariées ou qui ont déjà eu un partenaire intime sont le mari/partenaire intime actuel (72 %), suivi de l'ancien mari/partenaire intime (23 %). De même, chez les hommes qui ont déjà été mariés ou qui ont déjà eu une partenaire intime, les auteurs les plus fréquents de violences sexuelles sont l'épouse/partenaire intime actuelle (44 %), suivie de l'ancienne épouse/partenaire intime (39 %) (**Tableau 18.5**).

18.3.3 Expérience de violence sexuelle commise par un partenaire non intime

Le pourcentage de femmes et d'hommes ayant déclaré avoir déjà subi des actes de violence sexuelle causés par une personne autre que leur époux/épouse ou un/une partenaire intime est respectivement de 3 % et de 1 % (**Tableau 18.6**).

18.3.4 Âge à la première violence sexuelle subie

Dans l'ensemble. 4 % des femmes et 1 % des hommes ont déclaré avoir subi leur premier acte de violence sexuelle avant l'âge de 18 ans. Le pourcentage de femmes et d'hommes ayant subi des actes de violence sexuelle avant l'âge de 22 ans est respectivement de 7 % et de 1 % (**Tableau 18.7**).

18.4 EXPÉRIENCE DE DIFFÉRENTES FORMES DE VIOLENCE

La violence physique et la violence sexuelle ne sont pas toujours isolées, car les victimes de violence peuvent être confrontées à une combinaison de différentes formes de violence. Vingt-quatre pour cent des femmes et 17 % des hommes ont subi uniquement des actes de violence physique, 3 % des femmes et 2 % des hommes ont subi uniquement des actes de violence sexuelle, et 8 % des femmes et 1 % des hommes ont subi à la fois des actes de violence physique et sexuelle. Dans l'ensemble, 35 % des femmes et 19 % des hommes de 15–49 ans ont subi des violences physiques ou sexuelles (**Tableau 18.8**).

Chez les femmes, le pourcentage de celles qui ont subi des violences physiques ou sexuelles augmente avec l'âge, passant de 28 % parmi celles de 15–19 ans à 39 % parmi celles de 40–49 ans. Chez les hommes, on constate la tendance inverse, ce pourcentage diminuant avec l'âge, passant de 27 % parmi les hommes de 15–19 ans à 14 % parmi ceux de 40–49 ans.

18.5 TYPES DE COMPORTEMENTS DE CONTRÔLE ET VIOLENCE EXERCÉE ENTRE PARTENAIRES INTIMES

Comportement de contrôle

Femmes

Pourcentage de femmes dont le mari ou le partenaire intime actuel ou le plus récent a manifesté un ou plusieurs comportements de contrôle.

Échantillon : Femmes de 15–49 ans ayant déjà eu un mari ou un partenaire intime

Hommes

Pourcentage d'hommes dont l'épouse ou la partenaire intime actuelle ou la plus récente a manifesté un ou plusieurs comportements de contrôle.

Échantillon : Hommes de 15–49 ans ayant déjà eu une épouse ou une partenaire intime

Violence exercée par un partenaire intime

Femmes

Pourcentage de femmes qui ont subi l'un des actes spécifiés de violence physique, sexuelle ou émotionnelle commis par leur mari ou partenaire intime actuel ou le plus récent, à quelque moment que ce soit et dans les 12 mois précédant l'enquête.

Échantillon : Femmes de 15–49 ans ayant déjà eu un mari ou un partenaire intime

Hommes

Pourcentage d'hommes qui ont subi l'un des actes spécifiés de violence physique, sexuelle ou émotionnelle commis par leur épouse ou partenaire intime actuelle ou la plus récente, à quelque moment que ce soit et dans les 12 mois précédant l'enquête.

Échantillon : Hommes de 15–49 ans ayant déjà eu une épouse ou une partenaire intime

18.5.1 Prévalence des comportements de contrôle

Les tentatives des maris ou des épouses de contrôler et de surveiller étroitement le comportement de leur conjoint/conjointe sont des signes précurseurs importants et des indicateurs de la violence dans une relation. La concentration de comportements étant plus significative que la manifestation d'un seul comportement, le pourcentage de femmes et d'hommes dont les conjoints/conjointes manifestent au moins trois des comportements spécifiés est également examiné.

Le pourcentage des femmes ayant déjà eu un mari ou un partenaire intime et ayant déjà subi un comportement de contrôle de la part de son mari ou de son partenaire intime actuel ou le plus récent est de 61 % (**Tableau 18.9.1**).

Quatre femmes sur dix (40 %) ayant déjà eu un mari ou un partenaire intime ont subi n'importe quel acte de violence émotionnelle, physique ou sexuelle perpétré par leur mari/partenaire intime actuel ou le plus récent et 27 % ont subi ces actes de violence dans les 12 derniers mois. Vingt-neuf pourcents des femmes ont subi des actes de violence physique, 10 % des actes de violence sexuelle et 29 % des actes de violence émotionnelle de la part de leur mari/partenaire intime actuel ou le plus récent (**Tableau 18.9.1**).

Le pourcentage d'hommes ayant déjà eu une femme ou une partenaire intime et ayant déjà subi un comportement de contrôle de la part de sa femme ou de sa partenaire intime actuelle ou la plus récente est de 52 % (**Tableau 18.9.2**).

Onze pour cent des hommes de 15–49 ans qui ont déjà eu une femme ou une partenaire intime ont déjà subi une forme quelconque de violence émotionnelle, physique ou sexuelle de la part de leur femme ou partenaire intime actuelle ou la plus récente, et pour 7 % d'entre eux, ces actes se sont produits au cours des 12 derniers mois avant l'interview (**Tableau 18.11.2**).

Deux pour cent des hommes ont subi des actes de violence physique, 3 % des actes de violence sexuelle et 9 % des actes de violence émotionnelle causés par leur femme ou partenaire intime actuelle ou la plus récente.

Parmi les femmes qui ont déjà eu un mari ou un partenaire intime, 50 % ont déclaré que leur mari ou partenaire intime actuel ou le plus récent est jaloux ou en colère si elles parlent avec d'autres hommes ; 28 % ont déclaré qu'il insistait pour savoir où elles sont à tout moment ; 20 % ont déclaré qu'il ne les autorisait pas à rencontrer leurs amies ; 17 % ont déclaré qu'il les accusait fréquemment d'être infidèles, et 12 % qu'il essayait de limiter leurs contacts avec leur famille. Dix-neuf pour cent des femmes ont subi au moins trois comportements de contrôle de la part de leur mari ou partenaire intime (**Graphique 18.3**).

***Graphique 18.3* Types de comportements de contrôle**

Pourcentage de femmes de 15–49 ans ayant déjà été mariées ou ayant eu un partenaire intime et dont le mari/partenaire intime a manifesté certains types de comportements de contrôle



Tendances : Le pourcentage de femmes ayant déjà été mariées ou ayant déjà vécu avec un homme comme si elles étaient mariées qui ont déjà subi des actes de violence physique, sexuelle ou émotionnelle de la part de leur mari/partenaire actuel ou le plus récent a fluctué au fil du temps. Il est passé de 45 % en 2012–2013 à 49 % en 2018, et a diminué en 2023–2024 pour s'établir à 40 %.

Répartition des comportements de contrôle selon les caractéristiques sociodémographiques

- Les déclarations des femmes sur les comportements de contrôle de leur mari ou partenaire intime varient considérablement selon que l'enquêtée a peur ou non de ce mari ou partenaire intime. Onze pour cent des femmes qui déclarent ne jamais avoir peur de leur mari ou partenaire intime ont déclaré avoir subi au moins trois comportements de contrôle de la part de leur mari ou partenaire intime ; quand la femme a peur la plupart du temps de son mari/partenaire intime, ce pourcentage est de 38 % (**Tableau 18.10.1**).

- Dans les régions, le pourcentage de femmes dont le mari ou le partenaire intime a manifesté au moins trois comportements de contrôle spécifiques varie d'un maximum de 25 % dans la région de Sikasso à un minimum de 10 % à Mopti.

- Le pourcentage d'hommes ayant subi au moins trois comportements de contrôle de la part de sa femme/partenaire intime augmente avec le niveau d'instruction, passant de 5 % parmi les hommes n'ayant aucun niveau d'instruction à 14 % parmi ceux ayant un niveau d'instruction secondaire ou plus (**Tableau 18.10.2**).

- Le pourcentage augmente également avec le quintile de bien-être économique, passant de 4 % parmi les hommes du quintile le plus bas à 16 % parmi ceux du quintile le plus élevé.

18.5.2 Prévalence de la violence entre partenaires intimes perpétrée par le conjoint/ partenaire intime actuel ou le plus récent

Environ quatre femmes sur dix (38 %) ayant déjà eu un mari ou un partenaire intime ont subi n'importe quel acte de violence émotionnelle, physique ou sexuelle perpétré par leur mari/partenaire intime. Vingt-

sept pourcents des femmes ont subi des actes de violence physique, 8 % des actes de violence sexuelle et 28 % des actes de violence émotionnelle de la part de leur mari/partenaire (**Tableau 18.11.1**).

Neuf pour cent des hommes de 15–49 ans qui ont déjà eu une femme ou une partenaire intime ont déjà subi une forme quelconque de violence émotionnelle, physique ou sexuelle de la part de leur femme ou partenaire intime (**Tableau 18.11.2**).

Deux pour cent des hommes ont subi des actes de violence physique, 2 % des actes de violence sexuelle et 8 % des actes de violence émotionnelle causés par leur femme ou partenaire intime actuelle ou la plus récente

Répartition des violences exercées entre partenaires intimes perpétrées par le mari/partenaire intime actuel ou le plus récent en fonction des caractéristiques sociodémographiques

- Trente-neuf pour cent des femmes vivant dans le milieu rural ont déjà subi au moins une forme de violence de la part de leur mari ou partenaire intime, contre 35 % des femmes vivant dans le milieu urbain. Chez les hommes, le pourcentage de ceux qui ont déjà subi au moins une forme de violence de la part de leur épouse/partenaire intime est plus élevé en milieu urbain (12 %) qu'en milieu rural (8 %) (**Tableau 18.11.1** et **Tableau 18.11.2**).

- Le pourcentage de femmes ayant déjà subi au moins une forme de violence de la part de leur mari/partenaire intime est plus élevé chez les femmes déjà mariées (40 %) que chez les femmes célibataires (19 %). Parmi les femmes déjà mariées, celles en rupture d'union (divorcée/séparée/veuve) étaient un peu plus nombreuses à subir une forme de violence de la part de leur mari/partenaire intime (45 %) comparée à celles qui étaient encore en union (40 %).

- Le pourcentage de femmes qui travaillaient et qui ont subi des actes de violence (42 % des femmes rémunérées en argent et 40 % de celles dont le travail n'était pas rémunéré en argent) est plus élevé que parmi celles qui ne travaillaient pas (31 %).

- Les régions présentant le pourcentage le plus élevé de femmes ayant subi au moins une forme de violence de la part de leur mari/partenaire intime sont Sikasso (49 %), Kayes (47 %), Koulikoro et Ségou (36 %). Ce pourcentage est également de 36 % à Bamako (**Carte 18.1**).

Carte 18.1 Violences causées par un partenaire intime par région

Pourcentage de femmes de 15–49 ans ayant été mariées ou ayant eu un partenaire intime et qui ont subi des actes de violence physique, sexuelle ou émotionnelle causés par leur mari/partenaire intime actuel ou le plus récent



Note : Pour des raisons d'insécurité, les données de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région et ne sont pas présentées séparément.

Répartition des violences exercées entre partenaires intimes en fonction des caractéristiques du mari/partenaire intime et des indicateurs du pouvoir d'action des femmes

- Le pourcentage de femmes ayant subi des actes de violence quelle qu'en soit la forme, causés par leur mari/partenaire augmente avec le nombre des comportements de contrôle, passant de 22 % parmi les femmes dont le mari/partenaire intime n'a manifesté aucun comportement de contrôle à 72 % parmi les femmes ayant subi les cinq comportements de contrôle (**Tableau 18.12.1**). On observe le même type de variations parmi les hommes (**Tableau 18.12.2**).

- Le pourcentage de femmes ayant subi des actes de violence quelle qu'en soit la forme, causés par leur mari/partenaire intime est beaucoup plus élevé chez les femmes dont le père battait leur mère (65 %) que chez les femmes dont le père ne battait pas leur mère (36 %).

18.5.3 Actes de violence entre partenaires intimes au cours des 12 derniers mois, perpétrés par un mari/partenaire intime

Violence exercée entre partenaires intimes au cours des 12 derniers mois

Pourcentage de femmes/d'hommes ayant subi l'un des actes spécifiés de violence physique, sexuelle ou émotionnelle commis par un(e) conjoint(e) ou un partenaire intime au cours des 12 mois précédant l'enquête. Ces indicateurs correspondent à l'ODD 5.2.1.

Échantillon : Femmes/hommes de 15–49 ans ayant déjà eu un conjoint(e) ou un partenaire intime

Vingt-sept pour cent des femmes ayant déjà eu un mari ou un partenaire intime ont subi des actes de violence physique, sexuelle ou émotionnelle au cours des 12 mois précédant l'enquête de la part d'un mari ou d'un partenaire intime, y compris 13 % qui ont subi des actes de violence physique, 6 % des actes de violence sexuelle et 22 % des actes de violence émotionnelle (**Tableau 18.13.1**).

Sept pour cent des hommes de 15–49 ans qui ont déjà eu une femme ou une partenaire intime ont subi des actes de violence physique, sexuelle ou émotionnelle au cours des 12 mois précédant l'enquête causés par une épouse ou une partenaire intime (**Tableau 18.13.2**).

Dans les régions, la proportion de femmes ayant subi des actes de violence physique, sexuelle ou émotionnelle de la part d'un mari ou d'un partenaire intime au cours des 12 mois précédant l'interview est plus élevée à Sikasso (37 %) et Kayes (32 %) et plus faible à Gao (11 %) (**Tableau 18.13.1**). Chez les hommes, c'est parmi ceux de 15-19 ans (17 %), dans les autres villes du milieu urbain (14 %), dans la région de Kayes (12 %) et parmi ceux en rupture d'union (14 %) que les actes de violence conjugale, quelle qu'en soit la forme, ont été les plus fréquents dans les 12 mois avant l'enquête (**Tableau 18.13.2**).

18.6 BLESSURES SUBIES PAR LES FEMMES ET LES HOMMES RÉSULTANT DES VIOLENCES CAUSÉES PAR UN/UNE PARTENAIRE INTIME

Blessures résultant des violences exercées par un/une partenaire intime

Pourcentage de femmes/hommes ayant subi les types de blessures suivants à la suite de violences de leur partenaire intime : coupures, ecchymoses ou contusions ; blessures oculaires, entorses, luxations ou brûlures ; blessures profondes, fractures, dents cassées ou toute autre blessure grave.

Échantillon : Femmes/hommes de 15–49 ans ayant subi des violences physiques ou sexuelles commises par leur conjoint ou partenaire intime actuel ou le plus récent

Au Mali, parmi les femmes de 15–49 ans qui ont déjà eu un mari ou un partenaire intime et qui ont subi des actes de violence physique ou sexuelle de la part de leur mari/partenaire intime actuel ou le plus récent, 19 % ont déclaré avoir déjà subi l'une des blessures spécifiées ; ce pourcentage est de 23 % au cours des 12 derniers mois.

Les types de blessures les plus fréquemment signalés par les femmes ayant subi ces violences sont des coupures, des ecchymoses ou meurtrissures (14 %). D'autres femmes ont subi des blessures aux yeux, des entorses, des luxations ou des brûlures (7 %) et 6 % des blessures plus graves (blessures profondes, fractures, dents cassées ou autres blessures graves) (**Tableau 18.14**).

18.7 VIOLENCES INITIÉES PAR LES FEMMES ET LES HOMMES CONTRE LEURS CONJOINTS/PARTENAIRES INTIMES

Violences physiques initiées par les femmes/hommes

Pourcentage de femmes/hommes qui ont déjà frappé, giflé, donné des coups de pied ou fait quoi que ce soit d'autre afin de blesser physiquement leur conjoint ou partenaire intime actuel ou le plus récent alors que le conjoint/partenaire intime ne les avait ni battus, ni blessés physiquement.

Échantillon : Femmes/hommes de 15–49 ans ayant déjà eu un conjoint ou un partenaire intime

Parmi les femmes qui ont déjà eu un mari ou un partenaire intime, 3 % ont déjà commis des actes de violence physique à l'encontre de leur mari/ou partenaire intime alors qu'il ne les avait pas agressées. Parmi les hommes qui ont déjà eu une femme ou une partenaire intime, 7 % ont déjà exercé des actes de

violence physique contre leur femme/partenaire intime alors qu'elle ne les avait pas agressés (**Tableau 18.15** et **Tableau 18.16**).

Le pourcentage de femmes ayant déjà exercé des actes de violence physique à l'encontre de leur mari/partenaire intime est plus élevé chez les femmes ayant elles-mêmes subi des actes de violence physique de la part de leur partenaire intime (11 %) que chez les femmes n'ayant jamais subi de tels actes de violence (1 %).

LISTE DES TABLEAUX

Pour plus d'informations sur la violence domestique, consultez les tableaux suivants :

- **Tableau 18.1 Expérience de violence physique par n'importe quel auteur**
- **Tableau 18.2 Personnes ayant commis les actes de violence physique**
- **Tableau 18.3 Expérience de violence physique pendant la grossesse**
- **Tableau 18.4 Expérience de violence sexuelle par n'importe quel auteur**
- **Tableau 18.5 Personnes ayant commis les actes de violence sexuelle**
- **Tableau 18.6 Expérience de violence sexuelle par n'importe quel partenaire non-intime**
- **Tableau 18.7 Âge au premier acte de violence sexuelle**
- **Tableau 18.8 Violence sous différentes formes**
- **Tableau 18.9.1 Formes de comportement de contrôle et de violence commis par un partenaire intime : Femmes**
- **Tableau 18.9.2 Formes de comportement de contrôle et de violence commis par un partenaire intime : Hommes**
- **Tableau 18.10.1 Comportements de contrôle du mari/partenaire intime par caractéristiques sociodémographiques : Femmes**
- **Tableau 18.10.2 Comportements de contrôle du femme/partenaire intime par caractéristiques sociodémographiques : Hommes**
- **Tableau 18.11.1 Violence du partenaire intime selon les caractéristiques sociodémographiques : Femmes**
- **Tableau 18.11.2 Violence du partenaire intime selon les caractéristiques sociodémographiques : Hommes**
- **Tableau 18.12.1 Violence du partenaire intime selon les caractéristiques du mari/partenaire intime et les indicateurs d'autonomie : Femmes**
- **Tableau 18.12.2 Violence du partenaire intime selon les caractéristiques de la femme/partenaire intime : Hommes**
- **Tableau 18.13.1 Violence du mari ou partenaire intime au cours des 12 derniers mois : Femmes**
- **Tableau 18.13.2 Violence de la femme ou partenaire intime au cours des 12 derniers mois : Hommes**
- **Tableau 18.14 Blessures des femmes et hommes dues à la violence du partenaire intime**
- **Tableau 18.15 Violence des femmes et hommes contre leur mari/femme/partenaire intime selon les caractéristiques sociodémographiques des enquêtés**
- **Tableau 18.16 Violence des enquêtés contre leur mari/femme/partenaire intime selon les caractéristiques du mari/femme/partenaire intime et les indicateurs d'autonomie des femmes**

Tableau 18.1 Expérience de violence physique par n'importe quel auteur

Pourcentage des femmes et des hommes de 15–49 ans ayant subi des actes de violence physique de la part de n'importe quel auteur depuis l'âge de 15 ans et pourcentage ayant subi des actes de violence physique commis par n'importe quel auteur au cours des 12 mois précédant l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Femme					Homme				
		Pourcentage ayant subi des actes de violence physique au cours des 12 derniers mois					Pourcentage ayant subi des actes de violence physique au cours des 12 derniers mois			
Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant subi des actes de violence physique depuis l'âge de 15 ans[1]	Souvent	Parfois	Souvent ou parfois[2]	Effectif de femmes	Pourcentage ayant subi des actes de violence physique depuis l'âge de 15 ans[1]	Souvent	Parfois	Souvent ou parfois[2]	Effectif d'hommes
Âge										
15–19	24,7	4,2	7,7	12,0	908	27,0	3,5	10,1	13,7	792
20–24	29,6	5,2	6,8	12,1	862	19,4	1,9	3,8	5,7	593
25–29	35,7	9,4	10,0	19,3	671	14,6	2,6	2,2	4,8	435
30–39	34,9	5,4	8,1	13,7	1 111	12,6	1,1	2,9	4,0	839
40–49	37,3	5,9	6,2	12,1	623	13,0	1,1	3,5	4,6	590
Religion										
Musulmane	31,9	5,8	7,5	13,4	3 971	18,0	2,1	4,8	7,0	3 062
Chrétienne	31,3	3,8	11,4	15,2	105	11,3	0,0	5,6	5,6	93
Animiste	*	*	*	*	13	(6,1)	(0,0)	(1,0)	(1,0)	42
Autre	*	*	*	*	0	*	*	*	*	1
Sans religion	43,0	7,1	14,3	21,5	86	(23,3)	(1,2)	(7,1)	(8,4)	52
Ethnie										
Bambara	38,4	7,2	9,8	17,2	1 312	19,8	3,1	3,8	6,8	1 013
Malinke	36,5	5,2	11,0	16,2	426	22,9	2,1	11,4	13,5	370
Peulh	35,6	5,6	11,0	16,6	546	17,6	2,4	4,1	6,5	406
Sarakole/Soninke/Marka	33,6	5,8	5,5	11,3	451	17,4	1,3	5,6	6,9	317
Kassonke	*	*	*	*	28	*	*	*	*	22
Sonraï	18,4	4,2	4,7	8,8	172	14,7	2,0	6,0	8,0	135
Dogon	13,0	3,1	0,3	3,5	317	25,0	1,2	4,2	5,4	221
Touareg/Bella	13,7	5,6	3,2	8,8	97	17,3	3,0	7,6	10,7	71
Sénoufo/Minianka	27,2	6,9	6,2	13,1	447	10,2	0,8	2,5	3,4	379
Bobo	31,9	4,0	10,0	14,0	101	13,3	0,7	1,8	2,5	78
Bozo	38,3	4,9	3,8	9,1	149	7,6	0,0	2,8	2,8	82
Arabe/Maure	21,1	3,3	4,8	8,1	36	10,2	2,0	5,2	7,2	28
Autre ethnie malienne	(24,2)	(5,5)	(2,6)	(8,1)	49	9,4	1,8	1,6	3,3	90
Pays CEDEAO	*	*	*	*	21	*	*	*	*	12
Autres pays africains	*	*	*	*	8	*	*	*	*	21
Autres nationalités	*	*	*	*	16	*	*	*	*	3
Résidence										
Bamako	36,2	7,8	8,2	16,0	641	24,3	2,2	9,2	11,4	558
Autre urbain	27,3	4,4	7,8	12,2	516	15,2	2,4	4,1	6,5	394
Ensemble urbain	32,2	6,3	8,0	14,3	1 157	20,5	2,3	7,1	9,4	953
Rural	32,0	5,6	7,7	13,4	3 018	16,5	1,9	3,9	5,8	2 297
Région										
Kayes	40,3	7,0	9,5	16,4	616	20,0	0,3	5,7	6,0	456
Koulikoro	30,7	4,0	7,8	12,1	951	9,8	1,1	3,5	4,6	793
Sikasso	34,5	5,4	8,4	13,8	774	12,5	2,3	0,8	3,1	596
Ségou	33,7	7,1	8,8	16,0	613	24,9	4,9	5,7	10,6	458
Mopti	16,7	4,3	2,6	6,9	380	24,4	1,7	3,2	4,9	246
Tombouctou	19,5	6,6	7,7	14,3	74	18,5	2,2	16,2	18,4	69
Gao	13,0	3,9	4,3	8,2	125	12,9	2,4	3,2	5,7	73
Kidal	†	†	†	†	2	†	†	†	†	1
Bamako	36,2	7,8	8,2	16,0	641	24,3	2,2	9,2	11,4	558
État matrimonial										
Célibataire	23,3	3,0	5,2	8,3	818	22,9	3,1	7,4	10,6	1 369
N'a jamais eu de partenaire intime	20,8	2,2	6,2	8,4	532	21,6	2,9	6,8	9,7	1 105
A actuellement un partenaire intime	28,1	4,6	3,4	8,0	287	28,5	4,4	9,9	14,2	264
A eu un partenaire intime	(30,9)	(5,9)	(5,7)	(11,6)	54	24,1	0,0	5,8	5,8	106
A déjà été marié	34,3	6,5	8,4	15,0	3 303	13,3	1,3	2,8	4,1	1 774
Marié/vivant ensemble	34,1	6,3	8,6	15,0	3 193	13,3	1,3	2,8	4,1	1 760
Divorcé/séparé/veuf	40,6	12,5	3,7	16,2	110	*	*	*	*	14

À suivre…

Tableau 18.1—*Suite*

Caractéristique sociodémographique	Femme					Homme				
	Pourcentage ayant subi des actes de violence physique depuis l'âge de 15 ans[1]	Pourcentage ayant subi des actes de violence physique au cours des 12 derniers mois			Effectif de femmes	Pourcentage ayant subi des actes de violence physique depuis l'âge de 15 ans[1]	Pourcentage ayant subi des actes de violence physique au cours des 12 derniers mois			Effectif d'hommes
		Souvent	Parfois	Souvent ou parfois[2]			Souvent	Parfois	Souvent ou parfois[2]	
Niveau d'instruction										
Aucun	31,2	6,3	8,0	14,4	2 227	14,8	2,0	4,3	6,3	1 241
Primaire	33,6	5,3	8,1	13,6	682	17,3	1,4	3,9	5,3	660
Secondaire ou plus	32,8	5,2	7,2	12,5	1 266	20,6	2,4	5,8	8,2	1 349
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	38,3	5,1	8,9	14,0	683	17,9	2,9	3,4	6,3	580
Second	35,1	8,3	9,2	17,5	747	16,9	1,2	3,5	4,8	570
Moyen	28,3	5,6	7,2	13,1	834	18,0	2,8	4,5	7,3	599
Quatrième	30,4	5,6	8,4	14,1	920	15,3	1,2	5,4	6,6	711
Le plus élevé	30,3	4,8	5,8	10,6	991	20,0	2,2	6,6	8,7	790
Ensemble 15–49	32,1	5,8	7,8	13,7	4 175	17,7	2,0	4,8	6,9	3 249
50–64	na	na	na	na	na	10,1	1,3	2,8	4,2	550
Ensemble 15–64	na	na	na	na	na	16,6	1,9	4,5	6,5	3 799

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés ; un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
na = non applicable
[1] Y compris les actes de violence dans les 12 derniers mois. Pour les femmes/hommes qui étaient mariés ou qui vivaient ensemble avec un/une partenaire avant l'âge de 15 ans et qui ont déclaré avoir subi des actes de violence physiques commis seulement par un mari/femme et pour les femmes/hommes jamais mariés qui ont eu un/une partenaire intime avant l'âge de 15 ans et qui ont déclaré avoir subi des violences uniquement de la part de leur partenaire intime, il se peut que ces actes aient été commis avant l'âge de 15 ans.
[2] Y compris les femmes/hommes ayant déclaré avoir subi des actes de violence physique dans les 12 derniers mois mais dont on ne connait pas la fréquence
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 18.2 Personnes ayant commis les actes de violence physique

Parmi les femmes et les hommes de 15–49 ans ayant subi des actes de violence physique depuis l'âge de 15 ans, pourcentage ayant déclaré que des personnes spécifiques étaient les auteurs de ces actes, selon le statut de la relation de l'enquêté, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Statut de la relation		
Personne	A déjà été marié/a déjà eu un partenaire intime	Jamais marié et n'a jamais eu de partenaire intime	Ensemble
	FEMME		
Mari/partenaire intime actuel	75,4	na	69,2
Ex-mari/partenaire intime	15,0	na	13,8
Petit ami actuel	0,1	1,0	0,2
Ex petit ami	2,0	1,5	2,0
Père/mari de la mère	6,4	21,7	7,7
Mère/femme du père	9,1	42,3	11,8
Sœur/frère	9,8	13,7	10,1
Fille/fils	0,2	0,0	0,2
Autres parents	6,1	15,1	6,9
Belle-mère	0,5	na	0,5
Autre parent par alliance	0,7	na	0,7
Enseignant	2,2	27,5	4,3
Camarade d'école/camarade de classe	0,6	6,4	1,1
Employeur/quelqu'un au travail	1,4	0,0	1,3
Effectif de femmes ayant subi des actes de violence physique depuis l'âge de 15 ans	1 229	110	1 340
	HOMME		
Femme/partenaire intime actuelle	10,7	0,0	6,3
Ex-femme/partenaire intime	5,2	0,0	3,1
Petite amie actuelle	1,1	0,9	1,0
Ex petite amie	6,7	3,5	5,4
Père/mari de la mère	31,9	29,9	31,0
Mère/femme du père	6,2	11,5	8,4
Sœur/frère	34,1	38,7	36,0
Fille/fils	1,1	0,0	0,6
Autres parents	24,1	22,1	23,3
Belle-mère	0,1	1,4	0,6
Autre parent par alliance	0,3	0,0	0,2
Enseignant	12,6	19,4	15,4
Camarade d'école/camarade de classe	12,0	24,2	17,1
Employeur/quelqu'un au travail	9,9	8,5	9,3
Police/militaire	0,6	1,3	0,9
Autre	2,2	0,3	1,4
Effectif d'hommes ayant subi des actes de violence physique depuis l'âge de 15 ans	336	239	575

Note : Le terme mari/femme inclut un/une partenaire avec lequel une femme/homme vit comme s'il était marié. Le total des pourcentages peut être supérieur à 100 % car les femmes/hommes peuvent déclarer plus d'un auteur de la violence.
na = non applicable

Tableau 18.3 Expérience de violence physique pendant la grossesse

Parmi les femmes de 15–49 ans ayant déjà été enceintes, pourcentage ayant subi des actes de violence physique au cours d'une grossesse, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant subi des actes de violence durant une grossesse	Effectif de femmes ayant déjà été enceintes
Âge		
15–19	3,7	273
20–24	3,5	654
25–29	6,7	626
30–39	6,5	1 083
40–49	5,6	613
Religion		
Musulmane	5,4	3 082
Chrétienne	13,6	74
Animiste	*	13
Sans religion	3,3	79
Ethnie		
Bambara	7,2	1 084
Malinke	7,1	319
Peulh	3,8	410
Sarakole/Soninke/Marka	3,6	347
Kassonke	*	20
Sonraï	3,4	129
Dogon	3,5	249
Touareg/Bella	1,5	71
Sénoufo/Minianka	4,6	340
Bobo	4,2	73
Bozo	9,7	109
Arabe/Maure	4,0	21
Autre ethnie malienne	(7,0)	42
Pays CEDEAO	*	19
Autres pays africains	*	8
Autres nationalités	*	6
Résidence		
Bamako	7,7	424
Autre urbain	2,5	352
Ensemble urbain	5,3	776
Rural	5,6	2 472
Région		
Kayes	6,0	483
Koulikoro	3,1	734
Sikasso	6,3	633
Ségou	7,5	512
Mopti	4,5	315
Tombouctou	2,6	54
Gao	1,6	92
Kidal	†	1
Bamako	7,7	424
État matrimonial		
Célibataire	6,2	114
N'a jamais eu de partenaire intime	*	16
A déjà eu un partenaire intime	4,6	99
A déjà été mariée	5,5	3 134
Mariée/vivant ensemble	5,3	3 031
Divorcée/séparée/veuve	10,3	104
Nombre d'enfants vivants		
0	2,7	167
1–2	5,3	1 086
3–4	5,4	959
5+	6,3	1 037
Niveau d'instruction		
Aucun	5,6	1 961
Primaire	6,7	522
Secondaire ou plus	4,6	765
Quintile de bien-être économique		
Le plus bas	7,1	607
Second	7,2	659
Moyen	4,3	670
Quatrième	4,1	708
Le plus élevé	5,2	604
Ensemble	5,5	3 248

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés ; un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 18.4 Expérience de violence sexuelle par n'importe quel auteur

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans ayant subi des actes de violence sexuelle à un moment quelconque de la part de n'importe quel auteur et pourcentage en ayant subi au cours des 12 mois précédant l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Femme			Homme		
	Pourcentage ayant subi des actes de violence sexuelle par n'importe quel auteur :			Pourcentage ayant subi des actes de violence sexuelle par n'importe quel auteur :		
Caractéristique sociodémographique	À un moment quelconque[1]	Au cours des 12 derniers mois	Effectif de femmes	À un moment quelconque[1]	Au cours des 12 derniers mois	Effectif d'hommes
Âge						
15–19	7,8	4,5	908	0,4	0,4	792
20–24	10,6	7,2	862	5,1	1,1	593
25–29	14,3	7,6	671	3,4	1,5	435
30–39	11,4	4,2	1 111	3,2	1,7	839
40–49	8,4	4,0	623	1,6	0,8	590
Religion						
Musulmane	10,3	5,4	3 971	2,6	1,1	3 062
Chrétienne	15,6	5,7	105	0,0	0,0	93
Animiste	*	*	13	(0,0)	(0,0)	42
Autre	*	*	0	*	*	1
Sans religion	12,7	3,2	86	(10,5)	(3,5)	52
Ethnie						
Bambara	13,5	6,6	1 312	3,0	1,0	1 013
Malinke	13,7	7,4	426	2,0	0,8	370
Peulh	13,1	7,5	546	1,6	0,8	406
Sarakole/Soninke/Marka	6,5	3,5	451	1,4	1,2	317
Kassonke	*	*	28	*	*	22
Sonraï	4,1	2,5	172	3,0	1,7	135
Dogon	2,7	0,0	317	3,8	1,5	221
Touareg/Bella	5,2	3,3	97	6,4	3,6	71
Sénoufo/Minianka	8,2	4,6	447	2,0	0,2	379
Bobo	11,2	7,8	101	2,3	2,3	78
Bozo	11,1	7,9	149	5,8	1,7	82
Arabe/Maure	22,1	2,9	36	1,5	0,6	28
Autre ethnie malienne	(6,9)	(2,0)	49	1,5	0,5	90
Pays CEDEAO	*	*	21	*	*	12
Autres pays africains	*	*	8	*	*	21
Autres nationalités	*	*	16	*	*	3
Résidence						
Bamako	12,3	4,6	641	3,3	1,9	558
Autre urbain	8,3	5,5	516	3,0	1,8	394
Ensemble urbain	10,5	5,0	1 157	3,2	1,8	953
Rural	10,5	5,5	3 018	2,4	0,8	2 297
Région						
Kayes	14,5	8,0	616	3,9	1,5	456
Koulikoro	9,2	4,7	951	0,5	0,5	793
Sikasso	13,6	7,9	774	1,9	0,8	596
Ségou	7,7	4,3	613	3,9	1,5	458
Mopti	4,6	1,7	380	4,4	0,8	246
Tombouctou	7,7	5,9	74	2,7	0,6	69
Gao	5,3	2,8	125	3,4	0,0	73
Kidal	†	†	2	†	†	1
Bamako	12,3	4,6	641	3,3	1,9	558
État matrimonial						
Célibataire	7,3	3,0	872	1,8	0,6	1 476
N'a jamais eu de partenaire intime	4,4	1,2	532	0,8	0,1	1 105
A déjà eu un/une partenaire intime	11,9	5,8	340	4,6	2,1	370
A déjà été marié	11,3	6,0	3 303	3,3	1,4	1 774
Marié/vivant ensemble	11,0	5,8	3 193	3,3	1,5	1 760
Divorcé/séparé/veuf	19,8	12,7	110	*	*	14
Emploi						
Travaillait et payé en argent	11,6	5,7	2 099	2,5	1,2	2 036
Travaillait mais pas payé en argent	13,1	6,3	459	3,2	1,1	937
Ne travaillait pas	8,3	4,7	1 617	1,1	0,0	276
Niveau d'instruction						
Aucun	10,4	5,6	2 227	2,8	0,9	1 241
Primaire	15,3	6,9	682	2,2	0,7	660
Secondaire ou plus	8,0	4,2	1 266	2,7	1,4	1 349

À suivre...

Tableau 18.4—*Suite*

Caractéristique sociodémographique	Femme			Homme		
	Pourcentage ayant subi des actes de violence sexuelle par n'importe quel auteur :			Pourcentage ayant subi des actes de violence sexuelle par n'importe quel auteur :		
	À un moment quelconque[1]	Au cours des 12 derniers mois	Effectif de femmes	À un moment quelconque[1]	Au cours des 12 derniers mois	Effectif d'hommes
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	13,3	7,1	683	2,3	0,8	580
Second	13,6	6,9	747	1,5	0,3	570
Moyen	9,2	5,6	834	4,1	1,2	599
Quatrième	8,4	4,6	920	2,3	0,6	711
Le plus élevé	9,2	3,5	991	2,8	2,1	790
Ensemble 15–49	10,5	5,4	4 175	2,6	1,1	3 249
50–64	na	na	na	2,3	0,9	550
Ensemble 15–64	na	na	na	2,6	1,1	3 799

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés ; un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
[1] Y compris la violence au cours des 12 derniers mois
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.
na = non applicable

Tableau 18.5 Personnes ayant commis les actes de violence sexuelle

Parmi les femmes et les hommes de 15–49 ans ayant subi des actes de violence sexuelle, pourcentage ayant déclaré que des personnes spécifiques étaient les auteurs de ces actes, selon le statut de la relation de l'enquêté, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Statut de la relation		
Personne	A déjà été marié/a déjà eu un/une partenaire intime	Jamais marié et n'a jamais eu de partenaire intime	Ensemble
FEMME			
Mari actuel/partenaire intime	71,9	na	68,1
Ex-mari/partenaire intime	23,2	na	21,9
Ex/actuel petit ami	2,6	*	3,8
Père/beau-père	0,6	*	0,6
Frère/demi-frère	0,3	*	0,3
Autre parenté	4,8	*	5,6
Propre ami/rencontre	2,0	*	3,2
Ami de la famille	2,2	*	2,8
Enseignant	0,2	*	0,2
Employeur/quelqu'un au travail	2,9	*	2,8
Étranger	4,6	*	5,2
Effectif de femmes ayant subi des actes de violence sexuelle	415	*	438
HOMME			
Femme actuelle/partenaire intime	43,5	*	38,7
Ex-femme/partenaire intime	39,3	*	35,0
Ex/actuelle petite amie	16,5	*	14,7
Père/beau-père	0,9	*	0,8
Frère/demi-frère	0,7	*	0,6
Autre parenté	6,7	*	8,0
	9,9	*	9,9
Ami de la famille	0,2	*	6,3
Enseignant	0,7	*	0,6
Camarade d'école/camarade de classe	0,0	*	0,0
Police/militaire	2,3	*	2,1
Prêtre/responsable religieux	0,0	*	0,5
Étranger	6,0	*	8,7
Effectif d'hommes ayant subi des actes de violence sexuelle	76	9	85

Note : Le terme mari/femme inclut un/une partenaire avec lequel une femme/homme vit comme s'il était marié. Le total des pourcentages peut être supérieur à 100 % car les femmes/hommes peuvent déclarer plus d'un auteur. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
na = non applicable

Tableau 18.6 Expérience de violence sexuelle par n'importe quel partenaire non-intime

Pourcentage de femmes de 15–49 ans ayant déjà subi des violences sexuelles de la part d'une personne qui n'est ni leur mari ou leur partenaire intime, et pourcentage de celles qui ont subi des violences sexuelles de la part d'une personne qui n'est ni leur mari ou leur partenaire intime au cours des 12 mois précédant l'enquête ; pourcentage d'hommes de 15–49 ans ayant déjà subi des violences sexuelles de la part d'une personne qui n'est ni leur femme ou leur partenaire intime, et pourcentage de ceux qui ont subi des violences sexuelles de la part d'une personne qui n'est ni leur femme, ni leur partenaire intime au cours des 12 mois précédant l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes qui ont déjà subi des violences sexuelles de la part d'une personne qui n'est ni leur mari, ni leur partenaire intime		Effectif de femmes	Pourcentage d'hommes qui ont déjà subi des violences sexuelles de la part d'une personne qui n'est ni leur femme, ni leur partenaire intime		Effectif d'hommes
	À un moment quelconque[1]	Au cours des 12 derniers mois		À un moment quelconque[1]	Au cours des 12 derniers mois	
Âge						
15–19	3,5	0,3	908	0,3	0,3	792
20–24	2,5	0,5	862	3,7	0,7	593
25–29	2,8	0,1	671	1,0	0,0	435
30–39	2,6	0,2	1 111	1,3	0,2	839
40–49	0,4	0,0	623	0,4	0,0	590
Religion						
Musulmane	2,4	0,3	3 971	1,4	0,3	3 062
Chrétienne	7,6	0,0	105	0,0	0,0	93
Animiste	*	*	13	(0,0)	(0,0)	42
Autre	*	*	0	*	*	1
Sans religion	2,5	0,0	86	(0,0)	(0,0)	52
Ethnie						
Bambara	3,2	0,5	1 312	1,5	0,3	1 013
Malinke	3,5	0,0	426	0,0	0,0	370
Peulh	2,5	0,4	546	0,9	0,4	406
Sarakole/Soninke/Marka	0,6	0,0	451	1,3	1,0	317
Kassonke	*	*	28	*	*	22
Sonraï	0,6	0,2	172	1,0	0,0	135
Dogon	1,2	0,0	317	1,1	0,0	221
Touareg/Bella	1,7	0,0	97	2,8	0,0	71
Sénoufo/Minianka	2,0	0,2	447	1,5	0,0	379
Bobo	2,7	0,0	101	0,0	0,0	78
Bozo	1,8	0,0	149	4,7	0,6	82
Arabe/Maure	16,8	0,0	36	0,9	0,0	28
Autre ethnie malienne	(4,9)	(0,0)	49	1,0	0,0	90
Pays CEDEAO	*	*	21	*	*	12
Autres pays africains	*	*	8	*	*	21
Autres nationalités	*	*	16	*	*	3
Résidence						
Bamako	4,4	0,3	641	1,4	0,3	558
Autre urbain	2,3	0,8	516	1,1	0,4	394
Ensemble urbain	3,4	0,5	1 157	1,3	0,3	953
Rural	2,1	0,1	3 018	1,3	0,2	2 297
Région						
Kayes	2,1	0,0	616	1,9	0,3	456
Koulikoro	2,3	0,0	951	0,4	0,4	793
Sikasso	1,8	0,5	774	0,8	0,0	596
Ségou	3,0	0,4	613	1,4	0,2	458
Mopti	1,8	0,5	380	2,9	0,2	246
Tombouctou	2,0	0,4	74	2,1	0,0	69
Gao	0,9	0,0	125	3,4	0,0	73
Kidal	†	†	2	†	†	1
Bamako	4,4	0,3	641	1,4	0,3	558
État matrimonial						
Célibataire	4,4	0,8	872	0,9	0,2	1 476
N'a jamais eu de partenaire intime	4,4	1,2	532	0,8	0,1	1 105
A déjà eu un/une partenaire intime	4,5	0,1	340	0,9	0,5	370
A déjà été marié	2,0	0,1	3 303	1,6	0,3	1 774
Marié/vivant ensemble	2,0	0,1	3 193	1,6	0,3	1 760
Divorcé/séparé/veuf	1,5	0,0	110	*	*	14

À suivre...

Tableau 18.6—*Suite*

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes qui ont déjà subi des violences sexuelles de la part d'une personne qui n'est ni leur mari, ni leur partenaire intime			Pourcentage d'hommes qui ont déjà subi des violences sexuelles de la part d'une personne qui n'est ni leur femme, ni leur partenaire intime		
	Qui ont déjà[1]	Les 12 derniers mois	Effectif de femmes	Qui ont déjà[1]	Les 12 derniers mois	Effectif d'hommes
Niveau d'instruction						
Aucun	1,7	0,3	2 227	1,4	0,0	1 241
Primaire	5,3	0,3	682	1,0	0,0	660
Secondaire ou plus	2,4	0,1	1 266	1,3	0,6	1 349
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	2,5	0,2	683	0,8	0,0	580
Second	3,1	0,3	747	1,1	0,0	570
Moyen	1,8	0,0	834	1,9	0,3	599
Quatrième	2,1	0,6	920	1,5	0,0	711
Le plus élevé	3,0	0,1	991	1,1	0,8	790
Ensemble 15–49	2,5	0,2	4 175	1,3	0,3	3 249
50–64	na	na	na	1,1	0,0	550
Ensemble 15–64	na	na	na	1,3	0,2	3 799

Note : Le terme mari/femme inclut un/une partenaire avec lequel une femme/homme vit comme s'il était marié. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés ; un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
[1] Inclut l'expérience de la violence au cours des 12 derniers mois
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 18.7 Âge au premier acte de violence sexuelle

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans ayant subi des actes de violence sexuelle par âge exact, selon l'âge actuel et le type d'auteur, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant subi le premier acte de violence sexuelle à l'âge exact de :					Pourcentage n'ayant pas subi d'acte de violence sexuelle	Effectif de personnes
	10	12	15	18	22		
				FEMME			
Âge							
15–19	0,0	0,8	2,5	na	na	92,2	908
20–24	0,1	0,1	1,7	3,4	na	89,4	862
25–29	0,1	0,7	2,9	5,6	8,2	85,7	671
30–39	0,1	0,4	1,5	4,0	5,8	88,6	1 111
40–49	0,1	0,1	0,4	1,5	2,2	91,6	623
18–29	0,1	0,4	2,5	5,5	na	87,4	1 890
Ensemble 15–49	0,1	0,5	1,8	4,2	6,9	89,5	4 175
Type d'auteur							
Mari/partenaire intime[1]	0,1	0,1	0,8	2,9	5,8	88,6	3 643
Partenaire non intime[2]	0,0	0,4	1,2	1,9	2,2	97,2	4 175
				HOMME			
Âge							
15–19	0,0	0,0	0,0	na	na	99,3	792
20–24	0,0	0,3	0,3	1,8	na	94,9	593
25–29	0,0	0,3	0,3	0,9	1,0	96,2	435
30–39	0,0	0,0	0,1	0,6	0,7	96,4	839
40–49	0,0	0,0	0,2	0,3	0,9	98,2	590
18–29	0,0	0,2	0,2	1,2	na	96,3	1 335
Ensemble 15–49	0,0	0,1	0,1	0,8	1,4	97,1	3 249
50–64	0,0	0,2	0,2	0,3	0,9	97,7	550
Ensemble 15–64	0,0	0,1	0,2	0,7	1,3	97,2	3 799
Type d'auteur							
Femme/partenaire intime[1]	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	96,1	2 144
Partenaire non intime[2]	0,0	0,1	0,1	0,7	1,1	98,3	3 249

Note : Le terme mari/femme inclut un/une partenaire avec lequel une femme/homme vit comme s'il était marié.
na = non applicable
[1] Inclut uniquement les femmes/hommes jamais mariés et les femmes/hommes jamais mariés qui ont déjà eu un/une partenaire intime.
[2] Inclut toutes les femmes et tous les hommes.

Tableau 18.8 Violence sous différentes formes

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans ayant subi des actes de violence sous différentes formes par âge actuel, EDSM-VII Mali 2023–2024

Âge	Violence physique seulement	Violence sexuelle seulement	Violence physique et sexuelle	Violence physique ou sexuelle	Effectif de personnes
			FEMME		
15–19	19,7	2,8	5,0	27,5	908
15–17	17,8	2,0	1,8	21,5	550
18–19	22,7	4,0	10,0	36,8	358
20–24	22,3	3,4	7,2	32,9	862
25–29	23,6	2,3	12,1	38,0	671
30–39	25,6	2,1	9,4	37,0	1 111
40–49	30,8	1,9	6,5	39,2	623
Ensemble 15–49	24,1	2,5	8,0	34,6	4 175
			HOMME		
15–19	26,8	0,2	0,2	27,2	792
15–17	29,5	0,2	0,4	30,1	486
18–19	22,4	0,3	0,0	22,7	306
20–24	17,8	3,5	1,6	22,9	593
25–29	13,3	2,1	1,3	16,7	435
30–39	10,8	1,4	1,8	13,9	839
40–49	12,5	1,1	0,6	14,1	590
Ensemble 15–49	16,6	1,5	1,1	19,2	3 249
50–64	9,6	1,8	0,4	11,9	550
Ensemble 15–64	15,6	1,6	1,0	18,2	3 799

Tableau 18.9.1 Formes de comportement de contrôle et de violence commis par un partenaire intime : Femmes

Pourcentage de femmes de 15–49 ans ayant déjà eu un mari ou un partenaire intime qui ont subi des comportements de contrôle et diverses formes de violence de la part d'un partenaire intime à un moment quelconque et au cours des 12 mois précédant l'enquête, EDSM-VII Mali 2023–2024

Type de violence subie	À un moment quelconque	Au cours des 12 derniers mois	Fréquence dans les 12 derniers mois	
			Souvent	Parfois
Comportement autoritaire				
N'importe quel comportement autoritaire	60,7	54,1	31,3	22,8
Est jaloux ou en colère si elle parle à d'autres hommes	50,4	43,2	20,1	23,1
L'accuse à tort d'être infidèle.	16,6	13,1	5,9	7,2
Ne lui permet pas de rencontrer ses amies	19,9	17,6	8,0	9,6
Essaie de limiter ses contacts avec sa famille	11,5	10,0	4,7	5,3
Insiste pour savoir où elle se trouve à tout moment	28,0	25,0	13,3	11,7
Violence physique				
N'importe quel acte de violence physique	26,7	13,3	5,8	7,5
L'a bousculée, secouée ou lui a jeté quelque chose contre elle	5,6	3,7	2,2	1,5
L'a giflée	23,2	11,0	4,2	6,8
Lui a tordu son bras ou tiré les cheveux	4,5	2,2	0,9	1,3
L'a frappée à coup de poing ou avec quelque chose qui pouvait la blesser	9,2	4,3	1,3	3,0
Lui a donné des coups de pied, l'a trainée par terre ou l'a battue	5,7	2,9	1,0	1,9
A essayé de l'étrangler ou de la brûler	0,8	0,6	0,4	0,1
L'a attaquée avec un couteau, un fusil ou une autre arme	0,8	0,5	0,3	0,2
Violence sexuelle				
N'importe quel acte de violence sexuelle	8,2	5,6	2,0	3,6
L'a forcée physiquement à avoir des rapports sexuels avec lui alors qu'elle ne le voulait pas	6,8	4,9	1,8	3,1
L'a forcée physiquement à pratiquer des actes sexuels qu'elle ne voulait pas	3,4	2,4	0,8	1,7
L'a forcée sous la menace ou de n'importe quelle autre manière à pratiquer des actes sexuels qu'elle ne voulait pas	1,9	1,5	0,4	1,0
Violence émotionnelle				
N'importe quel acte de violence émotionnelle	28,2	21,7	8,4	13,2
A dit ou fait quelque chose pour l'humilier devant les autres	14,0	9,7	4,1	5,6
L'a menacée de lui faire du mal, à elle, ou à quelqu'un de proche	6,1	4,0	1,4	2,6
L'a insultée ou l'a fait se sentir mal dans sa peau	23,9	18,6	6,4	12,2
Au moins trois formes de comportements de contrôle	19,0	17,9	13,7	4,2
N'importe quel acte de violence physique ou sexuelle	28,9	15,6	6,9	8,8
N'importe quel acte de violence émotionnelle, physique ou sexuelle	37,9	26,8	11,7	15,1

À suivre...

Tableau 18.9.1—*Suite*

Type de violence subie	À un moment quelconque	Au cours des 12 derniers mois	Fréquence dans les 12 derniers mois	
			Souvent	Parfois
Violence perpétrée par un mari ou un partenaire intime actuel ou précédent				
Violence physique	28,5	13,4	na	na
Violence sexuelle	9,8	6,0	na	na
Violence émotionnelle	29,2	21,7	na	na
N'importe quel acte de violence physique ou sexuelle	31,3	16,1	na	na
N'importe quel acte de violence émotionnelle, physique ou sexuelle	39,7	27,1	na	na
Effectif de femmes mariées ou jamais mariées ayant eu un partenaire intime	3 643	3 643	3 643	3 643

Note : Mari/partenaire intime désigne le mari actuel pour les femmes actuellement mariées, le mari le plus récent pour les femmes divorcées, séparées ou veuves, le partenaire intime actuel pour les femmes qui ont déjà été mariées qui ont actuellement un partenaire intime, et le partenaire intime le plus récent pour les femmes qui n'ont jamais été mariées et qui n'ont pas actuellement de partenaire intime mais en ont eu un dans le passé.
na = non applicable

Tableau 18.9.2 Formes de comportement de contrôle et de violence commis par un partenaire intime : Hommes

Pourcentage d'hommes de 15–49 ans ayant déjà eu une femme ou une partenaire intime qui ont subi des comportements de contrôle et diverses formes de violence causées par une femme/partenaire intime à n'importe quel moment et au cours des 12 mois précédant l'enquête EDSM-VII Mali 2023–2024

Type de violence subie	À un moment quelconque	Au cours des 12 derniers mois	Fréquence dans les 12 derniers mois	
			Souvent	Parfois
Comportement autoritaire				
N'importe quel comportement autoritaire	52,3	46,8	27,1	19,7
Est jalouse ou en colère s'il parle à d'autres femmes	47,0	41,5	20,5	21,0
L'accuse à tort d'être infidèle.	19,6	17,3	9,4	7,9
Ne lui permet pas de rencontrer ses amis	3,4	3,2	1,6	1,7
Essaie de limiter ses contacts avec sa famille	1,5	1,4	0,5	0,9
Insiste pour savoir où il se trouve à tout moment	18,1	16,3	7,6	8,7
Violence physique				
N'importe quel acte de violence physique	1,8	1,2	0,5	0,7
L'a bousculé, secoué ou lui a jeté quelque chose contre lui	0,8	0,7	0,3	0,5
L'a giflé	0,8	0,4	0,1	0,3
Lui a tordu son bras ou tiré les cheveux	0,1	0,1	0,1	0,0
L'a frappé à coup de poing ou avec quelque chose qui pouvait la blesser	0,2	0,2	0,1	0,0
Lui a donné des coups de pied, l'a trainé par terre ou l'a battu	0,0	0,0	0,0	0,0
A essayé de l'étrangler ou de la brûler	0,1	0,0	0,0	0,0
L'a attaqué avec un couteau, un fusil ou une autre arme	0,2	0,0	0,0	0,0
Violence sexuelle				
N'importe quel acte de violence sexuelle	1,5	1,1	0,6	0,5
L'a forcé physiquement à avoir des rapports sexuels avec elle alors qu'il ne le voulait pas	1,3	1,0	0,5	0,5
L'a forcé physiquement à pratiquer des actes sexuels qu'il ne voulait pas	0,3	0,2	0,2	0,0
L'a forcé sous la menace ou de n'importe quelle autre manière à pratiquer des actes sexuels qu'il ne voulait pas	0,2	0,2	0,1	0,1
Violence émotionnelle				
N'importe quel acte de violence émotionnelle	7,7	5,9	2,8	3,1
A dit ou fait quelque chose pour l'humilier devant les autres	3,7	2,9	1,6	1,3
L'a menacé de lui faire du mal, à lui, ou à quelqu'un de proche	0,8	0,6	0,2	0,4
L'a insulté ou l'a fait se sentir mal dans sa peau	5,6	4,2	1,7	2,4
Au moins trois formes de comportements de contrôle	8,8	8,7	6,5	2,1
N'importe quel acte de violence physique ou sexuelle	2,9	2,0	1,1	0,9
N'importe quel acte de violence émotionnelle, physique ou sexuelle	9,2	7,0	3,5	3,5

À suivre...

Tableau 18.9.2—*Suite*

Type de violence subie	À un moment quelconque	Au cours des 12 derniers mois	Fréquence dans les 12 derniers mois	
			Souvent	Parfois
Violence perpétrée par une femme ou une partenaire intime actuelle ou précédente				
Violence physique	2,3	1,2	na	na
Violence sexuelle	2,7	1,5	na	na
Violence émotionnelle	8,8	6,2	na	na
N'importe quel acte de violence physique ou sexuelle	4,4	2,3	na	na
N'importe quel acte de violence émotionnelle, physique ou sexuelle	11,1	7,4	na	na
Effectif d'hommes mariés ou jamais mariés ayant eu une partenaire intime	2 144	2 144	2 144	2 144

Note : Femme/partenaire intime désigne la femme actuelle pour les hommes actuellement mariés, la femme la plus récente pour les hommes divorcés, séparés ou veufs, la partenaire intime actuelle pour les hommes qui ont déjà été mariés qui ont actuellement une partenaire intime, et la partenaire intime la plus récente pour les hommes qui n'ont jamais été mariés et qui n'ont pas actuellement de partenaire intime mais en ont eu une dans le passé.
na = non applicable

Tableau 18.10.1 Comportements de contrôle du mari/partenaire intime par caractéristiques sociodémographiques : Femmes

Pourcentage de femmes de 15–49 ans ayant déjà eu un mari ou un partenaire intime dont les maris/partenaires intimes ont déjà manifesté des types spécifiques de comportements de contrôle, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes dont le mari/partenaire intime : Est jaloux ou en colère si elle parle à d'autres hommes	L'accuse fréquemment d'être infidèle	Ne lui permet pas de rencontrer ses amies	Essaye de limiter ses contacts avec sa famille	Insiste pour savoir où elle est à tout moment	A manifesté au moins 3 de ces comportements	N'a manifesté aucun de ces comportements	Effectif de femmes ayant déjà eu un mari/partenaire intime
Âge								
15–19	55,1	18,2	20,6	6,4	25,9	15,8	32,7	473
20–24	56,4	15,5	21,6	12,5	30,6	21,7	34,8	790
25–29	46,7	21,4	22,5	13,6	28,6	22,4	41,8	657
30–39	50,4	15,9	20,0	13,4	31,3	19,3	37,9	1 102
40–49	43,0	13,0	14,4	8,4	19,8	14,0	50,1	623
Religion								
Musulmane	50,6	16,0	19,6	11,3	27,4	18,6	39,6	3 459
Chrétienne	45,7	25,1	21,6	15,2	35,4	25,9	36,8	89
Animiste	*	*	*	*	*	*	*	13
Sans religion	48,6	30,9	24,7	12,6	38,4	28,3	34,9	83
Ethnie								
Bambara	50,6	16,4	18,5	12,4	31,0	18,4	37,9	1 173
Malinke	61,1	16,6	25,8	7,5	30,2	20,8	26,9	363
Peulh	50,0	17,4	19,5	10,5	24,4	19,5	41,6	464
Sarakole/Soninke/Marka	51,9	18,0	21,5	12,2	25,9	19,6	38,4	406
Kassonke	*	*	*	*	*	*	*	22
Sonraï	40,2	12,7	17,2	11,7	20,4	17,8	54,7	149
Dogon	41,1	8,9	12,0	9,4	13,9	10,2	52,2	268
Touareg/Bella	39,1	6,4	17,1	6,6	13,8	12,7	55,9	80
Sénoufo/Minianka	49,1	21,9	22,9	14,0	36,1	23,5	39,5	400
Bobo	62,4	33,0	16,3	16,2	44,0	31,4	29,1	85
Bozo	51,2	13,7	29,6	16,3	28,5	22,6	32,3	126
Arabe/Maure	37,7	22,9	6,2	1,0	24,0	20,1	58,6	25
Autre ethnie malienne	(47,2)	(14,2)	(16,3)	(9,4)	(20,8)	(11,4)	(38,6)	45
Pays CEDEAO	*	*	*	*	*	*	*	19
Autres pays africains	*	*	*	*	*	*	*	8
Autres nationalités	*	*	*	*	*	*	*	9
Résidence								
Bamako	54,7	19,8	20,2	14,8	24,3	20,7	38,0	539
Autre urbain	57,0	21,2	18,6	12,5	32,0	20,8	32,8	416
Ensemble urbain	55,7	20,4	19,5	13,8	27,6	20,7	35,7	954
Rural	48,5	15,3	20,0	10,6	28,1	18,4	40,6	2 689
Région								
Kayes	64,6	17,4	26,2	7,4	25,5	21,4	25,3	553
Koulikoro	51,0	14,3	21,6	12,8	24,1	16,4	38,7	808
Sikasso	46,3	20,6	19,6	13,8	42,2	24,7	39,7	689
Ségou	43,6	18,7	16,3	10,6	32,4	18,0	44,1	551
Mopti	45,7	6,3	12,1	6,7	16,6	10,4	48,2	337
Tombouctou	33,3	9,4	10,5	11,8	18,9	13,7	59,5	58
Gao	35,0	12,9	23,2	9,9	15,6	17,7	58,4	107
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	1
Bamako	54,7	19,8	20,2	14,8	24,3	20,7	38,0	539
État matrimonial								
Célibataire	61,6	29,5	16,7	8,2	28,4	20,0	29,8	340
A actuellement un partenaire intime	62,0	29,8	17,5	8,0	29,3	20,4	28,5	287
A eu un partenaire intime	(59,5)	(28,1)	(12,1)	(9,4)	(23,3)	(17,7)	(37,0)	54
A déjà été mariée	49,2	15,3	20,2	11,8	28,0	18,9	40,3	3 303
Mariée/vivant ensemble	49,2	14,8	20,0	11,5	27,7	18,6	40,3	3 193
Divorcée/séparée/veuve	50,8	29,2	26,7	19,4	34,0	28,6	41,5	110
Niveau d'instruction								
Aucun	43,6	13,9	18,4	10,2	23,3	15,5	44,7	2 084
Primaire	58,7	22,5	23,0	10,8	38,0	25,3	30,5	590
Secondaire ou plus	59,9	19,0	21,1	14,6	31,9	22,7	33,1	970
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	40,6	14,4	17,9	10,5	27,7	15,5	47,4	643
Second	44,7	14,8	17,3	9,0	26,4	16,1	41,8	703
Moyen	53,0	16,3	20,8	9,9	28,1	19,5	37,9	739
Quatrième	53,9	19,5	24,1	15,6	32,6	24,6	36,4	784
Le plus élevé	57,7	17,4	18,9	11,9	25,0	18,5	34,9	775

À suivre...

Tableau 18.10.1—*Suite*

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes dont le mari/partenaire intime : Est jaloux ou en colère si elle parle à d'autres hommes	L'accuse fréquemment d'être infidèle	Ne lui permet pas de rencontrer ses amies	Essaye de limiter ses contacts avec sa famille	Insiste pour savoir où elle est à tout moment	A manifesté au moins 3 de ces comportements	N'a manifesté aucun de ces comportements	Effectif de femmes ayant déjà eu un mari/partenaire intime
L'enquêtée a peur de son mari/partenaire intime								
A peur la plupart du temps	66,1	28,8	35,5	21,8	49,6	38,0	19,2	559
A peur parfois	57,1	20,6	20,5	11,2	33,0	21,6	32,5	1 316
N'a jamais peur	40,4	9,8	14,5	8,4	17,5	11,1	50,8	1 769
Ensemble	50,4	16,6	19,9	11,5	28,0	19,0	39,3	3 643

Note : Mari/partenaire intime désigne le mari actuel pour les femmes actuellement mariées, le mari le plus récent pour les femmes divorcées, séparées ou veuves, le partenaire intime actuel pour les femmes qui ont déjà été mariées qui ont actuellement un partenaire intime, et le partenaire intime le plus récent pour les femmes qui n'ont jamais été mariées et qui n'ont pas actuellement de partenaire intime mais en ont eu un dans le passé. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés ; un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 18.10.2 Comportements de contrôle de la femme/partenaire intime par caractéristiques sociodémographiques : Hommes

Pourcentage d'hommes de 15–49 ans ayant déjà eu une femme ou une partenaire intime dont les femmes/partenaires intimes ont déjà manifesté des types spécifiques de comportements de contrôle, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Pourcentage d'hommes dont la femme/partenaire intime :							
Caractéristique sociodémographique	Est jalouse ou en colère s'il parle à une autre femme	L'accuse fréquemment d'être infidèle	Ne lui permet pas de rencontrer ses amis	Essaye de limiter ses contacts avec sa famille	Insiste pour savoir où il est à tout moment	A manifesté au moins 3 de ces comportements	N'a manifesté aucun de ces comportements	Effectif d'hommes ayant déjà eu une femme/ partenaire intime
Âge								
15–19	56,0	18,1	0,8	1,6	19,7	6,8	39,1	108
20–24	58,1	24,4	3,9	1,9	22,1	12,7	35,4	289
25–29	47,2	19,5	4,9	1,2	18,6	9,6	49,3	336
30–39	47,9	20,1	3,5	1,8	21,4	9,5	45,5	822
40–49	38,7	16,7	2,8	1,1	10,8	5,8	57,5	589
Religion								
Musulmane	47,5	19,6	3,5	1,5	18,3	8,9	47,1	2 017
Chrétienne	42,6	21,6	3,2	2,1	16,8	11,7	50,5	69
Animiste	(29,4)	(7,9)	(0,0)	(0,0)	(3,5)	(1,5)	(66,9)	29
Autre	*	*	*	*	*	*	*	1
Sans religion	*	*	*	*	*	*	*	27
Ethnie								
Bambara	45,0	21,1	4,2	1,4	20,5	8,3	48,0	659
Malinke	59,8	22,3	7,0	2,5	22,8	13,6	34,9	257
Peulh	45,2	17,9	2,5	0,3	16,6	8,0	48,2	289
Sarakole/Soninke/Marka	48,1	22,9	2,8	2,3	14,3	8,1	45,5	187
Kassonke	*	*	*	*	*	*	*	11
Sonraï	51,0	19,6	2,8	1,6	23,2	9,0	45,6	90
Dogon	38,4	16,6	3,9	2,2	17,5	15,5	60,6	161
Touareg/Bella	49,4	16,4	0,3	0,4	7,1	1,8	48,0	40
Sénoufo/Minianka	44,1	14,8	0,5	0,3	14,6	5,4	53,5	257
Bobo	(35,4)	(28,4)	(2,2)	(0,0)	(5,3)	(2,2)	(53,3)	49
Bozo	46,5	15,2	0,0	5,1	16,1	8,4	49,4	42
Arabe/Maure	37,3	5,4	0,3	1,7	11,3	4,5	61,9	20
Autre ethnie malienne	58,4	20,2	3,3	3,7	23,7	10,9	38,9	58
Pays CEDEAO	*	*	*	*	*	*	*	11
Autres pays africains	*	*	*	*	*	*	*	11
Autres nationalités	*	*	*	*	*	*	*	2
Résidence								
Bamako	66,7	27,5	3,9	3,2	34,5	15,8	26,8	368
Autre urbain	55,5	27,6	4,1	0,3	17,9	12,1	42,6	253
Ensemble urbain	62,1	27,6	4,0	2,0	27,7	14,3	33,2	621
Rural	40,9	16,3	3,2	1,3	14,1	6,6	53,6	1 523
Région								
Kayes	47,2	9,2	0,7	0,0	10,6	3,2	49,1	331
Koulikoro	56,3	26,0	7,7	2,8	21,1	13,1	36,6	489
Sikasso	31,7	19,2	1,4	0,2	12,6	6,6	64,3	409
Ségou	38,0	18,8	2,7	1,5	13,9	4,4	54,5	288
Mopti	26,5	10,9	2,3	0,6	12,0	7,4	72,4	169
Tombouctou	68,3	9,6	1,8	1,6	19,4	6,3	27,7	42
Gao	38,0	10,0	1,3	0,0	3,8	1,9	61,2	46
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	1
Bamako	66,7	27,5	3,9	3,2	34,5	15,8	26,8	368
État matrimonial								
Célibataire	56,1	14,8	1,4	0,0	18,9	7,0	39,4	125
A actuellement une partenaire intime	50,5	14,3	1,8	0,0	21,0	8,9	43,8	98
A eu une partenaire intime	*	*	*	*	*	*	*	27
A déjà été marié	45,8	20,0	3,7	1,8	18,0	8,8	48,6	1 818
Marié/vivant ensemble	45,5	20,1	3,4	1,8	17,6	8,5	48,9	1 773
Divorcé/séparé/veuf	58,1	15,7	15,5	0,7	32,5	19,5	38,7	46
Niveau d'instruction								
Aucun	36,9	14,1	2,3	0,8	11,6	4,7	59,0	944
Primaire	45,4	19,3	4,4	1,9	15,9	7,6	48,8	404
Secondaire ou plus	59,9	26,1	4,2	2,2	26,8	14,3	33,7	796
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	34,9	14,7	1,5	0,2	11,6	3,5	60,5	376
Second	28,9	10,6	3,1	1,2	9,1	4,5	66,7	392
Moyen	39,2	18,1	4,1	1,4	13,4	7,3	54,8	389
Quatrième	56,0	18,8	4,1	1,7	23,7	10,1	39,3	478
Le plus élevé	67,5	31,9	3,8	2,6	28,0	15,9	26,1	509

À suivre...

Tableau 18.10.2—*Suite*

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'hommes dont la femme/partenaire intime : Est jalouse ou en colère s'il parle à une autre femme	L'accuse fréquemment d'être infidèle	Ne lui permet pas de rencontrer ses amis	Essaye de limiter ses contacts avec sa famille	Insiste pour savoir où il est à tout moment	A manifesté au moins 3 de ces comportements	N'a manifesté aucun de ces comportements	Effectif d'hommes ayant déjà eu une femme/ partenaire intime
L'enquêté a peur de son épouse/partenaire intime								
A peur la plupart du temps	*	*	*	*	*	*	*	7
A peur parfois	67,2	45,3	6,0	3,5	26,7	25,2	29,1	116
N'a jamais peur	45,8	17,9	3,1	1,3	17,4	7,7	48,9	2 022
Ensemble 15–49	47,0	19,6	3,4	1,5	18,1	8,8	47,7	2 144
50–64	26,6	6,7	0,4	0,4	6,5	1,7	70,0	549
Ensemble 15–64	42,9	16,9	2,8	1,3	15,7	7,3	52,2	2 693

Note : Femme/partenaire intime désigne la femme actuelle pour les hommes actuellement mariés, la femme la plus récente pour les hommes divorcés, séparés ou veufs, la partenaire intime actuelle pour les hommes qui ont déjà été mariés qui ont actuellement une partenaire intime, et la partenaire intime la plus récente pour les hommes qui n'ont jamais été mariés et qui n'ont pas actuellement de partenaire intime mais en ont eu une dans le passé. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés ; un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 18.11.1 Violence du partenaire intime selon les caractéristiques sociodémographiques : Femmes

Pourcentage de femmes de 15–49 ans ayant déjà eu un mari ou un partenaire intime qui ont subi des actes de violence émotionnelle, physique ou sexuelle commis par leur mari/partenaire intime actuel ou par le plus récent, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Violence émotionnelle	Violence physique	Violence sexuelle	Physique et sexuelle	Physique et sexuelle et émotionnelle	Physique ou sexuelle	Physique ou sexuelle ou émotionnelle	Effectif de femmes ayant déjà eu un mari/partenaire intime
Âge								
15–19	17,4	18,7	8,4	5,8	4,2	21,4	25,8	473
20–24	26,9	21,2	8,6	5,3	3,7	24,4	35,2	790
25–29	31,2	30,8	11,1	9,0	7,6	32,9	42,0	657
30–39	29,7	28,6	6,6	5,2	4,6	30,1	39,5	1 102
40–49	31,9	32,1	7,2	5,1	3,9	34,2	43,6	623
Religion								
Musulmane	27,9	26,5	8,2	5,8	4,6	28,9	38,0	3 459
Chrétienne	22,9	20,5	8,7	7,9	7,9	21,4	29,0	89
Animiste	*	*	*	*	*	*	*	13
Sans religion	43,7	40,5	8,3	8,3	8,3	40,5	47,3	83
Ethnie								
Bambara	33,3	32,3	10,1	7,2	5,4	35,2	43,9	1 173
Malinke	31,6	34,7	12,2	10,2	6,9	36,7	46,1	363
Peulh	31,3	29,8	10,3	8,2	6,6	31,9	42,6	464
Sarakole/Soninke/Marka	26,1	25,8	5,5	3,0	2,4	28,4	37,1	406
Kassonke	*	*	*	*	*	*	*	22
Sonraï	12,6	13,2	3,9	2,5	2,3	14,7	20,0	149
Dogon	11,5	12,0	1,5	0,8	0,4	12,7	17,6	268
Touareg/Bella	12,6	12,5	4,2	2,1	2,1	14,6	16,3	80
Sénoufo/Minianka	29,1	20,7	6,7	4,5	4,5	22,9	35,5	400
Bobo	33,1	21,2	8,3	7,4	7,4	22,0	36,9	85
Bozo	27,4	31,8	9,3	7,1	7,1	34,0	38,9	126
Arabe/Maure	21,5	10,7	4,3	3,3	2,8	11,6	25,1	25
Autre ethnie malienne	(15,3)	(10,4)	(2,1)	(0,0)	(0,0)	(12,5)	(24,0)	45
Pays CEDEAO	*	*	*	*	*	*	*	19
Autres pays africains	*	*	*	*	*	*	*	8
Autres nationalités	*	*	*	*	*	*	*	9
Résidence								
Bamako	27,7	24,0	6,4	4,7	4,5	25,6	35,5	539
Autre urbain	26,5	22,7	6,9	6,0	5,1	23,7	34,1	416
Ensemble urbain	27,2	23,4	6,6	5,3	4,8	24,8	34,9	954
Rural	28,5	27,9	8,7	6,2	4,8	30,4	39,0	2 689
Région								
Kayes	31,6	36,4	13,0	11,0	7,0	38,5	47,4	553
Koulikoro	26,4	27,5	7,2	5,8	4,6	28,9	35,8	808
Sikasso	38,0	32,4	12,5	8,7	7,5	36,2	48,6	689
Ségou	28,4	23,8	4,9	2,3	2,0	26,4	36,4	551
Mopti	15,5	12,9	3,4	1,8	1,4	14,5	21,9	337
Tombouctou	13,7	17,9	7,7	5,1	4,4	20,4	23,1	58
Gao	8,8	11,1	4,8	2,3	2,3	13,5	14,9	107
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	1
Bamako	27,7	24,0	6,4	4,7	4,5	25,6	35,5	539
État matrimonial								
Célibataire	13,2	12,7	6,4	3,7	3,6	15,4	18,7	340
A actuellement un partenaire intime	12,1	10,8	6,1	2,8	2,7	14,1	18,0	287
A eu un partenaire intime	(19,0)	(22,3)	(8,2)	(8,2)	(8,2)	(22,3)	(22,3)	54
A déjà été mariée	29,7	28,2	8,4	6,2	4,9	30,3	39,9	3 303
Mariée/vivant ensemble	29,4	27,9	8,0	5,8	4,5	30,1	39,7	3 193
Divorcée/séparée/veuve	39,1	35,4	18,1	17,1	16,0	36,5	45,3	110
Emploi								
Travaillait et rémunérée en argent	31,3	30,0	8,5	6,4	5,1	32,0	41,8	1 940
Travaillait mais non rémunérée en argent	27,9	30,3	10,0	6,2	4,4	34,1	40,2	411
Ne travaillait pas	23,5	20,7	7,1	5,2	4,3	22,6	31,4	1 293
Niveau d'instruction								
Aucun	27,6	27,5	8,2	6,1	4,7	29,5	38,4	2 084
Primaire	33,3	30,7	11,5	7,8	6,2	34,3	44,4	590
Secondaire ou plus	26,2	22,6	6,2	4,5	4,0	24,4	33,0	970

À suivre...

Tableau 18.11.1—*Suite*

Caractéristique sociodémographique	Violence émotionnelle	Violence physique	Violence sexuelle	Physique et sexuelle	Physique et sexuelle et émotionnelle	Physique ou sexuelle	Physique ou sexuelle ou émotionnelle	Effectif de femmes ayant déjà eu un mari/partenaire intime
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	35,4	33,4	10,9	7,3	5,8	37,0	47,9	643
Second	30,3	31,6	10,8	8,3	6,0	34,0	41,8	703
Moyen	25,1	24,8	7,9	5,9	4,1	26,8	35,5	739
Quatrième	27,8	25,1	6,2	4,7	4,3	26,6	36,0	784
Le plus élevé	23,4	20,3	5,8	4,1	3,9	21,9	30,3	775
Ensemble	28,2	26,7	8,2	6,0	4,8	28,9	37,9	3 643

Note : Le terme mari inclut un partenaire avec lequel une femme vit comme si elle était mariée. Mari/partenaire intime désigne le mari actuel pour les femmes actuellement mariées, le mari le plus récent pour les femmes divorcées, séparées ou veuves, le partenaire intime actuel pour les femmes qui ont déjà été mariées qui ont actuellement un partenaire intime, et le partenaire intime le plus récent pour les femmes qui n'ont jamais été mariées et qui n'ont pas actuellement de partenaire intime mais en ont eu un dans le passé. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés ; un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 18.11.2 Violence du partenaire intime selon les caractéristiques sociodémographiques : Hommes

Pourcentage d'hommes de 15–49 ans ayant déjà eu une femme ou une partenaire intime qui ont subi des actes de violence émotionnelle, physique ou sexuelle commis par leur épouse/partenaire intime actuelle ou par la plus récente, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Violence émotionnelle	Violence physique	Violence sexuelle	Physique et sexuelle	Physique et sexuelle et émotionnelle	Physique ou sexuelle	Physique ou sexuelle ou émotionnelle	Effectif d'hommes ayant déjà eu une femme/ partenaire intime
Âge								
15–19	16,4	2,2	0,8	0,0	0,0	3,0	17,2	108
20–24	10,6	2,8	2,6	1,2	1,2	4,2	12,8	289
25–29	4,7	1,9	2,0	0,8	0,8	3,0	6,1	336
30–39	7,7	1,4	1,6	0,2	0,2	2,9	9,2	822
40–49	6,5	1,5	0,8	0,0	0,0	2,3	7,6	589
Religion								
Musulmane	7,7	1,8	1,4	0,3	0,3	2,8	9,0	2 017
Chrétienne	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	69
Animiste	(1,5)	(3,3)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(3,3)	(4,8)	29
Autre	*	*	*	*	*	*	*	1
Sans religion	*	*	*	*	*	*	*	27
Ethnie								
Bambara	7,0	1,1	1,2	0,3	0,3	1,9	7,9	659
Malinke	15,0	4,8	2,6	0,9	0,9	6,6	17,0	257
Peulh	4,9	1,4	0,5	0,4	0,4	1,6	5,1	289
Sarakole/Soninke/Marka	8,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	8,1	187
Kassonke	*	*	*	*	*	*	*	11
Sonraï	5,5	3,6	3,0	1,9	1,9	4,7	6,7	90
Dogon	8,4	1,3	3,2	0,0	0,0	4,5	12,2	161
Touareg/Bella	0,8	6,8	6,4	0,0	0,0	13,2	14,0	40
Sénoufo/Minianka	7,8	1,2	0,6	0,0	0,0	1,8	9,1	257
Bobo	(12,1)	(1,2)	(3,7)	(0,0)	(0,0)	(4,9)	(12,1)	49
Bozo	1,1	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	3,3	42
Arabe/Maure	5,1	0,1	0,8	0,0	0,0	0,9	6,0	20
Autre ethnie malienne	9,6	3,0	0,7	0,0	0,0	3,7	11,5	58
Pays CEDEAO	*	*	*	*	*	*	*	11
Autres pays africains	*	*	*	*	*	*	*	11
Autres nationalités	*	*	*	*	*	*	*	2
Résidence								
Bamako	8,2	1,2	2,7	0,0	0,0	4,0	10,2	368
Autre urbain	13,4	5,3	2,7	2,3	2,3	5,7	14,5	253
Ensemble urbain	10,4	2,9	2,7	0,9	0,9	4,7	12,0	621
Rural	6,7	1,3	1,1	0,1	0,1	2,2	8,0	1 523
Région								
Kayes	14,0	2,8	1,7	0,3	0,3	4,2	15,5	331
Koulikoro	7,8	1,7	0,2	0,2	0,2	1,7	8,6	489
Sikasso	4,8	0,9	1,1	0,7	0,7	1,3	5,2	409
Ségou	7,8	2,2	2,6	1,0	1,0	3,7	9,4	288
Mopti	3,6	1,3	2,2	0,0	0,0	3,6	6,3	169
Tombouctou	2,0	2,5	0,9	0,0	0,0	3,4	5,4	42
Gao	4,8	5,9	0,0	0,0	0,0	5,9	9,6	46
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	1
Bamako	8,2	1,2	2,7	0,0	0,0	4,0	10,2	368
État matrimonial								
Célibataire	8,4	2,0	0,4	0,0	0,0	2,4	8,7	125
A actuellement une partenaire intime	10,1	2,6	0,5	0,0	0,0	3,0	10,6	98
A eu une partenaire intime	*	*	*	*	*	*	*	27
A déjà été marié	8,0	1,8	1,6	0,4	0,4	3,0	9,5	1 818
Marié/vivant ensemble	7,9	1,8	1,6	0,4	0,4	3,0	9,4	1 773
Divorcé/séparé/veuf	12,4	3,1	0,0	0,0	0,0	3,1	14,2	46
Emploi								
Travaillait et payée en argent	8,3	1,5	1,3	0,3	0,3	2,5	9,5	1 567
Travaillait mais pas payée en argent	5,6	1,1	2,4	0,4	0,4	3,1	7,5	497
Ne travaillait pas	10,5	10,5	1,5	1,5	1,5	10,5	13,3	80
Niveau d'instruction								
Aucun	6,3	1,4	1,1	0,2	0,2	2,4	7,5	944
Primaire	8,2	2,6	0,9	0,7	0,7	2,9	9,3	404
Secondaire ou plus	9,2	1,7	2,3	0,4	0,4	3,6	11,1	796

À suivre...

Tableau 18.11.2—*Suite*

Caractéristique sociodémographique	Violence émotionnelle	Violence physique	Violence sexuelle	Physique et sexuelle	Physique et sexuelle et émotionnelle	Physique ou sexuelle	Physique ou sexuelle ou émotionnelle	Effectif d'hommes ayant déjà eu une femme/ partenaire intime
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	7,6	1,9	1,1	0,3	0,3	2,8	9,5	376
Second	6,3	0,5	0,4	0,0	0,0	1,0	6,7	392
Moyen	7,8	2,0	2,4	0,2	0,2	4,2	10,6	389
Quatrième	8,8	2,1	0,9	0,6	0,6	2,4	9,3	478
Le plus élevé	7,8	2,0	2,6	0,6	0,6	4,1	9,7	509
Ensemble 15–49	7,7	1,8	1,5	0,4	0,4	2,9	9,2	2 144
50–64	4,3	0,2	0,9	0,0	0,0	1,1	5,4	549
Ensemble 15–64	7,0	1,4	1,4	0,3	0,3	2,6	8,4	2 693

Note : Le terme femme inclut une partenaire avec lequel un homme vit comme s'il était marié. Femme/partenaire intime désigne la femme actuelle pour les hommes actuellement mariés, la femme la plus récente pour les hommes divorcés, sépares ou veufs, la partenaire intime actuel pour les hommes qui ont déjà été mariés qui ont actuellement une partenaire intime, et la partenaire intime la plus récente pour les hommes qui n'ont jamais été mariés et qui n'ont pas actuellement de partenaire intime mais en ont eu un dans le passé. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés ; un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 18.12.1 Violence du partenaire intime selon les caractéristiques du mari/partenaire intime et les indicateurs d'autonomie : Femmes

Pourcentage de femmes de 15–49 ans ayant déjà eu un mari ou un partenaire intime et qui ont subi des actes de violence émotionnelle, physique ou sexuelle commis par leur mari/partenaire intime actuel ou par le plus récent, selon les caractéristiques du mari/partenaire intime et les indicateurs d'autonomie des femmes, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Violence émotionnelle	Violence physique	Violence sexuelle	Physique et sexuelle	Physique et sexuelle et émotionnelle	Physique ou sexuelle	Physique ou sexuelle ou émotionnelle	Effectif de femmes ayant déjà eu un mari/partenaire intime
Consommation d'alcool du mari/partenaire intime								
Ne boit pas d'alcool	27,6	26,1	7,6	5,5	4,3	28,3	37,2	3 553
Boit de l'alcool mais n'est jamais ivre	*	*	*	*	*	*	*	18
Est parfois ivre	(55,9)	(57,6)	(27,9)	(26,2)	(21,5)	(59,3)	(71,3)	41
Est souvent ivre	(59,9)	(56,5)	(38,3)	(38,3)	(36,0)	(56,5)	(65,5)	32
Niveau d'instruction du mari[1]								
Aucun	29,6	27,6	7,5	5,6	4,3	29,6	39,5	2 025
Primaire	30,1	33,0	11,5	7,5	5,5	37,0	45,9	285
Secondaire ou plus	28,6	27,7	7,7	6,2	4,7	29,1	38,0	691
Ne sait pas/manquante	28,7	24,3	9,5	4,8	4,2	29,0	38,8	192
Écart de niveau d'instruction entre conjoint[1]								
Mari plus instruit	29,2	31,1	8,9	7,1	5,7	32,9	40,5	710
Femme plus instruite	32,4	27,2	7,3	4,2	2,9	30,3	42,1	642
Les deux ont le même niveau	34,3	23,4	7,4	6,0	4,2	24,7	41,1	92
Ni l'un, ni l'autre instruit	28,0	27,5	7,8	6,0	4,6	29,2	38,4	1 558
Ne sait pas/manquante	28,7	24,3	9,5	4,8	4,2	29,0	38,8	192
Écart d'âge entre conjoint[1]								
Femme plus âgée	(33,3)	(23,2)	(20,4)	(20,4)	(20,4)	(23,2)	(33,3)	38
Femme a le même âge	*	*	*	*	*	*	*	17
Femme plus jeune de 1–4 ans	32,9	27,8	7,5	5,3	3,9	30,0	40,3	464
Femme plus jeune de 5–9 ans	28,1	26,6	7,8	5,0	3,4	29,4	38,6	1 104
Femme plus jeune d'au moins 10 ans	29,2	28,9	8,0	6,3	5,1	30,6	40,3	1 571
Nombre de décisions auxquelles la femme a participé[2]								
0	27,4	26,4	8,2	6,0	4,5	28,6	37,9	1 905
1–2	32,3	29,0	8,9	6,4	4,9	31,5	42,2	945
3	32,0	33,6	4,9	3,6	3,3	34,9	43,1	343
Nombre de comportements de contrôle exercés par le mari/partenaire intime[3]								
0	14,7	14,4	2,8	1,6	1,3	15,5	21,5	1 434
1–2	29,4	27,5	8,3	5,5	4,3	30,2	40,3	1 517
3–4	51,9	50,1	17,0	14,2	11,9	52,8	65,9	595
5	59,9	53,9	31,6	25,7	19,4	59,9	72,4	98
Nombre de raisons justifiant qu'un mari batte sa femme[4]								
0	22,2	19,0	5,0	3,1	2,5	20,9	29,0	1 126
1–2	28,6	26,3	6,8	4,8	3,9	28,3	38,4	734
3–4	32,1	32,4	11,4	8,3	6,6	35,6	44,2	1 164
5	31,1	30,4	9,6	8,2	6,3	31,8	41,9	620
Le père de l'enquêtée battait sa mère								
Oui	46,9	52,7	22,7	19,4	12,8	56,0	64,5	382
Non	26,9	24,5	6,9	4,8	4,2	26,6	36,0	2 968
Ne sait pas	16,8	15,3	2,3	0,7	0,3	17,0	22,9	293
L'enquêtée a peur de son mari/partenaire intime								
A peur la plupart du temps	54,4	48,9	22,2	18,7	15,4	52,4	68,6	559
A peur parfois	36,2	35,5	9,3	6,7	5,3	38,1	47,7	1 316
N'a jamais peur	13,9	13,2	2,9	1,4	1,0	14,7	21,0	1 769
Ensemble	28,2	26,7	8,2	6,0	4,8	28,9	37,9	3 643

Note : Le terme mari inclut un partenaire avec lequel une femme vit comme si elle était mariée. Mari/partenaire intime désigne le mari actuel pour les femmes actuellement mariées, le mari le plus récent pour les femmes divorcées, séparées ou veuves, le partenaire intime actuel pour les femmes qui ont déjà été mariées qui ont actuellement un partenaire intime, et le partenaire intime le plus récent pour les femmes qui n'ont jamais été mariées et qui n'ont pas actuellement de partenaire intime mais en ont eu un dans le passé. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés ; un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

[1] Comprend seulement les femmes actuellement mariées/en union

[2] Selon le rapport des femmes. Comprend seulement les femmes actuellement mariées/en union. Se reporter au Tableau 15.8.1 pour la liste des décisions.

[3] Selon le rapport des femmes. Se reporter au Tableau 18.9.1 pour la liste des comportements.

[4] Selon le rapport des femmes. Se reporter au Tableau 15.9.1 pour la liste des raisons.

Tableau 18.12.2 Violence du partenaire intime selon les caractéristiques de la femme/partenaire intime : Hommes

Pourcentage d'hommes de 15–49 ans ayant déjà eu une femme ou une partenaire intime et qui ont subi des actes de violence émotionnelle, physique ou sexuelle commis par leur épouse/partenaire intime actuelle ou par la plus récente, selon les caractéristiques de l'épouse/partenaire intime, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Violence émotionnelle	Violence physique	Violence sexuelle	Physique et sexuelle	Physique et sexuelle et émotionnelle	Physique ou sexuelle	Physique ou sexuelle ou émotionnelle	Effectif d'hommes ayant déjà eu une femme/ partenaire intime
Consommation d'alcool de la femme/partenaire intime								
Ne boit pas d'alcool	7,6	1,7	1,5	0,4	0,4	2,8	9,0	2 137
Boit de l'alcool mais n'est jamais ivre	*	*	*	*	*	*	*	1
Est parfois ivre	*	*	*	*	*	*	*	6
Nombre de décisions auxquelles le mari a participé[1]								
0	1,7	1,2	2,6	0,0	0,0	3,8	5,2	161
1–2	6,8	1,6	1,2	0,3	0,3	2,6	8,0	1 598
Nombre de comportements de contrôle exercés par la femme/partenaire intime[2]								
0	3,6	0,8	0,4	0,0	0,0	1,2	4,6	1 023
1–2	9,7	2,2	2,1	0,4	0,4	3,9	11,5	933
3–4	18,3	3,5	5,2	2,2	2,2	6,6	20,7	183
5	*	*	*	*	*	*	*	6
Nombre de raisons justifiant qu'un mari batte sa femme[3]								
0	7,3	1,1	1,4	0,2	0,2	2,2	8,6	1 285
1–2	8,0	3,3	2,0	0,7	0,7	4,6	9,8	561
3–4	9,3	0,9	1,2	0,2	0,2	2,0	10,6	261
5	(7,9)	(8,0)	(3,2)	(3,2)	(3,2)	(8,0)	(9,2)	37
Le père de l'enquêté battait sa mère								
Oui	16,1	1,8	3,4	0,2	0,2	5,0	18,3	184
Non	7,1	1,8	1,4	0,3	0,3	2,8	8,5	1 799
Ne sait pas	5,5	1,6	1,2	0,7	0,7	2,1	6,4	161
L'enquêté a peur de sa femme/partenaire intime								
A peur la plupart du temps	*	*	*	*	*	*	*	7
A peur parfois	36,0	11,6	10,5	3,9	3,9	18,2	43,0	116
N'a jamais peur	5,9	1,1	0,9	0,1	0,1	2,0	7,0	2 022
Ensemble 15–49	7,7	1,8	1,5	0,4	0,4	2,9	9,2	2 144
50–64	4,3	0,2	0,9	0,0	0,0	1,1	5,4	549
Ensemble 15–64	7,0	1,4	1,4	0,3	0,3	2,6	8,4	2 693

Note : Le terme femme inclut une partenaire avec laquelle un homme vit comme s'il était marié. Femme/partenaire intime désigne la femme actuelle pour les hommes actuellement mariés, la femme la plus récente pour les hommes divorcés, séparés ou veufs, la partenaire intime actuelle pour les hommes qui ont déjà été mariés qui ont actuellement une partenaire intime, et la partenaire intime la plus récente pour les hommes qui n'ont jamais été mariés et qui n'ont pas actuellement de partenaire intime mais en ont eu une dans le passé. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés ; un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

[1] Comprend seulement les hommes actuellement mariés/en union

[2] Selon le rapport des hommes. Comprend seulement les hommes actuellement mariés/en union. Se reporter au Tableau 15.8.2 pour la liste des décisions.

[3] Selon le rapport des hommes. Se reporter au Tableau 18.9.2 pour la liste des comportements.

[4] Selon le rapport des hommes. Se reporter au Tableau 15.9.2 pour la liste des raisons.

Tableau 18.13.1 Violence du mari ou partenaire intime au cours des 12 derniers mois : Femmes

Pourcentage de femmes de 15–49 ans ayant déjà eu un mari ou un partenaire intime et qui ont subi des actes de violence émotionnelle, physique ou sexuelle commis par un mari/partenaire intime au cours des 12 derniers mois, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Violence émotionnelle	Violence physique	Violence sexuelle	Physique et sexuelle	Physique et sexuelle et émotionnelle	Physique ou sexuelle	Physique ou sexuelle ou émotionnelle	Effectif de femmes ayant déjà eu un mari/partenaire intime
Âge								
15–19	15,3	12,4	7,9	3,2	2,4	17,1	23,6	473
20–24	22,4	11,9	7,3	3,4	1,9	15,8	27,8	790
25–29	25,5	18,8	7,8	5,9	5,2	20,7	31,7	657
30–39	22,8	13,0	4,2	2,6	2,3	14,6	27,1	1 102
40–49	19,7	11,0	4,0	1,8	1,2	13,3	23,8	623
Résidence								
Bamako	21,2	12,3	5,2	2,7	2,6	14,7	25,7	539
Autre urbain	21,0	12,4	6,0	3,5	3,0	14,8	26,1	416
Ensemble urbain	21,1	12,3	5,5	3,1	2,8	14,8	25,9	954
Rural	21,9	13,8	6,1	3,4	2,5	16,5	27,5	2 689
Région								
Kayes	24,2	17,5	8,9	5,8	3,6	20,6	32,2	553
Koulikoro	17,5	13,2	5,5	3,6	2,5	15,2	23,4	808
Sikasso	30,3	14,3	8,3	3,6	2,8	19,0	37,0	689
Ségou	24,4	14,8	4,4	1,8	1,6	17,4	27,5	551
Mopti	12,4	6,0	1,9	1,4	1,4	6,5	14,7	337
Tombouctou	12,6	14,5	7,4	4,9	4,6	17,0	19,9	58
Gao	8,1	8,9	3,3	2,3	2,3	9,8	11,4	107
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	1
Bamako	21,2	12,3	5,2	2,7	2,6	14,7	25,7	539
État matrimonial								
Célibataire	10,9	5,3	5,8	1,0	1,0	10,0	14,4	340
A actuellement un partenaire intime	10,8	4,6	5,3	0,4	0,4	9,4	14,6	287
A eu un partenaire intime	(11,0)	(9,0)	(8,2)	(3,9)	(3,9)	(13,3)	(13,3)	54
A déjà été mariée	22,8	14,2	6,0	3,5	2,7	16,7	28,4	3 303
Mariée/vivant ensemble	23,0	14,2	5,8	3,4	2,5	16,6	28,5	3 193
Divorcée/séparée/veuve	18,6	15,6	12,7	8,6	7,5	19,7	25,4	110
Niveau d'instruction								
Aucun	21,3	14,3	5,7	3,6	2,6	16,5	27,1	2 084
Primaire	24,7	13,0	7,8	3,7	2,7	17,1	30,7	590
Secondaire ou plus	20,8	11,7	5,3	2,5	2,4	14,6	24,9	970
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	25,6	13,2	7,6	3,4	2,3	17,4	30,9	643
Second	25,4	17,2	7,1	4,3	2,9	19,9	32,3	703
Moyen	20,4	14,1	6,3	3,6	2,5	16,9	26,7	739
Quatrième	21,5	13,8	4,8	2,6	2,5	15,9	26,6	784
Le plus élevé	16,5	9,0	4,5	2,7	2,6	10,8	19,9	775
Ensemble	21,7	13,4	6,0	3,3	2,5	16,1	27,1	3 643

Note : Le terme mari inclut un partenaire avec lequel une femme vit comme si elle était mariée. Mari/partenaire intime inclut tous les maris actuels, les plus récents et les anciens maris pour les femmes qui ont déjà été mariées et tous les partenaires intimes actuels, les plus récents ou les anciens pour les femmes qui n'ont jamais été mariées. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 18.13.2 Violence de la femme ou partenaire intime au cours des 12 derniers mois : Hommes

Pourcentage d'hommes de 15–49 ans ayant déjà eu une femme ou une partenaire intime et qui ont subi des actes de violence émotionnelle, physique ou sexuelle commis par une femme/partenaire intime au cours des 12 derniers mois, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Violence émotionnelle	Violence physique	Violence sexuelle	Physique et sexuelle	Physique et sexuelle et émotionnelle	Physique ou sexuelle	Physique ou sexuelle ou émotionnelle	Effectif d'hommes ayant déjà eu une femme/ partenaire intime
Âge								
15–19	16,4	2,2	0,8	0,0	0,0	3,0	17,2	108
20–24	10,2	1,7	1,9	0,8	0,8	2,8	11,0	289
25–29	3,5	1,9	2,0	0,8	0,8	3,0	5,0	336
30–39	5,3	1,0	1,7	0,2	0,2	2,6	7,0	822
40–49	4,9	0,5	0,8	0,0	0,0	1,3	5,6	589
Résidence								
Bamako	5,3	0,7	2,3	0,0	0,0	3,0	6,9	368
Autre urbain	12,3	4,4	2,8	1,8	1,8	5,4	13,8	253
Ensemble urbain	8,2	2,2	2,5	0,7	0,7	4,0	9,7	621
Rural	5,3	0,8	1,0	0,1	0,1	1,7	6,4	1 523
Région								
Kayes	10,6	1,4	2,1	0,3	0,3	3,2	12,4	331
Koulikoro	7,5	1,0	0,9	0,2	0,2	1,7	8,1	489
Sikasso	4,2	0,9	1,1	0,7	0,7	1,3	4,6	409
Ségou	5,9	1,4	1,9	0,6	0,6	2,7	7,1	288
Mopti	1,7	1,2	0,9	0,0	0,0	2,0	3,4	169
Tombouctou	2,0	2,4	0,9	0,0	0,0	3,4	5,4	42
Gao	4,8	5,6	0,0	0,0	0,0	5,6	9,6	46
Kidal	†	†	†	†	†	†	†	1
Bamako	5,3	0,7	2,3	0,0	0,0	3,0	6,9	368
État matrimonial								
Célibataire	7,3	2,0	0,4	0,0	0,0	2,4	7,6	125
A actuellement un partenaire intime	8,8	2,6	0,5	0,0	0,0	3,0	9,2	98
A eu un partenaire intime	*	*	*	*	*	*	*	27
A déjà été marié	6,4	1,1	1,5	0,4	0,4	2,2	7,5	1 818
Marié/vivant ensemble	6,2	1,1	1,5	0,4	0,4	2,2	7,3	1 773
Divorcé/séparé/veuf	12,4	3,1	0,0	0,0	0,0	3,1	14,2	46
Niveau d'instruction								
Aucun	4,4	0,9	1,2	0,2	0,2	1,9	5,5	944
Primaire	7,2	1,7	1,2	0,7	0,7	2,2	8,2	404
Secondaire ou plus	7,7	1,2	2,0	0,3	0,3	3,0	9,1	796
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	6,0	0,8	1,3	0,3	0,3	1,8	7,3	376
Second	4,7	0,3	0,4	0,0	0,0	0,8	5,2	392
Moyen	4,9	1,2	1,5	0,2	0,2	2,4	6,9	389
Quatrième	8,2	2,0	0,9	0,6	0,6	2,3	8,5	478
Le plus élevé	6,5	1,3	3,0	0,3	0,3	4,0	8,3	509
Ensemble 15–49	6,2	1,2	1,5	0,3	0,3	2,3	7,4	2 144
50–64	2,7	0,2	0,9	0,0	0,0	1,1	3,8	549
Ensemble 15–64	5,4	1,0	1,4	0,2	0,2	2,1	6,6	2 693

Note : Le terme femme inclut une partenaire avec laquelle un homme vit comme s'il était marié. Femme/partenaire intime désigne la femme actuelle pour les hommes actuellement mariés, la femme la plus récente pour les hommes divorcés, séparés ou veufs, la partenaire intime actuelle pour les hommes qui ont déjà été mariés qui ont actuellement une partenaire intime, et la partenaire intime la plus récente pour les hommes qui n'ont jamais été mariés et qui n'ont pas actuellement de partenaire intime mais en ont eu un dans le passé. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 18.14 Blessures des femmes et hommes dues à la violence du partenaire intime

Parmi les femmes et les hommes de 15–49 ans ayant déjà eu un mari/femme ou un partenaire intime et qui ont subi des actes de violence de la part leur mari/femme/partenaire intime actuel ou par le plus récent, pourcentage ayant déclaré différents types de blessures résultant d'un/des actes de violence, par type de blessure, selon la forme de la violence, EDSM-VII Mali 2023–2024

Forme de violence	Coupures, hématomes ou meurtrissures	Hématomes à l'œil, foulures, luxations ou brûlures	Blessures profondes, os cassés, dents cassées ou autres blessures graves	Une de ces blessures	Effectif d'enquêtés, non célibataires, ayant subi des actes de violence physique ou sexuelle
			FEMME		
Violence physique[1]					
À un moment quelconque[2]	14,8	7,7	6,4	19,8	973
Au cours des 12 derniers mois	17,6	10,8	9,9	26,0	483
Violence sexuelle					
À un moment quelconque[2]	20,5	11,6	9,4	29,1	298
Au cours des 12 derniers mois	19,9	14,1	10,5	30,3	206
Violence physique ou sexuelle[1]					
À un moment quelconque[2]	13,8	7,3	6,0	18,7	1 054
Au cours des 12 derniers mois	15,6	9,5	8,8	23,4	570
			HOMME		
Violence physique[1]					
À un moment quelconque[2]	(3,8)	(0,0)	(0,0)	(3,8)	38
Au cours des 12 derniers mois	(2,3)	(0,0)	(0,0)	(2,3)	25
Violence sexuelle					
À un moment quelconque[2]	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	33
Au cours des 12 derniers mois	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	24
Violence physique ou sexuelle[1]					
À un moment quelconque[2]	2,3	0,0	0,0	2,3	63
Au cours des 12 derniers mois	(1,4)	(0,0)	(0,0)	(1,4)	42

Note : Le terme mari inclut un partenaire avec lequel une femme vit comme si elle était mariée. Mari/partenaire intime désigne le mari actuel pour les femmes actuellement mariées, le mari le plus récent pour les femmes divorcées, séparées ou veuves, le partenaire intime actuel pour les femmes qui ont déjà été mariées qui ont actuellement un partenaire intime, et le partenaire intime le plus récent pour les femmes qui n'ont jamais été mariées et qui n'ont pas actuellement de partenaire intime mais en ont eu un dans le passé. Le terme femme inclut une partenaire avec laquelle un homme vit comme s'il était marié. Femme/partenaire intime désigne la femme actuelle pour les hommes actuellement mariés, la femme la plus récente pour les hommes divorcés, séparés ou veufs, la partenaire intime actuelle pour les hommes qui ont déjà été mariés qui ont actuellement une partenaire intime, et la partenaire intime la plus récente pour les hommes qui n'ont jamais été mariés et qui n'ont pas actuellement de partenaire intime mais en ont eu un dans le passé. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés.

[1] Non compris les femmes qui ont déclaré avoir subi des actes de violence uniquement en réponse à la question directe sur la violence pendant une grossesse

[2] Y compris au cours des 12 derniers mois

Tableau 18.15 Violence des femmes et hommes contre leur mari/femme/partenaire intime selon les caractéristiques sociodémographiques des enquêtés

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans qui ont déjà eu un mari/une femme ou un partenaire intime qui ont commis, à un moment quelconque ou au cours des 12 derniers mois, des actes de violence physique contre leur mari/femme/partenaire intime actuel ou le plus récent alors qu'il/elle ne les avait ni battus ni agressés physiquement, selon le fait qu'enquêtés avaient subi ou non des actes de violence d'un partenaire intime et selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Femme			Homme		
	Pourcentage ayant commis des actes de violence physique contre leur mari/partenaire intime		Effectif de femmes ayant déjà eu un mari/partenaire intime	Pourcentage ayant commis des actes de violence physique contre leur mari/partenaire intime		Effectif d'hommes ayant déjà eu une femme/ partenaire intime
Caractéristique sociodémographique	À un moment quelconque[1]	Au cours des 12 derniers mois		À un moment quelconque[1]	Au cours des 12 derniers mois	
Enquêtés ayant subi des violences physiques de la part de leur partenaire intime						
À un moment quelconque[1]	10,5	5,3	973	(13,4)	(4,6)	39
Au cours des 12 derniers mois	12,6	9,4	483	(9,7)	(2,2)	26
Jamais	0,6	0,2	2 670	8,2	2,9	2 655
Âge						
15–19	2,3	1,5	473	0,9	0,9	108
20–24	1,9	1,0	790	5,3	3,1	289
25–29	3,3	1,9	657	5,6	2,7	336
30–39	4,0	1,7	1 102	8,6	3,4	822
40–49	4,3	1,8	623	8,9	2,5	589
Religion						
Musulmane	3,3	1,6	3 459	7,5	3,0	2 017
Chrétienne	4,6	1,8	89	5,1	0,0	69
Animiste	*	*	13	(9,8)	(3,1)	29
Autre	*	*	0	*	*	1
Sans religion	1,4	1,4	83	*	*	27
Ethnie						
Bambara	4,2	2,0	1 173	10,0	4,2	659
Malinke	3,2	1,9	363	4,0	2,5	257
Peulh	4,4	2,4	464	7,6	2,6	289
Sarakole/Soninke/Marka	2,4	1,0	406	8,0	2,5	187
Kassonke	*	*	22	*	*	11
Sonraï	0,7	0,7	149	1,1	0,0	90
Dogon	1,0	1,0	268	12,0	4,7	161
Touareg/Bella	1,1	1,1	80	4,5	0,6	40
Sénoufo/Minianka	3,4	1,6	400	4,9	1,4	257
Bobo	3,8	1,0	85	(6,5)	(3,7)	49
Bozo	3,2	0,0	126	2,5	0,0	42
Arabe/Maure	0,0	0,0	25	2,5	0,0	20
Autre ethnie malienne	(0,0)	(0,0)	45	4,4	0,0	58
Pays CEDEAO	*	*	19	*	*	11
Autres pays africains	*	*	8	*	*	11
Autres nationalités	*	*	9	*	*	2
Résidence						
Bamako	2,6	1,7	539	6,9	2,3	368
Autre urbain	2,2	1,1	416	5,1	2,1	253
Ensemble urbain	2,4	1,5	954	6,2	2,3	621
Rural	3,5	1,6	2 689	7,9	3,2	1 523
Région						
Kayes	2,6	1,5	553	2,8	1,6	331
Koulikoro	1,1	0,2	808	9,2	5,8	489
Sikasso	7,8	2,9	689	5,2	1,3	409
Ségou	4,1	2,5	551	13,4	4,0	288
Mopti	0,9	0,9	337	11,2	1,8	169
Tombouctou	0,6	0,6	58	0,6	0,6	42
Gao	1,2	1,2	107	0,0	0,0	46
Kidal	†	†	1	†	†	1
Bamako	2,6	1,7	539	6,9	2,3	368
État matrimonial						
Célibataire	2,4	1,0	340	4,6	2,7	125
A actuellement un partenaire intime	2,9	1,1	287	5,9	3,4	98
A eu un partenaire intime	(0,0)	(0,0)	54	*	*	27
A déjà été marié	3,3	1,6	3 303	7,9	3,0	1 818
Marié/vivant ensemble	3,2	1,6	3 193	7,9	2,9	1 773
Divorcé/séparé/veuf	5,6	3,0	110	7,5	4,4	46
Emploi						
Travaillait et payée en argent	3,8	1,8	1 940	6,4	2,9	1 567
Travaillait mais pas payée en argent	6,0	3,1	411	11,4	3,1	497
Ne travaillait pas	1,6	0,8	1 293	1,5	1,5	80

À suivre...

Tableau 18.15—*Suite*

Caractéristique sociodémographique	Femme			Homme		
	Pourcentage ayant commis des actes de violence physique contre leur mari/partenaire intime		Effectif de femmes ayant déjà eu un mari/partenaire intime	Pourcentage ayant commis des actes de violence physique contre leur mari/partenaire intime		Effectif d'hommes ayant déjà eu une femme/ partenaire intime
	À un moment quelconque[1]	Au cours des 12 derniers mois		À un moment quelconque[1]	Au cours des 12 derniers mois	
Niveau d'instruction						
Aucun	3,2	1,7	2 084	8,2	2,9	944
Primaire	3,9	1,0	590	9,3	2,0	404
Secondaire ou plus	2,8	1,7	970	5,4	3,3	796
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	5,2	1,4	643	14,8	5,0	376
Second	3,9	2,1	703	7,0	2,7	392
Moyen	4,1	2,5	739	3,8	1,7	389
Quatrième	1,2	0,8	784	5,5	1,5	478
Le plus élevé	2,3	1,2	775	6,7	3,7	509
Ensemble 15–49	3,2	1,6	3 643	7,4	2,9	2 144
50–64	na	na	na	11,6	3,2	549
Ensemble 15–64	na	na	na	8,3	3,0	2 693

Note : Le terme mari inclut un partenaire avec lequel une femme vit comme si elle était mariée. Mari/partenaire intime désigne le mari actuel pour les femmes actuellement mariées, le mari le plus récent pour les femmes divorcées, séparées ou veuves, le partenaire intime actuel pour les femmes qui ont déjà été mariées qui ont actuellement un partenaire intime, et le partenaire intime le plus récent pour les femmes qui n'ont jamais été mariées et qui n'ont pas actuellement de partenaire intime mais en ont eu un dans le passé. Le terme femme inclut une partenaire avec laquelle un homme vit comme s'il était marié. Femme/partenaire intime désigne la femme actuelle pour les hommes actuellement mariés, la femme la plus récente pour les hommes divorcés, séparés ou veufs, la partenaire intime actuelle pour les hommes qui ont déjà été mariés qui ont actuellement une partenaire intime, et la partenaire intime la plus récente pour les hommes qui n'ont jamais été mariés et qui n'ont pas actuellement de partenaire intime mais en ont eu un dans le passé. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

[1] Y compris au cours des 12 derniers mois

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau 18.16 Violence des enquêtés contre leur mari/femme/partenaire intime selon les caractéristiques du mari/femme/partenaire intime et les indicateurs d'autonomie des femmes

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15–49 ans ayant déjà eu un mari/femme ou un partenaire intime et qui ont commis, à un moment quelconque ou au cours des 12 derniers mois, des actes de violence physique contre leur mari/femme/partenaire intime actuel ou le plus récent alors qu'il/elle ne les avait ni battus, ni agressés physiquement, selon les caractéristiques de leur mari/femme/partenaire intime et selon les indicateurs du pouvoir d'action des femmes, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Femme			Homme		
	Pourcentage ayant commis des actes de violence physique contre leur mari/partenaire intime		Effectif de femmes ayant déjà eu un mari/partenaire intime	Pourcentage ayant commis des actes de violence physique contre leur mari/partenaire intime		Effectif d'hommes ayant déjà eu une femme/partenaire intime
Caractéristique sociodémographique	À un moment quelconque[1]	Au cours des 12 derniers mois		À un moment quelconque[1]	Au cours des 12 derniers mois	
Consommation d'alcool du mari/femme/partenaire intime						
Ne boit pas d'alcool	3,1	1,4	3 553	7,4	2,9	2 137
Boit de l'alcool mais n'est jamais ivre	*	*	18	*	*	1
Est parfois ivre	(11,0)	(11,0)	41	*	*	6
Est souvent ivre	(4,5)	(4,5)	32	*	*	0
Niveau d'instruction du mari[2]						
Aucun	3,7	1,6	2 025	na	na	na
Primaire	4,3	3,3	285	na	na	na
Secondaire ou plus	2,2	1,1	691	na	na	na
Ne sait pas/manquante	0,9	0,5	192	na	na	na
Écart de niveau d'instruction entre conjoint[2]						
Mari plus instruit	3,0	1,5	710	na	na	na
Femme plus instruite	3,4	1,1	642	na	na	na
Les deux ont le même niveau	4,6	4,6	92	na	na	na
Ni l'un, ni l'autre instruit	3,5	1,8	1 558	na	na	na
Ne sait pas/manquante	0,9	0,5	192	na	na	na
Écart d'âge entre conjoint[2]						
Femme plus âgée	(0,0)	(0,0)	38	na	na	na
Femme a le même âge	*	*	17	na	na	na
Femme plus jeune de 1–4 ans	3,7	1,0	464	na	na	na
Femme plus jeune de 5–9 ans	3,8	2,1	1 104	na	na	na
Femme plus jeune d'au moins 10 ans	2,9	1,5	1 571	na	na	na
Nombre de décisions auxquelles la femme/le mari a participé[3]						
0	2,8	1,0	1 905	5,8	2,0	161
1–2	3,2	1,9	945	8,7	3,3	1 598
3	6,0	4,4	343	*	*	0
Nombre de comportements de contrôle exercés par le mari/femme/partenaire intime[4]						
0	0,8	0,6	1 434	5,8	1,5	1 023
1–2	3,4	0,9	1 517	8,2	3,5	933
3–4	7,5	4,6	595	12,7	7,6	183
5	10,0	9,5	98	*	*	6
Nombre de raisons justifiant qu'un mari batte sa femme[5]						
0	2,1	1,3	1 126	5,4	2,3	1 285
1–2	2,4	1,2	734	10,7	4,5	561
3–4	3,8	2,0	1 164	8,4	2,2	261
5	5,3	1,7	620	(19,4)	(4,3)	37
Le père de l'enquêté battait sa mère						
Oui	10,5	3,3	382	20,3	10,3	184
Non	2,5	1,5	2 968	6,1	2,1	1 799
Ne sait pas	0,9	0,6	293	7,6	3,8	161
L'enquêté a peur de son mari/femme/partenaire intime						
A peur la plupart du temps	10,4	5,0	559	*	*	7
A peur parfois	3,0	1,6	1 316	14,5	7,0	116
N'a jamais peur	1,2	0,5	1 769	7,0	2,7	2 022
Ensemble 15–49	3,2	1,6	3 643	7,4	2,9	2 144
50–64	na	na	na	11,6	3,2	549
Ensemble 15–64	na	na	na	8,3	3,0	2 693

Note : Le terme mari inclut un partenaire avec lequel une femme vit comme si elle était mariée. Mari/partenaire intime désigne le mari actuel pour les femmes actuellement mariées, le mari le plus récent pour les femmes divorcées, séparées ou veuves, le partenaire intime actuel pour les femmes qui ont déjà été mariées qui ont actuellement un partenaire intime, et le partenaire intime le plus récent pour les femmes qui n'ont jamais été mariées et qui n'ont pas actuellement de partenaire intime mais en ont eu un dans le passé. Le terme femme inclut une partenaire avec laquelle un homme vit comme s'il était marié. Femme/partenaire intime désigne la femme actuelle pour les hommes actuellement mariés, la femme la plus récente pour les hommes divorcés, séparés ou veufs, la partenaire intime actuelle pour les hommes qui ont déjà été mariés qui ont actuellement une partenaire intime, et la partenaire intime la plus récente pour les hommes qui n'ont jamais été mariés et qui n'ont pas actuellement de partenaire intime mais en ont eu un dans le passé. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25–49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

[1] Y compris au cours des 12 derniers mois

[2] Comprend seulement les femmes actuellement mariées/en union

[3] Selon le rapport de la femme. Comprend seulement les femmes actuellement mariées/en union. Se reporter au Tableau 15.8.1 pour la liste des décisions.

[4] Selon le rapport de la femme/homme. Se reporter au Tableau 18.9.1/Tableau 18.9.2 pour la liste des comportements.

[5] Selon le rapport de la femme/homme. Se reporter au Tableau 15.9.1 pour la liste des raisons.

na = non applicable

RÉFÉRENCES

Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID). 2019. Multi-Sectoral Nutrition Strategy 2014–2025 Technical Guidance Brief: Interventions for Addressing Vitamin and Mineral Inadequacies. USAID. https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/micronutrient-brief-final-May2018-508v2.pdf.

Akashi-Ronquest, N. 2009. The Impact of Biological Preferences on Parental Investments in Children and Step Children. Review of Economics of the Household 7(1):59–81.

Askari, M., J. Heshmati, H. Shahinfar, et al. 2020. "Ultra-processed food and the risk of overweight and obesity: a systematic review and meta-analysis of observational studies." Int J Obes 44, 2080–2091. https://doi.org/10.1038/s41366-020-00650-z

Bradley, S. E. K., T. N. Croft, J. D. Fishel, and C. F. Westoff. 2012. Revising Unmet Need for Family Planning. DHS Analytical Studies No. 25. Calverton, Maryland, USA : ICF International.

Case, A., I. F. Lin, and S. McLanahan. 1999. Household Resource Allocation in Stepfamilies: Darwin Reflects on the Plight of Cinderella. The American Economic Review 89(2):234–238.

Cellule de Planification et de Statistique (CPS/SSDSPF), Institut national de la statistique (INSTAT/MPATP), INFO-STAT et ICF International, 2014. Enquête Démographique et de Santé au Mali 2012-2013. Rockville, Maryland, USA : CPS, INSTAT, INFO-STAT, et ICF International.

Cellule de Planification et de Statistique du ministère de la Santé (CPS/MS), Direction Nationale de la Statistique et de l'Informatique (DNSI) et ORC Macro. 2002. Enquête Démographique et de Santé au Mali 2001. Calverton, Maryland, USA : CPS/MS, DNSI et ORC Macro.

Cellule de Planification et de Statistique/SSDS/ministère de la Santé (CPS/MS), Institut national de la statistique (INSTAT) et ORC Macro. 2007. Enquête Démographique et de Santé au Mali 2006. Calverton, Maryland, USA : CPS/MS, INSTAT, et ICF Macro.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 1998. Recommendations to Prevent and Control Iron Deficiency in the United States. Morbidity and Mortality Weekly Report 47(RR-3):1–29. https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00051880.htm.

Chaparro, C. M., and P. S. Suchdev. 2019. "Anemia Epidemiology, Pathophysiology, and Etiology in Low- and Middle-Income Countries." Annals of the New York Academy of Sciences 1450 (1): 15–31. https://doi.org/10.1111/nyas.14092.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2014. Voices of the Hungry: The Food Insecurity Experience Scale. Rome: FAO. https://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry/en/.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2021. Minimum Dietary Diversity for Women. Rome: FAO. https://doi.org/10.4060/cb3434en.

GBD 2019 Mental Disorders Collaborators. Global, regional, and national burden of 12 mental disorders in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet Psychiatry. 10 January 2022. doi: 10.1016/S2215-0366(21)00395-3

Hackl, L. S., C. D. Karakochuk, D. I. Mazariegos, K. Jeremiah, O. Obeid, N. Ravi, D.A. Ayana, V. Varela, S. Alayón, O. Dary, and D. Moorthy. 2024. Assessing Accuracy and Precision of Hemoglobin Determination in Venous, Capillary Pool, and Single-Drop Capillary Blood Specimens Using Three Different HemoCue® Hb Models: The Multicountry Hemoglobin Measurement (HEME) Study. Journal of Nutrition Epub ahead of print. https://doi.org/10.1016/j.tjnut.2024.03.019.

Haider, B. A., I. Olofin, M. Wang, D. Spiegelman, M. Ezzati, W. W. Fawzi, and Nutrition Impact Model Study Group. 2013. Anaemia, Prenatal Iron Use, and Risk of Adverse Pregnancy Outcomes: Systematic Review and Meta-analysis. BMJ 346:f3443. https://doi.org/10.1136/bmj.f3443.

Institut National de la Statistique (INSTAT), Cellule de Planification et de Statistique Secteur Santé-Développement Social et Promotion de la Famille (CPS/SS-DS-PF) et ICF. 2019. Enquête Démographique et de Santé au Mali 2018. Bamako, Mali et Rockville, Maryland, USA : INSTAT, CPS/SS-DS-PF et ICF.

Korenromp, E. L., J. Armstrong-Schellenberg, B. Williams, B. Nahlen, and R. W. Snow. 2004. Impact of Malaria Control on Childhood Anemia in Africa—A Quantitative Review. Tropical Medicine & International Health 9(10):1050–1065. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-3156.2004.01317.x.

Labaki, W.W., Han, M.K. Chronic respiratory diseases: a global view. Lancet Respiratory Medicine: Vol 8: p531-533, 2020. https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30157-0/fulltext

Lopus, S. 2017. Relatives in Residence: Relatedness of Household Members Drives Schooling Differentials in Mozambique. Journal of Marriage and Family 79(4):897–914.

Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique et Ministère de la Solidarité, de l'Action Humanitaire et de la Reconstruction du Nord et Ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. 2014. Programme de Développement Socio-Sanitaire (PRODESS) III 2014-2018. Bamako, Mali.

Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique et Ministère du Travail et des Affaires Sociales et Humanitaires et Ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. 2014. Plan Décennal de Développement Sanitaire et Social (PDDSS) 2014-2023. Bamako, Mali.

Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique. 2014. Plan d'action national de planification familiale (PANPF) 2014-2018. Bamako, Mali.

Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique. 2014. Plan stratégique de la santé de la reproduction (PSSR) 2014-2018. Bamako, Mali.

Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique. 2017. Plan d'action multisectoriel santé des adolescents et des jeunes. 2017-2021. Bamako, Mali.

Ministère de la Santé et du Développement Social et Ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la famille. Rapport d'activités 2023 et de Programmation 2025 des structures centrales

Ministère de la Santé et du Développement Social. Programme National de Lutte contre la Paludisme. Plan Stratégique National de Lutte contre le Paludisme au Mali 2024–2028. Janvier 2024

Mitchell S, and D. Shaw. 2015. "The worldwide epidemic of female obesity." Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 29(3):289–99. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2014.10.002.

Moran, A. C., K. Kerber, D. Sitrin, T. Guenther, C. S. Morrissey, H. Newby, J. Fishel, P. S. Yoder, Z. Hill, and J. E. Lawn. 2013. Measuring Coverage in MNCH: Indicators for Global Tracking of Newborn Care. PLoS Medicine 10(5):e1001415. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001415.

Namaste, S. M., R. Baingana, and E. Brindle. 2024. Hemoglobin Measurement in Venous Blood Compared with Pooled and Single-drop Capillary Blood: A Method-Comparison Study in a Controlled and Survey Setting in Uganda Among Children and Women. American Journal of Clinical Nutrition 119(4):949–959. https://doi.org/10.1016/j.ajcnut.2023.12.025.

Nations Unies. 2006. Étude approfondie de toutes les formes de violence à l'égard des femmes : Rapport du Secrétaire général. New York: Nations Unies.

Neufeld, L. M., L. M. Larson, A. Kurpad, S. Mburu, R. Martorell, and K. H. Brown. 2019. Hemoglobin Concentration and Anemia Diagnosis in Venous and Capillary Blood: Biological Basis and Policy Implications. Annals of the New York Academy of Sciences 1450(1):172–189. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7496102/.

ONUSIDA.2021. Communiqué de presse. https://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2021/june/20210614_PR_HLM_closes.

Organisation mondiale de la Santé (OMS) and United Nations Children's Fund (UNICEF). 2019. Recommendations for Data Collection, Analysis and Reporting on Anthropometric Indicators in Children under 5 Years Old. Genève: Organisation mondiale de la Santé. https://www.who.int/nutrition/publications/anthropometry-data-quality-report/en/.

Organisation mondiale de la Santé (OMS) and United Nations Children's Fund (UNICEF). 2021. Indicators for Assessing Infant and Young Child Feeding Practices: Definitions and Measurement Methods. Genève: Organisation mondiale de la Santé. https://www.who.int/publications/i/item/9789240018389

Organisation mondiale de la Santé (OMS). 1995. Physical Status: The Use and Interpretation of Anthropometry. OMS Technical Report Series 854. Genève: Organisation mondiale de la Santé. https://apps.who.int/iris/handle/10665/37003.

Organisation mondiale de la Santé (OMS). 2001. Priorité aux femmes : principes d' éthique et de sécurité recommandés pour les recherches sur les actes de violence familiale à l' égard des femmes. Geneva: OMS.

Organisation mondiale de la Santé (OMS). 2003. Guiding Principles for Complementary Feeding of the Breastfed Child. Genève: Organisation mondiale de la Santé. https://iris.paho.org/handle/10665.2/752

Organisation mondiale de la Santé (OMS). 2006. Child Growth Standards. Genève: OMS. https://www.who.int/childgrowth/standards/Technical_report.pdf.

Organisation mondiale de la Santé (OMS). 2007. OMS Growth Reference Data for 5–19 years. Genève: OMS. https://www.who.int/childgrowth/mgrs/en/.

Organisation mondiale de la Santé (OMS). 2011a. Guideline: Intermittent Iron Supplementation in Preschool and School-age Children. Genève: Organisation mondiale de la Santé. https://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/guidelines/guideline_iron_supplementation_children/en/

Organisation mondiale de la Santé (OMS). 2011b. Guideline: Vitamin A Supplementation in Infants and Children 6–59 Months of Age. Genève: Organisation mondiale de la Santé. https://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/guidelines/vas_6to59_months/en/.

Organisation mondiale de la Santé (OMS). 2013. Guideline: Updates on the Management of Severe Acute Malnutrition in Infants and Children. Genève: Organisation mondiale de la Santé. https://www.who.int/publications/i/item/9789241506328.

Organisation mondiale de la Santé (OMS). 2014a. Childhood Stunting: Challenges and Opportunities. Report of a Promoting Healthy Growth and Preventing Childhood Stunting Colloquium. Genève: Organisation mondiale de la Santé. https://apps.who.int/nutrition/publications/childhood_stunting_report/en/index.html.

Organisation mondiale de la Santé (OMS). 2014b. Guideline: fortification of food-grade salt with iodine for the prevention and control of iodine deficiency disorders. Genève: OMS. https://www.who.int/publications/i/item/9789241507929.

Organisation mondiale de la Santé (OMS). 2016a. Guideline: Daily Iron Supplementation in Infants and Children. Genève: Organisation mondiale de la Santé. https://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/guidelines/daily_iron_supp_childrens/en/.

Organisation mondiale de la Santé (OMS). 2016b. Guideline: Use of Multiple Micronutrient Powders for Point-of-Use Fortification of Foods Consumed by Infants and Young Children Aged 6–23 Months and Children Aged 2–12 Years. Genève: Organisation mondiale de la Santé. https://www.who.int/publications/i/item/9789241549943.

Organisation mondiale de la Santé (OMS). 2016c. Recommandations de l'OMS concernant les soins prénatals pour que la grossesse soit une expérience positive [WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience]. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2017. Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Genève : Organisation mondiale de la santé. http://apps.who.int/iris.

Organisation mondiale de la Santé (OMS). 2017. Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates. Geneva: World Health Organization Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. https://www.who.int/publications/i/item/depression-global-health-estimates

Organisation mondiale de la Santé (OMS). 2017a. Guideline: Assessing and Managing Children at Primary Health-Care Facilities to Prevent Overweight and Obesity in the Context of the Double Burden of Malnutrition. Updates for the Integrated Management of Childhood Illness (IMCI). Genève: Organisation mondiale de la Santé. https://www.who.int/publications/i/item/9789241550123.

Organisation mondiale de la Santé (OMS). 2017b. Guideline: Preventive Chemotherapy to Control Soil-transmitted Helminth Infections in At-Risk Population Groups. Genève: Organisation mondiale de la Santé. https://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/deworming/en/

Organisation mondiale de la Santé (OMS). 2018. Guideline: Counselling of Women to Improve Breastfeeding Practices. Genève: Organisation mondiale de la Santé. https://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/counselling women-improve-bf-practices/en/.

Organisation mondiale de la Santé (OMS). 2024. Guideline on Haemoglobin Cutoffs to Define Anaemia in Individuals and Populations. Genève: Organisation mondiale de la Santé. https://www.who.int/publications/i/item/9789240088542.

Perumal, N., D. G. Bassani, and D. E. Roth. 2018. "Use and Misuse of Stunting as a Measure of Child Health." J Nutr 148 (3): 311–315. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29546307.

Programme commun OMS/UNICEF de suivi de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Core questions on drinking water, sanitation and hygiene for household surveys : mise à jour 2018. New York : Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et Organisation mondiale de la Santé, 2018.

Roll Back Malaria Partnership. 2003. Monitoring and Evaluation Reference Group Anemia Task Force Meeting Minutes. Presented at WHO Headquarters. Geneva : 2003 Oct 27-28.

Shonkoff, J., et D. Phillips. From Neurons to Neighborhoods : The Science of Early Childhood Development. Washington, D.C. : National Academy Press, 2000.

Stevens, G. A., M. C. Flores-Urrutia, L. M. Rogers, C. J. Paciorek, F. Rohner, S. Namaste, and J. P. Wirth. 2022. Associations Between Type of Blood Collection, Analytical Approach, Mean Haemoglobin and Anaemia Prevalence in Population-based Surveys: A Systematic Review and Meta-analysis. Journal of Global Health 12:04088. https://doi.org/10.7189/jogh.12.04088.

The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus; Report of the Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care 1 January 2003; 26 (suppl_1): s5–s20. https://doi.org/10.2337/diacare.26.2007.S5

United Nations Children's Fund (UNICEF). 2016. Advancing Early Childhood Development: From Science to Scale. Executive Summary. https://www.thelancet.com/pb-assets/Lancet/stories/series/ecd/Lancet_ECD_Executive_Summary.pdf.

WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene. 2018. Core Questions on Drinking Water, Sanitation and Hygiene for Household Surveys: 2018 Update. New York: United Nations Children's Fund (UNICEF) and World Health Organization (WHO).

World Health Organization (WHO) and United Nations Children's Fund (UNICEF). 2014. Every Newborn: An Action Plan to End Preventable Deaths. Geneva: WHO. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/127938/9789241507448_eng.pdf;sequence=1.

World Health Organization (WHO), United Nations Children's Fund (UNICEF), and United Nations Population Fund (UNFPA). 1997. Female Genital Mutilation: A Joint WHO/UNICEF/UNFPA Statement. Geneva: WHO.

PLAN DE SONDAGE

Annexe A

A.1 INTRODUCTION

Cette section présente une description des objectifs de la septième Enquête Démographique et de Santé au Mali (EDSM-VII), de la taille globale de l'échantillon, des domaines d'études ainsi qu'une description des sous-échantillons utilisés. L'EDSM-VII fait suite à celles réalisées en 1987, 1995, 2001, 2006, 2012–13 et 2018. Elle visait un échantillon national représentatif de 12 000 ménages. Toutes les femmes âgées de 15 à 64 ans vivant de façon permanente dans les ménages sélectionnés, ou ayant passé la nuit précédant l'enquête étaient éligibles pour être enquêtées, avec un nombre attendu d'environ 12 942 femmes de 15 à 49 ans enquêtées avec succès. Comme dans les enquêtes précédentes, l'EDSM-VII a pour objectif principal de recueillir des informations sur les taux de fécondité, de mortalité infantile et infanto-juvénile, sur la connaissance et l'utilisation des méthodes contraceptives, sur la santé maternelle et la santé des enfants de moins de 5 ans et sur la connaissance et les attitudes vis-à-vis des maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida. Les résultats de l'enquête sont présentés pour le Mali, pour la capitale Bamako, pour les autres milieux urbains, pour l'ensemble du milieu urbain et du milieu rural séparément, et pour 9 régions administratives.

Une enquête auprès des hommes était également menée au moment de l'enquête auprès des femmes. Parmi les ménages sélectionnés pour l'enquête auprès des femmes, un ménage sur deux était sélectionné pour l'enquête auprès des hommes. Tous les hommes âgés de 15 à 64 ans vivant de façon permanente dans les ménages sélectionnés, ou ayant passé la nuit précédant l'enquête étaient éligibles pour être enquêtés, avec un nombre attendu d'environ 5 683 hommes de 15–59 ans enquêtés avec succès. Des informations ont été recueillies sur leur connaissance et utilisation des méthodes contraceptives, sur leur connaissance et attitudes vis-à-vis des maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida. Dans ce sous échantillon de ménages, toutes les femmes de 15–49 ans éligibles pour l'enquête individuelle et tous les enfants de moins de 5 ans ont été mesurés et pesés pour déterminer leur état nutritionnel. Dans ce même sous-échantillon, tous les enfants de 6–59 mois et toutes les femmes de 15–49 ans ont été testés pour l'anémie. Enfin, dans ce même sous-échantillon, un module sur la violence domestique contre les hommes a été administré à un homme éligible sélectionné de manière aléatoire par ménage. Dans l'autre sous-échantillon de ménages non sélectionnés pour l'enquête auprès des hommes, tous les enfants de moins de 5 ans ont été mesurés et pesés pour déterminer leur état nutritionnel. Dans ce même sous-échantillon, un module sur la violence domestique contre les femmes a été administré à une femme éligible sélectionnée de manière aléatoire parmi toutes les femmes éligibles du ménage.

A.2 BASE DE SONDAGE

La base de sondage utilisée pour l'EDSM-VII est la base du quatrième Recensement Général de la Population et de l'Habitat du Mali effectué en 2022 (RGPH 2022). L'Institut National de la Statistique (INSTAT) dispose d'un fichier des Sections d'Énumération (SE) créées pour les besoins du RGPH 2022. Ce fichier contient 26 464 SE qui couvrent entièrement le territoire du Mali, avec des informations sur leur identifiant, leur localité, leur milieu de résidence (urbain ou rural), et leur taille en nombre de résidents. Chaque SE a une carte délimitant sa position et ses limites. Au Mali, le nombre de régions a été augmenté de 9 à 11, les deux nouvelles régions étant Taoudenni et Ménaka. Chaque région est composée de cercles, chaque cercle est composé de communes. Au total, il y a 60 cercles et 695 communes dont la ville de Bamako qui est subdivisée en 6 communes.

Le **Tableau A.1** ci-dessous présente la répartition de la population par région et par milieu de résidence à l'intérieur de chaque région. La région la plus peuplée est la région de Koulikoro qui représente 20,8 % de la population totale. La région la moins peuplée est la région de Taoudenni qui ne représente que 0,1 % de la population totale. La capitale Bamako représente 13,0 % de la population totale. Au Mali, 23,7 % de la population réside dans le milieu urbain, dont plus de la moitié réside à Bamako. Le **Tableau A.2** ci-dessous donne la répartition des SE et leur taille moyenne en résidents par région et selon le type de résidence. Au total, le Mali compte 26 464 SE, dont 7 309 sont urbaines, et 19 155 sont rurales. La taille moyenne globale des SE est de 802 résidents, avec 689 résidents dans le milieu urbain et 846 résidents dans le milieu rural. Cette taille moyenne de SE est convenable comme unité primaire de sondage. A part des informations d'identification, chaque SE est aussi classifiée comme « accessible » et « non accessible » en raison des problèmes de sécurité. Comme la situation sécuritaire au niveau de la SE peut changer à tout moment, il a été décidé d'inclure toutes les SE dans le tirage de l'échantillon avec des sur-échantillonnages dans les régions de Mopti, Ségou et Taoudenni où se trouvent la plupart des SE ayant des problèmes de sécurité.

Tableau A.1 Répartition de la population par région et selon le milieu de résidence (RGPH 2022)

	Population par région et selon le milieu				
Région	Urbain	Rural	Total région	Proportion région	Proportion urbaine
Kayes	357 540	2 670 907	3 028 447	14,3	11,8
Koulikoro	278 302	4 146 854	4 425 156	20,8	6,3
Sikasso	761 513	3 024 912	3 786 425	17,8	20,1
Ségou	323 343	2 913 180	3 236 523	15,2	10,0
Mopti	273 836	1 681 292	1 955 128	9,2	14,0
Tombouctou	107 523	632 333	739 856	3,5	14,5
Gao	144 319	667 551	811 870	3,8	17,8
Kidal	31 999	65 665	97 664	0,5	32,8
Bamako	2 754 220		2 754 220	13,0	100,0
Taoudenni		24 232	24 232	0,1	0,0
Ménaka		372 648	372 648	1,8	0,0
Mali	5 032 595	16 199 574	21 232 169	100,0	23,7

Source : RGPH-5 de 2022

Tableau A.2 Répartition de SE et de leur taille moyenne en populations par région et selon le milieu de résidence (RGPH 2022)

	Nombre de SE			Taille moyenne de SE en populations		
Région	Urbain	Rural	Total	Urbain	Rural	Total
Kayes	528	3 060	3 588	677	873	844
Koulikoro	441	5 268	5 709	631	787	775
Sikasso	1 074	3 490	4 564	709	867	830
Ségou	515	3 389	3 904	628	860	829
Mopti	398	1 914	2 312	688	878	846
Tombouctou	158	743	901	681	851	821
Gao	238	748	986	606	892	823
Kidal	44	80	124	727	821	788
Bamako	3 913		3 913	704		704
Taoudenni		43	43		564	564
Ménaka		420	420		887	887
Mali	7 309	19 155	26 464	689	846	802

Source : RGPH-5 de 2022

A.3 PLAN DE SONDAGE ET MISE EN ŒUVRE

La procédure retenue pour le tirage de l'échantillon de l'EDSM-VII est un tirage aléatoire, stratifié et à deux degrés. L'unité primaire de sondage, appelée aussi Grappe, est la SE. La partie urbaine et la partie rurale de chaque région correspondent chacune à une strate d'échantillonnage. Au total, 19 strates d'échantillonnage ont été créées car la région de Bamako n'est constituée que de milieu urbain et que les régions de Taoudenni et Ménaka ne sont constituées que de milieu rural. L'échantillon de premier degré avec 500 grappes avait été tiré indépendamment dans chaque strate selon la répartition présenté dans le **Tableau A.3** ci-dessous. Avant le tirage de unités primaires, la base de sondage avait été triée selon la région, le milieu de résidence et ensuite selon le cercle, l'arrondissement/commune et le numéro de la SE. La procédure de tirage de l'unité primaire est un tirage systématique avec probabilité proportionnelle à la taille ; la taille d'une SE étant le nombre d'habitants dans la SE. Cette procédure de tirage dans une base triée avait introduit une stratification implicite au niveau de toutes les unités administratives en dessous de la région.

Après le tirage au premier degré, une opération de dénombrement et la mise à jour de la carte avait été effectuée dans chacune des SE tirées dans le premier degré. Elle a pour objectifs d'obtenir le nombre exact de ménages ordinaires résidant dans la SE, d'établir un plan de situation et un croquis détaillé de la SE en marquant ses limites et les localisations de chaque structure trouvée et d'enregistrer sur une fiche d'enregistrement, la liste complète de ménages à partir de laquelle l'échantillon de ménages avait été tiré au second degré avec un tirage systématique à probabilité égale. En décidant d'enquêter 26 ménages par grappe, le **Tableau A.3** ci-dessous présente la répartition de l'échantillon de grappes, les nombres de ménages par région et selon milieu de résidence. Parmi les 500 SE sélectionnées, 125 sont situées dans le milieu urbain et 375 dans le milieu rural, avec un nombre total de 12 000 ménages à sélectionner dont 3 000 dans le milieu urbain et 9 000 dans le milieu rural.

Tableau A.3 Allocation de l'échantillon de grappes et de ménages par région et selon le milieu de résidence (EDSM VII)

	Allocation des SE			Nombre de ménages à tirer		
Région	Urbain	Rural	Total	Urbain	Rural	Total
Kayes	9	43	52	216	1 032	1 248
Koulikoro	6	50	56	144	1 200	1 344
Sikasso	13	40	53	312	960	1 272
Ségou	9	55	64	216	1 320	1 536
Mopti	10	44	54	240	1 056	1 296
Tombouctou	7	30	37	168	720	888
Gao	8	29	37	192	696	888
Kidal	11	20	31	264	480	744
Bamako	52		52	1 248		1 248
Taoudenni		32	32		768	768
Ménaka		32	32		768	768
Mali	125	375	500	3 000	9 000	12 000

Le **Tableau A.4** ci-dessous donne les nombres attendus de femmes de 15–49 ans et d'hommes de 15–59 ans enquêtés avec succès par région et selon milieu de résidence. Au total, le nombre attendu de femmes enquêtées avec succès est de 12 942 femmes de 15–49 ans, dont 3 511 dans le milieu urbain et 9 431 dans le milieu rural ; le nombre attendu d'hommes de 15 à 59 ans enquêtés avec succès est de 5 863 dont 1 505 dans le milieu urbain et 4 178 dans le milieu rural, en tenant compte du fait que l'enquête auprès des hommes a été effectué dans un sous échantillon d'un ménage sur deux tirés pour l'enquête auprès des femmes.

Tableau A.4 Allocation de nombres attendus de femmes et hommes enquêtés avec succès par région et selon le milieu de résidence (EDSM VII)

	Nombre attendu de femmes 15–49 ans enquêtées avec succès			Nombre attendu d'hommes 15–59 ans enquêtés avec succès		
Région	Urbain	Rural	Région	Urbain	Rural	Région
Kayes	252	1 082	1 334	108	480	588
Koulikoro	169	1 257	1 426	73	557	630
Sikasso	366	1 005	1 371	157	445	602
Ségou	252	1 384	1 636	108	613	721
Mopti	281	1 106	1 387	121	490	611
Tombouctou	197	755	952	84	335	419
Gao	225	729	954	96	323	419
Kidal	309	503	812	132	223	355
Bamako	1 460		1 460	626		626
Taoudenni		805	805		356	356
Ménaka		805	805		356	356
Mali	3 511	9 431	12 942	1 505	4 178	5 683

Les calculs de l'échantillon étaient basés sur les résultats de la dernière enquête démographique et de santé réalisée au Mali en 2018 (EDSM-VI 2018) : le taux de réponse des ménages était de 99 % pour le milieu urbain et 98 % pour le milieu rural ; le nombre moyen de femmes de 15–49 ans par ménage était de 1,24 dans le milieu urbain et 1,08 dans le milieu rural ; le taux de réponse des femmes était de 96 % pour le milieu urbain et 98 % pour le milieu rural. Le nombre moyen d'hommes de 15–59 ans par ménage était de 1,1 dans le milieu urbain et 0,97 dans le milieu rural ; le taux de réponse des hommes était de 93 % pour le milieu urbain et 97,7 % pour le milieu rural.

À cause de problèmes de sécurité, certaines grappes sélectionnées n'ont pas pu être enquêtées. Le nombre total de grappes non enquêtées est de 93 ; parmi elles, 2 grappes urbaines et 91 grappes rurales. La plupart des grappes non enquêtées sont situées dans les régions de Ségou (9 grappes), Mopti (13 grappes), Gao (11 grappes), Kidal (22 grappes), Taoudenni (10 grappes) et Ménaka (22 grappes). Toutes les grappes tirées dans le milieu rural de Kidal n'ont pas pu être enquêtées. Par conséquent, les résultats de l'enquête pour les régions de Kidal, Taoudenni et Ménaka ne sont pas présentés dans le rapport final de l'enquête. Les grappes tirées dans la région de Taoudenni sont remises dans la région de Tombouctou, et les grappes tirées dans la région de Ménaka sont remises dans la région de Gao.

A.4 PROBABILITÉS DE SONDAGE ET POIDS DE SONDAGE

À cause de la répartition non proportionnelle de l'échantillon dans les régions et les taux de réponse différentiels, des poids de sondage doivent être utilisés dans toutes les analyses des données de l'EDSM-VII pour assurer la représentativité des résultats de l'enquête aussi bien au niveau national qu'au niveau des domaines d'études. Étant donné que l'échantillon de l'EDSM-VII est un échantillon par grappe, stratifié à deux degrés, les poids de sondage sont basés sur les probabilités de sondage calculées séparément pour chaque degré de tirage et pour chaque grappe où :

P_{1hi}: probabilité de sondage au premier degré de la i^e grappe dans la strate h

P_{2hi}: probabilité de sondage au deuxième degré dans la i^e grappe (ménages)

Ce qui suit décrit les calculs de ces probabilités.

Soit a_h le nombre de grappes tirées dans la state h, M_{hi} la taille de mesure (nombre de ménages) selon la base de sondage dans la i^e grappe et $\sum M_{hi}$ la taille de mesure totale dans la strate. La probabilité de sélectionner la i^e grappe dans la strate h dans l'échantillon de l'EDSM VI est calculé comme suit :

$$\frac{a_h \times M_{hi}}{\sum M_{hi}}$$

Soit b_{hi} la proportion de ménages dans le segment sélectionné par rapport au nombre total de ménages dans la grappe i de la strate h si la grappe est segmentée, sans quoi $b_{hi} = 1$. Par conséquent, la probabilité de tirer une grappe i dans l'échantillon est :

$$P_{1hi} = \frac{a_h \times M_{hi}}{\sum M_{hi}} \times b_{hi}$$

Soit L_{hi} le nombre de ménages listés lors de l'opération de dénombrement des ménages dans la grappe i de la strate h, et soit g_{hi} le nombre de ménages sélectionnés dans la grappe. La probabilité de tirage au deuxième degré pour chaque ménage dans la grappe est calculée comme suit :

$$P_{2hi} = \frac{g_{hi}}{L_{hi}}$$

La probabilité globale de tirage de chaque ménage dans la grappe i de la strate h dans l'EDSM VI est donc le produit des probabilités de tirage des deux degrés, soit :

$$P_{hi} = P_{1hi} \times P_{2hi}$$

Le poids de sondage pour chaque ménage dans la grappe i de la strate h est l'inverse de sa probabilité globale de tirage :

$$W_{hi} = 1 / P_{hi}$$

Une feuille de calcul contenant tous les paramètres de sondage et les probabilités de tirage avait été préparée pour faciliter les calculs des poids de sondage. Plusieurs ensembles de poids étaient calculés et cela comme suit :

- Pour l'enquête auprès des femmes : un ensemble pour les ménages ; un ensemble pour les femmes enquêtées ;
- Pour l'enquête auprès des hommes : un ensemble pour les ménages ; un ensemble pour les hommes enquêtés ;
- Pour le module sur la violence domestique contre les femmes et les hommes, un ensemble de poids pour les femmes enquêtées et un ensemble de poids pour les hommes enquêtés selon le nombre de d'individus éligibles dans le ménage.

Les poids de sondage ont été ajustés pour tenir compte des non-réponses au niveau des ménages et au niveau des individus pour les ménages ainsi que pour les femmes et les hommes. Toutes les corrections des non-réponses ont été réalisées au niveau de la strate d'échantillonnage. Les poids des ménages ont été obtenus à partir des poids de sondage multipliés par l'inverse du taux de réponse du ménage par strate. Les poids pour les femmes ont été obtenus à partir des poids de ménages multipliés par l'inverse du taux de réponse individuel de femmes par strate. Les poids pour les hommes ont été obtenus à partir des poids de ménages pour le sous-échantillon pour l'enquête auprès des hommes multipliés par l'inverse du taux de réponse individuel des hommes par strate. Après ajustement pour les non-réponses, les poids étaient normalisés pour obtenir les poids standards qui apparaissent dans les fichiers de données. La procédure de

normalisation a pour objectif d'obtenir le nombre total de cas pondérés en utilisant des poids normalisés égal au nombre total de cas non pondérés au niveau national, pour le nombre total de ménages, de femmes et d'hommes respectivement. La normalisation consiste à multiplier les poids par le taux de sondage total estimé à partir de l'enquête, pour les poids des ménages, des femmes, et des hommes, respectivement. Les poids normalisés sont des poids relatifs qui sont valides pour l'estimation des moyennes, des proportions, des ratios et des taux, mais qui ne sont pas valides pour estimer des totaux ou des tailles de populations cibles, ou pour fusionner des données issues des enquêtes différentes.

Des poids spécifiques ont été calculés pour le module « violence domestique » contre les femmes et les hommes car le module n'était appliqué qu'à un seul individu par ménage tiré au hasard parmi tous les individus éligibles du ménage. Ces poids spécifiques étaient basés sur les poids de ménages en prenant en compte le nombre de femmes et d'hommes éligibles par ménages respectivement et avec la correction de la non-réponse individuelle, et finalement la normalisation. La procédure de la correction de la non-réponse et celle de la normalisation sont les mêmes comme expliquées ci-dessus.

Les erreurs de sondage étaient calculées pour des indicateurs sélectionnés, et pour chacun des domaines d'étude, comme présentées dans l'annexe B.

A.5 RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

Les **Tableaux A.5** et **A.6** présentent les résultats détaillés des interviews auprès des ménages, des femmes et des hommes. À la suite du classement des ménages selon les différents codes résultat, le taux de réponse pour l'enquête ménage (TRM) est calculé comme suit :

$$\frac{100 * R}{\mathrm{R} + \mathrm{MP} + \mathrm{D} + \mathrm{REF} + \mathrm{LNT}}$$

Le taux de réponse des femmes et des hommes éligibles est équivalent au pourcentage d'interviews complétées. Le taux de réponse global des femmes est le produit du taux de réponse des ménages et du taux de réponse des femmes. Le taux de réponse global des hommes est le produit du taux de réponse des ménages sélectionnés pour l'enquête auprès des hommes et du taux de réponse des hommes.

Tableau A.5 Résultats de l'enquête : Femme

Répartition (en %) des ménages et des femmes éligibles par résultat de l'enquête ménage et individuelle, taux de réponse des ménages, des femmes éligibles et taux de réponse global des femmes, selon le milieu de résidence et la région (non pondéré), EDSM-VII Mali 2023–2024

	Résidence				Région[1]									
Résultat	Bamako	Autre urbain	Ensemble urbain	Rural	Kayes	Koulikoro	Sikasso	Ségou	Mopti	Tombouctou	Gao	Kidal	Bamako	Ensemble
Ménages sélectionnés														
Rempli (R)	98,4	98,7	98,6	99,0	99,0	99,2	98,7	98,0	99,2	99,9	98,8	98,6	98,4	98,9
Ménage présent mais pas d'enquêté compétent à la maison (MP)	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Différé (D)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refusé (REF)	0,6	0,5	0,5	0,3	0,6	0,2	0,2	0,5	0,7	0,1	0,1	0,9	0,6	0,4
Logement non trouvé (LNT)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ménage absent (MA)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,1	0,5	1,1	0,1	0,1	0,9	0,5	0,4	0,4
Logement vide/pas de logement à l'adresse (LV)	0,6	0,2	0,4	0,1	0,2	0,1	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,2
Autre (A)	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de ménages sélectionnés	1 249	1 705	2 954	6 821	1 252	1 296	1 177	1 321	984	1 416	864	216	1 249	9 775
Taux de réponse des ménages (TRM)[1]	99,4	99,5	99,4	99,6	99,4	99,4	99,6	99,5	99,3	99,9	99,9	99,1	99,4	99,5
Femmes éligibles														
Rempli (FER)	97,9	97,8	97,9	98,4	98,7	98,6	98,5	97,3	97,4	99,4	98,1	100,0	97,9	98,3
Pas à la maison (FEPM)	0,9	0,8	0,8	0,6	0,4	0,5	0,7	1,6	0,7	0,0	0,6	0,0	0,9	0,7
Différé (FED)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refusé (FER)	0,8	0,6	0,7	0,4	0,0	0,6	0,1	0,4	1,7	0,2	0,6	0,0	0,8	0,5
Partiellement rempli (FEPR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Incapacité (FEI)	0,3	0,5	0,4	0,3	0,5	0,3	0,5	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3
Autre (FEA)	0,1	0,3	0,2	0,1	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,6	0,0	0,1	0,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes	2 708	3 188	5 896	14 816	3 102	3 246	2 792	2 766	2 209	2 258	1 424	207	2 708	20 712
Taux de réponse des femmes éligibles (TRFE)[2]	97,9	97,8	97,9	98,4	98,7	98,6	98,5	97,3	97,4	99,4	98,1	100,0	97,9	98,3
Taux de réponse global des femmes (TRGF)[3]	97,3	97,3	97,3	98,0	98,1	97,9	98,1	96,7	96,7	99,4	98,0	99,1	97,3	97,8

[1] En utilisant les différents codes résultats utilisés pour classer les ménages selon les catégories de réponse, le taux de réponse pour l'Enquête Ménage (TRM) est calculé comme suit :

$$\frac{100 * R}{R + MP + D + R + LNT}$$

[2] Le taux de réponse des femmes éligibles (TRFE) est équivalent au pourcentage de questionnaires femmes remplis (FER).
[3] Le taux de réponse global des femmes est calculé comme suit (TRGF) :

$$TRGF = TRM * TRFE/100$$

Tableau A.6 Résultats de l'enquête : Homme

Répartition (en %) des ménages et des hommes éligibles par résultat de l'enquête ménage et individuelle, taux de réponse des ménages, des hommes éligibles et taux de réponse global des hommes, selon le milieu de résidence et la région (non pondéré), EDSM-VII Mali 2023–2024

	Résidence				Région[1]									
Résultat	Bamako	Autre urbain	Ensemble urbain	Rural	Kayes	Koulikoro	Sikasso	Ségou	Mopti	Tombouctou	Gao	Kidal	Bamako	Ensemble
Ménages sélectionnés														
Rempli (R)	98,6	98,6	98,6	99,0	98,9	98,8	98,5	97,9	99,6	99,9	99,3	98,1	98,6	98,9
Ménage présent mais pas d'enquêté compétent à la maison (MP)	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Refusé (REF)	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0,2	0,5	0,2	0,0	0,2	1,9	0,5	0,3
Ménage absent (MA)	0,5	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,3	1,2	0,2	0,1	0,2	0,0	0,5	0,4
Logement vide/pas de logement à l'adresse (LV)	0,5	0,2	0,3	0,1	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2
Autre (A)	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de ménages sélectionnés	624	845	1 469	3 398	625	648	589	661	492	688	432	108	624	4 867
Taux de réponse des ménages (TRM)[1]	99,5	99,4	99,5	99,5	99,5	98,9	99,3	99,5	99,8	100,0	99,8	98,1	99,5	99,5
Hommes éligibles														
Rempli (HER)	95,4	94,8	95,1	96,3	96,7	95,9	95,5	94,7	94,8	99,7	92,7	100,0	95,4	96,0
Pas à la maison (HEPM)	1,6	2,5	2,1	1,6	1,2	0,9	3,2	3,1	2,8	0,0	1,2	0,0	1,6	1,7
Refusé (HER)	1,7	1,9	1,8	1,0	0,9	2,0	0,6	0,9	1,7	0,3	2,4	0,0	1,7	1,2
Partiellement rempli (HEPR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Incapacité (HEI)	0,6	0,5	0,5	0,6	0,4	0,9	0,6	1,2	0,5	0,0	0,8	0,0	0,6	0,6
Autre (HEA)	0,7	0,3	0,5	0,5	0,8	0,3	0,1	0,2	0,0	0,0	2,8	0,0	0,7	0,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif d'hommes	1 227	1 298	2 525	5 633	1 135	1 281	1 088	1 042	772	1 024	494	95	1 227	8 158
Taux de réponse des hommes éligibles (TRHE)[2]	95,4	94,8	95,1	96,3	96,7	95,9	95,5	94,7	94,8	99,7	92,7	100,0	95,4	96,0
Taux de réponse global des hommes (TRGH)[3]	95,0	94,3	94,6	95,9	96,3	94,8	94,8	94,3	94,6	99,7	92,5	98,1	95,0	95,5

[1] En utilisant les différents codes résultats utilisés pour classer les ménages selon les catégories de réponse, le taux de réponse pour l'Enquête Ménage (TRM) est calculé comme suit :

$$\frac{100 * R}{C + HP + P + R + LNT}$$

[2] Le taux de réponse des hommes éligibles (TRHE) est équivalent au pourcentage de questionnaires hommes remplis (HER).
[3] Le taux de réponse global des hommes est calculé comme suit (TRGH) :

$$TRGH = TRM * TRHE/100$$

ESTIMATION DES ERREURS D'ÉCHANTILLONAGE

Annexe B

Les estimations de paramètres à partir d'une enquête par sondage sont sujettes à deux types d'erreurs : les erreurs de mesure et l'erreur d'échantillonnage. Les erreurs de mesure sont celles associées à la mise en œuvre de la collecte et de l'exploitation des données, telles que l'omission des ménages sélectionnés, la mauvaise interprétation des questions de la part soit de l'enquêteur, soit de l'enquêté et les erreurs de saisie des données. Bien que tout le possible ait été fait durant la réalisation de l'EDS Mali 2023–2024 (EDSM 2023–2024) pour minimiser ce type d'erreur, il est difficile d'éviter et d'évaluer statistiquement les erreurs de mesure.

Par contre, l'erreur d'échantillonnage peut être évaluée statistiquement. L'échantillon sélectionné pour l'EDSM 2023–2024 n'est qu'un parmi un grand nombre d'échantillons qui peuvent être sélectionnés, à partir de la même population, en utilisant le même plan de sondage. Chacun de ces échantillons peut produire des résultats peu différents de ceux obtenus avec l'échantillon actuellement sélectionné. L'erreur d'échantillonnage est une mesure de la variabilité parmi tous les échantillons possibles. Bien que le niveau de variabilité ne puisse pas être connu exactement, il peut être estimé à partir des données collectées.

L'erreur-type (ET) est un indice particulièrement utile pour mesurer l'erreur d'échantillonnage d'un paramètre estimé (moyenne, proportion, etc.) ; elle est la racine carrée de la variance du paramètre estimé. L'erreur-type peut être utilisée pour calculer des intervalles de confiance dans lesquels on considère que se trouve la vraie valeur du paramètre avec un certain niveau de confiance. Par exemple, pour un paramètre donné calculé à partir d'un échantillon, la vraie valeur du paramètre se trouvera dans les limites de sa valeur estimée plus ou moins deux fois son erreur-type, avec un niveau de confiance de 95 %.

Si l'échantillon avait été tiré d'après un plan de sondage aléatoire simple, il aurait été possible d'utiliser des formules simples pour calculer l'erreur d'échantillonnage. Cependant, l'échantillon de l'EDSM 2023–2024 étant un échantillon stratifié et tiré à deux degrés, il s'est avéré nécessaire d'utiliser des formules plus complexes. Un programme SAS, développé par ICF International, a été utilisé pour calculer les erreurs d'échantillonnage. Ce programme utilise la méthode de linéarisation de Taylor pour les estimations comme des moyennes, proportions ou ratios. La méthode de réplication de Jackknife est utilisée pour les estimations des indicateurs plus complexes comme l'indice synthétique de fécondité et les quotients de mortalité.

La méthode de linéarisation de Taylor traite chaque proportion ou moyenne comme étant une estimation de ratio, $r = y/x$, avec y la somme pondérée de la variable d'intérêt et x le nombre total de cas pondérés, calculés basé sur les mêmes unités enquêtées. La variance de r est calculée en utilisant la formule ci-dessous, avec l'erreur-type qui est la racine carrée de la variance :

$$ET^2(r) = var(r) = \frac{1-f}{x^2}\sum_{h=1}^{H}\left[\frac{m_h}{m_h-1}\left(\sum_{i=1}^{m_h} z_{hi}^2 - \frac{z_h^2}{m_h}\right)\right]$$

Dans laquelle

$$z_{hi} = y_{hi} - rx_{hi}\ ,\ z_h = y_h - rx_h$$

où
- h représente la strate variant de 1 à H,
- m_h est le nombre total de grappes sélectionnées dans la strate h,
- y_{hi} est la somme des valeurs pondérées de la variable y dans la grappe i de la strate h,
- x_{hi} est la somme des nombres de cas pondérés dans la grappe i de la strate h, et
- f est le taux global de sondage, qui est négligeable et donc ignoré.

La méthode de réplication de Jackknife dérive les estimations de taux complexes à partir de chacun des sous-échantillons de l'échantillon principal et calcule les erreur-type de ces estimations en utilisant des formules simples. Chaque sous-échantillon exclut *une* grappe dans le calcul des estimations. Des estimations pseudo-indépendantes sont donc crées. Dans l'EDSM 2023–2024, il y a 407 grappes non-vides et par conséquent, 407 sous-échantillons ont été créés. La variance d'un taux *r* est calculée comme suit :

$$ET^2(r) = var(r) = \frac{1}{k(k-1)} \sum_{i=1}^{k} (r_i - r)^2$$

Dans laquelle

$$r_i = kr - (k-1)r_{(i)}$$

où *r* est l'estimation calculée à partir de l'échantillon complet de 407 grappes,
$r_{(i)}$ est l'estimation calculée à partir de l'échantillon réduit de 406 grappes ($i^{éme}$ grappe exclue), et
k est le nombre total de grappes.

En plus de l'erreur-type, on calcule pour chaque estimation l'effet du plan de sondage (DEFT). L'effet du plan de sondage est le rapport de l'erreur-type observée sur l'erreur-type qu'on aurait obtenue si un sondage aléatoire simple avait été utilisé. Une valeur du DEFT de 1,0 indique que le plan de sondage est aussi efficace qu'un plan aléatoire simple, alors qu'une valeur supérieure à 1,0 indique un accroissement de l'erreur d'échantillonnage due à un plan de sondage plus complexe et moins efficace par rapport à un plan aléatoire simple. Pour chaque estimation, l'erreur relative et les intervalles de confiance sont aussi calculés.

Les erreurs d'échantillonnage pour l'EDSM 2023–2024 ont été calculées pour certaines variables considérées comme essentielles. Les résultats sont présentés dans cette annexe pour le pays entier, pour la capitale Bamako, pour les autres milieux urbains, pour l'ensemble de milieu urbain, et l'ensemble de milieu rural séparément, et pour 9 régions administratives. Pour chaque variable, le type de statistique (moyenne, proportion, ou taux) et la population de base sont présentés au **Tableau B.1**. Les **Tableaux B.2** à **B.15** présentent la valeur de la statistique (M), l'erreur-type (ET), le nombre de cas non pondérés (N) et pondérés (WN), l'effet de plan de sondage (DEFT), l'erreur relative (ET/M), et l'intervalle de confiance à 95% (M±2ET), pour chaque variable. Les erreurs d'échantillonnage pour les taux de mortalité sont présentées pour la période des 5 années ayant précédé l'enquête pour l'échantillon national et pour la période des 10 années avant l'enquête au niveau des domaines d'étude. Le DEFT est considéré comme non défini quand l'écart type sous l'échantillon aléatoire simple est zéro (quand l'estimation est proche de 0 ou 1).

L'intervalle de confiance (calculé par ex. pour toutes les femmes enquêtées *Niveau d'instruction secondaire ou plus*) peut être interprété comme suit : la proportion de femmes 15–49 ayant une éducation du niveau secondaire ou plus pour l'ensemble des femmes enquêtées est de 0,290 auquel correspond une erreur-type de 0,010. Par conséquent, pour obtenir un intervalle de confiance de 95 %, on doit ajouter et soustraire deux fois l'erreur-type de l'estimation, c'est-à-dire, 0,290±2×0,010. Il y a une probabiliste élevée (95 %) que la proportion de femmes 15–49 ayant une éducation du niveau secondaire ou plus se trouve entre 0,271 et 0,310.

Pour l'échantillon total, la moyenne du DEFT, calculée pour l'ensemble des variables est de 1,733. Cela veut dire que, par rapport à un échantillon aléatoire simple, l'erreur d'échantillonnage est multipliée par un facteur de 1,733 parce qu'on utilise un plan de sondage complexe (par grappe et à plusieurs degrés) et moins efficace.

Tableau B.1 Liste des variables utilisées pour le calcul des erreurs de sondage, Mali 2023–2024

Variable	Estimation	Population de base	Numéro tableau
MÉNAGES ET POPULATION			
Électricité principale source d'éclairage	Proportion	Population de droit des ménages	2.3
Dépendance principale à l'égard de technologies propres pour la cuisine, le chauffage et l'éclairage	Proportion	Population de droit des ménages	2.4
Naissances enregistrées à l'état civil	Proportion	Population de droit des ménages de moins de 5 ans	2.10
Possession d'au moins une MII	Proportion	Ménages	12.1
Possession d'au moins une MII pour deux personnes	Proportion	Ménages (avec au moins une personne qui a passé la nuit avant l'interview dans le ménage)	12.1
Source améliorée d'eau de boisson	Proportion	Population de droit des ménages	16.1
Au moins un service élémentaire en eau de boisson	Proportion	Population de droit des ménages	16.2
Disponibilité d'eau à boire en quantités suffisantes	Proportion	Population de droit des ménages	16.4
Installation sanitaire améliorée	Proportion	Population de droit des ménages	16.6
Au moins un service élémentaire d'assainissement	Proportion	Population de droit des ménages	16.7
Utilisant défécation en plein air	Proportion	Population de droit des ménages	16.7
Utilisant une installation pour le lavage des mains avec du savon et de l'eau	Proportion	Population de droit des ménages dont l'endroit pour se laver les mains a été observé ou n'ayant aucun endroit sur place pour le lavage des mains	16.11
FEMME			
Milieu de résidence urbain	Proportion	Femmes 15–49	3,1
Aucune instruction	Proportion	Femmes 15–49	3.2.1
Niveau d'instruction secondaire ou plus	Proportion	Femmes 15–49	3.2.1
Alphabétisée	Proportion	Femmes 15–49	3.3.1
Utilisation de l'internet dans les 12 derniers mois	Proportion	Femmes 15–49	3.5.1
Consommation actuelle de tabac	Proportion	Femmes 15–49	3.13.1
Actuellement en union	Proportion	Femmes 15–49	4.1
En union avant l'âge de 15 ans	Proportion	Femmes 20–49	4.4
En union avant l'âge de 18 ans	Proportion	Femmes 20–49	4.4
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	Proportion	Femmes 20–49	4.6
Taux de fécondité par âge (15–19) (derniers 3 ans)	Taux	Femme-années d'exposition à la maternité à l'âge de 15–19 ans au cours des 3 années avant l'enquête	5.1
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	Taux	Femme-années d'exposition à la maternité	5.2
Actuellement enceinte	Proportion	Femmes 15–49	5.2
Nombre moyen d'enfants nés vivants des femmes de 40–49 ans	Moyenne	Femmes 40–49	5.2
Nombre moyen d'enfants nés vivants des femmes de 15–49 ans	Moyenne	Femmes 15–49	5.4
Nombre moyen d'enfants survivants des femmes de 15–49 ans	Moyenne	Femmes 15–49	5.4
Intervalle intergénésique médian	Médiane	Naissances qui ne sont pas de premiers rangs au cours des 5 années avant l'enquête	5.5
Âge moyen à la ménarche	Moyenne	Femmes 15–49	5.8
Première naissance avant 18 ans	Proportion	Femmes 20–49	5.10
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	Proportion	Femmes actuellement en union 15–49	6.1
Ne veut plus d'enfant	Proportion	Femmes actuellement en union 15–49	6.2.1
Nombre idéal d'enfants	Moyenne	Femmes de 15–49 ans ayant donné des réponses numériques	6.3
Taux de fécondité désirée (3 ans)	Taux	Femme-années d'exposition à la maternité	6.6
Utilise actuellement une méthode contraceptive	Proportion	Femmes actuellement en union 15–49	7.4.1
Utilise actuellement une méthode moderne	Proportion	Femmes actuellement en union 15–49	7.4.1
Utilise actuellement la pilule	Proportion	Femmes actuellement en union 15–49	7.4.1
Utilise actuellement les injectables	Proportion	Femmes actuellement en union 15–49	7.4.1
Utilise actuellement les implants	Proportion	Femmes actuellement en union 15–49	7.4.1
Utilise actuellement le condom masculin	Proportion	Femmes actuellement en union 15–49	7.4.1
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	Proportion	Femmes actuellement en union 15–49	7.4.1
Taux de discontinuation sur 12 mois à la suite d'un échec de la méthode	Taux	Femmes 15–49	7.13
Taux de discontinuation sur 12 mois dû à n'importe quelle raison	Taux	Femmes 15–49	7.13
Taux de discontinuation sur 12 mois à la suite d'un changement de méthode pour une autre	Taux	Femmes 15–49	7.13
Besoins non satisfaits pour espacer	Proportion	Femmes actuellement en union 15–49	7.15.1
Besoins non satisfaits pour limiter	Proportion	Femmes actuellement en union 15–49	7.15.1
Total des besoins non satisfaits	Proportion	Femmes actuellement en union 15–49	7.15.1
Demande satisfaite par des méthodes modernes (femmes en union)	Proportion	Femmes actuellement en union 15–49	7.15.1
Demande satisfaite par des méthodes modernes (l'ensemble des femmes)	Proportion	Femmes 15–49	7.15.2
Participation dans la prise de décision sur la planification familiale	Proportion	Femmes actuellement en union 15–49	7.17
Non exposée à aucun des huit médias	Proportion	Femmes 15–49	7.20.1
Quotient de mortalité néonatale[1]	Taux	Enfants exposés au risque de mortalité	8.1
Quotient de mortalité post-néonatale[1]	Taux	Enfants exposés au risque de mortalité	8.1
Quotient de mortalité infantile[1]	Taux	Enfants exposés au risque de mortalité	8.1
Quotient de mortalité juvénile[1]	Taux	Enfants exposés au risque de mortalité	8.1
Quotient de mortalité infanto-juvénile[1]	Taux	Enfants exposés au risque de mortalité	8.1

À suivre…

Tableau B.1—*Suite*

Variable	Estimation	Population de base	Numéro tableau
Taux de mortalité périnatale	Taux	Grossesses à 28 semaines ou plus des femmes de 15–49 ans au cours des 5 années avant l'enquête	8.4
Taux de mortinatalité	Taux	Grossesses à 28 semaines ou plus des femmes de 15–49 ans au cours des 5 années avant l'enquête	8.4
Taux de mortalité néonatale précoce	Taux	Grossesses à 28 semaines ou plus des femmes de 15–49 ans au cours des 5 années avant l'enquête	8.4
Dans une catégorie à haut risque évitable	Proportion	Enfants nés au cours des 5 années avant l'enquête des femmes de 15–49 ans	8.5
A reçu des soins prénatals par un prestataire de santé qualifié	Proportion	Femmes de 15–49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années avant l'enquête	9.1
4 visites prénatales ou plus	Proportion	Femmes de 15–49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années avant l'enquête	9.2
8 visites prénatales ou plus	Proportion	Femmes de 15–49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années avant l'enquête	9.2
A pris des suppléments contenant du fer	Proportion	Femmes de 15–49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années avant l'enquête	9.4
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	Proportion	Femmes de 15–49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années avant l'enquête	9.6
A accouché dans un établissement de santé (naissances vivantes)	Proportion	Naissances vivantes dans les 2 années avant l'enquête	9.7
A accouché par césarienne (naissances vivantes)	Proportion	Naissances vivantes dans les 2 années avant l'enquête	9.8
A accouché avec l'assistance d'un prestataire de santé qualifié (naissances vivantes)	Proportion	Naissances vivantes dans les 2 années avant l'enquête	9.9
Femmes ayant reçu des soins postnatals dans les 2 premiers jours	Proportion	Femmes de 15–49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années avant l'enquête	9.11
Nouveau-nés ayant reçu des soins postnatals dans les 2 premiers jours	Proportion	Naissances vivantes les plus récentes dans les 2 années avant l'enquête	9.14
Un problème d'accès aux soins de santé	Proportion	Femmes 15–49	9.20
A déjà eu un carnet de vaccination	Proportion	Enfants 12–23 mois	10.2
A reçu le vaccin du BCG	Proportion	Enfants 12–23 mois	10.4
A reçu [DTC-HepB-Hib] (3 doses)	Proportion	Enfants 12–23 mois	10.4
A reçu le vaccin contre pneumocoque (3 doses)	Proportion	Enfants 12–23 mois	10.4
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12–23)	Proportion	Enfants 12–23 mois	10.4
Complètement vacciné conformément au calendrier national (12–23 mois)	Proportion	Enfants 12–23 mois	10.4
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 24–35)	Proportion	Enfants 24–35 mois	10.4
Complètement vacciné conformément au calendrier national (24–35 mois)	Proportion	Enfants 24–35 mois	10.4
A recherché un traitement pour la diarrhée	Proportion	Enfants de moins de 5 ans avec diarrhée dans les 2 dernières semaines	10.9
Traité avec des SRO	Proportion	Enfants de moins de 5 ans avec diarrhée dans les 2 dernières semaines	10.11
Taille-pour-âge (-3ET)	Proportion	Enfants de moins de 5 ans mesurés	11.1
Taille-pour-âge (-2ET)	Proportion	Enfants de moins de 5 ans mesurés	11.1
Poids-pour-taille (-2ET)	Proportion	Enfants de moins de 5 ans mesurés	11.1
Poids-pour-taille (+2ET)	Proportion	Enfants de moins de 5 ans mesurés	11.1
Poids-pour-âge (-2ET)	Proportion	Enfants de moins de 5 ans mesurés	11.1
Exclusivement allaité	Proportion	Enfants les plus jeunes de 0–5 mois vivant avec leur mère	11.4
Diversité alimentaire minimale (enfants 6–23 mois)	Proportion	Enfants les plus jeunes de 6–23 mois vivant avec leur mère	11.8
Prévalence de l'anémie (enfants 6–59 mois) (hémoglobine <11,0 g/dl)	Proportion	Enfants 6–59 mois testés	11.12
Indice de masse corporelle (IMC) <18,5	Proportion	Femmes de 20–49 ans mesurées	11.14.1
Indice de masse corporelle (IMC) ≥25,0	Proportion	Femmes de 20–49 ans mesurées	11.14.1
Indice de Masse Corporelle-pour-âge (-2ET)	Proportion	Femmes adolescentes de 15–19 ans mesurées	11.14.2
Indice de Masse Corporelle-pour-âge (+1ET)	Proportion	Femmes adolescentes de 15–19 ans mesurées	11.14.2
Diversification alimentaire minimum (femmes 15–49)	Proportion	Femmes 15–49	11.16
Prévalence de l'anémie (femmes 15–49, OMS)	Proportion	Femmes de 15–49 ans testées	11.17.1
Prévalence de l'anémie (femmes 15–49 non enceintes, OMS)	Proportion	Femmes de 15–49 ans non enceintes qui ont été testées	11.17.1
Prévalence de l'anémie (femmes 15–49 enceintes, OMS)	Proportion	Femmes de 15–49 ans enceintes qui ont été testées	11.17.1
Enfant a dormi sous une MII la nuit précédente	Proportion	Enfants <5 dans le ménage	12.6
Femme enceinte a dormi sous une MII la nuit précédente	Proportion	Femme enceinte 15–49	12.7
A reçu trois doses ou plus de SP/Fansidar	Proportion	Femmes de 15–49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années avant l'enquête	12.9
Enfant a eu de la fièvre dans les 2 semaines précédentes	Proportion	Enfants <5 ans	12.10
Enfant a eu un prélèvement de sang au doigt/talon	Proportion	Enfants <5 ans avec fièvre dans les 2 semaines précédentes	12.10
Enfant a pris une CTA	Proportion	Enfants <5 ans avec fièvres dans les 2 semaines précédentes qui ont pris des antipaludiques	12.12
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	Proportion	Femme 15–49 [ayant entendu parler du VIH/sida]	13.2
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	Proportion	Femme de 15–49 ans avec partenaire non marital, non cohabitants dans les 12 derniers mois	13.3.1

À suivre…

Tableau B.1—*Suite*

Variable	Estimation	Population de base	Numéro tableau
A déjà été testée pour le VIH et a reçu les résultats du dernier test	Proportion	Femmes 15–49	13.5.1
A travaillé au cours des 12 derniers mois	Proportion	Femmes actuellement en union 15–49	15.1
A travaillé au cours des 12 derniers mois, mais n'a pas été rémunérée	Proportion	Femmes de 15–49 ans actuellement en union et ayant travaillé au cours des 12 derniers mois	15.1
Possession d'un téléphone portable	Proportion	Femmes 15–49	15.6.1
Possède et utilise un compte bancaire ou un téléphone portable pour des transactions financières	Proportion	Femmes 15–49	15.6.1
Participe dans la prise de décision (les trois décisions)	Proportion	Femmes actuellement en union 15–49	15.8.1
D'accord avec, au moins, une des raisons spécifiées justifiant qu'un mari puisse battre sa femme	Proportion	Femmes 15–49	15.9.1
Prend ses propres décisions concernant les relations sexuelles, l'utilisation contraceptive et les soins de santé reproductive	Proportion	Femmes actuellement en union 15–49	15.12
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	Proportion	Femmes 15–49	DV.1
A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment	Proportion	Femmes 15–49	DV.4
A subi des violences sexuelles par n'importe quel partenaire non-intime	Proportion	Femmes 15–49	DV.6
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par le mari/partenaire	Proportion	Femmes 15–49 ayant eu un mari ou un partenaire intime	DV.9
A subi des violences physiques/sexuelles exercées par le plus récent mari/partenaire	Proportion	Femmes 15–49 ayant eu un mari ou un partenaire intime	DV.11
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par le mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois	Proportion	Femmes 15–49 ayant eu un mari ou un partenaire intime	DV.13
HOMME			
Milieu de résidence urbain	Proportion	Hommes 15–49	3.1
Aucune instruction	Proportion	Hommes 15–49	3.2.2
Niveau d'instruction secondaire ou plus	Proportion	Hommes 15–49	3.2.2
Alphabétisation	Proportion	Hommes 15–49	3.3.2
Utilisation de l'internet au cours des 12 derniers mois	Proportion	Hommes 15–49	3.5.2
Consommation actuelle de tabac	Proportion	Hommes 15–49	3.13.2
Actuellement en union	Proportion	Hommes 15–49	4.1
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	Proportion	Hommes 20–49	4.6
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans au moins	Proportion	Hommes actuellement en union 15–49	6.1
Ne veut plus d'enfant	Proportion	Hommes actuellement en union 15–49	6.2.2
Nombre idéal d'enfants	Moyenne	Hommes de 15–49 ans ayant donné des réponses numériques	6.3
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	Proportion	Hommes 15–49 [ayant entendu parler du VIH/sida]	13.2
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	Proportion	Hommes 15–49 avec partenaire non marital, non cohabitant dans les 12 derniers mois	13.3.2
A déjà été testé pour le VIH et a reçu les résultats du dernier test	Proportion	Hommes 15–49	13.5.2
Circoncision	Proportion	Hommes 15–49	13.9
Possession d'un téléphone portable	Proportion	Hommes 15–49	15.6.2
Possède et utilise un compte bancaire ou un téléphone portable pour des transactions financières	Proportion	Hommes 15–49	15.6.2
D'accord avec, au moins, une des raisons spécifiées justifiant qu'un mari puisse battre sa femme	Proportion	Hommes 15–49	15.9.2

[1] Les quotients de mortalité sont calculés pour les 5 ans précédant l'enquête au niveau national et par milieu de résidence, et pour les 10 ans précédant l'enquête au niveau régional.

Tableau B.2 Erreurs de sondage : Echantillon Total, Mali 2023–2024

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
			MÉNAGES ET POPULATIONS					
Électricité principale source d'éclairage	0,429	0,020	82 499	86 350	3,102	0,046	0,390	0,468
Dépendance principale à l'égard de technologies propres pour la cuisine, le chauffage et l'éclairage	0,008	0,001	82 499	86 350	1,841	0,173	0,006	0,011
Naissances enregistrées à l'état civil	0,892	0,007	15 337	16 124	2,069	0,008	0,877	0,907
Possession d'au moins une MII	0,886	0,005	9 667	9 667	1,666	0,006	0,875	0,897
Possession d'au moins une MII pour deux personnes	0,495	0,008	9 661	9 657	1,605	0,016	0,479	0,512
Source améliorée d'eau de boisson	0,811	0,015	82 499	86 350	2,770	0,018	0,781	0,840
Au moins un service élémentaire en eau de boisson	0,748	0,015	82 499	86 350	2,569	0,020	0,719	0,777
Disponibilité d'eau à boire en quantités suffisantes	0,807	0,010	82 499	86 350	1,928	0,012	0,787	0,827
Installation sanitaire améliorée	0,722	0,015	82 499	86 350	2,652	0,021	0,692	0,752
Au moins un service élémentaire d'assainissement	0,553	0,015	82 499	86 350	2,352	0,027	0,524	0,583
Utilisant défécation en plein air	0,056	0,007	82 499	86 350	2,701	0,121	0,043	0,070
Utilisant une installation pour le lavage des mains avec du savon et de l'eau	0,190	0,010	81 745	85 663	2,073	0,055	0,169	0,210
			FEMMES					
Milieu de résidence urbain	0,272	0,008	17 202	17 347	2,213	0,028	0,257	0,287
Aucune instruction	0,541	0,011	17 202	17 347	2,900	0,020	0,519	0,563
Niveau d'instruction secondaire ou plus	0,290	0,010	17 202	17 347	2,818	0,034	0,271	0,310
Alphabétisée	0,319	0,010	17 202	17 347	2,743	0,031	0,300	0,339
Utilisation de l'internet dans les 12 derniers mois	0,403	0,013	17 202	17 347	3,404	0,032	0,377	0,428
Consommation actuelle de tabac	0,011	0,001	17 202	17 347	1,743	0,128	0,008	0,013
Actuellement en union	0,763	0,007	17 202	17 347	2,212	0,009	0,749	0,777
En union avant l'âge de 15 ans	0,165	0,006	13 267	13 485	1,777	0,035	0,153	0,176
En union avant l'âge de 18 ans	0,478	0,009	13 267	13 485	1,962	0,018	0,461	0,495
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,724	0,007	13 267	13 485	1,834	0,010	0,709	0,738
Taux de fécondité par âge (15–19) (derniers 3 ans)	137,261	4,684	11 751	11 532	1,507	0,034	127,893	146,629
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	6,050	0,084	47 932	48 404	1,577	0,014	5,883	6,217
Actuellement enceinte	0,105	0,003	17 202	17 347	1,342	0,030	0,098	0,111
Nombre moyen d'enfants nés vivants des femmes de 40–49 ans	6,658	0,077	2 678	2 755	1,437	0,012	6,505	6,812
Nombre moyen d'enfants nés vivants des femmes de 15–49 ans	3,170	0,044	17 202	17 347	1,986	0,014	3,082	3,258
Nombre moyen d'enfants survivants des femmes de 15–49 ans	2,762	0,034	17 202	17 347	1,771	0,012	2,695	2,829
Intervalle intergénésique médian	32,899	0,217	12 616	12 791	1,612	0,007	32,466	33,332
Âge moyen à la ménarche	14,082	0,024	16 782	16 966	1,873	0,002	14,035	14,130
Première naissance avant 18 ans	0,346	0,007	13 267	13 485	1,625	0,019	0,332	0,359
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0,455	0,006	12 900	13 237	1,323	0,013	0,443	0,466
Ne veut plus d'enfant	0,202	0,005	12 900	13 237	1,411	0,025	0,192	0,212
Nombre idéal d'enfants	6,423	0,044	16 321	16 640	2,133	0,007	6,336	6,511
Taux de fécondité désirée (3 ans)	5,418	0,078	47 932	48 404	1,532	0,014	5,262	5,573
Utilise actuellement une méthode contraceptive	0,222	0,007	12 900	13 237	1,925	0,032	0,208	0,236
Utilise actuellement une méthode moderne	0,209	0,007	12 900	13 237	1,920	0,033	0,195	0,223
Utilise actuellement la pilule	0,024	0,002	12 900	13 237	1,328	0,075	0,020	0,028
Utilise actuellement les injectables	0,051	0,003	12 900	13 237	1,641	0,062	0,045	0,058
Utilise actuellement les implants	0,109	0,005	12 900	13 237	1,876	0,047	0,099	0,120
Utilise actuellement le condom masculin	0,001	0,000	12 900	13 237	1,325	0,351	0,000	0,002
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,013	0,001	12 900	13 237	1,282	0,098	0,010	0,016
Taux de discontinuation sur 12 mois à la suite d'un échec de la méthode	1,543	1,007	4 992	5 706	1,347	0,653	0,000	3,557
Taux de discontinuation sur 12 mois dû à n'importe quelle raison	35,890	0,204	4 992	5 706	1,042	0,006	35,482	36,299
Taux de discontinuation sur 12 mois à la suite d'un changement de méthode pour une autre	1,937	0,261	4 992	5 706	1,167	0,135	1,416	2,458
Besoins non satisfaits pour espacer	0,187	0,004	12 900	13 237	1,230	0,023	0,179	0,196
Besoins non satisfaits pour limiter	0,064	0,002	12 900	13 237	1,156	0,039	0,059	0,068
Total des besoins non satisfaits	0,251	0,005	12 900	13 237	1,226	0,019	0,242	0,260
Demande satisfaite par des méthodes modernes (femmes en union)	0,442	0,010	5 753	6 257	1,642	0,024	0,421	0,463
Demande satisfaite par des méthodes modernes (l'ensemble des femmes)	0,455	0,010	6 386	6 882	1,704	0,023	0,435	0,476
Participation dans la prise de décision sur la planification familiale	0,590	0,011	12 900	13 237	2,462	0,018	0,569	0,611
Non exposée à aucun des huit médias	0,493	0,011	17 202	17 347	2,884	0,022	0,471	0,515

À suivre…

Tableau B.2—*Suite*

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0–4 ans)	29,113	1,796	15 605	15 824	1,251	0,062	25,520	32,706
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0–4 ans)	22,391	1,322	15 605	15 809	1,106	0,059	19,747	25,035
Quotient de mortalité infantile (derniers 0–4 ans)	51,503	2,191	15 634	15 851	1,165	0,043	47,121	55,886
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0–4 ans)	37,148	2,382	15 524	15 563	1,375	0,064	32,384	41,912
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0–4 ans)	86,738	3,151	15 842	16 078	1,213	0,036	80,436	93,041
Taux de mortalité périnatale	46,709	2,075	15 990	16 246	1,175	0,044	42,560	50,859
Taux de mortinatalité	24,133	1,482	15 990	16 246	1,148	0,061	21,169	27,097
Taux de mortalité néonatale précoce	23,135	1,548	15 631	15 854	1,212	0,067	20,039	26,230
Dans une catégorie à haut risque évitable	0,626	0,005	15 631	15 854	1,251	0,009	0,615	0,637
A reçu des soins prénatals par un prestataire de santé qualifié	0,693	0,018	5 916	6 148	2,963	0,026	0,658	0,729
4 visites prénatales ou plus	0,513	0,013	5 916	6 148	1,926	0,024	0,488	0,538
8 visites prénatales ou plus	0,041	0,004	5 916	6 148	1,372	0,086	0,034	0,048
A pris des suppléments contenant du fer	0,851	0,010	5 916	6 148	2,065	0,011	0,832	0,870
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,489	0,012	5 916	6 148	1,855	0,025	0,465	0,513
A accouché dans un établissement de santé (naissances vivantes)	0,807	0,013	6 166	6 413	2,473	0,016	0,781	0,832
A accouché avec l'assistance d'un prestataire de santé qualifié (naissances vivantes)	0,655	0,017	6 166	6 413	2,766	0,026	0,621	0,689
A accouché par césarienne (naissances vivantes)	0,051	0,003	6 166	6 413	1,142	0,064	0,045	0,058
Femmes ayant reçu des soins postnatals dans les 2 premiers jours	0,691	0,013	5 916	6 148	2,101	0,018	0,666	0,716
Nouveau-nés ayant reçu des soins postnatals dans les 2 premiers jours	0,696	0,011	5 916	6 148	1,907	0,016	0,673	0,719
Un problème d'accès aux soins de santé	0,520	0,012	17 202	17 347	3,021	0,022	0,497	0,543
A déjà eu un carnet de vaccination	0,877	0,011	2 859	2 892	1,839	0,013	0,854	0,900
A reçu le vaccin du BCG	0,836	0,013	2 859	2 892	1,790	0,015	0,811	0,862
A reçu [DTC-HepB-Hib] (3 doses)	0,734	0,015	2 859	2 892	1,752	0,020	0,705	0,763
A reçu le vaccin contre pneumocoque (3 doses)	0,711	0,015	2 859	2 892	1,761	0,021	0,681	0,741
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12–23)	0,694	0,014	2 859	2 892	1,638	0,021	0,666	0,723
Complètement vacciné conformément au calendrier national (12–23 mois)	0,204	0,011	2 859	2 892	1,453	0,054	0,182	0,226
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 24–35)	0,362	0,014	2 969	3 018	1,570	0,039	0,334	0,390
Complètement vacciné conformément au calendrier national (24–35 mois)	0,089	0,008	2 969	3 018	1,509	0,090	0,073	0,105
A recherché un traitement pour la diarrhée	0,371	0,015	2 521	2 576	1,516	0,040	0,341	0,401
Traité avec des SRO	0,099	0,008	2 521	2 576	1,291	0,080	0,083	0,114
Taille-pour-âge (-3ET)	0,071	0,003	14 992	15 817	1,497	0,048	0,064	0,078
Taille-pour-âge (-2ET)	0,251	0,007	14 992	15 817	1,693	0,027	0,238	0,265
Poids-pour-taille (-2ET)	0,054	0,003	15 155	15 922	1,333	0,047	0,048	0,059
Poids-pour-taille (+2ET)	0,014	0,001	15 155	15 922	1,241	0,082	0,012	0,017
Poids-pour-âge (-2ET)	0,150	0,005	15 031	15 845	1,542	0,033	0,141	0,160
Exclusivement allaité	0,404	0,015	1 588	1 710	1,248	0,038	0,373	0,435
Diversité alimentaire minimale (enfants 6–23 mois)	0,173	0,010	4 079	4 180	1,770	0,061	0,152	0,194
Prévalence de l'anémie (enfants 6–59 mois) (hémoglobine <11,0 g/dl)	0,738	0,008	6 872	7 154	1,431	0,011	0,722	0,754
Indice de masse corporelle (IMC) <18,5	0,068	0,004	5 669	5 757	1,179	0,058	0,060	0,076
Indice de masse corporelle (IMC) ≥25,0	0,343	0,010	5 669	5 757	1,568	0,029	0,323	0,362
Indice de masse corporelle-pour-âge (-2ET)	0,033	0,006	1 776	1 743	1,298	0,169	0,022	0,044
Indice de masse corporelle-pour-âge (+1ET)	0,140	0,010	1 776	1 743	1,259	0,075	0,119	0,161
Diversification alimentaire minimum (femmes 15–49)	0,335	0,010	17 202	17 347	2,790	0,030	0,315	0,355
Prévalence de l'anémie (femmes 15–49, OMS)	0,527	0,009	8 603	8 660	1,691	0,017	0,508	0,545
Prévalence de l'anémie (femmes 15–49 non enceintes, OMS)	0,521	0,009	7 691	7 758	1,618	0,018	0,503	0,540
Prévalence de l'anémie (femmes 15–49 enceintes, OMS)	0,572	0,021	912	902	1,282	0,037	0,530	0,614
Enfant a dormi sous une MII la nuit précédente	0,675	0,008	15 444	16 220	1,473	0,012	0,659	0,691
Femme enceinte a dormi sous une MII la nuit précédente	0,691	0,014	1 844	1 895	1,231	0,020	0,663	0,719
A reçu trois doses ou plus de SP/Fansidar	0,275	0,010	5 916	6 148	1,674	0,035	0,256	0,294
Enfant a eu de la fièvre dans les 2 semaines précédentes	0,148	0,006	14 677	14 831	1,933	0,041	0,136	0,160
Enfant a eu un prélèvement de sang au doigt/talon	0,184	0,011	2 202	2 192	1,300	0,061	0,162	0,207
Enfant a pris une CTA	0,453	0,029	531	513	1,260	0,063	0,396	0,511

À suivre…

Tableau B.2—*Suite*

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,747	0,009	14 758	15 606	2,555	0,012	0,729	0,765
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,095	0,011	913	897	1,125	0,115	0,074	0,117
A déjà été testée pour le VIH et a reçu les résultats du dernier test	0,046	0,002	17 202	17 347	1,480	0,051	0,041	0,051
A travaillé au cours des 12 derniers mois	0,657	0,010	12 900	13 237	2,509	0,016	0,636	0,678
A travaillé au cours des 12 derniers mois, mais n'a pas été rémunérée	0,155	0,011	7 611	8 700	2,767	0,074	0,132	0,178
Possession d'un téléphone portable	0,658	0,009	17 202	17 347	2,380	0,013	0,641	0,675
Possède et utilise un compte bancaire ou un téléphone portable pour des transactions financières	0,397	0,011	17 202	17 347	2,919	0,027	0,376	0,419
Participe dans la prise de décision (les trois décisions)	0,104	0,006	12 900	13 237	2,162	0,056	0,093	0,116
D'accord avec, au moins, une des raisons spécifiées justifiant qu'un mari puisse battre sa femme	0,693	0,009	17 202	17 347	2,562	0,013	0,675	0,711
Prend ses propres décisions concernant les relations sexuelles, l'utilisation contraceptive et les soins de santé reproductive	0,031	0,002	12 900	13 237	1,584	0,078	0,026	0,036
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	0,321	0,012	4 175	4 175	1,617	0,036	0,298	0,344
A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment	0,105	0,007	4 175	4 175	1,484	0,067	0,091	0,119
A subi des violences sexuelles par n'importe quel partenaire non-intime	0,025	0,003	4 175	4 175	1,379	0,134	0,018	0,032
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par le mari/partenaire	0,397	0,013	3 718	3 643	1,629	0,033	0,371	0,423
A subi des violences physiques/sexuelles exercées par le plus récent mari/partenaire	0,289	0,012	3 718	3 643	1,669	0,043	0,264	0,314
A subi des violences physiques/sexuelles/émotionnelles par le mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois	0,271	0,012	3 718	3 643	1,583	0,043	0,248	0,294
			HOMMES					
Milieu de résidence urbain	0,295	0,010	6 643	6 686	1,876	0,036	0,274	0,316
Aucune instruction	0,370	0,013	6 643	6 686	2,164	0,035	0,345	0,396
Niveau d'instruction secondaire ou plus	0,427	0,014	6 643	6 686	2,254	0,032	0,400	0,455
Alphabétisation	0,497	0,013	6 643	6 686	2,038	0,025	0,472	0,522
Utilisation de l'internet au cours des 12 derniers mois	0,612	0,012	6 643	6 686	1,981	0,019	0,588	0,636
Consommation actuelle de tabac	0,138	0,006	6 643	6 686	1,390	0,043	0,126	0,150
Actuellement en union	0,525	0,009	6 643	6 686	1,475	0,017	0,507	0,543
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,138	0,007	4 959	5 017	1,477	0,052	0,124	0,153
Ne veut plus d'enfant	0,056	0,005	3 496	3 512	1,347	0,093	0,046	0,067
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans au moins	0,531	0,013	3 496	3 512	1,504	0,024	0,506	0,557
Nombre idéal d'enfants	8,865	0,105	6 103	6 189	1,642	0,012	8,655	9,074
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,612	0,012	5 965	6 194	1,852	0,019	0,589	0,636
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,360	0,020	932	1 022	1,288	0,056	0,319	0,400
A déjà été testé pour le VIH et a reçu les résultats du dernier test	0,019	0,003	6 643	6 686	1,486	0,130	0,014	0,024
Circoncision	0,982	0,003	6 643	6 686	1,926	0,003	0,976	0,988
Possession d'un téléphone portable	0,869	0,006	6 643	6 686	1,395	0,007	0,857	0,881
Possède et utilise un compte bancaire ou un téléphone portable pour des transactions	0,675	0,012	6 643	6 686	2,066	0,018	0,652	0,699
D'accord avec, au moins, une des raisons spécifiées justifiant qu'un mari puisse battre sa femme	0,404	0,014	6 643	6 686	2,310	0,034	0,376	0,432

Tableau B.3 Erreurs de sondage : Echantillon Bamako, Mali 2023–2024

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
MÉNAGES ET POPULATIONS								
Électricité principale source d'éclairage	0,950	0,012	9 576	11 261	1,662	0,012	0,926	0,974
Dépendance principale à l'égard de technologies propres pour la cuisine, le chauffage d'appoint et l'éclairage	0,026	0,009	9 576	11 261	1,999	0,350	0,008	0,044
Naissances enregistrées à l'état civil	0,971	0,005	1 546	1 831	0,968	0,005	0,961	0,981
Possession d'au moins une MII	0,787	0,013	1 229	1 509	1,111	0,016	0,761	0,813
Possession d'au moins une MII pour deux personnes	0,339	0,030	1 228	1 505	2,226	0,089	0,279	0,399
Source améliorée d'eau de boisson	0,997	0,002	9 576	11 261	1,322	0,002	0,992	1,000
Au moins un service élémentaire en eau de boisson	0,942	0,014	9 576	11 261	1,761	0,015	0,914	0,970
Disponibilité d'eau à boire en quantités suffisantes	0,838	0,021	9 576	11 261	1,444	0,025	0,797	0,879
Installation sanitaire améliorée	0,980	0,005	9 576	11 261	0,996	0,005	0,970	0,990
Au moins un service élémentaire d'assainissement	0,611	0,025	9 576	11 261	1,443	0,041	0,562	0,661
Utilisant défécation en plein air	0,001	0,001	9 576	11 261	0,973	0,999	0,000	0,002
Utilisant une installation pour le lavage des mains avec du savon et de l'eau	0,358	0,020	9 573	11 258	1,102	0,057	0,318	0,399
FEMMES								
Aucune instruction	0,310	0,015	2 376	2 675	1,595	0,049	0,280	0,340
Niveau d'instruction secondaire ou plus	0,523	0,016	2 376	2 675	1,558	0,031	0,491	0,555
Alphabétisée	0,528	0,018	2 376	2 675	1,767	0,034	0,492	0,564
Utilisation de l'internet dans les 12 derniers mois	0,705	0,017	2 376	2 675	1,831	0,024	0,671	0,739
Consommation actuelle de tabac	0,006	0,002	2 376	2 675	1,117	0,297	0,002	0,009
Taux de fécondité par âge (15–19) (derniers 3 ans)	70,513	6,225	1 864	2 125	1,036	0,088	58,063	82,963
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	4,868	0,159	6 527	7 344	1,215	0,033	4,550	5,185
Actuellement enceinte	0,069	0,006	2 376	2 675	1,121	0,084	0,058	0,081
Nombre moyen d'enfants nés vivants des femmes de 40–49 ans	5,424	0,155	309	350	1,094	0,029	5,114	5,734
Intervalle intergénésique médian	35,834	0,428	1 221	1 381	0,870	0,012	34,978	36,691
Ne veut plus d'enfant	0,224	0,012	1 376	1 553	1,022	0,051	0,201	0,247
Nombre idéal d'enfants	5,784	0,068	2 217	2 492	1,363	0,012	5,649	5,919
Taux de fécondité désirée (3 ans)	4,291	0,156	6 527	7 344	1,297	0,036	3,979	4,603
Utilise actuellement une méthode contraceptive	0,327	0,014	1 376	1 553	1,096	0,042	0,299	0,355
Utilise actuellement une méthode moderne	0,299	0,013	1 376	1 553	1,092	0,045	0,272	0,326
Utilise actuellement la pilule	0,051	0,006	1 376	1 553	0,936	0,109	0,040	0,062
Utilise actuellement les injectables	0,050	0,007	1 376	1 553	1,239	0,146	0,035	0,064
Utilise actuellement les implants	0,142	0,008	1 376	1 553	0,842	0,056	0,127	0,158
Utilise actuellement le condom masculin	0,006	0,003	1 376	1 553	1,443	0,503	0,000	0,012
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,028	0,004	1 376	1 553	1,000	0,160	0,019	0,037
Besoins non satisfaits pour espacer	0,142	0,008	1 376	1 553	0,893	0,059	0,125	0,159
Besoins non satisfaits pour limiter	0,067	0,006	1 376	1 553	0,877	0,089	0,055	0,078
Total des besoins non satisfaits	0,209	0,011	1 376	1 553	0,974	0,051	0,187	0,230
Demande satisfaite par des méthodes modernes (femmes en union)	0,559	0,018	737	831	0,962	0,032	0,523	0,594
Demande satisfaite par des méthodes modernes (l'ensemble des femmes)	0,580	0,017	921	1 029	1,031	0,029	0,546	0,613
Participation dans la prise de décision sur la planification familiale	0,783	0,015	1 376	1 553	1,359	0,019	0,753	0,813
Non exposée à aucun des huit médias	0,396	0,014	2 376	2 675	1,392	0,035	0,368	0,424
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0–4 ans)	18,354	3,585	1 595	1 808	0,961	0,195	11,184	25,523
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0–4 ans)	20,623	3,768	1 591	1 805	1,047	0,183	13,088	28,159
Quotient de mortalité infantile (derniers 0–4 ans)	38,977	4,973	1 596	1 809	0,932	0,128	29,032	48,923
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0–4 ans)	9,081	2,466	1 502	1 701	1,012	0,272	4,148	14,013
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0–4 ans)	47,704	5,506	1 601	1 814	0,912	0,115	36,692	58,715
Taux de mortalité périnatale	34,430	5,485	1 623	1 837	1,070	0,159	23,460	45,401
Taux de mortinatalité	18,043	3,618	1 623	1 837	0,955	0,201	10,807	25,278
Taux de mortalité néonatale précoce	16,689	3,566	1 592	1 804	0,977	0,214	9,557	23,821
A reçu des soins prénatals par un prestataire de santé qualifié	0,977	0,006	637	724	1,007	0,006	0,965	0,989
4 visites prénatales ou plus	0,798	0,020	637	724	1,252	0,025	0,758	0,837
8 visites prénatales ou plus	0,131	0,016	637	724	1,206	0,123	0,099	0,163
A pris des suppléments contenant du fer	0,967	0,007	637	724	1,034	0,008	0,953	0,982

À suivre…

Tableau B.3—*Suite*

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,662	0,025	637	724	1,320	0,037	0,613	0,712
A accouché dans un établissement de santé (naissances vivantes)	0,973	0,006	664	751	0,880	0,006	0,961	0,984
A accouché avec l'assistance d'un prestataire de santé qualifié (naissances vivantes)	0,970	0,006	664	751	0,929	0,007	0,958	0,983
A accouché par césarienne (naissances vivantes)	0,095	0,011	664	751	0,954	0,121	0,072	0,118
Femmes ayant reçu des soins postnatals dans les 2 premiers jours	0,896	0,015	637	724	1,198	0,016	0,867	0,925
Nouveau-nés ayant reçu des soins postnatals dans les 2 premiers jours	0,848	0,017	637	724	1,164	0,020	0,815	0,881
Un problème d'accès aux soins de santé	0,526	0,027	2 376	2 675	2,587	0,050	0,472	0,579
A déjà eu un carnet de vaccination	0,979	0,008	306	348	0,954	0,008	0,964	0,995
A reçu le vaccin du BCG	0,964	0,013	306	348	1,194	0,013	0,939	0,990
A reçu [DTC-HepB-Hib] (3 doses)	0,923	0,015	306	348	1,007	0,017	0,892	0,954
A reçu le vaccin contre pneumocoque (3 doses)	0,904	0,018	306	348	1,069	0,020	0,868	0,940
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12–23)	0,824	0,023	306	348	1,044	0,028	0,778	0,870
Complètement vacciné conformément au calendrier national (12–23 mois)	0,340	0,033	306	348	1,221	0,097	0,274	0,406
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 24–35)	0,411	0,030	296	332	1,039	0,074	0,350	0,471
Complètement vacciné conformément au calendrier national (24–35 mois)	0,115	0,019	296	332	0,981	0,168	0,076	0,153
A recherché un traitement pour la diarrhée	0,383	0,031	230	261	0,962	0,082	0,320	0,445
Traité avec des SRO	0,159	0,028	230	261	1,129	0,175	0,104	0,215
Taille-pour-âge (-3ET)	0,034	0,005	1 530	1 809	1,099	0,153	0,024	0,045
Taille-pour-âge (-2ET)	0,144	0,011	1 530	1 809	1,058	0,073	0,123	0,165
Poids-pour-taille (-2ET)	0,046	0,006	1 528	1 806	1,071	0,131	0,034	0,058
Poids-pour-taille (+2ET)	0,011	0,003	1 528	1 806	0,967	0,243	0,006	0,016
Poids-pour-âge (-2ET)	0,096	0,008	1 529	1 808	1,053	0,086	0,080	0,113
Exclusivement allaité	0,153	0,030	184	206	1,112	0,194	0,094	0,212
Diversité alimentaire minimale (enfants 6–23 mois)	0,174	0,020	437	499	1,104	0,115	0,134	0,214
Prévalence de l'anémie (enfants 6–59 mois) (hémoglobine <11,0 g/dl)	0,677	0,026	670	791	1,283	0,039	0,624	0,729
Indice de masse corporelle (IMC) <18,5	0,053	0,008	788	884	0,991	0,150	0,037	0,069
Indice de masse corporelle (IMC) ≥25,0	0,502	0,019	788	884	1,087	0,039	0,463	0,541
Indice de masse corporelle-pour-âge (-2ET)	0,040	0,011	314	360	1,034	0,285	0,017	0,062
Indice de masse corporelle-pour-âge (+1ET)	0,202	0,030	314	360	1,348	0,150	0,141	0,262
Diversification alimentaire minimum (femmes 15–49)	0,460	0,023	2 376	2 675	2,260	0,050	0,413	0,506
Prévalence de l'anémie (femmes 15–49, OMS)	0,448	0,017	1 193	1 344	1,214	0,039	0,413	0,483
Enfant a dormi sous une MII la nuit précédente	0,605	0,018	1 552	1 838	1,087	0,030	0,569	0,642
Femme enceinte a dormi sous une MII la nuit précédente	0,567	0,046	166	193	1,159	0,082	0,474	0,660
A reçu trois doses ou plus de SP/Fansidar	0,277	0,021	637	724	1,164	0,075	0,236	0,318
Enfant a eu de la fièvre dans les 2 semaines précédentes	0,158	0,017	1 528	1 733	1,739	0,109	0,123	0,192
Enfant a eu un prélèvement de sang au doigt/talon	0,208	0,026	244	274	0,963	0,123	0,157	0,259
Enfant a pris une CTA	0,437	0,073	57	65	1,095	0,166	0,292	0,582
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,638	0,012	2 293	2 582	1,216	0,019	0,614	0,663
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,143	0,022	236	249	0,976	0,156	0,098	0,187
A déjà été testée pour le VIH et a reçu les résultats du dernier test	0,074	0,006	2 376	2 675	1,030	0,075	0,062	0,085
A travaillé au cours des 12 derniers mois	0,691	0,015	1 376	1 553	1,203	0,022	0,661	0,721
A travaillé au cours des 12 derniers mois, mais n'a pas été rémunérée	0,011	0,004	963	1 074	1,241	0,387	0,002	0,019
Possession d'un téléphone portable	0,818	0,010	2 376	2 675	1,202	0,012	0,799	0,837
Possède et utilise un compte bancaire ou un téléphone portable pour des transactions financières	0,596	0,016	2 376	2 675	1,587	0,027	0,564	0,628
Participe dans la prise de décision (les trois décisions)	0,174	0,018	1 376	1 553	1,723	0,101	0,139	0,209

À suivre…

Tableau B.3—*Suite*

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
D'accord avec, au moins, une des raisons spécifiées justifiant qu'un mari puisse battre sa femme	0,601	0,020	2 376	2 675	1,999	0,033	0,560	0,641
Prend ses propres décisions concernant les relations sexuelles, l'utilisation contraceptive et les soins de santé reproductive	0,062	0,009	1 376	1 553	1,457	0,153	0,043	0,081
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	0,362	0,028	532	641	1,340	0,077	0,306	0,418
A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment	0,123	0,018	532	641	1,243	0,144	0,088	0,159
A subi des violences sexuelles par n'importe quel partenaire non-intime	0,044	0,011	532	641	1,245	0,253	0,021	0,066
A subi des violences physiques/sexuelles exercées par le plus récent mari/partenaire	0,256	0,029	475	539	1,445	0,113	0,198	0,314
A subi des violences physiques/ sexuelles/émotionnelles par le mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois	0,257	0,026	475	539	1,315	0,103	0,204	0,310
			HOMMES					
Aucune instruction	0,160	0,018	1 027	1 177	1,579	0,113	0,124	0,196
Niveau d'instruction secondaire ou plus	0,701	0,025	1 027	1 177	1,727	0,035	0,652	0,751
Alphabétisation	0,773	0,021	1 027	1 177	1,637	0,028	0,731	0,816
Utilisation de l'internet au cours des 12 derniers mois	0,825	0,016	1 027	1 177	1,386	0,020	0,792	0,858
Consommation actuelle de tabac	0,179	0,013	1 027	1 177	1,119	0,075	0,152	0,206
Ne veut plus d'enfant	0,064	0,011	441	503	0,982	0,178	0,041	0,087
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,448	0,021	988	1 133	1,346	0,048	0,406	0,491
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,449	0,045	236	279	1,397	0,101	0,359	0,540
A déjà été testé pour le VIH et a reçu les résultats du dernier test	0,025	0,006	1 027	1 177	1,190	0,231	0,014	0,037
Circoncision	0,988	0,005	1 027	1 177	1,398	0,005	0,978	0,997
Possession d'un téléphone portable	0,924	0,009	1 027	1 177	1,037	0,009	0,907	0,941
Possède et utilise un compte bancaire ou un téléphone portable pour des transactions	0,829	0,018	1 027	1 177	1,515	0,022	0,793	0,865
D'accord avec, au moins, une des raisons spécifiées justifiant qu'un mari puisse battre sa femme	0,422	0,031	1 027	1 177	2,013	0,074	0,360	0,484

Tableau B.4 Erreurs de sondage : Echantillon Autre urbain, Mali 2023–2024

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
			MÉNAGES ET POPULATIONS					
Électricité principale source d'éclairage	0,720	0,048	12 216	9 246	3,699	0,067	0,623	0,816
Dépendance principale à l'égard de technologies propres pour la cuisine, le chauffage d'appoint et l'éclairage	0,007	0,002	12 216	9 246	1,252	0,281	0,003	0,011
Naissances enregistrées à l'état civil	0,938	0,009	2 101	1 554	1,351	0,010	0,919	0,957
Possession d'au moins une MII	0,875	0,013	1 683	1 171	1,575	0,015	0,849	0,900
Possession d'au moins une MII pour deux personnes	0,521	0,019	1 682	1 170	1,600	0,037	0,482	0,560
Source améliorée d'eau de boisson	0,888	0,032	12 216	9 246	3,114	0,036	0,823	0,953
Au moins un service élémentaire en eau de boisson	0,864	0,032	12 216	9 246	2,956	0,038	0,799	0,929
Disponibilité d'eau à boire en quantités suffisantes	0,747	0,024	12 216	9 246	1,910	0,032	0,700	0,795
Installation sanitaire améliorée	0,807	0,037	12 216	9 246	2,939	0,046	0,733	0,881
Au moins un service élémentaire d'assainissement	0,578	0,035	12 216	9 246	2,435	0,061	0,508	0,648
Utilisant défécation en plein air	0,008	0,002	12 216	9 246	1,201	0,300	0,003	0,012
Utilisant une installation pour le lavage des mains avec du savon et de l'eau	0,223	0,024	12 076	9 155	1,902	0,107	0,176	0,271
			FEMMES					
Aucune instruction	0,349	0,022	2 744	2 048	2,394	0,063	0,305	0,392
Niveau d'instruction secondaire ou plus	0,502	0,023	2 744	2 048	2,400	0,046	0,456	0,547
Alphabétisée	0,507	0,025	2 744	2 048	2,575	0,049	0,458	0,556
Utilisation de l'internet dans les 12 derniers mois	0,545	0,027	2 744	2 048	2,791	0,049	0,492	0,598
Consommation actuelle de tabac	0,017	0,004	2 744	2 048	1,516	0,222	0,009	0,024
Taux de fécondité par âge (15–19) (derniers 3 ans)	109,765	11,060	2 173	1 609	1,629	0,101	87,645	131,885
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	5,191	0,182	7 590	5 654	1,633	0,035	4,828	5,554
Actuellement enceinte	0,096	0,005	2 744	2 048	0,924	0,054	0,085	0,106
Nombre moyen d'enfants nés vivants des femmes de 40–49 ans	5,647	0,171	371	290	1,350	0,030	5,305	5,989
Intervalle intergénésique médian	34,502	0,683	1 659	1 181	1,444	0,020	33,136	35,869
Ne veut plus d'enfant	0,193	0,012	1 822	1 339	1,279	0,061	0,169	0,216
Nombre idéal d'enfants	6,260	0,096	2 569	1 957	1,844	0,015	6,069	6,452
Taux de fécondité désirée (3 ans)	4,783	0,175	7 590	5 654	1,596	0,036	4,434	5,132
Utilise actuellement une méthode contraceptive	0,267	0,013	1 822	1 339	1,238	0,048	0,242	0,293
Utilise actuellement une méthode moderne	0,257	0,013	1 822	1 339	1,294	0,052	0,231	0,284
Utilise actuellement la pilule	0,048	0,006	1 822	1 339	1,202	0,126	0,036	0,060
Utilise actuellement les injectables	0,062	0,006	1 822	1 339	1,077	0,098	0,050	0,074
Utilise actuellement les implants	0,127	0,013	1 822	1 339	1,658	0,102	0,101	0,153
Utilise actuellement le condom masculin	0,001	0,001	1 822	1 339	1,204	1,008	0,000	0,002
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,010	0,003	1 822	1 339	1,290	0,298	0,004	0,016
Besoins non satisfaits pour espacer	0,173	0,007	1 822	1 339	0,804	0,041	0,159	0,187
Besoins non satisfaits pour limiter	0,045	0,005	1 822	1 339	1,134	0,123	0,034	0,056
Total des besoins non satisfaits	0,218	0,009	1 822	1 339	0,956	0,042	0,199	0,236
Demande satisfaite par des méthodes modernes (femmes en union)	0,530	0,018	843	650	1,092	0,035	0,494	0,567
Demande satisfaite par des méthodes modernes (l'ensemble des femmes)	0,540	0,017	985	751	1,111	0,032	0,505	0,575
Participation dans la prise de décision sur la planification familiale	0,626	0,025	1 822	1 339	2,204	0,040	0,576	0,676
Non exposée à aucun des huit médias	0,435	0,026	2 744	2 048	2,776	0,060	0,383	0,488
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0–4 ans)	24,383	4,017	2 140	1 539	1,204	0,165	16,349	32,418
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0–4 ans)	19,685	3,653	2 131	1 530	1,214	0,186	12,378	26,992
Quotient de mortalité infantile (derniers 0–4 ans)	44,068	5,545	2 142	1 541	1,181	0,126	32,978	55,159
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0–4 ans)	16,552	3,424	2 078	1 486	1,199	0,207	9,705	23,399
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0–4 ans)	59,891	6,670	2 156	1 549	1,200	0,111	46,551	73,231
Taux de mortalité périnatale	42,077	5,634	2 190	1 577	1,310	0,134	30,810	53,344
Taux de mortinatalité	24,253	3,394	2 190	1 577	1,026	0,140	17,466	31,041
Taux de mortalité néonatale précoce	18,267	4,025	2 137	1 538	1,355	0,220	10,217	26,316
A reçu des soins prénatals par un prestataire de santé qualifié	0,861	0,041	838	602	3,374	0,047	0,780	0,942
4 visites prénatales ou plus	0,598	0,025	838	602	1,490	0,042	0,547	0,648
8 visites prénatales ou plus	0,060	0,011	838	602	1,345	0,185	0,037	0,082
A pris des suppléments contenant du fer	0,921	0,013	838	602	1,360	0,014	0,895	0,946
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,507	0,023	838	602	1,333	0,045	0,461	0,553

À suivre…

Tableau B.4—*Suite*

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
A accouché dans un établissement de santé (naissances vivantes)	0,940	0,009	877	630	1,087	0,010	0,922	0,958
A accouché avec l'assistance d'un prestataire de santé qualifié (naissances vivantes)	0,871	0,037	877	630	3,114	0,043	0,797	0,945
A accouché par césarienne (naissances vivantes)	0,071	0,008	877	630	0,943	0,119	0,054	0,088
Femmes ayant reçu des soins postnatals dans les 2 premiers jours	0,810	0,017	838	602	1,265	0,021	0,775	0,844
Nouveau-nés ayant reçu des soins postnatals dans les 2 premiers jours	0,776	0,021	838	602	1,471	0,027	0,734	0,819
Un problème d'accès aux soins de santé	0,443	0,022	2 744	2 048	2,283	0,049	0,399	0,486
A déjà eu un carnet de vaccination	0,906	0,017	406	277	1,112	0,019	0,872	0,939
A reçu le vaccin du BCG	0,891	0,017	406	277	1,034	0,019	0,857	0,925
A reçu [DTC-HepB-Hib] (3 doses)	0,715	0,030	406	277	1,261	0,042	0,656	0,775
A reçu le vaccin contre pneumocoque (3 doses)	0,696	0,029	406	277	1,213	0,042	0,638	0,754
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12–23)	0,708	0,030	406	277	1,256	0,042	0,649	0,768
Complètement vacciné conformément au calendrier national (12–23 mois)	0,199	0,026	406	277	1,225	0,129	0,148	0,251
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 24–35)	0,351	0,029	410	307	1,233	0,084	0,292	0,410
Complètement vacciné conformément au calendrier national (24–35 mois)	0,079	0,015	410	307	1,131	0,190	0,049	0,109
A recherché un traitement pour la diarrhée	0,379	0,039	369	249	1,424	0,103	0,301	0,457
Traité avec des SRO	0,145	0,031	369	249	1,608	0,217	0,082	0,208
Taille-pour-âge (-3ET)	0,052	0,006	2 047	1 527	1,083	0,108	0,040	0,063
Taille-pour-âge (-2ET)	0,190	0,012	2 047	1 527	1,310	0,065	0,165	0,215
Poids-pour-taille (-2ET)	0,039	0,007	2 078	1 545	1,554	0,175	0,026	0,053
Poids-pour-taille (+2ET)	0,018	0,004	2 078	1 545	1,328	0,207	0,010	0,025
Poids-pour-âge (-2ET)	0,110	0,008	2 050	1 528	1,042	0,068	0,095	0,125
Exclusivement allaité	0,329	0,037	209	154	1,135	0,113	0,255	0,403
Diversité alimentaire minimale (enfants 6–23 mois)	0,208	0,032	583	413	1,895	0,154	0,144	0,272
Prévalence de l'anémie (enfants 6–59 mois) (hémoglobine <11,0 g/dl)	0,680	0,026	883	651	1,550	0,038	0,629	0,731
Indice de masse corporelle (IMC) <18,5	0,062	0,011	844	619	1,365	0,185	0,039	0,085
Indice de masse corporelle (IMC) ≥25,0	0,447	0,023	844	619	1,344	0,052	0,401	0,494
Indice de masse corporelle-pour-âge (-2ET)	0,011	0,006	329	247	1,005	0,523	0,000	0,023
Indice de masse corporelle-pour-âge (+1ET)	0,162	0,021	329	247	1,020	0,128	0,121	0,203
Diversification alimentaire minimum (femmes 15–49)	0,378	0,021	2 744	2 048	2,215	0,054	0,337	0,419
Prévalence de l'anémie (femmes 15–49, OMS)	0,471	0,021	1 326	984	1,498	0,044	0,430	0,512
Enfant a dormi sous une MII la nuit précédente	0,691	0,014	2 125	1 580	1,004	0,020	0,664	0,718
Femme enceinte a dormi sous une MII la nuit précédente	0,727	0,028	264	204	1,023	0,038	0,672	0,782
A reçu trois doses ou plus de SP/Fansidar	0,284	0,023	838	602	1,477	0,081	0,238	0,330
Enfant a eu de la fièvre dans les 2 semaines précédentes	0,169	0,018	2 029	1 462	1,982	0,108	0,133	0,205
Enfant a eu un prélèvement de sang au doigt/talon	0,149	0,026	350	247	1,295	0,175	0,097	0,201
Enfant a pris une CTA	0,476	0,063	95	70	1,190	0,132	0,351	0,602
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,621	0,022	2 578	1 962	2,265	0,035	0,578	0,664
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,074	0,022	222	166	1,242	0,296	0,030	0,118
A déjà été testée pour le VIH et a reçu les résultats du dernier test	0,070	0,007	2 744	2 048	1,460	0,102	0,055	0,084
A travaillé au cours des 12 derniers mois	0,593	0,017	1 822	1 339	1,503	0,029	0,559	0,628
A travaillé au cours des 12 derniers mois, mais n'a pas été rémunérée	0,083	0,013	958	794	1,485	0,159	0,057	0,110
Possession d'un téléphone portable	0,770	0,019	2 744	2 048	2,387	0,025	0,731	0,808
Possède et utilise un compte bancaire ou un téléphone portable pour des transactions financières	0,518	0,017	2 744	2 048	1,812	0,033	0,483	0,553
Participe dans la prise de décision (les trois décisions)	0,124	0,015	1 822	1 339	1,881	0,117	0,095	0,153
D'accord avec, au moins, une des raisons spécifiées justifiant qu'un mari puisse battre sa femme	0,630	0,018	2 744	2 048	1,931	0,028	0,594	0,665
Prend ses propres décisions concernant les relations sexuelles, l'utilisation contraceptive et les soins de santé reproductive	0,045	0,007	1 822	1 339	1,456	0,157	0,031	0,059
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	0,273	0,024	711	516	1,447	0,089	0,224	0,321
A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment	0,083	0,017	711	516	1,626	0,203	0,049	0,117

À suivre…

Tableau B.4—*Suite*

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
A subi des violences sexuelles par n'importe quel partenaire non-intime	0,023	0,009	711	516	1,571	0,384	0,005	0,041
A subi des violences physiques/sexuelles exercées par le plus récent mari/partenaire	0,237	0,025	610	416	1,474	0,107	0,186	0,287
A subi des violences physiques/sexuelles/ émotionnelles par le mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois	0,261	0,029	610	416	1,608	0,110	0,203	0,318
			HOMMES					
Aucune instruction	0,189	0,020	1 065	795	1,703	0,108	0,148	0,230
Niveau d'instruction secondaire ou plus	0,637	0,026	1 065	795	1,737	0,040	0,585	0,688
Alphabétisation	0,718	0,023	1 065	795	1,702	0,033	0,671	0,765
Utilisation de l'internet au cours des 12 derniers mois	0,712	0,023	1 065	795	1,672	0,033	0,666	0,759
Consommation actuelle de tabac	0,148	0,013	1 065	795	1,230	0,090	0,122	0,175
Ne veut plus d'enfant	0,080	0,020	523	365	1,649	0,245	0,041	0,120
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,500	0,034	1 008	752	2,152	0,068	0,432	0,568
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,471	0,040	207	154	1,149	0,085	0,391	0,551
A déjà été testé pour le VIH et a reçu les résultats du dernier test	0,018	0,004	1 065	795	0,958	0,216	0,010	0,026
Circoncision	0,986	0,004	1 065	795	1,059	0,004	0,978	0,993
Possession d'un téléphone portable	0,894	0,011	1 065	795	1,166	0,012	0,872	0,916
Possède et utilise un compte bancaire ou un téléphone portable pour des transactions	0,746	0,018	1 065	795	1,314	0,024	0,711	0,781
D'accord avec, au moins, une des raisons spécifiées justifiant qu'un mari puisse battre sa femme	0,294	0,040	1 065	795	2,879	0,137	0,213	0,375

Tableau B.5 Erreurs de sondage : Echantillon Ensemble urbain, Mali 2023–2024

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
			MÉNAGES ET POPULATIONS					
Électricité principale source d'éclairage	0,846	0,023	21 792	20 507	2,855	0,027	0,800	0,892
Dépendance principale à l'égard de technologies propres pour la cuisine, le chauffage d'appoint et l'éclairage	0,017	0,005	21 792	20 507	2,183	0,289	0,007	0,027
Naissances enregistrées à l'état civil	0,956	0,005	3 647	3 385	1,151	0,005	0,946	0,966
Possession d'au moins une MII	0,825	0,009	2 912	2 680	1,265	0,011	0,808	0,843
Possession d'au moins une MII pour deux personnes	0,419	0,017	2 910	2 674	1,896	0,041	0,384	0,453
Source améliorée d'eau de boisson	0,948	0,015	21 792	20 507	2,643	0,016	0,918	0,978
Au moins un service élémentaire en eau de boisson	0,907	0,017	21 792	20 507	2,409	0,018	0,873	0,940
Disponibilité d'eau à boire en quantités suffisantes	0,797	0,015	21 792	20 507	1,645	0,019	0,766	0,828
Installation sanitaire améliorée	0,902	0,017	21 792	20 507	2,354	0,019	0,867	0,937
Au moins un service élémentaire d'assainissement	0,597	0,021	21 792	20 507	1,886	0,035	0,555	0,638
Utilisant défécation en plein air	0,004	0,001	21 792	20 507	1,051	0,288	0,002	0,006
Utilisant une installation pour le lavage des mains avec du savon et de l'eau	0,298	0,016	21 649	20 413	1,413	0,053	0,266	0,329
			FEMMES					
Aucune instruction	0,327	0,013	5 120	4 723	1,951	0,039	0,301	0,352
Niveau d'instruction secondaire ou plus	0,514	0,013	5 120	4 723	1,926	0,026	0,487	0,541
Alphabétisée	0,519	0,015	5 120	4 723	2,119	0,029	0,489	0,548
Utilisation de l'internet dans les 12 derniers mois	0,636	0,015	5 120	4 723	2,291	0,024	0,605	0,666
Consommation actuelle de tabac	0,011	0,002	5 120	4 723	1,324	0,179	0,007	0,014
Taux de fécondité par âge (15–19) (derniers 3 ans)	87,430	6,120	4 037	3 734	1,358	0,070	75,190	99,671
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	5,008	0,120	14 117	12 997	1,399	0,024	4,769	5,247
Actuellement enceinte	0,081	0,004	5 120	4 723	1,058	0,050	0,073	0,089
Nombre moyen d'enfants nés vivants des femmes de 40–49 ans	5,525	0,115	680	640	1,219	0,021	5,294	5,756
Intervalle intergénésique médian	35,284	0,350	2 880	2 562	1,134	0,010	34,584	35,983
Ne veut plus d'enfant	0,210	0,008	3 198	2 892	1,131	0,039	0,193	0,226
Nombre idéal d'enfants	5,993	0,057	4 786	4 449	1,601	0,010	5,879	6,108
Taux de fécondité désirée (3 ans)	4,506	0,118	14 117	12 997	1,431	0,026	4,270	4,743
Utilise actuellement une méthode contraceptive	0,299	0,010	3 198	2 892	1,181	0,032	0,280	0,318
Utilise actuellement une méthode moderne	0,280	0,009	3 198	2 892	1,196	0,034	0,261	0,299
Utilise actuellement la pilule	0,049	0,004	3 198	2 892	1,064	0,083	0,041	0,058
Utilise actuellement les injectables	0,055	0,005	3 198	2 892	1,191	0,087	0,046	0,065
Utilise actuellement les implants	0,135	0,007	3 198	2 892	1,216	0,054	0,121	0,150
Utilise actuellement le condom masculin	0,004	0,002	3 198	2 892	1,548	0,458	0,000	0,007
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,020	0,003	3 198	2 892	1,143	0,143	0,014	0,025
Besoins non satisfaits pour espacer	0,156	0,006	3 198	2 892	0,870	0,036	0,145	0,168
Besoins non satisfaits pour limiter	0,056	0,004	3 198	2 892	0,995	0,072	0,048	0,065
Total des besoins non satisfaits	0,213	0,007	3 198	2 892	0,988	0,034	0,198	0,227
Demande satisfaite par des méthodes modernes (femmes en union)	0,546	0,013	1 580	1 481	1,033	0,023	0,521	0,572
Demande satisfaite par des méthodes modernes (l'ensemble des femmes)	0,563	0,012	1 906	1 780	1,077	0,022	0,539	0,587
Participation dans la prise de décision sur la planification familiale	0,710	0,014	3 198	2 892	1,739	0,020	0,682	0,738
Non exposée à aucun des huit médias	0,413	0,014	5 120	4 723	2,024	0,034	0,385	0,441
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0–4 ans)	21,123	2,683	3 735	3 346	1,077	0,127	15,757	26,489
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0–4 ans)	20,190	2,614	3 722	3 335	1,130	0,129	14,963	25,418
Quotient de mortalité infantile (derniers 0–4 ans)	41,313	3,696	3 738	3 350	1,052	0,089	33,922	48,705
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0–4 ans)	12,594	2,095	3 580	3 187	1,097	0,166	8,404	16,785
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0–4 ans)	53,387	4,331	3 757	3 364	1,055	0,081	44,726	62,049
Taux de mortalité périnatale	37,961	3,958	3 813	3 414	1,187	0,104	30,045	45,878
Taux de mortinatalité	20,911	2,507	3 813	3 414	0,999	0,120	15,896	25,925
Taux de mortalité néonatale précoce	17,415	2,677	3 729	3 343	1,143	0,154	12,062	22,768
A reçu des soins prénatals par un prestataire de santé qualifié	0,924	0,019	1 475	1 326	2,786	0,021	0,886	0,963
4 visites prénatales ou plus	0,707	0,017	1 475	1 326	1,403	0,024	0,674	0,740
8 visites prénatales ou plus	0,099	0,010	1 475	1 326	1,316	0,104	0,078	0,119
A pris des suppléments contenant du fer	0,946	0,007	1 475	1 326	1,246	0,008	0,931	0,961
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,592	0,018	1 475	1 326	1,372	0,030	0,557	0,627

À suivre…

Tableau B.5—*Suite*

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
A accouché dans un établissement de santé (naissances vivantes)	0,958	0,005	1 541	1 381	0,994	0,005	0,947	0,968
A accouché avec l'assistance d'un prestataire de santé qualifié (naissances vivantes)	0,925	0,018	1 541	1 381	2,521	0,019	0,890	0,960
A accouché par césarienne (naissances vivantes)	0,084	0,007	1 541	1 381	0,976	0,086	0,069	0,098
Femmes ayant reçu des soins postnatals dans les 2 premiers jours	0,857	0,011	1 475	1 326	1,239	0,013	0,834	0,879
Nouveau-nés ayant reçu des soins postnatals dans les 2 premiers jours	0,816	0,013	1 475	1 326	1,308	0,016	0,789	0,842
Un problème d'accès aux soins de santé	0,490	0,018	5 120	4 723	2,516	0,036	0,454	0,525
A déjà eu un carnet de vaccination	0,947	0,009	712	624	1,026	0,009	0,929	0,964
A reçu le vaccin du BCG	0,932	0,010	712	624	1,054	0,011	0,911	0,953
A reçu [DTC-HepB-Hib] (3 doses)	0,831	0,016	712	624	1,100	0,019	0,799	0,863
A reçu le vaccin contre pneumocoque (3 doses)	0,812	0,016	712	624	1,090	0,020	0,779	0,845
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12–23)	0,773	0,018	712	624	1,134	0,024	0,736	0,810
Complètement vacciné conformément au calendrier national (12–23 mois)	0,278	0,022	712	624	1,266	0,078	0,234	0,321
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 24–35)	0,382	0,021	706	640	1,149	0,056	0,339	0,425
Complètement vacciné conformément au calendrier national (24–35 mois)	0,097	0,012	706	640	1,067	0,127	0,073	0,122
A recherché un traitement pour la diarrhée	0,381	0,025	599	511	1,183	0,065	0,331	0,431
Traité avec des SRO	0,152	0,021	599	511	1,351	0,138	0,110	0,194
Taille-pour-âge (-3ET)	0,042	0,004	3 577	3 335	1,082	0,091	0,035	0,050
Taille-pour-âge (-2ET)	0,165	0,008	3 577	3 335	1,161	0,048	0,149	0,181
Poids-pour-taille (-2ET)	0,043	0,005	3 606	3 351	1,284	0,105	0,034	0,052
Poids-pour-taille (+2ET)	0,014	0,002	3 606	3 351	1,138	0,158	0,010	0,018
Poids-pour-âge (-2ET)	0,103	0,006	3 579	3 336	1,068	0,055	0,091	0,114
Exclusivement allaité	0,228	0,025	393	360	1,178	0,109	0,178	0,278
Diversité alimentaire minimale (enfants 6–23 mois)	0,189	0,018	1 020	912	1,495	0,097	0,153	0,226
Prévalence de l'anémie (enfants 6–59 mois) (hémoglobine <11,0 g/dl)	0,678	0,018	1 553	1 442	1,424	0,027	0,641	0,715
Indice de masse corporelle (IMC) <18,5	0,057	0,007	1 632	1 503	1,153	0,117	0,043	0,070
Indice de masse corporelle (IMC) ≥25,0	0,480	0,015	1 632	1 503	1,199	0,031	0,450	0,509
Indice de masse corporelle-pour-âge (-2ET)	0,028	0,007	643	606	1,141	0,262	0,013	0,043
Indice de masse corporelle-pour-âge (+1ET)	0,186	0,020	643	606	1,299	0,106	0,146	0,225
Diversification alimentaire minimum (femmes 15–49)	0,424	0,016	5 120	4 723	2,299	0,037	0,392	0,456
Prévalence de l'anémie (femmes 15–49, OMS)	0,458	0,013	2 519	2 328	1,342	0,029	0,431	0,484
Enfant a dormi sous une MII la nuit précédente	0,645	0,012	3 677	3 419	1,079	0,018	0,622	0,668
Femme enceinte a dormi sous une MII la nuit précédente	0,649	0,026	430	397	1,118	0,040	0,597	0,701
A reçu trois doses ou plus de SP/Fansidar	0,280	0,015	1 475	1 326	1,315	0,055	0,250	0,311
Enfant a eu de la fièvre dans les 2 semaines précédentes	0,163	0,013	3 557	3 195	1,868	0,077	0,138	0,188
Enfant a eu un prélèvement de sang au doigt/talon	0,180	0,019	594	521	1,133	0,104	0,142	0,217
Enfant a pris une CTA	0,457	0,048	152	135	1,148	0,105	0,361	0,554
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,631	0,012	4 871	4 544	1,687	0,018	0,608	0,654
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,115	0,016	458	415	1,081	0,140	0,083	0,148
A déjà été testée pour le VIH et a reçu les résultats du dernier test	0,072	0,004	5 120	4 723	1,216	0,061	0,063	0,081
A travaillé au cours des 12 derniers mois	0,646	0,011	3 198	2 892	1,333	0,017	0,623	0,668
A travaillé au cours des 12 derniers mois, mais n'a pas été rémunérée	0,042	0,006	1 921	1 868	1,306	0,143	0,030	0,053
Possession d'un téléphone portable	0,797	0,010	5 120	4 723	1,758	0,012	0,777	0,817
Possède et utilise un compte bancaire ou un téléphone portable pour des transactions financières	0,562	0,012	5 120	4 723	1,712	0,021	0,539	0,586
Participe dans la prise de décision (les trois décisions)	0,151	0,012	3 198	2 892	1,824	0,077	0,128	0,174
D'accord avec, au moins, une des raisons spécifiées justifiant qu'un mari puisse battre sa femme	0,613	0,014	5 120	4 723	2,023	0,022	0,586	0,641
Prend ses propres décisions concernant les relations sexuelles, l'utilisation contraceptive et les soins de santé reproductive	0,054	0,006	3 198	2 892	1,502	0,111	0,042	0,066
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	0,322	0,019	1 243	1 157	1,427	0,059	0,284	0,360
A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment	0,105	0,012	1 243	1 157	1,422	0,118	0,081	0,130

À suivre…

Tableau B.5—*Suite*

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
A subi des violences sexuelles par n'importe quel partenaire non-intime	0,034	0,007	1 243	1 157	1,405	0,211	0,020	0,049
A subi des violences physiques/sexuelles exercées par le plus récent mari/partenaire	0,248	0,020	1 085	954	1,508	0,080	0,208	0,287
A subi des violences physiques/sexuelles/ émotionnelles par le mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois	0,259	0,019	1 085	954	1,461	0,075	0,220	0,297
			HOMMES					
Aucune instruction	0,172	0,014	2 092	1 971	1,644	0,079	0,145	0,199
Niveau d'instruction secondaire ou plus	0,675	0,018	2 092	1 971	1,755	0,027	0,639	0,711
Alphabétisation	0,751	0,016	2 092	1 971	1,686	0,021	0,719	0,783
Utilisation de l'internet au cours des 12 derniers mois	0,780	0,014	2 092	1 971	1,524	0,018	0,752	0,807
Consommation actuelle de tabac	0,167	0,010	2 092	1 971	1,184	0,058	0,147	0,186
Ne veut plus d'enfant	0,071	0,011	964	868	1,288	0,150	0,050	0,092
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,469	0,018	1 996	1 885	1,654	0,039	0,432	0,506
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,457	0,033	443	433	1,371	0,071	0,392	0,522
A déjà été testé pour le VIH et a reçu les résultats du dernier test	0,022	0,004	2 092	1 971	1,181	0,171	0,015	0,030
Circoncision	0,987	0,003	2 092	1 971	1,314	0,003	0,980	0,993
Possession d'un téléphone portable	0,912	0,007	2 092	1 971	1,097	0,007	0,898	0,925
Possède et utilise un compte bancaire ou un téléphone portable pour des transactions	0,796	0,013	2 092	1 971	1,450	0,016	0,770	0,821
D'accord avec, au moins, une des raisons spécifiées justifiant qu'un mari puisse battre sa femme	0,370	0,025	2 092	1 971	2,318	0,066	0,321	0,419

Tableau B.6 Erreurs de sondage : Echantillon Rurale, Mali 2023–2024

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
			MÉNAGES ET POPULATIONS					
Électricité principale source d'éclairage	0,299	0,024	60 707	65 843	3,421	0,080	0,251	0,347
Dépendance principale à l'égard de technologies propres pour la cuisine, le chauffage d'appoint et l'éclairage	0,006	0,001	60 707	65 843	1,519	0,197	0,003	0,008
Naissances enregistrées à l'état civil	0,875	0,009	11 690	12 740	2,107	0,011	0,857	0,893
Possession d'au moins une MII	0,909	0,007	6 755	6 987	1,885	0,007	0,896	0,922
Possession d'au moins une MII pour deux personnes	0,525	0,009	6 751	6 983	1,541	0,018	0,506	0,543
Source améliorée d'eau de boisson	0,768	0,019	60 707	65 843	2,793	0,024	0,731	0,805
Au moins un service élémentaire en eau de boisson	0,699	0,019	60 707	65 843	2,615	0,027	0,662	0,736
Disponibilité d'eau à boire en quantités suffisantes	0,810	0,012	60 707	65 843	1,977	0,015	0,786	0,834
Installation sanitaire améliorée	0,666	0,019	60 707	65 843	2,690	0,029	0,628	0,704
Au moins un service élémentaire d'assainissement	0,540	0,018	60 707	65 843	2,427	0,034	0,503	0,577
Utilisant défécation en plein air	0,073	0,009	60 707	65 843	2,692	0,124	0,055	0,091
Utilisant une installation pour le lavage des mains avec du savon et de l'eau	0,156	0,013	60 096	65 250	2,311	0,081	0,130	0,181
			FEMMES					
Aucune instruction	0,621	0,014	12 082	12 624	3,194	0,023	0,593	0,649
Niveau d'instruction secondaire ou plus	0,207	0,012	12 082	12 624	3,291	0,059	0,183	0,231
Alphabétisée	0,245	0,012	12 082	12 624	3,096	0,049	0,221	0,269
Utilisation de l'internet dans les 12 derniers mois	0,316	0,017	12 082	12 624	3,999	0,054	0,282	0,350
Consommation actuelle de tabac	0,011	0,002	12 082	12 624	1,856	0,162	0,007	0,014
Taux de fécondité par âge (15–19) (derniers 3 ans)	161,125	6,295	7 713	7 797	1,572	0,039	148,536	173,715
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	6,441	0,095	33 815	35 407	1,614	0,015	6,252	6,631
Actuellement enceinte	0,113	0,004	12 082	12 624	1,403	0,036	0,105	0,122
Nombre moyen d'enfants nés vivants des femmes de 40–49 ans	7,001	0,091	1 998	2 115	1,472	0,013	6,820	7,183
Intervalle intergénésique médian	32,423	0,240	9 736	10 229	1,674	0,007	31,943	32,904
Ne veut plus d'enfant	0,199	0,006	9 702	10 345	1,469	0,030	0,187	0,211
Nombre idéal d'enfants	6,580	0,056	11 535	12 191	2,260	0,009	6,468	6,692
Taux de fécondité désirée (3 ans)	5,766	0,088	33 815	35 407	1,539	0,015	5,591	5,941
Utilise actuellement une méthode contraceptive	0,200	0,008	9 702	10 345	2,087	0,042	0,183	0,217
Utilise actuellement une méthode moderne	0,189	0,008	9 702	10 345	2,083	0,044	0,172	0,206
Utilise actuellement la pilule	0,017	0,002	9 702	10 345	1,501	0,116	0,013	0,021
Utilise actuellement les injectables	0,050	0,004	9 702	10 345	1,737	0,077	0,043	0,058
Utilise actuellement les implants	0,102	0,006	9 702	10 345	2,024	0,061	0,090	0,115
Utilise actuellement le condom masculin	0,000	0,000	9 702	10 345	0,994	0,494	0,000	0,001
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,011	0,001	9 702	10 345	1,339	0,128	0,008	0,014
Besoins non satisfaits pour espacer	0,196	0,005	9 702	10 345	1,291	0,027	0,186	0,207
Besoins non satisfaits pour limiter	0,065	0,003	9 702	10 345	1,181	0,045	0,060	0,071
Total des besoins non satisfaits	0,262	0,006	9 702	10 345	1,272	0,022	0,250	0,273
Demande satisfaite par des méthodes modernes (femmes en union)	0,409	0,013	4 173	4 776	1,801	0,032	0,383	0,436
Demande satisfaite par des méthodes modernes (l'ensemble des femmes)	0,418	0,013	4 480	5 102	1,891	0,032	0,391	0,444
Participation dans la prise de décision sur la planification familiale	0,556	0,013	9 702	10 345	2,578	0,023	0,530	0,582
Non exposée à aucun des huit médias	0,523	0,014	12 082	12 624	3,090	0,027	0,495	0,551
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0–4 ans)	31,253	2,155	11 870	12 477	1,271	0,069	26,943	35,562
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0–4 ans)	22,976	1,523	11 883	12 474	1,092	0,066	19,930	26,022
Quotient de mortalité infantile (derniers 0–4 ans)	54,229	2,581	11 896	12 501	1,178	0,048	49,067	59,391
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0–4 ans)	43,447	2,794	11 944	12 376	1,349	0,064	37,860	49,035
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0–4 ans)	95,320	3,612	12 085	12 714	1,210	0,038	88,097	102,544
Taux de mortalité périnatale	49,037	2,413	12 177	12 832	1,166	0,049	44,210	53,864
Taux de mortinatalité	24,990	1,754	12 177	12 832	1,167	0,070	21,481	28,499
Taux de mortalité néonatale précoce	24,663	1,831	11 902	12 511	1,215	0,074	21,001	28,325
A reçu des soins prénatals par un prestataire de santé qualifié	0,630	0,021	4 441	4 822	2,951	0,034	0,587	0,672
4 visites prénatales ou plus	0,460	0,015	4 441	4 822	1,998	0,033	0,430	0,489
8 visites prénatales ou plus	0,026	0,003	4 441	4 822	1,462	0,135	0,019	0,033
A pris des suppléments contenant du fer	0,825	0,012	4 441	4 822	2,088	0,014	0,801	0,849
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,460	0,014	4 441	4 822	1,907	0,031	0,432	0,489

À suivre…

Tableau B.6—*Suite*

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
A accouché dans un établissement de santé (naissances vivantes)	0,765	0,016	4 625	5 032	2,537	0,021	0,733	0,797
A accouché avec l'assistance d'un prestataire de santé qualifié (naissances vivantes)	0,581	0,021	4 625	5 032	2,811	0,036	0,540	0,623
A accouché par césarienne (naissances vivantes)	0,042	0,004	4 625	5 032	1,222	0,087	0,035	0,050
Femmes ayant reçu des soins postnatals dans les 2 premiers jours	0,645	0,015	4 441	4 822	2,140	0,024	0,614	0,676
Nouveau-nés ayant reçu des soins postnatals dans les 2 premiers jours	0,663	0,014	4 441	4 822	1,978	0,021	0,635	0,691
Un problème d'accès aux soins de santé	0,531	0,014	12 082	12 624	3,164	0,027	0,502	0,560
A déjà eu un carnet de vaccination	0,858	0,014	2 147	2 268	1,882	0,017	0,829	0,886
A reçu le vaccin du BCG	0,810	0,016	2 147	2 268	1,837	0,020	0,778	0,842
A reçu [DTC-HepB-Hib] (3 doses)	0,707	0,018	2 147	2 268	1,825	0,026	0,671	0,744
A reçu le vaccin contre pneumocoque (3 doses)	0,683	0,019	2 147	2 268	1,836	0,027	0,646	0,721
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12–23)	0,673	0,018	2 147	2 268	1,717	0,026	0,637	0,708
Complètement vacciné conformément au calendrier national (12–23 mois)	0,184	0,013	2 147	2 268	1,517	0,070	0,158	0,209
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 24–35)	0,357	0,017	2 263	2 378	1,656	0,048	0,323	0,391
Complètement vacciné conformément au calendrier national (24–35 mois)	0,086	0,010	2 263	2 378	1,610	0,111	0,067	0,105
A recherché un traitement pour la diarrhée	0,369	0,018	1 922	2 065	1,570	0,048	0,333	0,404
Traité avec des SRO	0,085	0,008	1 922	2 065	1,237	0,094	0,069	0,101
Taille-pour-âge (-3ET)	0,079	0,004	11 415	12 482	1,531	0,054	0,070	0,087
Taille-pour-âge (-2ET)	0,274	0,008	11 415	12 482	1,749	0,030	0,258	0,291
Poids-pour-taille (-2ET)	0,056	0,003	11 549	12 571	1,331	0,053	0,050	0,062
Poids-pour-taille (+2ET)	0,015	0,001	11 549	12 571	1,254	0,095	0,012	0,017
Poids-pour-âge (-2ET)	0,163	0,006	11 452	12 509	1,587	0,037	0,151	0,175
Exclusivement allaité	0,451	0,018	1 195	1 351	1,231	0,039	0,415	0,486
Diversité alimentaire minimale (enfants 6–23 mois)	0,168	0,012	3 059	3 268	1,836	0,074	0,143	0,193
Prévalence de l'anémie (enfants 6–59 mois) (hémoglobine <11,0 g/dl)	0,753	0,009	5 319	5 711	1,428	0,012	0,735	0,771
Indice de masse corporelle (IMC) <18,5	0,072	0,005	4 037	4 254	1,179	0,066	0,063	0,082
Indice de masse corporelle (IMC) ≥25,0	0,294	0,012	4 037	4 254	1,687	0,041	0,270	0,319
Indice de masse corporelle-pour-âge (-2ET)	0,035	0,008	1 133	1 137	1,356	0,214	0,020	0,051
Indice de masse corporelle-pour-âge (+1ET)	0,115	0,012	1 133	1 137	1,268	0,107	0,090	0,140
Diversification alimentaire minimum (femmes 15–49)	0,302	0,012	12 082	12 624	2,952	0,041	0,277	0,326
Prévalence de l'anémie (femmes 15–49, OMS)	0,552	0,011	6 084	6 333	1,780	0,021	0,529	0,575
Enfant a dormi sous une MII la nuit précédente	0,683	0,010	11 767	12 801	1,531	0,014	0,663	0,702
Femme enceinte a dormi sous une MII la nuit précédente	0,702	0,016	1 414	1 498	1,253	0,023	0,669	0,735
A reçu trois doses ou plus de SP/Fansidar	0,273	0,012	4 441	4 822	1,740	0,043	0,250	0,297
Enfant a eu de la fièvre dans les 2 semaines précédentes	0,144	0,007	11 120	11 637	1,937	0,048	0,130	0,157
Enfant a eu un prélèvement de sang au doigt/talon	0,185	0,014	1 608	1 671	1,335	0,073	0,158	0,213
Enfant a pris une CTA	0,452	0,035	379	378	1,293	0,077	0,382	0,522
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,795	0,012	9 887	11 062	2,881	0,015	0,771	0,818
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,078	0,015	455	481	1,206	0,194	0,048	0,109
A déjà été testée pour le VIH et a reçu les résultats du dernier test	0,036	0,003	12 082	12 624	1,637	0,077	0,031	0,042
A travaillé au cours des 12 derniers mois	0,660	0,013	9 702	10 345	2,708	0,020	0,634	0,686
A travaillé au cours des 12 derniers mois, mais n'a pas été rémunérée	0,186	0,014	5 690	6 832	2,741	0,076	0,158	0,215
Possession d'un téléphone portable	0,606	0,011	12 082	12 624	2,564	0,019	0,583	0,629
Possède et utilise un compte bancaire ou un téléphone portable pour des transactions financières	0,336	0,015	12 082	12 624	3,374	0,043	0,307	0,365
Participe dans la prise de décision (les trois décisions)	0,091	0,007	9 702	10 345	2,292	0,074	0,078	0,105
D'accord avec, au moins, une des raisons spécifiées justifiant qu'un mari puisse battre sa femme	0,722	0,011	12 082	12 624	2,731	0,015	0,700	0,745
Prend ses propres décisions concernant les relations sexuelles, l'utilisation contraceptive et les soins de santé reproductive	0,025	0,003	9 702	10 345	1,658	0,105	0,020	0,030
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	0,320	0,014	2 932	3 018	1,675	0,045	0,291	0,349

À suivre…

Tableau B.6—*Suite*

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment	0,105	0,008	2 932	3 018	1,502	0,081	0,088	0,122
A subi des violences sexuelles par n'importe quel partenaire non-intime	0,021	0,004	2 932	3 018	1,372	0,172	0,014	0,029
A subi des violences physiques/sexuelles exercées par le plus récent mari/partenaire	0,304	0,015	2 633	2 689	1,702	0,050	0,273	0,335
A subi des violences physiques/sexuelles/ émotionnelles par le mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois	0,275	0,014	2 633	2 689	1,611	0,051	0,247	0,303
			HOMMES					
Aucune instruction	0,453	0,017	4 551	4 714	2,264	0,037	0,420	0,487
Niveau d'instruction secondaire ou plus	0,324	0,017	4 551	4 714	2,445	0,052	0,290	0,358
Alphabétisation	0,391	0,016	4 551	4 714	2,158	0,040	0,360	0,422
Utilisation de l'internet au cours des 12 derniers mois	0,542	0,016	4 551	4 714	2,113	0,029	0,510	0,573
Consommation actuelle de tabac	0,126	0,007	4 551	4 714	1,490	0,058	0,112	0,141
Ne veut plus d'enfant	0,051	0,006	2 532	2 644	1,367	0,117	0,039	0,063
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,675	0,015	3 969	4 309	1,959	0,022	0,646	0,704
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,288	0,026	489	589	1,282	0,091	0,235	0,341
A déjà été testé pour le VIH et a reçu les résultats du dernier test	0,018	0,003	4 551	4 714	1,617	0,177	0,012	0,024
Circoncision	0,980	0,004	4 551	4 714	2,044	0,004	0,972	0,989
Possession d'un téléphone portable	0,851	0,008	4 551	4 714	1,435	0,009	0,836	0,866
Possède et utilise un compte bancaire ou un téléphone portable pour des transactions	0,625	0,016	4 551	4 714	2,194	0,025	0,594	0,657
D'accord avec, au moins, une des raisons spécifiées justifiant qu'un mari puisse battre sa femme	0,418	0,017	4 551	4 714	2,299	0,040	0,384	0,451

Tableau B.7 Erreurs de sondage : Echantillon Kayes, Mali 2023–2024

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
			MÉNAGES ET POPULATIONS					
Naissances enregistrées à l'état civil	0,886	0,020	2 338	2 411	2,083	0,022	0,846	0,925
Possession d'au moins une MII	0,908	0,018	1 239	1 305	2,140	0,019	0,873	0,943
Possession d'au moins une MII pour deux personnes	0,548	0,024	1 237	1 303	1,667	0,043	0,500	0,595
Au moins un service élémentaire en eau de boisson	0,648	0,045	12 314	12 728	2,518	0,069	0,558	0,737
Disponibilité d'eau à boire en quantités suffisantes	0,751	0,028	12 314	12 728	1,643	0,037	0,695	0,807
Au moins un service élémentaire d'assainissement	0,611	0,035	12 314	12 728	1,991	0,057	0,542	0,681
Utilisant défécation en plein air	0,055	0,017	12 314	12 728	2,709	0,317	0,020	0,089
Utilisant une installation pour le lavage des mains avec du savon et de l'eau	0,099	0,021	12 122	12 555	1,834	0,210	0,058	0,141
			FEMMES					
Aucune instruction	0,589	0,031	2 673	2 635	3,257	0,053	0,527	0,651
Niveau d'instruction secondaire ou plus	0,195	0,022	2 673	2 635	2,862	0,113	0,151	0,239
Alphabétisée	0,242	0,021	2 673	2 635	2,541	0,087	0,200	0,284
Utilisation de l'internet dans les 12 derniers mois	0,533	0,030	2 673	2 635	3,079	0,056	0,473	0,592
Consommation actuelle de tabac	0,009	0,003	2 673	2 635	1,588	0,329	0,003	0,014
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	6,123	0,180	7 418	7 309	1,479	0,029	5,762	6,483
Actuellement enceinte	0,102	0,006	2 673	2 635	1,050	0,060	0,090	0,114
Nombre moyen d'enfants nés vivants des femmes de 40–49 ans	6,687	0,164	449	432	1,359	0,025	6,358	7,015
Intervalle intergénésique médian	31,801	0,482	1 975	1 933	1,287	0,015	30,838	32,765
Ne veut plus d'enfant	0,229	0,012	2 127	2 094	1,292	0,051	0,205	0,253
Nombre idéal d'enfants	6,045	0,089	2 539	2 519	2,045	0,015	5,867	6,223
Taux de fécondité désirée (3 ans)	5,502	0,166	7 418	7 309	1,432	0,030	5,170	5,834
Utilise actuellement une méthode contraceptive	0,201	0,021	2 127	2 094	2,371	0,103	0,159	0,242
Utilise actuellement une méthode moderne	0,187	0,019	2 127	2 094	2,254	0,102	0,149	0,226
Utilise actuellement la pilule	0,013	0,003	2 127	2 094	1,051	0,200	0,008	0,018
Utilise actuellement les injectables	0,050	0,007	2 127	2 094	1,469	0,139	0,036	0,064
Utilise actuellement les implants	0,101	0,016	2 127	2 094	2,428	0,158	0,069	0,132
Utilise actuellement le condom masculin	0,001	0,001	2 127	2 094	0,989	0,709	0,000	0,002
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,013	0,004	2 127	2 094	1,429	0,268	0,006	0,020
Besoins non satisfaits pour espacer	0,168	0,009	2 127	2 094	1,070	0,052	0,151	0,185
Besoins non satisfaits pour limiter	0,072	0,006	2 127	2 094	1,118	0,087	0,060	0,085
Total des besoins non satisfaits	0,240	0,011	2 127	2 094	1,187	0,046	0,218	0,262
Demande satisfaite par des méthodes modernes (femmes en union)	0,425	0,029	934	923	1,802	0,068	0,367	0,484
Demande satisfaite par des méthodes modernes (l'ensemble des femmes)	0,447	0,031	1 013	1 014	2,009	0,070	0,385	0,509
Participation dans la prise de décision sur la planification familiale	0,481	0,027	2 127	2 094	2,497	0,056	0,427	0,535
Non exposée à aucun des huit médias	0,547	0,019	2 673	2 635	2,010	0,035	0,508	0,586
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0–9 ans)	32,037	2,712	4 675	4 584	1,001	0,085	26,613	37,462
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0–9 ans)	21,215	2,682	4 671	4 578	1,268	0,126	15,850	26,579
Quotient de mortalité infantile (derniers 0–9 ans)	53,252	3,770	4 678	4 587	1,105	0,071	45,712	60,791
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0–9 ans)	45,226	4,588	4 581	4 479	1,323	0,101	36,051	54,402
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0–9 ans)	96,070	6,023	4 722	4 627	1,217	0,063	84,025	108,115
Taux de mortalité périnatale	43,423	4,704	2 522	2 486	1,141	0,108	34,016	52,830
Taux de mortinatalité	22,658	3,335	2 522	2 486	1,081	0,147	15,988	29,328
Taux de mortalité néonatale précoce	21,247	2,700	2 466	2 429	0,916	0,127	15,848	26,646
A reçu des soins prénatals par un prestataire de santé qualifié	0,670	0,045	967	958	2,969	0,067	0,580	0,760
4 visites prénatales ou plus	0,462	0,026	967	958	1,623	0,056	0,410	0,514
8 visites prénatales ou plus	0,037	0,007	967	958	1,167	0,193	0,023	0,051
A pris des suppléments contenant du fer	0,796	0,027	967	958	2,088	0,034	0,742	0,850
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,505	0,026	967	958	1,588	0,051	0,454	0,556
A accouché dans un établissement de santé (naissances vivantes)	0,687	0,038	1 012	1 002	2,564	0,056	0,611	0,763
A accouché avec l'assistance d'un prestataire de santé qualifié (naissances vivantes)	0,591	0,039	1 012	1 002	2,478	0,066	0,512	0,670
A accouché par césarienne (naissances vivantes)	0,058	0,010	1 012	1 002	1,319	0,171	0,038	0,078
Femmes ayant reçu des soins postnatals dans les 2 premiers jours	0,620	0,034	967	958	2,195	0,055	0,551	0,689

À suivre…

Tableau B.7—*Suite*

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
Nouveau-nés ayant reçu des soins postnatals dans les 2 premiers jours	0,597	0,034	967	958	2,132	0,056	0,530	0,665
Un problème d'accès aux soins de santé	0,558	0,018	2 673	2 635	1,851	0,032	0,522	0,593
A déjà eu un carnet de vaccination	0,781	0,043	459	450	2,201	0,055	0,695	0,868
A reçu le vaccin du BCG	0,698	0,041	459	450	1,849	0,058	0,616	0,779
A reçu [DTC-HepB-Hib] (3 doses)	0,636	0,042	459	450	1,853	0,067	0,551	0,721
A reçu le vaccin contre pneumocoque (3 doses)	0,633	0,043	459	450	1,887	0,068	0,546	0,719
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12–23)	0,593	0,043	459	450	1,862	0,073	0,506	0,680
Complètement vacciné conformément au calendrier national (12–23 mois)	0,163	0,025	459	450	1,439	0,153	0,114	0,213
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 24–35)	0,265	0,031	459	453	1,514	0,118	0,203	0,328
Complètement vacciné conformément au calendrier national (24–35 mois)	0,063	0,014	459	453	1,247	0,225	0,034	0,091
A recherché un traitement pour la diarrhée	0,312	0,040	526	524	1,916	0,128	0,232	0,391
Traité avec des SRO	0,082	0,015	526	524	1,243	0,181	0,052	0,112
Taille-pour-âge (-3ET)	0,060	0,007	2 338	2 412	1,159	0,112	0,047	0,073
Taille-pour-âge (-2ET)	0,227	0,016	2 338	2 412	1,567	0,072	0,194	0,260
Poids-pour-taille (-2ET)	0,062	0,006	2 340	2 413	1,039	0,090	0,051	0,073
Poids-pour-taille (+2ET)	0,011	0,002	2 340	2 413	1,140	0,221	0,006	0,016
Poids-pour-âge (-2ET)	0,154	0,010	2 339	2 412	1,187	0,068	0,133	0,175
Exclusivement allaité	0,374	0,036	271	275	1,232	0,097	0,302	0,447
Diversité alimentaire minimale (enfants 6–23 mois)	0,118	0,017	660	646	1,371	0,146	0,083	0,152
Prévalence de l'anémie (enfants 6–59 mois) (hémoglobine <11,0 g/dl)	0,794	0,018	1 015	1 037	1,316	0,023	0,758	0,831
Indice de masse corporelle (IMC) <18,5	0,094	0,011	868	858	1,104	0,116	0,072	0,116
Indice de masse corporelle (IMC) ≥25,0	0,282	0,019	868	858	1,259	0,068	0,243	0,320
Indice de masse corporelle-pour-âge (-2ET)	0,046	0,016	287	285	1,295	0,347	0,014	0,078
Indice de masse corporelle-pour-âge (+1ET)	0,116	0,023	287	285	1,244	0,202	0,069	0,163
Diversification alimentaire minimum (femmes 15–49)	0,321	0,029	2 673	2 635	3,200	0,090	0,263	0,379
Prévalence de l'anémie (femmes 15–49, OMS)	0,610	0,023	1 336	1 317	1,758	0,039	0,563	0,657
Enfant a dormi sous une MII la nuit précédente	0,651	0,026	2 378	2 452	1,657	0,040	0,598	0,703
Femme enceinte a dormi sous une MII la nuit précédente	0,687	0,035	278	283	1,111	0,051	0,617	0,757
A reçu trois doses ou plus de SP/Fansidar	0,265	0,021	967	958	1,458	0,078	0,223	0,306
Enfant a eu de la fièvre dans les 2 semaines précédentes	0,178	0,014	2 300	2 265	1,722	0,079	0,150	0,206
Enfant a eu un prélèvement de sang au doigt/talon	0,144	0,027	398	403	1,540	0,185	0,091	0,198
Enfant a pris une CTA	0,662	0,069	72	67	1,160	0,104	0,525	0,799
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,775	0,018	2 445	2 421	2,180	0,024	0,738	0,812
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,110	0,032	128	142	1,151	0,290	0,046	0,174
A déjà été testée pour le VIH et a reçu les résultats du dernier test	0,043	0,005	2 673	2 635	1,291	0,117	0,033	0,054
A travaillé au cours des 12 derniers mois	0,673	0,026	2 127	2 094	2,566	0,039	0,621	0,726
A travaillé au cours des 12 derniers mois, mais n'a pas été rémunérée	0,270	0,025	1 394	1 410	2,076	0,092	0,221	0,319
Possession d'un téléphone portable	0,634	0,021	2 673	2 635	2,303	0,034	0,591	0,677
Possède et utilise un compte bancaire ou un téléphone portable pour des transactions financières	0,388	0,027	2 673	2 635	2,839	0,069	0,335	0,442
Participe dans la prise de décision (les trois décisions)	0,086	0,013	2 127	2 094	2,203	0,156	0,059	0,113
D'accord avec, au moins, une des raisons spécifiées justifiant qu'un mari puisse battre sa femme	0,687	0,026	2 673	2 635	2,872	0,038	0,636	0,739
Prend ses propres décisions concernant les relations sexuelles, l'utilisation contraceptive et les soins de santé reproductive	0,035	0,006	2 127	2 094	1,603	0,182	0,022	0,048
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	0,403	0,029	558	616	1,371	0,071	0,346	0,460
A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment	0,145	0,021	558	616	1,389	0,143	0,103	0,186
A subi des violences sexuelles par n'importe quel partenaire non-intime	0,021	0,009	558	616	1,500	0,437	0,003	0,039
A subi des violences physiques/sexuelles exercées par le plus récent mari/partenaire	0,385	0,033	516	553	1,515	0,085	0,320	0,450

À suivre…

Tableau B.7—*Suite*

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
A subi des violences physiques/sexuelles/ émotionnelles par le mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois	0,322	0,028	516	553	1,350	0,086	0,266	0,378
			HOMMES					
Aucune instruction	0,414	0,034	899	920	2,035	0,081	0,347	0,481
Niveau d'instruction secondaire ou plus	0,341	0,038	899	920	2,386	0,111	0,265	0,417
Alphabétisation	0,416	0,030	899	920	1,843	0,073	0,355	0,477
Utilisation de l'internet au cours des 12 derniers mois	0,655	0,027	899	920	1,686	0,041	0,601	0,708
Consommation actuelle de tabac	0,171	0,014	899	920	1,104	0,081	0,143	0,199
Ne veut plus d'enfant	0,029	0,008	473	474	0,985	0,263	0,014	0,044
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,579	0,047	848	869	2,748	0,081	0,486	0,673
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,328	0,043	170	190	1,198	0,132	0,242	0,415
A déjà été testé pour le VIH et a reçu les résultats du dernier test	0,012	0,005	899	920	1,416	0,425	0,002	0,023
Circoncision	0,991	0,005	899	920	1,588	0,005	0,980	1,000
Possession d'un téléphone portable	0,852	0,017	899	920	1,457	0,020	0,817	0,887
Possède et utilise un compte bancaire ou un téléphone portable pour des transactions	0,710	0,032	899	920	2,083	0,044	0,647	0,773
D'accord avec, au moins, une des raisons spécifiées justifiant qu'un mari puisse battre sa femme	0,459	0,034	899	920	2,042	0,074	0,391	0,527

Tableau B.8 Erreurs de sondage : Echantillon Koulikoro, Mali 2023–2024

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
MÉNAGES ET POPULATIONS								
Naissances enregistrées à l'état civil	0,904	0,020	2 470	3 834	2,152	0,022	0,865	0,944
Possession d'au moins une MII	0,888	0,012	1 286	2 053	1,351	0,013	0,864	0,912
Possession d'au moins une MII pour deux personnes	0,469	0,017	1 286	2 053	1,249	0,037	0,434	0,504
Au moins un service élémentaire en eau de boisson	0,738	0,036	13 067	20 164	2,228	0,049	0,665	0,810
Disponibilité d'eau à boire en quantités suffisantes	0,755	0,025	13 067	20 164	1,750	0,034	0,705	0,806
Au moins un service élémentaire d'assainissement	0,626	0,037	13 067	20 164	2,199	0,058	0,553	0,699
Utilisant défécation en plein air	0,036	0,018	13 067	20 164	3,426	0,506	0,000	0,073
Utilisant une installation pour le lavage des mains avec du savon et de l'eau	0,287	0,033	12 976	20 030	2,108	0,115	0,221	0,353
FEMMES								
Aucune instruction	0,530	0,027	2 703	4 018	2,850	0,052	0,475	0,584
Niveau d'instruction secondaire ou plus	0,301	0,025	2 703	4 018	2,829	0,083	0,251	0,351
Alphabétisée	0,337	0,025	2 703	4 018	2,794	0,075	0,286	0,388
Utilisation de l'internet dans les 12 derniers mois	0,428	0,036	2 703	4 018	3,798	0,085	0,356	0,501
Consommation actuelle de tabac	0,003	0,001	2 703	4 018	0,951	0,365	0,001	0,004
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	6,118	0,163	7 529	11 156	1,303	0,027	5,793	6,443
Actuellement enceinte	0,106	0,008	2 703	4 018	1,360	0,076	0,090	0,122
Nombre moyen d'enfants nés vivants des femmes de 40–49 ans	6,502	0,191	403	571	1,313	0,029	6,121	6,883
Intervalle intergénésique médian	33,699	0,628	2 034	2 997	1,619	0,019	32,443	34,954
Ne veut plus d'enfant	0,178	0,009	2 149	3 130	1,128	0,052	0,160	0,197
Nombre idéal d'enfants	6,109	0,090	2 639	3 924	2,136	0,015	5,928	6,289
Taux de fécondité désirée (3 ans)	5,522	0,149	7 529	11 156	1,244	0,027	5,223	5,820
Utilise actuellement une méthode contraceptive	0,246	0,018	2 149	3 130	1,890	0,071	0,211	0,281
Utilise actuellement une méthode moderne	0,235	0,018	2 149	3 130	1,938	0,076	0,199	0,270
Utilise actuellement la pilule	0,024	0,005	2 149	3 130	1,498	0,206	0,014	0,034
Utilise actuellement les injectables	0,058	0,008	2 149	3 130	1,634	0,143	0,041	0,074
Utilise actuellement les implants	0,135	0,013	2 149	3 130	1,746	0,096	0,109	0,160
Utilise actuellement le condom masculin	0,000	0,000	2 149	3 130	1,003	1,008	0,000	0,001
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,011	0,002	2 149	3 130	0,931	0,190	0,007	0,015
Besoins non satisfaits pour espacer	0,191	0,010	2 149	3 130	1,200	0,053	0,171	0,212
Besoins non satisfaits pour limiter	0,056	0,005	2 149	3 130	1,089	0,097	0,045	0,066
Total des besoins non satisfaits	0,247	0,010	2 149	3 130	1,064	0,040	0,227	0,267
Demande satisfaite par des méthodes modernes (femmes en union)	0,476	0,025	1 043	1 543	1,607	0,052	0,427	0,526
Demande satisfaite par des méthodes modernes (l'ensemble des femmes)	0,487	0,025	1 118	1 658	1,639	0,050	0,438	0,536
Participation dans la prise de décision sur la planification familiale	0,554	0,023	2 149	3 130	2,168	0,042	0,508	0,601
Non exposée à aucun des huit médias	0,550	0,029	2 703	4 018	2,993	0,052	0,493	0,608
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0–9 ans)	31,497	3,516	4 653	6 798	1,253	0,112	24,464	38,530
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0–9 ans)	20,301	1,855	4 638	6 773	0,865	0,091	16,591	24,011
Quotient de mortalité infantile (derniers 0–9 ans)	51,798	4,402	4 657	6 803	1,260	0,085	42,995	60,602
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0–9 ans)	30,599	3,664	4 525	6 585	1,269	0,120	23,271	37,927
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0–9 ans)	80,813	6,575	4 682	6 844	1,464	0,081	67,663	93,963
Taux de mortalité périnatale	46,205	4,588	2 593	3 822	1,022	0,099	37,029	55,382
Taux de mortinatalité	24,831	3,738	2 593	3 822	1,097	0,151	17,355	32,308
Taux de mortalité néonatale précoce	21,918	3,127	2 531	3 727	1,013	0,143	15,664	28,172
A reçu des soins prénatals par un prestataire de santé qualifié	0,653	0,045	990	1 466	2,953	0,069	0,563	0,743
4 visites prénatales ou plus	0,623	0,028	990	1 466	1,800	0,045	0,567	0,678
8 visites prénatales ou plus	0,039	0,009	990	1 466	1,450	0,229	0,021	0,057
A pris des suppléments contenant du fer	0,886	0,020	990	1 466	2,010	0,023	0,845	0,926
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,489	0,028	990	1 466	1,767	0,057	0,433	0,546
A accouché dans un établissement de santé (naissances vivantes)	0,922	0,019	1 032	1 527	2,186	0,021	0,883	0,960
A accouché avec l'assistance d'un prestataire de santé qualifié (naissances vivantes)	0,653	0,043	1 032	1 527	2,809	0,065	0,567	0,738
A accouché par césarienne (naissances vivantes)	0,047	0,006	1 032	1 527	0,922	0,136	0,034	0,059
Femmes ayant reçu des soins postnatals dans les 2 premiers jours	0,769	0,020	990	1 466	1,466	0,026	0,730	0,809

À suivre…

Tableau B.8—*Suite*

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
Nouveau-nés ayant reçu des soins postnatals dans les 2 premiers jours	0,787	0,020	990	1 466	1,561	0,026	0,747	0,828
Un problème d'accès aux soins de santé	0,502	0,033	2 703	4 018	3,426	0,066	0,436	0,568
A déjà eu un carnet de vaccination	0,919	0,020	472	702	1,565	0,021	0,880	0,958
A reçu le vaccin du BCG	0,877	0,023	472	702	1,559	0,027	0,831	0,924
A reçu [DTC-HepB-Hib] (3 doses)	0,753	0,030	472	702	1,494	0,039	0,694	0,812
A reçu le vaccin contre pneumocoque (3 doses)	0,744	0,029	472	702	1,461	0,039	0,686	0,803
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12–23)	0,707	0,026	472	702	1,239	0,037	0,655	0,759
Complètement vacciné conformément au calendrier national (12–23 mois)	0,227	0,025	472	702	1,308	0,110	0,177	0,277
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 24–35)	0,334	0,025	473	697	1,134	0,074	0,285	0,384
Complètement vacciné conformément au calendrier national (24–35 mois)	0,083	0,014	473	697	1,114	0,170	0,055	0,111
A recherché un traitement pour la diarrhée	0,390	0,039	272	406	1,316	0,099	0,312	0,467
Traité avec des SRO	0,109	0,019	272	406	1,025	0,176	0,071	0,147
Taille-pour-âge (-3ET)	0,060	0,007	2 414	3 752	1,330	0,114	0,046	0,074
Taille-pour-âge (-2ET)	0,246	0,014	2 414	3 752	1,390	0,057	0,218	0,274
Poids-pour-taille (-2ET)	0,055	0,007	2 427	3 767	1,330	0,127	0,041	0,070
Poids-pour-taille (+2ET)	0,020	0,004	2 427	3 767	1,205	0,179	0,013	0,027
Poids-pour-âge (-2ET)	0,154	0,013	2 428	3 770	1,529	0,086	0,127	0,180
Exclusivement allaité	0,388	0,035	282	418	1,187	0,089	0,318	0,457
Diversité alimentaire minimale (enfants 6–23 mois)	0,182	0,025	663	987	1,639	0,135	0,133	0,231
Prévalence de l'anémie (enfants 6–59 mois) (hémoglobine <11,0 g/dl)	0,756	0,015	1 098	1 718	1,126	0,020	0,726	0,786
Indice de masse corporelle (IMC) <18,5	0,080	0,010	903	1 345	1,056	0,119	0,061	0,099
Indice de masse corporelle (IMC) ≥25,0	0,331	0,024	903	1 345	1,559	0,074	0,282	0,380
Indice de masse corporelle-pour-âge (-2ET)	0,028	0,014	262	401	1,373	0,494	0,000	0,055
Indice de masse corporelle-pour-âge (+1ET)	0,135	0,023	262	401	1,120	0,173	0,089	0,182
Diversification alimentaire minimum (femmes 15–49)	0,295	0,020	2 703	4 018	2,237	0,067	0,255	0,334
Prévalence de l'anémie (femmes 15–49, OMS)	0,561	0,021	1 360	2 016	1,570	0,038	0,518	0,603
Enfant a dormi sous une MII la nuit précédente	0,663	0,017	2 470	3 833	1,175	0,026	0,628	0,698
Femme enceinte a dormi sous une MII la nuit précédente	0,587	0,034	302	445	1,040	0,057	0,520	0,654
A reçu trois doses ou plus de SP/Fansidar	0,298	0,028	990	1 466	1,896	0,093	0,243	0,353
Enfant a eu de la fièvre dans les 2 semaines précédentes	0,112	0,013	2 377	3 504	1,996	0,118	0,086	0,139
Enfant a eu un prélèvement de sang au doigt/talon	0,176	0,025	261	394	1,063	0,142	0,126	0,226
Enfant a pris une CTA	0,363	0,070	73	107	1,255	0,194	0,223	0,504
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,786	0,021	2 300	3 447	2,413	0,026	0,745	0,828
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,080	0,029	118	177	1,141	0,359	0,022	0,137
A déjà été testée pour le VIH et a reçu les résultats du dernier test	0,047	0,006	2 703	4 018	1,444	0,125	0,036	0,059
A travaillé au cours des 12 derniers mois	0,670	0,021	2 149	3 130	2,083	0,032	0,628	0,712
A travaillé au cours des 12 derniers mois, mais n'a pas été rémunérée	0,101	0,019	1 448	2 098	2,341	0,184	0,064	0,138
Possession d'un téléphone portable	0,674	0,024	2 703	4 018	2,673	0,036	0,626	0,723
Possède et utilise un compte bancaire ou un téléphone portable pour des transactions financières	0,463	0,028	2 703	4 018	2,945	0,061	0,406	0,520
Participe dans la prise de décision (les trois décisions)	0,072	0,011	2 149	3 130	1,898	0,148	0,050	0,093
D'accord avec, au moins, une des raisons spécifiées justifiant qu'un mari puisse battre sa femme	0,656	0,023	2 703	4 018	2,553	0,036	0,610	0,703
Prend ses propres décisions concernant les relations sexuelles, l'utilisation contraceptive et les soins de santé reproductive	0,033	0,006	2 149	3 130	1,455	0,171	0,022	0,044
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	0,307	0,026	572	951	1,339	0,084	0,255	0,358
A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment	0,092	0,016	572	951	1,347	0,178	0,059	0,124
A subi des violences sexuelles par n'importe quel partenaire non-intime	0,023	0,007	572	951	1,110	0,305	0,009	0,037
A subi des violences physiques/sexuelles exercées par le plus récent mari/partenaire	0,289	0,028	507	808	1,369	0,096	0,233	0,344
A subi des violences physiques/sexuelles/ émotionnelles par le mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois	0,234	0,028	507	808	1,486	0,120	0,178	0,290

À suivre…

Tableau B.8—*Suite*

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
			HOMMES					
Aucune instruction	0,330	0,028	1 080	1 637	1,947	0,085	0,274	0,386
Niveau d'instruction secondaire ou plus	0,452	0,034	1 080	1 637	2,211	0,074	0,385	0,519
Alphabétisation	0,485	0,033	1 080	1 637	2,170	0,068	0,419	0,552
Utilisation de l'internet au cours des 12 derniers mois	0,566	0,032	1 080	1 637	2,138	0,057	0,502	0,631
Consommation actuelle de tabac	0,141	0,014	1 080	1 637	1,311	0,099	0,113	0,168
Ne veut plus d'enfant	0,055	0,011	584	884	1,140	0,197	0,033	0,076
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,684	0,020	961	1 456	1,340	0,029	0,643	0,724
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,317	0,041	128	205	1,002	0,130	0,235	0,400
A déjà été testé pour le VIH et a reçu les résultats du dernier test	0,023	0,007	1 080	1 637	1,498	0,295	0,010	0,037
Circoncision	0,978	0,007	1 080	1 637	1,561	0,007	0,964	0,992
Possession d'un téléphone portable	0,871	0,014	1 080	1 637	1,378	0,016	0,842	0,899
Possède et utilise un compte bancaire ou un téléphone portable pour des transactions	0,657	0,029	1 080	1 637	2,013	0,044	0,599	0,715
D'accord avec, au moins, une des raisons spécifiées justifiant qu'un mari puisse battre sa femme	0,335	0,032	1 080	1 637	2,198	0,094	0,272	0,398

Tableau B.9 Erreurs de sondage : Echantillon Sikasso, Mali 2023–2024

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
			MÉNAGES ET POPULATIONS					
Naissances enregistrées à l'état civil	0,931	0,012	2 236	3 156	1,605	0,013	0,906	0,956
Possession d'au moins une MII	0,934	0,009	1 162	1 631	1,210	0,009	0,917	0,952
Possession d'au moins une MII pour deux personnes	0,578	0,020	1 160	1 628	1,358	0,034	0,539	0,618
Au moins un service élémentaire en eau de boisson	0,739	0,038	11 563	16 286	2,443	0,052	0,662	0,816
Disponibilité d'eau à boire en quantités suffisantes	0,888	0,014	11 563	16 286	1,277	0,016	0,860	0,917
Au moins un service élémentaire d'assainissement	0,491	0,045	11 563	16 286	2,503	0,091	0,402	0,580
Utilisant défécation en plein air	0,029	0,006	11 563	16 286	1,240	0,200	0,017	0,040
Utilisant une installation pour le lavage des mains avec du savon et de l'eau	0,103	0,019	11 480	16 164	1,899	0,182	0,065	0,140
			FEMMES					
Aucune instruction	0,598	0,023	2 343	3 143	2,260	0,038	0,552	0,643
Niveau d'instruction secondaire ou plus	0,254	0,021	2 343	3 143	2,342	0,083	0,212	0,297
Alphabétisée	0,278	0,022	2 343	3 143	2,343	0,078	0,234	0,321
Utilisation de l'internet dans les 12 derniers mois	0,227	0,022	2 343	3 143	2,571	0,098	0,183	0,272
Consommation actuelle de tabac	0,012	0,005	2 343	3 143	2,182	0,402	0,002	0,022
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	6,486	0,179	6 582	8 822	1,316	0,028	6,127	6,844
Actuellement enceinte	0,124	0,007	2 343	3 143	1,064	0,058	0,110	0,139
Nombre moyen d'enfants nés vivants des femmes de 40–49 ans	7,091	0,164	402	536	1,218	0,023	6,762	7,420
Intervalle intergénésique médian	32,945	0,406	1 906	2 566	1,211	0,012	32,134	33,756
Ne veut plus d'enfant	0,203	0,013	1 894	2 558	1,455	0,066	0,176	0,230
Nombre idéal d'enfants	6,752	0,142	2 244	3 016	2,197	0,021	6,468	7,036
Taux de fécondité désirée (3 ans)	5,636	0,158	6 582	8 822	1,287	0,028	5,320	5,952
Utilise actuellement une méthode contraceptive	0,220	0,014	1 894	2 558	1,436	0,062	0,193	0,248
Utilise actuellement une méthode moderne	0,204	0,013	1 894	2 558	1,380	0,063	0,179	0,230
Utilise actuellement la pilule	0,016	0,003	1 894	2 558	1,017	0,185	0,010	0,021
Utilise actuellement les injectables	0,054	0,006	1 894	2 558	1,084	0,104	0,043	0,065
Utilise actuellement les implants	0,114	0,013	1 894	2 558	1,804	0,116	0,087	0,140
Utilise actuellement le condom masculin	0,000	0,000	1 894	2 558	0,886	1,005	0,000	0,001
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,016	0,004	1 894	2 558	1,393	0,250	0,008	0,024
Besoins non satisfaits pour espacer	0,174	0,009	1 894	2 558	1,060	0,053	0,156	0,193
Besoins non satisfaits pour limiter	0,062	0,006	1 894	2 558	1,171	0,105	0,049	0,075
Total des besoins non satisfaits	0,236	0,012	1 894	2 558	1,194	0,049	0,213	0,259
Demande satisfaite par des méthodes modernes (femmes en union)	0,448	0,022	872	1 168	1,275	0,048	0,405	0,491
Demande satisfaite par des méthodes modernes (l'ensemble des femmes)	0,447	0,022	928	1 241	1,358	0,050	0,403	0,492
Participation dans la prise de décision sur la planification familiale	0,631	0,032	1 894	2 558	2,867	0,051	0,567	0,695
Non exposée à aucun des huit médias	0,507	0,034	2 343	3 143	3,296	0,067	0,439	0,576
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0–9 ans)	39,239	4,223	4 397	5 902	1,221	0,108	30,793	47,685
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0–9 ans)	24,431	3,349	4 401	5 905	1,262	0,137	17,734	31,128
Quotient de mortalité infantile (derniers 0–9 ans)	63,670	6,033	4 405	5 911	1,374	0,095	51,604	75,736
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0–9 ans)	50,245	4,159	4 295	5 758	1,021	0,083	41,928	58,562
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0–9 ans)	110,716	7,310	4 458	5 980	1,357	0,066	96,096	125,336
Taux de mortalité périnatale	54,564	4,991	2 370	3 192	1,003	0,091	44,581	64,546
Taux de mortinatalité	26,505	3,196	2 370	3 192	0,916	0,121	20,114	32,896
Taux de mortalité néonatale précoce	28,822	4,541	2 306	3 107	1,212	0,158	19,741	37,904
A reçu des soins prénatals par un prestataire de santé qualifié	0,535	0,039	891	1 202	2,298	0,072	0,458	0,612
4 visites prénatales ou plus	0,401	0,029	891	1 202	1,747	0,072	0,343	0,458
8 visites prénatales ou plus	0,018	0,005	891	1 202	1,066	0,268	0,008	0,027
A pris des suppléments contenant du fer	0,838	0,027	891	1 202	2,157	0,032	0,784	0,891
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,425	0,029	891	1 202	1,755	0,069	0,367	0,483
A accouché dans un établissement de santé (naissances vivantes)	0,859	0,026	935	1 262	2,243	0,030	0,807	0,911
A accouché avec l'assistance d'un prestataire de santé qualifié (naissances vivantes)	0,575	0,040	935	1 262	2,350	0,069	0,496	0,655
A accouché par césarienne (naissances vivantes)	0,047	0,008	935	1 262	1,150	0,175	0,030	0,063
Femmes ayant reçu des soins postnatals dans les 2 premiers jours	0,652	0,028	891	1 202	1,743	0,043	0,597	0,708

À suivre…

Tableau B.9—*Suite*

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
Nouveau-nés ayant reçu des soins postnatals dans les 2 premiers jours	0,640	0,033	891	1 202	2,024	0,051	0,575	0,705
Un problème d'accès aux soins de santé	0,460	0,028	2 343	3 143	2,758	0,062	0,403	0,517
A déjà eu un carnet de vaccination	0,908	0,028	388	528	1,823	0,030	0,852	0,963
A reçu le vaccin du BCG	0,881	0,030	388	528	1,757	0,034	0,822	0,940
A reçu [DTC-HepB-Hib] (3 doses)	0,749	0,039	388	528	1,750	0,053	0,671	0,828
A reçu le vaccin contre pneumocoque (3 doses)	0,683	0,040	388	528	1,677	0,059	0,602	0,763
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12–23)	0,694	0,039	388	528	1,611	0,056	0,616	0,771
Complètement vacciné conformément au calendrier national (12–23 mois)	0,225	0,031	388	528	1,443	0,138	0,163	0,287
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 24–35)	0,407	0,032	467	623	1,398	0,079	0,342	0,472
Complètement vacciné conformément au calendrier national (24–35 mois)	0,108	0,024	467	623	1,614	0,219	0,061	0,156
A recherché un traitement pour la diarrhée	0,352	0,032	399	537	1,314	0,092	0,287	0,417
Traité avec des SRO	0,075	0,017	399	537	1,270	0,231	0,040	0,109
Taille-pour-âge (-3ET)	0,102	0,010	2 190	3 088	1,296	0,094	0,083	0,121
Taille-pour-âge (-2ET)	0,307	0,019	2 190	3 088	1,639	0,062	0,269	0,346
Poids-pour-taille (-2ET)	0,045	0,005	2 205	3 107	1,130	0,115	0,034	0,055
Poids-pour-taille (+2ET)	0,015	0,003	2 205	3 107	0,979	0,164	0,010	0,020
Poids-pour-âge (-2ET)	0,158	0,011	2 191	3 089	1,339	0,072	0,136	0,181
Exclusivement allaité	0,482	0,034	246	329	1,072	0,071	0,413	0,550
Diversité alimentaire minimale (enfants 6–23 mois)	0,165	0,021	601	817	1,405	0,129	0,122	0,207
Prévalence de l'anémie (enfants 6–59 mois) (hémoglobine <11,0 g/dl)	0,737	0,016	1 011	1 430	1,051	0,022	0,705	0,769
Indice de masse corporelle (IMC) <18,5	0,058	0,010	765	1 025	1,160	0,170	0,038	0,077
Indice de masse corporelle (IMC) ≥25,0	0,285	0,020	765	1 025	1,250	0,072	0,244	0,325
Indice de masse corporelle-pour-âge (-2ET)	0,025	0,014	206	272	1,263	0,554	0,000	0,053
Indice de masse corporelle-pour-âge (+1ET)	0,101	0,022	206	272	1,048	0,219	0,057	0,145
Diversification alimentaire minimum (femmes 15–49)	0,297	0,025	2 343	3 143	2,662	0,085	0,247	0,347
Prévalence de l'anémie (femmes 15–49, OMS)	0,525	0,021	1 174	1 569	1,457	0,040	0,482	0,567
Enfant a dormi sous une MII la nuit précédente	0,668	0,017	2 245	3 160	1,182	0,025	0,635	0,702
Femme enceinte a dormi sous une MII la nuit précédente	0,762	0,024	286	409	0,941	0,032	0,713	0,810
A reçu trois doses ou plus de SP/Fansidar	0,251	0,023	891	1 202	1,556	0,090	0,206	0,296
Enfant a eu de la fièvre dans les 2 semaines précédentes	0,187	0,015	2 158	2 906	1,684	0,082	0,156	0,218
Enfant a eu un prélèvement de sang au doigt/talon	0,149	0,023	402	543	1,239	0,155	0,103	0,195
Enfant a pris une CTA	0,460	0,078	77	105	1,307	0,170	0,304	0,616
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,756	0,024	2 043	2 741	2,532	0,032	0,708	0,804
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,043	0,019	94	119	0,911	0,444	0,005	0,082
A déjà été testée pour le VIH et a reçu les résultats du dernier test	0,040	0,006	2 343	3 143	1,546	0,157	0,027	0,052
A travaillé au cours des 12 derniers mois	0,715	0,019	1 894	2 558	1,844	0,027	0,676	0,753
A travaillé au cours des 12 derniers mois, mais n'a pas été rémunérée	0,216	0,033	1 353	1 828	2,925	0,152	0,150	0,281
Possession d'un téléphone portable	0,636	0,019	2 343	3 143	1,886	0,029	0,599	0,674
Possède et utilise un compte bancaire ou un téléphone portable pour des transactions financières	0,298	0,029	2 343	3 143	3,108	0,099	0,239	0,357
Participe dans la prise de décision (les trois décisions)	0,080	0,015	1 894	2 558	2,484	0,194	0,049	0,111
D'accord avec, au moins, une des raisons spécifiées justifiant qu'un mari puisse battre sa femme	0,830	0,014	2 343	3 143	1,782	0,017	0,802	0,857
Prend ses propres décisions concernant les relations sexuelles, l'utilisation contraceptive et les soins de santé reproductive	0,015	0,004	1 894	2 558	1,391	0,263	0,007	0,022
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	0,345	0,032	509	774	1,521	0,093	0,281	0,409
A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment	0,136	0,019	509	774	1,280	0,143	0,097	0,175
A subi des violences sexuelles par n'importe quel partenaire non-intime	0,018	0,007	509	774	1,223	0,402	0,003	0,032
A subi des violences physiques/sexuelles exercées par le plus récent mari/partenaire	0,362	0,036	466	689	1,635	0,101	0,289	0,435
A subi des violences physiques/sexuelles/ émotionnelles par le mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois	0,370	0,030	466	689	1,357	0,082	0,310	0,431

À suivre…

Tableau B.9—*Suite*

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
			HOMMES					
Aucune instruction	0,443	0,031	889	1 215	1,842	0,069	0,382	0,505
Niveau d'instruction secondaire ou plus	0,347	0,030	889	1 215	1,904	0,088	0,286	0,408
Alphabétisation	0,447	0,024	889	1 215	1,435	0,054	0,399	0,495
Utilisation de l'internet au cours des 12 derniers mois	0,487	0,028	889	1 215	1,684	0,058	0,431	0,544
Consommation actuelle de tabac	0,090	0,014	889	1 215	1,485	0,158	0,062	0,119
Ne veut plus d'enfant	0,031	0,007	503	689	0,876	0,219	0,017	0,044
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,600	0,035	831	1 131	2,034	0,058	0,531	0,670
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,277	0,051	92	118	1,088	0,185	0,175	0,379
A déjà été testé pour le VIH et a reçu les résultats du dernier test	0,015	0,005	889	1 215	1,246	0,336	0,005	0,026
Circoncision	0,988	0,004	889	1 215	1,155	0,004	0,979	0,996
Possession d'un téléphone portable	0,864	0,014	889	1 215	1,200	0,016	0,836	0,891
Possède et utilise un compte bancaire ou un téléphone portable pour des transactions	0,547	0,031	889	1 215	1,828	0,056	0,486	0,609
D'accord avec, au moins, une des raisons spécifiées justifiant qu'un mari puisse battre sa femme	0,407	0,043	889	1 215	2,590	0,105	0,321	0,493

Tableau B.10 Erreurs de sondage : Echantillon Ségou, Mali 2023–2024

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
MÉNAGES ET POPULATIONS								
Naissances enregistrées à l'état civil	0,880	0,019	2 048	2 587	1,849	0,021	0,842	0,917
Possession d'au moins une MII	0,971	0,005	1 294	1 632	1,099	0,005	0,961	0,981
Possession d'au moins une MII pour deux personnes	0,650	0,016	1 293	1 631	1,231	0,025	0,617	0,683
Au moins un service élémentaire en eau de boisson	0,753	0,031	11 214	13 691	2,127	0,041	0,690	0,815
Disponibilité d'eau à boire en quantités suffisantes	0,910	0,014	11 214	13 691	1,455	0,015	0,883	0,938
Au moins un service élémentaire d'assainissement	0,583	0,029	11 214	13 691	1,771	0,049	0,525	0,641
Utilisant défécation en plein air	0,025	0,009	11 214	13 691	1,962	0,340	0,008	0,042
Utilisant une installation pour le lavage des mains avec du savon et de l'eau	0,113	0,019	11 068	13 535	1,765	0,167	0,075	0,151
FEMMES								
Aucune instruction	0,590	0,032	2 204	2 574	3,052	0,054	0,526	0,654
Niveau d'instruction secondaire ou plus	0,246	0,029	2 204	2 574	3,104	0,116	0,189	0,303
Alphabétisée	0,275	0,028	2 204	2 574	2,890	0,100	0,220	0,330
Utilisation de l'internet dans les 12 derniers mois	0,250	0,030	2 204	2 574	3,281	0,121	0,190	0,311
Consommation actuelle de tabac	0,012	0,003	2 204	2 574	1,300	0,254	0,006	0,018
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	6,357	0,261	6 228	7 323	1,970	0,041	5,835	6,879
Actuellement enceinte	0,117	0,010	2 204	2 574	1,533	0,090	0,096	0,138
Nombre moyen d'enfants nés vivants des femmes de 40–49 ans	7,206	0,196	414	479	1,490	0,027	6,815	7,597
Intervalle intergénésique médian	32,736	0,574	1 656	2 027	2,063	0,018	31,587	33,884
Ne veut plus d'enfant	0,231	0,015	1 754	2 109	1,470	0,064	0,201	0,260
Nombre idéal d'enfants	6,358	0,114	2 101	2 445	2,068	0,018	6,131	6,586
Taux de fécondité désirée (3 ans)	5,587	0,250	6 228	7 323	1,872	0,045	5,087	6,087
Utilise actuellement une méthode contraceptive	0,235	0,018	1 754	2 109	1,802	0,078	0,198	0,271
Utilise actuellement une méthode moderne	0,226	0,018	1 754	2 109	1,836	0,081	0,189	0,262
Utilise actuellement la pilule	0,032	0,005	1 754	2 109	1,250	0,164	0,021	0,042
Utilise actuellement les injectables	0,062	0,010	1 754	2 109	1,769	0,164	0,042	0,083
Utilise actuellement les implants	0,106	0,011	1 754	2 109	1,505	0,104	0,084	0,129
Utilise actuellement le condom masculin	0,000	0,000	1 754	2 109	na	na	0,000	0,000
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,009	0,002	1 754	2 109	1,037	0,255	0,005	0,014
Besoins non satisfaits pour espacer	0,224	0,014	1 754	2 109	1,359	0,060	0,197	0,251
Besoins non satisfaits pour limiter	0,073	0,006	1 754	2 109	0,894	0,076	0,062	0,084
Total des besoins non satisfaits	0,296	0,013	1 754	2 109	1,192	0,044	0,270	0,322
Demande satisfaite par des méthodes modernes (femmes en union)	0,425	0,027	922	1 120	1,636	0,062	0,372	0,478
Demande satisfaite par des méthodes modernes (l'ensemble des femmes)	0,435	0,024	988	1 197	1,559	0,056	0,386	0,483
Participation dans la prise de décision sur la planification familiale	0,637	0,024	1 754	2 109	2,114	0,038	0,588	0,685
Non exposée à aucun des huit médias	0,293	0,019	2 204	2 574	1,976	0,065	0,255	0,332
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0–9 ans)	36,086	3,404	3 902	4 754	1,059	0,094	29,277	42,894
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0–9 ans)	27,867	3,145	3 907	4 755	1,198	0,113	21,576	34,158
Quotient de mortalité infantile (derniers 0–9 ans)	63,953	4,367	3 908	4 766	1,043	0,068	55,219	72,687
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0–9 ans)	65,629	11,558	3 847	4 689	2,297	0,176	42,514	88,745
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0–9 ans)	125,385	12,496	3 952	4 834	1,903	0,100	100,392	150,378
Taux de mortalité périnatale	53,208	5,896	2 114	2 599	1,206	0,111	41,415	65,000
Taux de mortinatalité	32,214	4,307	2 114	2 599	1,133	0,134	23,600	40,827
Taux de mortalité néonatale précoce	21,693	3,933	2 050	2 516	1,190	0,181	13,828	29,558
A reçu des soins prénatals par un prestataire de santé qualifié	0,695	0,058	782	963	3,466	0,083	0,580	0,810
4 visites prénatales ou plus	0,424	0,037	782	963	2,089	0,087	0,349	0,498
8 visites prénatales ou plus	0,019	0,005	782	963	1,072	0,273	0,009	0,030
A pris des suppléments contenant du fer	0,815	0,023	782	963	1,664	0,028	0,768	0,861
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,453	0,031	782	963	1,751	0,069	0,391	0,515
A accouché dans un établissement de santé (naissances vivantes)	0,731	0,040	812	1 002	2,504	0,054	0,651	0,810
A accouché avec l'assistance d'un prestataire de santé qualifié (naissances vivantes)	0,624	0,047	812	1 002	2,700	0,075	0,531	0,718
A accouché par césarienne (naissances vivantes)	0,035	0,007	812	1 002	1,101	0,204	0,021	0,049
Femmes ayant reçu des soins postnatals dans les 2 premiers jours	0,605	0,042	782	963	2,374	0,069	0,521	0,688

À suivre…

Tableau B.10—*Suite*

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
Nouveau-nés ayant reçu des soins postnatals dans les 2 premiers jours	0,635	0,025	782	963	1,426	0,039	0,586	0,685
Un problème d'accès aux soins de santé	0,502	0,023	2 204	2 574	2,196	0,047	0,455	0,549
A déjà eu un carnet de vaccination	0,905	0,031	362	441	2,025	0,034	0,842	0,967
A reçu le vaccin du BCG	0,854	0,039	362	441	2,130	0,046	0,776	0,933
A reçu [DTC-HepB-Hib] (3 doses)	0,756	0,042	362	441	1,885	0,056	0,671	0,841
A reçu le vaccin contre pneumocoque (3 doses)	0,725	0,047	362	441	1,999	0,064	0,632	0,818
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12–23)	0,751	0,040	362	441	1,747	0,053	0,672	0,831
Complètement vacciné conformément au calendrier national (12–23 mois)	0,197	0,028	362	441	1,334	0,142	0,141	0,253
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 24–35)	0,418	0,047	405	504	1,935	0,114	0,323	0,513
Complètement vacciné conformément au calendrier national (24–35 mois)	0,100	0,024	405	504	1,659	0,241	0,052	0,148
A recherché un traitement pour la diarrhée	0,383	0,032	327	401	1,184	0,083	0,319	0,446
Traité avec des SRO	0,085	0,021	327	401	1,306	0,244	0,044	0,126
Taille-pour-âge (-3ET)	0,043	0,009	2 019	2 543	1,652	0,202	0,026	0,061
Taille-pour-âge (-2ET)	0,208	0,021	2 019	2 543	1,938	0,101	0,166	0,249
Poids-pour-taille (-2ET)	0,044	0,006	2 027	2 553	1,209	0,127	0,033	0,055
Poids-pour-taille (+2ET)	0,011	0,002	2 027	2 553	0,941	0,193	0,007	0,016
Poids-pour-âge (-2ET)	0,124	0,012	2 020	2 544	1,406	0,098	0,099	0,148
Exclusivement allaité	0,519	0,035	215	276	1,024	0,067	0,449	0,589
Diversité alimentaire minimale (enfants 6–23 mois)	0,241	0,035	536	647	1,895	0,146	0,171	0,311
Prévalence de l'anémie (enfants 6–59 mois) (hémoglobine <11,0 g/dl)	0,748	0,025	933	1 150	1,690	0,034	0,698	0,798
Indice de masse corporelle (IMC) <18,5	0,059	0,008	757	879	0,981	0,142	0,042	0,076
Indice de masse corporelle (IMC) ≥25,0	0,322	0,029	757	879	1,711	0,091	0,264	0,380
Indice de masse corporelle-pour-âge (-2ET)	0,025	0,012	206	216	1,053	0,484	0,001	0,049
Indice de masse corporelle-pour-âge (+1ET)	0,108	0,024	206	216	1,070	0,226	0,059	0,157
Diversification alimentaire minimum (femmes 15–49)	0,377	0,027	2 204	2 574	2,599	0,071	0,323	0,430
Prévalence de l'anémie (femmes 15–49, OMS)	0,518	0,025	1 124	1 297	1,684	0,049	0,468	0,568
Enfant a dormi sous une MII la nuit précédente	0,759	0,017	2 064	2 602	1,255	0,023	0,724	0,794
Femme enceinte a dormi sous une MII la nuit précédente	0,791	0,031	254	313	1,168	0,039	0,728	0,853
A reçu trois doses ou plus de SP/Fansidar	0,313	0,022	782	963	1,351	0,072	0,268	0,357
Enfant a eu de la fièvre dans les 2 semaines précédentes	0,104	0,013	1 912	2 330	1,733	0,121	0,079	0,129
Enfant a eu un prélèvement de sang au doigt/talon	0,243	0,040	210	241	1,283	0,166	0,162	0,323
Enfant a pris une CTA	0,564	0,064	72	84	1,084	0,113	0,437	0,691
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,737	0,034	2 083	2 436	3,520	0,046	0,669	0,805
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,074	0,028	116	121	1,152	0,382	0,017	0,130
A déjà été testée pour le VIH et a reçu les résultats du dernier test	0,037	0,006	2 204	2 574	1,457	0,159	0,025	0,048
A travaillé au cours des 12 derniers mois	0,665	0,035	1 754	2 109	3,093	0,053	0,595	0,735
A travaillé au cours des 12 derniers mois, mais n'a pas été rémunérée	0,177	0,037	1 107	1 402	3,185	0,207	0,103	0,250
Possession d'un téléphone portable	0,574	0,023	2 204	2 574	2,189	0,040	0,528	0,620
Possède et utilise un compte bancaire ou un téléphone portable pour des transactions financières	0,345	0,021	2 204	2 574	2,098	0,062	0,302	0,387
Participe dans la prise de décision (les trois décisions)	0,125	0,016	1 754	2 109	1,970	0,124	0,094	0,157
D'accord avec, au moins, une des raisons spécifiées justifiant qu'un mari puisse battre sa femme	0,767	0,020	2 204	2 574	2,254	0,027	0,726	0,807
Prend ses propres décisions concernant les relations sexuelles, l'utilisation contraceptive et les soins de santé reproductive	0,033	0,007	1 754	2 109	1,608	0,207	0,020	0,047
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	0,337	0,031	515	613	1,490	0,092	0,275	0,400
A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment	0,077	0,014	515	613	1,181	0,180	0,049	0,105
A subi des violences sexuelles par n'importe quel partenaire non-intime	0,030	0,009	515	613	1,146	0,288	0,013	0,047
A subi des violences physiques/sexuelles exercées par le plus récent mari/partenaire	0,264	0,029	472	551	1,442	0,111	0,205	0,322
A subi des violences physiques/sexuelles/ émotionnelles par le mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois	0,275	0,030	472	551	1,469	0,110	0,214	0,336

À suivre…

Tableau B.10—*Suite*

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
			HOMMES					
Aucune instruction	0,415	0,039	832	939	2,300	0,095	0,336	0,494
Niveau d'instruction secondaire ou plus	0,365	0,031	832	939	1,868	0,086	0,302	0,427
Alphabétisation	0,439	0,032	832	939	1,865	0,073	0,375	0,504
Utilisation de l'internet au cours des 12 derniers mois	0,606	0,027	832	939	1,589	0,045	0,552	0,660
Consommation actuelle de tabac	0,108	0,013	832	939	1,189	0,118	0,083	0,134
Ne veut plus d'enfant	0,046	0,012	418	493	1,158	0,260	0,022	0,069
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,743	0,023	805	906	1,477	0,031	0,698	0,789
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,314	0,052	141	144	1,313	0,164	0,211	0,417
A déjà été testé pour le VIH et a reçu les résultats du dernier test	0,018	0,006	832	939	1,342	0,343	0,006	0,031
Circoncision	0,963	0,016	832	939	2,432	0,017	0,931	0,995
Possession d'un téléphone portable	0,844	0,015	832	939	1,211	0,018	0,813	0,874
Possède et utilise un compte bancaire ou un téléphone portable pour des transactions	0,692	0,026	832	939	1,623	0,038	0,639	0,744
D'accord avec, au moins, une des raisons spécifiées justifiant qu'un mari puisse battre sa femme	0,488	0,027	832	939	1,541	0,055	0,435	0,542

Tableau B.11 Erreurs de sondage : Echantillon Mopti, Mali 2023–2024

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
			MÉNAGES ET POPULATIONS					
Naissances enregistrées à l'état civil	0,841	0,024	1 688	1 518	1,777	0,028	0,793	0,888
Possession d'au moins une MII	0,936	0,012	976	895	1,577	0,013	0,912	0,961
Possession d'au moins une MII pour deux personnes	0,514	0,022	976	895	1,349	0,042	0,471	0,557
Au moins un service élémentaire en eau de boisson	0,687	0,045	9 013	8 044	2,287	0,065	0,598	0,777
Disponibilité d'eau à boire en quantités suffisantes	0,718	0,046	9 013	8 044	2,502	0,065	0,625	0,810
Au moins un service élémentaire d'assainissement	0,385	0,037	9 013	8 044	1,789	0,097	0,311	0,460
Utilisant défécation en plein air	0,216	0,043	9 013	8 044	2,675	0,201	0,129	0,303
Utilisant une installation pour le lavage des mains avec du savon et de l'eau	0,187	0,021	8 975	8 014	1,322	0,111	0,145	0,228
			FEMMES					
Aucune instruction	0,640	0,028	1 798	1 530	2,483	0,044	0,584	0,697
Niveau d'instruction secondaire ou plus	0,222	0,024	1 798	1 530	2,484	0,110	0,173	0,271
Alphabétisée	0,243	0,026	1 798	1 530	2,539	0,106	0,192	0,294
Utilisation de l'internet dans les 12 derniers mois	0,294	0,029	1 798	1 530	2,727	0,100	0,235	0,353
Consommation actuelle de tabac	0,005	0,002	1 798	1 530	0,942	0,301	0,002	0,009
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	6,511	0,266	5 039	4 302	1,451	0,041	5,979	7,043
Actuellement enceinte	0,108	0,006	1 798	1 530	0,876	0,059	0,095	0,120
Nombre moyen d'enfants nés vivants des femmes de 40–49 ans	7,099	0,269	313	282	1,634	0,038	6,561	7,638
Intervalle intergénésique médian	32,111	0,614	1 507	1 314	1,458	0,019	30,882	33,340
Ne veut plus d'enfant	0,182	0,014	1 413	1 230	1,403	0,079	0,154	0,211
Nombre idéal d'enfants	7,857	0,112	1 789	1 524	1,664	0,014	7,634	8,080
Taux de fécondité désirée (3 ans)	6,154	0,251	5 039	4 302	1,445	0,041	5,653	6,656
Utilise actuellement une méthode contraceptive	0,125	0,016	1 413	1 230	1,779	0,126	0,093	0,156
Utilise actuellement une méthode moderne	0,121	0,015	1 413	1 230	1,770	0,127	0,091	0,152
Utilise actuellement la pilule	0,019	0,004	1 413	1 230	1,091	0,207	0,011	0,027
Utilise actuellement les injectables	0,034	0,007	1 413	1 230	1,378	0,194	0,021	0,048
Utilise actuellement les implants	0,059	0,008	1 413	1 230	1,344	0,143	0,042	0,076
Utilise actuellement le condom masculin	0,000	0,000	1 413	1 230	na	na	0,000	0,000
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,003	0,002	1 413	1 230	1,030	0,486	0,000	0,006
Besoins non satisfaits pour espacer	0,213	0,013	1 413	1 230	1,169	0,060	0,188	0,239
Besoins non satisfaits pour limiter	0,065	0,009	1 413	1 230	1,324	0,134	0,047	0,082
Total des besoins non satisfaits	0,278	0,018	1 413	1 230	1,479	0,063	0,242	0,313
Demande satisfaite par des méthodes modernes (femmes en union)	0,302	0,034	582	495	1,750	0,112	0,234	0,369
Demande satisfaite par des méthodes modernes (l'ensemble des femmes)	0,318	0,033	623	523	1,781	0,105	0,251	0,385
Participation dans la prise de décision sur la planification familiale	0,561	0,023	1 413	1 230	1,719	0,041	0,515	0,606
Non exposée à aucun des huit médias	0,701	0,030	1 798	1 530	2,752	0,043	0,641	0,760
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0–9 ans)	40,075	4,825	3 503	3 059	1,327	0,120	30,424	49,725
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0–9 ans)	27,313	3,171	3 511	3 066	1,135	0,116	20,971	33,656
Quotient de mortalité infantile (derniers 0–9 ans)	67,388	5,192	3 507	3 062	1,138	0,077	57,004	77,772
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0–9 ans)	60,319	5,247	3 522	3 082	1,145	0,087	49,825	70,814
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0–9 ans)	123,643	7,110	3 553	3 107	1,080	0,058	109,422	137,863
Taux de mortalité périnatale	47,695	5,605	1 802	1 570	1,067	0,118	36,485	58,906
Taux de mortinatalité	16,949	3,082	1 802	1 570	0,975	0,182	10,785	23,112
Taux de mortalité néonatale précoce	31,277	5,019	1 769	1 544	1,152	0,160	21,239	41,315
A reçu des soins prénatals par un prestataire de santé qualifié	0,829	0,025	667	580	1,685	0,030	0,780	0,878
4 visites prénatales ou plus	0,442	0,030	667	580	1,555	0,068	0,382	0,502
8 visites prénatales ou plus	0,037	0,011	667	580	1,542	0,305	0,014	0,060
A pris des suppléments contenant du fer	0,879	0,019	667	580	1,495	0,022	0,841	0,917
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,486	0,036	667	580	1,874	0,075	0,413	0,559
A accouché dans un établissement de santé (naissances vivantes)	0,630	0,051	699	608	2,734	0,082	0,527	0,733
A accouché avec l'assistance d'un prestataire de santé qualifié (naissances vivantes)	0,623	0,053	699	608	2,826	0,086	0,516	0,730
A accouché par césarienne (naissances vivantes)	0,030	0,007	699	608	1,032	0,224	0,016	0,043
Femmes ayant reçu des soins postnatals dans les 2 premiers jours	0,654	0,034	667	580	1,862	0,053	0,585	0,723

À suivre…

Tableau B.11—*Suite*

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
Nouveau-nés ayant reçu des soins postnatals dans les 2 premiers jours	0,740	0,029	667	580	1,713	0,039	0,682	0,798
Un problème d'accès aux soins de santé	0,531	0,032	1 798	1 530	2,734	0,061	0,466	0,595
A déjà eu un carnet de vaccination	0,827	0,028	340	295	1,354	0,034	0,772	0,883
A reçu le vaccin du BCG	0,792	0,033	340	295	1,453	0,041	0,727	0,857
A reçu [DTC-HepB-Hib] (3 doses)	0,699	0,037	340	295	1,483	0,053	0,625	0,773
A reçu le vaccin contre pneumocoque (3 doses)	0,694	0,037	340	295	1,466	0,053	0,620	0,768
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12–23)	0,691	0,041	340	295	1,603	0,059	0,609	0,772
Complètement vacciné conformément au calendrier national (12–23 mois)	0,075	0,016	340	295	1,098	0,217	0,042	0,107
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 24–35)	0,394	0,038	301	267	1,319	0,096	0,319	0,469
Complètement vacciné conformément au calendrier national (24–35 mois)	0,074	0,018	301	267	1,167	0,235	0,039	0,110
A recherché un traitement pour la diarrhée	0,426	0,043	407	346	1,609	0,100	0,341	0,511
Traité avec des SRO	0,077	0,020	407	346	1,414	0,265	0,036	0,118
Taille-pour-âge (-3ET)	0,101	0,012	1 647	1 486	1,439	0,115	0,078	0,125
Taille-pour-âge (-2ET)	0,337	0,017	1 647	1 486	1,287	0,051	0,303	0,372
Poids-pour-taille (-2ET)	0,045	0,006	1 656	1 495	1,065	0,123	0,034	0,057
Poids-pour-taille (+2ET)	0,010	0,002	1 656	1 495	0,927	0,222	0,006	0,015
Poids-pour-âge (-2ET)	0,178	0,016	1 649	1 488	1,563	0,092	0,145	0,210
Exclusivement allaité	0,474	0,050	162	143	1,270	0,106	0,374	0,575
Diversité alimentaire minimale (enfants 6–23 mois)	0,204	0,031	469	405	1,686	0,154	0,141	0,267
Prévalence de l'anémie (enfants 6–59 mois) (hémoglobine <11,0 g/dl)	0,705	0,025	719	654	1,310	0,036	0,655	0,756
Indice de masse corporelle (IMC) <18,5	0,047	0,009	596	509	1,025	0,190	0,029	0,064
Indice de masse corporelle (IMC) ≥25,0	0,322	0,034	596	509	1,785	0,106	0,254	0,390
Indice de masse corporelle-pour-âge (-2ET)	0,024	0,012	160	130	0,936	0,483	0,001	0,047
Indice de masse corporelle-pour-âge (+1ET)	0,154	0,034	160	130	1,173	0,222	0,086	0,223
Diversification alimentaire minimum (femmes 15–49)	0,357	0,035	1 798	1 530	3,087	0,098	0,287	0,427
Prévalence de l'anémie (femmes 15–49, OMS)	0,474	0,020	865	734	1,166	0,042	0,435	0,514
Enfant a dormi sous une MII la nuit précédente	0,770	0,023	1 699	1 533	1,357	0,030	0,724	0,816
Femme enceinte a dormi sous une MII la nuit précédente	0,811	0,032	188	170	1,090	0,039	0,748	0,874
A reçu trois doses ou plus de SP/Fansidar	0,285	0,019	667	580	1,069	0,066	0,247	0,322
Enfant a eu de la fièvre dans les 2 semaines précédentes	0,150	0,017	1 615	1 407	1,725	0,115	0,115	0,185
Enfant a eu un prélèvement de sang au doigt/talon	0,256	0,039	244	211	1,226	0,151	0,178	0,333
Enfant a pris une CTA	0,253	0,058	61	50	0,968	0,229	0,137	0,369
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,797	0,019	1 723	1 465	1,941	0,024	0,760	0,835
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,060	0,032	55	40	0,994	0,533	0,000	0,125
A déjà été testée pour le VIH et a reçu les résultats du dernier test	0,034	0,005	1 798	1 530	1,239	0,155	0,024	0,045
A travaillé au cours des 12 derniers mois	0,625	0,044	1 413	1 230	3,396	0,070	0,537	0,712
A travaillé au cours des 12 derniers mois, mais n'a pas été rémunérée	0,122	0,023	879	768	2,096	0,190	0,076	0,169
Possession d'un téléphone portable	0,640	0,022	1 798	1 530	1,925	0,034	0,596	0,683
Possède et utilise un compte bancaire ou un téléphone portable pour des transactions financières	0,296	0,028	1 798	1 530	2,625	0,096	0,239	0,353
Participe dans la prise de décision (les trois décisions)	0,140	0,016	1 413	1 230	1,778	0,117	0,107	0,173
D'accord avec, au moins, une des raisons spécifiées justifiant qu'un mari puisse battre sa femme	0,627	0,029	1 798	1 530	2,518	0,046	0,569	0,684
Prend ses propres décisions concernant les relations sexuelles, l'utilisation contraceptive et les soins de santé reproductive	0,011	0,004	1 413	1 230	1,270	0,321	0,004	0,018
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	0,167	0,027	417	380	1,497	0,164	0,112	0,222
A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment	0,046	0,012	417	380	1,183	0,264	0,022	0,071
A subi des violences sexuelles par n'importe quel partenaire non-intime	0,018	0,007	417	380	1,110	0,403	0,003	0,032
A subi des violences physiques/sexuelles exercées par le plus récent mari/partenaire	0,145	0,026	372	337	1,415	0,179	0,093	0,196
A subi des violences physiques/sexuelles/ émotionnelles par le mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois	0,147	0,030	372	337	1,646	0,206	0,086	0,208

À suivre…

Tableau B.11—*Suite*

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
			HOMMES					
Aucune instruction	0,581	0,039	601	505	1,933	0,067	0,502	0,659
Niveau d'instruction secondaire ou plus	0,269	0,032	601	505	1,764	0,119	0,205	0,333
Alphabétisation	0,344	0,031	601	505	1,580	0,089	0,283	0,406
Utilisation de l'internet au cours des 12 derniers mois	0,590	0,027	601	505	1,356	0,046	0,535	0,644
Consommation actuelle de tabac	0,121	0,021	601	505	1,589	0,175	0,078	0,163
Ne veut plus d'enfant	0,168	0,040	351	298	2,004	0,240	0,087	0,248
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,617	0,033	567	471	1,609	0,053	0,552	0,683
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,460	0,084	79	62	1,469	0,182	0,292	0,627
A déjà été testé pour le VIH et a reçu les résultats du dernier test	0,014	0,007	601	505	1,372	0,466	0,001	0,028
Circoncision	0,996	0,002	601	505	1,022	0,002	0,991	1,000
Possession d'un téléphone portable	0,895	0,016	601	505	1,254	0,018	0,863	0,926
Possède et utilise un compte bancaire ou un téléphone portable pour des transactions	0,702	0,028	601	505	1,482	0,039	0,647	0,758
D'accord avec, au moins, une des raisons spécifiées justifiant qu'un mari puisse battre sa femme	0,445	0,036	601	505	1,785	0,081	0,373	0,518

Tableau B.12 Erreurs de sondage : Echantillon Tombouctou, Mali 2023–2024

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
MÉNAGES ET POPULATIONS								
Naissances enregistrées à l'état civil	0,655	0,031	1 705	296	2,077	0,048	0,592	0,717
Possession d'au moins une MII	0,703	0,025	1 414	248	2,034	0,035	0,654	0,753
Possession d'au moins une MII pour deux personnes	0,198	0,026	1 414	248	2,479	0,133	0,145	0,251
Au moins un service élémentaire en eau de boisson	0,815	0,039	9 004	1 561	3,458	0,048	0,736	0,893
Disponibilité d'eau à boire en quantités suffisantes	0,730	0,032	9 004	1 561	2,490	0,044	0,666	0,794
Au moins un service élémentaire d'assainissement	0,275	0,031	9 004	1 561	2,434	0,111	0,214	0,336
Utilisant défécation en plein air	0,257	0,042	9 004	1 561	3,463	0,164	0,173	0,342
Utilisant une installation pour le lavage des mains avec du savon et de l'eau	0,071	0,013	8 939	1 541	1,821	0,190	0,044	0,098
FEMMES								
Aucune instruction	0,684	0,035	1 774	281	3,135	0,051	0,614	0,753
Niveau d'instruction secondaire ou plus	0,179	0,028	1 774	281	3,072	0,156	0,123	0,235
Alphabétisée	0,247	0,029	1 774	281	2,830	0,118	0,189	0,305
Utilisation de l'internet dans les 12 derniers mois	0,213	0,025	1 774	281	2,560	0,117	0,163	0,262
Consommation actuelle de tabac	0,018	0,005	1 774	281	1,444	0,256	0,009	0,027
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	5,334	0,222	4 890	781	1,717	0,042	4,890	5,778
Actuellement enceinte	0,120	0,010	1 774	281	1,277	0,082	0,101	0,140
Nombre moyen d'enfants nés vivants des femmes de 40–49 ans	5,621	0,199	213	35	1,214	0,035	5,222	6,020
Intervalle intergénésique médian	28,211	0,747	1 288	210	2,165	0,026	26,717	29,705
Ne veut plus d'enfant	0,122	0,015	1 202	199	1,552	0,120	0,093	0,152
Nombre idéal d'enfants	7,130	0,177	1 554	249	2,348	0,025	6,777	7,483
Taux de fécondité désirée (3 ans)	5,108	0,223	4 890	781	1,675	0,044	4,662	5,554
Utilise actuellement une méthode contraceptive	0,077	0,008	1 202	199	1,086	0,108	0,061	0,094
Utilise actuellement une méthode moderne	0,071	0,008	1 202	199	1,044	0,109	0,056	0,087
Utilise actuellement la pilule	0,018	0,007	1 202	199	1,831	0,388	0,004	0,032
Utilise actuellement les injectables	0,017	0,005	1 202	199	1,202	0,262	0,008	0,026
Utilise actuellement les implants	0,025	0,006	1 202	199	1,342	0,244	0,013	0,037
Utilise actuellement le condom masculin	0,001	0,001	1 202	199	1,102	1,014	0,000	0,003
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,006	0,003	1 202	199	1,473	0,557	0,000	0,012
Besoins non satisfaits pour espacer	0,138	0,013	1 202	199	1,316	0,095	0,112	0,165
Besoins non satisfaits pour limiter	0,043	0,009	1 202	199	1,578	0,214	0,025	0,062
Total des besoins non satisfaits	0,182	0,016	1 202	199	1,445	0,088	0,150	0,214
Demande satisfaite par des méthodes modernes (femmes en union)	0,276	0,026	324	52	1,033	0,095	0,223	0,328
Demande satisfaite par des méthodes modernes (l'ensemble des femmes)	0,323	0,034	375	60	1,431	0,107	0,254	0,392
Participation dans la prise de décision sur la planification familiale	0,428	0,039	1 202	199	2,711	0,091	0,350	0,506
Non exposée à aucun des huit médias	0,630	0,037	1 774	281	3,209	0,059	0,556	0,704
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0–9 ans)	20,285	3,418	2 973	479	1,243	0,168	13,450	27,120
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0–9 ans)	11,566	2,500	2 973	480	1,323	0,216	6,566	16,567
Quotient de mortalité infantile (derniers 0–9 ans)	31,851	4,102	2 974	480	1,200	0,129	23,648	40,055
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0–9 ans)	21,032	3,943	3 023	480	1,281	0,187	13,146	28,919
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0–9 ans)	52,214	5,919	2 985	482	1,196	0,113	40,376	64,051
Taux de mortalité périnatale	38,918	4,808	1 650	270	1,032	0,124	29,302	48,535
Taux de mortinatalité	22,201	5,215	1 650	270	1,487	0,235	11,772	32,630
Taux de mortalité néonatale précoce	17,097	3,537	1 622	264	1,075	0,207	10,022	24,172
A reçu des soins prénatals par un prestataire de santé qualifié	0,536	0,030	484	79	1,327	0,056	0,476	0,596
4 visites prénatales ou plus	0,197	0,027	484	79	1,513	0,139	0,142	0,252
8 visites prénatales ou plus	0,013	0,006	484	79	1,119	0,446	0,001	0,024
A pris des suppléments contenant du fer	0,601	0,035	484	79	1,571	0,058	0,531	0,671
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,209	0,030	484	79	1,622	0,144	0,148	0,269
A accouché dans un établissement de santé (naissances vivantes)	0,591	0,048	497	80	2,154	0,082	0,494	0,687
A accouché avec l'assistance d'un prestataire de santé qualifié (naissances vivantes)	0,519	0,041	497	80	1,824	0,080	0,436	0,602
A accouché par césarienne (naissances vivantes)	0,066	0,011	497	80	0,966	0,163	0,045	0,088
Femmes ayant reçu des soins postnatals dans les 2 premiers jours	0,547	0,046	484	79	2,028	0,084	0,455	0,639

À suivre…

Tableau B.12—*Suite*

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
Nouveau-nés ayant reçu des soins postnatals dans les 2 premiers jours	0,529	0,043	484	79	1,898	0,082	0,443	0,615
Un problème d'accès aux soins de santé	0,844	0,020	1 774	281	2,329	0,024	0,804	0,885
A déjà eu un carnet de vaccination	0,479	0,050	290	47	1,665	0,103	0,380	0,578
A reçu le vaccin du BCG	0,461	0,046	290	47	1,566	0,101	0,368	0,554
A reçu [DTC-HepB-Hib] (3 doses)	0,239	0,030	290	47	1,186	0,126	0,179	0,299
A reçu le vaccin contre pneumocoque (3 doses)	0,232	0,034	290	47	1,371	0,148	0,163	0,301
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12–23)	0,325	0,046	290	47	1,658	0,142	0,233	0,417
Complètement vacciné conformément au calendrier national (12–23 mois)	0,084	0,020	290	47	1,183	0,237	0,044	0,124
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 24–35)	0,188	0,040	312	50	1,793	0,212	0,108	0,268
Complètement vacciné conformément au calendrier national (24–35 mois)	0,012	0,008	312	50	1,309	0,670	0,000	0,028
A recherché un traitement pour la diarrhée	0,361	0,043	158	30	1,226	0,118	0,276	0,446
Traité avec des SRO	0,187	0,041	158	30	1,450	0,222	0,104	0,269
Taille-pour-âge (-3ET)	0,127	0,015	1 662	287	1,834	0,116	0,098	0,157
Taille-pour-âge (-2ET)	0,301	0,022	1 662	287	1,883	0,074	0,257	0,346
Poids-pour-taille (-2ET)	0,109	0,017	1 685	294	1,973	0,152	0,076	0,142
Poids-pour-taille (+2ET)	0,040	0,008	1 685	294	1,582	0,191	0,025	0,055
Poids-pour-âge (-2ET)	0,197	0,015	1 682	292	1,546	0,077	0,167	0,228
Exclusivement allaité	0,430	0,056	109	18	1,178	0,131	0,318	0,543
Diversité alimentaire minimale (enfants 6–23 mois)	0,034	0,009	363	58	0,961	0,268	0,016	0,053
Prévalence de l'anémie (enfants 6–59 mois) (hémoglobine <11,0 g/dl)	0,666	0,041	822	143	2,311	0,061	0,585	0,747
Indice de masse corporelle (IMC) <18,5	0,014	0,006	549	90	1,160	0,407	0,003	0,026
Indice de masse corporelle (IMC) ≥25,0	0,434	0,043	549	90	2,053	0,099	0,348	0,520
Indice de masse corporelle-pour-âge (-2ET)	0,000	0,000	207	30	na	na	0,000	0,000
Indice de masse corporelle-pour-âge (+1ET)	0,228	0,038	207	30	1,241	0,165	0,152	0,303
Diversification alimentaire minimum (femmes 15–49)	0,102	0,014	1 774	281	1,953	0,138	0,074	0,130
Prévalence de l'anémie (femmes 15–49, OMS)	0,422	0,043	889	139	2,606	0,103	0,335	0,509
Enfant a dormi sous une MII la nuit précédente	0,558	0,027	1 714	300	1,754	0,049	0,504	0,612
Femme enceinte a dormi sous une MII la nuit précédente	0,590	0,056	232	36	1,608	0,095	0,478	0,703
A reçu trois doses ou plus de SP/Fansidar	0,059	0,017	484	79	1,553	0,283	0,026	0,092
Enfant a eu de la fièvre dans les 2 semaines précédentes	0,148	0,015	1 569	253	1,703	0,104	0,117	0,179
Enfant a eu un prélèvement de sang au doigt/talon	0,147	0,035	219	37	1,450	0,237	0,077	0,217
Enfant a pris une CTA	0,241	0,072	61	10	1,327	0,298	0,098	0,385
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,726	0,030	1 036	207	2,180	0,042	0,666	0,787
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,076	0,044	59	9	1,261	0,582	0,000	0,164
A déjà été testée pour le VIH et a reçu les résultats du dernier test	0,005	0,002	1 774	281	1,305	0,460	0,000	0,009
A travaillé au cours des 12 derniers mois	0,254	0,020	1 202	199	1,618	0,080	0,213	0,295
A travaillé au cours des 12 derniers mois, mais n'a pas été rémunérée	0,070	0,021	289	51	1,416	0,304	0,027	0,113
Possession d'un téléphone portable	0,554	0,033	1 774	281	2,758	0,059	0,489	0,619
Possède et utilise un compte bancaire ou un téléphone portable pour des transactions financières	0,171	0,025	1 774	281	2,819	0,148	0,120	0,221
Participe dans la prise de décision (les trois décisions)	0,166	0,023	1 202	199	2,139	0,139	0,120	0,211
D'accord avec, au moins, une des raisons spécifiées justifiant qu'un mari puisse battre sa femme	0,439	0,022	1 774	281	1,893	0,051	0,394	0,483
Prend ses propres décisions concernant les relations sexuelles, l'utilisation contraceptive et les soins de santé reproductive	0,049	0,013	1 202	199	2,085	0,266	0,023	0,075
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	0,195	0,024	633	74	1,515	0,122	0,147	0,243
A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment	0,077	0,016	633	74	1,467	0,202	0,046	0,108
A subi des violences sexuelles par n'importe quel partenaire non-intime	0,020	0,012	633	74	2,129	0,596	0,000	0,044
A subi des violences physiques/sexuelles exercées par le plus récent mari/partenaire	0,204	0,020	519	58	1,102	0,096	0,165	0,243
A subi des violences physiques/sexuelles/ émotionnelles par le mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois	0,199	0,022	519	58	1,262	0,111	0,154	0,243

À suivre…

Tableau B.12—*Suite*

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
			HOMMES					
Aucune instruction	0,642	0,041	862	128	2,483	0,063	0,561	0,723
Niveau d'instruction secondaire ou plus	0,215	0,033	862	128	2,374	0,155	0,148	0,281
Alphabétisation	0,328	0,033	862	128	2,035	0,099	0,263	0,393
Utilisation de l'internet au cours des 12 derniers mois	0,472	0,043	862	128	2,494	0,090	0,386	0,557
Consommation actuelle de tabac	0,106	0,014	862	128	1,326	0,131	0,078	0,134
Ne veut plus d'enfant	0,022	0,009	449	72	1,238	0,394	0,005	0,039
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,553	0,040	620	110	2,011	0,073	0,473	0,634
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,468	0,088	42	8	1,124	0,188	0,293	0,644
A déjà été testé pour le VIH et a reçu les résultats du dernier test	0,014	0,005	862	128	1,164	0,328	0,005	0,024
Circoncision	0,961	0,010	862	128	1,550	0,011	0,941	0,982
Possession d'un téléphone portable	0,758	0,035	862	128	2,359	0,046	0,689	0,827
Possède et utilise un compte bancaire ou un téléphone portable pour des transactions	0,598	0,035	862	128	2,113	0,059	0,527	0,669
D'accord avec, au moins, une des raisons spécifiées justifiant qu'un mari puisse battre sa femme	0,283	0,035	862	128	2,257	0,123	0,214	0,353

Tableau B.13 Erreurs de sondage : Echantillon Gao, Mali 2023–2024

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
MÉNAGES ET POPULATIONS								
Naissances enregistrées à l'état civil	0,644	0,044	1 100	486	2,178	0,068	0,557	0,731
Possession d'au moins une MII	0,629	0,055	854	387	3,318	0,088	0,518	0,739
Possession d'au moins une MII pour deux personnes	0,215	0,026	854	387	1,877	0,123	0,162	0,268
Au moins un service élémentaire en eau de boisson	0,666	0,058	5 792	2 586	3,164	0,087	0,550	0,781
Disponibilité d'eau à boire en quantités suffisantes	0,614	0,028	5 792	2 586	1,500	0,046	0,557	0,671
Au moins un service élémentaire d'assainissement	0,370	0,050	5 792	2 586	2,655	0,136	0,269	0,471
Utilisant défécation en plein air	0,188	0,042	5 792	2 586	2,932	0,225	0,103	0,273
Utilisant une installation pour le lavage des mains avec du savon et de l'eau	0,163	0,043	5 662	2 536	2,746	0,267	0,076	0,250
FEMMES								
Aucune instruction	0,618	0,038	1 141	485	2,645	0,062	0,542	0,695
Niveau d'instruction secondaire ou plus	0,191	0,027	1 141	485	2,302	0,141	0,137	0,245
Alphabétisée	0,232	0,026	1 141	485	2,103	0,114	0,179	0,284
Utilisation de l'internet dans les 12 derniers mois	0,222	0,025	1 141	485	1,993	0,111	0,173	0,271
Consommation actuelle de tabac	0,111	0,023	1 141	485	2,465	0,207	0,065	0,157
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	6,062	0,241	3 174	1 352	0,995	0,040	5,580	6,544
Actuellement enceinte	0,091	0,012	1 141	485	1,392	0,130	0,068	0,115
Nombre moyen d'enfants nés vivants des femmes de 40–49 ans	5,625	0,195	156	70	1,051	0,035	5,235	6,015
Intervalle intergénésique médian	29,682	0,687	857	358	1,148	0,023	28,308	31,056
Ne veut plus d'enfant	0,071	0,012	826	360	1,309	0,165	0,048	0,094
Nombre idéal d'enfants	7,679	0,198	1 094	467	1,758	0,026	7,283	8,076
Taux de fécondité désirée (3 ans)	5,722	0,241	3 174	1 352	0,984	0,042	5,241	6,204
Utilise actuellement une méthode contraceptive	0,029	0,007	826	360	1,218	0,246	0,015	0,043
Utilise actuellement une méthode moderne	0,027	0,006	826	360	1,091	0,230	0,014	0,039
Utilise actuellement la pilule	0,006	0,004	826	360	1,292	0,568	0,000	0,013
Utilise actuellement les injectables	0,010	0,004	826	360	1,121	0,389	0,002	0,018
Utilise actuellement les implants	0,007	0,003	826	360	1,118	0,459	0,001	0,014
Utilise actuellement le condom masculin	0,002	0,002	826	360	1,294	0,979	0,000	0,006
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,002	0,002	826	360	1,374	0,988	0,000	0,007
Besoins non satisfaits pour espacer	0,284	0,020	826	360	1,293	0,071	0,244	0,325
Besoins non satisfaits pour limiter	0,034	0,008	826	360	1,308	0,243	0,018	0,051
Total des besoins non satisfaits	0,318	0,020	826	360	1,214	0,062	0,279	0,358
Demande satisfaite par des méthodes modernes (femmes en union)	0,076	0,017	287	125	1,056	0,217	0,043	0,110
Demande satisfaite par des méthodes modernes (l'ensemble des femmes)	0,091	0,016	363	158	1,097	0,180	0,058	0,123
Participation dans la prise de décision sur la planification familiale	0,333	0,028	826	360	1,692	0,084	0,277	0,388
Non exposée à aucun des huit médias	0,486	0,047	1 141	485	3,134	0,096	0,393	0,579
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0–9 ans)	20,384	4,061	1 994	841	1,164	0,199	12,262	28,505
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0–9 ans)	24,353	4,826	1 987	838	1,335	0,198	14,700	34,006
Quotient de mortalité infantile (derniers 0–9 ans)	44,737	5,810	1 995	841	1,138	0,130	33,118	56,356
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0–9 ans)	21,188	3,675	1 961	821	0,900	0,173	13,838	28,537
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0–9 ans)	64,977	8,278	1 997	842	1,322	0,127	48,421	81,532
Taux de mortalité périnatale	27,874	7,640	1 094	462	1,403	0,274	12,594	43,154
Taux de mortinatalité	14,178	5,092	1 094	462	1,337	0,359	3,994	24,361
Taux de mortalité néonatale précoce	13,893	5,012	1 080	456	1,235	0,361	3,868	23,918
A reçu des soins prénatals par un prestataire de santé qualifié	0,679	0,046	409	174	2,001	0,068	0,586	0,772
4 visites prénatales ou plus	0,332	0,038	409	174	1,624	0,114	0,256	0,408
8 visites prénatales ou plus	0,029	0,012	409	174	1,390	0,397	0,006	0,052
A pris des suppléments contenant du fer	0,703	0,038	409	174	1,686	0,054	0,627	0,780
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,442	0,036	409	174	1,453	0,081	0,371	0,514
A accouché dans un établissement de santé (naissances vivantes)	0,553	0,055	419	179	2,206	0,099	0,443	0,662
A accouché avec l'assistance d'un prestataire de santé qualifié (naissances vivantes)	0,623	0,050	419	179	2,078	0,081	0,523	0,724
A accouché par césarienne (naissances vivantes)	0,059	0,011	419	179	0,971	0,189	0,036	0,081
Femmes ayant reçu des soins postnatals dans les 2 premiers jours	0,500	0,053	409	174	2,142	0,106	0,394	0,607

À suivre…

Tableau B.13—*Suite*

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
Nouveau-nés ayant reçu des soins postnatals dans les 2 premiers jours	0,498	0,048	409	174	1,929	0,096	0,403	0,594
Un problème d'accès aux soins de santé	0,687	0,029	1 141	485	2,074	0,042	0,630	0,744
A déjà eu un carnet de vaccination	0,671	0,051	196	81	1,496	0,077	0,569	0,774
A reçu le vaccin du BCG	0,693	0,050	196	81	1,472	0,072	0,594	0,792
A reçu [DTC-HepB-Hib] (3 doses)	0,507	0,058	196	81	1,591	0,114	0,391	0,623
A reçu le vaccin contre pneumocoque (3 doses)	0,490	0,053	196	81	1,462	0,109	0,384	0,597
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12–23)	0,521	0,054	196	81	1,487	0,104	0,413	0,630
Complètement vacciné conformément au calendrier national (12–23 mois)	0,086	0,024	196	81	1,162	0,276	0,039	0,133
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 24–35)	0,271	0,048	215	90	1,543	0,179	0,174	0,368
Complètement vacciné conformément au calendrier national (24–35 mois)	0,052	0,020	215	90	1,279	0,375	0,013	0,092
A recherché un traitement pour la diarrhée	0,479	0,052	172	69	1,290	0,108	0,376	0,583
Traité avec des SRO	0,263	0,045	172	69	1,238	0,169	0,174	0,352
Taille-pour-âge (-3ET)	0,184	0,020	989	435	1,474	0,109	0,144	0,225
Taille-pour-âge (-2ET)	0,406	0,030	989	435	1,700	0,073	0,347	0,466
Poids-pour-taille (-2ET)	0,121	0,019	1 085	480	1,750	0,159	0,082	0,159
Poids-pour-taille (+2ET)	0,008	0,003	1 085	480	0,943	0,321	0,003	0,013
Poids-pour-âge (-2ET)	0,304	0,026	990	436	1,596	0,085	0,252	0,356
Exclusivement allaité	0,379	0,066	99	46	1,349	0,175	0,247	0,512
Diversité alimentaire minimale (enfants 6–23 mois)	0,034	0,011	286	120	1,062	0,335	0,011	0,057
Prévalence de l'anémie (enfants 6–59 mois) (hémoglobine <11,0 g/dl)	0,655	0,045	510	227	1,823	0,069	0,565	0,745
Indice de masse corporelle (IMC) <18,5	0,129	0,027	376	164	1,560	0,207	0,076	0,182
Indice de masse corporelle (IMC) ≥25,0	0,385	0,041	376	164	1,637	0,105	0,304	0,466
Indice de masse corporelle-pour-âge (-2ET)	0,072	0,032	119	48	1,315	0,445	0,008	0,136
Indice de masse corporelle-pour-âge (+1ET)	0,115	0,032	119	48	1,064	0,278	0,051	0,180
Diversification alimentaire minimum (femmes 15–49)	0,154	0,025	1 141	485	2,289	0,159	0,105	0,203
Prévalence de l'anémie (femmes 15–49, OMS)	0,501	0,044	564	241	2,070	0,087	0,413	0,588
Enfant a dormi sous une MII la nuit précédente	0,515	0,044	1 118	494	2,181	0,085	0,428	0,602
Femme enceinte a dormi sous une MII la nuit précédente	0,568	0,065	112	46	1,279	0,115	0,437	0,698
A reçu trois doses ou plus de SP/Fansidar	0,151	0,036	409	174	2,020	0,238	0,079	0,223
Enfant a eu de la fièvre dans les 2 semaines précédentes	0,203	0,015	1 014	428	1,122	0,076	0,172	0,234
Enfant a eu un prélèvement de sang au doigt/talon	0,230	0,048	194	87	1,546	0,207	0,135	0,325
Enfant a pris une CTA	0,406	0,090	55	24	1,315	0,223	0,225	0,587
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,777	0,034	698	303	2,181	0,044	0,708	0,846
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,079	0,037	98	41	1,352	0,472	0,004	0,153
A déjà été testée pour le VIH et a reçu les résultats du dernier test	0,050	0,010	1 141	485	1,597	0,207	0,029	0,070
A travaillé au cours des 12 derniers mois	0,193	0,023	826	360	1,641	0,117	0,148	0,238
A travaillé au cours des 12 derniers mois, mais n'a pas été rémunérée	0,091	0,027	158	69	1,156	0,292	0,038	0,144
Possession d'un téléphone portable	0,475	0,029	1 141	485	1,974	0,062	0,416	0,533
Possède et utilise un compte bancaire ou un téléphone portable pour des transactions financières	0,182	0,022	1 141	485	1,913	0,120	0,138	0,225
Participe dans la prise de décision (les trois décisions)	0,083	0,022	826	360	2,248	0,261	0,040	0,126
D'accord avec, au moins, une des raisons spécifiées justifiant qu'un mari puisse battre sa femme	0,610	0,037	1 141	485	2,554	0,061	0,536	0,684
Prend ses propres décisions concernant les relations sexuelles, l'utilisation contraceptive et les soins de santé reproductive	0,034	0,012	826	360	1,828	0,340	0,011	0,057
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	0,130	0,022	364	125	1,237	0,168	0,086	0,173
A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment	0,053	0,021	364	125	1,765	0,393	0,011	0,095
A subi des violences sexuelles par n'importe quel partenaire non-intime	0,009	0,007	364	125	1,444	0,791	0,000	0,024
A subi des violences physiques/sexuelles exercées par le plus récent mari/partenaire	0,135	0,026	320	107	1,369	0,195	0,082	0,187
A subi des violences physiques/sexuelles/ émotionnelles par le mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois	0,114	0,026	320	107	1,464	0,229	0,061	0,166

À suivre…

Tableau B.13—*Suite*

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
			HOMMES					
Aucune instruction	0,384	0,046	368	163	1,814	0,120	0,291	0,476
Niveau d'instruction secondaire ou plus	0,311	0,045	368	163	1,874	0,146	0,220	0,402
Alphabétisation	0,398	0,044	368	163	1,699	0,109	0,311	0,486
Utilisation de l'internet au cours des 12 derniers mois	0,434	0,034	368	163	1,298	0,077	0,367	0,501
Consommation actuelle de tabac	0,241	0,032	368	163	1,414	0,131	0,178	0,304
Ne veut plus d'enfant	0,080	0,027	215	97	1,432	0,332	0,027	0,134
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,708	0,025	265	116	0,898	0,035	0,658	0,758
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,265	0,070	33	14	0,906	0,266	0,124	0,406
A déjà été testé pour le VIH et a reçu les résultats du dernier test	0,034	0,011	368	163	1,128	0,314	0,013	0,055
Circoncision	0,980	0,010	368	163	1,297	0,010	0,961	0,999
Possession d'un téléphone portable	0,747	0,021	368	163	0,929	0,028	0,705	0,789
Possède et utilise un compte bancaire ou un téléphone portable pour des transactions	0,392	0,041	368	163	1,590	0,104	0,311	0,473
D'accord avec, au moins, une des raisons spécifiées justifiant qu'un mari puisse battre sa femme	0,108	0,021	368	163	1,268	0,191	0,067	0,149

Tableau B.14 Erreurs de sondage : Echantillon Bamako, Mali 2023–2024

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
MÉNAGES ET POPULATIONS								
Naissances enregistrées à l'état civil	0,971	0,005	1 546	1 831	0,968	0,005	0,961	0,981
Possession d'au moins une MII	0,787	0,013	1 229	1 509	1,111	0,016	0,761	0,813
Possession d'au moins une MII pour deux personnes	0,339	0,030	1 228	1 505	2,226	0,089	0,279	0,399
Au moins un service élémentaire en eau de boisson	0,942	0,014	9 576	11 261	1,761	0,015	0,914	0,970
Disponibilité d'eau à boire en quantités suffisantes	0,838	0,021	9 576	11 261	1,444	0,025	0,797	0,879
Au moins un service élémentaire d'assainissement	0,611	0,025	9 576	11 261	1,443	0,041	0,562	0,661
Utilisant défécation en plein air	0,001	0,001	9 576	11 261	0,973	0,999	0,000	0,002
Utilisant une installation pour le lavage des mains avec du savon et de l'eau	0,358	0,020	9 573	11 258	1,102	0,057	0,318	0,399
FEMMES								
Aucune instruction	0,310	0,015	2 376	2 675	1,595	0,049	0,280	0,340
Niveau d'instruction secondaire ou plus	0,523	0,016	2 376	2 675	1,558	0,031	0,491	0,555
Alphabétisée	0,528	0,018	2 376	2 675	1,767	0,034	0,492	0,564
Utilisation de l'internet dans les 12 derniers mois	0,705	0,017	2 376	2 675	1,831	0,024	0,671	0,739
Consommation actuelle de tabac	0,006	0,002	2 376	2 675	1,117	0,297	0,002	0,009
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	4,868	0,159	6 527	7 344	1,215	0,033	4,550	5,185
Actuellement enceinte	0,069	0,006	2 376	2 675	1,121	0,084	0,058	0,081
Nombre moyen d'enfants nés vivants des femmes de 40–49 ans	5,424	0,155	309	350	1,094	0,029	5,114	5,734
Intervalle intergénésique médian	35,834	0,428	1 221	1 381	0,870	0,012	34,978	36,691
Ne veut plus d'enfant	0,224	0,012	1 376	1 553	1,022	0,051	0,201	0,247
Nombre idéal d'enfants	5,784	0,068	2 217	2 492	1,363	0,012	5,649	5,919
Taux de fécondité désirée (3 ans)	4,291	0,156	6 527	7 344	1,297	0,036	3,979	4,603
Utilise actuellement une méthode contraceptive	0,327	0,014	1 376	1 553	1,096	0,042	0,299	0,355
Utilise actuellement une méthode moderne	0,299	0,013	1 376	1 553	1,092	0,045	0,272	0,326
Utilise actuellement la pilule	0,051	0,006	1 376	1 553	0,936	0,109	0,040	0,062
Utilise actuellement les injectables	0,050	0,007	1 376	1 553	1,239	0,146	0,035	0,064
Utilise actuellement les implants	0,142	0,008	1 376	1 553	0,842	0,056	0,127	0,158
Utilise actuellement le condom masculin	0,006	0,003	1 376	1 553	1,443	0,503	0,000	0,012
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,028	0,004	1 376	1 553	1,000	0,160	0,019	0,037
Besoins non satisfaits pour espacer	0,142	0,008	1 376	1 553	0,893	0,059	0,125	0,159
Besoins non satisfaits pour limiter	0,067	0,006	1 376	1 553	0,877	0,089	0,055	0,078
Total des besoins non satisfaits	0,209	0,011	1 376	1 553	0,974	0,051	0,187	0,230
Demande satisfaite par des méthodes modernes (femmes en union)	0,559	0,018	737	831	0,962	0,032	0,523	0,594
Demande satisfaite par des méthodes modernes (l'ensemble des femmes)	0,580	0,017	921	1 029	1,031	0,029	0,546	0,613
Participation dans la prise de décision sur la planification familiale	0,783	0,015	1 376	1 553	1,359	0,019	0,753	0,813
Non exposée à aucun des huit médias	0,396	0,014	2 376	2 675	1,392	0,035	0,368	0,424
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0–9 ans)	22,623	3,359	2 882	3 255	1,118	0,148	15,904	29,342
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0–9 ans)	17,249	2,724	2 879	3 254	1,010	0,158	11,800	22,698
Quotient de mortalité infantile (derniers 0–9 ans)	39,872	4,389	2 883	3 256	1,042	0,110	31,094	48,651
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0–9 ans)	19,703	2,875	2 774	3 131	1,006	0,146	13,953	25,453
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0–9 ans)	58,790	4,985	2 902	3 279	0,981	0,085	48,821	68,759
Taux de mortalité périnatale	34,430	5,485	1 623	1 837	1,070	0,159	23,460	45,401
Taux de mortinatalité	18,043	3,618	1 623	1 837	0,955	0,201	10,807	25,278
Taux de mortalité néonatale précoce	16,689	3,566	1 592	1 804	0,977	0,214	9,557	23,821
A reçu des soins prénatals par un prestataire de santé qualifié	0,977	0,006	637	724	1,007	0,006	0,965	0,989
4 visites prénatales ou plus	0,798	0,020	637	724	1,252	0,025	0,758	0,837
8 visites prénatales ou plus	0,131	0,016	637	724	1,206	0,123	0,099	0,163
A pris des suppléments contenant du fer	0,967	0,007	637	724	1,034	0,008	0,953	0,982
Mères protégées contre le tétanos pour la dernière naissance	0,662	0,025	637	724	1,320	0,037	0,613	0,712
A accouché dans un établissement de santé (naissances vivantes)	0,973	0,006	664	751	0,880	0,006	0,961	0,984
A accouché avec l'assistance d'un prestataire de santé qualifié (naissances vivantes)	0,970	0,006	664	751	0,929	0,007	0,958	0,983
A accouché par césarienne (naissances vivantes)	0,095	0,011	664	751	0,954	0,121	0,072	0,118
Femmes ayant reçu des soins postnatals dans les 2 premiers jours	0,896	0,015	637	724	1,198	0,016	0,867	0,925

À suivre…

Tableau B.14—*Suite*

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
Nouveau-nés ayant reçu des soins postnatals dans les 2 premiers jours	0,848	0,017	637	724	1,164	0,020	0,815	0,881
Un problème d'accès aux soins de santé	0,526	0,027	2 376	2 675	2,587	0,050	0,472	0,579
A déjà eu un carnet de vaccination	0,979	0,008	306	348	0,954	0,008	0,964	0,995
A reçu le vaccin du BCG	0,964	0,013	306	348	1,194	0,013	0,939	0,990
A reçu [DTC-HepB-Hib] (3 doses)	0,923	0,015	306	348	1,007	0,017	0,892	0,954
A reçu le vaccin contre pneumocoque (3 doses)	0,904	0,018	306	348	1,069	0,020	0,868	0,940
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12–23)	0,824	0,023	306	348	1,044	0,028	0,778	0,870
Complètement vacciné conformément au calendrier national (12–23 mois)	0,340	0,033	306	348	1,221	0,097	0,274	0,406
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 24–35)	0,411	0,030	296	332	1,039	0,074	0,350	0,471
Complètement vacciné conformément au calendrier national (24–35 mois)	0,115	0,019	296	332	0,981	0,168	0,076	0,153
A recherché un traitement pour la diarrhée	0,383	0,031	230	261	0,962	0,082	0,320	0,445
Traité avec des SRO	0,159	0,028	230	261	1,129	0,175	0,104	0,215
Taille-pour-âge (-3ET)	0,034	0,005	1 530	1 809	1,099	0,153	0,024	0,045
Taille-pour-âge (-2ET)	0,144	0,011	1 530	1 809	1,058	0,073	0,123	0,165
Poids-pour-taille (-2ET)	0,046	0,006	1 528	1 806	1,071	0,131	0,034	0,058
Poids-pour-taille (+2ET)	0,011	0,003	1 528	1 806	0,967	0,243	0,006	0,016
Poids-pour-âge (-2ET)	0,096	0,008	1 529	1 808	1,053	0,086	0,080	0,113
Exclusivement allaité	0,153	0,030	184	206	1,112	0,194	0,094	0,212
Diversité alimentaire minimale (enfants 6–23 mois)	0,174	0,020	437	499	1,104	0,115	0,134	0,214
Prévalence de l'anémie (enfants 6–59 mois) (hémoglobine <11,0 g/dl)	0,677	0,026	670	791	1,283	0,039	0,624	0,729
Indice de masse corporelle (IMC) <18,5	0,053	0,008	788	884	0,991	0,150	0,037	0,069
Indice de masse corporelle (IMC) ≥25,0	0,502	0,019	788	884	1,087	0,039	0,463	0,541
Indice de masse corporelle-pour-âge (-2ET)	0,040	0,011	314	360	1,034	0,285	0,017	0,062
Indice de masse corporelle-pour-âge (+1ET)	0,202	0,030	314	360	1,348	0,150	0,141	0,262
Diversification alimentaire minimum (femmes 15–49)	0,460	0,023	2 376	2 675	2,260	0,050	0,413	0,506
Prévalence de l'anémie (femmes 15–49, OMS)	0,448	0,017	1 193	1 344	1,214	0,039	0,413	0,483
Enfant a dormi sous une MII la nuit précédente	0,605	0,018	1 552	1 838	1,087	0,030	0,569	0,642
Femme enceinte a dormi sous une MII la nuit précédente	0,567	0,046	166	193	1,159	0,082	0,474	0,660
A reçu trois doses ou plus de SP/Fansidar	0,277	0,021	637	724	1,164	0,075	0,236	0,318
Enfant a eu de la fièvre dans les 2 semaines précédentes	0,158	0,017	1 528	1 733	1,739	0,109	0,123	0,192
Enfant a eu un prélèvement de sang au doigt/talon	0,208	0,026	244	274	0,963	0,123	0,157	0,259
Enfant a pris une CTA	0,437	0,073	57	65	1,095	0,166	0,292	0,582
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,638	0,012	2 293	2 582	1,216	0,019	0,614	0,663
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,143	0,022	236	249	0,976	0,156	0,098	0,187
A déjà été testée pour le VIH et a reçu les résultats du dernier test	0,074	0,006	2 376	2 675	1,030	0,075	0,062	0,085
A travaillé au cours des 12 derniers mois	0,691	0,015	1 376	1 553	1,203	0,022	0,661	0,721
A travaillé au cours des 12 derniers mois, mais n'a pas été rémunérée	0,011	0,004	963	1 074	1,241	0,387	0,002	0,019
Possession d'un téléphone portable	0,818	0,010	2 376	2 675	1,202	0,012	0,799	0,837
Possède et utilise un compte bancaire ou un téléphone portable pour des transactions financières	0,596	0,016	2 376	2 675	1,587	0,027	0,564	0,628
Participe dans la prise de décision (les trois décisions)	0,174	0,018	1 376	1 553	1,723	0,101	0,139	0,209
D'accord avec, au moins, une des raisons spécifiées justifiant qu'un mari puisse battre sa femme	0,601	0,020	2 376	2 675	1,999	0,033	0,560	0,641
Prend ses propres décisions concernant les relations sexuelles, l'utilisation contraceptive et les soins de santé reproductive	0,062	0,009	1 376	1 553	1,457	0,153	0,043	0,081
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	0,362	0,028	532	641	1,340	0,077	0,306	0,418
A subi des violences sexuelles à n'importe quel moment	0,123	0,018	532	641	1,243	0,144	0,088	0,159
A subi des violences sexuelles par n'importe quel partenaire non-intime	0,044	0,011	532	641	1,245	0,253	0,021	0,066
A subi des violences physiques/sexuelles exercées par le plus récent mari/partenaire	0,256	0,029	475	539	1,445	0,113	0,198	0,314
A subi des violences physiques/sexuelles/ émotionnelles par le mari/partenaire aux cours des 12 derniers mois	0,257	0,026	475	539	1,315	0,103	0,204	0,310

À suivre…

Tableau B.14—*Suite*

Variable	M	ET	N	N'	DEFT	ET/M	M-2ET	M+2ET
			HOMMES					
Aucune instruction	0,160	0,018	1 027	1 177	1,579	0,113	0,124	0,196
Niveau d'instruction secondaire ou plus	0,701	0,025	1 027	1 177	1,727	0,035	0,652	0,751
Alphabétisation	0,773	0,021	1 027	1 177	1,637	0,028	0,731	0,816
Utilisation de l'internet au cours des 12 derniers mois	0,825	0,016	1 027	1 177	1,386	0,020	0,792	0,858
Consommation actuelle de tabac	0,179	0,013	1 027	1 177	1,119	0,075	0,152	0,206
Ne veut plus d'enfant	0,064	0,011	441	503	0,982	0,178	0,041	0,087
Comportements discriminatoires à l'égard de personnes vivant avec le VIH	0,448	0,021	988	1 133	1,346	0,048	0,406	0,491
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels	0,449	0,045	236	279	1,397	0,101	0,359	0,540
A déjà été testé pour le VIH et a reçu les résultats du dernier test	0,025	0,006	1 027	1 177	1,190	0,231	0,014	0,037
Circoncision	0,988	0,005	1 027	1 177	1,398	0,005	0,978	0,997
Possession d'un téléphone portable	0,924	0,009	1 027	1 177	1,037	0,009	0,907	0,941
Possède et utilise un compte bancaire ou un téléphone portable pour des transactions	0,829	0,018	1 027	1 177	1,515	0,022	0,793	0,865
D'accord avec, au moins, une des raisons spécifiées justifiant qu'un mari puisse battre sa femme	0,422	0,031	1 027	1 177	2,013	0,074	0,360	0,484

Tableau B.15 Intervalle de confiance pour l 'indice de développement de la petite enfance 2030, EDS Mali, 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	R	SE	N	WN	DEFT	SE/R	R-2SE	R+2SE
Sexe								
Masculin	0,379	0,012	4 275	4 209	1,628	0,032	0,355	0,403
Féminin	0,425	0,012	4 155	4 153	1,588	0,029	0,401	0,449
Résidence								
Bamako	0,499	0,031	837	952	1,804	0,063	0,436	0,561
Autre urbain	0,512	0,026	1 129	823	1,769	0,051	0,460	0,565
Ensemble urbain	0,505	0,021	1 966	1 775	1,840	0,041	0,464	0,547
Rural	0,374	0,012	6 464	6 587	1,943	0,031	0,350	0,397
Région								
Kayes	0,308	0,019	1 271	1 244	1,462	0,062	0,270	0,346
Koulikoro	0,310	0,021	1 346	1 979	1,699	0,069	0,267	0,353
Sikasso	0,524	0,017	1 229	1 653	1,213	0,033	0,489	0,559
Ségou	0,437	0,034	1 095	1 326	2,289	0,079	0,368	0,506
Mopti	0,395	0,022	911	795	1,336	0,055	0,352	0,438
Tombouctou	0,249	0,021	1 060	170	1,556	0,083	0,208	0,290
Gao	0,351	0,027	574	240	1,334	0,076	0,298	0,404
Bamako	0,499	0,031	837	952	1,804	0,063	0,436	0,561
Âge (en mois)								
24–35	0,587	0,016	2 891	2 950	1,753	0,027	0,555	0,619
36–47	0,372	0,013	2 820	2 734	1,444	0,035	0,345	0,398
48–59	0,228	0,011	2 719	2 679	1,322	0,047	0,207	0,250
Niveau d'instruction de la mère								
Aucun	0,359	0,012	5 487	5 156	1,813	0,033	0,336	0,383
Primaire	0,422	0,018	1 329	1 412	1,310	0,042	0,386	0,457
Secondaire ou plus	0,508	0,018	1 614	1 794	1,468	0,036	0,471	0,544
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	0,400	0,018	1 528	1 751	1,448	0,045	0,364	0,436
Second	0,370	0,022	1 746	1 798	1,895	0,059	0,326	0,414
Moyen	0,333	0,016	2 195	1 711	1,604	0,048	0,301	0,365
Quatrième	0,412	0,020	1 684	1 689	1,660	0,048	0,372	0,452
Le plus élevé	0,515	0,020	1 277	1 413	1,449	0,039	0,474	0,555
Ensemble	0,402	0,010	8 430	8 362	1,908	0,025	0,381	0,422

TABLEAUX POUR L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES

Annexe C

Tableau C.1 Répartition par âge de la population des ménages

Répartition de la population (de fait) des ménages par année d'âge selon le sexe (pondéré), EDSM-VII Mali 2023–2024

	Homme		Femme			Homme		Femme	
Âge	Effectif	Pourcentage	Effectif	Pourcentage	Âge	Effectif	Pourcentage	Effectif	Pourcentage
0	1 716	4,2	1 648	3,7	42	311	0,8	317	0,7
1	1 519	3,7	1 519	3,4	43	308	0,8	321	0,7
2	1 689	4,1	1 659	3,7	44	247	0,6	257	0,6
3	1 552	3,8	1 628	3,7	45	359	0,9	379	0,9
4	1 635	4,0	1 558	3,5	46	243	0,6	248	0,6
5	1 485	3,6	1 360	3,1	47	221	0,5	215	0,5
6	1 650	4,0	1 582	3,6	48	226	0,6	208	0,5
7	1 595	3,9	1 569	3,5	49	179	0,4	164	0,4
8	1 504	3,7	1 439	3,2	50	328	0,8	335	0,8
9	1 260	3,1	1 208	2,7	51	144	0,4	282	0,6
10	1 411	3,4	1 356	3,0	52	254	0,6	298	0,7
11	1 119	2,7	1 125	2,5	53	188	0,5	283	0,6
12	1 308	3,2	1 242	2,8	54	143	0,3	240	0,5
13	1 245	3,0	1 346	3,0	55	239	0,6	257	0,6
14	1 105	2,7	1 037	2,3	56	179	0,4	176	0,4
15	873	2,1	834	1,9	57	145	0,4	143	0,3
16	804	2,0	874	2,0	58	158	0,4	168	0,4
17	779	1,9	800	1,8	59	134	0,3	139	0,3
18	783	1,9	939	2,1	60	208	0,5	233	0,5
19	500	1,2	709	1,6	61	138	0,3	126	0,3
20	701	1,7	957	2,2	62	129	0,3	146	0,3
21	500	1,2	649	1,5	63	154	0,4	192	0,4
22	481	1,2	733	1,6	64	119	0,3	125	0,3
23	484	1,2	661	1,5	65	168	0,4	167	0,4
24	416	1,0	615	1,4	66	154	0,4	147	0,3
25	501	1,2	839	1,9	67	169	0,4	132	0,3
26	395	1,0	607	1,4	68	116	0,3	135	0,3
27	342	0,8	525	1,2	69	87	0,2	86	0,2
28	403	1,0	683	1,5	70	128	0,3	161	0,4
29	339	0,8	464	1,0	71	92	0,2	69	0,2
30	526	1,3	751	1,7	72	85	0,2	73	0,2
31	340	0,8	446	1,0	73	86	0,2	70	0,2
32	442	1,1	528	1,2	74	65	0,2	42	0,1
33	354	0,9	411	0,9	75	87	0,2	69	0,2
34	268	0,7	416	0,9	76	56	0,1	26	0,1
35	510	1,2	623	1,4	77	37	0,1	33	0,1
36	342	0,8	386	0,9	78	50	0,1	48	0,1
37	304	0,7	386	0,9	79	44	0,1	23	0,1
38	386	0,9	454	1,0	80+	239	0,6	253	0,6
39	289	0,7	341	0,8	Ne sait pas	16	0,0	17	0,0
40	435	1,1	508	1,1					
41	251	0,6	258	0,6	Ensemble	40 975	100,0	44 479	100,0

Note : La population de fait comprend tous les résidents et les non-résidents qui ont dormi dans le ménage la nuit ayant précédé l'interview.

Tableau C.2.1 Répartition par âge des femmes éligibles et interviewées

Population de fait des femmes de 10–69 ans, effectif et répartition (en %) par groupe d'âges des femmes interviewées de 15–64 ans et pourcentage de femmes éligibles qui ont été interviewées (pondéré), EDSM-VII Mali 2023–2024

Groupe d'âges	Population des femmes de 10–69 ans dans les ménages	Femmes interviewées de 15–64 ans		Pourcentage de femmes éligibles interviewées
	Effectif	Effectif	Pourcentage	
10–14	6 105	na	na	na
15–19	4 155	4 087	19,2	98,4
20–24	3 615	3 547	16,7	98,1
25–29	3 119	3 067	14,4	98,4
30–34	2 552	2 499	11,8	97,9
35–39	2 190	2 158	10,2	98,6
40–44	1 662	1 625	7,6	97,8
45–49	1 214	1 175	5,5	96,8
50–54	1 439	1 423	6,7	98,9
55–59	884	874	4,1	98,8
60–64	821	809	3,8	98,5
65–69	668	na	na	na
15–64	21 650	21 264	100,0	98,2
Ratios				
10–14 sur 15–19	na	na	na	146,9
65–69 sur 60–64	na	na	na	81,4

Note : La population de fait comprend tous les résidents et les non-résidents qui ont dormi dans le ménage la nuit ayant précédé l'interview. Les pondérations utilisées que ce soit pour la population des femmes dans les ménages que pour les femmes interviewées sont celles de l'enquête ménage. L'âge est basé sur le Questionnaire Ménage.
na = non applicable

Tableau C.2.2 Répartition par âge des hommes éligibles et interviewés

Population de fait des hommes de 10–69 ans, effectif et répartition (en %) par groupe d'âges des hommes interviewés de 15–64 ans et pourcentage d'hommes éligibles qui ont été interviewés (pondéré), EDSM-VII Mali 2023–2024

Groupe d'âges	Population des hommes de 10–69 ans dans les ménages	Hommes interviewées de 15–64 ans		Pourcentage d'hommes éligibles interviewés
	Effectif	Effectif	Percentage	
10–14	3 202	na	na	na
15–19	1 774	1 719	21,1	96,9
20–24	1 267	1 219	15,0	96,2
25–29	1 003	953	11,7	95,0
30–34	983	930	11,4	94,6
35–39	861	822	10,1	95,4
40–44	735	707	8,7	96,2
45–49	611	579	7,1	94,7
50–54	531	505	6,2	95,1
55–59	411	399	4,9	97,1
60–64	317	301	3,7	94,9
65–69	366	na	na	na
15–64	8 493	8 132	100,0	95,8
Ratios				
10–14 sur 15–19	na	na	na	180,5
65–69 sur 60–64	na	na	na	115,7

Note : La population de fait comprend tous les résidents et les non-résidents qui ont dormi dans le ménage la nuit ayant précédé l'interview. Les pondérations utilisées que ce soit pour la population des femmes dans les ménages que pour les femmes interviewées sont celles de l'enquête ménage. L'âge est basé sur le Questionnaire Ménage.
na = non applicable

Tableau C.3 Déplacement d'âges aux âges 14/15

Nombre de femmes et d'hommes de 12–18 ans listés dans le tableau ménage, par année d'âge et ratio d'âge 15/14, selon la région (pondéré), EDSM-VII Mali 2023–2024

	Âge							Total âge	Ratio d'âge (15 ans/
Région	12	13	14	15	16	17	18	12–18	14 ans)
				FEMME					
Région[1]									
Kayes	202	205	135	146	155	115	169	1 128	108,2
Koulikoro	315	315	225	199	226	187	215	1 682	88,2
Sikasso	205	240	220	146	138	137	155	1 241	66,4
Ségou	189	213	127	99	96	95	109	929	77,9
Mopti	130	125	104	73	65	50	79	626	70,4
Tombouctou	23	27	26	14	19	14	18	141	52,0
Gao	40	34	39	25	17	24	36	216	64,0
Bamako	154	196	179	143	167	185	171	1 196	80,2
Ensemble	1 258	1 356	1 057	846	884	807	951	7 160	80,1
				HOMME					
Région[1]									
Kayes	186	204	155	150	138	89	130	1 052	97,1
Koulikoro	359	276	278	201	193	177	184	1 669	72,4
Sikasso	249	239	201	161	143	179	129	1 302	80,1
Ségou	219	225	162	165	145	123	124	1 163	101,4
Mopti	128	121	119	79	74	59	63	645	66,4
Tombouctou	21	19	21	19	15	17	15	127	89,1
Gao	44	31	41	22	25	16	21	201	54,4
Bamako	116	135	136	99	84	126	130	826	72,2
Ensemble	1 324	1 251	1 115	896	818	786	796	6 986	80,4

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau C.4 Déplacement d'âges aux âges 64/65

Nombre de femmes et d'hommes de 62–68 ans listés dans le tableau de ménage par année d'âge et ratio d'âge 65/64, selon la région (pondéré), EDSM-VII Mali 2023–2024

	Âge							Total 62–68	Ratio d'âge (65 ans/
Région	62	63	64	65	66	67	68	ans	64 ans)
				FEMME					
Région[1]									
Kayes	18	16	18	30	22	21	15	139	170,4
Koulikoro	34	40	25	32	32	27	47	238	126,3
Sikasso	24	35	24	38	27	27	16	190	156,3
Ségou	34	50	34	34	32	23	16	224	102,0
Mopti	19	19	10	17	17	12	16	110	172,3
Tombouctou	4	4	1	1	1	0	2	13	75,3
Gao	2	8	3	3	5	5	3	29	112,8
Bamako	13	19	14	18	19	21	24	128	124,0
Ensemble	148	192	129	173	156	136	138	1 072	134,0
				HOMME					
Région[1]									
Kayes	22	31	21	15	20	23	15	147	73,8
Koulikoro	30	34	24	43	29	48	23	231	177,2
Sikasso	23	25	21	26	26	37	31	189	126,1
Ségou	20	26	30	35	44	26	24	204	117,4
Mopti	10	18	8	17	19	14	10	97	210,0
Tombouctou	4	4	3	5	2	6	2	24	173,6
Gao	3	7	5	8	1	4	3	31	163,7
Bamako	24	25	11	22	17	15	12	127	208,0
Ensemble	135	170	122	172	158	174	120	1 051	140,8

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau C.5 Issues de la grossesse par années précédant l'enquête

Nombre d'issues de grossesses, pourcentage pour lesquelles une année et un mois de naissance ou une fin de grossesse ont été donnés, rapport de masculinité à la naissance pour les naissances vivantes et ratio par années précédant l'enquête, selon que les enfants sont vivants, enfants décédés, selon que l'issue de la grossesse est un mort-né, une fausse-couche/avortement et total des issues de la grossesse (pondéré), EDSM-VII Mali 2023–2024

	Nombre d'issues de grossesses					Pourcentage avec une année et un mois de naissance ou une fin de grossesse donné					Rapport de masculinité à la naissance pour les naissances vivantes[1]			Ratio des années précédant l'enquête[2]				
Années précédant l'enquête	Enfants vivants	Enfants décédés	Mort-nés	Fausses-couches/ avorte-ments	Total	Enfants vivants	Enfants décédés	Mort-nés	Fausses-couches/ avorte-ments	Total	Enfants vivants	Enfants décédés	Total	Enfants vivants	Enfants décédés	Mort-nés	Fausses-couches/ avorte-ments	Total
0	3 235	143	77	341	3 795	99,8	100,0	100,0	97,6	99,6	104,7	127,0	105,6	na	na	na	na	na
1	2 892	143	74	265	3 374	99,6	97,9	95,1	94,3	99,0	98,8	114,2	99,4	92,5	84,5	94,5	87,4	91,7
2	3 018	197	80	265	3 559	99,5	97,8	95,7	88,1	98,5	101,4	117,2	102,3	104,8	101,9	109,0	95,7	104,0
3	2 870	243	72	289	3 474	99,3	96,7	91,2	93,9	98,5	96,4	80,5	95,1	98,4	98,2	84,7	105,6	98,6
4	2 816	297	91	282	3 486	99,2	96,6	92,5	91,3	98,2	103,9	100,1	103,5	102,4	107,9	123,2	110,9	104,0
5	2 630	309	75	220	3 234	98,4	95,9	89,9	92,2	97,5	105,1	126,5	107,1	94,7	106,6	88,9	87,0	95,0
6	2 737	282	78	223	3 321	98,1	93,3	83,0	83,8	96,4	106,7	109,1	107,0	106,1	100,4	110,8	104,5	105,6
7	2 530	253	66	208	3 056	97,7	94,1	89,4	88,6	96,6	109,3	97,4	108,2	97,7	86,7	86,6	103,9	96,8
8	2 440	301	74	176	2 992	98,2	96,3	94,2	89,2	97,4	99,0	125,3	101,6	105,7	105,5	111,6	98,8	105,4
9	2 088	319	67	149	2 623	98,0	95,6	89,6	90,9	97,1	106,5	119,9	108,2	89,5	97,7	103,8	97,4	91,2
0–4	14 831	1 022	393	1 442	17 689	99,5	97,5	94,9	93,3	98,8	101,1	103,2	101,2	na	na	na	na	na
5–9	12 426	1 464	360	976	15 225	98,1	95,1	89,1	88,7	97,0	105,3	115,9	106,3	na	na	na	na	na
10–14	9 426	1 506	262	547	11 741	97,5	94,1	88,1	84,6	96,3	100,0	113,8	101,8	na	na	na	na	na
15–10	6 070	1 436	172	343	8 021	97,2	92,7	88,6	83,2	95,6	104,4	120,3	107,2	na	na	na	na	na
20+	5 158	1 652	193	284	7 286	96,2	90,2	85,7	82,0	94,0	104,1	117,5	107,1	na	na	na	na	na
Ensemble	47 911	7 079	1 379	3 592	59 962	98,1	93,6	90,0	88,9	96,8	102,7	114,7	104,1	na	na	na	na	na

na = non applicable

[1] $(N_m/N_f)x100$, où N_m est le nombre de naissances masculines et N_f le nombre de naissances féminines

[2] $[2G_x/(G_{x-1-}1+G_{x+1})]x100$, où G_x est le nombre d'issues de grossesse dans l'année x précédant l'enquête

Tableau C.6 Complétude de l'enregistrement

Pourcentage d'observations manquant d'information pour certaines questions démographiques et de santé (pondéré), EDSM-VII Mali 2023–2024

Type d'information	Pourcentage avec information manquante	Nombre de cas
Date de la naissance vivante ou du mort-né (15 dernières années)		
Jour manquant seulement	5,89	41 689
Mois manquant mais année déclarée	1,95	41 689
Année manquante	0,06	41 689
Date de la naissance vivante ou du mort-né (5 dernières années)		
Jour manquant seulement	3,77	16 247
Mois manquant mais année déclarée	0,74	16 247
Année manquante	0,01	16 247
Date de naissance des femmes (15–49 ans)		
Mois manquant mais année déclarée	5,86	20 354
Année manquante	0,20	20 354
Date de naissance des hommes (15–49 ans)		
Mois manquant mais année déclarée	11,27	7 829
Année manquante	0,76	7 829
Diarrhée dans les 2 dernières semaines (enfants vivant de 0–59 mois)	0,88	14 831
Anthropométrie des enfants (enfants vivants de 0–59 mois du Questionnaire Biomarqueur)		
Taille	1,34	16 175
Poids	1,34	16 175
Taille ou poids	1,34	16 175
Anthropométrie des femmes (15–49 ans du Questionnaire Biomarqueur)		
Taille	1,62	9 373
Poids	1,61	9 373
Taille ou poids	1,62	9 373
Anémie		
Enfants	2,83	7 363
Femmes	2,19	9 373

Tableau C.7 Résultats de l'exercice de standardisation effectué pendant la formation anthropométrique

Précision et exactitude des participants à la formation pour la prise des mesures de la taille au cours de l'exercice de standardisation anthropométrique, EDSM-VII Mali 2023–2024

	Exercice de standardisation[1]		Exercice de re-standardisation[1]	
	Précision du participant[2]	Exactitude du participant[2]	Précision du participant[2]	Exactitude du participant[2]
Participant 1	0,40	0,45	na	na
Participant 2	0,46	0,70	na	na
Participant 3	4,35	2,64	0,42	0,31
Participant 4	0,10	0,62	na	na
Participant 5	0,20	0,80	na	na
Participant 6	0,71	0,79	0,17	0,22
Participant 7	2,11	1,03	0,09	0,64
Participant 8	0,72	0,78	0,08	0,38
Participant 9	1,51	1,10	0,17	0,62
Participant 10	0,33	1,22	0,51	0,58
Participant 11	0,27	0,33	na	na
Participant 12	0,33	0,64	na	na
Participant 13	0,25	0,54	na	na
Participant 14	0,43	0,45	na	na
Participant 15	0,38	0,54	na	na
Participant 16	0,28	0,67	na	na
Participant 17	0,46	0,67	na	na
Participant 18	0,49	0,93	0,21	0,43
Participant 19	4,35	2,38	0,46	0,30
Participant 20	0,24	0,36	na	na
Participant 21	0,28	0,65	na	na
Participant 22	2,37	1,18	0,13	0,63
Participant 23	0,40	0,95	0,32	0,50
Participant 24	0,64	0,75	0,29	0,35
Participant 25	0,23	0,58	na	na
Participant 26	0,46	0,77	na	na
Participant 27	0,32	0,60	na	na
Participant 28	0,40	0,37	na	na
Participant 29	0,46	0,53	na	na
Participant 30	0,44	0,49	na	na
Participant 31	4,50	2,30	0,17	0,42
Participant 32	0,14	0,36	na	na
Participant 33	0,22	0,44	na	na
Participant 34	0,23	0,26	na	na
Participant 35	0,52	0,73	na	na
Participant 36	6,46	3,36	0,33	0,31
Participant 37	0,33	0,38	na	na
Participant 38	0,69	0,79	0,14	0,35
Participant 39	0,48	1,10	0,23	0,23
Participant 40	0,55	0,98	0,02	0,51
Participant 41	0,43	0,97	0,21	0,19
Participant 42	0,35	0,58	na	na
Participant 43	0,21	0,58	na	na
Participant 44	0,28	0,76	na	na
Participant 45	4,55	2,63	0,31	0,36
Participant 46	0,36	0,52	na	na
Participant 47	1,70	0,84	6,29	3,43
Participant 48	2,11	1,85	0,31	0,30
Participant 49	4,30	2,71	0,46	0,64
Participant 50	0,61	1,22	0,28	0,67
Participant 51	0,50	0,28	na	na
Participant 52	0,91	0,50	0,17	0,27
Moyenne	1,05	0,94	0,51	0,55

na = non applicable

[1] 10 enfants ont été mesurés deux fois pour chaque exercice de standardisation et de re-standardisation.

[2] La précision et l'exactitude des participants sont définies en termes d'erreur technique de mesure (TEM), calculé comme suit : $\sqrt{\sum(D^2)/(2N)}$ où D est la différence en taille et N le nombre de mesures répétées. Une erreur (TEM) acceptable selon l'OMS-UNICEF est une erreur de <0,6 cm pour la précision et de <0,8 cm pour l'exactitude.

Tableau C.8 Complétude et qualité des données concernant le poids et la taille des enfants

Parmi les enfants de moins de 5 ans (0–59 mois) éligibles pour l'anthropométrie, pourcentage pour lesquels les mesures de la taille, du poids, ou le mois ou l'année de naissance sont incomplètes ou manquantes ; parmi les enfants dont les données sur la taille et l'âge sont complètes, pourcentage pour lesquels les données pour la taille-pour-âge ne sont pas plausibles ; parmi les enfants dont les données sur le poids et la taille sont complètes, pourcentage pour lesquels les données pour le poids-pour-taille sont non plausibles ; et parmi les enfants dont les données sur le poids et l'âge sont complètes, pourcentage pour lesquels les données pour le poids-pour-âge sont non plausibles ; et parmi tous les enfants de moins de 5 ans qui étaient éligibles pour les mesures anthropométriques, pourcentage pour lesquels les données sur la taille-pour-âge, le poids-pour-taille ou le poids-pour âge sont valides, selon certaines caractéristiques sociodémographiques (non pondéré), EDSM-VII Mali 2023–2024

	Pourcentage avec des données incomplètes ou manquantes pour :				Pourcentage avec des données non plausibles pour :						Pourcentage avec des données valides pour[8]			
Caractéristique sociodémographique	Taille[1]	Poids[2]	Mois ou année de naissance[3]	Effectif d'enfants	Taille-pour-âge[4]	Nombre d'enfants avec des données complètes sur la taille et l'âge[5]	Poids-pour-taille[6]	Nombre d'enfants avec des données complètes sur le poids et la taille	Poids-pour-âge[7]	Nombre d'enfants avec des données complètes sur le poids et l'âge[5]	Taille-pour-âge	Poids-pour-taille	Poids-pour-âge	Effectif d'enfants
Âge en mois														
<6	1,3	1,3	0,2	1 639	1,2	1 615	1,2	1 617	0,4	1 615	97,4	97,5	98,1	1 639
6–11	1,2	1,2	1,0	1 453	0,6	1 422	0,4	1 435	0,2	1 423	97,2	98,3	97,7	1 453
12–23	1,3	1,3	0,9	2 937	0,5	2 879	0,4	2 899	0,1	2 879	97,6	98,3	97,9	2 937
24–35	1,1	1,1	1,4	3 145	0,2	3 069	0,2	3 111	0,1	3 069	97,4	98,8	97,5	3 145
36–47	1,0	1,0	1,8	3 137	0,1	3 062	0,1	3 106	0,0	3 062	97,5	98,9	97,6	3 137
48–59	1,7	1,7	1,5	3 093	0,1	2 999	0,3	3 041	0,0	2 999	96,8	98,0	96,9	3 093
0–23	1,3	1,3	0,7	6 029	0,7	5 916	0,6	5 951	0,2	5 917	97,4	98,1	97,9	6 029
24–59	1,2	1,2	1,5	9 375	0,1	9 130	0,2	9 258	0,0	9 130	97,2	98,6	97,4	9 375
Sexe														
Masculin	1,1	1,1	1,3	7 746	0,4	7 573	0,4	7 659	0,1	7 574	97,4	98,5	97,7	7 746
Féminin	1,4	1,4	1,2	7 658	0,3	7 473	0,3	7 550	0,2	7 473	97,3	98,3	97,4	7 658
Interview de la mère														
Interviewée	0,8	0,8	0,9	14 188	0,4	13 961	0,4	14 078	0,1	13 962	98,0	98,9	98,3	14 188
Non interviewée mais elle est dans le ménage	17,2	17,2	7,0	429	0,6	341	0,6	355	0,6	341	79,0	82,3	79,0	429
Non interviewée et pas dans le ménage[9]	1,4	1,4	4,4	787	0,1	744	0,1	776	0,1	744	94,4	98,5	94,4	787
Résidence														
Bamako	1,2	1,2	0,2	1 549	0,1	1 531	0,2	1 531	0,1	1 531	98,8	98,6	98,7	1 549
Autre urbain	1,4	1,4	2,0	2 118	0,2	2 051	0,5	2 088	0,0	2 051	96,6	98,1	96,8	2 118
Ensemble urbain	1,3	1,3	1,2	3 667	0,1	3 582	0,4	3 619	0,1	3 582	97,5	98,3	97,6	3 667
Rural	1,3	1,2	1,2	11 737	0,4	11 464	0,4	11 590	0,1	11 465	97,3	98,4	97,6	11 737
Région[11]														
Kayes	1,3	1,3	0,2	2 376	0,1	2 340	0,2	2 345	0,0	2 340	98,4	98,5	98,4	2 376
Koulikoro	1,1	1,1	0,4	2 463	0,6	2 429	0,4	2 437	0,0	2 429	98,0	98,5	98,6	2 463
Sikasso	1,5	1,5	1,0	2 240	0,1	2 193	0,1	2 207	0,1	2 193	97,8	98,4	97,8	2 240
Ségou	1,2	1,2	0,3	2 054	0,2	2 023	0,1	2 029	0,1	2 023	98,3	98,7	98,3	2 054
Mopti	2,2	2,2	0,8	1 695	0,2	1 650	0,1	1 657	0,1	1 650	97,2	97,7	97,3	1 695
Tombouctou	0,2	0,2	1,3	1 711	1,4	1 685	1,3	1 708	0,2	1 685	97,1	98,5	98,3	1 711
Gao	1,9	1,8	9,3	1 112	0,3	992	0,5	1 091	0,3	993	88,9	97,6	89,0	1 112
Kidal	†	†	†	204	†	203	†	204	†	203	†	†	†	204
Bamako	1,2	1,2	0,2	1 549	0,1	1 531	0,2	1 531	0,1	1 531	98,8	98,6	98,7	1 549

À suivre...

Tableau C.8—*Suite*

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage avec des données incomplètes ou manquantes pour :				Pourcentage avec des données non plausibles pour :						Pourcentage avec des données valides pour[8]			
	Taille[1]	Poids[2]	Mois ou année de naissance[3]	Effectif d'enfants	Taille-pour-âge[4]	Nombre d'enfants avec des données complètes sur la taille et l'âge[5]	Poids-pour-taille[6]	Nombre d'enfants avec des données complètes sur le poids et la taille	Poids-pour-âge[7]	Nombre d'enfants avec des données complètes sur le poids et l'âge[5]	Taille-pour-âge	Poids-pour-taille	Poids-pour-âge	Effectif d'enfants
Niveau d'instruction de la mère														
Aucun	1,3	1,3	1,3	9 239	0,4	9 014	0,4	9 123	0,1	9 014	97,1	98,3	97,5	9 239
Primaire	1,1	1,1	0,8	2 372	0,4	2 331	0,3	2 345	0,1	2 332	97,9	98,6	98,2	2 372
Secondaire ou plus	1,3	1,3	0,4	3 004	0,2	2 957	0,3	2 965	0,1	2 957	98,3	98,4	98,4	3 004
Manquant	100,0	100,0	100,0	2	-	0	-	0	-	0	0,0	0,0	0,0	2
Mesureur														
Mesureur 1	0,8	0,8	0,1	737	0,0	730	0,1	731	0,0	730	99,1	99,1	99,1	737
Mesureur 2	1,7	1,7	0,4	1 052	0,1	1 030	0,3	1 034	0,1	1 030	97,8	98,0	97,8	1 052
Mesureur 3	1,0	1,0	0,0	586	0,2	580	0,2	580	0,0	580	98,8	98,8	99,0	586
Mesureur 4	2,1	2,1	0,8	623	0,5	606	0,5	610	0,0	606	96,8	97,4	97,3	623
Mesureur 5	0,4	0,4	0,5	803	1,3	796	0,8	800	0,0	796	97,9	98,9	99,1	803
Mesureur 6	0,0	0,0	0,0	673	0,1	673	0,1	673	0,0	673	99,9	99,9	100,0	673
Mesureur 7	0,0	0,0	0,1	675	0,1	674	0,0	675	0,1	674	99,7	100,0	99,7	675
Mesureur 8	0,3	0,3	0,2	587	0,2	584	0,2	585	0,0	584	99,3	99,5	99,5	587
Mesureur 9	1,2	1,2	0,1	731	0,3	722	0,1	722	0,3	722	98,5	98,6	98,5	731
Mesureur 10	2,7	2,7	3,4	563	0,0	536	0,0	548	0,0	536	95,2	97,3	95,2	563
Mesureur 11	1,4	1,4	0,0	553	0,4	545	0,2	545	0,4	545	98,2	98,4	98,2	553
Mesureur 12	0,7	0,7	0,5	415	0,0	411	0,2	412	0,0	411	99,0	99,0	99,0	415
Mesureur 13	0,2	0,2	0,2	549	0,0	547	0,0	548	0,0	547	99,6	99,8	99,6	549
Mesureur 14	1,4	1,4	0,7	566	0,4	554	0,0	558	0,2	554	97,5	98,6	97,7	566
Mesureur 15	1,9	1,9	0,4	522	0,2	512	0,2	512	0,2	512	97,9	97,9	97,9	522
Mesureur 16	0,2	0,2	0,0	439	0,0	438	0,0	438	0,0	438	99,8	99,8	99,8	439
Mesureur 17	0,7	0,7	0,2	581	0,0	577	0,3	577	0,2	577	99,3	99,0	99,1	581
Mesureur 18	3,6	3,6	1,5	750	0,1	719	0,0	723	0,0	719	95,7	96,4	95,9	750
Mesureur 19	0,0	0,0	0,8	259	0,4	257	0,4	259	0,4	257	98,8	99,6	98,8	259
Mesureur 20	1,2	1,2	0,1	683	0,1	674	0,0	675	0,0	674	98,5	98,8	98,7	683
Mesureur 21	0,0	0,0	2,7	482	1,9	469	0,4	482	0,2	469	95,4	99,6	97,1	482
Mesureur 22	0,0	0,0	1,5	609	2,0	600	2,5	609	0,2	600	96,6	97,5	98,4	609
Mesureur 23	1,4	1,4	0,2	424	0,2	418	1,0	418	0,5	418	98,3	97,6	98,1	424
Mesureur 24	0,5	0,5	21,8	371	0,0	288	0,0	369	0,0	288	77,6	99,5	77,6	371
Mesureur 25	0,0	0,0	0,5	204	0,0	203	1,0	204	0,0	203	99,5	99,0	99,5	204
Mesureur 26	0,3	0,3	0,2	620	0,3	617	1,0	618	0,2	617	99,2	98,7	99,4	620
Mesureur 27	1,9	1,6	5,8	310	0,7	286	0,7	304	0,3	287	91,6	97,4	92,3	310
Ensemble	1,3	1,3	1,2	15 404	0,4	15 046	0,4	15 209	0,1	15 047	97,3	98,4	97,6	15 404

[1] La taille de l'enfant en centimètres est manquante, l'enfant n'était pas présent, l'enfant a refusé et code résultat 'autre'
[2] Le poids de l'enfant en kilogrammes est manquant, l'enfant n'était pas présent, l'enfant a refusé et code résultat 'autre'
[3] Date de naissance incomplète ; une date de naissance complète comprend le jour/mois/année ou le mois/année
[4] Les cas non plausibles pour la taille-pour-âge sont définis comme plus de 6 écarts type (ET) au-dessus ou en-dessous de la médiane de la population de référence (Z-scores) basé sur les Normes OMS de la croissance de l'enfant parmi les enfants dont les données sur la taille et sur le mois/année de naissance sont complètes.
[5] L'âge complet est obtenu à partir du mois et de l'année de naissance.
[6] Les cas non plausibles pour le poids-pour-taille sont définis comme plus de 5 écarts type (ET) au-dessus ou en-dessous de la médiane de la population de référence (Z-scores) basé sur les Normes OMS de la croissance de l'enfant parmi les enfants dont les données sur le poids et sur le mois/année de naissance sont complètes.
[7] Les cas non plausibles pour le poids-pour-âge sont définis comme plus de 6 ET en-dessous ou 5 ET au-dessus de la médiane de la population de référence (Z-scores) basé sur les Normes OMS de la croissance de l'enfant parmi les enfants dont les données sur le poids et sur le mois/année de naissance sont complètes.
[8] Pas de données manquantes, incomplètes ou non plausibles
[9] Y compris les enfants dont la mère est décédée
[10] Pour les femmes qui ne sont pas interviewées, les informations proviennent du Questionnaire Ménage. Non compris les enfants dont la mère n'est pas listée dans le Questionnaire Ménage.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau C.9 Mesures de la taille à partir d'un sous-échantillon aléatoire d'enfants mesurés

Différences entre la première et la deuxième mesure de la taille parmi les enfants de moins de 5 ans (0–59 mois) sélectionnés aléatoirement et remesurés, selon la région et le mesureur (non pondéré), EDSM-VII Mali 2023–2024

Région et mesureur	Différence médiane des mesures de la taille[1]	Pourcentage des mesures de la taille avec une différence >1 cm	Nombre d'enfants sélectionnés aléatoirement et remesurés
Région[2]			
Kayes	0,332	19,4	103
Koulikoro	0,283	17,0	106
Sikasso	0,184	6,3	95
Ségou	0,266	9,9	101
Mopti	0,321	11,5	78
Tombouctou	0,241	15,3	118
Gao	0,131	12,5	72
Kidal	†	†	18
Bamako	0,182	8,7	104
Mesureur			
Mesureur 1	0,240	20,0	35
Mesureur 2	0,232	11,8	34
Mesureur 3	0,725	26,5	34
Mesureur 4	0,400	16,7	30
Mesureur 5	0,240	24,2	33
Mesureur 6	0,260	13,8	29
Mesureur 7	0,267	17,2	29
Mesureur 8	0,186	6,7	30
Mesureur 9	0,138	3,4	29
Mesureur 10	0,238	0,0	21
Mesureur 11	0,264	3,8	26
Mesureur 12	0,175	8,7	23
Mesureur 13	0,383	11,5	26
Mesureur 14	0,250	14,3	28
Mesureur 15	0,210	11,8	34
Mesureur 16	0,214	11,8	34
Mesureur 17	0,138	0,0	34
Mesureur 18	0,144	2,9	35
Mesureur 19	0,350	11,1	18
Mesureur 20	0,575	24,0	25
Mesureur 21	0,490	25,0	36
Mesureur 22	0,157	2,6	38
Mesureur 23	0,114	10,7	28
Mesureur 24	0,000	4,2	24
Mesureur 25	0,250	11,1	18
Mesureur 26	0,817	18,2	44
Mesureur 27	0,450	25,0	20
Ensemble	0,231	12,7	795

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 10 enfants, qui est le nombre minimum d'enfants nécessaire pour calculer l'erreur technique de mesure.

[1] Différence médiane absolue entre la première et la deuxième mesure de la taille en centimètres du mesureur

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau C.10 Interférence dans les mesures du poids des enfants

Parmi les enfants de moins de 5 ans dont le poids ont été mesurés, pourcentage d'enfants qui ne portaient pas de vêtements légers ou qui portaient des accessoires lourds difficilement retirables durant la prise des mesures, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, (non pondéré), EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'enfants qui ne portaient pas de vêtements légers ou qui portaient des accessoires lourds, difficilement retirables, pendant la mesure du poids	Effectif d'enfants
Âge en mois		
<6	1,2	1 639
6–11	1,0	1 453
12–23	0,8	2 937
24–35	0,7	3 145
36–47	0,5	3 137
48–59	0,5	3 093
0–23	0,9	6 029
24–59	0,6	9 375
Sexe		
Masculin	0,6	7 746
Féminin	0,8	7 658
Résidence		
Bamako	1,0	1 549
Autre urbain	0,9	2 118
Ensemble urbain	1,0	3 667
Rural	0,6	11 737
Région[1]		
Kayes	0,0	2 376
Koulikoro	0,9	2 463
Sikasso	0,2	2 240
Ségou	1,1	2 054
Mopti	0,1	1 695
Tombouctou	0,9	1 711
Gao	2,1	1 112
Kidal	†	204
Bamako	1,0	1 549
Mesureur		
Mesureur 1	0,0	737
Mesureur 2	0,0	1 052
Mesureur 3	0,2	586
Mesureur 4	2,1	623
Mesureur 5	0,5	803
Mesureur 6	0,7	673
Mesureur 7	0,3	675
Mesureur 8	0,2	587
Mesureur 9	0,1	731
Mesureur 10	0,2	563
Mesureur 11	0,4	553
Mesureur 12	3,9	415
Mesureur 13	0,0	549
Mesureur 14	0,5	566
Mesureur 15	2,1	522
Mesureur 16	0,2	439
Mesureur 17	0,7	581
Mesureur 18	0,1	750
Mesureur 19	0,0	259
Mesureur 20	0,0	683
Mesureur 21	1,2	482
Mesureur 22	0,7	609
Mesureur 23	0,9	424
Mesureur 24	3,2	371
Mesureur 25	2,5	204
Mesureur 26	1,1	620
Mesureur 27	2,3	310
Ensemble	0,7	15 404

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau C.11 Interférence dans les mesures du poids et de la taille des femmes

Parmi les femmes de 15–49 ans dont le poids et la taille ont été mesurés, pourcentage de femmes dont le style de coiffure ou le port d'accessoires ont interféré avec la mesure de la taille et pourcentage de femmes qui ne portaient pas de vêtements légers ou qui portaient des accessoires lourds et difficilement retirables pendant la mesure du poids, selon certaines caractéristiques sociodémographiques (non pondéré), EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes qui ne portaient pas de vêtements légers ou qui portaient des accessoires lourds difficilement retirables pendant la mesure du poids	Effectif de femmes
Âge		
15–19	3,7	1 988
20–29	3,0	3 146
30–39	3,1	2 218
40–49	2,4	1 350
Résidence		
Bamako	2,9	1 210
Autre urbain	4,1	1 354
Rural	2,9	6 138
Région[1]		
Kayes	1,5	1 359
Koulikoro	3,9	1 385
Sikasso	3,1	1 177
Ségou	2,4	1 138
Mopti	2,4	873
Tombouctou	1,8	893
Gao	9,8	569
Kidal	†	98
Bamako	2,9	1 210
Mesureur		
Mesureur 1	1,5	458
Mesureur 2	1,9	580
Mesureur 3	0,6	321
Mesureur 4	9,0	335
Mesureur 5	4,1	464
Mesureur 6	1,3	385
Mesureur 7	0,0	374
Mesureur 8	2,8	362
Mesureur 9	6,2	357
Mesureur 10	1,5	269
Mesureur 11	1,3	301
Mesureur 12	3,1	254
Mesureur 13	4,2	330
Mesureur 14	0,4	273
Mesureur 15	3,0	401
Mesureur 16	1,5	396
Mesureur 17	4,2	409
Mesureur 18	3,6	336
Mesureur 19	4,9	183
Mesureur 20	0,0	354
Mesureur 21	1,1	264
Mesureur 22	2,3	263
Mesureur 23	10,2	226
Mesureur 24	8,4	179
Mesureur 25	4,1	98
Mesureur 26	1,9	366
Mesureur 27	11,0	164
Ensemble	3,1	8 702

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau C.12 Concentration dans les mesures anthropométriques pour les enfants (préférence numérique)

Répartition des mesures du poids et de la taille/longueur par chiffre décimal enregistré (non pondéré), EDSM-VII Mali 2023–2024

	Poids		Taille ou longueur	
Chiffre	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
0	1 488	9,7	1 305	8,5
1	1 456	9,5	1 516	9,9
2	1 635	10,7	1 987	13,0
3	1 553	10,2	1 799	11,8
4	1 566	10,2	1 697	11,1
5	1 661	10,9	1 798	11,8
6	1 530	10,0	1 516	9,9
7	1 395	9,1	1 425	9,3
8	1 492	9,8	1 212	7,9
9	1 522	9,9	1 041	6,8
Total	15 298	100,0	15 296	100,0
Index de dissimilarité[1]	na	1,9	na	7,6

Note : Le tableau inclut tous les enfants avec des mesures du poids et de la taille/longueur, sans tenir compte de la complétude des informations sur la date de naissance et des cas avec des données non plausibles. Les mesures du poids et de la taille /longueur sont enregistrées avec un chiffre décimal.
na = non applicable
[1] L'index de dissimilarité est une mesure de la préférence numérique, qui est calculé comme la moitié de la somme des différences absolues entre le pourcentage observé et le pourcentage attendu. Il peut être interprété comme le pourcentage de valeurs qu'il faudrait redistribuer pour obtenir une distribution uniforme.

Tableau C.13 Observation des moustiquaires

Pourcentage de toutes les moustiquaires observées par les enquêteurs, selon certaines caractéristiques (pondéré), EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique	Pourcentage de moustiquaires ayant été observées par les enquêteurs	Nombre de moustiquaires
Résidence		
Bamako	86,5	3 609
Autre urbain	91,1	4 309
Ensemble urbain	89,0	7 919
Rural	87,1	30 039
Région[1]		
Kayes	92,3	5 739
Koulikoro	83,9	8 465
Sikasso	82,7	8 050
Ségou	90,5	7 310
Mopti	91,5	3 673
Tombouctou	95,0	412
Gao	95,0	690
Kidal	†	9
Bamako	86,5	3 609
Quintile de bien-être économique		
Le plus bas	89,3	8 199
Second	87,6	7 915
Moyen	88,8	7 644
Quatrième	87,8	7 397
Le plus élevé	83,4	6 803
Ensemble	87,5	37 958

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau C.14 Observation des installations sanitaires pour le lavage des mains

Répartition (en %) des installations sanitaires pour le lavage des mains dans tous les ménages selon que l'installation a été observée ou non par les enquêteurs, selon certaines caractéristiques (pondéré), EDSM-VII Mali 2023–2024

	Installation pour le lavage des mains observée		Installation pour le lavage des mains non observée				
Caractéristique	Endroit fixe	Endroit mobile	Pas dans le logement, la cour ou la parcelle	N'a pas eu la permission d'observer	Autre raison	Total	Effectif de ménages
Résidence							
Bamako	17,6	70,1	12,1	0,1	0,0	100,0	1 509
Autre urbain	12,5	63,3	22,7	0,8	0,6	100,0	1 171
Ensemble urbain	15,4	67,1	16,7	0,4	0,3	100,0	2 680
Rural	5,7	71,0	22,4	0,5	0,4	100,0	6 987
Région[1]							
Kayes	5,4	79,3	13,3	1,3	0,7	100,0	1 305
Koulikoro	7,2	72,0	19,9	0,4	0,4	100,0	2 053
Sikasso	6,3	61,8	31,4	0,1	0,4	100,0	1 631
Ségou	6,7	64,0	28,5	0,6	0,3	100,0	1 632
Mopti	9,4	83,3	6,8	0,4	0,1	100,0	895
Tombouctou	6,3	43,8	48,7	1,1	0,1	100,0	248
Gao	4,1	71,2	22,5	1,0	1,2	100,0	387
Kidal	†	†	†	†	†	100,0	7
Bamako	17,6	70,1	12,1	0,1	0,0	100,0	1 509
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	3,8	69,7	25,8	0,4	0,4	100,0	1 487
Second	3,3	71,5	24,3	0,6	0,3	100,0	1 751
Moyen	3,9	73,3	21,6	0,6	0,6	100,0	2 062
Quatrième	7,1	70,6	21,1	0,8	0,4	100,0	2 318
Le plus élevé	22,1	64,5	13,2	0,1	0,2	100,0	2 050
Ensemble	8,4	69,9	20,8	0,5	0,4	100,0	9 667

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau C.15 Fréquentation scolaire par année d'âge

Répartition (en %) de la population de droit âgée de 4–24 ans par niveau et classe d'enseignement fréquenté pendant l'année scolaire en cours (pondéré), EDSM-VII Mali 2023–2024

Âge en années au début de l'année scolaire	Ne fréquente pas l'école	Un programme d'éducation préscolaire	Classe d'enseignement primaire						Classe d'enseignement secondaire				Supérieur	Ne sais pas	Total	Effectif de personnes de 4–24 ans
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4				
4	81,0	13,5	4,3	0,7	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	100,0	2 998
5	68,6	7,1	19,4	3,9	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	100,0	3 037
6	52,5	1,9	25,7	14,7	3,4	0,8	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,5	100,0	3 192
7	40,2	0,3	18,6	22,0	14,4	3,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,6	100,0	3 073
8	34,5	0,1	7,8	20,7	21,8	12,0	2,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	100,0	2 775
9	33,2	0,1	3,8	11,6	19,3	20,5	9,2	1,6	0,3	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	100,0	2 559
10	37,3	0,0	1,7	6,8	12,3	17,4	15,2	7,4	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	2 656
11	34,2	0,0	1,3	2,9	7,1	13,9	15,9	15,1	7,5	1,4	0,3	0,0	0,0	0,3	100,0	2 316
12	40,4	0,0	0,3	1,2	4,2	9,2	12,9	14,4	11,0	5,2	0,8	0,0	0,0	0,3	100,0	2 581
13	40,9	0,0	0,4	0,9	2,1	5,8	9,4	12,5	12,5	8,5	6,5	0,0	0,0	0,4	100,0	2 431
14	48,9	0,0	0,2	0,6	0,8	3,2	5,3	6,8	11,7	10,8	10,9	0,0	0,0	0,9	100,0	1 991
15	51,9	0,0	0,0	0,2	0,4	0,7	2,4	5,8	11,0	11,7	15,0	0,1	0,0	0,8	100,0	1 799
16	58,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	1,3	2,8	6,9	11,5	18,1	0,0	0,6	0,3	100,0	1 683
17	62,5	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,5	5,4	9,9	18,1	0,1	1,3	0,3	100,0	1 580
18	71,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	3,3	6,0	14,0	0,4	3,9	0,3	100,0	1 568
19	74,9	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	1,7	3,4	14,4	0,3	4,1	0,6	100,0	1 318
20	77,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,3	1,8	2,1	7,8	1,5	8,0	0,7	100,0	1 582
21	83,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,7	0,8	7,1	0,8	7,0	0,0	100,0	1 166
22	85,7	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,8	1,1	3,9	0,4	7,5	0,0	100,0	1 169
23	90,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1	1,8	0,4	5,8	0,2	100,0	1 131
24[a]	92,5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	2,3	0,2	4,0	0,3	100,0	796

Note : L'âge au début de l'année scolaire est calculée en utilisant la date de début de l'année scolaire et, lorsqu'elles sont disponibles, les dates de naissance des membres du ménage. Pour les membres du ménage pour lesquels la date de naissance n'a pas été déclarée, une date de naissance est imputée en utilisant l'âge en années révolues au moment de l'enquête et la date de l'enquête. Les niveaux et les classes se réfèrent à l'année scolaire en cours ou à l'année scolaire la plus récente (si la collecte des données a été effectuée entre les années scolaires).

[a] Les personnes âgées de 25 ans au moment de l'interview qui avaient 24 ans au début de l'année scolaire sont exclues du tableau car la fréquentation actuelle n'a été recueillie que pour les personnes âgées de 4 à 24 ans au moment de l'interview.

Tableau C.16 Carnets de vaccination photographiés

Pourcentage d'enfants de moins de 3 ans pour lesquels on a déclaré posséder un carnet de vaccination, pourcentage pour lesquels le carnet de vaccination a été vu par l'enquêteur, pourcentage pour lesquels le carnet de vaccination a été photographié ou n'a pas été photographié selon la raison ; parmi les enfants avec un carnet qui a été vu, pourcentage de carnets photographiés, selon certaines caractéristiques sociodémographiques (pondéré), EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique socio-démographique	Pourcentage d'enfants pour lesquels on a déclaré posséder un carnet de vaccination	Pourcentage d'enfants pour lesquels le carnet de vaccination a été vu par l'enquêteur	Pourcentage d'enfants pour lesquels le carnet de vaccination a été photographié	Pourcentage d'enfants pour lesquels le carnet de vaccination n'a pas été photographié car la permission n'a pas été accordée	Pourcentage d'enfants pour lesquels le carnet de vaccination n'a pas été photographié pour d'autres raisons	Effectif d'enfants	Parmi les enfants dont le carnet de vaccination a été vu	
							Pourcentage de carnets de vaccination photographiés	Effectif d'enfants
Âge en mois								
0–11	77,7	72,9	72,6	0,2	0,1	3 235	99,6	2 357
12–23	78,9	67,9	67,6	0,3	0,1	2 892	99,5	1 964
24–35	69,0	51,5	51,2	0,2	0,1	3 018	99,4	1 555
Résidence								
Bamako	87,7	71,6	71,3	0,3	0,0	1 063	99,5	762
Autre urbain	78,1	66,3	65,7	0,5	0,1	899	99,0	596
Ensemble urbain	83,3	69,2	68,7	0,4	0,0	1 962	99,3	1 357
Rural	72,9	62,9	62,7	0,2	0,1	7 183	99,6	4 519
Région[1]								
Kayes	63,7	53,4	53,3	0,0	0,1	1 411	99,9	753
Koulikoro	82,5	67,1	66,9	0,1	0,2	2 155	99,6	1 447
Sikasso	78,5	70,5	69,9	0,5	0,1	1 822	99,2	1 285
Ségou	73,4	66,5	66,4	0,2	0,0	1 462	99,8	972
Mopti	69,5	60,7	60,6	0,1	0,0	840	99,9	510
Tombouctou	36,4	21,6	21,0	0,4	0,2	127	97,2	28
Gao	50,8	45,7	44,5	1,3	0,0	261	97,2	119
Kidal	†	†	†	†	†	4	†	1
Bamako	87,7	71,6	71,3	0,3	0,0	1 063	99,5	762
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	72,6	65,0	64,6	0,3	0,1	1 895	99,4	1 232
Second	69,9	61,2	61,0	0,2	0,0	1 937	99,6	1 186
Moyen	69,5	59,7	59,6	0,1	0,1	1 830	99,8	1 092
Quatrième	78,6	67,0	66,6	0,4	0,0	1 838	99,4	1 231
Le plus élevé	86,8	69,0	68,6	0,2	0,2	1 645	99,5	1 135
Ensemble	75,2	64,3	63,9	0,2	0,1	9 145	99,5	5 876

Note : Les carnets de vaccination incluent les cartes, les carnets ou d'autres enregistrements conservés à la maison.
† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau C.17.1 Prévalence de l'anémie chez les enfants selon les directives 2011 de l'OMS

Pourcentage d'enfants de 6–59 mois considérés comme étant atteints d'anémie en utilisant les directives originales de l'OMS, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Anémie selon le niveau d'hémoglobine				Effectif d'enfants de 6–59 mois
	Anémie (<11.0 g/dl)	Légère (10.0–10.9 g/dl)	Modérée (7.0–9.9 g/dl)	Sévère (<7.0 g/dl)	
Âge en mois					
6–11	76,6	25,4	49,4	1,9	783
12–23	85,7	23,8	59,5	2,4	1 568
24–35	79,7	28,1	49,7	1,9	1 682
36–47	66,9	29,3	36,1	1,5	1 563
48–59	55,5	28,7	26,2	0,6	1 560
6–23	82,7	24,3	56,2	2,2	2 350
24–59	67,7	28,7	37,7	1,3	4 805
Sexe					
Masculin	73,6	25,9	46,3	1,5	3 604
Féminin	71,6	28,6	41,2	1,8	3 551
Interview de la mère					
Interviewée	73,2	27,3	44,3	1,6	6 630
Mère non interviewée et vivant dans le ménage	63,8	25,4	37,9	0,5	168
Mère non interviewée et ne vivant pas dans le ménage[1]	66,2	27,8	35,3	3,1	358
Résidence					
Bamako	66,1	34,5	30,7	1,0	791
Autre urbain	68,7	29,5	37,6	1,5	651
Ensemble urbain	67,3	32,3	33,8	1,2	1 442
Rural	74,0	26,0	46,3	1,7	5 712
Région[3]					
Kayes	79,8	26,7	50,3	2,8	1 039
Koulikoro	73,7	24,0	48,7	1,0	1 718
Sikasso	72,7	28,2	42,6	1,9	1 430
Ségou	73,6	26,7	45,3	1,6	1 150
Mopti	67,8	26,9	39,4	1,6	654
Tombouctou	66,0	29,2	35,7	1,2	143
Gao	67,2	25,5	38,9	2,8	227
Kidal	†	†	†	†	3
Bamako	66,1	34,5	30,7	1,0	791
Niveau d'instruction de la mère[2]					
Aucun	75,4	27,0	46,8	1,7	4 048
Primaire	73,3	26,4	45,3	1,6	1 204
Secondaire ou plus	66,3	28,5	36,5	1,3	1 545
Quintile de bien-être économique					
Le plus bas	73,7	25,2	46,5	2,0	1 631
Second	76,1	26,3	48,2	1,5	1 524
Moyen	76,1	27,6	46,3	2,1	1 407
Quatrième	70,3	25,6	43,0	1,7	1 362
Le plus élevé	65,5	32,4	32,3	0,7	1 231
Ensemble	72,6	27,2	43,7	1,6	7 155

Note : Le tableau est basé sur les enfants qui ont passé la nuit ayant précédé l'interview dans le ménage et qui ont été testés pour l'anémie. La prévalence de l'anémie, basée sur le niveau d'hémoglobine, est ajustée en fonction de l'altitude en utilisant les formules du CDC, 1998 et seuils définis dans OMS, 2017. Hémoglobine est en grammes par décilitre (g/dl) en utilisant l'appareil HemoCue 201+.

[1] Y compris les enfants dont la mère est décédée

[2] Pour les femmes qui n'ont pas été interviewées, l'information provient du questionnaire Ménage. Non compris les enfants dont la mère n'est pas listée dans le questionnaire Ménage.

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

Tableau C.17.2 Prévalence de l'anémie chez les femmes selon les directives 2011 de l'OMS

Pourcentage de femmes de 15–49 ans considérés comme étant atteintes d'anémie en utilisant les directives originales de l'OMS, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDSM-VII Mali 2023–2024

Caractéristique sociodémographique	Anémie selon le niveau d'hémoglobine				Effectif de femmes
	Anémie	Légère	Modérée	Sévère	
	Non enceinte	<12.0 g/dl	11.0–11.9 g/dl	8.0–10.9 g/dl	<8.0 g/dl	
	Enceinte	<11.0 g/dl	10.0–10.9 g/dl	7.0–9.9 g/dl	<7.0 g/dl	
Âge					
15–19	49,4	23,5	24,4	1,5	1 924
20–29	47,7	22,0	24,3	1,4	3 168
30–39	47,0	21,0	24,3	1,7	2 206
40–49	47,8	22,0	23,6	2,2	1 362
Nombre d'enfants déjà nés					
0	46,9	22,1	22,6	2,2	2 125
1	46,7	20,1	25,5	1,1	1 095
2–3	48,9	22,5	25,1	1,4	1 959
4–5	46,9	22,6	23,0	1,3	1 569
6+	49,6	22,4	25,4	1,8	1 912
Maternité					
Enceinte	57,6	24,5	31,5	1,6	902
Non enceinte[1]	46,8	21,8	23,4	1,6	7 758
Utilise un DIU					
Oui	46,2	13,0	30,2	2,9	63
Non	47,9	22,2	24,2	1,6	8 597
Résidence					
Bamako	39,7	21,3	16,5	1,9	1 344
Autre urbain	41,7	19,5	20,9	1,3	984
Ensemble urbain	40,6	20,5	18,4	1,7	2 328
Rural	50,6	22,7	26,4	1,6	6 333
Région[2]					
Kayes	58,1	22,7	32,3	3,2	1 317
Koulikoro	51,5	22,8	28,0	0,7	2 016
Sikasso	46,3	22,6	22,4	1,3	1 569
Ségou	46,7	21,4	23,6	1,6	1 297
Mopti	42,5	23,6	17,9	1,0	734
Tombouctou	37,5	13,1	20,5	3,9	139
Gao	48,6	18,3	27,8	2,5	241
Kidal	†	†	†	†	3
Bamako	39,7	21,3	16,5	1,9	1 344
Niveau d'instruction					
Aucun	51,5	22,2	27,2	2,0	4 637
Primaire	47,4	24,2	22,0	1,2	1 507
Secondaire ou plus	41,8	20,6	20,1	1,2	2 516
Quintile de bien-être économique					
Le plus bas	51,6	22,7	27,4	1,5	1 566
Second	54,4	22,7	29,8	1,9	1 591
Moyen	49,3	22,1	25,4	1,8	1 631
Quatrième	47,5	23,3	23,0	1,3	1 818
Le plus élevé	39,4	20,1	17,6	1,6	2 054
Ensemble	47,9	22,1	24,2	1,6	8 660

Note : La prévalence, de l'anémie, basée sur le niveau d'hémoglobine, est ajustée en fonction de l'altitude et du fait de fumer, ou non, des cigarettes, si l'information est disponible, en utilisant les formules du CDC, 1998 et les seuils définis dans WHO, 2017. L'hémoglobine est mesurée en grammes par décilitre (g/dl) en utilisant l'appareil HemoCue 201+.

[1] Y compris les femmes qui ne savent pas si elles sont enceintes

† Les données de la région de Kidal ne sont pas représentatives de toute la région ; elles sont prises en compte dans l'ensemble des résultats et contribuent à l'estimation des indicateurs au niveau national mais elles ne sont pas présentées séparément.

PERSONNEL DE LA SEPTIÈME ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ DU MALI DE 2023–2024

Annexe D

COORDINATION NATIONALE

Coordination nationale

Moussa KAMISSOKO
Arouna SOUGANE
Issa BOUARE
Issa TRAORE

Coordination technique

Siaka CISSE
Diakaridia SAMAKE
Aminata COULIBALY
Idrissa DIABATE

Supervision technique

Amadou KONE
Amadou TRAORE
Sira TRAORE
Ankoundia Gaston SODIO
Kissima SIDIBE
Abdoul Karim DIAWARA
Sory DIAKITE
Abdoulaye DIARRA
Fanta H. TRAORE
Yacouba COULIBALY
Massa DIAKITE
Mamadou DRABO
Samba M.S. KEITA

Equipe d'édition

Sédou DEMBELE
Daouda BERTHE
Boubakar KONTAGA
Yaya KONARE
Habiboulaye COULIBALY
Mahamane Kalil CISSE

Appui administratif

Bintou TOGOLA
Bathieno CHARLES
Diaraba COULIBALY
Youssouf DIALLO
Mouhamed COULIBALY

Gestion financière

Christine EYOUP
Aminata KOSSOUBA

COORDINATION RÉGIONALE

Mahamadou Hamada MAIGA
Oumar TRAORE
Toua Ag HABALLA
Amadou NIARE
Seydou Makan KEITA
Dippa TRAORTE
Tahibou SISSOKO
Moussa DEMBELE
Halidou MAIGA
Amadou DIAWARA
Mme DEMBELE Djénèba dite Elisa TANGARA

CARTOGRAPHIE ET DÉNOMBREMENT

Agents cartographes

Fono COULIBALY
Siaka DIAKITE
Abdoulaye H DIALLO
Hamidou DIALLO
Nawe DIARRA
Sayon DJONFAGA
Aguibou DOUMBIA
Youssouf DOUMBIA
Idrissa FOFANA
Lassana KAREMBE
Bibi KEITA
Modibo KEITA
Mohamed Lamine KEITA
Mamadou KOKAINA
Daouda KONATE
Yaya KONATE
Souleymane KONE
Tenemakan KONE
Boubacar Sidi MAIGA
Moussa MAIGA
Alassane SISSOKO
Abdoulaye SOW

Alou TRAORE
Ibrahima TRAORE
Bangaly Fodé DOUMBIA
Issa COULIBALY
Sayon DIALLO
Fousseyni DIARRA
Amadou MAIGA
Daouda TOGO
Adama CISSE

Agents énumérateurs

Moustapha BANOU
Oumar BALLO
Alou COULIBALY
Boubacar DAOU
Tiamboigui D. DEMBELE
Diakaridja DIAKITE
Mamadou DIALLO
Seydou DIALLO
Drissa DIARRA
Mohamed Wassa DIARRA
Fousseyni DIAWARA
Yacouba DIAWARA
Bintou DIENG
Freud DJOTINDAGBA
Fodé DOUMBIA
Gaoussou DOUMBIA
Souleymane KANE
Mamadou Alpha LY
Modibo MAIGA
Sidy OUSMANE
Faly SOUMAHORO
Oumar SOUMAHORO
Seydou TOURE
Djibril TRAORE
Adama YATTARA
Mamoudou CISSE
Sinimory KEITA
Alassane KOITA
Sékou SAO
Issiaka SIDIBE

PERSONNEL ENQUÊTE PILOTE

Chefs d'équipe

Salif TRAORE, Boubacar S. COULIBALY, Sadou ONGOIBA,
Hamidou DIAKITE et Tiekoro DOUMBIA

Agents enquêteurs

Maimouna COULIBALY
Diouma DIARRA
Awa SYLLA
Habibatou DOUMBIA
Fanta TRAORE
Fatoumata SIMPARA
Aminata FOFANA
Nene Satourou THIAM
Fatim FOFANA
Assétou GUINDO
Fatoumata TRAORE
Alima BENGALY
Nene KEITA
Boutou DIALLO
Fatoumata SAMAKE
Abdoul Abas DIA
Fousseni DIARRA
Adama COULIBALY
Boubacar HAIDARA
Fally KAMISSOKO
N'tio Gabiel CISSE
Mouhamed SOUMAORO
Nar N'DIAYE
Mamadou T. COULIBALY
Issa DIALLO
Oumar BEMBELE
Issa BAGAYOKO
Seyba FOFANA
Mariam D. TRAORE
Yacouba DIAKITE

PERSONNEL ENQUÊTE PRINCIPALE

Chefs d'équipe

Issa DIALLO
Fally KAMISSOKO
Boubacar HAIDARA
Daouda SISSOKO
Marc Mariba COULIBALY
Hamidou DIAKITE
Sadou ONGOIBA
Aboubacar BERTHE
N'tio Gabiel CISSE
Yacouba DIAKITE
Tiekoro DOUMBIA
Mohamed SOUMAORO
Zibeyrou TRAORE
Aboubacar Sidiki BERTHE
Boubacar S. COULIBALY
Adama COULIBALY
Salif TRAORE
Tidiani KASSOGUE
Bakary SIBOLIEN
Amadou DIALLO
Agaly ASSADECK
Abdallahi ALHOUSSENI
Kissima DIAKITE
Abdoulaye M. TOURE
Mohamed OULD MATALA
Saloum Oumar CISSE
Souleymane AGALY

Agents enquêteurs

Oumar KEITA
Djénéba BACIA
Nakana SIDIBE
Maman DIARRA
Kadidia Founè DIARRA
Ibrahima DIABATE
Broulaye CAMARA
Kadidia DIARRA
Mariam SYLLA
Nene KEITA
Nar N'DIAYE
Abraham MOUNKORO
Mahamadou DIALLO N'Tjou
Awa SYLLA
Habibatou DOUMBIA
Douka DIARRA
Abdoul Abas DIA
Abdoul Bassitou ADEDJOUMA
Zoumana COULIBALY
Aissata COULIBALY
Fatoumata C. TRAORE
Assétou GUINDO
Fatoumata BEREDOGO
Ibrahim KAMPO
Meme TRAORE
Diaminatou OUATTARA
Fatoumata KONE
Mariam MAIGA
Djeneba BARRO
Noumakan CAMARA
Moussa TOGOLA
Fatim FOFANA
Djénébou DIAKITE
Aichatou ABBA
Moussocoura TRAORE
Daouda COULIBALY
Oumar BEMBELE
Ntintio BOUGOUDOGO
Aminata BAGAYOKO
Barofa DIALLO
Seydou KALAPO
Sira KOUYATE
Sinaly COULIBALY
Korotoum SANOGO
Narama TOURE
Aminata B. COULIBALY
Aminata KONTAO
Fousseyni KEITA
Bassirou DOUMBIA
Djélika TRAORE
Kadiatou Sira TRAORE
Assitan KANTE
Fatoumata B. CAMARA
Souleymane DIABATE
Douatigui SOGOBA
Boutou DIALLO
Aissata KONE
Astan SACKO
Sanata OUATTARA
Modibo KASSONGUÉ
Adama Logalo COULIBALY
Fatoumata SAMAKE
Kadiatou D. COULIBALY
Yatimé Françoise TOGO
Issa BAGAYOKO
Aminata FOFANA
Mahmoud M. CAMARA
Biadaly DEMBELE
Sorofing SANGARE
Fatoumata DIARRA
Kankou KEITA
Mahmoud Bilaly SIDIBE
Seydou TRAORE
Aïssata SAMAKE
Fatoumata BATHILY
Djonsaba SIDIBE

Seyba FOFANA
Habybatou SISSOKO
Ousmane SAWADOGO
Tenin Kamissa TAGALA
Mamou KOUYATE
Ramata DEMBELE
Youssouf COULIBALY
Aichatou KAMISSOKO
Boubacar Siddik DAGNO
Néné Satourou THIAM
Diouma DIARRA
Djénéba TRAORE
Fatoumata SIMPARA
Mariam D. TRAORE
YOUSSOUF KAMENA
Rokia TRAORE
Fanta TRAORE
Maimouna COULIBALY
Davine Morine MONTHE MIEMANANG
Mamadou T. COULIBALY
Seydou SISSOKO
Zenaïbou SYLLA
Djeneba TERETA
Balkissa MAIGA
Fatoumata Binta SOUMARE
Mohamed KONE
Saada DJIRE
Aissata MAIGA
Kany DIAKITE
Rokia DIALLO
Hawa COULIBALY
Alimatou KEITA
Ibrahima A. MAIGA
Mariam TAMBOURA
Assitan DIALLO
Fatoumata BOCOUM
Bintou Niamoye TRAORE
Zoumana FOFANA
Moribacoro KEITA
Hawa NIAMBELE
Fatoumata Bannel DIA
Safiatou DIALLO
Oumou Koulssoum NIARE

Lamine SIDIBE
Idrissa Abdoulaye MAIGA
Bintou DICKO
Oumou KEITA
Lala SIDI ADIAWIYAKOYE
Mohamed A. YATTARA
Sidy Aly TRAORE
Mohamed CHABANE
Aissata DICKO
Zeinabou ALLASANE
Agaichatou A. CISSE
Almoubareck BOUDJOUMA
Fatoumata Walet ALDJOU
Alassane ISSIAKA
Adizatou wellet MOHAMED
Arhamatou AGALY
Maimouna TRAORE
Moussa MAIGA
Ousmane MAIGA
Harouna MOHAMED
Zeinabou MOUSSA
Adama ABDOURAHAMANE
Aissata BONCANA
Acheick Agoumour MAIGA
Boncane ASSADECK
Aboubacrine Ag BILAL
Hachamchtou Aliou CISSE
Amoudjamilatou A. MAIGA
Tahone WALET ADJI
Rafi Walet INORAGHE
Ibrahim DIALLO
Sahi ag MOHAMAD
Haoua KASSOGUE
Nafissa ADIAWIAKOY
Tonfo TANDINA
Oumar MAIGA
Fatalmoudou CISSE
Allaye Ould MOHAMED
Aissata Walet ALHAD
Halimatou MAIGA
Salamata TOURE
Aminata Hamany CISSE
Hassane O. MOUGANI

PERSONNEL DE LA SANTÉ IMPLIQUÉ DANS LA FORMATION

Moussa ABDOULAHI
Yacouba COULIBALY
Diakaridia SAMAKE

Mariame T. TRAORE
Ibrahima CISSE
Seybou COULIBALY

RÉDACTION DU RAPPORT SUR LES INDICATEURS CLÉS

Siaka CISSE
Diakaridia SAMAKE
Allasseini BALAM
Ibrahima CISSE
Yacouba COULIBALY
Moussa Abdoulayahi MAIGA
Seybou COULIBALY
Ntji KEITA
Mariame TRAORE
Idrissa TRAORE
Aminata COULIBALY
Amadou KONE
Ankoundia Gaston SODIO
Kissima SIDIBE
Massa DIAKITE
Sira TRAORE

RÉDACTION DU RAPPORT FINAL

Siaka CISSE
Diakaridia SAMAKE
Allasseini BALAM
Ibrahima CISSE
Yacouba COULIBALY
Moussa Abdoulayahi MAIGA
Seybou COULIBALY
Ntji KEITA
Mariame TRAORE
Ousmane MAIGA
Lacine SOUNTOURA
Abdoulaye OUOLOGUEM
Idrissa TRAORE
Aminata COULIBALY
Amadou KONE
Ankoundia Gaston SODIO
Kissima SIDIBE
Massa DIAKITE
Sira TRAORE
Daouda Aba FANE
Sory DIAKITE
Yaya KONARE
Mohamed TANGARA

PERSONNEL D'ICF

Jean de Dieu BIZIMANA
Oumarou SANOU
Tinga SINARE
Amadou SOW
Guy Marino HINNOUHO
Souaibou MOUSSA
Aimee BENSON
Gregoire VOLNY
Alain HIEN
Ruilin REN
Paulo MEDINA
Chris GRAMER
Natalie SHATTUCK
Joan WARDELL
Johanna C. USEEM
Janet NUNEZ GIVENS
Trevor N. CROFT
Keith D. PURVIS
Ronnette P. NOLASCO
Victoria OWUSU ANSAH
Rose DONOHUE
Peter V. AKA
Monique C. BARRÈRE
Peter REDVERS-LEE
Livia S. MONTANA
Benjamin K. MAYALA
John CORRIGAN
Andrew DEGNIM
Emily ECKERT
Cameron A. TAYLOR
Olsen HANNER
Blake ZACHARY
Boaz ANGLADE
Yodit BEKELE
Joanna LOWELL
Rukundo BENEDICT
Sunita KISHOR
Annette McFARLAND

QUESTIONNAIRES

Annexe **E**

DATE: 12 nov 2023

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INSTAT)

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE SECTEUR SANTÉ, DEVELOPPEMENT SOCIAL ET PROMOTION DE LA FAMILLE (CPS/SSDSPF)

SEPTIÈME ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ AU MALI
EDSM-VII
QUESTIONNAIRE MÉNAGE

IDENTIFICATION

NOM DE LA LOCALITÉ _____

NOM DU CHEF DE MÉNAGE _____

NUMÉRO DE GRAPPE . . . . . [ ][ ][ ][ ]

NUMÉRO DE CONCESSION . . . . . [ ][ ][ ][ ]

NUMÉRO DU MÉNAGE . . . . . [ ][ ][ ][ ]

MÉNAGE SÉLECTIONNÉ POUR L'ENQUÊTE HOMME ? (1=OUI, 2=NON) . . . . . [ ]

VISITES D'ENQUÊTEURS

	1	2	3	VISITE FINALE
DATE	_____	_____	_____	JOUR [ ][ ] MOIS [ ][ ] ANNÉE [ ][ ][ ][ ]
NOM DE L'ENQUÊTEUR/ ENQUÊTRICE	_____	_____	_____	N° ENQUÊT [ ][ ][ ][ ]
RÉSULTAT*	_____	_____	_____	RÉSULTAT* [ ]
PROCHAINEDATE VISITE	_____	_____		NOMBRE TOTAL DE VISITES [ ]
HEURE	_____	_____		

*CODES RÉSULTAT :

1 REMPLI
2 PAS DE MEMBRE DU MÉNAGE À LA MAISON OU PAS D'ENQUÊTÉ COMPÉTENT À LA MAISON, AU MOMENT DE LA VISITE
3 MÉNAGE TOTALEMENT ABSENT POUR UNE LONGUE PÉRIODE
4 DIFFÉRÉ
5 REFUSÉ
6 LOGEMENT VACANT OU PAS DE LOGEMENT À L'ADRESSE
7 LOGEMENT DÉTRUIT
8 LOGEMENT NON TROUVÉ
9 AUTRE _____ (PRÉCISEZ)

TOTAL DE PERSONNES DANS LE MÉNAGE [ ][ ]

TOTAL DE FEMMES ÉLIGIBLES [ ][ ]

TOTAL D'HOMMES ÉLIGIBLES [ ][ ]

N° DE LIGNE DE L'ENQUÊTÉ POUR LE QUESTIONNAIRE MÉNAGE [ ][ ]

LANGUE DU QUESTIONNAIRE** [0][1] LANGUE DE L'INTERVIEW** [ ][ ] LANGUE MATERNELLE DE L'ENQUÊTÉ** [ ][ ] INTERPRÈTE (OUI = 1, NON = 2) [ ]

LANGUE DU QUESTIONNAIRE** **FRANÇAIS**

**CODES LANGUES :

01 FRANÇAIS
02 BAMBARA/MALINKÉ
03 SONRAÏ/DJERMA
04 PEUHL/FOULFOULDÉ
05 SÉNOUFO
06 MARKA/SONINKÉ
07 DOGON
08 MINIANKA
09 TAMACHECK
10 BOBO/DAFING
11 BOZO
96 AUTRE _____ (PRÉCISEZ)

ÉQUIPE [ ][ ] NUMÉRO

CHEF D'ÉQUIPE _____ NOM [ ][ ][ ][ ] NUMÉRO

CETTE PAGE EST LAISSÉE BLANCHE INTENTIONNELLEMENT

PRÉSENTATION ET DEMANDE DE CONSENTEMENT

Bonjour. Je m'appelle _____. Je travaille pour l'Institut National de la Statistique (INSTAT). En collaboration avec la Cellule de Planification et de Statistique Secteur Santé-Développement Social et Promotion de la Famille (CPS/SS-DS-PF), nous effectuons une enquête nationale sur la santé et sur d'autres sujets partout au Mali. Les informations que nous collectons aideront à améliorer les services de santé. Votre ménage a été sélectionné pour cette enquête. Nous voudrions vous poser quelques questions sur votre ménage. Les questions prennent habituellement entre 15 et 20 minutes. Toutes les informations que vous nous donnerez sont strictement confidentielles et elles ne seront transmises à personne d'autres que les membres de l'équipe d'enquête. Vous n'êtes pas obligé de participer à cette enquête, mais nous espérons que vous accepterez de répondre à nos questions car votre opinion est très importante. S'il arrivait que je pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, dites-le moi et je passerai à la question suivante ou vous pouvez également interrompre l'interview à n'importe quel moment. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'enquête, vous pouvez contacter les personnes figurant sur cette carte.

DONNEZ LA CARTE AVEC LES INFORMATIONS POUR CONTACTER CES PERSONNES

Avez-vous des questions à me poser ?
Puis-je commencer l'interview maintenant ?

SIGNATURE DE L'ENQUÊTEUR _____ DATE _____

L'ENQUÊTÉ ACCEPTE D'ÊTRE INTERVIEWÉ . . 1 ↓

L'ENQUÊTÉ REFUSE D'ÊTRE INTERVIEWÉ . . 2 → FIN

100	NOTEZ L'HEURE.	HEURES . . . . . MINUTES . . . . .

TABLEAU MENAGE

								SI 15 ANS OU PLUS			
N° LIGNE	RÉSIDENTS HABITUELS ET VISITEURS	LIEN AVEC LE CHEF DE MÉNAGE	SEXE	RÉSIDENCE		ÂGE	PLUS DE PERSONNES	ÉTAT MATRIMONIAL	ÉLIGIBILITÉ		
1	2	3	4	5	6	7	7-1	8	9	10	11
	S'il vous plait, donnez-moi les noms des personnes qui vivent habituellement dans votre ménage et des visiteurs qui ont passé la nuit dernière ici, en commençant par le chef de ménage. NOTEZ LE PRÉNOM DU CHEF DE MENAGE NOMS ET ENREGISTRÉ LE LIEN DE PARENTÉ ET LE SEXE POUR CHAQUE PERSONNE, POSEZ LES QUESTIONS 7A-7C POUR VOUS ASSURER QUE LA LISTE EST COMPLÈTE. POSEZ ENSUITE LES QUESTIONS DES COLONNES 8-35 POUR CHAQUE PERSONNE	Quel est le lien de parenté de (NOM) avec le chef de ménage ? VOIR CODES CI-DESSOUS.	(NOM) est-il de sexe masculin ou féminin ?	(NOM) vit-il/ elle ici habituellement ?	(NOM) a t-il/ elle passé la nuit dernière ici ?	Quel âge a (NOM) ? SI 95 OU PLUS, NOTEZ '95'.	Y a-t-il d'autres personnes qui vivent dans ce ménage ?	Quel est l'état matrimonial actuel de (PRENOM) ? 1 = MARIÉ OU VIVANT ENSEMBLE 2 = DIVORCÉ/ SEPARÉ 3 =VEUF 4 = JAMAIS MARIÉ ET N'A JAMAIS VÉCU AVEC QUELQU'UN	ENCERCLEZ LE N° DE LIGNE DE TOUTES LES FEMME DE 15-64 ANS	**SI MÉNAGE SÉLECTIONNÉ POUR ENQUÊTE HOMME** ENCERCLEZ LE N° DE LIGNE DE TOUS LES HOMMES DE 15-64 ANS	ENCERCLEZ LE N° DE LIGNE DE TOUS LES ENFANTS DE 0-5 ANS
01			M F 1 2	O N 1 2	O N 1 2	EN ANNÉES	O N 1 → ALLEZ À 2 LIGNE SUIVANTE 2 ALLEZ À 7A ←		01	01	01
02			1 2	1 2	1 2		1 → ALLEZ À 2 LIGNE SUIVANTE 2 ALLEZ À 7A ←		02	02	02
03			1 2	1 2	1 2		1 → ALLEZ À 2 LIGNE SUIVANTE 2 ALLEZ À 7A ←		03	03	03
04			1 2	1 2	1 2		1 → ALLEZ À 2 LIGNE SUIVANTE 2 ALLEZ À 7A ←		04	04	04
05			1 2	1 2	1 2		1 → ALLEZ À 2 LIGNE SUIVANTE 2 ALLEZ À 7A ←		05	05	05
06			1 2	1 2	1 2		1 → ALLEZ À 2 LIGNE SUIVANTE 2 ALLEZ À 7A ←		06	06	06
07			1 2	1 2	1 2		1 → ALLEZ À 2 LIGNE SUIVANTE 2 ALLEZ À 7A ←		07	07	07
08			1 2	1 2	1 2		1 → ALLEZ À 2 LIGNE SUIVANTE 2 ALLEZ À 7A ←		08	08	08

7A)	Juste pour être sûr que j'ai une liste complète : y a-t-il d'autres personnes comme des petits enfants ou des nourrissons que nous n'avons pas listés ?	OUI →	AJOUTEZ TABLEAU NON
7B)	Y a-t-il d'autres personnes qui ne sont peut-être pas membres de votre famille, comme des domestiques, locataires ou amis qui vivent habituellement ici ?	OUI →	AJOUTEZ TABLEAU NON
7C)	Avez-vous des invités ou des visiteurs temporaires qui sont chez vous, ou d'autres personnes qui ont dormi ici la nuit dernière et qui n'ont pas été listés ?	OUI →	AJOUTEZ TABLEAU NON

CODES POUR Q. 3: LIEN DE PARENTÉ AVEC CHEF DE MÉNAGE

01 = CHEF DE MÉNAGE
02 = FEMME OU MARI
03 = FILS OU FILLE
04 = GENDRE OU BELLE-FILLE
05 = PETIT FILS/FILLE
06 = PÈRE/MÈRE
07 = BEAU-PARENT
08 = FRÈRE OU SOEUR
09 = AUTRE LIEN DE PARENTÉ
10 = ADOPTÉ /EN GARDE/ ENFANT DE FEMME/MARI
11 = SANS PARENTÉ
98 = NE SAIT PAS

TABLEAU MENAGE

	SI 0-17 ANS						SI 15-17 ANS	SI 0-17 ANS		
N° LIGNE	ÉTAT DE SURVIE ET RÉSIDENCE DES PARENTS BIOLOGIQUES							PERSONNE PRINCIPALE QUI S'OCCUPE DE L'ENFANT		
	12	12A	13	14	14A	15	15A	15B	15C	15D
	La mère biologique de (PRENOM) est-elle en vie ?	En quelle année la mère biologique de (NOM) est-elle décédée ? ENREGISTERZ ANNÉE DU DÉCÈS SI NE SAIT PAS, ENREGISTREZ '9998'.	La mère biologique de (PRENOM) vit-elle habituellement dans ce ménage ou était-elle en visite ici la nuit dernière ? SI OUI : Quel est son nom ? NOTEZ LE N° DE LIGNE DE LA MÈRE. SI NON, NOTEZ '00'.	Le père biologique de (PRENOM) est-il en vie ?	En quelle année le père biologique de (NOM) est-il décédé ? ENREGISTERZ ANNÉE DU DÉCÈS SI NE SAIT PAS, ENREGISTREZ '9998'.	Le père biologique de (PRENOM) vit-il habituellement dans ce ménage ou était-il en visite ici la nuit dernière ? SI OUI : Quel est son nom ? NOTEZ LE N° DE LIGNE DU PÈRE. SI NON, NOTEZ '00'.	VÉRIFIEZ Q. 8: CODES 1, 2, OU 3 SÉLEC-TIONNÉ?	VÉRIFIEZ Q. 5, 13 ET 15: EST-CE QUE L'ENFANT EST UN RÉSIDENT HABITUEL DU MÉNAGE ET AUCUN PARENT BIOLOGIQUE N'EST UN RÉSIDENT HABITUEL ?	Qui est la personne qui s'occupe principalement de (NOM) ? C'est-à-dire la personne qui s'occupe tous les jours de l'enfant ? ENREGISTREZ LE N° DE LIGNE DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L'ENFANT SI L'ENFANT N'A PAS DE PERSONNE RESPONSABLE ENREGISTREZ 95'	Quelle est la relation entre la personne et (NOM)? VOIR CODES CI-DESSOUS
01	O N NSP 1 2 8 ALLEZ À 13 ALLEZ À 14	ALLEZ À 14		O N NSP 1 2 8 ALLEZ À 15 ALLEZ À 15A	ALLEZ À 15A		O N 1 2 ALLEZ À16	O N 1 2 ALLEZ À16	SI '95' ALLEZ À 16	
02	1 2 8 ALLEZ À 13 ALLEZ À 14	ALLEZ À 14		1 2 8 ALLEZ À 15 ALLEZ À 15A	ALLEZ À 15A		1 2 ALLEZ À 16	1 2 ALLEZ À 16	SI '95' ALLEZ À 16	
03	1 2 8 ALLEZ À 13 ALLEZ À 14	ALLEZ À 14		1 2 8 ALLEZ À 15 ALLEZ À 15A	ALLEZ À 15A		1 2 ALLEZ À 16	1 2 ALLEZ À 16	SI '95' ALLEZ À 16	
04	1 2 8 ALLEZ À 13 ALLEZ À 14	ALLEZ À 14		1 2 8 ALLEZ À 15 ALLEZ À 15A	ALLEZ À 15A		1 2 ALLEZ À 16	1 2 ALLEZ À 16	SI '95' ALLEZ À 16	
05	1 2 8 ALLEZ À 13 ALLEZ À 14	ALLEZ À 14		1 2 8 ALLEZ À 15 ALLEZ À 15A	ALLEZ À 15A		1 2 ALLEZ À 16	1 2 ALLEZ À 16	SI '95' ALLEZ À 16	
06	1 2 8 ALLEZ À 13 ALLEZ À 14	ALLEZ À 14		1 2 8 ALLEZ À 15 ALLEZ À 15A	ALLEZ À 15A		1 2 ALLEZ À 16	1 2 ALLEZ À 16	SI '95' ALLEZ À 16	
07	1 2 8 ALLEZ À 13 ALLEZ À 14	ALLEZ À 14		1 2 8 ALLEZ À 15 ALLEZ À 15A	ALLEZ À 15A		1 2 ALLEZ À 16	1 2 ALLEZ À 16	SI '95' ALLEZ À 16	
08	1 2 8 ALLEZ À 13 ALLEZ À 14	ALLEZ À 14		1 2 8 ALLEZ À 15 ALLEZ À 15A	ALLEZ À 15A		1 2 ALLEZ À 16	1 2 ALLEZ À 16	SI '95' ALLEZ À 16	

CODES POUR Q. 15D

01 = GRANDPARENT
02 = TANTE/ONCLE
03 = FRÈRE OU SOEUR
04 = AUTRE PARENT DE L'ENFANT
05 = BELLE-MÈRE/BEAU-PÈRE
06 = PARENT DES BEAUX-PARENTS
07 = FAMILLE D'ACCUEIL FORMELLE/ PARENT ADOPTIF
8 = AMI
96 = AUTRE (SPÉCIFIEZ)

	SI 3 ANS OU PLUS			SI 3-24 ANS		SI 3-24 ANS							SI 0-4 ANS
N° LIGNE	A FRÉQUENTÉ L'ÉCOLE			FRÉQUENTATION SCOLAIRE ACTUELLE/RÉCENTE		SOUTIEN AUX FRAIS DE SCOLARITÉ ET À L'ACHAT DU MATÉRIEL SCOLAIRE							ENREGISTREMENT DES NAISSANCES
	16	17A	17B	18	19	19C	19D	19E	19F	19G	19H	19I	20
	Est-ce que (PRENOM) a déjà fréquenté l'école ou a-t-il suivi un programme éducatif préscolaire ?	Quel est le plus haut niveau d'études que (PRENOM) a atteint ? VOIR CODES CI-DESSOUS	Quelle est la classe la plus élevée que (PRENOM) a achevée à ce niveau ? VOIR CODES CI-DESSOUS	Est-ce que (PRENOM) est allé à l'école ou a suivi un programme éducatif préscolaire à un moment au cours de l'année scolaire [2023-2024] ?	Au cours de cette année scolaire, à quel niveau et en quelle classe est (PRENOM) ? VOIR CODES CI-DESSOUS	Est-ce que (PRENOM) va à l'école publique ou autre type d'école? 1 =ÉTAT / PUBLIC 2 = PRIVÉ RELIGIEUX 3 = PRIVÉ NON RELIGIEUX 4 = PRIVÉ INTERNATIONAL 5 = COMMUNAUTÉ	Durant l'année scolaire [2023-2024], est-ce que (PRENOM) a perçu une aide aux frais de scolarité ?	Est-ce que cette aide aux frais de scolarité est suffisante pour payer les frais de scolarité de (PRENOM) ?	Qui a fourni ce soutien aux frais de scolarité de (PRENOM)? Quelqu'un d'autre ? A =ÉTAT / PUBLIC B = ORGANISATION CONFESSIONNELLE C = ORGANISATION NON-CONFESSIONNELLE D = PARENT/PROCHE/AMI X = AUTRE	Durant l'année scolaire [2023-2024], est-ce que (PRENOM) a reçu une aide matérielle ou de l'argent pour acheter des chaussures, des cahiers d'exercice, des carnets de notes, des uniformes scolaires ou d'autres fournitures scolaires ?	Est-ce que cette aide pour les achats scolaires est suffisante pour les achats scolaires de (PRENOM) ?	Qui a fourni ce soutien aux achats scolaires de (PRENOM)? Quelqu'un d'autre ? A =ÉTAT / PUBLIC B = ORGANISATION CONFESSIONNELLE C = ORGANISATION NON-CONFESSIONNELLE D = PARENT/PROCHE/AMI X = AUTRE	(PRENOM) a-t-il/elle un certificat de naissance ? SI NON, INSISTEZ : La naissance de (PRENOM) a-t-elle été enregistrée à l'état civil ? 1 = A UN CERTIFICAT 2 = ENREGISTRÉ 3 = NI L'UN NI L'AUTRE 8 = NE SAIT PAS
01	O N 1 2 ↓ ALLEZ À 20	NIVEAU ☐	CLASSE ☐☐	O N 1 2 ↓ ALLEZ À 20	NIVEAU ☐ CLASSE ☐☐	☐	O N 1 2 ↓ ALLEZ À 19G	O N 1 2	A B C D X	O N 1 2 ↓ ALLEZ À 20	O N 1 2	A B C D X	☐
02	1 2 ↓ ALLEZ À 20	☐	☐☐	1 2 ↓ ALLEZ À 20	☐ ☐☐	☐	1 2 ↓ ALLEZ À 19G	1 2	A B C D X	1 2 ↓ ALLEZ À 20	1 2	A B C D X	☐
03	1 2 ↓ ALLEZ À 20	☐	☐☐	1 2 ↓ ALLEZ À 20	☐ ☐☐	☐	1 2 ↓ ALLEZ À 19G	1 2	A B C D X	1 2 ↓ ALLEZ À 20	1 2	A B C D X	☐
04	1 2 ↓ ALLEZ À 20	☐	☐☐	1 2 ↓ ALLEZ À 20	☐ ☐☐	☐	1 2 ↓ ALLEZ À 19G	1 2	A B C D X	1 2 ↓ ALLEZ À 20	1 2	A B C D X	☐
05	1 2 ↓ ALLEZ À 20	☐	☐☐	1 2 ↓ ALLEZ À 20	☐ ☐☐	☐	1 2 ↓ ALLEZ À 19G	1 2	A B C D X	1 2 ↓ ALLEZ À 20	1 2	A B C D X	☐
06	1 2 ↓ ALLEZ À20	☐	☐☐	1 2 ↓ ALLEZ À 20	☐ ☐☐	☐	1 2 ↓ ALLEZ À 19G	1 2	A B C D X	1 2 ↓ ALLEZ À 20	1 2	A B C D X	☐
07	1 2 ↓ ALLEZ À 20	☐	☐☐	1 2 ↓ ALLEZ À 20	☐ ☐☐	☐	1 2 ↓ ALLEZ À 19G	1 2	A B C D X	1 2 ↓ ALLEZ À 20	1 2	A B C D X	☐
08	1 2 ↓ ALLEZ À 20	☐	☐☐	1 2 ↓ ALLEZ À 20	☐ ☐☐	☐	1 2 ↓ ALLEZ À 19G	1 2	A B C D X	1 2 ↓ ALLEZ À 20	1 2	A B C D X	☐

CODES POUR QUESTIONS 17 ET 19: NIVEAU D'INSTRUCTION

NIVEAU	MATERNELLE/ PRÉ-PRIMAIRE=0	FONDAMENTAL 1er Cycle = 1	FONDAMENTAL 2nd Cycle = 2	SECONDAIRE Lycée, Enseignement Technique/Professionnel =3	SUPÉRIEUR = 4	NSP=8
	MOINS D'1 AN. = 0 1ère an. / Petite section = 1 2ème an./ Moyenne section = 2 3ème an./Grande section = 3 NSP = 8	MOINS D'1 AN. = 0 1ère année . = 1 2ème année . = 2 3ème année . = 3 4ème année . = 4 5ème année . = 5 6ème année . = 6 NSP ..... = 8	MOINS D'1 AN. = 0 7ème année . = 1 8ème année . = 2 9ème année . = 3 NSP ..... = 8	MOINS D'1 AN. . = 0 1ère/10ème année . = 1 2ème/11ème année . = 2 3ème/12ème année . = 3 4ème année . . = 4 NSP ..... . = 8	MOINS D'1 AN. = 0 1ère année . = 1 2ème année . = 2 3ème année . = 3 4ème année . = 4 5ème année+ . = 5 NSP ..... = 8	

TABLEAU MÉNAGE

No LIGNE	SI ÂGÉ DE 5 ANS OU PLUS HANDICAP					
	26	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
	Est-ce que (NOM) porte des lunettes ou des lentilles de contact pour voir ?	Je voudrais savoir si (NOM) a des difficultés pour voir même quand il/elle porte des lunettes ou des lentilles de contact. Diriez-vous que (NOM) n'a aucune difficulté pour voir, quelques difficultés, beaucoup de difficulté ou qu'il/elle ne peut pas voir du tout ? 1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR VOIR 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3 = BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS VOIR DU TOUT 8 = NE SAIT PAS	Je voudrais savoir si (NOM) a des difficultés pour voir. Diriez-vous que (NOM) n'a aucune difficulté pour voir, quelques difficultés, beaucoup de difficulté ou qu'il/elle ne peut pas voir du tout ? 1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR VOIR 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3 = BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS VOIR DU TOUT 8 = NE SAIT PAS	Est-ce que (NOM) porte un appareil auditif?	Je voudrais savoir si (NOM) a des difficultés pour entendre même quand il/elle porte un appareil auditif. Diriez-vous que (NOM) n'a aucune difficulté pour entendre, quelques difficultés, beaucoup de difficulté ou qu'il/elle ne peut pas entendre du tout ? 1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR ENTENDRE 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3 = BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS ENTENDRE DU TOUT 8 = NE SAIT PAS	Je voudrais savoir si (NOM) a des difficultés pour entendre. Diriez-vous que (NOM) n'a aucune difficulté pour entendre, quelques difficultés, beaucoup de difficulté ou qu'il/elle ne peut pas entendre du tout ? 1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR ENTENDRE 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3 = BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS ENTENDRE DU TOUT 8 = NE SAIT PAS
1	O N 1 2 ↓ ALLEZ À 28	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 29)	1 2 3 4 8	O N 1 2 ↓ ALLEZ À 31	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 32)	1 2 3 4 8
2	1 2 ↓ ALLEZ À 28	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 29)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 31	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 32)	1 2 3 4 8
3	1 2 ↓ ALLEZ À 28	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 29)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 31	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 32)	1 2 3 4 8
4	1 2 ↓ ALLEZ À 28	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 29)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 31	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 32)	1 2 3 4 8
5	1 2 ↓ ALLEZ À 28	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 29)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 31	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 32)	1 2 3 4 8
6	1 2 ↓ ALLEZ À 28	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 29)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 31	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 32)	1 2 3 4 8
7	1 2 ↓ ALLEZ À 28	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 29)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 31	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 32)	1 2 3 4 8
8	1 2 ↓ ALLEZ À 28	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 29)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 31	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 32)	1 2 3 4 8

TABLEAU MÉNAGE

	SI ÂGÉ DE 5 ANS OU PLUS			
No LIGNE	HANDICAP			
	32	33	34	35
	Je voudrais savoir si (NOM) a des difficultés pour communiquer dans sa langue habituelle. Diriez-vous que (NOM) n'a aucune difficulté pour comprendre ou être compris, quelques difficultés, beaucoup de difficulté ou qu'il/elle ne peut pas communiquer du tout ? 1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR COMMUNIQUER 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3 = BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS COMMUNIQUER DU TOUT 8 = NE SAIT PAS	Je voudrais savoir si (NOM) a des difficultés pour se rappeler ou se concentrer. Diriez-vous que (NOM) n'a aucune difficulté pour se rappeler ou se concentrer, quelques difficultés, beaucoup de difficulté ou qu'il/elle ne peut pas se rappeler ou se concentrer du tout ? 1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR SE RAPPELER OU POUR SE CONCENTRER 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3=BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS SE RAPPELER/SE CONCENTRER DU TOUT 8 = NE SAIT PAS	Je voudrais savoir si (NOM) a des difficultés pour marcher ou monter des marches. Diriez-vous que (NOM) n'a aucune difficulté pour marcher ou monter des marches, quelques difficultés, beaucoup de difficulté ou qu'il/elle ne peut pas marcher ou monter des marches du tout ? 1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR MARCHER OU GRIMPER 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3=BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS MARCHER OU GRIMPER DU TOUT 8 = NE SAIT PAS	Je voudrais savoir si (NOM) a des difficultés pour se laver ou s'habiller. Diriez-vous que (NOM) n'a aucune difficulté pour se laver ou s'habiller, quelques difficultés, beaucoup de difficulté ou qu'il/elle ne peut pas se laver ou s'habiller du tout ? 1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR SE LAVER OU S'HABILLER 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3=BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS SE LAVER OU S'HABILLER DU TOUT 8 = NE SAIT PAS
1	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
2	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
3	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
4	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
5	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
6	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
9	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
10	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8

BIEN-ÊTRE DE L'ENFANT ET STRUCTURE DU MÉNAGE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODE	ALLEZ À
41	VÉRIFIEZ LES COLONNES 5 ET 7: Y A-T-IL UN ENFANT DE 0-17 ANS (POPULATION DE DROIT) ? OUI ☐ ↓ NON ☐ →		101
42	VÉRIFIEZ LES COLONNES 5, 13, ET 15: Y A-T-IL UN ENFANT DE 0-17 ANS (POPULATION DE DROIT) DON'T LE PÈRE OU LA MÈRE BIOLOGIQUE NE SONT PAS LISTÉS DANS LE TABLEAU MÉNAGE (COLONNE 13 OU COLONNE 15 EST '00') ? NON ☐ ↓ OUI ☐ →		44
43	VÉRIFIEZ LES COLONNES 5, 13, ET 15: Y A-T-IL UN ENFANT DE 0-17 ANS (POPULATION DE DROIT) DONT LA MÈRE OU LE PÈRE BIOLOGIQUE SONT DES VISITEURS DU MÉNAGE? ('2' EST ENREGISTRÉ À LA COLONNE 5 SUR LA LIGNE DANS LE TABLEAU MÉNAGE CORRESPONDANT À LA MÈRE OU AU PÈRE BIOLOGIQUE DE L'ENFANT). OUI ☐ ↓ NON ☐ →		101
44	LISTEZ CHAQUE ENFANT (POPULATION DE DROIT) DE 0-17 ANS DONT LA MÈRE OU LE PÈRE BIOLOGIQUE NE VIT PAS HABITUELLEMENT DANS LE MENAGE CI-DESSOUS DANS L'ORDRE D'APPARITION DANS LE TABLEAU MÉNAGE. ENREGISTREZ LE NUMÉRO DE LIGNE ET LE NOM POUR CHAQUE ENFANT, ET ENREGISTREZ SI LE PÈRE OU LA MÈRE BIOLOGIQUE DE L'ENFANT VIT OU NON HABITUELLEMENT AILLEURS , S'ILS VIVENT HABITUELLEMENT DANS CE MÉNAGE OU SI ILS SONT DÉCÉDÉS.		

44A. N° RANG	44B. N° DE LIGNE DU MÉNAGE	44C. NOM DE COL. 2	44D. STATUT DE LA MÈRE	44E. STATUT DU PÈRE
01	☐☐	_____	HABIT. VIT AILLEUR 1 HABIT. VIT DANS C 2 DÉCÉDÉE 3	HABIT. VIT AILLEUR 1 HABIT. VIT DANS C 2 DÉCÉDÉ 3
02	☐☐	_____	HABIT. VIT AILLEUR 1 HABIT. VIT DANS C 2 DÉCÉDÉE 3	HABIT. VIT AILLEUR 1 HABIT. VIT DANS C 2 DÉCÉDÉ 3
03	☐☐	_____	HABIT. VIT AILLEUR 1 HABIT. VIT DANS C 2 DÉCÉDÉ 3	HABIT. VIT AILLEUR 1 HABIT. VIT DANS C 2 DÉCÉDÉ 3
04	☐☐	_____	HABIT. VIT AILLEUR 1 HABIT. VIT DANS C 2 DÉCÉDÉE 3	HABIT. VIT AILLEUR 1 HABIT. VIT DANS C 2 DÉCÉDÉ 3
05	☐☐	_____	HABIT. VIT AILLEUR 1 HABIT. VIT DANS C 2 DÉCÉDÉE 3	HABIT. VIT AILLEUR 1 HABIT. VIT DANS C 2 DÉCÉDÉ 3

45	VÉRIFIEZ 44: ENREGISTREZ LE NOM ET LE NUMÉRO DE LIGNE DU MÉNAGE DU (PREMIER/SUIVANT) ENFANT DONT LA MÈRE ET/OU LE PÈRE BIOLOGIQUE SONT EN VIE MAIS NE SONT PAS DES RÉSIDENTS HABITUELS DE CE MÉNAGE. NOM _____ NUMÉRO DE LIGNE DU MÉNAGE . . . . ☐☐		
46	Je voudrais maintenant vous poser quelques questions sur (NOM DE L'ENFANT DE 45).		
47	VÉRIFIEZ 44D: STATUT DE LA MÈRE CODE '1' ENCERCLÉ ☐ ↓ CODE '2' OU '3' ENCERCLÉ ☐ →		59
48	Depuis combien de temps (NOM) et la mère de (NOM) ne vivent-ils/elles plus ensemble ? SI MOINS D' 1 ANNÉE, ENREGISTREZ LA RÉPONSE EN MOIS. SI 1 ANNÉE OU PLUS, ENREGISTREZ LA RÉPONSE EN ANNÉES RÉVOLUES. SI (NOM) ET (NOM) DE LA MÈRE N'ONT JAMAIS VÉCU ENSEMBLE , ENREGISTREZ '995'.	MOIS . . . . . 1 ☐☐ ANNÉES . . . . . 2 ☐☐ JAMAIS VÉCU ENSEMBLE . . . . . 995 NE SAIT PAS 998	

N°	QUESTIONS ET FILTERS	CODE	ALLEZ À
	NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE DU MÉNAGE . . ☐☐	
49	Au cours des 6 derniers mois, est-ce que la mère biologique de (NOM) a vu ou a communiqué souvent avec (NOM): presque tous les jours, au moins une fois par semaine, au moins une fois par mois, moins d'une fois par mois ou pas du tout ?	PRESQUE CHAQUE JOUR . . . . . 1 AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE . . . . . 2 AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS . . . . . 3 MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS . . . . . 4 PAS DU TOUT . . . . . 5 NE SAIT PAS 8	
50	CAPI VÉRIFIERA LES DONNÉES COLLECTÉES JUSQU'ICI POUR DÉTERMINER SI LES QUESTIONS 53-57 ONT ÉTÉ, OU NON, DÉJÀ POSÉES POUR UN AUTRE ENFANT QUI A LA MÊME MÈRE QUE CET ENFANT , OU SI CELA NE PEUT PAS ÊTRE DÉTERMINÉ À PARTIR DE DONNÉES DÉJÀ COLLECTÉES. ON NE SAIT PAS SI 53-57 ONT ÉTÉ POSÉES POUR LA MÈRE DE CET ENFANT ☐	53-57 N'A PAS ÉTÉ POSÉE POUR LA MÈRE DE CET ENFANT ☐ → 53 53-57 A ÉTÉ POSÉE POUR LA MÈRE DE CET ENFANT ☐ → 58	
51	Est-ce que (NOM) a la même mère biologique qu'un autre enfant dont je vous ai déjà parlé ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 53
52	Quel enfant a la même mère biologique que (NOM) ? ENREGISTREZ LE NUMÉRO DE LIGNE DU MÉNAGE DE L'ENFANT AVEC LA MÊME MÈRE BIOLOGIQUE QUE (NOM).	NUMÉRO DE LIGNE DU MÉNAGE DU FRÈRE/SOEUR CÔTÉ MATERNEL ☐☐	→ 58
53	La mère biologique de (NOM) est-elle mariée ou vit-elle avec un homme comme si elle était mariée ?	OUI, MARIÉ OU VIVANT ENSEMBLE . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 55
54	Est-ce que cet homme est le père biologique de (NOM)?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
55	La mère biologique de (NOM) envoie-t-elle de l'argent ou des biens à ce ménage ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
56	La mère biologique de (NOM) reçoit-elle de l'argent ou des biens de ce ménage ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
57	Où vit la mère biologique de (NOM)?	DANS UN AUTRE MÉNAGE DANS LA MÊME RÉGION . . . . . 1 DANS UN MÉNAGE DANS UNE AUTRE RÉGION . . . . . 2 DANS UNE INSTITUTION AU MALI . . . . . 3 DANS UN AUTRE PAYS . . . . . 4 NE SAIT PAS 8	
58	VÉRIFIEZ 44E: STATUT DU PÈRE CODE '1' ENCERCLÉ ☐	CODE '2' OU '3' ENCERCLÉ ☐ → 69	
59	Depuis combien de temps (NOM) et le père de (NOM) ne vivent-ils plus ensemble ? SI MOINS D' 1 ANNÉE, ENREGISTREZ LA RÉPONSE EN MOIS. SI 1 ANNÉE OU PLUS, ENREGISTREZ LA RÉPONSE EN ANNÉES RÉVOLUES. SI (NOM) ET(NOM) DU PÈRE N'ONT JAMAIS VÉCU ENSEMBLE, ENREGISTREZ '995'.	MOIS . . . . . 1 ☐☐ ANNÉES . . . . . 2 ☐☐ JAMAIS VÉCU ENSEMBLE . . . . . 995 NE SAIT PAS 998	

N°	QUESTIONS ET FILTERS	CODE	ALLEZ À
	NOM _____	NUMÉRO DE LIGNE DU MÉNAGE . . ☐☐	
60	Au cours des 6 derniers mois, est-ce que le père biologique de (NOM) a vu ou a communiqué souvent avec (NOM): presque tous les jours, au moins une fois par semaine, au moins une fois par mois, moins d'une fois par mois ou pas du tout ?	PRESQUE CHAQUE JOUR . . . . . 1 AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE . . . . . 2 AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS . . . . . 3 MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS . . . . . 4 PAS DU TOUT . . . . . 5 NE SAIT PAS 8	
61	CAPI VÉRIFIERA LES DONNÉES COLLECTÉES JUSQU'ICI POUR DÉTERMINER SI LES QUESTIONS 64-68 ONT DÉJÀ ÉTÉ POSÉES POUR UN AUTRE ENFANT QUI A LE MÊME PÈRE QUE CET ENFANT OU SI CELA PEUT ÊTRE DÉTERMINÉ À PARTIR DE DONNÉES DÉJÀ COLLECTÉES. ON NE SAIT PAS SI 64-68 ONT ÉTÉ POSÉES POUR LE PÈRE DE CET ENFANT ☐	64-68 N'ONT PAS ÉTÉ POSÉES POUR LE PÈRE DE CET ENFANT ☐ → 64 64-68 ONT ÉTÉ POSÉES POUR LE PÈRE DE CET ENFANT ☐ → 69	
62	Est-ce que (NOM) a le même père biologique qu'un autre enfant dont je vous ai déjà parlé?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 64
63	Quel enfant a le même père biologique que (NOM) ? ENREGISTREZ LE NUMÉRO DE LIGNE DU MÉNAGE DE L'ENFANT AVEC LE MÊME PÈRE BIOLOGIQUE QUE (NOM).	NUMÉRO DE LIGNE DU MÉNAGE DU FRÈRE/SOEUR CÔTÉ PATERNEL ☐☐	→ 69
64	VÉRIFIEZ 54: EST-CE QUE LA MÈRE BIOLOGIQUE DE L'ENFANT EST MARIÉE AVEC (OU VIT AVEC) LE PÈRE BIOLOGIQUE DE L'ENFANT? NON, NE SAIT PAS OU PAS POSÉE ☐	OUI ☐ → 66	
65	Le père biologique de (NOM) est-il marié ou vit-il avec une femme comme s'il était marié ?	OUI, MARIÉ OU VIVANT ENSEMBLE . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
66	Le père biologique de (NOM) envoie-t-il de l'argent ou des biens à ce ménage ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
67	Le père biologique de (NOM) reçoit-il de l'argent ou des biens de ce ménage ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
68	Où vit le père biologique de (NOM)?	DANS UN AUTRE MÉNAGE DANS LA MÊME RÉGION . . . . . 1 DANS UN MÉNAGE DANS UNE AUTRE RÉGION . . . . . 2 DANS UNE INSTITUTION AU MALI . . . . . 3 DANS UN AUTRE PAYS . . . . . 4 NE SAIT PAS 8	
69	VÉRIFIEZ 44: Y A-T-IL D'AUTRES ENFANTS DE 0-17 ANS (POPULATION DE DROIT) DONT LA MÈRE ET/OU LE PÈRE BIOLOGIQUE SONT VIVANTS MAIS NE SONT PAS DES RÉSIDENTS HABITUELS DE CE MÉNAGE ? OUI ☐ (ALLEZ À 45 POUR ENFANT SUIVANT)	NON ☐ → 101	

CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
101	D'où provient principalement l'eau que boivent les membres de votre ménage ?	**EAU DU ROBINET** ROBINET DANS LOGEMENT . . . . . 11 ROBINET DANS COUR/PARCELLE . . . . 12 ROBINET CHEZ UN VOISIN . . . . . 13 ROBINET PUBLIC/BORNE FONTAINE . . . . 14 PUITS À POMPE OU FORAGE . . . . . 21 **PUITS CREUSÉ** PUITS PROTÉGÉ . . . . . 31 PUITS NON PROTÉGÉ . . . . . 32 **EAU DE SOURCE** SOURCE PROTÉGÉE . . . . . 41 SOURCE NON PROTÉGÉE . . . . . 42 EAU DE PLUIE . . . . . 51 CAMION CITERNE . . . . . 61 CHARRETTE AVEC PETITE CITERNE/ TONNEAU . . . . . 71 EAU DE SURFACE (RIVIÈRE/BARRAGE/LAC/ MARE/FLEUVE/CANAL/ CANAL D'IRRIGATION) . . . . . 81 EAU EN BOUTEILLE . . . . . 91 EAU EN SACHET . . . . . 92 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	→ 106 → 103 → 103
102	D'où provient principalement l'eau utilisée par votre ménage pour d'autres usages comme faire la cuisine et se laver les mains ?	**EAU DU ROBINET** ROBINET DANS LOGEMENT . . . . . 11 ROBINET DANS COUR/PARCELLE . . . . 12 ROBINET CHEZ UN VOISIN . . . . . 13 ROBINET PUBLIC/BORNE FONTAINE . . . . 14 PUITS À POMPE OU FORAGE . . . . . 21 **PUITS CREUSÉ** PUITS PROTÉGÉ . . . . . 31 PUITS NON PROTÉGÉ . . . . . 32 **EAU DE SOURCE** SOURCE PROTÉGÉE . . . . . 41 SOURCE NON PROTÉGÉE . . . . . 42 EAU DE PLUIE . . . . . 51 CAMION CITERNE . . . . . 61 CHARRETTE AVEC PETITE CITERNE/ TONNEAU . . . . . 71 EAU DE SURFACE (RIVIÈRE/BARRAGE/LAC/ MARE/FLEUVE/CANAL/ CANAL D'IRRIGATION) . . . . . 81 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	→ 106
103	Où est située cette source d'approvisionnement de l'eau ?	DANS VOTRE LOGEMENT . . . . . 1 DANS VOTRE COUR/PARCELLE . . . . . 2 AILLEURS 3	→ 106
104	Combien de temps faut-il pour s'y rendre, prendre l'eau et revenir ?	MINUTES . . . . . ☐☐☐ NE SAIT PAS 998	

CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
105	Qui habituellement va à la source d'approvisionnement pour prendre l'eau pour le ménage ? ENREGISTREZ LE NOM DE LA PERSONNE ET LE NUMÉRO DE LIGNE À PARTIR DU TABLEAU MÉNAGE. SI LA PERSONNE N'EST PAS LISTÉE DANS LE TABLEAU MÉNAGE, INSCRIVEZ '00'.	NOM _____ NUMÉRO DE LIGNE	
106	Au cours du mois dernier, est-ce qu'il est arrivé que votre ménage n'ait pas eu suffisamment d'eau pour boire quand vous en aviez besoin ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
107	Faites-vous quelque chose pour rendre l'eau plus saine à boire ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 109
108	Habituellement, que faites-vous pour rendre l'eau que vous buvez plus saine ? Quelque chose d'autre ? ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	LA FAIRE BOUILLIR . . . . . A AJOUTER EAU DE JAVEL/CHLORE . . . . . B LA FILTRER À TRAVERS UN LINGE . . . . . C UTILISER UN FILTRE (CÉRAMIQUE/ SABLE/COMPOSITE/ETC) . . . . . D DÉSINFECTION SOLAIRE . . . . . E LA LAISSER REPOSER . . . . . F AUTRE _____ X (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS . . . . . Z	
109	Quel type de toilettes les membres de votre ménage utilisent-ils habituellement ? S'IL N'EST PAS POSSIBLE DE DÉTERMINER LE TYPE DE TOILETTES, DEMANDEZ LA PERMISSION DE VOIR L'INSTALLATION.	**CHASSE D'EAU/CHASSE MANUELLE** CHASSE D'EAU CONNECTÉE À UN SYSTÈME D'ÉGOUT . . . . . 11 À UNE FOSSE SEPTIQUE . . . . . 12 À UNE FOSSE D'AISANCES . . . . . 13 À QUELQUE CHOSE D'AUTRE . . . . . 14 À NE SAIT PAS OÙ . . . . . 15 **FOSSE D'AISANCES** FOSSE D'AISANCES AMÉLIORÉE AUTO-AÉRÉE . . . . . 21 FOSSE D'AISANCES AVEC DALLE . . . . 22 FOSSE D'AISANCES SANS DALLE TROU OUVERT . . . . . 23 TOILETTES À COMPOSTAGE . . . . . 31 SEAU/TINETTE . . . . . 41 TOILETTES/LATRINES SUSPENDUES . . . . 51 PAS DE TOILETTES/NATURE . . . . . 61 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	→ 117
110	Partagez-vous ces toilettes avec d'autres ménages ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 112
111	En comptant votre propre ménage, combien de ménages utilisent ces toilettes ?	NOMBRE DE MÉNAGES SI MOINS DE 10 . . . . . 0 10 MÉNAGES OU PLUS . . . . . 95 NE SAIT PAS 98	

CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
112	Où se trouvent ces toilettes ?	DANS VOTRE LOGEMENT . . . . . 1 DANS VOTRE COUR/PARCELLE . . . . . 2 AILLEURS 3	
113	VÉRIFIEZ 109 : CODES 12, 13, 21, 22, 23, OU 31 ENCERCLÉ ☐↓ AUTRE ☐		→ 117
114	VÉRIFIEZ 109: CODE 12 ☐↓ : a) Est-ce que votre fosse septique a déjà été vidée ? CODE 13, 21, 22, OU 23 ☐↓ : b) Est-ce que votre fosse a déjà été vidée ? CODE 31 ☐↓ : c) Est-ce que votre toilettes à compostage a déjà été vidée ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 117
115	VÉRIFIEZ 109: CODE 12 ☐↓ : a) La dernière fois que votre fosse septique a été vidée, est-ce que cela a été fait par un professionnel ? CODE 13, 21, 22, OU 23 ☐↓ : b) La dernière fois que votre fosse a été vidée, est-ce que cela a été fait par un professionnel ? CODE 31 ☐↓ : c) La dernière fois que votre toilettes à compostage a été vidée, est-ce que cela a été fait par un professionnel ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
116	Où le contenu a-t-il été vidé ?	USINE DE TRAITEMENT . . . . . 1 ENTERRÉ DANS UNE FOSSE COUVERTE . . 2 FOSSE À DECOUVERT/FORÊT/CHAMPS / TERRAIN VAGUE . . . . . 3 EAU DE SURFACE (RIVIÈRE/BARRAGE/ LAC/MARE/FLEUVE CANAL/ CANAL D'IRRIGATION . . . . . 4 AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 8	

CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
117	Dans ce ménage, quel type de cuisinière est habituellement utilisée pour la cuisine ?	CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE . . . . . 01 FOUR SOLAIRE . . . . . 02 CUISINIÈRE À GAZ PROPANE LIQUÉFIÉ (GPL) CUISINIÈRE À GAZ . . . . . 03 CUINIÈRE CONNECTÉE AU GAZ NATUREL . . 04 CUISINIÈRE AU BIOGAZ . . . . . 05 CUISINIÈRE À COMBUSTIBLE LIQUIDE . . . . 06 CUISINIÈRE D'UN FABRICANT À COMBUSTIBLE SOLIDE . . . . . 07 CUISINIÈRE TRADITIONNELLE À COMBUSTIBLE SOLIDE . . . . . 08 FOYER À TROIS PIERRES/FOYER OUVERT . . 09 PAS DE CUISINE DANS LE MÉNAGE . . . . . 95 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	→ 121 → 120 → 120 → 123 → 120
118	Est-ce que la cuisinière a une cheminée ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
120	Avec quel type de combustible ou d'énergie fonctionne cette cuisinière ?	ALCOOL/ÉTHANOL . . . . . 01 ESSENCE/DIESEL . . . . . 02 PARAFFINE/PÉTROLE . . . . . 03 CHARBON/LIGNITE . . . . . 04 CHARBON DE BOIS . . . . . 05 BOIS . . . . . 06 PAILLE/BRANCHAGES/HERBES . . . . . 07 PRODUITS AGRICOLES . . . . . 08 BOUSE D'ANIMAL/DÉCHETS . . . . . 09 COMBUSTIBLES BIOMASSE TRANSFORMÉS (PELLETS) OU GRANULÉS DE BOIS . . . . 10 ORDURES/PLASTIQUE . . . . . 11 SCIURE . . . . . 12 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
121	Est-ce que la cuisine est faite habituellement dans la maison, dans un bâtiment séparé ou à l'extérieur ?	DANS LA MAISON . . . . . 1 DANS UN BÂTIMENT SÉPARÉ . . . . . 2 À L'EXTÉRIEUR . . . . . 3 AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ)	→ 123
122	Avez-vous une pièce séparée que vous utilisez comme cuisine ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
123	Dans ce ménage, qu'utilisez-vous pour chauffer la maison quand c'est nécessaire ? SI L'ENQUÊTÉ RÉPOND ÉLECTRICITÉ OU GAZ , DEMANDEZ : Dans quel type d'appareil chauffant (l'electricité/gas) est-il utilisé ?	CHAUFFAGE CENTRAL . . . . . 01 RADIATEUR D'UN FABRICANT . . . . . 02 RADIATEUR TRADITIONNEL . . . . . 03 FOURNEAU D'UN FABRICANT . . . . . 04 FOURNEAU TRADITIONNEL . . . . . 05 FEU À TROIS PIERRES/FOYER OUVERT . . 06 PAS DE RADIATEUR DANS LE MÉNAGE/ PAS BESOIN . . . . . 95 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	→ 125 → 125 → 126 → 125
124	Est-ce que l'appareil a une cheminée ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	

CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
125	Avec quel type de combustible ou d'énergie fonctionne cet appareil ?	ÉLECTRICITÉ . . . . . 01 CONNECTÉ AU GAZ NATUREL . . . . . 02 CHAUFFAGE SOLAIRE DE L'AIR . . . . . 03 GAZ PROPANE LIQUÉFIÉ (GPL)/ GAZ DE CUISINE . . . . . 04 BIOGAZ . . . . . 05 ALCOOL/ÉTHANOL . . . . . 06 ESSENCE/DIESEL . . . . . 07 PARAFFINE/PÉTROLE . . . . . 08 CHARBON/LIGNITE . . . . . 09 CHARBON DE BOIS . . . . . 10 BOIS . . . . . 11 PAILLE/BRANCHAGES/HERBES . . . . . 12 PRODUITS AGRICOLES . . . . . 13 BOUSE D'ANIMAL/DÉCHETS . . . . . 14 COMBUSTIBLES BIOMASSE TRANSFORMÉS (PELLETS) OU GRANULÉS DE BOIS . . . . 15 ORDURES/PLASTIQUE . . . . . 16 SCIURE . . . . . 17 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
126	Dans ce ménage, quand il fait nuit, qu'est-ce que vous utilisez habituellement pour vous éclairer ?	ÉLECTRICITÉ . . . . . 01 LANTERNE SOLAIRE . . . . . 02 LAMPE DE POCHE, TORCHE OU LANTERNE RECHARGEABLE . . . . . 03 LAMPE DE POCHE, TORCHE OU LANTERNE À PILES . . . . . 04 LAMPE BIOGAZ . . . . . 05 LAMPE ESSENCE/GROUPE ELECTROGENE 06 LAMPE PARAFFINE/PÉTROLE . . . . . 07 CHARBON DE BOIS . . . . . 08 BOIS . . . . . 09 PAILLE/BRANCHAGES/HERBES . . . . . 10 PRODUITS AGRICOLES . . . . . 11 BOUSE D'ANIMAL/DÉCHETS . . . . . 12 LAMPE À HUILE . . . . . 13 BOUGIE . . . . . 14 PAS D'ÉCLAIRAGE DANS LE MÉNAGE . . . . 95 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
127	Dans ce ménage, combien de pièces utilisez-vous pour dormir ?	NOMBRE DE PIÈCES	
128	Est-ce que votre ménage possède du bétail, des troupeaux, d'autres animaux de ferme ou de la volaille ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 130

CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
129	Parmi les animaux suivants, combien votre ménage en possède-t-il ? SI AUCUN, NOTEZ '00'. SI 95 OU PLUS, NOTEZ '95'. SI NE SAIT PAS, NOTEZ '98'.		
	a) Vaches laitières ou taureaux ?	a) VACHES/TAUREAUX	
	b) Autre bovins ?	b) AUTRE BOVINS	
	c) Chevaux, ânes ou mulets ?	c) CHEVAUX/ÂNES/MULETS	
	d) Chèvres ?	d) CHÈVRES	
	e) Moutons ?	e) MOUTONS	
	f) Cochons?	f) COCHONS	
	g) Poulets ou autre volaille ?	g) POULETS/AUTRE VOLAILLE . .	
	h) Chameaux ou dromadaires?	h) CHAMEAUX/DROMADAIRES . .	
130	Est-ce qu'un membre de votre ménage possède des terres cultivables ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 132
131	Combien d'hectares de terres cultivables les membres du ménage possèdent-ils ? SI 95 OU PLUS, ENCERCLEZ '950'.	HECTARES . . . . 95 HECTARES OU PLUS . . . . . 950 NE SAIT PAS 998	

CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
132	Dans ce ménage, avez-vous :	OUI NON	
	a) L'électricité ?	a) ÉLECTRICITÉ 1 2	
	b) Un poste radio ?	b) RADIO 1 2	
	c) Une télévision ?	c) TÉLÉVISION 1 2	
	d) Un téléphone fixe ?	d) TÉLÉPHONE FIXE 1 2	
	e) Un ordinateur ?	e) ORDINATEUR 1 2	
	f) Un réfrigérateur ?	f) RÉFRIGÉRATEUR 1 2	
	g) Une chaise en matériaux traditionnels?	g) CHAISE EN MATERIAUX TRADI 1 2	
	h) Armoire/Bibliothèque?	h) ARMOIRE/BIBLIOTHÈQU 1 2	
	i) Un réchaud?	i) RÉCHAUD 1 2	
	j) Une cuisinière, à gaz ou électrique?	J) CUISINIÈRE 1 2	
	k) Un foyer amélioré?	k) FOYER AMÉLIORÉ 1 2	
	l) Un climatiseur?	l) CLIMATISEUR 1 2	
	m) Un modem/clé internet?	m) INTERNET 1 2	
	n) Un panneau solaire?	n) PANNEAUX SOLAIRES 1 2	
	o) Un groupe électrogène?	o) GROUPE ELECTROGENE 1 2	
133	Est-ce qu'un membre de votre ménage possède :	OUI NON	
	a) Une montre ?	a) MONTRE 1 2	
	b) Un téléphone portable ?	b) TÉLÉPHONE PORTABLE 1 2	
	c) Une bicyclette ?	c) BICYCLETTE 1 2	
	d) Une motocyclette ou un scooter ?	d) MOTOCYCLETTE/SCOOTER 1 2	
	e) Une charrette tirée par un animal ?	e) CHARRETTE AVEC ANIMAL . . 1 2	
	f) Une voiture ou une camionnette ?	f) VOITURE/CAMIONNETTE . . 1 2	
	g) Un bateau à moteur ou une pinasse ?	g) BATEAU À MOTEUR/PINASSE 1 2	
	h) Une charrue?	h) CHARRUES 1 2	
	i) Une pirogue ?	i) PIROGUE 1 2	
	j) Un tracteur?	j) TRACTEUR 1 2	
	k) Un motoculteur/tracteur ?	k) MOTOCULTEUR/TRACTEUR 1 2	
	l) un semoir motorisé ?	l) SEMOIR MOTORISE 1 2	
	m) Une moto tricycle ?	m) MOTO TRICYCLE 1 2	
134	Est-ce qu'un membre de ce ménage possède un compte dans une banque ou dans une autre institution financière ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
135	Est-ce qu'un membre de ce ménage utilise un téléphone portable pour effectuer des transactions financières comme envoyer ou recevoir de l'argent, payer des factures, acheter des biens ou services ou recevoir un salaire ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
136	Est-ce qu'il arrive que quelqu'un fume dans votre maison ? Diriez-vous que cela arrive tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois, moins d'une fois par mois ou jamais ?	TOUS LES JOURS . . . . . 1 UNE FOIS PAR SEMAINE . . . . . 2 UNE FOIS PAR MOIS . . . . . 3 MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS . . . . . 4 JAMAIS 5	
137	Est-ce que votre ménage a des moustiquaires ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 148A
138	Combien de moustiquaires votre ménage a-t-il ? SI 15 MOUSTIQUAIRES OU PLUS, NOTEZ '15'.	NOMBRE DE MOUSTIQUAIRES . .	

MOUSTIQUAIRES

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
	DEMANDEZ À L'ENQUÊTÉ DE VOUS MONTRER TOUTES LES MOUSTIQUAIRES DU MÉNAGE. OBSERVEZ ET POSEZ LES QUESTIONS À PROPOS DE CHAQUE MOUSTIQUAIRE, UNE PAR UNE.		
139	ATTRIBUEZ À CHAQUE MOUSTIQUAIRE UN NOMBRE SÉQUENTIEL ET INSCRIVEZ LE	NUMÉRO DE MOUSTIQUAIRE	
140	Je voudrais voir les moustiquaires. Pouvez-vous me montrer la première moustiquaire ? ENREGISTRER SI LA MOUSTIQUAIRE A ÉTÉ OBSERVÉE OU NON	OBSERVÉE . . . . . 1 NON OBSERVÉE 2	
141	Cela fait combien de mois que votre ménage a la moustiquaire ? SI MOINS D'UN MOIS, NOTEZ '00'.	IL Y A MOIS . . . . . PLUS DE 36 MOIS . . . . . 95 PAS SÛR 98	
142	OBSERVEZ OU DEMANDEZ LA MARQUE/TYPE DE LA MOUSTIQUAIRE. SI LA MARQUE N'EST PAS CONNUE ET SI VOUS NE POUVEZ PAS VOIR LA MOUSTIQUAIRE, MONTREZ À L'ENQUÊTÉ DES PHOTOS DE MARQUES ET DE TYPES COURANTS DE MOUSTIQUAIRE.	**MOUSTIQUAIRE IMPRÉGNÉE D'INSECTICIDE À LONGUE DURÉE D'ACTION (MIILDA)** OLYSET . . . . . 11 PERMANET . . . . . 12 INTERCEPTOR . . . . . 13 SERENA . . . . . 14 YORKOOL . . . . . 15 YAMEI . . . . . 16 DAWA PLUS . . . . . 17 SAFENET . . . . . 18 AUTRE/NE CONNAÎT PAS LA MARQUE (MIILDA) . . . . . 19 AUTRE TYPE (PAS MIILDA) . . . . . 96 NE CONNAÎT PAS LE TYPE 98	
143	Avez-vous obtenu la moustiquaire à l'occasion des campagnes de distribution de masse de 2020, celle de 2023, celle de 2024, durant une consultation prénatale ou au cours d'une visite pour une vaccination ?	OUI, CAMPAGNE DE 2020 . . . . . 1 OUI, CAMPAGNE DE 2023 . . . . . 2 OUI, CAMPAGNE DE 2024 . . . . . 3 OUI, PRÉNATALE . . . . . 4 OUI, VISITE POUR VACCINATION . . . . . 5 NON 6	→ 145
144	Où avez-vous obtenu la moustiquaire ?	ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ PUBLIC . . . . . 01 ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ PRIVÉ . . . . . 02 PHARMACIE . . . . . 03 BOUTIQUE/MARCHÉ . . . . . 04 ONG . . . . . 05 INSTITUTION RELIGIEUSE . . . . . 06 ÉCOLE . . . . . 07 ZONE MINIÈRE . . . . . 08 AUTRE . . . . . 96 NE SAIT PAS 98	
145	Est-ce que, la nuit dernière, quelqu'un a dormi sous cette moustiquaire ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 PAS SÛR 8	 → 147 → 148

MOUSTIQUAIRES

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
146	Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière ? INSCRIVEZ LE NOM DE LA PERSONNE ET SON NUMÉRO DE LIGNE DU TABLEAU MÉNAGE.	NOM _____ N° DE LIGNE . . . . . [ ][ ] NOM _____ N° DE LIGNE . . . . . [ ][ ] NOM _____ N° DE LIGNE . . . . . [ ][ ] NOM _____ N° DE LIGNE . . . . . [ ][ ]	→ 148
147	Pour quelle raison principale, cette moustiquaire n'a-t-elle pas été utilisée la nuit dernière ?	TROP CHAUD . . . . . 01 N'AIME PAS LA FORME/COULEUR/TAILLE DE LA MOUSTIQUAIRE . . . . . 02 N'AIME PAS L'ODEUR/ALLERGI . . . . . 03 INCAPABLE DE LA SUSPENDRE/PARESSE . . 04 A DORMI DEHORS . . . . . 05 L'UTILISATEUR HABITUEL N'A PAS DORMI ICI LA NUIT DERNIÈRE . . . . . 06 PAS DE MOUSTIQUES/PAS DE PALUDISME . . 07 MOUSTIQUAIRE SUPPLÉMENTAIRE/GARDÉE POUR PLUS TARD/POUR VISITEURS . . . . . 08 MOUSTIQUAIRE DEFECTUEUSE/ MAUVAIS ETAT/NON UTILISABLE . . . . . 09 PENSE QUE INUTILE D'UTILISER . . . . . 10 PRÈFÈRE UTILISER VENTILATEUR/ CLIMATISEUR/INSECTICIDE . . . . . 11 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
148	RETOURNEZ À 139 POUR LA MOUSTIQUAIRE SUIVANTE ; S'IL N'Y A PLUS DE MOUSTIQUAIRES, ALLEZ À 148A.		

TRANSFERTS SOCIAUX

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
148A	J'aimerais vous poser des questions sur les multiples programmes d'aide économique extérieure dont peuvent bénéficier les ménages. Par aide extérieure, j'entends le soutien apporté par le gouvernement ou par des organisations non gouvernementales telles que des organisations religieuses, caritatives ou communautaires. Cela exclut le soutien apporté par la famille, par d'autres personnes proches, par des amis ou des voisins.		
148B	Connaissez-vous le programme gouvernemental d'urgence Jigisèmèjiri?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 148E
148C	Est-ce que votre ménage ou l'une des personnes qui composent votre ménage a reçu une aide grâce à Jigisèmèjiri ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 PAS SÛR 8	→ 148E
148D	Quand votre ménage ou l'une des personnes qui composent votre ménage a reçu une aide pour la dernière fois grâce à Jigisèmèjiri ? INSCRIVEZ EN MOIS SI MOINS DE 12 MOIS; EN ANNÉES SI 1AN /12 MOIS OU PLUS	MOIS 1 ☐☐ ANNÉE 2 ☐☐	
148E	Est-ce que votre ménage ou l'une des personnes qui composent votre ménage a reçu une aide grâce à un programme d'aide économique extérieure autre que Jigisèmèjiri ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 PAS SÛR 8	→ 149
148F	VÉRIFIEZ SI 148B=2, 148C=2, OU148C=8 OUI ↓ / NON ↓ a) Quand votre ménage ou l'une des personnes qui composent votre ménage a reçu une aide grâce à un programme d'aide économique extérieure pour la dernière fois ? b) Quand votre ménage ou l'une des personnes qui composent votre ménage a reçu une aide grâce à cet autre programme pour la dernière fois ? INSCRIVEZ EN MOIS SI MOINS DE 12 MOIS; EN ANNÉES SI 1AN /12 MOIS OU PLUS	MOIS 1 ☐☐ ANNÉE 2 ☐☐	

AUTRES CARACTÉRISTIQUES DU LOGEMENT

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
149	Nous voudrions connaître l'endroit utilisé par les membres du ménage pour se laver les mains. Pouvez-vous me montrer, s'il vous plait, où les membres du ménage se lavent les mains ?	OBSERVÉ, ENDROIT FIXE . . . . . 1 OBSERVÉ, NON FIXE . . . . . 2 NON OBSERVÉ, PAS DANS LOGEMENT /COUR/PARCELLE . 3 NON OBSERVÉ, PERMISSION DE VOIR NON OBTENUE . . 4 NON OBSERVÉ, AUTRE RAISON 5	→ 152
150	OBSERVEZ LA PRÉSENCE D'EAU À L'ENDROIT UTILISÉ POUR SE LAVER LES MAINS. NOTEZ L'OBSERVATION.	EAU DISPONIBLE . . . . . 1 EAU NON DISPONIBLE 2	
151	OBSERVEZ LA PRÉSENCE DE SAVON, DE DÉTERGENT OU D'AUTRES PRODUITS NETTOYANTS À L'ENDROIT UTILISÉ POUR SE LAVER LES MAINS NOTEZ L'OBSERVATION.	SAVON OU DÉTERGENT (EN MORCEAU, LIQUIDE, POUDRE, PÂTE) . A CENDRE, BOUE, SABLE . . . . . B AUCUN . . . . . Y	
152	OBSERVEZ LE MATÉRIAU PRINCIPAL DU SOL DU LOGEMENT. NOTEZ L'OBSERVATION	**MATÉRIAU NATUREL** TERRE/SABLE/GRAVIER . . . . . 11 BOUSE . . . . . 12 **MATÉRIAU RUDIMENTAIRE** PLANCHES EN BOIS . . . . . 21 PALMES/BAMBOU . . . . . 22 **MATÉRIAU ÉLABORÉ** PARQUET OU BOIS CIRÉ . . . . . 31 BANDES DE VINYLE/ASPHALTE . . . . . 32 CARRELAGE . . . . . 33 CIMENT . . . . . 34 MOQUETTE . . . . . 35 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
153	OBSERVEZ LE MATÉRIAU PRINCIPAL DU TOIT DU LOGEMENT. NOTEZ L'OBSERVATION.	**MATÉRIAU NATUREL** PAS DE TOIT . . . . . 11 CHAUME/PALMES/FEUILLES/TIGES DE MIL 12 MOTTES DE TERRE . . . . . 13 **MATÉRIAU RUDIMENTAIRE** NATTE . . . . . 21 PALMES/BAMBOU . . . . . 22 PLANCHES EN BOIS . . . . . 23 CARTON . . . . . 24 BACHE/PLASTIQUE . . . . . 25 **MATÉRIAU ÉLABORÉ** TÔLE . . . . . 31 BOIS . . . . . 32 ZINC/FIBRE DE CIMENT . . . . . 33 TUILES . . . . . 34 CIMENT . . . . . 35 SHINGLES . . . . . 36 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	

AUTRES CARACTÉRISTIQUES DU LOGEMENT

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
154	OBSERVEZ LE MATÉRIAU PRINCIPAL DES MURS EXTÈRIEURS DU LOGEMENT. NOTEZ L'OBSERVATION.	**MATÉRIAU NATUREL** PAS DE MUR . . . . . 11 BAMBOU/CANE/PALME/TRONC . . . . . 12 TERRE . . . . . 13 **MATÉRIAU RUDIMENTAIRE** BAMBOU AVEC BOUE . . . . . 21 PIERRES AVEC BOUE . . . . . 22 ADOBE NON RECOUVERT . . . . . 23 CONTRE-PLAQUÉ . . . . . 24 CARTON . . . . . 25 BOIS DE RÉCUPÉRATION . . . . . 26 **MATÉRIAU ÉLABORÉ** CIMENT . . . . . 31 PIERRES AVEC CHAUX/CIMENT . . . . . 32 BRIQUES . . . . . 33 BLOCS DE CIMENT . . . . . 34 ADOBE RECOUVERT . . . . . 35 PLANCHE EN BOIS/SHINGLES . . . . . 36 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
155	Je voudrais vérifier si le sel utilisé dans votre ménage est iodé. Puis-je avoir un peu de sel qui est utilisé pour cuisiner dans votre ménage ? TEST DU SEL POUR L'IODE.	**SEL TESTÉ** PRÉSENCE D'IODE . . . . . 1 PAS D'IODE . . . . . 2 **SEL NON TESTÉ** LE MÉNAGE UTILISE DU SEL MAIS IL N'Y A PAS DE SEL DANS LE MÉNAGE . . . . 3 LE MÉNAGE N'UTILISE PAS DE SEL . . . . 4 SEL NON TESTÉ _____ 6 (PRÉCISEZ LA RAISON)	
156	NOTEZ L'HEURE.	HEURES . . . . . ☐☐ MINUTES . . . . . ☐☐	

OBSERVATIONS DE L'ENQUÊTEUR/ENQUÊTRICE

À REMPLIR, UNE FOIS L'INTERVIEW TERMINÉE

COMMENTAIRES CONCERNANT L'INTERVIEW :

COMMENTAIRES SUR DES QUESTIONS PARTICULIÈRES :

AUTRES COMMENTAIRES :

OBSERVATIONS DU CHEF D'ÉQUIPE

DATE: 02 nov 2023

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INSTAT)

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE SECTEUR SANTÉ, DEVELOPPEMENT SOCIAL ET PROMOTION DE LA FAMILLE (CPS/SSDSPF)

SEPTIÈME ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ AU MALI

EDSM-VII

QUESTIONNAIRE FEMME

IDENTIFICATION

NOM DE LA LOCALITÉ _____

NOM DU CHEF DE MÉNAGE _____

NUMÉRO DE GRAPPE . . . . . | | | | |

NUMÉRO DE CONCESSION . . . . . | | | | |

NUMÉRO DE MÉNAGE . . . . . | | | | |

NOM ET NUMÉRO DE LIGNE DE LA FEMME _____ | | |

FEMME SÉLECTIONNÉE POUR MODULE VD ? (1=OUI, 2=NON) . . . . . |_|

VISITES D'ENQUÊTRICES

	1	2	3	VISITE FINALE
DATE				JOUR |_|_|
				MOIS |_|_|
				ANNÉE |_|_|_|_|
NOM DE L'ENQUÊTRICE				N° ENQUÊTR. |_|_|_|
RÉSULTAT*				RÉSULTAT* |_|
PROCHAINEDATE VISITE				NOMBRE TOTAL DE VISITES |_|
HEURE				

*CODES RÉSULTAT :
1 COMPLÉTÉ
2 PAS À LA MAISON
3 DIFFÉRÉ
4 REFUSÉ
5 PARTIELLEMENT COMPLÉTÉ
6 INCAPACITÉ
7 AUTRE _____ PRÉCISEZ

LANGUE DU QUESTIONNAIRE** **0 1** LANGUE DE L'INTERVIEW** |_|_| LANGUE MATERNELLE DE L'ENQUÊTÉE** |_|_| INTERPRÈTE (OUI = 1, NON = 2) |_|

LANGUE DU QUESTIONNAIRE** **FRANÇAIS**

**CODES LANGUES :

01 FRANÇAIS	07 DOGON
02 BAMBARA/MALINKÉ	08 MINIANKA
06 MARKA/SONINKÉ	09 TAMACHECK
04 PEUHL/FOULFOULDÉ	10 BOBO/DAFING
05 SÉNOUFO	11 BOZO
06 MARKA/SONINKÉ	96 AUTRE

_____ (PRÉCISEZ)

ÉQUIPE |_|_| NUMÉRO

CHEF D'ÉQUIPE
_____ NOM |_|_|_|_| NUMÉRO

PRÉSENTATION ET DEMANDE DE CONSENTEMENT

Bonjour. Je m'appelle _____. Je travaille pour l'Institut National de la Statistique (INSTAT). En collaboration avec la Cellule de Planification et de Statistique Secteur Santé-Développement Social et Promotion de la Famille (CPS/SS-DS-PF), nous effectuons une enquête nationale sur la santé et sur d'autres sujets partout au Mali. Les informations que nous collectons aideront à améliorer les services de santé. Votre ménage a été sélectionné pour cette enquête. Les questions prennent habituellement entre 30 et 60 minutes. Toutes les informations que vous nous donnerez sont strictement confidentielles et elles ne seront transmises à personne d'autre que les membres de l'équipe d'enquête. Vous n'êtes pas obligée de participer à cette enquête mais nous espérons que vous accepterez de répondre à questions car votre opinion est très importante. S'il arrivait que je pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, dites-le moi et je passerai à la question suivante ; vous pouvez également interrompre l'interview à n'importe quel moment.

Si vous souhaitez plus d'informations sur l'enquête, vous pouvez contacter la personne dont le nom figure sur la carte qui a déjà été donnée à votre ménage.

Avez-vous des questions à me poser ?
Puis-je commencer l'interview maintenant ?

SIGNATURE DE L'ENQUÊTRICE : _____ DATE _____

L'ENQUÊTÉE ACCEPTE D'ÊTRE INTERVIEWÉE . . 1 → SECTION 1

L'ENQUÊTÉE REFUSE D'ÊTRE INTERVIEWÉE . . 2 → FIN

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTÉE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
101	INSCRIVEZ L'HEURE.	HEURES . . . . . ☐☐ MINUTES . . . . . ☐☐	
102	Dans quelle RÉGION êtes-vous née ?	KAYES . . . . . 01 KOULIKORO . . . . . 02 SIKASSO . . . . . 03 SÉGOU . . . . . 04 MOPTI . . . . . 05 TOMBOUCTOU . . . . . 06 GAO . . . . . 07 KIDAL . . . . . 08 TAOUDENIT . . . . . 09 MÉNAKA . . . . . 10 BAMAKO . . . . . 11 EN DEHORS DU MALI/À L'ÉTRANGER 96	→ 104
103	Dans quel pays êtes-vous née ?	PAYS _____ ☐☐	
104	Depuis combien de temps vivez-vous de manière continue à (NOM DE LA VILLE, PETITE VILLE OU VILLAGE ACTUEL DE RÉSIDENCE) ? SI MOINS D'UNE ANNÉE, INSCRIVEZ '00' ANNÉE.	ANNÉES . . . . . ☐☐ DEPUIS TOUJOURS . . . . . 95 VISITEUR 96	→ 110
105	VÉRIFIEZ 104 : 00 - 04 ANS ☐ ↓ 05 ANS OU PLUS ☐ →		→ 107
106	En quel mois et en quelle année avez-vous emménagé ici ?	MOIS . . . . . ☐☐ NE CONNAÎT PAS LE MOIS . . . . . 98 ANNÉE . . . . . ☐☐☐☐ NE CONNAÎT PAS L'ANNÉE 9998	

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTÉE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
107	Juste avant d'emménager ici, dans quelle RÉGION viviez-vous ?	KAYES . . . . . 01 KOULIKORO . . . . . 02 SIKASSO . . . . . 03 SÉGOU . . . . . 04 MOPTI . . . . . 05 TOMBOUCTOU . . . . . 06 GAO . . . . . 07 KIDAL . . . . . 08 TAOUDENIT . . . . . 09 MÉNAKA . . . . . 10 BAMAKO . . . . . 11 EN DEHORS DU MALI/À L'ÉTRANGER 96	
108	Juste avant d'emménager ici, est-ce que vous viviez dans une grande ville comme Bamako, une petite ville ou en zone rurale ?	GRANDE VILLE (BAMAKO, AUTRE CAPITAL,...) 1 AUTRE VILLE . . . . . 2 ZONE RURALE 3	
109	Pourquoi avez-vous déménagé dans cet endroit ?	EMPLOI . . . . . 01 ÉDUCATION/FORMATION . . . . . 02 MARIAGE . . . . . 03 RÉUNIFICATION FAMILIALE/AUTRE RAISON FAMILIALE . . . . . 04 DÉPLACEMENT FORCÉ . . . . . 05 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
110	En quel mois et en quelle année êtes-vous née ?	MOIS . . . . . [ ][ ] NE CONNAÎT PAS LE MOIS . . . . . 98 ANNÉE . . . . . [ ][ ][ ][ ] NE CONNAÎT PAS L'ANNÉE 9998	
111	Quel âge aviez-vous à votre dernier anniversaire ? COMPAREZ ET CORRIGEZ 110 ET/OU111 SI INCOHÉRENT.	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES . . . . [ ][ ]	
112	Globalement, comment jugez-vous votre état de santé, très bon, bon, moyennement bon, mauvais ou très mauvais ?	TRÈS BON . . . . . 1 BON . . . . . 2 MOYENNEMENT BON . . . . . 3 MAUVAIS . . . . . 4 TRÈS MAUVAIS 5	
113	Êtes-vous allée à l'école ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 117
114	Quel est le plus haut niveau d'études que vous avez atteint : fondamental 1 (1er cycle), fondamental 2 (2nd cycle), secondaire (lycée, technique, professionnel) ou supérieur ?	FONDAMENTAL 1er Cycle . . . . . 1 FONDAMENTAL 2nd Cycle . . . . . 2 SECONDAIRE (Lycée/Technique/Professionnel) 3 SUPÉRIEUR 4	
115	Quelle est [L'ANNÉE/CLASSE] la plus élevée que vous avez achevée à ce niveau ? SI MOINS D'UNE ANNÉE A ÉTÉ ACHEVÉE À CE NIVEAU, INSCRIVEZ '00'.	[ANNÉE/CLASSE] . . . . . [ ][ ]	

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTÉE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
116	VÉRIFIEZ 114 : FONDAMENTAL 1er Cycle, FONDAMENTAL 2nd Cycle, SECONDAIRE ☐ ↓ SUPÉRIEUR ☐ → 119		
117	Je voudrais maintenant que vous me lisiez cette phrase. MONTREZ LA CARTE À L'ENQUÊTÉE. SI L'ENQUÊTÉE NE PEUT LIRE TOUTE LA PHRASE, INSISTEZ : Pouvez-vous lire une partie de la phrase ?	NE PEUT PAS LIRE DU TOUT . . . . . 1 PEUT SEULEMENT LIRE UNE PARTIE DE LA PHRASE . . . . . 2 PEUT LIRE TOUTE LA PHRASE . . . . . 3 PAS DE CARTE DANS LA LANGUE DEMANDÉE _____ 4 (PRÉCISEZ LA LANGUE) AVEUGLE/PROBLÈMES DE VUE 5	
118	VÉRIFIEZ 117: CODE '2', '3' OU '4' ENCERCLÉ ☐ ↓ CODE '1' OU '5' ENCERCLÉ ☐ → 120		
119	Lisez-vous un journal ou un magazine au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?	AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE . . . . . 1 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE . . . . . 2 PAS DU TOUT 3	
120	Écoutez-vous la radio au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?	AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE . . . . . 1 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE . . . . . 2 PAS DU TOUT 3	
121	Regardez-vous la télévision au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?	AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE . . . . . 1 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE . . . . . 2 PAS DU TOUT 3	
122	Avez-vous un téléphone portable ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 127
123	Est-ce que votre téléphone portable est un smart phone ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
127	Avez-vous déjà utilisé l'Internet depuis n'importe quel endroit ou n'importe quel appareil ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 130
128	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé l'Internet ? SI NÉCESSAIRE, INSISTEZ POUR L'UTILISATION À PARTIR DE N'IMPORTE QUEL ENDROIT AVEC N'IMPORTE QUEL APPAREIL.	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 130
129	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous utilisé l'Internet : presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?	PRESQUE CHAQUE JOUR . . . . . 1 AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE . . . . . 2 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE . . . . . 3 PAS DU TOUT 4	

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTÉE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
130	Quelle est votre religion ?	MUSULMANE . . . . . 01 CATHOLIQUE . . . . . 02 PROTESTANT . . . . . 03 AUTRE RELIGION CHRÉTIENNE 04 ANIMISTE . . . . . 05 SANS RELIGION . . . . . 06 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
131	Quelle est votre ethnie ?	**CODE ETHNIE (Pour les MALIENS)** BAMBARA . . . . . 01 MALINKE . . . . . 02 PEULH . . . . . 03 SARAKOLE/SONINKE/MARKA . . . . . 04 KASSONKE . . . . . 05 SONRAÏ . . . . . 06 DOGON . . . . . 07 TOUAREG/BELLA . . . . . 08 SÉNOUFO/MINIANKA . . . . . 09 BOBO . . . . . 10 BOZO . . . . . 11 ARABE/MAURE . . . . . 12 AUTRE ETHNIE MALIENNE _____ 16 (PRÉCISEZ) **CODE NATIONALITÉ (Pour les ÉTRANGERS)** PAYS CEDEAO . . . . . 21 AUTRES PAYS AFRICAINS . . . . . 22 AUTRES NATIONALITÉS 23	
132	VÉRIFIEZ 111: ÂGE: 15-49 ANS ☐ ↓ ÂGE: 50-64 ANS ☐ →		1200

SECTION 2. REPRODUCTION

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
201	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur toutes les naissances que vous avez eues durant votre vie. Avez-vous déjà donné naissance à des enfants ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 206
202	Avez-vous des fils ou des filles à qui vous avez donné naissance et qui vivent actuellement avec vous ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 204
203	a) Combien de fils vivent avec vous ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'. b) Et combien de filles vivent avec vous ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'.	a) FILS À LA MAISON . . . . . ☐☐ b) FILLES À LA MAISON . . . . . ☐☐	
204	Avez-vous des fils ou des filles à qui vous avez donné naissance qui sont toujours en vie mais qui ne vivent pas avec vous ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 206
205	a) Combien de fils sont vivants mais qui ne vivent pas avec vous ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'. b) Et combien de filles sont vivantes mais qui ne vivent pas avec vous ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'.	a) FILS AILLEURS . . . . . ☐☐ b) FILLES AILLEURS . . . . . ☐☐	
206	Avez-vous déjà donné naissance à un garçon ou à une fille qui est né vivant mais qui est décédé par la suite ? SI NON, INSISTEZ : Aucun bébé qui a crié ou fait un mouvement, qui a émis un son ou essayé de respirer ou qui a montré d'autres signes de vie pendant un très court moment ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 208
207	a) Combien de garçons sont décédés ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'. b) Et combien de filles sont décédées ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'.	a) GARÇONS DÉCÉDÉS . . . . . ☐☐ b) FILLES DÉCÉDÉES . . . . . ☐☐	
208	FAITES LA SOMME DES RÉPONSES À 203, 205, ET 207, ET INSCRIVEZ LE TOTAL. SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'.	TOTAL NAISSANCES . . . . . ☐☐	
209	VÉRIFIEZ 208 : Je voudrais être sûre d'avoir bien compris : vous avez eu au total (NOMBRE DE NAISSANCES) naissances durant votre vie. Est-ce bien exact ? OUI ☐ NON ☐ INSISTEZ ET CORRIGEZ 201-208 COMME IL SE DOIT.		

SECTION 2. REPRODUCTION

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
210	Il arrive parfois que les femmes ont une grossesse qui ne se termine pas par une naissance vivante. Par exemple, une grossesse peut se terminer en fausse-couche, par un avortement ou l'enfant peut être mort-né. Avez-vous déjà eu une grossesse qui ne s'est pas terminée par une naissance vivante ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 212
211	Combien de fausses couches, d'avortements et de mort-nés avez-vous eus ?	PERTES DE GROSSESSE	
212	FAITES LA SOMME DE 208 ET 211 ET INSCRIVEZ LE TOTAL. SI AUCUNE, INSCRIVEZ '00'.	TOTAL DU RÉSULTAT DES GROSSESSES	
213	VÉRIFIEZ 212: UNE GROSSESSE PASSÉE OU PLUS ☐ ↓ AUCUNE GROSSESSE PASSÉE ☐ →		232

214 Je voudrais maintenant enregistrer toutes vos grossesses comprenant les naissances vivantes, les morts-nés, les fausses-couches et les avortements, en commençant par votre première grossesse.

ENREGISTRER LES JUMEAUX ET LES TRIPLÉS SUR DES LIGNES SÉPARÉES.

NUMÉRO DE LIGNE DE L'HISTO-RIQUE DE LA GROS-SESSE	215	216	217	218	219	220	221	222
	SI LIGNE=01 Rappelez-vous de votre première grossesse. Est-ce que c'était une grossesse simple, des jumeaux ou triplés ? SI LIGNE>01 Rappelez-vous de votre suivante grossesse. Est-ce que c'était une grossesse simple, des jumeaux ou triplés ?	SI 215=SIMPLE : Est-ce que le bébé est né vivant, mort-né ou avez-vous eu une fausse-couche ou un avortement ? SI 215>1 : PREM. DE MULT. Est-ce que le premier bébé de cette grossesse est né vivant ou mort ? SUIV. DE MULT. Est-ce que le prochain bébé de cette grossesse est né vivant ou mort ?	Est-ce que le bébé a crié, a bougé ou respiré ?	Quel nom a été donné au bébé ? INSCRIVEZ LE NOM.	(NOM EN 218) est-il un garçon ou une fille ?	VÉRIFIEZ 216 ET 217: TYPE DE RÉSULTAT DE GROSSESSE . NOTE: SI 217=1, ALORS LE RÉSULTAT DE LA GROSSESSE = NÉ VIVANT . SI NÉ VIVANT. : Quel jour, quel mois et en quelle année (NOM EN 218) est-il/elle né(e) ? SI MORT-NÉ, FAUSSE-COUCHE OU AVORT. : Quel jour, quel mois et en quelle année, cette grossesse s'est-elle terminée ?	Combien de semaines ou de mois cette grossesse a-t-elle durée ? ENREGISTRER EN SEMAINES OU MOIS RÉVOLUS.	SI LIGNE=01 : Y a-t-il eu d'autres grossesses avant cette grossesse ? SI LIGNE>01 : Y a-t-il eu d'autres grossesses entre la grossesse précédente et cette grossesse ? SI 215>1 ET CE N'EST PAS LA PREMIÈRE NAISSANCE DE LA GROSSESSE. PASSEZ À 216 À LA LIGNE SUIVANTE
01	SIMPLE 1 JUME ... 2 TRIP .... 3 QUAD .. 4 QUIN ... 5	NÉ VIVANT ..... 1 (ALLEZ À 218) MORT NÉ ..... 2 FAUSSE-COUCHE ..... 3 (ALLEZ À 220) AVORTEMENT 4	OUI ..... 1 NON .... 2 (ALLEZ À 220)	NOM	GAR. .... 1 FILLE ... 2	JOUR MOIS ANNÉE	SEMAINE 1 MOIS 2	OUI ..... 1 (AJOUTEZ GROSSESSE) NON ..... 2 (LIGNE SUIVANTE)
02	SIMPLE 1 JUME ... 2 TRIP .... 3 QUAD .. 4 QUIN ... 5	NÉ VIVANT ..... 1 (ALLEZ À 218) MORT NÉ ..... 2 FAUSSE-COUCHE ..... 3 (ALLEZ À 220) AVORTEMENT 4	OUI ..... 1 NON .... 2 (ALLEZ À 220)	NOM	GAR. .... 1 FILLE ... 2	JOUR MOIS ANNÉE	SEMAINE 1 MOIS 2	OUI ..... 1 (AJOUTEZ GROSSESSE) NON ..... 2 (LIGNE SUIVANTE)
03	SIMPLE 1 JUME ... 2 TRIP .... 3 QUAD .. 4 QUIN ... 5	NÉ VIVANT ..... 1 (ALLEZ À 218) MORT NÉ ..... 2 FAUSSE-COUCHE ..... 3 (ALLEZ À 220) AVORTEMENT 4	OUI ..... 1 NON .... 2 (ALLEZ À 220)	NOM	GAR. .... 1 FILLE ... 2	JOUR MOIS ANNÉE	SEMAINE 1 MOIS 2	OUI ..... 1 (AJOUTEZ GROSSESSE) NON ..... 2 (LIGNE SUIVANTE)

222A	Avez-vous eu une grossesse qui s'est terminée depuis la dernière grossesse que vous avez mentionnée ?	OUI ..... 1 → AJOUTEZ AU TABLEAU NON 2
222B	LISEZ LA LISTE DES RÉSULTATS DE LA GROSSESSE DANS L' ORDRE À L'ENQUÊTÉE ET DEMANDEZ-LUI S'ILS CORRESPONDENT À TOUS LES RÉSULTATS QU'ELLE A EUS ET S'ILS SONT ÉNUMÉRÉS DANS L'ORDRE À PARTIR DU PREMIER. EST-CE QUE L'ENQUETÉE EST D'ACCORD ? SI NON, INSISTEZ POUR OBTENIR LES INFORMATIONS CORRECTES ET RÉVISEZ L'HISTORIQUE DE LA GROSSESSE EN CONSÉQUENCE.	

NUMÉRO DE LIGNE DE L'HISTO-RIQUE DE LA GROS-SESSE	223	224	225	226	227	228
			SI NÉ VIVANT ET ENCORE EN VIE :			SI NÉ VIVANT ET MAINTENANT DÉCÉDÉ :
	VÉRIFIEZ 216, 217 ET 221: SI 216=1 OU 217=1, ALORS LE RÉSULTAT DE LA GROSSESSE = NÉ VIVANT. SI 216=2 OU 3, VÉRIFIEZ 221. SI 221 ≥ 7 MOIS OU 28 SEMAINES, ALORS LE RÉSULTAT DE LA GROSSESSE = MORT NÉ. SI 221 < 7 MOIS OU 28 SEMAINES, ALORS LE RÉSULTAT DE LA GROSSESSE = FAUSSE COUCHE. SI 216=4, ALORS LE RÉSULTAT DE LA GROSSESSE = AVORTEMENT.	(NOM EN 218) est-il/elle encore en vie ?	SI 219=GAR : Quel âge avait (NOM EN 218) à son dernier anniversaire ? INSCRIVEZ L'ÂGE EN ANNÉE RÉVOLUE. SI 219=FILLE Quel âge avait (NOM EN 218) à son dernier anniversaire ? INSCRIVEZ L'ÂGE EN ANNÉE RÉVOLUE.	(NOM EN 218) vit-il/elle avec vous ?	INSCRIVEZ LE N° DE LIGNE DE L'ENFANT DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ '00' SI L'ENFANT N'EST PAS LISTÉ DANS LE MÉNAGE .	SI 219=GAR : Quel âge avait (NOM EN 218) quand il est décédé ? SI '12 MOIS' OU '1 AN', DEMANDEZ: Est-ce que (NOM EN 218) avait eu son premier anniversaire ? PUIS DEMANDEZ: Exactement combien de mois avait (NOM EN 218) quand il est décédé ? INSCRIVEZ EN JOURS SI L'ENFANT A MOINS D'1 MOIS; EN MOIS, SI L'ENFANT A MOINS DE 2 ANS; OU EN ANNÉES. SI 219=FILLE : Quel âge avait (NOM EN 218) quand elle est décédée ? SI '12 MOIS' OU '1 AN', DEMANDEZ: Est-ce que (NOM EN 218) avait eu son premier anniversaire ? PUIS DEMANDEZ: Exactement combien de mois avait (NOM EN 218) quand elle est décédée ? INSCRIVEZ EN JOURS SI L'ENFANT A MOINS D'1 MOIS; EN MOIS, SI L'ENFANT A MOINS DE 2 ANS; OU EN ANNÉES.
01	NÉ VIVANT ..... 1 1 MORT NÉ ..... 2 FAUSSE-COUCHE .... 3 AVORTEMENT ... 4	OUI ..... 1 NON ..... 2 → (ALLEZ À 228)	ÂGE EN ANNÉES	OUI ..... 1 NON 2	N° LIGNE DU MÉNAGE → (ALLEZ À 223 LIGNE SUIVANTE)	JOUR 1 MOIS 2 ANNÉE 3 (ALLEZ À 223 LIGNE SUIVANTE)
02	NÉ VIVANT ..... 1 1 MORT NÉ ..... 2 FAUSSE-COUCHE .... 3 AVORTEMENT ... 4	OUI ..... 1 NON ..... 2 → (ALLEZ À 228)	ÂGE EN ANNÉES	OUI ..... 1 NON 2	N° LIGNE DU MÉNAGE → (ALLEZ À 223 LIGNE SUIVANTE)	JOUR 1 MOIS 2 ANNÉE 3 (ALLEZ À 223 LIGNE SUIVANTE)
03	NÉ VIVANT ..... 1 1 MORT NÉ ..... 2 FAUSSE-COUCHE .... 3 AVORTEMENT ... 4	OUI ..... 1 NON ..... 2 → (ALLEZ À 228)	ÂGE EN ANNÉES	OUI ..... 1 NON 2	N° LIGNE DU MÉNAGE → (ALLEZ À 223 LIGNE SUIVANTE)	JOUR 1 MOIS 2 ANNÉE 3 (ALLEZ À 223 LIGNE SUIVANTE)

SECTION 2. REPRODUCTION

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
230	COMPAREZ 212 AVEC NOMBRE DE RÉSULTATS DE GROSSESSE DANS L'HISTORIQUE DE LA GROSSESSE NOMBRE DANS HISTORIQUE GROSSESSE EST PLUS GRAND OU ÉGAL À 212 ↓ NOMBRE DANS HISTORIQUE GROSSESSE EST INFÉRIEUR À 212 ↓ (INSISTEZ ET CORRIGEZ) ←		
231	**C** POUR CHAQUE NAISSANCE EN 2018-2023, INSCRIVEZ 'N' AU MOIS DE NAISSANCE DANS LE CALENDRIER. INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENFANT À GAUCHE DU CODE 'N'. POUR CHAQUE NAISSANCE VIVANTE, DEMANDEZ LE NOMBRE DE MOIS RÉVOLUS QUE LA GROSSESSE A DURÉ ET INSCRIVEZ 'G' À CHACUN DES MOIS PRÉCÉDENTS SELON LA DURÉE DE LA GROSSESSE. (NOTE: LE NOMBRE DE 'G' DOIT ÊTRE INFÉRIEUR DE 1 AU NOMBRE DE MOIS QUE LA GROSSESSE A DURÉ.) POUR CHAQUE GROSSESSE QUI NE S'EST PAS TERMINÉE PAR UNE NAISSANCE VIVANTE EN 2018-2023, INSCRIVEZ 'F' DANS LE CALENDRIER AU MOIS OÙ LA GROSSESSE S'EST TERMINÉE ET 'G' POUR LE NOMBRE RESTANT DE MOIS RÉVOLUS DE GROSSESSE. SI LA DURÉE DE LA GROSSESSE A ÉTÉ DÉCLARÉE EN SEMAINES, MULTIPLIEZ LE NOMBRE DE SEMAINES PAR 0,23 POUR CONVERTIR LE NOMBRE EN MOIS. ARRONDISSEZ AU NOMBRE ENTIER LE PLUS PROCHE POUR OBTENIR LE NOMBRE DE MOIS RÉVOLUS.		
232	Êtes-vous actuellement enceinte ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 PAS SÛRE 8	→ 236
233	De combien de semaines ou de mois êtes-vous enceinte ? ENEGISTREZ LE NOMBRE DE SEMAINES OU DE MOIS RÉVOLUS. **C** INSCRIVEZ 'G' DANS LE CALENDRIER, EN COMMENÇANT PAR LE MOIS DE L'ENQUÊTE ET POUR LE NOMBRE TOTAL DE MOIS RÉVOLUS. SI LA DURÉE DE LA GROSSESSE A ÉTÉ DÉCLARÉE EN SEMAINES, MULTIPLIEZ LE NOMBRE DE SEMAINES PAR 0,23 POUR CONVERTIR LE NOMBRE EN MOIS. ARRONDISSEZ AU NOMBRE ENTIER LE PLUS PROCHE POUR OBTENIR LE NOMBRE DE MOIS RÉVOLUS.	SEMAINES . . . . . 1 ☐☐ MOIS . . . . . 2 ☐☐	
234	Quand vous êtes tombée enceinte, vouliez-vous être enceinte à ce moment-là ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 236
235	VÉRIFIEZ 208 : NOMBRE TOTAL DE NAISSANCES VIVANTES UNE OU PLUS ↓ : a) Est-ce que vous vouliez avoir un enfant plus tard ou est-ce que vous ne vouliez plus d'enfant ? AUCUNE ↓ : b) Est-ce que vous vouliez avoir un enfant plus tard ou est-ce que vous ne vouliez pas avoir d'enfant ?	PLUS TARD . . . . . 1 PLUS/AUCUN 2	

SECTION 2. REPRODUCTION

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
236	Quand vos dernières règles ont-elles commencé ? _____ (DATE, SI DONNÉE)	IL Y A JOURS . . . . . 1 [ ][ ] IL Y A SEMAINES . . . . . 2 [ ][ ] IL Y A MOIS . . . . . 3 [ ][ ] IL Y A ANNÉES . . . . . 4 [ ][ ] EN MÉNOPAUSE/ A EU UNE HYSTÉRECTOMIE . . . . . 994 AVANT LA DERNIÈRE GROSSESSE . . . . 995 JAMAIS EU DE RÈGLES 996	→ 240 → 241
237	VÉRIFIEZ 236 : EST-CE QUE LES DERNIÈRES RÈGLES ONT EU LIEU AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE ? OUI, AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE ↓ ☐ NON, UNE ANNÉE OU PLUS ☐		→ 240
238	Durant vos dernières règles, qu'avez-vous utilisé pour recueillir ou absorber le sang des règles ? Autre chose ?	SERVIETTES HYGIÈNIQUES RÉUTILISABLES . A SERVIETTES HYGÍÈNIQUES JETABLES . . . . B TAMPONS . . . . . C COUPE MENSTRUELLE . . . . . D TISSU . . . . . E PAPIER TOILETTE . . . . . F COTON . . . . . G SOUS-VÊTEMENT SEULEMENT . . . . . H AUTRE _____ X (PRÉCISEZ) RIEN . . . . . Y	
239	Durant vos dernières règles, est-ce que vous avez pu vous laver et vous changer en privé chez vous ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 LOIN DE LA MAISON PENDANT SES DERNIÈRES RÈGLES 3	
240	Quel âge aviez-vous quand vous avez eu vos premières règles ?	ÂGE . . . . . [ ][ ] NE SAIT PAS 98	
241	Entre la période des règles et les règles suivantes, est-ce qu'il y a une période où les femmes ont plus de chances de tomber enceintes ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 PAS SÛRE 8	→ 243
242	Est-ce que cette période se situe juste avant que les règles ne commencent, pendant la période des règles, juste après que les règles soient terminées ou bien au milieu de deux périodes de règles ?	JUSTE AVANT QUE LES RÈGLES NE COMMENCENT . . . . . 1 PENDANT LES RÈGLES . . . . . 2 JUSTE APRÈS LA FIN DES RÈGLES . . . . . 3 AU MILIEU, ENTRE DEUX PÉRIODES DE RÈGLES . . . . . 4 AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 8	
243	Après la naissance d'un enfant, est-ce qu'une femme peut tomber enceinte avant que ses règles ne soient revenues ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	

SECTION 3. CONTRACEPTION

301	Je voudrais maintenant que nous parlions de planification familiale, c'est-à-dire les différents moyens ou méthodes qu'un couple peut utiliser pour retarder ou éviter une grossesse.	
01	Avez-vous déjà entendu parler de stérilisation féminine ? INSISTEZ : Les femmes peuvent avoir une opération pour ne plus avoir d'enfants.	OUI . . . . . 1 NON 2
02	Avez-vous déjà entendu parler de stérilisation masculine ? INSISTEZ : Les hommes peuvent avoir une opération pour ne plus avoir d'enfants.	OUI . . . . . 1 NON 2
03	Avez-vous déjà entendu parler de DIU ? INSISTEZ : Les femmes peuvent avoir un stérilet qu'un médecin ou une infirmière leur place dans l'utérus pour leur éviter une grossesse pendant une année ou plus.	OUI . . . . . 1 NON 2
04	Avez-vous déjà entendu parler d'injectables ? INSISTEZ : Les femmes peuvent avoir une injection faite par du personnel de santé pour leur éviter une grossesse pendant un mois ou plus.	OUI . . . . . 1 NON 2
05	Avez-vous déjà entendu parler d'implants ? INSISTEZ : Les femmes peuvent se faire insérer par un médecin ou une infirmière un bâtonnet ou plus sous la peau du haut du bras pour leur éviter une grossesse, pendant une année ou plus.	OUI . . . . . 1 NON 2
06	Avez-vous déjà entendu parler de pilule ? INSISTEZ : Les femmes peuvent prendre une pilule chaque jour pour éviter une grossesse.	OUI . . . . . 1 NON 2
07	Avez-vous déjà entendu parler de condom ? INSISTEZ : Les hommes peuvent mettre une capote en caoutchouc sur leur pénis avant les rapports sexuels.	OUI . . . . . 1 NON 2
08	Avez-vous déjà entendu parler de condom féminin ? INSISTEZ : Les femmes peuvent placer un fourreau dans leur vagin avant les rapports sexuels.	OUI . . . . . 1 NON 2
09	Avez-vous déjà entendu parler de contraception d'urgence ? INSISTEZ : Comme mesure d'urgence, les femmes peuvent prendre pendant 3 jours après des rapports sexuels non protégés des pilules spéciales qui les empêchent de tomber enceintes.	OUI . . . . . 1 NON 2
10	Avez-vous déjà entendu parler de méthode des jours fixes ? INSISTEZ : Les femmes utilisent un collier de perles de couleur différente pour connaître les jours où elles peuvent tomber enceintes. Durant ces jours où elles peuvent tomber enceintes, elles utilisent un condom ou elles s'abstiennent de rapports sexuels.	OUI . . . . . 1 NON 2
11	Avez-vous déjà entendu parler de méthode de l'aménorrhée et de l'allaitement maternel (MAMA) ? INSISTEZ : Pendant 6 mois après la naissance d'un enfant, avant que les règles ne soient revenues, les femmes utilisent une méthode qui nécessite d'allaiter fréquemment le jour et la nuit.	OUI . . . . . 1 NON 2
12	Avez-vous déjà entendu parler de méthode du rythme ? INSISTEZ : Pour éviter une grossesse, les femmes n'ont pas de rapports sexuels les jours où elles pensent qu'elles peuvent tomber enceintes.	OUI . . . . . 1 NON 2
13	Avez-vous déjà entendu parler de retrait ? INSISTEZ : Les hommes peuvent faire attention et se retirer avant l'éjaculation.	OUI . . . . . 1 NON 2
14	Avez-vous entendu parler d'autres moyens ou méthodes qu'une femme ou un homme peut utiliser pour éviter une grossesse ?	OUI, MÉTHODE MODERNE _____ A (PRÉCISEZ) OUI, MÉTHODE TRADITIONNELLE _____ B (PRÉCISEZ) NON . . . . . Y

SECTION 3. CONTRACEPTION

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
302	VÉRIFIEZ 232 : PAS ENCEINTE OU PAS SÛRE ↓ ENCEINTE →		317
303	Est-ce que vous, ou votre partenaire, faites actuellement quelque chose ou est-ce que vous utilisez actuellement une méthode pour retarder ou éviter une grossesse ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 307
304	Est-ce que vous, ou votre partenaire, êtes stérilisé ? SI OUI : Qui est stérilisé, vous ou votre partenaire ?	OUI, ENQUÊTÉE STÉRILISÉE SEULEMENT . . 1 OUI, PARTENAIRE STÉRILISÉ SEULEMENT 2 OUI, LES DEUX STÉRILISÉS . . . . . 3 NON, NI L'UN, NI L'AUTRE STÉRILISÉ 4	→ 306
305	VÉRIFIEZ 304: ENQUÊTÉE STÉRILISÉE SEULEMENT ↓ : PASSEZ À 307. ENCERCLEZ CODE 'A' ET SUIVEZ L'INSTRUCTION DE PASSAGE. PARTENAIRE STÉRILISÉ SEULEMENT ↓ : PASSEZ À 307. ENCERCLEZ CODE 'B' ET SUIVEZ L'INSTRUCTION DE PASSAGE. LES DEUX STÉRILISÉS ↓ : PASSEZ À 307. ENCERCLEZ CODE 'A' ET CODE 'B' ET SUIVEZ L'INSTRUCTION DE PASSAGE.		
306	Juste pour être sûre, est-ce que vous ou votre partenaire faites l'une des choses suivantes pour éviter une grossesse : éviter délibérément les rapports sexuels certains jours, utiliser un condom, pratiquer le retrait ou utiliser la contraception d'urgence ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 317
307	Quelle méthode utilisez-vous ? ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ. SI PLUS D'UNE MÉTHODE EST MENTIONNÉE, SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE PASSAGE DE LA PREMIÈRE MÉTHODE DE LA LISTE.	STÉRILISATION FÉMININE . . . . . A STÉRILISATION MASCULINE . . . . . B DIU . . . . . C INJECTABLES . . . . . D IMPLANTS . . . . . E PILULE . . . . . F CONDOM . . . . . G CONDOM FÉMININ . . . . . H CONTRACEPTION D'URGENCE . . . . . I MÉTHODE DES JOURS FIXES . . . . . J MAMA . . . . . K MÉTHODE DU RYTHME . . . . . L RETRAIT . . . . . M AUTRE MÉTHODE MODERNE . . . . . X AUTRE MÉTHODE TRADITIONNELLE . . . . . Y	A, B → 312 C → 314 D E → 314 F → 310 G → 311 H, I, J, K, L, M, X, Y → 314
308	Je vais vous montrer maintenant deux photos. Montrez-moi sur la photo ce qui ressemble le plus à ce qui a été utilisé la dernière fois que vous avez reçu votre injectable. MONTREZ DES PHOTOS DE SAYANA PRESS ET D'UNE SERINGUE NORMALE.	DMPA-SC/SAYANA PRESS . . . . . 1 AIGUILLE ET SERINGUE . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	1, 2 → 314
309	La dernière fois que vous avez reçu votre injectable, est-ce que vous vous êtes injecté vous-même DMPA-SC/Sayana Press ou c'est un prestataire de santé qui l'a fait pour vous ?	AUTO-INJECTION . . . . . 1 INJECTION FAITE PAR PRESTATAIRE DE SANTÉ . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	1, 2 → 314

SECTION 3. CONTRACEPTION

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
310	Quelle est la marque de pilule que vous utilisez actuellement ? SI LA MARQUE N'EST PAS CONNUE, DEMANDEZ À VOIR LA BOITE.	PILPLAN . . . . . 01 OVRETTE . . . . . 02 LO FEMENAL . . . . . 03 MINIDRIL . . . . . 04 STEDIRIL . . . . . 05 ADEPAL . . . . . 06 MICROGYN(. . . . . 07 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 98	→ 314
311	Quelle est la marque de condom que vous utilisez actuellement ? SI LA MARQUE N'EST PAS CONNUE, DEMANDEZ À VOIR LA BOITE.	PRUDENCE . . . . . 01 PROTECTOI . . . . . 02 DUREX . . . . . 03 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 98	→ 314
312	Dans quel établissement a été effectuée la stérilisation ? INSISTEZ POUR DÉTERMINEZ LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC, PRIVÉ, OU UNE ONG, ENREGISTREZ '96' ET ÉCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT .	**SECTEUR MÉDICAL PUBLIC** HÔPITAL NATIONAL . . . . . 11 HÔPITAL RÉGIONAL . . . . . 12 CENTRE DE SANTÉ DE RÉFÉRENCE . . . . 13 CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE . . 14 DISPENSAIRE/MATERNITÉ . . . . . 15 INFIRMERIE DE GARNISON MILITAIRE . . 16 CENTRE MEDICAUX INTER-ENTREPRISES (CMIE/INPS) . . . . . 17 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PUBLIC _____ 18 (PRÉCISEZ) **SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ** HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ . . . . . 21 CENTRE CONFESSIONNEL . . . . . 22 CABINET MÉDICAL . . . . . 23 CABINET DE SOIN PRIVÉ . . . . . 24 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ 26 (PRÉCISEZ) **SECTEUR MÉDICAL ONG** HÔPITAL ONG . . . . . 31 CLINIQUE ONG . . . . . 32 AUTRE SECTEUR MÉDICAL ONG _____ (PRÉCISEZ) 36 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 98	
313	En quel mois et en quelle année la stérilisation a-t-elle été effectuée ?	MOIS . . . . . ☐☐ ANNÉE . . . . . ☐☐☐☐	→ 315
314	Depuis quel mois et quelle année utilisez-vous (MÉTHODE ACTUELLE) sans interruption ? INSISTEZ : Depuis combien de temps utilisez-vous (MÉTHODE ACTUELLE) sans interruption ?	MOIS . . . . . ☐☐ ANNÉE . . . . . ☐☐☐☐	
315	VÉRIFIEZ 313 ET 314, ET 220 : UNE NAISSANCE VIVANTE, UN MORT-NÉ, UNE FAUSSE-COUCHE OU UN AVORTEMENT APRÈS MOIS ET ANNÉE DE DÉBUT D'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION À 313 OU 314? NON ☐ ↓ OUI ☐ → RETOURNEZ À 313 OU 314, INSISTEZ ET INSCRIVEZ LE MOIS ET L'ANNÉE DE DÉBUT D'UTILISATION CONTINUE DE LA MÉTHODE ACTUELLE (QUI DOIT SE SITUER APRÈS LA DERNIÈRE NAISSANCE OU LA FIN DE LA DERNIÈRE GROSSESSE).	

SECTION 3. CONTRACEPTION

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
316	VÉRIFIEZ 313 ET 314 : ANNÉE EST 2018-2023 → **C** INSCRIVEZ DANS LE CALENDRIER LE CODE POUR LA MÉTHODE UTILISÉE LE MOIS DE L'INTERVIEW ET POUR CHAQUE MOIS JUSQU'À LA DATE DE DÉBUT D'UTILISATION. ENSUITE CONTINUEZ ANNÉE EST 2017 OU PLUS TÔT → **C** INSCRIVEZ DANS LE CALENDRIER LE CODE POUR LA MÉTHODE UTILISÉE LE MOIS DE L'INTERVIEW ET POUR CHAQUE MOIS JUSQU'À JANVIER 2018. ENSUITE (ALLEZ À 329)		
317	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur les périodes où, durant ces dernières années, vous ou votre partenaire, avez utilisé une méthode pour éviter une grossesse. UTILISEZ LE CALENDRIER POUR VÉRIFIER LES PÉRIODES ANTÉRIEURES D'UTILISATION ET DE NON UTILISATION, EN COMMENÇANT PAR L'UTILISATION LA PLUS RÉCENTE, EN PARTANT DE JANVIER 2017. UTILISEZ LES NOMS DES ENFANTS, DATES DE NAISSANCE ET PÉRIODES DE GROSSESSE COMME DES POINTS DE RÉFÉRENCE. **C**		
317A	MOIS ET ANNÉE DU DÉBUT DE L'INTERVALLE D'UTILISATION OU DE NON UTILISATION.	MOIS . . . . . [ ][ ] ANNÉE . . . . . [ ][ ][ ][ ]	
317B	Entre (ÉVÉNEMENT ONE) en (MOIS/ANNÉE UN) et (ÉVÉNEMENT DEUX) en (MOIS/ANNÉE DEUX), avez-vous ou votre partenaire utilisé une méthode de contraception ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 317I
317C	Quelle était cette méthode ?	CODE MÉTHODE . . . . . [ ]	
317D	Combien de mois après (ÉVÉNEMENT UN) en (MOIS/ANNÉE UN) avez-vous commencé à utiliser (MÉTHODE ACTUELLE) ? ENCERCLEZ '95' SI L'ENQUÊTÉE DONNE LA DATE DE DÉBUT D'UTILISATION DE LA	IMMÉDIATEMENT . . . . . 00 MOIS . . . . . [ ][ ] DATE DONNÉE 95	→ 317F
317E	INSCRIVEZ LE MOIS ET L'ANNÉE OÙ L'ENQUÊTÉE A COMMENCÉ À UTILISER LA MÉTHODE.	MOIS . . . . . [ ][ ] ANNÉE . . . . . [ ][ ][ ][ ]	
317F	Pendant combien de mois avez-vous utilisé (MÉTHODE ACTUELLE) ? ENCERCLEZ '95' SI L'ENQUÊTÉE DONNE LA DATE DE FIN D'UTILISATION DE LA MÉTHODE.	MOIS . . . . . [ ][ ] DATE DONNÉE 95	→ 317H
317G	INSCRIVEZ LE MOIS ET L'ANNÉE OÙ L'ENQUÊTÉE A ARRÊTÉ D'UTILISER LA MÉTHODE.	MOIS . . . . . [ ][ ] ANNÉE . . . . . [ ][ ][ ][ ]	
317H	Pourquoi avez-vous arrêté d'utiliser (MÉTHODE ACTUELLE) ?	RAISON POUR AVOIR ARRÊTÉ . . . . . [ ]	
317I	RETOURNEZ À 317A POUR INTERRUPTION SUIVANTE; OU, SI PLUS D'INTERRUPTION, ALLEZ À 318.		

SECTION 3. CONTRACEPTION

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
318	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé la contraception d'urgence ? Je veux dire est-ce que vous avez pris des pilules spéciales dans les 3 jours qui ont suivi des rapports sexuels non protégés pour éviter une grossesse ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
319	VÉRIFIEZ LE CALENDRIER POUR L'UTILISATION D'UNE MÉTHODE CONTRACEPTIVE À N'IMPORTE QUEL MOIS AUCUNE MÉTHODE UTILISÉE ☐ ↓ UNE MÉTHODE UTILISÉE ☐ →		321
320	Avez-vous déjà utilisé quelque chose ou essayé par divers moyens de retarder ou d'éviter une grossesse ?	OUI . . . . . 1 NON 2	331
321	VÉRIFIEZ 307 : ENCERCLEZ LE CODE DE LA MÉTHODE: SI PLUS D'UN CODE MÉTHODE ENCERCLÉ À 307, ENCERCLEZ LE CODE DE LA PREMIÈRE MÉTHODE DE LA LISTE.	PAS DE CODE ENCERCLÉ . . . . . 00 STÉRILISATION FÉMININE . . . . . 01 STÉRILISATION MASCULINE . . . . . 02 DIU . . . . . 03 INJECTABLES . . . . . 04 IMPLANTS . . . . . 05 PILULE . . . . . 06 CONDOM . . . . . 07 CONDOM FÉMININ . . . . . 08 CONTRACEPTION D'URGENCE . . . . . 09 MÉTHODE DES JOURS FIXES . . . . . 10 MAMA . . . . . 11 MÉTHODE DU RYTHME . . . . . 12 RETRAIT . . . . . 13 AUTRE MÉTHODE MODERNE . . . . . 95 AUTRE MÉTHODE TRADITIONNELLE 96	331 324 332 332 332

SECTION 3. CONTRACEPTION

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
322	Vous avez commencé à utiliser (MÉTHODE ACTUELLE) en (DATE DE 314). Où l'avez-vous obtenue à ce moment-là ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC, PRIVÉ, OU UNE ONG, ENREGISTREZ '96' ET ÉCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.	**SECTEUR MÉDICAL PUBLIC** HÔPITAL NATIONAL . . . . . 11 HÔPITAL RÉGIONAL . . . . . 12 CENTRE DE SANTÉ DE RÉFÉRENCE . . 13 CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE . . 14 DISPENSAIRE/MATERNITÉ . . . . . 15 INFIRMERIE DE GARNISON MILITAIRE . . 16 CENTRE MEDICAUX INTER-ENTREPRISES (CMIE/INPS) . . . . . 17 AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ 18 (PRÉCISEZ) **SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ** HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ . . . . . 21 CENTRE CONFESSIONNEL . . . . . 22 CABINET MÉDICAL . . . . . 23 CABINET DE SOIN PRIVÉ . . . . . 24 PHARMACIE . . . . . 25 AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC)/RELAIS . . 26 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ 27 (PRÉCISEZ) **SECTEUR MÉDICAL ONG** HÔPITAL ONG . . . . . 31 CLINIQUE ONG . . . . . 32 AUTRE SECTEUR MÉDICAL ONG _____ 36 (PRÉCISEZ) **AUTRE SOURCE** BOUTIQUE . . . . . 41 BAR/BOÎTE DE NUIT . . . . . 42 KIOSQUE/TABLIER . . . . . 43 VENDEUR AMBULANT . . . . . 44 AMIS/PARENTS . . . . . 45 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
323	À ce moment-là, vous a-t-on parlé d'effets secondaires que vous pourriez avoir en utilisant cette méthode ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 325
324	Quand vous avez été stérilisée, vous a-t-on parlé d'effets secondaires ou de problèmes que vous pourriez avoir à cause de la méthode ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
325	Vous a-t-on dit ce qu'il fallait faire si vous ressentiez ces effets secondaires ou ces problèmes ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
326	À ce moment-là, vous a-t-on parlé d'autres méthodes de planification familiale que vous pourriez utiliser ?	OUI . . . . . 1 NON 2	

SECTION 3. CONTRACEPTION

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
327	VÉRIFIEZ 307 : ENCERCLEZ LE CODE DE LA MÉTHODE : SI PLUS D'UN CODE MÉTHODE EST ENCERCLÉ À 307, ENCERCLEZ LE CODE DE LA PREMIÈRE MÉTHODE DE LA LISTE.	STÉRILISATION FÉMININE . . . . . 01 DIU . . . . . 03 INJECTABLES . . . . . 04 IMPLANTS . . . . . 05 PILULE . . . . . 06 CONDOM . . . . . 07 CONDOM FÉMININ . . . . . 08 CONTRACEPTION D'URGENCE . . . . . 09 MÉTHODE DES JOURS FIXES . . . . . 10 AUTRE MÉTHODE MODERNE 95	→ 332
328	À ce moment-là, est-ce qu'on vous a dit que vous pouviez changer pour une autre méthode si vous le souhaitiez ou parce que c'était nécessaire ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 330
329	VÉRIFIEZ 307 : ENCERCLEZ LE CODE DE LA MÉTHODE : SI PLUS D'UN CODE MÉTHODE ENCERCLÉ À 307, ENCERCLEZ LE CODE DE LA PREMIÈRE MÉTHODE DE LA LISTE.	STÉRILISATION FÉMININE . . . . . 01 STÉRILISATION MASCULINE . . . . . 02 DIU . . . . . 03 INJECTABLES . . . . . 04 IMPLANTS . . . . . 05 PILULE . . . . . 06 CONDOM . . . . . 07 CONDOM FÉMININ . . . . . 08 CONTRACEPTION D'URGENCE . . . . . 09 MÉTHODE DES JOURS FIXES . . . . . 10 MAMA . . . . . 11 MÉTHODE DU RYTHME . . . . . 12 RETRAIT . . . . . 13 AUTRE MÉTHODE MODERNE . . . . . 95 AUTRE MÉTHODE TRADITIONNELLE 96	→ 332 → 332 → 332

SECTION 3. CONTRACEPTION

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
330	Où avez-vous obtenu (MÉTHODE ACTUELLE) (MÉTHODE ACTUELLE) la dernière fois ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC, PRIVÉ, OU UNE ONG, ENREGISTREZ '96' ET ÉCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.	**SECTEUR MÉDICAL PUBLIC** HÔPITAL NATIONAL . . . . . 11 HÔPITAL RÉGIONAL . . . . . 12 CENTRE DE SANTÉ DE RÉFÉRENCE . . 13 CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE . . 14 DISPENSAIRE/MATERNITÉ . . . . . 15 INFIRMERIE DE GARNISON MILITAIRE . . 16 CENTRE MEDICAUX INTER-ENTREPRISES (CMIE/INPS) . . . . . 17 AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ 18 (PRÉCISEZ) **SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ** HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ . . . . . 21 CENTRE CONFESSIONNEL . . . . . 22 CABINET MÉDICAL . . . . . 23 CABINET DE SOIN PRIVÉ . . . . . 24 PHARMACIE . . . . . 25 AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC)/RELAIS . . 26 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ 27 (PRÉCISEZ) **SECTEUR MÉDICAL ONG** HÔPITAL ONG . . . . . 31 CLINIQUE ONG . . . . . 32 AUTRE SECTEUR MÉDICAL ONG _____ 36 (PRÉCISEZ) **AUTRE SOURCE** BOUTIQUE . . . . . 41 BAR/BOÎTE DE NUIT . . . . . 42 KIOSQUE/TABLIER . . . . . 43 VENDEUR AMBULANT . . . . . 44 AMIS/PARENTS . . . . . 45 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	332
331	Connaissez-vous un endroit où vous pouvez vous procurer une méthode de planification familiale ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
332	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez reçu la visite d'un agent de santé ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 334
333	Est-ce que l'agent de santé vous a parlé de planification familiale ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
334	VÉRIFIEZ 202 : ENFANTS VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉE ? OUI ↓ a) Au cours des 12 derniers mois, êtes-vous allée dans un établissement de santé pour recevoir des soins pour vous-même ou pour vos enfants ? NON ↓ b) Au cours des 12 derniers mois, êtes-vous allée dans un établissement de santé pour recevoir des soins pour vous-même ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 401
335	Est-ce qu'un membre du personnel de l'établissement de santé vous a parlé de méthodes de planification familiale ?	OUI . . . . . 1 NON 2	

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
401	VÉRIFIEZ 220 ET 225 : UN RÉSULTAT OU PLUS DE GROSSESSE 0-35 MOIS AVANT L'ENQUÊTE ☐ AUCUN RÉSULTAT DE GROSSESSE 0-35 MOIS AVANT L'ENQUÊTE ☐		→ 601
402	VÉRIFIEZ 220. LISTE DU NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DE LA GROSSESSE À 215 POUR CHAQUE RÉSULTAT DE GROSSESSE 0-35 MOIS AVANT L'ENQUÊTE, EN COMMENÇANT PAR LA DERNIÈRE. CLASSER CHAQUE RÉSULTAT DE GROSSESSE PAR TYPE EN UTILISANT 223 ET L'ORDRE DES RÉSULTATS DANS L'HISTORIQUE DE LA GROSSESSE. **TYPE DE RÉSULTAT DE GROSSESSE** NAISSANCE VIVANTE LA PLUS RÉCENTE 1 NAISSANCE VIVANTE PRÉCÉDENTE 2 MORT-NÉ LE PLUS RÉCENT 3 MORT-NÉ PRÉCÉDENT 4 AVORTEMENT OU FAUSSE-COUCHE 5 NUMÉRO HISTORIQUE GROSSESSE ☐☐ TYPE DE RÉSULTAT DE GROSSESSE .. ☐ NUMÉRO HISTORIQUE GROSSESSE ☐☐ TYPE DE RÉSULTAT DE GROSSESSE .. ☐ NUMÉRO HISTORIQUE GROSSESSE ☐☐ TYPE DE RÉSULTAT DE GROSSESSE .. ☐ NUMÉRO HISTORIQUE GROSSESSE ☐☐ TYPE DE RÉSULTAT DE GROSSESSE .. ☐ NUMÉRO HISTORIQUE GROSSESSE ☐☐ TYPE DE RÉSULTAT DE GROSSESSE .. ☐ NUMÉRO HISTORIQUE GROSSESSE ☐☐ TYPE DE RÉSULTAT DE GROSSESSE .. ☐		
403	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur vos grossesses qui ont eu lieu au cours des 3 dernières années . Nous parlerons de chaque grossesse séparément, en commençant par la dernière .		
404	NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DE LA GROSSESSE DE 402.	NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DE LA GROSSESSE ..... ☐☐	
405	TYPE DE RÉSULTAT DE LA GROSSESSE DE 402.	NAISSANCE VIVANTE LA PLUS RÉCENTE .. 1 NAISSANCE VIVANTE PRÉCÉDENTE .... 2 MORT-NÉ LE PLUS RÉCENT ..... 3 MORT-NÉ PRÉCÉDENT ..... 4 FAUSSE-COUCHE/AVORTEMENT 5	→ 407
406	ENREGISTREZ LA DATE DE LA GROSSESSE QUI S'EST TERMINÉE À 220.	JOUR ..... ☐☐ MOIS ..... ☐☐ ANNÉE ..... ☐☐☐☐	→ 408
407	ENREGISTREZ NOM DE 218. NOM _____		
408	VÉRIFIEZ 405 : TYPE GROSSESSE 1 OU 2 ☐ a) Quand vous êtes tombée enceinte de (NOM EN 407), vouliez-vous être enceinte à ce moment-là ? TYPE GROSSESSE 3, 4, OU 5 ☐ b) Quand vous êtes tomber enceinte pendant la grossesse qui s'est terminée en (DATE DE 406), vouliez-vous être enceinte à ce moment-là ?	OUI ..... 1 NON 2	→ 411

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
409	Est-ce que vous vouliez avoir un enfant plus tard, ou pas d'enfant du tout ?	PLUS TARD . . . . . 1 PAS D'ENFANT DU TOUT 2	→ 411
410	Combien de temps de plus vouliez-vous attendre ?	MOIS . . . . . 1 ☐☐ ANNÉES . . . . . 2 ☐☐ NE SAIT PAS 998	
411	VÉRIFIEZ 405 : TYPE DE RÉSULTAT DE GROSSESSE	NAISSANCE VIVANTE LA PLUS RÉCENTE . . 1 NAISSANCE VIVANTE PRÉCÉDENTE . . . . 2 MORT-NÉ LE PLUS RÉCENT . . . . . 3 MORT-NÉ PRÉCÉDENT . . . . . 4 FAUSSE-COUCHE/AVORTEMENT 5	→ 434 → 434 → 475
412	Avez-vous vu quelqu'un pour des soins prénatals pour cette grossesse ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 414
413	VÉRIFIEZ 405 : TYPE RÉSULTAT DE GROSSESSE NAISSANCE VIVANTE LA PLUS RÉCENTE (PASSEZ À 420) ☐	MORT-NÉ LE PLUS RÉCENT ☐	→ 426
414	Qui avez-vous vu ? Quelqu'un d'autre ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER CHAQUE TYPE DE PERSONNE ET ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	**PERSONNEL QUALIFIÉ** MÉDECIN . . . . . A INFIRMIÈRE OBSTETRICIENNE/ SAGE-FEMME . . . . . B **AUTRE PERSONNEL** MATRONE . . . . . C ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE FORMÉE ET SUVIE (ATR) . . D ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE . . . . E AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC)/ RELAIS . . . . F AUTRE _____ (PRÉCISEZ) X	
415	Où avez-vous reçu les soins prénatals pour cette grossesse ? Pas d'autre endroit ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC, PRIVÉ, OU UNE ONG , ENREGISTREZ 'X' ET ÉCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.	**MAISON** MAISON DE L'ENQUETEE . . . . . A AUTRE MAISON . . . . . B **SECTEUR MÉDICAL PUBLIC** HÔPITAL NATIONAL . . . . . C HÔPITAL RÉGIONAL . . . . . D CENTRE DE SANTÉ DE RÉFÉRENCE . . E CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE . . F DISPENSAIRE/MATERNITÉ . . . . . G INFIRMERIE DE GARNISON MILITAIRE . . H CENTRE MEDICAUX INTER-ENTREPRISES (CMIE/INPS) . . . . . I AUTRE SECTEUR MÉDICAL PUBLIC _____ (PRÉCISEZ) J **SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ** HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ . . . . . K CENTRE CONFESSIONNEL . . . . . L CABINET MÉDICAL . . . . . M CABINET DE SOIN PRIVÉ . . . . . N AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ (PRÉCISEZ) O **SECTEUR MÉDICAL ONG** HÔPITAL ONG . . . . . P CLINIQUE ONG . . . . . Q AUTRE SECTEUR MÉDICAL ONG _____ (PRÉCISEZ) U AUTRE _____ (PRÉCISEZ) X	

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
416	De combien de semaines ou de mois étiez-vous enceinte quand vous avez reçu vos premiers soins prénatals pour cette grossesse ?	SEMAINES . . . . . 1 [ ][ ] MOIS . . . . . 2 [ ][ ] NE SAIT PAS 998	
417	Durant cette grossesse, combien de fois avez-vous reçu des soins prénatals ?	NOMBRE DE FOIS . . . . . [ ][ ] NE SAIT PAS 98	
418	Dans le cadre de vos soins prénatals durant cette grossesse, est-ce qu'un prestataire de santé a effectué l'un des actes suivants : a) Mesurer votre pression artérielle ? b) Effectuer un prélèvement d'urine ? c) Effectuer un prélèvement sanguin ? d) Écouter les battements cardiaques du bébé ? e) Parler avec vous des aliments ou de la quantité de nourriture que vous devriez manger ? f) Parler avec vous de l'allaitement ? g) Demander si vous aviez eu des saignements vaginaux ?	OUI NON NSP a) PRESSION ARTÉRIELLE . . . . 1 2 8 b) URINE . . . . . 1 2 8 c) SANG . . . . . 1 2 8 d) BATTEMENTS CARDIAQUES 1 2 8 e) ALIMENTS . . . . . 1 2 8 f) ALLAITEMENT . . . . . 1 2 8 g) SAIGNEMENTS 1 2 8	
419	VÉRIFIEZ 405 : TYPE RÉSULTAT GROSSESSE NAISSANCE VIVANTE LA PLUS RÉCENTE ↓ MORT-NÉ LE PLUS RÉCENT →		426
420	Durant cette grossesse, est-ce que l'on vous a fait une injection dans le bras pour éviter au bébé de contracter le tétanos après la naissance ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	423
421	Durant cette grossesse, combien de fois vous a-t-on fait une injection contre le tétanos ?	NOMBRE DE FOIS . . . . . [ ] NE SAIT PAS 8	
422	VÉRIFIEZ 421 : UNE FOIS OU NSP ↓ DEUX FOIS OU PLUS →		426
423	À n'importe quel moment avant cette grossesse, vous a-t-on fait des injections contre le tétanos ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	426
424	Avant cette grossesse, combien de fois avez-vous eu une injection contre le tétanos ? SI 7 FOIS OU PLUS ENREGISTREZ '7'.	NOMBRE DE FOIS . . . . . [ ] NE SAIT PAS 8	
425	VÉRIFIEZ 424 : SEULEMENT UNE FOIS ↓ : a) Il y a combien d'années que vous avez reçu cette injection contre le tétanos ? PLUS D'UNE FOIS ↓ : b) Il y a combien d'années que vous avez reçu la dernière injection contre le tétanos avant cette grossesse ?	IL Y A ANNÉES . . . . . [ ][ ]	

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
426	Durant cette grossesse, vous a-t-on donné ou avez-vous acheté des comprimés de fer combiné a l'acide folique/ACFOL ou du sirop contenant du fer ? MONTREZ LES COMPRIMÉS/SIROP/ SUPPLÉMENTS MICRONUTRIMENTS	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 429
427	Où avez-vous obtenu les comprimés de fer combiné a l'acide folique/ACFOL ou le sirop contenant du fer ? Quelque part d'autre ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE DE SOURCE. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC, PRIVÉ OU UNE ONG, ENREGISTREZ 'X' ET ÉCRIVEZ LE NOM DE/DES ENDROIT.	**SECTEUR MÉDICAL PUBLIC** PHARMACIE HÔSPITALIERE . . . . . A DEPOTS DE VENTE DE MEDICAMENTS/ CENTRE DE SANTÉ DE RÉFÉRENCE/CSRef . . . . . B DEPOTS DE VENTE DE MEDICAMENTS/ CENTRE DE SANTÉ DE COMMUNAUTAIRE/CSCOM . . . . . C DISPENSAIRE/MATERNITÉ . . . . . D INFIRMERIE DE GARNISON MILITAIRE . . E CENTRE MEDICAUX INTER-ENTREPRISES (CMIE/INPS) . . . . . F AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ G (PRÉCISEZ) **SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ** HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ . . . . . H CENTRE CONFESSIONNEL . . . . . I CABINET MÉDICAL . . . . . J CABINET DE SOIN PRIVÉ . . . . . K PHARMACIE . . . . . L AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC)/RELAIS . . . . M AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ N (PRÉCISEZ) **SECTEUR MÉDICAL ONG** HÔPITAL ONG . . . . . O CLINIQUE ONG . . . . . P AUTRE SECTEUR MÉDICAL ONG _____ Q (PRÉCISEZ) **AUTRE SOURCE** BOUTIQUE . . . . . R VENDEUR DE MÉDICAMENTS AMBULANTS S GUÉRISSEUR/ PRATICIEN TRADITIONNEL T MARCHÉ . . . . . U AUTRE _____ X (PRÉCISEZ)	
428	Pendant toute la grossesse, pendant combien de jours avez-vous pris des comprimés de fer ou du sirop contenant du fer ? DANS LE CAS D'UNE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UN NOMBRE APPROXIMATIF DE JOURS.	JOURS . . . . . [ ][ ][ ] NE SAIT PAS 998	
429	Durant cette grossesse, avez-vous pris des médicaments contre les vers intestinaux ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
431	Durant cette grossesse, avez-vous pris de la sulfadoxine pyrimétamine (SP) pour éviter le paludisme ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 434
432	Durant cette grossesse, combien de fois avez-vous pris les 3 comprimés de la SP ?	NOMBRE DE FOIS	
433	Vous a-t-on donné la SP durant une visite prénatale, durant une autre visite dans un établissement de santé ou l'avez-vous obtenue ailleurs ? SI PLUS D'UNE SOURCE, INSCRIVEZ LA PREMIÈRE SOURCE DE LA LISTE.	VISITE PRÉNATALE . . . . . 1 AUTRE VISITE DANS ÉTABLIS. DE SANTÉ . . 2 AILLEURS 6	
434	VÉRIFIEZ 405: TYPE GROSSESSE 1 OU 2 → a) Qui vous a assisté durant l'accouchement de (NOM EN 407) ? Quelqu'un d'autre ? INSISTEZ POUR LE/LES TYPES DE PERSONNE ET ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ. SI L'ENQUÊTÉE DÉCLARE QUE PERSONNE N'A ASSISTÉ L'ACCOUCHEMENT, INSISTEZ POUR DÉTERMINER SI DES ADULTES ÉTAIENT PRÉSENTS À L'ACCOUCHEMENT. TYPE GROSSESSE 3 OU 4 → b) Qui a assisté l'accouchement de l'enfant mort-né que vous avez eu en (DATE DE 406) ? Quelqu'un d'autre ? INSISTEZ POUR LE/LES TYPES DE PERSONNE ET ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ. SI L'ENQUÊTÉE DÉCLARE QUE PERSONNE N'A ASSISTÉ L'ACCOUCHEMENT, INSISTEZ POUR DÉTERMINER SI DES ADULTES ÉTAIENT PRÉSENTS À L'ACCOUCHEMENT.	**PERSONNEL QAULIFÉ** MÉDECIN . . . . . A INFIRMIÈRE OBSTETRICIENNE/ SAGE-FEMME . . . . . B **AUTRE PERSONNEL** MATRONE . . . . . C ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE FORMÉE ET SUVIE (ATR) . . D ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE . . . . E AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC)/ RELAIS . . . . F PARENTS/AMIS . . . . . G AUTRE _____ X (PRÉCISEZ) PERSONNE N'A ASSISTÉ . . . . . Y	

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
435	VÉRIFIEZ 405: TYPE GROSSESSE 1 OU 2 → a) Où avez-vous accouché de (NOM EN 407) ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC, PRIVÉ OU UNE ONG, ENREGISTREZ '96' ET ÉCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT. TYPE GROSSESSE 3 OU 4 → b) Où a eu lieu l'accouchement de cet enfant mort-né ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC, PRIVÉ OU UNE ONG, ENREGISTREZ '96' ET ÉCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.	**MAISON** MAISON DE L'ENQUETEE . . . . . 11 AUTRE MAISON . . . . . 12 **SECTEUR MÉDICAL PUBLIC** HÔPITAL NATIONAL . . . . . 21 HÔPITAL RÉGIONAL . . . . . 22 CENTRE DE SANTÉ DE RÉFÉRENCE . . 23 CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE . . 24 DISPENSAIRE/MATERNITÉ . . . . . 25 INFIRMERIE DE GARNISON MILITAIRE . . 26 CENTRE MEDICAUX INTER-ENTREPRISES (CMIE/INPS) . . . . . 27 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PUBLIC _____ (PRÉCISEZ) 28 **SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ** HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ . . . . . 31 CENTRE CONFESSIONNEL . . . . . 32 CABINET MÉDICAL . . . . . 33 CABINET DE SOIN PRIVÉ . . . . . 34 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ 36 (PRÉCISEZ) **SECTEUR MÉDICAL ONG** HÔPITAL ONG . . . . . 41 CLINIQUE ONG . . . . . 42 AUTRE SECTEUR MÉDICAL ONG _____ 46 (PRÉCISEZ) AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	→ 437 → 437
436	VÉRIFIEZ 405: TYPE GROSSESSE 1 OU 2 → a) Avez-vous accouché de (NOM EN 407) par césarienne, c'est-à-dire que l'on vous a ouvert le ventre pour faire sortir le bébé ? TYPE GROSSESSE 3 OU 4 → b) Est-ce que l'accouchement de cet enfant mort-né a eu lieu par césarienne, c'est-à-dire qu'on a ouvert votre ventre pour sortir le bébé ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
437	VÉRIFIEZ 405 : TYPE DE RÉSULTAT DE LA GROSSESSE	NAISSANCE VIVANTE LA PLUS RÉCENTE . . 1 NAISSANCE VIVANTE PRÉCÉDENTE . . . . 2 MORT-NÉ LE PLUS RÉCENT . . . . . 3 MORT-NÉ PRÉCÉDENT 4	 → 441 → 445 → 487
438	Après la naissance, est-ce qu'on a posé (NOM EN 407) sur votre poitrine ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 441
439	Est-ce que la peau de (NOM EN 407) touchait votre peau ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 441
440	Combien de temps après la naissance, (NOM EN 407) a -t-il été posé peau contre peau sur votre poitrine ? INSISTEZ POUR AVOIR UNE RÉPONSE NUMÉRIQUE. SI MOINS D'1 HEURE, ENREGISTREZ '00' HEURE ; SI 24 HEURES OU PLUS, ENREGISTREZ 24	IMMÉDIATEMENT . . . . . 00 HEURES . . . . . 1 ☐☐	

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
441	Quand (NOM EN 407) est né, était-il/elle très gros, plus gros que la moyenne, moyen, plus petit que la moyenne ou très petit ?	TRÈS GROS . . . . . 1 PLUS GROS QUE LA MOYENNE . . . . . 2 MOYEN . . . . . 3 PLUS PETIT QUE LA MOYENNE . . . . . 4 TRÈS PETIT . . . . . 5 NE SAIT PAS 8	
442	(NOM EN 407) a t-il /elle été pesé (e) à la naissance ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 444
443	Combien (NOM EN 407) pesait-il/elle ?	KG DU CARNET 1 ☐☐ . ☐☐☐ KG DE MÉMOIRE 2 ☐☐ . ☐☐☐ NE SAIT PAS 99998	
444	VÉRIFIEZ 405 : TYPE RÉSULTAT DE GROSSESSE NAISSANCE VIVANTE LA PLUS RÉCENTE ☐ ↓ NAISSANCE VIVANTE PRÉCÉDENTE ☐		→ 480
445	VÉRIFIEZ 435 : LIEU D'ACCOUCHEMENT NAISSANCE ÉTABLISSEMENT: UN CODE 21 À 46 ENCERCLÉ ☐ ↓ CODE 11, 12, OU 96 ENCERCLÉ ☐		→ 464
447	VÉRIFIEZ 405: TYPE GROSSESSE 1 ☐ ↓ a) Combien de temps après l'accouchement de (NOM EN 407) êtes-vous restée dans (ÉTABLISSEMENT À 435) ? TYPE GROSSESSE 3 ☐ ↓ b) Pour l'enfant mort-né que vous avez eu en (DATE DE 406), pendant combien de temps après la naissance êtes-vous restée dans (ÉTABLISSEMENT À 435) ? SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS.	HEURES . . . . . 1 ☐☐ JOURS . . . . . 2 ☐☐ SEMAINES . . . . . 3 ☐☐ NE SAIT PAS 998	
448	Je voudrais vous parler maintenant des contrôles de votre santé après l'accouchement comme par exemple, quelqu'un qui vous a posé des questions sur votre santé ou qui vous a examinée. Avant que vous ne quittiez l'établissement de santé, est-ce que quelqu'un a examiné votre état de santé ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 451
449	Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier examen ? SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS.	HEURES . . . . . 1 ☐☐ JOURS . . . . . 2 ☐☐ SEMAINES . . . . . 3 ☐☐ NE SAIT PAS 998	

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
450	Qui a examiné votre état de santé à ce moment-là ? INSISTEZ POUR OBTENIR LA PERSONNE LA PLUS QUALIFIÉEE.	**PERSONNEL QAULIFÉ** MÉDECIN . . . . . 11 INFIRMIÈRE/SAGE-FEMME . . . . . 12 **AUTRE PERSONNEL** MATRONE . . . . . 21 ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE FORMÉE . . . . . 22 ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE . . . . 23 AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC)/ RELAIS . . . . 24 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
451	VÉRIFIEZ 405 : TYPE RÉSULTAT DE GROSSESSE NAISSANCE VIVANTE LA PLUS RÉCENTE ☐ MORT-NÉ LE PLUS RÉCENT ☐		→ 455
452	Je voudrais maintenant vous parler des contrôles de la santé de (NOM EN 407)--par exemple, quelqu'un qui a examiné (NOM EN 407), vérifié le cordon ou parlé avec vous des soins à donner à (NOM EN 407). Avant que (NOM EN 407) ne quitte l'établissement de santé, est-ce que quelqu'un a examiné l'état de santé de (NOM EN 407) ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 455
453	Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier examen de (NOM EN 407) ? SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS.	HEURES . . . . . 1 ☐☐ JOURS . . . . . 2 ☐☐ SEMAINES . . . . . 3 ☐☐ NE SAIT PAS 998	
454	Qui a examiné l'état de santé de (NOM EN 407) à ce moment-là ? INSISTEZ POUR OBTENIR LA PERSONNE LA PLUS QUALIFIÉE.	**PERSONNEL QAULIFÉ** MÉDECIN . . . . . 11 INFIRMIÈRE/SAGE-FEMME . . . . . 12 **AUTRE PERSONNEL** MATRONE . . . . . 21 ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE FORMÉE . . . . . 22 ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE . . . . 23 AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC)/ RELAIS . . . . 24 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
455	Je voudrais maintenant vous parler de ce qui s'est passé après votre départ de l'établissement. Est-ce que quelqu'un a examiné votre état de santé après avoir quitté l'établissement ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 459
456	Combien de temps après l'accouchement cet examen a-t-il eu lieu ? SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS.	HEURES . . . . . 1 ☐☐ JOURS . . . . . 2 ☐☐ SEMAINES . . . . . 3 ☐☐ NE SAIT PAS 998	

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
457	Qui a examiné votre état de santé à ce moment-là ? INSISTEZ POUR OBTENIR LA PERSONNE LA PLUS QUALIFIÉE.	**PERSONNEL QAULIFÉ** MÉDECIN . . . . . 11 INFIRMIÈRE/SAGE-FEMME . . . . . 12 **AUTRE PERSONNEL** MATRONE . . . . . 21 ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE FORMÉE . . . . . 22 ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE . . . . 23 AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC)/ RELAIS . . . . 24 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
458	Où a eu lieu l'examen ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC, PRIVÉ OU UNE ONG, ENREGISTREZ '96' ET ÉCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.	**MAISON** MAISON DE L'ENQUETEE . . . . . 11 AUTRE MAISON . . . . . 12 **SECTEUR MÉDICAL PUBLIC** HÔPITAL NATIONAL . . . . . 21 HÔPITAL RÉGIONAL . . . . . 22 CENTRE DE SANTÉ DE RÉFÉRENCE . . 23 CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE . . 24 DISPENSAIRE/MATERNITÉ . . . . . 25 INFIRMERIE DE GARNISON MILITAIRE . . 26 CENTRE MEDICAUX INTER-ENTREPRISES (CMIE/INPS) . . . . . 27 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PUBLIC _____ (PRÉCISEZ) 28 **SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ** HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ . . . . . 31 CENTRE CONFESSIONNEL . . . . . 32 CABINET MÉDICAL . . . . . 33 CABINET DE SOIN PRIVÉ . . . . . 34 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ 36 (PRÉCISEZ) **SECTEUR MÉDICAL ONG** HÔPITAL ONG . . . . . 41 CLINIQUE ONG . . . . . 42 AUTRE SECTEUR MÉDICAL ONG _____ 46 (PRÉCISEZ) AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
459	VÉRIFIEZ 405 : TYPE RÉSULTAT DE GROSSESSE NAISSANCE VIVANTE LA PLUS RÉCENTE ☐ MORT-NÉ LE PLUS RÉCENT ☐		→ 474
460	Après que (NOM EN 407) a quitté (ÉTABLISSEMENT À 435), est-ce qu'un prestataire de santé ou une accoucheuse traditionnelle a examiné l'état de santé de (NOM EN 407) ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 473
461	Combien de temps après la naissance de (NOM EN 407) cet examen a t-il eu lieu ? SI MOINS D'UN JOUR,INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE,INSCRIVEZ EN JOURS.	HEURES . . . . . 1 ☐☐ JOURS . . . . . 2 ☐☐ SEMAINES . . . . . 3 ☐☐ NE SAIT PAS 998	

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
462	Qui a examiné l'état de santé de (NOM EN 407) à ce moment-là ? INSISTEZ POUR OBTENIR LA PERSONNE LA PLUS QUALIFIÉE.	**PERSONNEL QAULIFÉ** MÉDECIN . . . . . 11 INFIRMIÈRE/SAGE-FEMME . . . . . 12 **AUTRE PERSONNEL** MATRONE . . . . . 21 ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE FORMÉE . . . . . 22 ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE . . . . 23 AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC)/ RELAIS . . . . 24 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
463	Où a eu lieu l'examen de (NOM EN 407) ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC, PRIVÉ, OU UNE ONG, ENREGISTREZ '96' ET ÉCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.	**MAISON** MAISON DE L'ENQUETEE . . . . . 11 AUTRE MAISON . . . . . 12 **SECTEUR MÉDICAL PUBLIC** HÔPITAL NATIONAL . . . . . 21 HÔPITAL RÉGIONAL . . . . . 22 CENTRE DE SANTÉ DE RÉFÉRENCE . . 23 CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE . . 24 DISPENSAIRE/MATERNITÉ . . . . . 25 INFIRMERIE DE GARNISON MILITAIRE . . 26 CENTRE MEDICAUX INTER-ENTREPRISES (CMIE/INPS) . . . . . 27 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PUBLIC _____ (PRÉCISEZ) 28 **SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ** HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ . . . . . 31 CENTRE CONFESSIONNEL . . . . . 32 CABINET MÉDICAL . . . . . 33 CABINET DE SOIN PRIVÉ . . . . . 34 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ 36 (PRÉCISEZ) **SECTEUR MÉDICAL ONG** HÔPITAL ONG . . . . . 41 CLINIQUE ONG . . . . . 42 AUTRE SECTEUR MÉDICAL ONG _____ 46 (PRÉCISEZ) AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	→ 473
464	VÉRIFIEZ 405: TYPE GROSSESSE 1 a) Je voudrais vous parler de contrôle de votre santé après l'accouchement, par exemple quelqu'un qui vous a posé des questions sur votre santé ou vous a examinée. Est-ce que quelqu'un a vérifié votre état de santé après la naissance de (NOM EN 407) ? TYPE GROSSESSE 3 b) Je voudrais vous parler des vérifications de votre état de santé après l'accouchement, par exemple, quelqu'un qui vous a posé des questions sur votre santé ou qui vous a examinée. Est-ce que quelqu'un vous a examinée après avoir accouché de l'enfant mort-né que vous avez eu en (DATE DE 406) ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 468
465	Combien de temps après l'accouchement cet examen a-t-il eu lieu ? SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS.	HEURES . . . . . 1 ☐☐ JOURS . . . . . 2 ☐☐ SEMAINES . . . . . 3 ☐☐ NE SAIT PAS 998	

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
466	Qui a examiné votre état de santé à ce moment-là ? INSISTEZ POUR OBTENIR LA PERSONNE LA PLUS QUALIFIÉE.	**PERSONNEL QAULIFÉ** MÉDECIN . . . . . 11 INFIRMIÈRE/SAGE-FEMME . . . . . 12 **AUTRE PERSONNEL** MATRONE . . . . . 21 ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE FORMÉE . . . . . 22 ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE . . . . 23 AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC)/ RELAIS . . . . 24 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
467	Où a eu lieu ce premier examen ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC, PRIVÉ, OU UNE ONG, ENREGISTREZ '96' ET ÉCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.	**MAISON** MAISON DE L'ENQUETEE . . . . . 11 AUTRE MAISON . . . . . 12 **SECTEUR MÉDICAL PUBLIC** HÔPITAL NATIONAL . . . . . 21 HÔPITAL RÉGIONAL . . . . . 22 CENTRE DE SANTÉ DE RÉFÉRENCE . . 23 CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE . . 24 DISPENSAIRE/MATERNITÉ . . . . . 25 INFIRMERIE DE GARNISON MILITAIRE . . 26 CENTRE MEDICAUX INTER-ENTREPRISES (CMIE/INPS) . . . . . 27 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PUBLIC _____ (PRÉCISEZ) 28 **SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ** HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ . . . . . 31 CENTRE CONFESSIONNEL . . . . . 32 CABINET MÉDICAL . . . . . 33 CABINET DE SOIN PRIVÉ . . . . . 34 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ 36 (PRÉCISEZ) **SECTEUR MÉDICAL ONG** HÔPITAL ONG . . . . . 41 CLINIQUE ONG . . . . . 42 AUTRE SECTEUR MÉDICAL ONG _____ 46 (PRÉCISEZ) AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
468	VÉRIFIEZ 405 : TYPE RÉSULTAT DE GROSSESSE NAISSANCE VIVANTE LA PLUS RÉCENTE ☐ MORT-NÉ LE PLUS RÉCENT ☐		→ 474
469	Je voudrais vous parler du contrôle de la santé de (NOM EN 407) -- par exemple, quelqu'un qui a examiné (NOM EN 407), vérifié le cordon ou qui vous a parlé des soins à donner à (NOM EN 407). Après que (NOM EN 407) est né, est-ce qu'un prestataire de santé ou une accoucheuse traditionnelle a examiné l'état de santé de (NOM EN 407) ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 473
470	Combien de temps après la naissance de (NOM EN 407) cet examen a-t-il eu lieu ? SI MOINS D'UN JOUR,INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS.	HEURES . . . . . 1 ☐☐ JOURS . . . . . 2 ☐☐ SEMAINES . . . . . 3 ☐☐ NE SAIT PAS 998	

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
471	Qui a examiné l'état de santé de (NOM EN 407) à ce moment-là ? INSISTEZ POUR OBTENIR LA PERSONNE LA PLUS QUALIFIÉE.	**PERSONNEL QAULIFÉ** MÉDECIN . . . . . 11 INFIRMIÈRE/SAGE-FEMME . . . . . 12 **AUTRE PERSONNEL** MATRONE . . . . . 21 ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE FORMÉE . . . . . 22 ACCOUCHEUSE TRADITIONNELLE . . . . 23 AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC)/ RELAIS . . . . 24 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
472	Où a eu lieu le premier examen de (NOM EN 407) ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC, PRIVÉ, OU UNE ONG, ENREGISTREZ '96' ET ÉCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.	**MAISON** MAISON DE L'ENQUETEE . . . . . 11 AUTRE MAISON . . . . . 12 **SECTEUR MÉDICAL PUBLIC** HÔPITAL NATIONAL . . . . . 21 HÔPITAL RÉGIONAL . . . . . 22 CENTRE DE SANTÉ DE RÉFÉRENCE . . 23 CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE . . 24 DISPENSAIRE/MATERNITÉ . . . . . 25 INFIRMERIE DE GARNISON MILITAIRE . . 26 CENTRE MEDICAUX INTER-ENTREPRISES (CMIE/INPS) . . . . . 27 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PUBLIC _____ (PRÉCISEZ) 28 **SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ** HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ . . . . . 31 CENTRE CONFESSIONNEL . . . . . 32 CABINET MÉDICAL . . . . . 33 CABINET DE SOIN PRIVÉ . . . . . 34 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ 36 (PRÉCISEZ) **SECTEUR MÉDICAL ONG** HÔPITAL ONG . . . . . 41 CLINIQUE ONG . . . . . 42 AUTRE SECTEUR MÉDICAL ONG _____ 46 (PRÉCISEZ) AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
473	Au cours des 2 jours suivant la naissance de (NOM EN 407), est-ce qu'un prestataire de santé a fait l'une des choses suivantes ? a) Il a examiné le cordon ? b) Il a vérifié la température de (NOM EN 407) ? c) Il vous a dit comment reconnaître si votre bébé a besoin d'une attention médicale immédiate ? d) Il a parlé avec vous de l'allaitement maternel ? e) Il a observé (NOM EN 407) en train d'être allaité pour voir si vous le faisiez correctement ?	OUI NON NSP a) CORDON . . . . . 1 2 8 b) TEMP . . . . . 1 2 8 c) ATTENTION MÉDICALE . . . . 1 2 8 d) PARLÉ ALLAITEMENT . . . . 1 2 8 e) OBSERVÉ ALLAITEMENT . . 1 2 8	
474	Durant les 2 premiers jours après la naissance, est-ce qu'un prestataire de santé a effectué l'un des actes suivants : a) Mesurer votre pression artérielle ? b) Parler de vos saignements vaginaux ? c) Discuter de planification familiale avec vous ?	OUI NON NSP a) PRESSION ARTÉRIELLE . . . . 1 2 8 b) SAIGNEMENTS . . . . . 1 2 8 c) PLANIFICATION FAMILIALE . . 1 2 8	
475	VÉRIFIEZ 215 : CETTE GROSSESSE EST-ELLE LA DERNIÈRE GROSSESSE DE LA FEMME ? OUI ☐ NON ☐ → 479		

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
476	VÉRIFIEZ 405 : GROSSESSE TYPE 1 ☐ ↓ / GROSSESSE TYPE 3 OU 5 ☐ ↓ a) Vos règles sont-elles revenues depuis la naissance de (NOM EN 407) ? b) Est-ce que vos règles sont revenues depuis la grossesse qui s'est terminée en (DATE DE 406) ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
477	VÉRIFIEZ 232 : L'ENQUÊTÉE EST-ELLE ENCEINTE ? PAS ENCEINTE ☐ ↓ ENCEINTE OU PAS SÛRE ☐ →		479
478	VÉRIFIEZ 405 : GROSSESSE TYPE 1 ☐ ↓ / GROSSESSE TYPE 3 OU 5 ☐ ↓ a) Avez-vous eu des rapports sexuels depuis la naissance de (NOM EN 407) ? b) Avez-vous eu des rapports sexuels depuis la grossesse qui s'est terminée (DATE DE 406) ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
479	VÉRIFIEZ 405 : TYPE DE RÉSULTAT DE GROSSESSE	NAISSANCE VIVANTE LA PLUS RÉCENTE . . 1 MORT-NÉ LE PLUS RÉCENT . . . . . 3 FAUSSE-COUCHE/AVORTEMENT . . . . . 5 ☐ →	487
480	Avez-vous allaité (NOM EN 407) ?	OUI . . . . . 1 NON 2	482
481	VÉRIFIEZ 224 POUR L'ENFANT:	VIVANT ☐ →	486
		DÉCÉDÉ ☐ →	487
482	Combien de temps après la naissance, avez-vous mis (NOM EN 407) au sein pour la première fois ? SI MOINS D'1 HEURE, INSCRIVEZ '00' HEURE; SI MOINS DE 24 HEURES,INSCRIVEZ EN HEURES; SINON, INSCRIVEZ EN JOURS.	IMMÉDIATEMENT . . . . . 000 HEURES . . . . . 1 ☐☐ JOURS . . . . . 2 ☐☐	
483	Dans les 2 premiers jours après l'accouchement, a t-on donné à (NOM EN 407) autre chose que le lait maternel pour boire ou manger – quelque chose comme de l'eau, lait artificiel, dattes, ou infusion de plantes médicinales?	OUI . . . . . 1 NON 2	
484	VÉRIFIEZ 224 POUR L'ENFANT : VIVANT ☐ ↓ DÉCÉDÉ ☐ →		487
485	Allaitez-vous encore (NOM EN 407) ?	OUI . . . . . 1 NON 2	

SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
486	(NOM EN 407) a t-il bu quelque chose au biberon hier durant la journée ou la nuit ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
487	VÉRIFIEZ 402 : PAS D'AUTRES RÉSULTATS DE GROSSESSE 0-35 MOIS AVANT L'ENQUÊTE ? AUTRES RÉSULTATS DE GROSSESSE 0-35 MOIS AVANT L'ENQUÊTE (ALLEZ À 404 POUR LE PROCHAIN RÉSULTAT DE GROSSESSE) PAS D'AUTRES RÉSULTATS DE GROSSESSE 0-35 MOIS AVANT L'ENQUÊTE		→ 501

SECTION 5. VACCINATION DES ENFANTS

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
501	VÉRIFIEZ 220, 224 ET 225 DANS HISTORIQUE DES GROSSESSES : Y A-T-IL UN ENFANT SURVIVANT NÉ 0-35 MOIS AVANT L'ENQUÊTE? UN ENFANT SURVIVANT OU PLUS NÉ 0-35 MOIS AVANT L'ENQUÊTE ☐ AUCUN ENFANT SURVIVANT NÉ 0-35 MOIS AVANT L'ENQUÊTE ☐ → 601		
502	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur la santé de vos enfants nés dans les 3 dernières années. Nous parlerons d'un enfant séparément, en commençant par le plus jeune.		
503	ENREGISTREZ LE NOM ET LE NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DE LA GROSSESSE DE 215 ET 218 DE L'ENFANT SURVIVANT NÉ 0-35 MOIS AVANT L'ENQUÊTE, EN COMMENÇANT PAR LE DERNIER. NOM DE L'ENFANT _____ NUMÉRO HISTORIQUE GROSSESSE ☐☐		
504	Avez-vous une carte de vaccination ou un autre document où les vaccinations de (NOM EN 503) sont inscrites ?	OUI, A SEULEMENT UNE CARTE . . . . . 1 → 507 OUI, A SEULEMENT UN AUTRE DOCUMENT 2 OUI, A UNE CARTE ET UN AUTRE DOCUMENT . . . . . 3 → 507 NON, PAS DE CARTE ET PAS D'AUTRE DOCUMENT 4	
505	Avez-vous déjà eu une carte de vaccination pour (NOM EN 503) ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
506	VÉRIFIEZ 504 : CODE '2' ENCERCLÉ ☐ CODE '4' ENCERCLÉ ☐ → 513		
507	Puis-je voir la carte de vaccination ou un autre document sur lequel les vaccinations de (NOM EN 503) sont inscrites ?	OUI, SEULEMENT CARTE VUE . . . . . 1 OUI, SEULEMENT AUTRE DOCUMENT VU . . 2 OUI, CARTE ET AUTRE DOCUMENT VUS . . 3 NI CARTE NI AUTRE DOCUMENT VUS . . . . 4 → 513	
508	ENREGISTREZ LA DATE DE NAISSANCE DE (NOM) DE LA CARTE DE VACCINATION OU D'UN AUTRE DOCUMENT.	JOUR . . . . . ☐☐ MOIS . . . . . ☐☐ ANNÉE . . . . . ☐☐☐☐ PAS DE DATE DE NAISSANCE SUR CARTE 95	

SECTION 5. VACCINATION DES ENFANTS

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
	NOM DE LA NAISSANCE VIVANTE_____ NUMÉRO HISTORIQUE GROSSESSE		

509 RECOPIEZ LES DATES DES VACCINATIONS DE LA CARTE DE (NOM).
INSCRIVEZ '44' DANS LA COLONNE 'JOUR' SI LA CARTE MONTRE QU'UNE DOSE A ÉTÉ DONNÉE MAIS QUE LA DATE N'A PAS ÉTÉ ENREGISTRÉE. INSCRIVEZ '00' DANS LA COLONNE 'JOUR' SI LA CARTE EST VIDE POUR LA DOSE.

	JOUR	MOIS	ANNÉE
BCG			
VACCIN POLIO ORAL (VPO) 0 (DOSE NAISSANCE)			
DTCoq-HEP.B-HIB (PENTAVALENT) 1			
ROTAVIRUS (ROTA) 1			
PNEUMOCOQUE (PCV13) 1			
VACCIN POLIO ORAL (VPO) 1			
DTCoq-HEP.B-HIB (PENTAVALENT) 2			
ROTAVIRUS (ROTA) 2			
PNEUMOCOQUE (PCV13) 2			
VACCIN POLIO ORAL (VPO) 2			
DTCoq-HEP.B-HIB (PENTAVALENT) 3			
ROTAVIRUS (ROTA) 3			
PNEUMOCOQUE (PCV13) 3			
VACCIN POLIO ORAL (VPO) 3			
VACCIN POLIO INACTIVÉ (VPI) 1			
VACCIN POLIO INACTIVÉ (VPI) 2			
VACCIN ANTIROUGEOLEUX (VAR) 1			
VACCIN CONTRE LA FIÈVRE JAUNE (VAA)			
VACCIN CONTRE LA MÉNINGITE (MenAfriVac)			
VACCIN ANTIROUGEOLEUX (VAR) 2			
VITAMINE A (LA PLUS RÉCENTE)			

510	DEMANDEZ À L'ENQUÊTÉE LA PERMISSION DE PRENDRE UNE PHOTOGRAPHIE DE LA CARTE DE VACCINATION OU D'UN AUTRE DOCUMENT OÙ LES VACCINS SONT ENREGISTRÉS. SI LA PERMISSION EST ACCORDÉE, PHOTOGRAPHIEZ LA CARTE.	PHOTOGRAPHIE PRISE . . . . . 1 PHOTOGRAPHIE NON PRISE, PERMISSION NON ACCORDÉE . . . . . 2 PHOTOGRAPHIE NON PRISE, AUTRE RAISON _____ 6 (PRÉCISEZ)	
511	VÉRIFIEZ 509 : 'BCG' À 'VACCIN ANTIROUGEOLEUX (VAR) 2' TOUS AVEC UNE DATE ENREGISTRÉE OU '44' ENREGISTRÉ DANS LA COLONNE 'JOUR' ? NON ☐ ↓ OUI ☐ →		529

SECTION 5. VACCINATION DES ENFANTS

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
	NOM DE LA NAISSANCE VIVANTE_____ NUMÉRO HISTORIQUE GROSSESSE ☐☐		
512	En plus de ce qui est inscrit (sur ce/ces documents), (NOM EN 503) a-t-il/elle eu d'autres vaccins, y compris des vaccins reçus le jour d'une campagne de vaccination, de journées de vaccination ou de journées sur la santé de l'enfant ? INSCRIVEZ 'OUI' SEULEMENT SI L'ENQUÊTÉE MENTIONNE AU MOINS UNE DES VACCINATIONS À 509 QUI N'A PAS ÉTÉ ENREGISTRÉE COMME AYANT ÉTÉ DONNÉE.	OUI . . . . . 1 (UTLISEZ LA LISTE DANS CAPI POUR SELECTIONNER LES AUTRES VACCINATIONS DONNÉES. NOTEZ QUE CAPI CHANGERA LA RÉPONSE À 509 DANS LA COLONNE 'JOUR' DE '00' À '66' POUR LES VACCINATIONS SELECTIONNÉES) (PASSEZ ENSUITE À 529) NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
512A	VÉRIFIEZ 509: AU MOINS UNE VACCINATION ENREGISTRÉE SUR LA CARTE OU L'AUTRE DOCUMENT? OUI ☐ → PASSEZ À 529 NON ☐ →		530
513	(NOM EN 503) a-t-il/elle reçu des vaccins pour éviter de contracter des maladies, y compris des vaccins reçus au cours de campagnes ou de journées de vaccination ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 530
514	Est-ce que (NOM EN 503) a reçu le vaccin du BCG contre la tuberculose, c'est-à-dire une injection dans le bras ou à l'épaule qui laisse habituellement une cicatrice ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
517	Est-ce que (NOM EN 503) a reçu le vaccin oral contre la polio, c'est-à-dire deux gouttes dans la bouche pour éviter la polio ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 521
518	Est-ce que (NOM EN 503) a reçu le premier vaccin oral contre la polio dans les 2 premières semaines après sa naissance ou plus tard ?	DEUX PREMIÈRES SEMAINES . . . . . 1 PLUS TARD 2	
519	Combien de fois (NOM EN 503) a-t-il/elle reçu le vaccin oral contre la polio ?	NOMBRE DE FOIS . . . . . ☐☐	
520	La dernière fois que (NOM EN 503) a reçu des gouttes contre la polio, est-ce que (NOM EN 503) a aussi reçu une injection de VPI dans la cuisse pour le/la protéger contre la polio ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 521
520A	Combien de fois (NOM EN 503) a-t-il/elle reçu le vaccin contre la polio sous forme d'injection?	NOMBRE DE FOIS . . . . . ☐☐	
521	Est-ce que (NOM EN 503) a reçu le vaccin Pentavalent c'est-à-dire une injection dans la cuisse, donné parfois en même temps que les gouttes du vaccin contre la polio ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 523
522	Combien de fois (NOM EN 503) a-t-il/elle reçu le vaccin Pentavalent ?	NOMBRE DE FOIS . . . . . ☐☐	

SECTION 5. VACCINATION DES ENFANTS

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
	NOM DE LA NAISSANCE VIVANTE_____ NUMÉRO HISTORIQUE GROSSESSE		
523	Est-ce que (NOM EN 503) a reçu le vaccin contre le pneumocoque, c'est-à-dire une injection dans la cuisse pour éviter la pneumonie ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 525
524	Combien de fois (NOM EN 503) a-t-il/elle reçu le vaccin contre le pneumocoque ?	NOMBRE DE FOIS	
525	Est-ce que (NOM EN 503) a reçu le vaccin contre le rotavirus, c'est-à-dire un liquide dans la bouche pour éviter la diarrhée ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 527
526	Combien de fois (NOM EN 503) a-t-il/elle reçu le vaccin contre le rotavirus ?	NOMBRE DE FOIS	
527	Est-ce que (NOM EN 503) a reçu le vaccin VAR contre la rougeole, c'est-à-dire une injection dans le bras pour lui éviter la rougeole ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 529
528	Combien de fois (NOM EN 503) a-t-il/elle reçu le vaccin contre la rougeole ?	NOMBRE DE FOIS	
528A	Est-ce que (NOM EN 503) a reçu le vaccin MenAfriVac contre la méningite, c'est-à-dire une injection dans la cuisse pour lui éviter la méningite?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
528B	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin contre la fièvre jaune, c'est-à-dire une injection dans la cuisse droite pour lui éviter la fièvre jaune?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	

SECTION 5. VACCINATION DES ENFANTS

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
	NOM DE LA NAISSANCE VIVANTE _____	NUMÉRO HISTORIQUE GROSSESSE ☐☐	
529	Où (NOM EN 503) a-t-il reçu la plupart de ses vaccins ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC, PRIVÉ, OU UNE ONG, ENREGISTREZ '96' ET ÉCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.	**SECTEUR MÉDICAL PUBLIC** HÔPITAL NATIONAL . . . . . 11 HÔPITAL RÉGIONAL . . . . . 12 CENTRE DE SANTÉ DE RÉFÉRENCE . . 13 CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE . . 14 DISPENSAIRE/MATERNITÉ . . . . . 15 INFIRMERIE DE GARNISON MILITAIRE . . 16 CENTRE MEDICAUX INTER-ENTREPRISES (CMIE/INPS) . . . . . 17 AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ 18 (PRÉCISEZ) **SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ** HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ . . . . . 21 CENTRE CONFESSIONNEL . . . . . 22 CABINET MÉDICAL . . . . . 23 CABINET DE SOIN PRIVÉ . . . . . 24 PHARMACIE . . . . . 25 AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC)/RELAIS . . 26 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ 27 (PRÉCISEZ) **SECTEUR MÉDICAL ONG** HÔPITAL ONG . . . . . 31 CLINIQUE ONG . . . . . 32 AUTRE SECTEUR MÉDICAL ONG _____ 36 (PRÉCISEZ) **AUTRE SOURCE** CAMPAGNE VACCINATION . . . . . 41 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
530	VÉRIFIEZ 220 ET 224 DANS HISTORIQUE DES GROSSESSES : Y A-T-IL D'AUTRES ENFANTS SURVIVANTS NÉS 0-35 MOIS AVANT L'ENQUÊTE ? D'AUTRES ENFANTS SURVIVANTS NÉS 0-35 MOIS AVANT L'ENQUÊTE ☐ (ALLEZ À 503 POUR ENFANT SURVIVANT SUIVANT) PAS D'AUTRE ENFANT SURVIVANT NÉ 0-35 MOIS AVANT L'ENQUÊTE ☐ → 601		

SECTION 6A. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
601	VÉRIFIEZ 220, 224, ET 225 DANS L'HISTORIQUE DES GROSSESSES : Y A-T-IL UN ENFANT SURVIVANT NÉ 0-59 MOIS AVANT L'ENQUÊTE ? UN ENFANT SURVIVANT OU PLUS NÉ 0-59 MOIS AVANT L'ENQUÊTE ☐ PAS D'ENFANT SURVIVANT NÉ 0-59 MOIS AVANT L'ENQUÊTE ☐ → 643		
602	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur la santé de vos enfants nés dans les 5 dernières années. Nous parlerons d'un enfant séparément, en commençant par le plus jeune.		
603	ENREGISTREZ LE NOM DE 218 ET LE NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES GROSSESSES DE 215 DE L'ENFANT SURVIVANT NÉ 0-59 MOIS AVANT L'ENQUÊTE, EN COMMENÇANT PAR LE DERNIER. NOM DE L'ENFANT_____ NUMÉRO HISTORIQUE GROSSESSE ☐☐		
604	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que l'on a donné à (NOM EN 603) l'une des choses suivantes : a) Du fer sous forme de comprimé ou de sirop ? MONTREZ DES TYPES COURANTS DE COMPRIMÉS/SIROPS b) Un mélange en poudre de micronutriments comme MOUGOU-DLANIN? MONTREZ DES MICRONUTRIMENTS MULTIPLES SOUS FORME DE POUDRE.	OUI NON NSP a) COMPRIMÉS/SIROP . . . . . 1 2 8 b) UN MÉLANGE EN POUDRE DE MICRONUTRIMENTS COMME MOUGOU-DLANIN 1 2 8	
605	Au cours des 6 derniers mois, a-t-on donné à (NOM EN 603) une dose de vitamine A comme [celle-ci/l'une de celles-ci] ? MONTREZ DES MODÈLES COURANTS AMPOULES/GÉLULES/SIROP.	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
606	Au cours des 6 derniers mois, est-ce qu'on a donné à (NOM EN 603) des médicaments contre les vers intestinaux ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
607	Au cours des 3 derniers mois, est-ce qu'un prestataire de santé ou un agent de santé communautaire a : a) mesuré le poids de (NOM EN 603) ? b) mesuré la longueur ou la taille de (NOM EN 603) c) mesuré la circonférence du bras à mi-hauteur de (NOM EN 603) ? MONTREZ UNE IMAGE DU RUBAN DE MESURE DE LA CIRCONFÉRENCE DU BRAS. d) contrôlé la présence d'œdème chez (NOM) ?	OUI NON NSP a) POIDS . . . . . 1 2 8 b) LONGUEUR/TAILLE . . . . . 1 2 8 c) BRAS . . . . . 1 2 8 d) OEDÈME 1 2 8	
608	Au cours des deux dernières semaines, (NOM EN 603) a-t-il eu la diarrhée ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 618

N°	NOM DE LA NAISSANCE VIVANTE _____ NUMÉRO HISTORIQUE GROSSESSE		
609	VÉRIFIEZ 485 : ALLAITÉ ACTUELLEMENT ? OUI ↓ a) Je voudrais maintenant savoir quelle quantité de liquides a été donnée à (NOM EN 603) pendant la diarrhée, y compris le lait maternel. Lui a-t-on donné à boire moins que d'habitude, environ la même quantité ou plus que d'habitude ? SI MOINS, INSISTEZ : Lui a-t-on donné à boire beaucoup moins que d'habitude ou un peu moins ? NON/ PAS POSÉ ↓ b) Je voudrais maintenant savoir quelle quantité de liquides a été donnée à (NOM EN 603) pendant la diarrhée. Lui a-t-on donné à boire moins que d'habitude, environ la même quantité ou plus que d'habitude ? SI MOINS, INSISTEZ : Lui a-t-on donné à boire beaucoup moins que d'habitude ou un peu moins ?	BEAUCOUP MOINS . . . . . 1 UN PEU MOINS . . . . . 2 ENVIRON LA MÊME QUANTITÉ . . . . . 3 PLUS . . . . . 4 RIEN À BOIRE . . . . . 5 NE SAIT PAS 8	
610	Quand (NOM EN 603) avait la diarrhée, lui a-t-on donné à manger moins que d'habitude, environ la même quantité, plus que d'habitude ou rien à manger ? SI MOINS, INSISTEZ : Lui a-t-on donné à manger beaucoup moins que d'habitude ou un peu moins ?	BEAUCOUP MOINS . . . . . 1 UN PEU MOINS . . . . . 2 ENVIRON LA MÊME QUANTITÉ . . . . . 3 PLUS . . . . . 4 A STOPPÉ LA NOURRITURE . . . . . 5 N'A JAMAIS DONNÉ À MANGER . . . . . 6 NE SAIT PAS 8	
611	Avez-vous recherché des conseils ou un traitement pour la diarrhée ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 615

N°	NOM DE LA NAISSANCE VIVANTE _____ NUMÉRO HISTORIQUE GROSSESSE		
612	Où êtes-vous allée pour rechercher des conseils ou un traitement ? Quelque part ailleurs ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC, PRIVÉ, OU UNE ONG, ENREGISTREZ 'X' ET ÉCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.	**SECTEUR MÉDICAL PUBLIC** HÔPITAL NATIONAL . . . . . A HÔPITAL RÉGIONAL . . . . . B CENTRE DE SANTÉ DE RÉFÉRENCE . . C CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE . . D DISPENSAIRE/MATERNITÉ . . . . . E INFIRMERIE DE GARNISON MILITAIRE . . F CENTRE MEDICAUX INTER-ENTREPRISES (CMIE/INPS) . . . . . G AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ H (PRÉCISEZ) **SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ** HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ . . . . . I CENTRE CONFESSIONNEL . . . . . J CABINET MÉDICAL . . . . . K CABINET DE SOIN PRIVÉ . . . . . L PHARMACIE . . . . . M AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC)/RELAIS . . N AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ O (PRÉCISEZ) **SECTEUR MÉDICAL ONG** HÔPITAL ONG . . . . . P CLINIQUE ONG . . . . . Q AUTRE SECTEUR MÉDICAL ONG _____ R (PRÉCISEZ) **AUTRE SOURCE** BOUTIQUE . . . . . S VENDEUR DE MÉDICAMENTS AMBULANTS T GUÉRISSEUR/ PRATICIEN TRADITIONNEL U MARCHÉ . . . . . V AUTRE _____ X (PRÉCISEZ)	
613	VÉRIFIEZ 612 : DEUX CODES OU PLUS ENCERCLÉS ↓	SEULEMENT UN CODE ENCERCLÉ → 615	
614	Où êtes-vous allé en premier pour rechercher des conseils ou un traitement ? UTILISEZ LES CODES LETTRES DE 612.	PREMIER ENDROIT	
615	Avez-vous donné à (NOM EN 603) les choses suivantes à n'importe quel moment dès qu'il/elle a commencé à avoir la diarrhée : a) Un liquide préparé à partir d'un sachet spécial appelé KENEYADJI (Sachet de solution SRO) ? b) Un liquide SRO (KENEYADJI) ? c) Du zinc, en comprimés ou en sirop ? d) Un liquide KENEYADJI préparé à la maison à base d'eau, de sucre et de sel?	OUI NON NSP a) LIQUIDE SACHET SRO . . . . 1 2 8 b) LIQUIDE SRO . . . . . 1 2 8 c) ZINC . . . . . 1 2 8 d) LIQUIDE MAISON 1 2 8	

N°	NOM DE LA NAISSANCE VIVANTE _____ NUMÉRO HISTORIQUE GROSSESSE [ ][ ]		
616	VÉRIFIEZ 615 : UN 'OUI' ↓ : a) A-t-on donné quelque chose d'autre pour traiter la diarrhée ? TOUT 'NON' OU 'NSP' ↓ : b) A-t-on donné quelque chose pour traiter la diarrhée ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 618
617	VÉRIFIEZ 615 : UN 'OUI' ↓ : a) Qu'a-t-on donné d'autre pour traiter la diarrhée ? Rien d'autre ? ENREGISTREZ TOUS LES TRAITEMENTS DONNÉS. TOUT 'NON' OU 'NSP' ↓ : b) Qu'a-t-on donné pour traiter la diarrhée ? Rien d'autre ? ENREGISTREZ TOUS LES TRAITEMENTS DONNÉS.	**COMPRIMÉ OU SIROP** ANTIBIOTIQUE . . . . . A ANTIMOTILITÉ . . . . . B AUTRE (NON ANTIBIOTIQUE OU ANTIMOTILITÉ) . . . . . C COMPRIMÉ OU SIROP INCONNU . . . . . D **INJECTION** ANTIBIOTIQUE . . . . . E NON-ANTIBIOTIQUE . . . . . F INJECTION INCONNUE . . . . . G (IV) INTRAVEINEUSE . . . . . H REMÈDE MAISON/HERBES MÉDICINALES . . I AUTRE _____ (PRÉCISEZ) X	
618	Au cours des deux dernières semaines, est-ce que (NOM EN 603) a été malade avec de la fièvre à n'importe quel moment ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 621
619	À n'importe quel moment au cours de sa maladie, est-ce qu'on a pris à (NOM EN 603) du sang de son doigt ou de son talon ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
620	Est-ce qu'un prestataire de santé vous a dit que (NOM EN 603) avait le paludisme ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
621	Au cours des deux dernières semaines, est-ce que (NOM EN 603) a été malade avec de la toux à n'importe quel moment ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
622	Est-ce que (NOM EN 603) a eu un souffle court et rapide ou avait-il/elle des difficultés pour respirer à n'importe quel moment au cours des deux dernières semaines ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 624
623	Est-ce que ce souffle rapide ou ces difficultés pour respirer étaient dus à un problème de bronche ou à un nez bouché ou qui coulait ?	BRONCHE SEULEMENT . . . . . 1 NEZ SEULEMENT . . . . . 2 LES DEUX . . . . . 3 AUTRE _____ (PRÉCISEZ) 6 NE SAIT PAS 8	→ 625
624	VÉRIFIEZ 618 : A EU DE LA FIÈVRE? OUI ↓	NON OU NE SAIT PAS →	634
625	Avez-vous recherché des conseils ou un traitement pour la maladie ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 630

N°	NOM DE LA NAISSANCE VIVANTE _____ NUMÉRO HISTORIQUE GROSSESSE ☐☐		
626	Où êtes-vous allé pour rechercher des conseils ou un traitement ? Quelque part d'autre ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC, PRIVÉ, OU UNE ONG, ENREGISTREZ 'X' ET ÉCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.	**SECTEUR MÉDICAL PUBLIC** HÔPITAL NATIONAL . . . . . A HÔPITAL RÉGIONAL . . . . . B CENTRE DE SANTÉ DE RÉFÉRENCE . . C CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE . . D DISPENSAIRE/MATERNITÉ . . . . . E INFIRMERIE DE GARNISON MILITAIRE . . F CENTRE MEDICAUX INTER-ENTREPRISES (CMIE/INPS) . . . . . G AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ H (PRÉCISEZ) **SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ** HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ . . . . . I CENTRE CONFESSIONNEL . . . . . J CABINET MÉDICAL . . . . . K CABINET DE SOIN PRIVÉ . . . . . L PHARMACIE . . . . . M AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC)/RELAIS . . N AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ O (PRÉCISEZ) **SECTEUR MÉDICAL ONG** HÔPITAL ONG . . . . . P CLINIQUE ONG . . . . . Q AUTRE SECTEUR MÉDICAL ONG _____ R (PRÉCISEZ) **AUTRE SOURCE** BOUTIQUE . . . . . S VENDEUR DE MÉDICAMENTS AMBULANTS T GUÉRISSEUR/ PRATICIEN TRADITIONNEL U MARCHÉ . . . . . V AUTRE _____ X (PRÉCISEZ)	
627	VÉRIFIEZ 626 : DEUX CODES OU PLUS ENCERCLÉS ☐ ↓	SEULEMENT UN CODE ENCERCLÉ ☐ → 629	
628	Où êtes-vous allé en premier pour rechercher des conseils ou un traitement ? UTILISEZ LES CODES LETTRES DE 626.	PREMIER ENDROIT . . . . . ☐	
629	Combien de jours après le début de la maladie, avez-vous recherché des conseils ou un traitement pour (NOM EN 603) ? SI MÊME JOUR, INSCRIRE '00'.	JOURS . . . . . ☐☐	
630	À n'importe quel moment pendant la maladie, est-ce que (NOM EN 603) a pris des médicaments pour la maladie ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 → 634 NE SAIT PAS 8	

N°	NOM DE LA NAISSANCE VIVANTE _____ NUMÉRO HISTORIQUE GROSSESSE ☐☐	
631	Quel médicament (NOM EN 603) a-t-il pris ? Pas d'autre médicament ? INSCRIVEZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ. SI LE MÉDICAMENT N'EST PAS CONNU, DEMANDEZ À VOIR LA BOITE OU L'ORDONNANCE.	**ANTIPALUDIQUES** COMBINAISON THÉRAPEUTIQUE À BASE D'ARTÉMISININE (CTA) .... A SP/FANSIDAR ..... B CHLOROQUINE ..... C AMODIAQUINE ..... D QUININE COMPRIMÉS ..... E INJECTION/IV ..... F ARTESUNATE VOIE RECTALE ..... G INJECTION/ IV/ IM ..... H ARTÉMÉTHER INJECTION/ IV/ IM ..... I AUTRE ANTIPALUDIQUE _____ J (PRÉCISEZ) **ANTIBIOTIQUES** AMOXICILLIN ..... K COTRIMOXAZOLE ..... L AUTRE COMPRIMÉ/SIROP ..... M AUTRE INJECTION/IV ..... N **AUTRES MÉDICAMENTS** ASPIRINE ..... O PARACÉTAMOL/PANADOL/ ACÉTAMINOPHÈNE ..... P IBUPROFÈNE ..... Q AUTRE _____ X (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS ..... Z	
632	VÉRIFIEZ 631: COMBINAISON THÉRAPEUTIQUE À BASE D'ARTÉMISININE ('A') DONNÉE CODE 'A' ENCERCLÉ ☐ ↓ CODE 'A' NON ENCERCLÉ ☐ → 634	
633	Combien de temps après le début de la fièvre, (NOM EN 603) a-t-il/elle commencé à prendre une combinaison à base d'artémisinine ?	MÊME JOUR ..... 0 JOUR SUIVANT ..... 1 DEUX JOURS APRÈS LA FIÈVRE ..... 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÉS LA FIÈVRE 3 NE SAIT PAS 8	
634	VÉRIFIEZ 220, 224 ET 225 DANS HISTORIQUE DES GROSSESSES : Y A-T-IL UN ENFANT SURVIVANT NÉ 0-59 MOIS AVANT L'ENQUÊTE ? D'AUTRES ENFANTS SURVIVANTS NÉS 0-59 MOIS AVANT L'ENQUÊTE ☐ (ALLEZ À 603 POUR L'ENFANT SURVIVANT SUIVANT) PAS D'AUTRE ENFANT SURVIVANT NÉ 0-59 MOIS AVANT L'ENQUÊTE ☐ → 635	

SECTION 6B. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES				ALLEZ À
635	VÉRIFIEZ 220, 225 ET 226, TOUTES LIGNES : NOMBRE D'ENFANTS NÉS 0-23 MOIS AVANT L'ENQUÊTE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉE UN OU PLUS ☐ AUCUN ☐ → 643 (NOM DU PLUS JEUNE ENFANT VIVANT AVEC ELLE)					
636	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur les liquides que (NOM EN 635) a pris durant le jour ou la nuit. Donnez-moi tous les liquides que (NOM EN 635) a pris, qu'il les ait pris à la maison ou quelque part ailleurs.		OUI	NON	NSP	
	a) De l'eau plate ?	a)	1	2	8	
	b) Du lait artificiel comme Nursie, Bledina, Nan, ou Gallia?	b)	1	2	8	
	SI OUI : b1) Combien de fois (NOM EN 635) a -t-il/elle bu du lait artificiel? SI 7 FOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '7'.	NOMBRE DE FOIS QU'IL/ELLE A BU DU LAIT ARTIFICIEL ☐			8	
	c) Du lait d'origine animale y compris frais, liquide, ou en poudre?	c)	1	2	8	
	SI OUI : c1) Combien de fois (NOM EN 635) a -t-il/elle bu du lait ? SI 7 FOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '7'.	NOMBRE DE FOIS QU'IL/ELLE A BU DU LAIT D'ORIGINE ANIMAL ☐			8	
	c2) Est-ce que le lait était un lait de type sucré ou aromatisé ?	SUCRÉ/ AROMATISÉ . .	1	2	8	
	e) Du lait de soja	e)	1	2	8	
	SI OUI : e1) Est-ce que c'était une boisson sucrée ou aromatisée ?	SUCRÉ/ AROMATISÉ . .	1	2	8	
	f) Du chocolat chaud comme Nesquick ou Milo?	f)	1	2	8	
	g) Du jus de fruit, jus en sachet, bissap, jus de gingembre, ou jus de tamarin?	g)	1	2	8	
	h) Des sucreries comme Coca Cola, Fanta, Sprite, ou Malta, ou boissons énergisantes telles que XXL ?	h)	1	2	8	
	i) Du thé, du café ou de la tisane ?	i)	1	2	8	
	SI OUI : i1) La boisson était-elle sucrée ?	SUCRÉE	1	2	8	

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES				ALLEZ À
			OUI	NON	NSP	
	j) Du bouillon clair ou de la soupe claire ?	j)	1	2	8	
	k) D'autres liquides ?	k)	1	2	8	
	SI OUI : k1) Quelle était la boisson ? MARQUEZ LE GROUPE APPROPRIÉ POUR CHAQUE BOISSON SUPPLÉMENTAIRE, SI LE GROUPE N'EST PAS ENCORE CODÉ « OUI ». S'IL EST IMPOSSIBLE DE DÉTERMINER À QUEL GROUPE APPARTIENT LA BOISSON SUPPLÉMENTAIRE, SÉLECTIONNEZ L'OPTION "Z" ET UN ÉCRAN S'AFFICHERA POUR ENREGISTRER LE NOM DE LA BOISSON.	AUTRE(S) BOISSON(S) _____ (PRÉCISEZ)				
	k2) La boisson était-elle sucrée ?	SUCRÉE	1	2	8	
637	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur les aliments que (NOM EN 635) a reçus hier durant le jour ou la nuit. Ce qui m'intéresse, ce sont les aliments que votre enfant a consommés, que ce soit à la maison, ou quelque part ailleurs. Veuillez inclure les collations et les petits repas comme les repas principaux. Je vais vous poser des questions concernant différents aliments, et je voudrais savoir si l'enfant a mangé l'aliment même s'il était mélangé à d'autres aliments. Ne répondez pas 'oui' à propos d'un aliment ou d'un ingrédient utilisé seulement en petite quantité pour ajouter du goût à un plat.					
			OUI	NON	NSP	
	a) Du yaourt, lait caillé ou nônô koumou, dèguè ou laka?	a)	1	2	8	
	SI OUI: a1) Combien de fois (NOM EN 635) a-t-il reçu du yaourt, lait caillé ou nônô koumou, dèguè ou laka? SI 7 FOIS OU PLUS , ENREGISTREZ '7'.	NOMBRE DE FOIS QU'IL/ELLE A REÇU DU YAOURT ☐			8	
	a2) (NOM EN 635) a-t-il/elle reçu du yaourt buvable, lait caillé ou nônô koumou, dèguè ou laka à boire ?	REÇU DU YAOURT À BOIRE . .	1	2	8	
	SI OUI: a3) Était-il un type de boisson sucrée ou aromatisée ?	SUCRÉE . .	1	2	8	
	b) Du riz, pain, macaroni, spaghetti, couscous, tô, ou bouillie?	b)	1	2	8	

SECTION 6B. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES				ALLEZ À
			OUI	NON	NSP	
	c) Des carottes, courge, ou patate douce à chair jaune ou orange?	c)	1	2	8	
	d) Du manioc, attiéké, igname, patate douce à chair blanche, pomme de terre, taro, ou banane plantain?	d)	1	2	8	
	e) N'importe quel légume à feuilles vert foncé tel que sauce feuille, feuilles de patate douce, feuilles de moringa, feuilles d'aubergine, fakoye ou d'autres légumes-feuilles vert foncé?	e)	1	2	8	
	f) N'importe quel autre légume tel que tomate, aubergine, gombo, concombre, chou, ou d'autres légumes?	f)	1	2	8	
	g) Des mangues mûres, papayes mûres, ou fruits de néré?	g)	1	2	8	
	h) D'autres fruits tels que les bananes, avocats, pasteques, jujubier, oranges ou autres fruits ?	h)	1	2	8	
	i) Du poisson frais, fumé ou séché, sardines en boîte, crabes ou des crevettes?	i)	1	2	8	
	j) Des abats tels que le foie, le poumon, le cœur, ou les rognons?	j)	1	2	8	
	k) Des viandes séchées, des saucissons, jambon, corne boeuf, ou pâté?	k)	1	2	8	
	l) N'importe quelle autre viande telle que le bœuf, le mouton, la chèvre, le porc, la viande de brousse, ou d'autres oiseaux ?	l)	1	2	8	
	m) Des œufs ?	m)	1	2	8	
	n) Des haricots, sô haricot, petits pois, voandzou, ou bouillie de soja ?	n)	1	2	8	
	o) Des arachides ou cacahuètes, sauce d'arachide, ou noix de cajou?	o)	1	2	8	

SECTION 6B. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
		OUI NON NSP	
	p) Cheese, naré, gachi, or La Vache Qui Rit	p) 1 2 8	
	q) Des criquets, éphémères, biti, chenilles, sauterelles ?	q) 1 2 8	
	r) Des gâteaux, gâteaux ni, biscuits sucrés?	r) 1 2 8	
	s) Des bonbons, chocolat, caramels ou aloua, cacahuètes sucrées, sésame sucré, crème glacée, glace, ou riz au lait ?	s) 1 2 8	
	t) Chips comme pringles, nouilles instantanées comme Kellogg's ou Indomie, frites de pommes de terre, frites de patates douces, aloco, ou des beignets?	t) 1 2 8	
	u) Huile de palme rouge ?	u) 1 2 8	
	v) N'importe quel autre aliment solide, semi-solide ou mou ? SI OUI: v1) Quel était cet aliment ? MARQUEZ LE GROUPE D'ALIMENTS APPROPRIÉ POUR CHAQUE ALIMENT SUPPLÉMENTAIRE, SI LE GROUPE N'EST PAS ENCORE CODÉ « OUI ». SI IL EST IMPOSSIBLE DE DÉTERMINER À QUEL GROUPE APPARTIENT L'ALIMENT SUPPLÉMENTAIRE, SÉLECTIONNEZ L'OPTION "Z" ET UN ÉCRAN S'AFFICHERA POUR ENREGISTRER LE NOM DE L'ALIMENT.	v) . . . . . 1 2 8 AUTRE(S) ALIMENT(S) _____ (PRÉCISEZ)	
638	VÉRIFIEZ 637 (CATÉGORIES 'a' À 'v') : PAS UN SEUL 'OUI' ☐ AU MOINS UN 'OUI' ☐ →		640
639	Est-ce que (NOM EN 635) a mangé des aliments solides, semi-solides ou mous hier durant le jour ou la nuit ? SI 'OUI' INSISTEZ : Quel type d'aliments solides, semi- solides ou mous (NOM EN 635) a-t-il/elle mangés ?	OUI . . . . . 1 (RETOURNEZ À 637 POUR INSCRIRE LES ALIMENTS CONSOMMÉS HIER) (PUIS CONTINUEZ AVEC 640) NON 2	→ 641
640	Combien de fois (NOM EN 635) a-t-il mangé des aliments solides, semi-solides ou mous durant le jour ou la nuit ?	NOMBRE DE FOIS . . . . . ☐☐ NE SAIT PAS 8	

SECTION 6B. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
641	Au cours des 6 derniers mois, est-ce qu'un prestataire de santé ou un agent de santé communautaire vous a dit comment nourrir (NOM EN 635) et quels aliments lui donner ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
642	La dernière fois que (NOM EN 635) est allé aux toilettes, qu'est-ce qui a été fait pour se débarrasser des selles ?	ENFANT A UTILISÉ TOILETTES OU LATRINES 01 JETÉES/RINSÉES DANS TOILETTES OU LATRINE . . . . . 02 JETÉES/RINSÉES DANS ÉGOUT OU CANIVEAU . . . . . 03 JETÉES AUX ORDURES . . . . . 04 ENTERRÉES . . . . . 05 LAISSÉES À L'AIR LIBRE . . . . . 06 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
643	Je voudrais vous demander maintenant quels aliments et quelles boissons vous avez consommés hier durant le jour ou la nuit, que ce soit à la maison ou quelque part d'autre. Veuillez inclure des collations et petits repas ainsi que des repas principaux. Je vais vous poser des questions sur différents aliments et boissons et je voudrais savoir si vous avez mangé un aliment même s'il était mélangé à d'autres aliments. Ne répondez pas 'oui' pour un aliment ou un ingrédient utilisé uniquement en petite quantité pour ajouter du goût à un plat.		

	OUI	NON	NSP
a) Du riz, pain, macaroni, spaghetti, tô, couscous, ou bouillies?	a) 1	2	8
b) Des carottes, courges, ou patate douce à chair jaune ou orange ?	b) 1	2	8
c) Du manioc, attiéké, ignames, patate douce à chair blanche, pomme de terre, taro, ou banane plantain?	c) 1	2	8
d) N'importe quel légume à feuilles vert foncé tels que sauce feuille, feuilles de patate douce, feuilles de moringa, feuilles d'aubergine, fakoye ou d'autres légumes-feuilles vert foncé?	d) 1	2	8

	OUI	NON	NSP
e) N'importe quels autres légumes tels que tomate, aubergine, gombo, concombre, choux, ou d'autres légumes?	e) 1	2	8
f) Des mangues mûres ou des papayes mûres?	f) 1	2	8
g) D'autres fruits tels que banane, avocat, pasteque, jujubier, orange, ou d'autres fruits?	g) 1	2	8
h) Du poisson frais, poisson fumé, poisson séché,	h) 1	2	8
i) Des abats tels que le foie, le poumon, le cœur, ou des rognons ?	i) 1	2	8

SECTION 6B. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES			ALLEZ À
	j) Des viandes séchées, saucisson, jambon, corne bœuf, ou pâté?	j)	1	2	8	
	k) D'autres viandes tels que le bœuf, mouton, chevre, porc, viande de brousse, poulet, ou d'autres oiseaux?	k)	1	2	8	
	l) Des œufs ?	l)	1	2	8	
	m) Des haricots, sô haricot, petits pois, voandzou, ou soja?	m)	1	2	8	
	n) Des arachides ou cacahuètes, sauce d'arachide, ou noix de cajou?	n)	1	2	8	
	o) Du lait liquide, lait en poudre, fromage, naré ou gachi, La Vache Qui Rit, yaourt, lait caillé ou nônô koumou, degue ou laka?	o)	1	2	8	
	p) Des criquets, éphémères, biti, chenilles, ou sauterelles ?	p)	1	2	8	
	q) Des gâteaux, gâteaux ni, ou biscuits sucrés?	q)	1	2	8	
	r) Des bonbons, chocolat, caramels ou aloua, cacahuètes sucrées, sésame sucré, crème glacée, glace, ou riz au lait?	r)	1	2	8	

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES				ALLEZ À
			OUI	NON	NSP	
	s) Des chips comme Pringles, nouilles instantanées comme Kellogg's ou Indomie, frites de pommes de terre, frites de patates douces, aloco, or beignets?	s)	1	2	8	
	t) Du jus de fruit, jus en sachet, bissap, jus de gingembre, ou jus de tamarin?	t)	1	2	8	
	u) Des sucreries comme Coca Cola, Fanta, Sprite, ou Malta, ou boissons énergisantes telles que XXL?	u)	1	2	8	
	v) Du café sucré, thé sucré, kinkéliba avec du sucre, ou chocolat chaud comme Nesquick ou Milo?	v)	1	2	8	
	w) Huile de palme rouge ?	w)	1	2	8	
	x) D'autres liquides ? SI OUI : x1) Quelle était cette boisson ?	x)	1	2	8	
		AUTRE(S) BOISSON(S) _____ (PRÉCISEZ)				
	x2) La boisson était-elle sucrée ?	SUCRÉE	1	2	8	
	y) D'autres aliments ? SI OUI : y1) Quels étaient ces aliments ? INDIQUEZ LE GROUPE D'ALIMENTS APPROPRIÉ POUR CHAQUE ALIMENT SUPPLÉMENTAIRE, SI LE GROUPE N'EST PAS ENCORE CODÉ <OUI>. S'IL EST IMPOSSIBLE DE DÉTERMINER À QUEL GROUPE UN ALIMENT SUPPLÉMENTAIRE APPARTIENT, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ALIMENT.	y)	1	2	8	
		AUTRE(S) ALIMENT(S) _____ (PRÉCISEZ)				

SECTION 6C. INDICE DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE

NO.	QUESTIONS AND FILTERS	CODING CATEGORIES	SKIP
650	VÉRIFIEZ 220, 224, 225 ET 226 DANS HISTORIQUE DES GROSSESSES: Y A-T-IL UN ENFANT SURVIVANT NÉ 24-59 MOIS AVANT L'ENQUÊTE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉE? UN ENFANT SURVIVANT OU PLUS NÉ 24-59 MOIS AVANT L'ENQUÊTE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉE ☐ AUCUN ENFANT SURVIVANT NÉ 24-59 MOIS AVANT L'ENQUÊTE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉE ☐ →		701
651	Je voudrais vous poser des questions sur vos enfants de 2-4 ans vivant avec vous. Ces questions concernent certaines choses qu'ils sont actuellement capables de faire. Veuillez garder à l'esprit que les enfants peuvent se développer et apprendre à des rythmes différents. Par exemple, certains commencent à parler plus tôt que d'autres, ou il est possible qu'ils sachent déjà dire quelques mots sans encore pouvoir faire des phrases. Cela ne pose donc aucun problème si votre enfant ne peut pas faire toutes les activités qui seront mentionnées dans ce questionnaire. Si vous avez des doutes concernant la réponse à fournir, n'hésitez pas à m'en faire part.		
652	ENREGISTREZ LE NOM ET LE NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DE LA GROSSESSE DE 215 ET 218 DE L'ENFANT SURVIVANT NÉ 24-59 MOIS AVANT L'ENQUÊTE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉE, EN COMMENÇANT PAR LE DERNIER. NOM DE L'ENFANT _____ NUMÉRO HISTORIQUE GROSSESS . . ☐☐		
653	(NOM DE L'ENFANT) peut-(il/elle) marcher sur une surface inégale, par exemple, une route cahoteuse ou escarpée, sans tomber ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
654	(NOM DE L'ENFANT) peut-(il/elle) sauter en soulevant les deux pieds du sol ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
655	(NOM DE L'ENFANT) peut-(il/elle) s'habiller (lui/elle)-même, c'est-à-dire mettre un pantalon et une chemise, sans l'aide de personne ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
656	(NOM DE L'ENFANT) peut-(il/elle) boutonner et déboutonner des boutons sans l'aide de personne ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
657	(NOM DE L'ENFANT) peut-(il/elle) dire 10 mots ou plus, comme « maman » ou « ballon » ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
658	(NOM DE L'ENFANT) peut-(il/elle) faire des phrases de 3 mots ou plus qui vont ensemble, par exemple, « Je veux de l'eau. » ou « La maison est grande. » ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 660
659	(NOM DE L'ENFANT) peut-(il/elle) faire des phrases de 5 mots ou plus qui vont ensemble, par exemple, « La maison est très grande. » ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
660	(NOM DE L'ENFANT) peut-(il/elle) utiliser correctement les pronoms « je », « tu », « elle » ou « il », par exemple, « Je veux de l'eau. » ou « Il mange du riz. » ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	

NO.	QUESTIONS AND FILTERS	CODING CATEGORIES	SKIP
661	Si vous montrez à (NOM DE L'ENFANT) un objet qu'(il/elle) connaît bien, comme une tasse ou un animal, peut-(il/elle) le nommer de manière systématique ? Par « systématique », nous entendons qu'(il/elle) utilise le même mot pour se référer au même objet, même si le mot employé n'est pas tout à fait correct.	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
662	(NOM DE L'ENFANT) peut-(il/elle) reconnaître au moins 5 lettres de l'alphabet ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
663	(NOM DE L'ENFANT) peut-(il/her) écrire son prénom ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
664	(NOM DE L'ENFANT) peut-(il/elle) reconnaître tous les chiffres de 1 à 5 ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
665	Si vous lui demandez de vous donner trois objets, tels que 3 pierres ou 3 haricots, (NOM DE L'ENFANT) vous en donne-t-(il/elle) la bonne quantité ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
666	(NOM DE L'ENFANT) peut-(il/elle) compter 10 objets, par exemple, 10 doigts ou 10 cubes, sans se tromper ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
667	(NOM DE L'ENFANT) faire une activité, comme colorier ou jouer avec des blocs de construction, sans demander de l'aide à plusieurs reprises ou abandonner trop vite ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
668	(NOM DE L'ENFANT) pose-t-(il/elle) des questions sur des personnes qu'(il/elle) connaît, en dehors de ses parents, lorsqu'elles ne sont pas là, par exemple, « Où est mamie ? »	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
669	(NOM DE L'ENFANT) propose-t-(il/elle) d'aider une personne qui semble avoir besoin d'aide ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
670	(NOM DE L'ENFANT) s'entend-(il/elle) bien avec les autres enfants ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
671	À quelle fréquence (NOM DE L'ENFANT) semble-t-(il/elle) très triste ou déprimé(e) ? Diriez-vous : semble très triste ou déprimé(e) chaque jour, chaque semaine, chaque mois, quelques fois dans l'année ou jamais ?	CHAQUE JOUR . . . . . 1 CHAQUE SEMAINE . . . . . 2 CHAQUE MOIS . . . . . 3 QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE . . . . . 4 JAMAIS . . . . . 5 NE SAIT PAS 8	

NO.	QUESTIONS AND FILTERS	CODING CATEGORIES	SKIP
672	Par rapport aux enfants du même âge, à quelle fréquence (NOM DE L'ENFANT) donne-t-(il/elle) des coups de pied, mord-(il/elle) ou frappe-t-(il/elle) les autres enfants ou les adultes ? Diriez-vous : jamais, autant ou moins, plus souvent ou beaucoup plus souvent ?	JAMAIS . . . . . 1 AUTANT OU MOINS . . . . . 2 PLUS SOUVENT . . . . . 3 BEAUCOUP PLUS SOUVENT . . . . . 4 NE SAIT PAS 8	
673	VÉRIFIEZ 220, 224, 225 ET 226 DANS HISTORIQUE DES GROSSESSES: Y A-T-IL D'AUTRES ENFANTS SURVIVANTS NÉS 24-59 MOIS AVANT L'ENQUÊTE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉE? D'AUTRES ENFANTS SURVIVANTS NÉS 24-59 MOIS AVANT L'ENQUÊTE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉE ☐ → (ALLEZ À 652 POUR ENFANT SURVIVANT SUIVANT) PAS D'AUTRE ENFANT SURVIVANT NÉ 24-59 MOIS AVANT L'ENQUÊTE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉE ☐ → 701	

SECTION 7. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
701	Êtes-vous actuellement mariée ou vivez-vous avec un homme comme si vous étiez mariée ?	OUI, ACTUELLEMENT MARIÉE . . . . . 1 OUI, VIT AVEC UN HOMME . . . . . 2 NON, PAS EN UNION 3	→ 706A
702	Avez-vous déjà été mariée ou avez-vous déjà vécu avec un homme comme si vous étiez mariée ?	OUI, A ÉTÉ MARIÉE . . . . . 1 OUI, A VÉCU AVEC UN HOMME . . . . . 2 NON 3	→ 721
703	Quel est votre état matrimonial actuel : êtes-vous veuve, divorcée ou séparée ?	VEUVE . . . . . 1 DIVORCÉE . . . . . 2 SÉPARÉE 3	→ 714
706A	Avez-vous un acte de mariage ou un autre document certifiant (ce mariage/cette union) ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 707
706B	Quel document avez-vous ? Aucun autre document ? ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	ACTE DE MARIAGE DÉLIVRÉ PAR UNE ÉGLISE, MOSQUEE OU AUTRE INSTITUTION RELIGIEUSE . . . . . A ACTE DE MARIAGE DÉLIVRÉ PAR UNE AUTORITÉ CIVILE . . . . . B AUTRE DOCUMENT DÉLIVRÉ PAR UNE INSTITUTION RELIGIEUSE . . . . . C AUTRE DOCUMENT DÉLIVRÉ PAR UNE AUTORITÉ CIVILE . . . . . D AUTRE _____ X (PRÉCISEZ)	→ 709
707	Est-ce que ce mariage a été enregistré à l'état civil ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
709	Est-ce que votre (mari/partenaire) vit actuellement avec vous ou vit-il ailleurs ?	VIT AVEC ELLE . . . . . 1 VIT AILLEURS 2	
710	Veuillez me dire le nom de votre (mari/partenaire). s'il vous plaît. ENREGISTREZ LE NOM ET N° DE LIGNE DU MARI/PARTENAIRE DU QUESTIONNAIRE MÉNAGE. S'IL N'EST PAS LISTÉ DANS LE QUESTIONNAIRE MÉNAGE, INSCRIVEZ '00'.	NOM _____ N° DE LIGNE	
711	Est-ce que votre (mari/partenaire) a d'autres épouses ou vit-il avec d'autres femmes comme s'il était marié ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 714
712	En tout, y compris vous-même, combien a-t-il d'épouses ou de partenaires avec qui il vit comme s'il était marié ?	NOMBRE TOTAL D'ÉPOUSES ET DE FEMMES AVEC QUI IL VIT COMME MARIÉ . . . . . NE SAIT PAS 98	
713	Êtes-vous la première, deuxième, … épouse ?	RANG . . . . . NE SAIT PAS 98	
714	Avez-vous été mariée ou avez-vous vécu avec un homme une seule fois ou plus d'une fois ?	SEULEMENT UNE FOIS . . . . . 1 PLUS D'UNE FOIS 2	

SECTION 7. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
715	VÉRIFIEZ 714 : MARIÉE/A VÉCU AVEC UN HOMME SEULEMENT UNE FOIS → a) MARIÉE/A VÉCU AVEC UN HOMME PLUS D'UNE FOIS → b)		
	a) En quel mois et quelle année avez-vous commencé à vivre avec votre (mari/partenaire) ?	MOIS . . . . . [ ][ ] NE CONNAÎT PAS LE MOIS . . . . . 98 ANNÉE . . . . . [ ][ ][ ][ ] NE CONNAÎT PAS L'ANNÉE 9998	→ 717
	b) Je voudrais maintenant vous parler de votre premier (mari/partenaire). En quel mois et quelle année avez-vous commencé à vivre avec lui ?		
716	Quel âge aviez-vous quand vous avez commencé à vivre avec lui pour la première fois ?	ÂGE . . . . . [ ][ ]	
717	VÉRIFIEZ 714 : MARIÉE/A VÉCU AVEC UN HOMME PLUS D'UNE FOIS MARIÉE/A VÉCU AVEC UN HOMME SEULEMENT UNE FOIS →		→ 721
718	VÉRIFIEZ 701 : OUI, ACTUELLEMENT MARIÉE OUI, VIT AVEC UN HOMME NON, PAS EN UNION →		→ 721
719	Je voudrais vous poser des questions sur votre (mari/partenaire) actuel. En quel mois et en quelle année avez-vous commencé à vivre avec lui ?	MOIS . . . . . [ ][ ] NE CONNAÎT PAS LE MOIS . . . . . 98 ANNÉE . . . . . [ ][ ][ ][ ] NE CONNAÎT PAS L'ANNÉE 9998	→ 721
720	Quel âge aviez-vous quand vous avez commencé à vivre pour la première fois avec votre (mari/partenaire) actuel ?	ÂGE . . . . . [ ][ ]	
721	**VÉRIFIEZ LA PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES. AVANT DE CONTINUER, FAITES TOUT VOTRE POSSIBLE POUR VOUS TROUVER EN PRIVÉ.**		
722	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur votre activité sexuelle pour mieux comprendre certains aspects importants de la vie. Je voudrais vous assurer de nouveau que vos réponses sont absolument confidentielles et qu'elles ne seront divulguées à personne. S'il arrivait que je pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, dites-le moi et je passerai à la question suivante. Quel âge aviez-vous quand vous avez eu, pour la première fois, des rapports sexuels ?	N'A JAMAIS EU DE RAPPORTS SEXUELS . . . . . 00 ÂGE EN ANNÉES . . . . . [ ][ ]	→ 738

SECTION 7. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
723	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur votre activité sexuelle récente. Quand avez-vous eu des rapports sexuels pour la dernière fois ? ENREGISTRER LE NOMBRE DE JOURS, DE SEMAINES, DE MOIS OU D'ANNÉES SI MOINS DE 12 MOIS, LA RÉPONSE DOIT ÊTRE ENREGISTRÉE EN JOURS, SEMAINES OU MOIS. SI 12 MOIS (UNE ANNÉE) OU PLUS, LA RÉPONSE DOIT ÊTRE ENREGISTRÉE EN ANNÉES.	IL Y A DES JOURS . . . . . 1 IL Y A DES SEMAINES . . . . 2 IL Y A DES MOIS . . . . . 3 IL Y A DES ANNÉES 4	→ 737
724	VÉRIFIEZ 232 : PAS ENCEINTE OU PAS SÛRE ☐ ENCEINTE ☐		→ 727
725	La dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels, est-ce que vous ou votre partenaire avait fait quelque chose ou utilisé une méthode pour retarder une grossesse ou éviter de tomber enceinte ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 727
726	Quelle méthode avez-vous utilisé ? ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ. SI LES CODES 'G' OU 'H' SONT ENCERCLÉS, ALLEZ À 728 MÊME SI UNE AUTRE MÉTHODE A ÉTÉ AUSSI UTILISÉE.	STÉRILISATION FÉMININE . . . . . A STÉRILISATION MASCULINE . . . . . B DIU . . . . . C INJECTABLES . . . . . D IMPLANTS . . . . . E PILULE . . . . . F CONDOM . . . . . G CONDOM FÉMININ . . . . . H CONTRACEPTION D'URGENCE . . . . . I MÉTHODE DES JOURS FIXES . . . . . J MAMA . . . . . K MÉTHODE DU RYTHME . . . . . L RETRAIT . . . . . M AUTRE MÉTHODE MODERNE . . . . . X AUTRE MÉTHODE TRADITIONNELLE . . . . . Y	→ 728
727	La dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels, est-ce qu'un condom masculin ou féminin a été utilisé ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 730
728	Quel est le nom de la marque du condom utilisé ? SI LA MARQUE N'EST PAS CONNUE, DEMANDEZ À VOIR LA BOITE.	PRUDENCE . . . . . 01 PROTECTOR . . . . . 02 DUREX . . . . . 03 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 98	

SECTION 7. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
729	Où vous étiez-vous procuré le condom la dernière fois ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC, PRIVÉ, OU UNE ONG, ENREGISTREZ '96' ET ÉCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.	**SECTEUR MÉDICAL PUBLIC** HÔPITAL NATIONAL . . . . . 11 HÔPITAL RÉGIONAL . . . . . 12 CENTRE DE SANTÉ DE RÉFÉRENCE . . 13 CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE . . 14 DISPENSAIRE/MATERNITÉ . . . . . 15 INFIRMERIE DE GARNISON MILITAIRE . . 16 CENTRE MEDICAUX INTER-ENTREPRISES (CMIE/INPS) . . . . . 17 AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ 18 (PRÉCISEZ) **SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ** HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ . . . . . 21 CENTRE CONFESSIONNEL . . . . . 22 CABINET MÉDICAL . . . . . 23 CABINET DE SOIN PRIVÉ . . . . . 24 PHARMACIE . . . . . 25 AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC)/RELAIS . . 26 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ 27 (PRÉCISEZ) **SECTEUR MÉDICAL ONG** HÔPITAL ONG . . . . . 31 CLINIQUE ONG . . . . . 32 AUTRE SECTEUR MÉDICAL ONG _____ 36 (PRÉCISEZ) **AUTRE SOURCE** BOUTIQUE . . . . . 41 BAR/BOÎTE DE NUIT . . . . . 42 KIOSQUE/TABLIER . . . . . 43 VENDEUR AMBULANT . . . . . 44 AMIS/PARENTS . . . . . 45 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
730	Quelle était votre relation avec cette personne avec qui vous avez eu des rapports sexuels ? SI PETIT AMI : Viviez-vous ensemble comme si vous étiez mariés ? SI OUI, ENREGISTREZ '2'. SI NON, ENREGISTREZ '3'.	MARI . . . . . 1 PARTENAIRE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉE . . 2 PETIT AMI NE VIVANT PAS AVEC L'ENQUÊTÉE . . . . . 3 RENCONTRE OCCASIONNELLE . . . . . 4 CLIENT / TRAVAILLEUR DU SEXE . . . . . 5 AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ)	
731	À part cette personne, avez-vous eu des rapports sexuels avec une autre personne au cours des 12 derniers mois ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 737
732	La dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels avec cette deuxième personne, est-ce qu'un condom masculin ou féminin a été utilisé ?	OUI . . . . . 1 NON 2	

SECTION 7. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
733	Quelle était votre relation avec cette deuxième personne avec qui vous avez eu des rapports sexuels ? SI PETIT AMI : Viviez-vous ensemble comme si vous étiez marié ? SI OUI, ENREGISTREZ '2'. SI NON, ENREGISTREZ '3'.	MARI . . . . . 1 PARTENAIRE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉE . . 2 PETIT AMI NE VIVANT PAS AVEC L'ENQUÊTÉE . . . . . 3 RENCONTRE OCCASIONNELLE . . . . . 4 CLIENT / TRAVAILLEUR DU SEXE . . . . . 5 AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ)	
734	À part ces deux personnes, avez-vous eu des rapports sexuels avec une autre personne au cours des 12 derniers mois ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 737
735	La dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels avec cette troisième personne, est-ce qu'un condom masculin ou féminin a été utilisé ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
736	Quelle était votre relation avec cette troisième personne avec qui vous avez eu des rapports sexuels ? SI PETIT AMI : Viviez-vous ensemble comme si vous étiez marié ? SI OUI, ENREGISTREZ '2'. SI NON, ENREGISTREZ '3'.	MARI . . . . . 1 PARTENAIRE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉE . . 2 PETIT AMI NE VIVANT PAS AVEC L'ENQUÊTÉE . . . . . 3 RENCONTRE OCCASIONNELLE . . . . . 4 CLIENT / TRAVAILLEUR DU SEXE . . . . . 5 AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ)	
737	En tout, durant votre vie, avec combien de personnes différentes avez-vous eu des rapports sexuels ? DANS LE CAS D'UNE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION. SI LE NOMBRE DE PARTENAIRES	NOMBRE DE PARTENAIRES DANS LA VIE . . . . . [ ][ ] NE SAIT PAS 98	
738	PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES DANS CETTE SECTION	OUI NON ENFANTS <10 . . . . . 1 2 HOMMES ADULTES . . . . . 1 2 FEMMES ADULTES 1 2	

SECTION 8. PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
801	VÉRIFIEZ 307 : NON POSÉE ☐ ↓ — NI LUI, NI ELLE STÉRILISÉ ☐ ↓ — IL OU ELLE STÉRILISÉ ☐ →		813
802	VÉRIFIEZ 232 : ENCEINTE ☐ ↓ — PAS ENCEINTE OU PAS SÛRE ☐ →		804
803	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Après l'enfant que vous attendez maintenant, souhaiteriez-vous un autre enfant ou préféreriez-vous ne plus en avoir ?	AVOIR UN AUTRE ENFANT . . . . . 1 N'EN VEUT PAS D'AUTRE . . . . . 2 INDÉCISE/NE SAIT PAS 8	→ 805 → 812
804	VÉRIFIEZ 208 : A EU UN ENFANT ☐ ↓ — N'A PAS EU D'ENFANT ☐ ↓ a) Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Voudriez-vous avoir un autre enfant ou préféreriez-vous ne pas plus avoir d'enfant ? b) Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Voudriez-vous avoir un enfant ou préféreriez-vous ne pas avoir d'enfant ?	AVOIR (UN/UN AUTRE) ENFANT . . . . . 1 PAS D'AUTRE/AUCUN . . . . . 2 DIT QU'ELLE NE PEUT PAS TOMBER ENCEINTE . . . . . 3 INDÉCISE/NE SAIT PAS 8	→ 807 → 813 → 811
805	VÉRIFIEZ 208 ET 232 : PAS ENCEINTE OU PAS SÛRE ET A EU UN ENFANT ☐ ↓ — PAS ENCEINTE OU PAS SÛRE ET N'A PAS D'ENFANT ☐ ↓ — ENCEINTE ☐ ↓ a) Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissanceu n autre enfant ? b) Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissance d'un enfant ? c) Après la naissance de l'enfant que vous attendez, combien de temps voudriez-vous attendre avant la naissance d'un autre enfant ?	MOIS . . . . . 1 ☐☐ ANNÉES . . . . . 2 ☐☐ BIENTÔT/MAINTENANT . . . . . 993 DIT QU'ELLE NE PEUT PAS TOMBER ENCEINTE . . . . . 994 APRÈS LE MARIAGE . . . . . 995 AUTRE _____ (PRÉCISEZ) 996 NE SAIT PAS 998	→ 811 → 813 → 811

SECTION 8. PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
806	VÉRIFIEZ 232 : PAS ENCEINTE OU PAS SÛRE ↓ ENCEINTE →		812
807	VÉRIFIEZ 307 : UTILISE ACTUELLEMENT UNE MÉTHODE CONTRACEPTIVE ? NON POSÉE ↓ UTILISE ACTUELLEMENT →		813
808	VÉRIFIEZ 805 : '24' MOIS OU PLUS OU '02' ANNÉES OU PLUS ↓ NON POSÉE ↓ '00-23' MOIS OU '00-01' ANNÉE →		812
809	VÉRIFIEZ 723 : IL Y A DES JOURS, SEMAINES OU MOIS ↓ IL Y A DES ANNÉES → NON POSÉE →		811 811
810	VÉRIFIEZ 208 ET 804 : A EU UN ENFANT ET EN VEUT UN AUTRE ↓ a) Vous avez dit que dans l'immédiat, vous ne souhaitiez pas un autre enfant. Pouvez-vous me dire pourquoi vous n'utilisez pas une méthode pour éviter une grossesse ? Y-a-t-il une autre raison ? ENREGISTREZ TOUTES LES RAISONS MENTIONNÉES.	PAS MARIÉE . . . . . A **RAISONS RELATIVES À LA FÉCONDITÉ** PAS DE RAPPORTS SEXUELS . . . . . B RAP. SEXUELS PEU FRÉQUENTS . . . . C MÉNOPAUSEL/HYSTÉRECTOMIE . . . . . D NE PEUT PAS TOMBER ENCEINTE . . . . E PAS DE RÈGLES DEPUIS DERNIÈRE NAISSANCE . . . . . F ALLAITE . . . . . G FATALISTE . . . . . H **OPPOSITION À L'UTILISATION** ENQUÊTÉE OPPOSÉE . . . . . I MARI/PARTENAIRE OPPOSÉ . . . . . J AUTRES OPPOSÉS . . . . . K INTERDITS RELIGIEUX . . . . . L **MANQUE DE CONNAISSANCE** NE CONNAÎT AUCUNE MÉTHODE . . . . M NE CONNAÎT AUCUN ENDROIT . . . . . N **RAISONS LIÉES À LA MÉTHODE** PAS PRATIQUE À UTILISER . . . . . O MODIFICATIONS MENSTRUELLES . . . . P MÉTHODES PEUVENT RENDRE INFERTILES . . . . . Q INTERFÈRE AVEC FONCTIONS NORMALES DU CORPS . . . . . R AUTRES EFFETS SECONDAIRES . . . . . S **COÛT/ACCÈS/DISPONIBILITÉ** MANQUE D'ACCÈS/TROP ÉLOIGNÉ . . . . T COÛT TROP ÉLEVÉ . . . . . U MÉTHODE PRÉFERRÉE NON DISPONIBLE . . . . . V AUCUNE MÉTHODE DISPONIBLE . . . . . W AUTRE _____ (PRÉCISEZ) X NE SAIT PAS . . . . . Z	

A EU UN ENFANT ET N'EN VEUT PLUS ↓	N'A PAS EU D'ENFANT ET VEUT UN ENFANT ↓
b) Vous avez dit que vous ne souhaitiez pas plus d' enfant. Pouvez-vous me dire pourquoi vous n'utilisez pas une méthode pour éviter une grossesse ? Y-a-t-il une autre raison ? ENREGISTREZ TOUTES LES RAISONS MENTIONNÉES.	c) Vous avez dit que dans l'immédiat, vous ne souhaitiez pas un enfant. Pouvez-vous me dire pourquoi vous n'utilisez pas une méthode pour éviter une grossesse ? Y-a-t-il une autre raison ? ENREGISTREZ TOUTES LES RAISONS MENTIONNÉES.
N'A PAS EU D'ENFANT ET NE VEUT PAS D'ENFANT ↓	
d) Vous avez dit que vous ne souhaitiez pas d' enfant. Pouvez-vous me dire pourquoi vous n'utilisez pas une méthode pour éviter une grossesse ? Y-a-t-il une autre raison ? ENREGISTREZ TOUTES LES RAISONS MENTIONNÉES.	

SECTION 8. PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
811	VÉRIFIEZ 307 : UTILISE ACTUELLEMENT UNE MÉTHODE CONTRACEPTIVE ? NON POSÉE ↓ — OUI, UTILISE ACTUELLEMENT →		813
812	Pensez-vous que vous utiliserez, à un certain moment dans le futur, une méthode contraceptive pour retarder ou éviter une grossesse ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
813	VÉRIFIEZ 224 : A DES ENFANTS VIVANTS ↓ a) Si vous pouviez revenir à l'époque où vous n'aviez pas d'enfant et que vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien auriez-vous voulu en avoir ? INSISTEZ POUR OBTENIR UNE RÉPONSE AUCUN ENFANT VIVANT ↓ b) Si vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien en voudriez-vous ? INSISTEZ POUR OBTENIR UNE RÉPONSE NUMÉRIQUE.	AUCUN . . . . . 00 NOMBRE . . . . . [ ][ ] AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	815 815
814	Parmi ces enfants, combien souhaiteriez-vous de garçons, combien souhaiteriez-vous de filles et pour combien d'entre eux, le sexe n'aurait-il pas d'importance ?	GARÇONS FILLES PEU IMPORTE NOMBRE . . [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ] AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
815	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous :	OUI NON a) RADIO . . . . . 1 2 b) TÉLÉVISION . . . . . 1 2 c) JOURNAL OU MAGAZINE . . . . . 1 2 d) TÉLÉPHONE PORTABLE . . . . . 1 2 e) FACEBOOK/TWITTER/ INSTAGRAM/WHATSAPP . . . . 1 2 f) POSTER/AFFICHE/BROCHURE/ DÉPLIANT . . . . . 1 2 g) AFFICHE/PANNEAU D'AFFICHAGE . . 1 2 h) CRIEURS, GRIOTS OU RELIGIEUX . . 1 2	

a) Entendu parler de la planification familiale à la radio ?
b) Vu quelque chose sur la planification familiale à la télévision ?
c) Lu quelque chose sur la planification familiale dans un journal ou magazine ?
d) Reçu un message vocal ou un texte sur la planification familiale sur votre téléphone portable ?
e) Avez-vous vu quelque chose sur la planification familiale sur les média sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram ou WhatsApp?
f) Avez-vous vu quelque chose sur la planification familiale sur un poster, une affiche, une brochure, ou un dépliant ?
g) Avez-vous vu quelque chose sur la planification familiale sur une affiche ou un panneau d'affichage à l'extérieur?
h) Avez-vous entendu quelque chose sur la planification familiale de la part des crieurs publics, griots ou leaders religieux?

SECTION 8. PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
817	VÉRIFIEZ 701 : OUI, ACTUELLEMENT MARIÉE ↓ ; OUI, VIT AVEC UN HOMME ↓ ; NON, PAS EN UNION →		901
818	Qui décide habituellement si vous devez utiliser ou non la contraception, vous, votre (mari/partenaire), vous et votre (mari/partenaire) ensemble, ou quelqu'un d'autre ?	ENQUÊTÉE . . . . . 1 MARI/PARTENAIRE . . . . . 2 ENQUÊTÉE ET MARI/PARTENAIRE ENSEMBLE . . . . . 3 QUELQU'UN D'AUTRE . . . . . 4 AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ)	820 820
819	Quand vous prenez cette décision avec votre (mari/partenaire), est-ce que vous diriez que votre opinion compte davantage, autant ou moins que celle de votre (mari/partenaire) ?	COMPTE DAVANTAGE . . . . . 1 COMPTE AUTANT . . . . . 2 COMPTE MOINS 3	
820	Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre (mari/partenaire) ou un autre membre de la famille essaie de vous forcer ou de faire pression sur vous pour que vous tombiez enceinte alors que vous ne vouliez pas tomber enceinte ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
821	VÉRIFIEZ 307 : NON POSÉE ↓ ; NI LUI, NI ELLE STÉRILISÉ ↓ ; IL OU ELLE STÉRILISÉ →		901
822	Est-ce que votre (mari/partenaire) veut le même nombre d'enfants que vous ou en veut-il plus ou moins que vous ?	MÊME NOMBRE . . . . . 1 PLUS D'ENFANTS . . . . . 2 MOINS D'ENFANTS . . . . . 3 NE SAIT PAS 8	

SECTION 9. CARACTÉRISTIQUES DU MARI ET TRAVAIL DE LA FEMME

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
901	VÉRIFIEZ 701 : ACTUELLEMENT MARIÉE/ VIT AVEC UN HOMME ☐ ↓ PAS EN UNION ☐ →		909
902	Quel âge avait votre (mari/partenaire) à son dernier anniversaire ?	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES .... ☐☐	
903	Est-ce que votre (mari/partenaire) a fréquenté l'école ?	OUI ..... 1 NON 2	→ 906
904	Quel est le plus haut niveau d'étude qu'il a atteint: fondamental 1 (1er cycle), fondamental 2 (2nd cycle), secondaire (lycée, technique, professionnel) ou supérieur ?	FONDAMENTAL 1er Cycle ..... 1 FONDAMENTAL 2nd Cycle ..... 2 SECONDAIRE (Lycée/Technique/Professionnel) 3 SUPÉRIEUR ..... 4 NE SAIT PAS 8	→ 906
905	Quelle est la [CLASSE/ANNÉE] la plus élevée qu'il a achevée à ce niveau ? SI LE NOMBRE D'ANNÉES ACHEVÉES EST INFÉRIEUR À 1 ANNÉE À CE NIVEAU, ENREGISTREZ '00'.	[CLASSE/ANNÉE] ..... ☐☐ NE SAIT PAS 98	
906	Est-ce que votre (mari/partenaire) a effectué un travail au cours des sept derniers jours ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS 8	→ 908
907	Est-ce que votre (mari/partenaire) a effectué un travail au cours des 12 derniers mois ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS 8	→ 909
908	Quelle est l'occupation de votre (mari/partenaire) ? C'est-à-dire quel genre de travail fait-il principalement ?	_____ _____ ☐☐ _____	
909	En dehors de votre travail domestique, avez-vous travaillé au cours des 7 derniers jours ?	OUI ..... 1 NON 2	→ 913
910	Comme vous le savez, certaines femmes font un travail pour lequel elles sont payées en argent ou en nature. D'autres vendent des choses, ou elles ont une petite affaire ou elles travaillent dans la ferme ou dans l'affaire de la famille. Au cours des 7 derniers jours, avez-vous fait quelque chose de ce genre ou un autre travail ?	OUI ..... 1 NON 2	→ 913
911	Bien que vous n'ayez pas travaillé au cours des 7 derniers jours, est-ce que vous avez un travail ou une affaire dont vous avez dû vous absenter par ce que vous avez eu un empêchement, pour maladie, vacances, congé maternité ou pour une autre raison ?	OUI ..... 1 NON 2	→ 913
912	Avez-vous fait un travail quelconque au cours des 12 derniers mois ?	OUI ..... 1 NON 2	→ 917
913	Quelle est votre occupation? C'est-à-dire quel genre de travail faites-vous principalement ?	_____ _____ ☐☐ _____	

SECTION 9. CARACTÉRISTIQUES DU MARI ET TRAVAIL DE LA FEMME

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
914	Faites-vous ce travail pour un membre de votre famille, pour quelqu'un d'autre ou êtes-vous à votre compte ?	MEMBRE DE LA FAMILLE . . . . . 1 QUELQU'UN D'AUTRE . . . . . 2 À SON COMPTE 3	
915	Travaillez-vous habituellement toute l'année, ou de manière saisonnière ou travaillez-vous seulement de temps en temps ?	TOUTE L'ANNÉE . . . . . 1 SAISONNIER/PARTIE DE L'ANNÉE . . . . . 2 DE TEMPS EN TEMPS 3	
916	Êtes-vous payée en argent ou en nature pour ce travail ou n'êtes-vous pas payée du tout ?	ARGENT SEULEMENT . . . . . 1 ARGENT ET NATURE . . . . . 2 NATURE SEULEMENT . . . . . 3 PAS PAYÉE 4	
917	VÉRIFIEZ 701 : ACTUELLEMENT MARIÉE/VIT AVEC UN HOMME ☐	PAS EN UNION ☐	→ 925
918	VÉRIFIEZ 916 : CODE '1' OU '2' ENCERCLÉ ☐	AUTRE ☐	→ 921
919	Habituellement, qui décide comment l'argent que vous gagnez va être utilisé : c'est vous, votre (mari/partenaire), ou conjointement vous et votre (mari/partenaire) ?	ENQUÊTÉE . . . . . 1 MARI/PARTENAIRE . . . . . 2 CONJOINTEMENT ENQUÊTÉE ET MARI/PARTENAIRE . . . . . 3 AUTRE _____ (PRÉCISEZ) 6	
920	Est-ce que vous pensez-vous que vous gagnez plus que votre (mari/partenaire), moins ou à peu prés la même chose ?	PLUS QUE LUI . . . . . 1 MOINS QUE LUI . . . . . 2 À PEU PRÉS LA MÊME CHOSE . . . . . 3 MARI/PARTENAIRE N'A PAS DE REVENUS . . . . . 4 NE SAIT PAS 8	→ 922
921	Habituellement, qui décide comment l'argent que votre (mari/partenaire) gagne va être utilisé: vous, votre (mari/partenaire), ou conjointement vous et votre (mari/partenaire) ?	ENQUÊTÉE . . . . . 1 MARI/PARTENAIRE . . . . . 2 CONJOINTEMENT ENQUÊTÉE ET MARI/PARTENAIRE . . . . . 3 MARI/PARTENAIRE N'A PAS DE REVENUS . . . . . 4 AUTRE _____ (PRÉCISEZ) 6	
922	Habituellement, qui prend les décisions en ce qui concerne vos propres soins de santé: vous, votre (mari/partenaire), conjointement vous et votre (mari/partenaire) ou quelqu'un d'autre ?	ENQUÊTÉE . . . . . 1 MARI/PARTENAIRE . . . . . 2 CONJOINTEMENT ENQUÊTÉE ET MARI/PARTENAIRE . . . . . 3 QUELQU'UN D'AUTRE . . . . . 4 AUTRE 6	
923	Qui prend habituellement les décisions concernant les achats importants pour le ménage ?	ENQUÊTÉE . . . . . 1 MARI/PARTENAIRE . . . . . 2 CONJOINTEMENT ENQUÊTÉE ET MARI/PARTENAIRE . . . . . 3 QUELQU'UN D'AUTRE . . . . . 4 AUTRE 6	

SECTION 9. CARACTÉRISTIQUES DU MARI ET TRAVAIL DE LA FEMME

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
924	Qui prend habituellement les décisions concernant les visites à votre famille ou parents ?	ENQUÊTÉE . . . . . 1 MARI/PARTENAIRE . . . . . 2 CONJOINTEMENT ENQUÊTÉE ET MARI/PARTENAIRE . . . . . 3 QUELQU'UN D'AUTRE . . . . . 4 AUTRE 6	
925	Est-ce que vous possédez cette maison ou une autre maison seule ou conjointement avec quelqu'un d'autre ?	SEULE SEULEMENT . . . . . 01 CONJOINTEMENT AVEC MARI/ PARTENAIRE SEULEMENT . . . . . 02 CONJOINTEMENT AVEC QUELQU'UN D'AUTRE SEULEMENT . . . . . 03 CONJOINTEMENT AVEC MARI/PARTENAIRE ET QUELQU'UN D'AUTRE . . . . . 04 SEULE ET CONJOINTEMENT . . . . . 05 N'EN POSSÈDE PAS 06	→ 928
926	Avez-vous un titre de propriété ou un autre document reconnu par le gouvernement pour une maison que vous possédez ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 928
927	Est-ce que votre nom figure sur ce document ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
928	Est-ce que vous possédez de la terre agricole ou non agricole, seule ou conjointement avec quelqu'un d'autre ?	SEULE SEULEMENT . . . . . 01 CONJOINTEMENT AVEC MARI/ PARTENAIRE SEULEMENT . . . . . 02 CONJOINTEMENT AVEC QUELQU'UN D'AUTRE SEULEMENT . . . . . 03 CONJOINTEMENT AVEC MARI/PARTENAIRE ET QUELQU'UN D'AUTRE . . . . . 04 SEULE ET CONJOINTEMENT . . . . . 05 N'EN POSSÈDE PAS 06	→ 930A
929	Avez-vous un titre de propriété ou un autre document reconnu par le gouvernement pour des terres que vous possédez ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 930A
930	Est-ce que votre nom figure sur ce document ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
930A	Avez-vous un compte dans une banque ou dans une autre institution financière que vous pouvez utiliser vous-même ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 930C
930B	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déposé vous-même de l'argent dans ce compte ou en avez-vous retiré ?	OUI . . . . . 1 NON 2	

SECTION 9. CARACTÉRISTIQUES DU MARI ET TRAVAIL DE LA FEMME

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
930C	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé un téléphone portable pour faire des transactions financières comme envoyer ou recevoir de l'argent, payer des factures, acheter des biens ou des services ou recevoir un salaire ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
931	PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES À CE POINT DE L'INTERVIEW (PERSONNES PRÉSENTES ET QUI ÉCOUTENT, PRÉSENTES MAIS QUI N'ÉCOUTENT PAS OU PAS PRÉSENTES).	PRES./ ÉCOUTE. / PRES./ N'ÉCOUTE PAS. / PAS PRES. ENFANTS < 10 . . . . . 1 2 3 MARI . . . . . 1 2 3 AUTRES HOMMES . . . . 1 2 3 AUTRES FEMMES 1 2 3	
932	Selon vous, est-il justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes : a) Si elle sort sans le lui dire ? b) Si elle néglige les enfants ? c) Si elle argumente avec lui ? d) Si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui ? e) Si elle brûle la nourriture ?	OUI / NON / NSP a) SORT SANS LE LUI DIRE 1 2 8 b) NÉGLIGE LES ENFANTS 1 2 8 c) ARGUMENTE . . . . . 1 2 8 d) REFUSE RAP. SEXUELS . . 1 2 8 e) BRÛLE NOURRITURE . . 1 2 8	

SECTION 10. VIH/SIDA

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
1000	Je voudrais maintenant parler avec vous du VIH et du sida.		
1001	Avez-vous déjà entendu parler du VIH ou du sida ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1040
1002	VÉRIFIEZ 111 : ÂGE 15-24 ANS ↓ 25 ANS OU PLUS →		→ 1008
1003	Le VIH est le virus qui cause le sida. Est-ce qu'on peut réduire le risque de contracter le VIH en ayant juste un seul partenaire sexuel qui n'est pas infecté et qui n'a aucun autre partenaire sexuel ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
1004	Est-ce qu'on peut contracter le VIH par les piqûres de moustiques ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
1005	Est-ce qu'on peut réduire le risque de contracter le VIH en utilisant des condoms au cours de chaque rapport sexuel ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
1006	Est-ce qu'on peut contracter le VIH en partageant la nourriture avec une personne qui a le VIH ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
1007	Est-il possible qu'une personne paraissant en bonne santé ait, en fait, le VIH ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
1008	Avez-vous entendu parler des TAR, c' est-à-dire des médicaments antirétroviraux qui traitent le VIH ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1009	Est-ce qu'il y a des médicaments spéciaux qu'un médecin ou une infirmière peut donner à une femme ayant contracté le VIH pour réduire le risque de transmission au bébé ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
1010	Avez-vous entendu parler de la PrEP, c'est-à-dire un médicament que l'on prend tous les jours pour éviter qu'une personne ne contracte le VIH ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1012
1011	Est-ce que vous approuvez les gens qui prennent un comprimé tous les jours pour éviter de contracter le VIH ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS/PAS SÛRE/ÇA DÉPEND 8	
1012	VÉRIFIEZ 220 ET 223 : AUCUNE NAISSANCE VIVANTE →		→ 1024
	DERNIÈRE NAISSANCE VIVANTE 0-23 MOIS AVANT L'ENQUÊTE ↓ DERNIÈRE NAISSANCE VIVANTE 24 MOIS OU PLUS AVANT L'ENQUÊTE →		→ 1024
1013	VÉRIFIEZ 412 POUR DERNIÈRE NAISSANCE VIVANTE ('TYPE 1'): A EU DES SOINS PRÉNATALS ↓ PAS DE SOINS PRÉNATALS →		→ 1018
1014	**VÉRIFIEZ LA PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES. AVANT DE CONTINUER, FAITES TOUS LES EFFORTS POSSIBLE POUR VOUS TROUVER EN PRIVÉ.**		
1015	Avez-vous fait un test du VIH dans le cadre des soins prénatals pendant que vous étiez enceinte de (NOM DE L'ENFANT) ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1018

SECTION 10. VIH/SIDA

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
1016	Où le test a-t-il été fait ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC, PRIVÉ, OU UNE ONG, ENREGISTREZ '96' ET ÉCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.	**SECTEUR MÉDICAL PUBLIC** HÔPITAL NATIONAL . . . . . 11 HÔPITAL RÉGIONAL . . . . . 12 CENTRE DE SANTÉ DE RÉFÉRENCE . . 13 CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE . . 14 DISPENSAIRE/MATERNITÉ . . . . . 15 INFIRMERIE DE GARNISON MILITAIRE . . 16 CENTRE MEDICAUX INTER-ENTREPRISES (CMIE/INPS) . . . . . 17 CENTRE DE CONSEILS ET DE DEPISTAGE VOLONTAIRE . . . . . 18 AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ 19 (PRÉCISEZ) **SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ** HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ . . . . . 21 CENTRE CONFESSIONNEL . . . . . 22 CABINET MÉDICAL . . . . . 23 CABINET DE SOIN PRIVÉ . . . . . 24 PHARMACIE . . . . . 25 AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC)/RELAIS . . 26 CENTRE DE CONSEILS ET DE DEPISTAGE VOLONTAIRE . . . . . 27 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ 28 (PRÉCISEZ) **SECTEUR MÉDICAL ONG** HÔPITAL ONG . . . . . 31 CLINIQUE ONG . . . . . 32 CENTRE DE CONSEILS ET DE DEPISTAGE VOLONTAIRE . . . . . 33 ORGANISATION A BASE COMMUNAUTAIRE AUTRE SECTEUR MÉDICAL ONG _____ 36 (PRÉCISEZ) **AUTRE SOURCE** MAISON . . . . . 41 LIEU DE TRAVAIL . . . . . 42 CENTRE DE DÉTENTION . . . . . 43 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
1017	Avez-vous eu les résultats du test ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1018	VÉRIFIEZ 435 POUR DERNIÈRE NAISSANCE VIVANTE ('TYPE 1') : UN CODE '21-46' ENCERCLÉ ☐ ↓ AUTRE ☐		→ 1021
1019	Entre le moment où vous êtes arrivée pour accoucher mais avant la naissance du bébé, avez-vous fait un test du VIH ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1021
1020	Avez-vous eu les résultats du test ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1022

SECTION 10. VIH/SIDA

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
1021	VÉRIFIEZ 1015 : OUI ☐ ↓ NON OU PAS POSÉE ☐ →		1024
1022	Avez-vous été testée pour le VIH depuis que vous avez fait ce test durant votre grossesse ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1025
1023	De quel mois et de quelle année date votre test du VIH le plus récent ?	MOIS . . . . . ☐☐ NE CONNAÎT PAS LE MOIS . . . . . 98 ANNÉE . . . . . ☐☐☐☐ NE CONNAÎT PAS L'ANNÉE 9998	→ 1028
1024	Avez-vous déjà fait un test du VIH ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1032
1025	De quel mois et de quelle année date votre test du VIH le plus récent ?	MOIS . . . . . ☐☐ NE CONNAÎT PAS LE MOIS . . . . . 98 ANNÉE . . . . . ☐☐☐☐ NE CONNAÎT PAS L'ANNÉE 9998	

SECTION 10. VIH/SIDA

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
1026	Où le test a-t-il été fait ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC, PRIVÉ, OU UNE ONG, ENREGISTREZ '96' ET ÉCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.	**SECTEUR MÉDICAL PUBLIC** HÔPITAL NATIONAL . . . . . 11 HÔPITAL RÉGIONAL . . . . . 12 CENTRE DE SANTÉ DE RÉFÉRENCE . . 13 CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE . . 14 DISPENSAIRE/MATERNITÉ . . . . . 15 INFIRMERIE DE GARNISON MILITAIRE . . 16 CENTRE MEDICAUX INTER-ENTREPRISES (CMIE/INPS) . . . . . 17 CENTRE DE CONSEILS ET DE DEPISTAGE VOLONTAIRE . . . . . 18 AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ 19 (PRÉCISEZ) **SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ** HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ . . . . . 21 CENTRE CONFESSIONNEL . . . . . 22 CABINET MÉDICAL . . . . . 23 CABINET DE SOIN PRIVÉ . . . . . 24 PHARMACIE . . . . . 25 AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC)/RELAIS . . 26 CENTRE DE CONSEILS ET DE DEPISTAGE VOLONTAIRE . . . . . 27 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ 28 (PRÉCISEZ) **SECTEUR MÉDICAL ONG** HÔPITAL ONG . . . . . 31 CLINIQUE ONG . . . . . 32 CENTRE DE CONSEILS ET DE DEPISTAGE VOLONTAIRE . . . . . 33 ORGANISATION A BASE COMMUNAUTAIRE AUTRE SECTEUR MÉDICAL ONG _____ 36 (PRÉCISEZ) **AUTRE SOURCE** MAISON . . . . . 41 LIEU DE TRAVAIL . . . . . 42 CENTRE DE DÉTENTION . . . . . 43 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
1027	Avez-vous eu les résultats du test ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1031
1028	Quel était le résultat du test ?	POSITIF . . . . . 1 NEGATIF . . . . . 2 INDÉTERMINÉ . . . . . 3 A REFUSÉ DE RÉPONDRE . . . . . 4 N'A PAS REÇU LE RÉSULTAT DU TEST 5	→ 1031

SECTION 10. VIH/SIDA

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
1029	En quel mois et en quelle année avez-vous reçu votre premier résultat positif au test du VIH ?	MOIS . . . . . ☐☐ NE CONNAÎT PAS LE MOIS . . . . . 98 ANNÉE . . . . . ☐☐☐☐ NE CONNAÎT PAS L'ANNÉE . . . . . 9998 MÊME DATE QUE LE DERNIER TEST DU VIH 95	
1030	Est-ce que vous prenez actuellement des TAR qui sont des médicaments antirétroviraux ? Par actuellement, je veux dire que vous avez peut-être oublié certaines doses mais vous êtes toujours en train de prendre des TAR.	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
1031	Combien de fois, dans votre vie, avez-vous fait un test du VIH ? DANS LE CAS D'UNE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION; SI LE NOMBRE DE TESTS EST DE 95 OU PLUS, ENREGISTREZ '95'.	NOMBRE DE TESTS DU VIH . . . . ☐☐	
1032	Avez-vous entendu parler de tests que les gens peuvent utiliser pour se tester eux-mêmes pour le VIH ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1034
1033	Vous êtes-vous testée vous-même en utilisant un kit de test ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1034	Est-ce que vous achèteriez des légumes frais à un marchand ou à un vendeur si vous saviez que cette personne a le VIH ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS/PAS SÛRE/ÇA DÉPEND 8	
1035	Pensez-vous que des enfants vivant avec le VIH devraient être autorisés à aller à l'école avec des enfants qui n'ont pas le VIH ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS/PAS SÛRE/ÇA DÉPEND 8	
1036	VÉRIFIEZ 1028 : CODE '1' ENCERCLÉ ☐ ↓	AUTRE ☐	→ 1040
1037	Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur votre vie en tant que personne vivant avec le VIH. Avez-vous révélé à quelqu'un d'autre que moi que vous avez le VIH ?	OUI . . . . . 1 NON 2	

SECTION 10. VIH/SIDA

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
1038	Êtes-vous d'accord ou non avec la déclaration suivante : J'ai eu honte parce que j'ai le VIH.	D'ACCORD . . . . . 1 PAS D'ACCORD 2	
1039	Dites-moi, s'il vous plait, si au cours des 12 derniers mois, il vous est arrivé les choses suivantes ou si vous pensez qu'elles vous sont arrivées parce que vous avez le VIH : a) Les gens ont mal parlé de moi parce que j'ai le VIH. b) Quelqu'un a révélé que j'avais le VIH sans ma permission. c) J'ai été insultée, harcelée ou menacée parce que j'ai le VIH. d) Le personnel de santé a mal parlé de moi parce que j'ai le VIH. e) Le personnel de santé a crié sur moi, m'a grondée, m'a traitée de tous les noms ou m'a agressée verbalement d'une autre manière parce que j'ai le VIH.	OUI NON a) GENS ONT MAL PARLÉ DE MOI . . . . . 1 2 b) RÉVÉLÉ MON STATUT . . . . . 1 2 c) INSULTÉ . . . . . 1 2 d) PERSONNEL DE SANTÉ A MAL PARLÉ DE MOI . . . . . 1 2 e) PERSONNEL DE SANTÉ VERBALEMENT AGRESSIF . . 1 2	
1040	VÉRIFIEZ 1001 : A ENTENDU PARLER DU VIH OU DU SIDA → a) À part le VIH, avez-vous entendu parler d'autres infections qui peuvent se transmettre par contact sexuel ? PAS ENTENDU PARLER DU VIH OU DU SIDA → b) Avez-vous entendu parler d'infections qui peuvent se transmettre par contact sexuel ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1041	VÉRIFIEZ 722 : A EU DES RAPPORTS SEXUELS N'A JAMAIS EU DE RAPPORTS SEXUELS →		1046
1042	VÉRIFIEZ 1040 : A ENTENDU PARLER D'AUTRES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES ? OUI NON →		1044
1043	J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur votre santé au cours des 12 derniers mois. Durant les 12 derniers mois, avez-vous eu une maladie que vous avez contractée par contact sexuel ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
1044	Il arrive parfois que les femmes aient des pertes vaginales, anormales et malodorantes. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des pertes vaginales anormales et malodorantes ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
1045	Il arrive parfois que les femmes aient une plaie ou un ulcère génital. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu une plaie ou un ulcère génital ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	

SECTION 10. VIH/SIDA

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
1046	Si une femme sait que son mari est atteint d'une maladie qu'elle peut contracter au cours de rapports sexuels, pensez-vous qu'il est justifié qu'elle demande qu'un condom soit utilisé quand ils ont des rapports sexuels ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
1047	Est-ce que vous pensez qu'il est justifié qu'une femme refuse d'avoir des rapports sexuels avec son mari quand elle sait qu'il a des relations sexuelles avec d'autres femmes ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
1048	VÉRIFIEZ 701 : ACTUELLEMENT MARIÉE/ VIT AVEC UN HOMME ☐ ↓ PAS EN UNION ☐ →		1101
1049	Pouvez-vous refuser d'avoir des rapports sexuels avec votre (mari/partenaire) quand vous ne souhaitez pas en avoir ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 ÇA DÉPEND/PAS SÛRE 8	
1050	Pourriez-vous demander à votre (mari/partenaire) d'utiliser un condom si vous vouliez qu'il en utilise un ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 ÇA DÉPEND/PAS SÛRE 8	

SECTION 11. AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
1101	Combien de minutes faut-il pour aller de votre maison à l'établissement de santé le plus proche, qui peut être un hôpital, une clinique, un cabinet médical, un CSCOM, un site ASC, une maternité ou	MINUTES . . . . . [ ][ ][ ]	
1102	Comment est-ce que vous allez dans cet établissement de santé depuis votre maison ? SI PLUS D'UN MOYEN DE DÉPLACEMENT EST MENTIONNÉ, ENCERCLÉ LE PREMIER DE LA LISTE.	**MOTORISÉ** VOITURE/CAMION . . . . . 01 BUS PUBLIC . . . . . 02 MOTOCYCLETTE/SCOOTER . . . . . 03 BATEAU À MOTEUR . . . . . 04 **NON MOTORISÉ** CHARRETTE TIRÉE PAR UN ANIMAL . . . . 05 BICYCLETTE . . . . . 06 BATEAU SANS MOTEUR . . . . . 07 EN MARCHANT . . . . . 08 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
1103	Est-ce qu'un médecin ou un autre prestataire de santé a examiné vos seins pour le cancer du sein ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
1106	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur la consommation de tabac, que ce soit en le fumant ou en l'utilisant d'une autre manière. Est-ce que vous fumez actuellement des cigarettes chaque jour, certains jours ou pas du tout ?	CHAQUE JOUR . . . . . 1 CERTAINS JOURS . . . . . 2 PAS DU TOUT 3	→ 1108
1107	En moyenne, combien de cigarettes fumez-vous actuellement par jour ?	NOMBRE DE CIGARETTES . . . . . [ ][ ]	
1108	Actuellement, est-ce que vous fumez ou utilisez un autre type de tabac chaque jour, certains jours ou pas du tout ?	CHAQUE JOUR . . . . . 1 CERTAINS JOURS . . . . . 2 PAS DU TOUT 3	→ 1110
1109	Actuellement, quel autre type de tabac fumez-vous ou utilisez-vous ? ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	KRETEKS . . . . . A PIPES REMPLIES DE TABAC . . . . . B CIGARES, CHEROOTS, OU CIGARILLOS . . C PIPE À EAU . . . . . D TABAC À CHIQUER . . . . . E SNUFF À PRISER . . . . . F TABAC À MÂCHER . . . . . G CHIQUE DE BETEL AVEC TABAC . . . . . H AUTRE _____ X (PRÉCISEZ)	

SECTION 11. AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
1110	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur la consommation d'alcool. Est-ce que vous avez déjà bu de l'alcool, comme de la bière, du vin, des liqueurs, du dolo ou du baandjii?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1113
1111	Au cours du dernier mois, quel est le nombre de jours pendant lesquels vous avez bu une boisson alcoolisée ? DANS LE CAS D'UNE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION. SI L'ENQUÊTÉE RÉPOND 'CHAQUE JOUR ' OU 'PRESQUE CHAQUE JOUR ,' ENCERCLEZ LE CODE'95'.	N'A PAS BU D'ALCOOL . . . . . 00 NOMBRE DE JOURS . . . . . [ ][ ] CHAQUE JOUR/ PRESQUE CHAQUE JOUR 95	→ 1113
1112	Nous considérons qu'une canette ou une bouteille de bière, un verre de vin, un verre de liqueur ou une calebassée de dolo ou de baandjii est un verre d'alcool. Au cours du dernier mois, les jours où vous avez bu de l'alcool, combien de verres buviez-vous habituellement par jour ? MONTREZ LES PHOTOS DE VERRES STANDARD DES BOISSONS ALCOOLISÉES.	MOINS D'UN VERRE STANDARD . . . . . 00 NOMBRE DE VERRES . . . . . [ ][ ]	
1113	Différentes raisons peuvent empêcher les femmes d'obtenir un avis médical ou de se faire soigner. Quand vous êtes malade et que vous voulez un avis médical ou un traitement, est-ce que chacune des raisons suivantes constitue, pour vous, un problème important ou bien ce n'est pas un problème a) Obtenir la permission d'aller voir un médecin ? b) Obtenir l'argent nécessaire pour le conseil ou le traitement ? c) La distance pour atteindre l'établissement de santé ? d) Ne pas vouloir y aller seule ?	PROBLÈME IMPORTANT / PAS UN PROBLÈME IMPORTANT a) PERMISSION . . . . . 1 2 b) OBTENIR L'ARGENT . . 1 2 c) DISTANCE . . . . . 1 2 d) ALLER SEULE 1 2	
1114	Êtes-vous couverte par une assurance médicale ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1116
1115	Par quel type d'assurance médicale êtes-vous couverte ? ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE (AMO) A REGIME D'ASSISTANCE MEDICALE (RAMED) B ASSURANCE MALADIE VOLONTAIRE (AMV) C MUTUELLE DE SANTE COMMUNAUTAIRE (MSC) . . . . . D ASSURANCE MALADIE DES COMPAGNIES D'ASSURANCE PRIVÉE (STANE, NSIA, SONAVIE,..) . . . . . E AUTRE ASSURANCE PRIVÉE . . . . . F AUTRE _____ X (PRÉCISEZ)	

SECTION 12. ACTIVITÉ PHYSIQUE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
1200	Je vais maintenant vous poser quelques questions sur le temps que vous consacrez à différents types d'activité physique lors d'une semaine typique. Veuillez répondre à ces questions même si vous ne vous considérez pas comme quelqu'un d'actif. Pensez tout d'abord au temps que vous y consacrez au travail, qu'il s'agisse d'un travail rémunéré ou non, de tâches ménagères, de cueillir ou récolter des aliments, de pêcher ou chasser, de chercher un emploi. Dans les questions suivantes, les activités physiques de forte intensité sont des activités nécessitant un effort physique important et causant une augmentation conséquente de la respiration ou du rythme cardiaque, et les activités physiques d'intensité modérée sont des activités qui demandent un effort physique modéré et causant une petite augmentation de la respiration ou du rythme cardiaque.		
1201	Est-ce que votre travail implique des activités physiques de forte intensité qui nécessitent une augmentation conséquente de la respiration ou du rythme cardiaque, comme soulever des charges lourdes, travailler sur un chantier, effectuer du travail de maçonnerie pendant au moins 10 minutes d'affilée ? UTILISER LA BOÎTE À IMAGES POUR DONNER DES EXAMPLES D'ACTIVITÉS PHYSIQUES DE FORTE INTENSITÉ.	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1204
1202	Habituellement, combien de jours par semaine effectuez-vous des activités physiques de forte intensité dans le cadre de votre travail ?	NOMBRE DE JOURS . . . . . ☐	
1203	Lors d'une journée habituelle durant laquelle vous effectuez des activités physiques de forte intensité, combien de temps en minutes consacrez-vous à ces activités ?	MINUTES . . . . . ☐☐☐☐	
1204	Est-ce que votre travail implique des activités physiques d'intensité modérée, comme une marche rapide ou soulever une charge légère durant au moins 10 minutes d'affilée ? UTILISER LA BOÎTE À IMAGES POUR DONNER DES EXAMPLES D'ACTIVITÉS PHYSIQUES D' INTENSITÉ MODÉRÉE.	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1207
1205	Habituellement, combien de jours par semaine effectuez-vous des activités physiques d'intensité modérée dans le cadre de votre travail ?	NOMBRE DE JOURS . . . . . ☐	
1206	Lors d'une journée habituelle durant laquelle vous effectuez des activités physiques d'intensité modérée, combien de temps en minutes consacrez-vous à ces activités ?	MINUTES . . . . . ☐☐☐☐	
1207	Les questions suivantes excluent les activités physiques dans le cadre de votre travail, que vous avez déjà mentionnées. Maintenant, je voudrais connaître votre façon habituelle de vous déplacer d'un endroit à l'autre ; par exemple pour aller au travail, faire des courses, aller au marché, aller à votre lieu consacré au culte?		
1208	Est-ce que vous effectuez des trajets d'au moins 10 minutes à pied, à vélo, ou par pirogue ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1211
1209	Habituellement, combien de jours par semaine effectuez-vous des trajets d'au moins 10 minutes à pied, à vélo, ou par pirogue ?	NOMBRE DE JOURS . . . . . ☐	

SECTION 12. ACTIVITÉ PHYSIQUE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
1210	Lors d'une journée habituelle, combien de temps en minutes consacrez-vous à vos déplacements à pied, à vélo, ou par pirogue ?	MINUTES	
1211	Les questions suivantes excluent les activités liées au travail et aux déplacements que vous avez déjà mentionnées. Maintenant je souhaiterais vous poser des questions sur le sport, le fitness et les activités de loisirs		
1212	Est-ce que vous pratiquez des sports, du fitness ou des activités de loisirs de forte intensité qui nécessitent une augmentation importante de la respiration ou du rythme cardiaque comme courir ou jouer au football pendant au moins dix minutes d'affilée ? UTILISER LA BOÎTE À IMAGES POUR DONNER DES EXAMPLES	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1215
1213	Habituellement, combien de jours par semaine pratiquez-vous une activité sportive, du fitness ou d'autres activités de loisirs de forte intensité ?	NOMBRE DE JOURS	
1214	Lors d'une journée habituelle, combien de temps en minutes consacrez-vous à une activité sportive, du fitness ou d'autres activités de loisirs de forte intensité?	MINUTES	
1215	Est-ce que vous pratiquez des sports, du fitness ou des activités de loisirs d'intensité modérée qui nécessitent une petite augmentation de la respiration ou du rythme cardiaque comme la marche rapide faire du vélo, nager, jouer au volley pendant au moins dix minutes d'affilée ? UTILISER LA BOÎTE À IMAGES POUR DONNER DES EXAMPLES	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1218
1216	Habituellement, combien de jours par semaine pratiquez-vous une activité sportive, du fitness ou d'autres activités de loisirs d'intensité modérée ?	NOMBRE DE JOURS	
1217	Lors d'une journée habituelle, combien de temps en minutes consacrez-vous à une activité sportive, du fitness ou d'autres activités de loisirs d'intensité modérée ?	MINUTES	
1218	La question suivante concerne le temps passé en position assise ou couchée, au travail, à la maison, en déplacement, à rendre visite à des amis, et inclut le temps passé [assis devant un bureau, se déplacer en voiture, en bus, en train, à lire, jouer aux cartes ou à regarder la télévision] mais n'inclut pas le temps passé à dormir.		
1219	Combien de temps en minutes passez-vous en position assise ou couchée lors d'une journée habituelle ?	MINUTES	

SECTION 13: MALADIES CHONIQUES

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
1301	Est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé a déjà vérifié votre tension artérielle ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
1302	Est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé vous a déjà dit que vous aviez une tension artérielle élevée ou de l'hypertension ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1306
1303	Dans les 12 derniers mois, est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé vous a dit que vous aviez une tension artérielle élevée ou de l'hypertension ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1304	Est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé vous a prescrit des médicaments pour contrôler votre tension artérielle ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1305	Est-ce que vous prenez actuellement des médicaments pour contrôler votre tension artérielle ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1306	Est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé a déjà mesuré le niveau de sucre dans votre sang ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
1307	Est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé vous a déjà dit que vous aviez un niveau élevé de sucre dans le sang ou du diabète ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1311
1308	Dans les 12 derniers mois, est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé vous a dit que vous aviez un niveau élevé de sucre dans le sang ou du diabète ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1309	Est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé vous a prescrit des médicaments pour contrôler votre niveau de sucre ou de diabète ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1310	Est-ce que vous prenez des médicaments pour contrôler votre niveau élevé de sucre dans le sang ou votre diabète ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1311	Est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé vous a déjà dit que vous aviez une maladie cardiaque ou un problème cardiaque chronique ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1313
1312	Suivez-vous actuellement un traitement pour une maladie cardiaque ou un problème cardiaque chronique ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1313	Est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé vous a déjà dit que vous aviez une maladie pulmonaire ou un problème pulmonaire chronique ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1315
1314	Suivez-vous actuellement un traitement pour une maladie pulmonaire ou un problème pulmonaire chronique ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1315	Est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé vous a déjà dit que vous aviez un cancer ou une tumeur ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1317
1316	Suivez-vous actuellement un traitement pour un cancer ou une tumeur ?	OUI . . . . . 1 NON 2	

SECTION 13: MALADIES CHONIQUES

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
1317	Est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé vous a déjà dit que vous faisiez de la depression?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1319
1318	Suivez-vous actuellement un traitement pour la dépression ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1319	Est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé vous a déjà dit que vous faisiez de l'anxiété?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1321
1320	Suivez-vous actuellement un traitement pour l'anxiété ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1321	Est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé vous a déjà dit que vous souffriez de troubles épileptiques ou d'épilepsie ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1323
1322	Suivez-vous actuellement un traitement pour l'épilepsie?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1323	Est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé vous a déjà dit que vous aviez de l'arthrite?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1327
1324	Suivez-vous actuellement un traitement pour l'arthrite ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1327	Avez-vous entendu parler du cancer du col de l'utérus ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1329
1328	Avez-vous entendu parler de tests pour le cancer du col de l'utérus ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1329	Je vais, maintenant, vous poser des questions sur des tests que le personnel de santé peut faire pour détecter un cancer du col de l'utérus. Le col de l'utérus est la partie qui relie l'utérus au vagin. Pour effectuer un test du cancer du col de l'utérus, on demande à la femme de s'allonger sur le dos en écartant les jambes. Ensuite, en utilisant une petite brosse ou un coton-tige, le personnel de santé prélève à l'intérieur de l'utérus un échantillon. L'échantillon est envoyé dans un laboratoire pour être testé. Ce test est appelé un frottis Pap ou un test PVH. Il y a une autre méthode qui est appelée IVA ou Inspection Visuelle après application d'Acide ascétique. Au cours de ce test, le personnel de santé applique du vinaigre dilué sur le col utérin pour voir si une réaction se produit.		
1330	Est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé vous a déjà fait un test de détection du cancer du col de l'utérus ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 1337
1331	Quand a eu lieu votre dernier test pour le cancer du col de l'utérus ? SI MOINS D'1 ANNÉE , ENREGISTREZ '00'.	ANNÉES . . . . . ☐☐ NE SAIT PAS 98	

SECTION 13: MALADIES CHONIQUES

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
1332	Quel était le résultat de votre dernier test pour le cancer du col de l'utérus ?	NORMAL / NÉGATIF . . . . . 1 ANORMAL / POSITIF . . . . . 2 SUSPICION DE CANCER . . . . . 3 PAS CLAIR / NON CONCLUANT . . . . . 4 N'A PAS REÇU DE RÉSULTATS . . . . . 5 NE SAIT PAS 8	→ 1337 → 1336 → 1337
1333	Avez-vous suivi un traitement pour le col de l'utérus ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 1336
1334	Avez-vous reçu le traitement le même jour où vous avez reçu les résultats du test, ou un jour différent?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
1335	Avez-vous fait des visites de suivi après le traitement ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 1337
1336	Avez-vous fait des visites de suivi à cause des résultats de votre test ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
1337	Est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé vous a déjà dit que vous aviez une autre maladie chronique, c'est-à-dire une maladie qui dure depuis longtemps?	OUI . . . . . 1 _____ (SPÉCIFIEZ LA MALADIE CHRONIQUE) NON 2	→ 1339
1338	Suivez-vous actuellement un traitement pour (MALADIE CHRONIQUE À 1337) ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1339	Avez-vous déjà reçu un vaccin contre la COVID-19 ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 1341
1340	Quand a eu lieu votre dernière vaccination contre le COVID-19 ?	MOIS . . . . . ☐☐ NE CONNAÎT PAS LE MOIS . . . . . 98 ANNÉE . . . . . ☐☐☐☐ NE CONNAÎT PAS L'ANNÉE 9998	
1341	VÉRIFIEZ 111: ÂGE: 15-49 ANS ☐ ↓ ÂGE: 50-64 ANS ☐		→ 1538

SECTION 14. EXCISION/MUTILATION GÉNITALE FÉMININE

No.	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSEZ À
1401	Je voudrais maintenant vous parler d'une pratique que l'on appelle l'excision. Avez-vous déjà entendu parler de l'excision ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1403
1402	Dans certains pays, il existe une pratique qui consiste à couper une partie des organes génitaux externes des filles. Avez-vous déjà entendu parler de cette pratique ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1500
1403	Vous-même, avez-vous été excisée ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1409
1404	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur ce qui vous a été fait à ce moment-là. Vous a-t-on retiré des chairs de la zone génitale ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 1406
1405	Vous a-t-on seulement entaillé les parties génitales sans enlever de chairs ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
1406	Vous a-t-on fermé la zone génitale par une couture ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
1407	Quel âge aviez-vous quand on vous a excisée ? SI L'ENQUÊTÉE NE CONNAîT PAS L'ÂGE EXACT, ESSAYEZ D'EN OBTENIR UNE ESTIMATION.	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES . . . . . [ ][ ] EN TANT QUE BÉBÉ/ PENDANT L'ENFANCE . . . . . 95 NE SAIT PAS 98	
1408	Qui a procédé à votre excision ?	**TRADITIONNEL** EXCISEUSE TRADITIONNELLE . . . . . 11 MATRONE/ACCOUCHEUSE TRAD. . . . . 12 AUTRE TRADITIONNEL _____ 16 (PRÉCISEZ) **PROFESSIONNEL DE SANTÉ** MÉDECIN . . . . . 21 INFIRMIÈRE/SAGE-FEMME . . . . . 22 AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ _____ 26 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 98	
1409	VÉRIFIEZ 219, 220, ET 224 DANS L'HISTORIQUE DES GROSSESSES: A AU MOINS UNE FILLE VIVANTE NÉE EN 2008 OU PLUS TARD ☐ ↓ N'A AUCUNE FILLE VIVANTE NÉE EN 2008 OU PLUS TARD ☐ →		→ 1417

SECTION 14. EXCISION/MUTILATION GÉNITALE FÉMININE

No.	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSEZ À
1410	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur (votre/vos filles) .		
1411	ENREGISTREZ LE NOM ET LE NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DE LA GROSSESSE DE 215 ET 218 DE CHAQUE FILLE VIVANTE NÉE EN 2008 OU PLUS TARD LATER, EN COMMENÇANT PAR LA PLUS JEUNE. NOM _____	NUMÉRO HISTORIQUE GROSSESSE . . . . . ☐☐	
1412	Est-ce que (NOM DE LA FILLE) est excisée ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1416
1413	Quel âge avait (NOM DE LA FILLE) quand elle a été excisée ? SI L'ENQUÊTÉE NE CONNAîT PAS L'ÂGE, ESSAYEZ D'EN OBTENIR UNE ESTIMATION.	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES . . . . . ☐☐ NE SAIT PAS 98	
1414	Lui a-t-on fermé la zone génitale par une couture ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
1415	Qui a procédé à l'excision de votre fille ?	**TRADITIONNEL** EXCISEUSE TRADITIONNELLE . . . . . 11 MATRONE/ACCOUCHEUSE TRAD. . . . . 12 AUTRE TRADITIONNEL _____ 16 (PRÉCISEZ) **PROFESSIONNEL DE SANTÉ** MÉDECIN . . . . . 21 INFIRMIÈRE/SAGE-FEMME . . . . . 22 AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ _____ 26 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 98	
1416	VÉRIFIEZ 219, 220, ET 224 DANS HISTORIQUE DES GROSSESSES : Y A-T-IL D'AUTRES FILLES VIVANTES NÉES EN 2008 OU PLUS TARD? OUI ☐ → (ALLEZ À 1411 POUR LA PLUS JEUNE FILLE SUIVANTE) NON ☐		→ 1417

SECTION 14. EXCISION/MUTILATION GÉNITALE FÉMININE

No.	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSEZ À
1417	Pensez-vous que l'excision est exigée par votre religion ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 PAS DE RELIGION . . . . . 3 NE SAIT PAS 8	
1418	Pensez-vous que la pratique de l'excision doit continuer ou qu'elle doit être abandonnée ?	CONTINUER . . . . . 1 ABANDONNER . . . . . 2 CELA DÉPEND . . . . . 3 NE SAIT PAS 8	

SECTION 15. MODULE SUR LA VIOLENCE DOMESTIQUE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSEZ À
1500	VÉRIFIER LA PAGE DE COUVERTURE: LA FEMME EST SÉLECTIONNÉE POUR LE MODULE VD ? FEMME SÉLECTIONNÉE POUR CETTE SECTION ↓ FEMME NON SÉLECTIONNÉE →		1538
1501	VÉRIFIER LA PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES: NE PAS CONTINUER TANT QUE VOUS N'ÊTES PAS SÛRE D'ÊTRE EN PRIVÉ. VOUS ÊTES EN PRIVÉ . . . . . 1 ↓ IMPOSSIBLE D'ÊTRE EN PRIVÉ . . . . . 2 →		1537
1502	LISEZ À L'ENQUÊTÉE : Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions concernant certains autres aspects importants de la vie d'une femme. Vous allez trouver certaines de ces questions très personnelles. Cependant, vos réponses sont très importantes pour nous aider à connaître la condition des femmes au Mali. Je vous garantis que vos réponses resteront complètement confidentielles et qu'elles ne seront divulguées à personne. Je tiens aussi à vous assurer que personne d'autre que vous dans votre ménage ne saura que l'on vous a posé ces questions. S'il arrivait que je pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, dites-le moi et je passerai à la question suivante.		
1503	VÉRIFIER 701 ET 702: ACTUELLEMENT MARIÉE/ VIVANT AVEC UN HOMME →		1506
	JAMAIS MARIÉE/ JAMAIS VÉCU AVEC UN HOMME ↓		
	PRÉCÉDEMMENT MARIÉE/ A VÉCU AVEC UN HOMME (À LIRE AU PASSÉ ET UTILISER'DERNIER' AVEC 'MARI/ PARTENAIRE MASCULIN') →		1506
1504	Vous avez déclaré que vous n'êtiez pas mariée et que vous ne viviez pas avec un homme comme si vous êtiez mariée. Êtez-vous engagée actuellement dans une relation intime avec un homme bien que vous ne viviez pas avec lui ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→1506
1505	Avez-vous déjà été engagée dans une relation intime avec un homme bien que vous n'ayez jamais vécu avec lui ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1519
1506	Maintenant, je vais vous poser des questions sur des situations qui peuvent se produire entre certaines femmes et leur mari(mari/ partenaire masculin).		

	A. Dites-moi, s'il vous plait, si les situations suivantes s'appliquent à vos relations avec votre (dernier) (mari/partenaire masculin) ?	DÉJÀ ARRIVÉ	B. Combien de fois cela est-il arrivé au cours des 12 derniers mois : souvent, de temps en temps ou pas du tout ?		
			SOUVENT	PARFOIS	PAS DANS 12 DERNIERS MOIS
a)	Il (est/était) jaloux ou en colère si vous (parlez/parliez) à d'autres hommes ?	OUI 1 NON 2 ↓	→ 1	2	3
b)	Il vous (accuse/accusait) d'être infidèle ?	OUI 1 NON 2 ↓	→ 1	2	3
c)	Il ne vous (permet/permettait) pas de voir vos amies ?	OUI 1 NON 2 ↓	→ 1	2	3
d)	Il (essaye/essayait) de limiter vos contacts avec votre famille ?	OUI 1 NON 2 ↓	→ 1	2	3
e)	Il (insiste /insistait) pour savoir où vous (êtes/êtiez) à tous moments ?	OUI 1 NON 2 ↓	→ 1	2	3

SECTION 15. MODULE SUR LA VIOLENCE DOMESTIQUE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSEZ À
1507	Maintenant, je voudrais vous poser d'autres questions sur vos relations avec votre (dernier) (mari/partenaire masculin).		
	A. Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre (dernier) (mari/partenaire masculin) :	B. Combien de fois cela est-il arrivé au cours des 12 derniers mois : souvent, parfois seulement ou pas du tout ?	
		DÉJÀ ARRIVÉ / SOUVENT / PARFOIS / PAS DANS 12 DERNIERS MOIS	
	a) Vous dise ou fasse quelque chose pour vous humilier devant d'autres personnes ?	OUI 1 → 1 2 3 NON 2 ↓	
	b) Vous menace de vous blesser ou de vous faire du mal, vous ou quelqu'un qui vous est proche ?	OUI 1 → 1 2 3 NON 2 ↓	
	c) Vous insulte ou vous rabaisse ?	OUI 1 → 1 2 3 NON 2 ↓	
1508	A. Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre (dernier) (mari/partenaire masculin) vous ait fait l'une des choses suivantes :	B. Combien de fois cela est-il arrivé au cours des 12 derniers mois : souvent, parfois seulement ou pas du tout ?	
		DÉJÀ ARRIVÉ / SOUVENT / PARFOIS / PAS DANS 12 DERNIERS MOIS	
	a) vous bouscule, secoue ou vous jette quelque chose ?	OUI 1 → 1 2 3 NON 2 ↓	
	b) vous gifle ?	OUI 1 → 1 2 3 NON 2 ↓	
	c) vous torde le bras ou vous tire les cheveux ?	OUI 1 → 1 2 3 NON 2 ↓	
	d) vous frappe à coups de poings ou avec quelque chose qui pouvait vous blesser ?	OUI 1 → 1 2 3 NON 2 ↓	
	e) vous donne des coups de pied, vous traîne par terre ou vous batte ?	OUI 1 → 1 2 3 NON 2 ↓	
	f) essaye de vous étrangler ou de vous brûler avec l'intention de le faire ?	OUI 1 → 1 2 3 NON 2 ↓	
	g) vous attaque avec un couteau, un fusil ou une autre arme ?	OUI 1 → 1 2 3 NON 2 ↓	
	h) vous force physiquement à avoir des rapports sexuels avec lui quand vous ne le vouliez pas ?	OUI 1 → 1 2 3 NON 2 ↓	
	i) vous force physiquement à pratiquer d'autres actes sexuels que vous ne vouliez pas ?	OUI 1 → 1 2 3 NON 2 ↓	
	j) vous force en vous menaçant ou d'une autre manière à pratiquer des actes sexuels que vous ne vouliez pas ?	OUI 1 → 1 2 3 NON 2 ↓	

SECTION 15. MODULE SUR LA VIOLENCE DOMESTIQUE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSEZ À
1509	VÉRIFIER 1508A (a-j): AU MOINS UN OUI' ☐ ↓ PAS UN SEUL OUI' ☐ →		1511
1510	Est-ce qu'à la suite d'actes commis envers vous par votre (dernier) (mari/partenaire masculin), il vous est arrivé d'avoir :		
	a) des coupures, des hématomes ou des douleurs ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
	b) des hématomes aux yeux, des entorses, des luxations ou des brûlures ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
	c) des blessures profondes, des os cassés, des dents cassées ou d'autres blessures graves ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1511	Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de battre, de gifler, de donner des coups de pied ou de faire quelque chose d'autre avec l'intention de blesser physiquement votre (dernier) (mari/partenaire masculin) alors qu'il ne vous battait pas et ne vous faisait pas de mal physiquement ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1513
1512	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois vous est-il arrivé de faire cela à votre (dernier) (mari/partenaire masculin) : souvent, parfois seulement ou pas du tout ?	SOUVENT . . . . . 1 PARFOIS . . . . . 2 PAS DU TOUT 3	
1513	Est-ce que votre (dernier) (mari/partenaire masculin) boit (buvait) de l'alcool ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1515
1514	Combien de fois lui arrive-t-il (lui est-il arrivé) d'être ivre : souvent, parfois seulement ou jamais ?	SOUVENT . . . . . 1 PARFOIS . . . . . 2 PAS DU TOUT 3	
1515	Vous est-il arrivé d'avoir peur (d'avoir eu peur) de votre (dernier) (mari/partenaire masculin) : la plupart du temps, parfois ou jamais ?	PEUR LA PLUPART DU TEMPS . . . . 1 PEUR PARFOIS . . . . . 2 JAMAIS PEUR 3	

SECTION 15. MODULE SUR LA VIOLENCE DOMESTIQUE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSEZ À
1516	A. Jusqu'ici, nous avons parlé du comportement de votre (actuel/dernier) (mari/partenaire masculin). Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur le comportement d'un de vos précédents maris ou de tout autre partenaires actuels ou précédents que vous avez pu avoir .	B. Il y a combien de temps que cela s'est produit ?	
		DÉJÀ ARRIVÉ / IL Y A 0-11 MOIS / IL Y A 12 MOIS OU PLUS / NE SE SOUVIENT PAS	
		N'A JAMAIS EU UN AUTRE MARI/ PARTENAIRE MASCULIN 6	→ 1517
	a) Est-ce qu'il est arrivé qu'un mari précédent ou un autre partenaire masculin actuel ou précédent vous batte, vous gifle, vous donne des coups de pied ou vous fasse quelque chose pour vous blesser physiquement ?	OUI 1 → 1 2 3 NON 2 ↓	
	b) Est-ce qu'il est arrivé qu'un mari précédent ou un autre partenaire masculin actuel ou précédent vous force physiquement à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer des actes sexuels contre votre volonté ?	OUI 1 → 1 2 3 NON 2 ↓	
	c) Est-ce qu'il est arrivé qu'un mari précédent ou un autre partenaire masculin actuel ou précédent vous a humiliée devant d'autres personnes, vous menace de vous blesser, vous ou quelqu'un qui vous est proche, vous insulte ou cherche à vous rabaisser ?	OUI 1 → 1 2 3 NON 2 ↓	
1517	VÉRIFIER 1508A (h-j) ET 1516A (b):	AU MOINS UN OUI' ☐ ↓ / PAS UN SEUL OUI ☐	→ 1519
1518	Quel âge aviez-vous la première fois qu'un mari ou un partenaire masculin, actuel ou précédent, vous a forcée à avoir des rapports sexuels ou de pratiquer des actes sexuels que vous ne vouliez pas ?	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES . . . . . ☐☐ NE SAIT PAS 98	
1519	VÉRIFIER 212 ET 232:	ACTUELLEMENT ENCEINTE 232=1 OU A EU UNE GROSSESSE OU PLUS 212>0 ☐ ↓ / PAS ENCEINTE 232=2 ET N'A EU AUCUNE GROSSESSE 212=0 ☐	→ 1522
1520	Est-ce qu'il est arrivé que quelqu'un vous batte, vous gifle, vous donne des coups de pied ou vous fasse quelque chose d'autre pour vous faire mal physiquement alors que vous êtiez enceinte ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1522

SECTION 15. MODULE SUR LA VIOLENCE DOMESTIQUE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSEZ À
1521	Qui a agi ainsi pour vous faire mal physiquement pendant que vous êtiez enceinte ? Quelqu'un d'autre ? ENREGISTRER TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	MARI/PARTENAIRE ACTUEL ..... A MÈRE/ FEMME DU PÈRE ..... B PÈRE/ MARI DE LA MÈRE ..... C SOEUR/FRÈRE ..... D FILLE/FILS ..... E AUTRE PERSONNE APPARENTÉE .. F ANCIEN MARI/PARTENAIRE ..... G PETIT AMI ACTUEL ..... H ANCIEN PETIT AMI ..... I BELLE-MÈRE ..... J BEAU-PÈRE ..... K AUTRE BEAU-PARENT ..... L ENSEIGNANT ..... M CAMARADE D'ÉCOLE/DE CLASSE ... N EMPLOYEUR/QUELQU'UN .. AU TRAVAIL O POLICE/SOLDAT ..... P AUTRE _____ X (PRÉCISER)	
1522	VÉRIFIER 701 ET 702 ET 1504 ET 1505: A DÉJÀ ÉTÉ MARIÉE/ A VÉCU AVEC UN HOMME/ A DÉJÀ EU UN PARTENAIRE MASCULIN ☐ ↓ a) Depuis l'âge de 15 ans, est-ce que quelqu'un d'autre qu'un mari ou partenaire masculin vous a battu, giflé, donné des coups de pieds ou fait quelque chose pour vous faire mal physiquement ? N'oubliez pas, je ne parle pas ici d'un mari ou d'un partenaire masculin. N'A JAMAIS ÉTÉ MARIÉE/ N'A JAMAIS EU UN PARTENAIRE MASCULIN ☐ ↓ b) Depuis l'âge de 15 ans, est-ce que quelqu'un vous a battu, giflé ou donné des coups de pieds ou fait quelque chose d'autre pour vous faire mal physiquement ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 A REFUSÉ DE RÉPONDRE/ PAS DE RÉPONSE 3	→ 1525
1523	Qui vous a agressé de cette façon ? Quelqu'un d'autre ? ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	MÈRE/FEMME DU PÈRE ..... A PÈRE/MARI DE LA MÈRE ..... B SOEUR/FRÈRE ..... C FILLE/FILS ..... D AUTRE PERSONNE APPARENTÉE .. E PETIT AMI ACTUEL ..... F ANCIEN PETIT AMI ..... G BELLE-MÈRE ..... H BEAU-PÈRE ..... I AUTRE BEAU-PARENT ..... J ENSEIGNANT ..... K CAMARADE D'ÉCOLE/DE CLASSE .. L EMPLOYEUR/QUELQU'UN AU TRAVAIL ..... M POLICE/SOLDAT ..... N AUTRE _____ X (PRÉCISER)	
1524	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-il arrivé que (cette personne/ces personnes) vous agresse (vous agressent) physiquement : souvent, seulement de temps en temps ou pas du tout ?	SOUVENT ..... 1 PARFOIS ..... 2 PAS DU TOUT 3	

SECTION 15. MODULE SUR LA VIOLENCE DOMESTIQUE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSEZ À
1525	VÉRIFIER 701 ET 702 ET 1504 ET 1505: A DÉJÀ ÉTÉ MARIÉE/ A VÉCU AVEC UN HOMME/ A DÉJÀ EU UN PARTENAIRE MASCULIN ☐ ↓ N'A JAMAIS ÉTÉ MARIÉE/ N'A JAMAIS EU UN PARTENAIRE MASCULIN ☐ → 1527		
1526	À n'importe quel moment dans votre vie, quand vous étiez enfant ou adulte, est-ce que quelqu'un d'autre qu'un mari précédent ou un partenaire actuel ou précédent vous a forcé à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer d'autres actes sexuels contre votre volonté ? N'oubliez pas, je ne parle pas ici d'un mari ou d'un partenaire masculin.	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 A REFUSÉ DE RÉPONDRE/ PAS DE RÉPONSE 3	→ 1528 → 1531
1527	À n'importe quel moment dans votre vie, quand vous étiez enfant ou adulte, est-ce que quelqu'un vous a forcé de quelque manière que ce soit à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer d'autres actes sexuels que vous ne vouliez pas ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 A REFUSÉ DE RÉPONDRE/ PAS DE RÉPONSE 3	→ 1531
1528	VÉRIFIER 701 ET 702 ET 1504 ET 1505: A DÉJÀ ÉTÉ MARIÉE/ A VÉCU AVEC UN HOMME/ A DÉJÀ EU UN PARTENAIRE MASCULIN ☐ ↓ a) Quel âge aviez-vous la première fois que quelqu'un d'autre qu'un mari ou un autre partenaire masculin, vous a forcé à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer d'autres actes sexuels contre votre volonté? N'A JAMAIS ÉTÉ MARIÉE/ N'A JAMAIS EU UN PARTENAIRE MASCULIN ☐ ↓ b) Quel âge aviez-vous la première fois que l'on vous a forcé à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer d'autres actes sexuels contre votre volonté?	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES . . . . . ☐☐ NE SAIT PAS 98	
1529	Qui vous a forcé à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer des actes sexuels que vous ne vouliez pas ? Quelqu'un d'autre ? ENREGISTRER TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	PÈRE/MARI DE LA MÈRE . . . . . A FRÈRE/DEMI-FRÈRE . . . . . B AUTRE PERSONNE APPARENTÉE . . C PETIT AMI ACTUEL . . . . . D ANCIEN PETIT AMI . . . . . E BEAU-PARENT . . . . . F AMI/RENCONTRE . . . . . G AMI DE LA FAMILLE . . . . . H ENSEIGNANT . . . . . I CAMARADE D'ÉCOLE/CLASSE . . . . . J EMPLOYEUR/QUELQU'UN AU TRAVAIL . . . . . K POLICE/SOLDAT . . . . . L PRÊTRE/RESPONSABLE RELIGIEUX M ÉTRANGER . . . . . N AUTRE _____ X (PRÉCISEZ)	

SECTION 15. MODULE SUR LA VIOLENCE DOMESTIQUE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSEZ À
1530	VÉRIFIER 701 ET 702 ET 1504 ET 1505: A DÉJÀ ÉTÉ MARIÉE/ A VÉCU AVEC UN HOMME/ A DÉJÀ EU UN PARTENAIRE MASCULIN ☐ a) Au cours des 12 derniers mois, est-ce que quelqu'un d'autre qu'un mari précédent ou un partenaire masculin actuel ou précédent vous a forcé à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer des actes sexuels contre votre volonté? N'A JAMAIS ÉTÉ MARIÉE/ N'A JAMAIS EU UN PARTENAIRE MASCULIN ☐ b) Au cours des 12 derniers mois, est-ce que quelqu'un vous a forcé à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer des actes sexuels que vous ne vouliez pas ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1531	VÉRIFIEZ 1508A (a-j), 1516A (a,b), 1520, 1522, 1526, ET 1527: AU MOINS UN OUI' ☐ PAS UN SEUL OUI' ☐		→ 1535
1532	Pensez à ce qui vous est arrivé parmi les choses dont nous venons de parler. Vous est-il arrivé de rechercher de l'aide ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1534
1533	Auprès de qui avez-vous recherché de l'aide ? Personne d'autre ? ENREGISTRER TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	PROPRE FAMILLE . . . . . A FAMILLE DU MARI/PARTENAIRE . . B MARI/PARTENAIRE ACTUEL/ANCIEN . . . . . C PETIT AMI ACTUEL/ANCIEN . . . . . D AMI . . . . . E VOISIN . . . . . F RESPONSABLE RELIGIEUX . . . . . G MÉDECIN/PERSONNEL MÉDICAL . . . H POLICE . . . . . I AVOCAT . . . . . J ORGANISATION SERVICE SOCIAL . . . K AUTRE _____ X (PRÉCISER)	→ 1535
1534	Avez-vous parlé de cela à quelqu'un ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1535	Pour autant que vous le sachiez, est-ce que votre père battait votre mère ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	

SECTION 15. MODULE SUR LA VIOLENCE DOMESTIQUE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSEZ À
	REMERCIEZ L'ENQUÊTÉE DE SA COOPÉRATION ET RÉAFFIRMEZ-LUI QUE SES RÉPONSES RESTERONT CONFIDENTIELLES. COMPLÉTEZ LES QUESTIONS CI-DESSOUS CONCERNANT LE MODULE SUR LA VIOLENCE DOMESTIQUE SEULEMENT.		
1536	AVEZ-VOUS DÛ INTERROMPRE L'INTERVIEW PARCE QU'UN ADULTE A ESSAYÉ D'ÉCOUTER, EST VENU DANS LA PIÈCE OU A ESSAYÉ D'INTERVENIR D'UNE AUTRE MANIÈRE ?	OUI, UNE FOIS / OUI, PLUS D'UNE FOIS / NON MARI . . . . . 1 2 3 AUTRE HOMME ADULTE . . 1 2 3 FEMME ADULTE 1 2 3	
1537	COMMENTAIRES DE L'ENQUÊTRICE / SI L'ENQUÊTE SUR LA VIOLENCE DOMESTIQUE N'A PAS PU ÊTRE MENÉE, DONNEZ LES RAISONS.		
1538	ENREGISTREZ L'HEURE.	HEURE . . . . . [ ][ ] MINUTES . . . . . [ ][ ]	

INSTRUCTIONS:

UN SEUL CODE DOIT FIGURER DANS CHAQUE CASE.
UN CODE DOIT ÊTRE INSCRIT À CHAQUE MOIS À LA COLONNE 1.

CODES À UTILISER POUR CHAQUE COLONNE

COLONNE 1: NAISSANCES, GROSSESSES, UTILIS. CONTRACEP.

- N NAISSANCES
- G GROSSESSES
- F FIN DE GROSSESSE

- 0 AUCUNE MÉTHODE
- 1 STÉRILISATION FÉMININE
- 2 STÉRILISATION MASCULINE
- 3 DIU
- 4 INJECTABLES
- 5 IMPLANTS
- 6 PILULE
- 7 CONDOM
- 8 CONDOM FÉMININ
- 9 CONTRACEPTION D'URGENCE
- J MÉTHODE DES JOURS FIXES
- K MÉTHODE DE L'AMÉNORRHÉE ET DE L'ALLAITEMENT MATERNEL
- L MÉTHODE DU RYTHME
- M RETRAIT
- X AUTRE MÉTHODE MODERNE
- Y AUTRE MÉTHODE TRADITIONNELLE

COLONNE 2: DISCONTINUATION DE L'UTILISATION CONTRACEPTIVE

- 0 RAPPORTS SEX. PEU FRÉQUENTS/MARI ABSENT
- 1 TOMBÉE ENCEINTE ALORS QU'ELLE UTILISAIT
- 2 SOUHAITAIT TOMBER ENCEINTE
- 3 MARI/PARTENAIRE DÉSAPPROUVE
- 4 VOULAIT MÉTHODE PLUS EFFICACE
- 5 MODIFICATIONS MENSTRUELLES
- 6 AUTRES EFFETS SECONDAIRES/ SOUCIS CONCERNANT LA SANTÉ
- 7 MANQUE D'ACCESSIBILITÉ/TROP ÉLOIGNÉ
- 8 COÛTE TROP CHER
- N PAS PRATIQUE À UTILISER
- F FATALISTE
- A DIFFICULTÉS POUR TOMBER ENCEINTE/MÉNOPAUSE
- D DISSOLUTION DU MARIAGE/SÉPARATION
- X AUTRE

_____ (PRÉCISEZ)

- Z NE SAIT PAS

				COL. 1	COL. 2	
	12	DEC	01			
	11	NOV	02			
	10	OCT	03			
	09	SEP	04			
2	08	AOÛT	05			2
0	07	JUL	06			0
2	06	JUIN	07			2
3	05	MAI	08			3
	04	AVRIL	09			
	03	MARS	10			
	02	FEVRIER	11			
	01	JAN	12			
	12	DEC	13			
	11	NOV	14			
	10	OCT	15			
	09	SEP	16			
2	08	AOÛT	17			2
0	07	JUL	18			0
2	06	JUIN	19			2
2	05	MAI	20			2
	04	AVRIL	21			
	03	MARS	22			
	02	FEVRIER	23			
	01	JAN	24			
	12	DEC	25			
	11	NOV	26			
	10	OCT	27			
	09	SEP	28			
2	08	AOÛT	29			2
0	07	JUL	30			0
2	06	JUIN	31			2
1	05	MAI	32			1
	04	AVRIL	33			
	03	MARS	34			
	02	FEVRIER	35			
	01	JAN	36			
	12	DEC	37			
	11	NOV	38			
	10	OCT	39			
	09	SEP	40			
2	08	AOÛT	41			2
0	07	JUL	42			0
2	06	JUIN	43			2
0	05	MAI	44			0
	04	AVRIL	45			
	03	MARS	46			
	02	FEVRIER	47			
	01	JAN	48			
	12	DEC	49			
	11	NOV	50			
	10	OCT	51			
	09	SEP	52			
2	08	AOÛT	53			2
0	07	JUL	54			0
1	06	JUIN	55			1
9	05	MAI	56			9
	04	AVRIL	57			
	03	MARS	58			
	02	FEVRIER	59			
	01	JAN	60			
	12	DEC	61			
	11	NOV	62			
	10	OCT	63			
	09	SEP	64			
2	08	AOÛT	65			2
0	07	JUL	66			0
1	06	JUIN	67			1
8	05	MAI	68			8
	04	AVRIL	69			
	03	MARS	70			
	02	FEVRIER	71			
	01	JAN	72			

OBSERVATIONS DE L'ENQUÊTRICE

À REMPLIR UNE FOIS L'INTERVIEW TERMINÉE

COMMENTAIRES SUR L'INTERVIEW :

COMMENTAIRES SUR DES QUESTIONS PARTICULIÈRES :

AUTRES COMMENTAIRES :

OBSERVATION DU CHEF D'ÉQUIPE

FORMATTING DATE: 02 nov 2023

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INSTAT)

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE SECTEUR SANTÉ, DEVELOPPEMENT SOCIAL ET PROMOTION DE LA FAMILLE (CPS/SSDSPF)

SEPTIÈME ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ AU MALI

EDSM-VII

QUESTIONNAIRE HOMME

IDENTIFICATION

NOM DE LA LOCALITÉ _____

NOM DU CHEF DE MÉNAGE _____

NUMÉRO DE GRAPPE . . . . . | | | | |

NUMÉRO DE CONCESSION . . . . . | | | | |

NUMÉRO DU MÉNAGE . . . . . | | | | |

NOM ET NUMÉRO DE LIGNE DE L'HOMME _____ | | |

HOMME SÉLECTIONNÉ POUR MODULE VD ? (1=OUI, 2=NON) . . . . . |_|

VISITES D'ENQUÊTEURS

	1	2	3	VISITE FINALE
DATE	_____	_____	_____	JOUR |_|_|
				MOIS |_|_|
				ANNÉE |_|_|_|_|
NOM DE L'ENQUÊTEUR	_____	_____	_____	No ENQUÊT |_|_|_|_|
RÉSULTAT*	_____	_____	_____	RÉSULTAT* |_|
PROCHAINEDATE VISITE	_____	_____		NOMBRE TOTAL DE VISITES |_|
HEURE	_____	_____		

*CODES RÉSULTAT :
1 REMPLI
2 PAS À LA MAISON
3 DIFFÉRÉ
4 REFUSÉ
5 PARTIELLEMENT REMPLI
6 INCAPACITÉ
7 AUTRE _____ (PRÉCISEZ)

LANGUE DU QUESTIONNAIRE** **0 1** LANGUE DE L'INTERVIEW** |_|_| LANGUE MATERNELLE DE L'ENQUÊTÉ** |_|_| INTERPRÈTE (OUI = 1, NON = 2) |_|

LANGUE DU QUESTIONNAIRE** **FRANÇAIS**

**CODES LANGUES :

01 FRANÇAIS	07 DOGON
02 BAMBARA/MALINKÉ	08 MINIANKA
03 SONRAÏ/DJERMA	09 TAMACHECK
04 PEUHL/FOULFOULDÉ	10 BOBO/DAFING
05 SÉNOUFO	11 BOZO
06 MARKA/SONINKÉ	96 AUTRE _____ (PRÉCISEZ)

ÉQUIPE |_|_| NUMÉRO

CHEF D'ÉQUIPE _____ NOM |_|_|_|_| NUMÉRO

PRÉSENTATION ET DEMANDE DE CONSENTEMENT

Bonjour. Je m'appelle _____. Je travaille pour l'Institut National de la Statistique (INSTAT). En collaboration avec la Cellule de Planification et de Statistique Secteur Santé-Développement Social et Promotion de la Famille (CPS/SS-DS-PF), Nous effectuons une enquête nationale sur la santé et sur d'autres sujets partout au Mali. Les informations que nous collectons aideront à améliorer les services de santé. Votre ménage a été sélectionné pour cette enquête. Les questions prennent habituellement environ 20 minutes. Toutes les informations que vous nous donnerez sont strictement confidentielles et elles ne seront transmises à personne d'autre que les membres de l'équipe d'enquête. Vous n'êtes pas obligé de participer à cette enquête mais nous espérons que vous accepterez de répondre à nos questions car votre opinion est très importante. S'il arrivait que je pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, dites-le moi et je passerai à la question suivante ; vous pouvez également interrompre l'interview à n'importe quel moment.

Si vous souhaitez plus d'informations sur l'enquête, vous pouvez contacter la personne dont le nom figure sur la carte qui a déjà été donnée à votre ménage.

Avez-vous des questions à me poser ?

SIGNATURE DE L'ENQUÊTEUR _____ DATE _____

L'ENQUÊTÉ ACCEPTE D'ÊTRE INTERVIEWÉ . . 1 ↓

L'ENQUÊTÉ REFUSE D'ÊTRE INTERVIEWÉ . . 2 → FIN

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES DE L'ENQUÊTÉ

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
101	INSCRIVEZ L'HEURE.	HEURES . . . . . ☐☐ MINUTES . . . . . ☐☐	
102	Dans quelle RÉGION êtes-vous née ?	KAYES . . . . . 01 KOULIKORO . . . . . 02 SIKASSO . . . . . 03 SÉGOU . . . . . 04 MOPTI . . . . . 05 TOMBOUCTOU . . . . . 06 GAO . . . . . 07 KIDAL . . . . . 08 TAOUDENIT . . . . . 09 MÉNAKA . . . . . 10 BAMAKO . . . . . 11 EN DEHORS DU MALI/À L'ÉTRANGER 96	104
103	Dans quel pays êtes-vous né ?	PAYS _____ ☐☐	
104	Depuis combien de temps vivez-vous de manière continue à (NOM DE LA VILLE, PETITE VILLE OU VILLAGE ACTUEL DE RÉSIDENCE) ? SI MOINS D'UNE ANNÉE, INSCRIVEZ '00' ANNÉE.	ANNÉES . . . . . ☐☐ TOUJOURS . . . . . 95 VISITEUR 96	→ 110
105	VÉRIFIEZ 104 : 00 - 04 ANS ☐ ↓ 05 ANS OU PLUS ☐		→ 107
106	En quel mois et en quelle année avez-vous emménagé ici ?	MOIS . . . . . ☐☐ NE CONNAÎT PAS LE MOIS . . . . . 98 ANNÉE . . . . . ☐☐☐☐ NE CONNAÎT PAS L'ANNÉE 9998	

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES DE L'ENQUÊTÉ

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
107	Juste avant d'emménager ici, dans quelle RÉGION viviez-vous ?	KAYES . . . . . 01 KOULIKORO . . . . . 02 SIKASSO . . . . . 03 SÉGOU . . . . . 04 MOPTI . . . . . 05 TOMBOUCTOU . . . . . 06 GAO . . . . . 07 KIDAL . . . . . 08 TAOUDENIT . . . . . 09 MÉNAKA . . . . . 10 BAMAKO . . . . . 11 EN DEHORS DU MALI/À L'ÉTRANGER 96	
108	Juste avant d'emménager ici, est-ce que vous viviez dans une grande ville comme Bamako, une petite ville ou en zone rurale ?	GRANDE VILLE (BAMAKO, AUTRE CAPITAL,...) 1 AUTRE VILLE . . . . . 2 ZONE RURALE 3	
109	Pourquoi avez-vous déménagé dans cet endroit ?	EMPLOI . . . . . 01 ÉDUCATION/FORMATION . . . . . 02 MARIAGE . . . . . 03 RÉUNIFICATION FAMILIALE/AUTRE RAISON FAMILIALE . . . . . 04 DÉPLACEMENT FORCÉ . . . . . 05 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
110	En quel mois et en quelle année êtes-vous né ?	MOIS . . . . . [ ][ ] NE CONNAIT PAS LE MOIS . . . . . 98 ANNÉE . . . . . [ ][ ][ ][ ] NE CONNAIT PAS L'ANNÉE 9998	
111	Quel âge aviez-vous à votre dernier anniversaire ? COMPAREZ ET CORRIGEZ 110 ET/OU 111 SI INCOHÉRENT.	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES . . . . [ ][ ]	
112	Globalement, comment jugez-vous votre état de santé: très bon, bon, moyennement bon , mauvais ou très mauvais?	TRÈS BON . . . . . 1 BON . . . . . 2 MOYENNEMENT BON . . . . . 3 MAUVAIS . . . . . 4 TRÈS MAUVAIS 5	
113	Êtes-vous allé à l'école ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 117
114	Quel est le plus haut niveau d'études que vous avez atteint : fondamental 1 (1er cycle), fondamental 2 (2nd cycle), secondaire (lycée, technique, professionnel) ou supérieur ?	FONDAMENTAL 1er Cycle . . . . . 1 FONDAMENTAL 2nd Cycle . . . . . 2 SECONDAIRE (Lycée/Technique/Professionnel) 3 SUPÉRIEUR 4	
115	Quelle est [ANNÉE/CLASSE] la plus élevée que vous avez atteint à ce niveau ? SI MOINS D'UNE ANNÉE A ÉTÉ ACHEVÉE À CE NIVEAU, INSCRIVEZ '00'.	[ANNÉE/CLASSE] . . . . . [ ][ ]	

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES DE L'ENQUÊTÉ

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
116	VÉRIFIEZ 114 : FONDAMENTAL 1er Cycle, FONDAMENTAL 2nd Cycle, SECONDAIRE ↓ SUPÉRIEUR →		119
117	Je voudrais maintenant que vous me lisiez cette phrase. MONTREZ LA CARTE À L'ENQUÊTÉ. SI L'ENQUÊTÉ NE PEUT LIRE TOUTE LA PHRASE, INSISTEZ : Pouvez-vous lire une partie de la phrase ?	NE PEUT PAS LIRE DU TOUT . . . . . 1 PEUT SEULEMENT LIRE UNE PARTIE DE LA PHRASE . . . . . 2 PEUT LIRE TOUTE LA PHRASE . . . . . 3 PAS DE CARTE DANS LA LANGUE SOUHAITÉE PAR L'ENQUÊTÉ _____ 4 (PRÉCISEZ LA LANGUE) AVEUGLE/PROBLÈMES DE VUE 5	
118	VÉRIFIEZ 117 : CODE '2', '3' OU '4' ENCERCLÉ ↓ CODE '1' OU '5' ENCERCLÉ →		120
119	Lisez-vous un journal ou un magazine au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?	AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE . . . . . 1 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE . . . . . 2 PAS DU TOUT 3	
120	Écoutez-vous la radio au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?	AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE . . . . . 1 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE . . . . . 2 PAS DU TOUT 3	
121	Regardez-vous la télévision au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?	AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE . . . . . 1 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE . . . . . 2 PAS DU TOUT 3	
122	Avez-vous un téléphone portable ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 127
123	Est-ce que votre téléphone portable est un smart phone ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
127	Avez-vous déjà utilisé l'Internet depuis n'importe quel endroit à partir de n'importe quel appareil ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 130
128	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé l'Internet ? SI NÉCESSAIRE, INSISTEZ POUR L'UTILISATION À PARTIR DE N'IMPORTE QUEL ENDROIT ET DE	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 130
129	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous utilisé l'Internet : presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?	PRESQUE CHAQUE JOUR . . . . . 1 AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE . . . . . 2 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE . . . . . 3 PAS DU TOUT 4	

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES DE L'ENQUÊTÉ

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
130	Quelle est votre religion ?	MUSULMANE . . . . . 01 CATHOLIQUE . . . . . 02 PROTESTANT . . . . . 03 AUTRE RELIGION CHRÉTIENNE 04 ANIMISTE . . . . . 05 SANS RELIGION . . . . . 06 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
131	Quelle est votre ethnie ?	**CODE ETHNIE (Pour les MALIENS)** BAMBARA . . . . . 01 MALINKE . . . . . 02 PEULH . . . . . 03 SARAKOLE/SONINKE/MARKA . . . . . 04 KASSONKE . . . . . 05 SONRAï . . . . . 06 DOGON . . . . . 07 TOUAREG/BELLA . . . . . 08 SÉNOUFO/MINIANKA . . . . . 09 BOBO . . . . . 10 BOZO . . . . . 11 ARABE/MAURE . . . . . 12 AUTRE ETHNIE MALIENNE _____ 16 (PRÉCISEZ) **CODE NATIONALITÉ (Pour les ÉTRANGERS)** PAYS CEDEAO . . . . . 21 AUTRES PAYS AFRICAINS . . . . . 22 AUTRES NATIONALITÉS 23	

SECTION 2. REPRODUCTION

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
201	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur tous les enfants que vous avez eus durant votre vie. Je m'intéresse à tous vos enfants biologiques, même s'ils ne sont pas légalement les votres ou s'ils ne portent pas votre nom. Avez-vous ou avez-vous eu des enfants que vous avez engendrés ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 206
202	Avez-vous des fils ou des filles dont vous êtes le père et qui vivent actuellement avec vous ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 204
203	a) Combien de fils vivent avec vous ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'. b) Et combien de filles vivent avec vous ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'.	a) FILS À LA MAISON . . . . . ☐☐ b) FILLES À LA MAISON . . . . . ☐☐	
204	Avez-vous des fils ou filles dont vous êtes le père qui sont toujours en vie mais qui ne vivent pas avec vous ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 206
205	a) Combien de fils sont vivants mais qui ne vivent pas avec vous ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'. b) Combien de filles sont vivantes mais qui ne vivent pas avec vous ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'.	a) FILS AILLEURS . . . . . ☐☐ b) FILLES AILLEURS . . . . . ☐☐	
206	Avez-vous eu une fille ou un garçon qui est né vivant mais qui est décédé par la suite ? SI NON, INSISTEZ : Aucun bébé qui a crié ou fait un mouvement, qui a émis un son ou essayé de respirer ou qui a montré d'autres signes de vie même pendant un très court moment ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 208
207	a) Combien de garçons sont décédés ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'. b) Combien de filles sont décédées ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'.	a) GARÇONS DÉCÉDÉS . . . . . ☐☐ b) FILLES DÉCÉDÉES . . . . . ☐☐	
208	FAITES LA SOMME DES RÉPONSES À 203, 205, ET 207, ET INSCRIVEZ LE TOTAL. SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'.	TOTAL DES ENFANTS . . . . . ☐☐	
209	VÉRIFIEZ 208 : A EU PLUS D'UN ENFANT ↓ A EU SEULEMENT UN ENFANT → 211 N'A EU AUCUN ENFANT → 301		
210	Est-ce que tous les enfants dont vous êtes le père ont tous la même mère biologique ?	OUI . . . . . 1 NON 2	

SECTION 2. REPRODUCTION

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
211	VÉRIFIEZ 208 : A EU PLUS D'UN ENFANT ☐ → a) Quel âge aviez-vous quand votre premier enfant est né ? A EU SEULEMENT UN ENFANT ☐ → b) Quel âge aviez-vous quand votre enfant est né ?	ÂGE EN ANNÉES . . . . . ☐☐	
212	VÉRIFIEZ 203 ET 205 : AU MOINS UN ENFANT VIVANT ☐ AUCUN ENFANT VIVANT ☐ →		301
213	VÉRIFIEZ 203 ET 205 : PLUS D'UN ENFANT VIVANT ☐ → a) Quel âge a votre plus jeune enfant ? SEULEMENT UN ENFANT VIVANT ☐ → b) Quel âge a votre enfant ?	ÂGE EN ANNÉES . . . . . ☐☐	
214	VÉRIFIEZ 213 : (LE PLUS JEUNE) ENFANT A 0-2 ANS ☐ (LE PLUS JEUNE) ENFANT A 3 ANS OU PLUS ☐ →		301
215	VÉRIFIEZ 203 ET 205 : PLUS D'UN ENFANT VIVANT ☐ → a) Quel est le nom de votre plus jeune enfant ? SEULEMENT UN ENFANT VIVANT ☐ → b) Quel est le nom de votre enfant ?	_____ (NOM DE L'ENFANT (LE PLUS JEUNE))	
216	Quand la mère de (NOM EN 215) était enceinte de (NOM EN 215), a-t-elle eu des examens prénatals ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 218
217	Est-ce que vous étiez présent pendant l'un de ces examens prénatals ?	PRÉSENT . . . . . 1 PAS PRÉSENT 2	
218	Est-ce que (NOM EN 215) est né dans un hôpital ou un établissement de santé ?	HÔPITAL/ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ . . . . 1 AUTRE 2	→ 301
219	Êtes-vous allé avec la mère de (NOM EN 215) à l'hopital ou l'établissement de santé où elle a donné naissance à (NOM EN 215) ?	OUI . . . . . 1 NON 2	

SECTION 3. CONTRACEPTION

301	Je voudrais maintenant que nous parlions de planification familiale, c'est-à-dire les différents moyens ou méthodes qu'un couple peut utiliser pour retarder ou éviter une grossesse.	
01	Avez-vous déjà entendu parler de stérilisation féminine ? INSISTEZ : Les femmes peuvent avoir une opération pour ne plus avoir d'enfants.	OUI . . . . . 1 NON 2
02	Avez-vous déjà entendu parler de stérilisation masculine ? INSISTEZ : Les hommes peuvent avoir une opération pour ne plus avoir d'enfants.	OUI . . . . . 1 NON 2
03	Avez-vous déjà entendu parler de DIU ? INSISTEZ : Les femmes peuvent avoir un stérilet qu'un médecin ou une infirmière leur place dans l'utérus pour leur éviter une grossesse pendant une année ou plus.	OUI . . . . . 1 NON 2
04	Avez-vous déjà entendu parler d'injectables ? INSISTEZ : Les femmes peuvent avoir une injection faite par du personnel de santé pour leur éviter une grossesse pendant un mois ou plus.	OUI . . . . . 1 NON 2
05	Avez-vous déjà entendu parler d'implants ? INSISTEZ : Les femmes peuvent se faire insérer par un médecin ou une infirmière un bâtonnet ou plus sous la peau du haut du bras pour leur éviter une grossesse, pendant une année ou plus.	OUI . . . . . 1 NON 2
06	Avez-vous déjà entendu parler de pilule ? INSISTEZ : Les femmes peuvent prendre une pilule chaque jour pour éviter une grossesse.	OUI . . . . . 1 NON 2
07	Avez-vous déjà entendu parler de condom ? INSISTEZ : Les hommes peuvent mettre une capote en caoutchouc sur leur pénis avant les rapports sexuels.	OUI . . . . . 1 NON 2
08	Avez-vous déjà entendu parler de condom féminin ? INSISTEZ : Les femmes peuvent placer un fourreau dans leur vagin avant les rapports sexuels.	OUI . . . . . 1 NON 2
09	Avez-vous déjà entendu parler de contraception d'urgence ? INSISTEZ : Comme mesure d'urgence, les femmes peuvent prendre pendant 3 jours après des rapports sexuels non protégés des pilules spéciales qui les empêchent de tomber enceintes.	OUI . . . . . 1 NON 2
10	Avez-vous déjà entendu parler de méthode des jours fixes ? INSISTEZ : Les femmes utilisent un collier de perles de couleur différente pour connaître les jours où elles peuvent tomber enceintes. Durant ces jours où elles peuvent tomber enceintes, elles utilisent un condom ou elles s'abstiennent de rapports sexuels.	OUI . . . . . 1 NON 2
11	Avez-vous déjà entendu parler de méthode de l'aménorrhée et de l'allaitement maternel (MAMA) ? INSISTEZ : Pendant 6 mois après la naissance d'un enfant, avant que les règles ne soient revenues, les femmes utilisent une méthode qui nécessite d'allaiter fréquemment le jour et la nuit.	OUI . . . . . 1 NON 2
12	Avez-vous déjà entendu parler de méthode du rythme ? INSISTEZ : Pour éviter une grossesse, les femmes n'ont pas de rapports sexuels les jours où elles pensent qu'elles peuvent tomber enceintes.	OUI . . . . . 1 NON 2
13	Avez-vous déjà entendu parler de retrait ? INSISTEZ : Les hommes peuvent faire attention et se retirer avant l'éjaculation.	OUI . . . . . 1 NON 2
14	Avez-vous entendu parler d'autres moyens ou méthodes qu'une femme ou un homme peut utiliser pour éviter une grossesse ?	OUI, MÉTHODE MODERNE _____ A (PRÉCISEZ) OUI, MÉTHODE TRADITIONNELLE _____ B (PRÉCISEZ) NON . . . . . Y

SECTION 3. CONTRACEPTION

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
302	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous :	OUI NON	
	a) Entendu parler de la planification familiale à la radio ?	a) RADIO 1 2	
	b) Vu quelque chose sur la planification familiale à la télévision ?	b) TÉLÉVISION 1 2	
	c) Lu quelque chose sur la planification familiale dans un journal ou magazine ?	c) JOURNAL OU MAGAZINE 1 2	
	d) Reçu un message vocal ou un texte sur la planification familiale sur votre téléphone portable ?	d) TÉLÉPHONE PORTABLE 1 2	
	e) Avez-vous vu quelque chose sur la planification familiale sur les média sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram ou WhatsApp?	e) FACEBOOK/TWITTER/ INSTAGRAM/WHATSAPP . . 1 2	
	f) Avez-vous vu quelque chose sur la planification familiale sur un poster, une affiche, une brochure, ou un dépliant ?	f) POSTER/AFFICHE/BROCHURE/ DÉPLIANT 1 2	
	g) Avez-vous vu quelque chose sur la planification familiale sur une affiche ou un panneau d'affichage à l'extérieur?	g) AFFICHE/PANNEAU D'AFFICHAGE 1 2	
	h) Avez-vous entendu quelque chose sur la planification familiale de la part des crieurs publics, griots ou leaders religieux?	h) CRIEURS, GRIOTS OU RELIGIEUX 1 2	
303	Au cours des derniers mois, avez-vous parlé de planification familiale avec un agent de santé ou un professionnel de santé ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
304	Je voudrais maintenant vous parler des risques de tomber enceintes. Entre la période des règles et les règles suivantes, est-ce qu'il y a une période où les femmes ont plus de chances de tomber enceintes lorsqu'elles ont des relations sexuelles ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 306
305	Est-ce que cette période se situe juste avant que les règles ne commencent, pendant la période des règles, juste après que les règles soient terminées ou bien au milieu de deux périodes de règles ?	JUSTE AVANT QUE LES RÈGLES NE COMMENCENT . . . . . 1 PENDANT LES RÈGLES . . . . . 2 JUSTE APRÈS LA FIN DES RÈGLES . . . . . 3 AU MILIEU, ENTRE DEUX PÉRIODES . . . . . 4 AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 8	
306	Après la naissance d'un enfant, est-ce qu'une femme peut tomber enceinte avant que ses règles soient revenues ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
307	Je vais vous lire maintenant certaines déclarations sur la contraception. Dites-moi, s'il vous plait, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec chacune de ces déclarations ?	D'ACCORD / PAS D'ACCORD / NSP	
	a) La contraception est un problème de femme et un homme ne doit pas s'en préoccuper.	a) CONTRACEPTION EST UN PROBLÈME DE FEMME 1 2 8	
	b) Une femme qui utilise la contraception peut devenir une femme légère.	b) FEMME PEUT DEVENIR LÉGÈRE 1 2 8	

SECTION 4. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
401	Êtes-vous actuellement marié ou vivez-vous avec une femme comme si vous êtiez marié ?	OUI, ACTUELLEMENT MARIÉ . . . . . 1 OUI, VIT AVEC UNE FEMME . . . . . 2 NON, PAS EN UNION 3	→ 404
402	Avez-vous déjà été marié ou avez-vous vécu avec une femme comme si vous étiez marié ?	OUI, A DÉJÀ ÉTÉ MARIÉ . . . . . 1 OUI, A VÉCU AVEC UNE FEMME . . . . . 2 NON 3	→ 413
403	Quel est votre état matrimonial actuel : êtes-vous veuf, divorcé ou séparé ?	VEUF . . . . . 1 DIVORCÉ . . . . . 2 SÉPARÉ 3	→ 410
404	Est-ce que votre (épouse/partenaire) vit actuellement avec vous ou vit-elle ailleurs ?	VIT AVEC LUI . . . . . 1 VIT AILLEURS 2	
405	Avez-vous d'autres épouses ou vivez-vous avec d'autres femmes comme si vous êtiez marié ?	OUI (PLUS D'UNE ÉPOUSE) . . . . . 1 NON (SEULEMENT UNE ÉPOUSE) 2	→ 407
406	En tout, combien d'épouses ou de partenaires avec qui vous vivez comme si vous étiez marié avez-vous ?	NOMBRE TOTAL D'ÉPOUSES ET DE FEMMES AVEC QUI IL VIT COMME MARIÉ [ ][ ]	
407	VÉRIFIEZ 405 : UNE ÉPOUSE/ PARTENAIRE ☐ → a) Dites-moi, s'il vous plait, le nom de (épouse/partenaire). PLUS D'UNE ÉPOUSE/ PARTENAIRE ☐ → b) Dites-moi, s'il vous plait, le nom de votre (première/suivante) épouse ou femme avec qui vous vivez comme si vous étiez marié. INSCRIVEZ LE NOM ET LE NUMÉRO DE LIGNE DU TABLEAU MÉNAGE POUR LA (PREMIÈRE/SUIVANTE) ÉPOUSE OU CONJOINTE AVEC QUI IL VIT COMME MARIÉ. SI UNE FEMME N'EST PAS LISTÉE DANS LE MÉNAGE, INSCRIVEZ '00'.	NOM / NUMÉRO DE LIGNE / 408 Quel âge avait (NOM EN 407) à son dernier anniversaire ? / ÂGE _____ [ ][ ] [ ][ ] _____ [ ][ ] [ ][ ] _____ [ ][ ] [ ][ ] _____ [ ][ ] [ ][ ]	
408	Quel âge avait (NOM EN 407) à son dernier anniversaire ? RETOURNER AU 407 POUR LA FEMME OU PARTENAIRE RÉSIDENTIEL SUIVANTE		
409	VÉRIFIEZ 407 : UNE ÉPOUSE/ PARTENAIRE ☐ ↓ PLUS D'UNE ÉPOUSE/ PARTENAIRE ☐ →		→ 411
410	Avez-vous été marié ou avez-vous vécu avec une femme une seule fois ou plus d'une fois ?	PLUS D'UNE FOIS . . . . . 1 UNE SEULE FOIS 2	

SECTION 4. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
411	VÉRIFIEZ 405 ET 410 : LES DEUX SONT CODE '2' ↓ : a) En quel mois et quelle année avez-vous commencé à vivre avec votre (épouse/partenaire) ? AUTRE ↓ : b) Je voudrais maintenant vous parler de votre première (épouse/partenaire). En quel mois et quelle année avez-vous commencé à vivre avec elle ?	MOIS . . . . . ☐☐ NE CONNAIT PAS LE MOIS . . . . . 98 ANNÉE . . . . . ☐☐☐☐ NE CONNAIT PAS L'ANNÉE 9998	→ 413
412	Quel âge aviez-vous quand vous avez commencé à vivre avec elle pour la première fois ?	ÂGE . . . . . ☐☐	
413	**VÉRIFIEZ LA PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES. AVANT DE CONTINUER, FAITES TOUT VOTRE POSSIBLE POUR ÊTRE EN PRIVÉ.**		
414	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur votre activité sexuelle pour mieux comprendre certains aspects importants de la vie. Je voudrais vous assurer de nouveau que toutes vos réponseS sont absolument confidentielles et qu'elles ne seront divulguées à personne. S'il arrivait que je pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, dites-le moi et je passerai à la question suivante. Quel âge aviez-vous quand vous avez eu, pour la première fois, des rapports sexuels ?	N'A JAMAIS EU DE RAPPORTS SEXUELS . . 00 ÂGE EN ANNÉES . . . . . ☐☐	→ 501
415	Je voudrais vous poser des questions sur votre activité sexuelle récente. Quand avez-vous eu des rapports sexuels pour la dernière fois ? SI MOINS DE 12 MOIS, LA RÉPONSE DOIT ÊTRE ENREGISTRÉE EN JOURS, SEMAINES OU MOIS. SI 12 MOIS (UNE ANNÉE) OU PLUS, LA RÉPONSE DOIT ÊTRE ENREGISTRÉE EN ANNÉES.	IL Y A DES JOURS . . . . . 1 ☐☐ IL Y A DES SEMAINES . . . . 2 ☐☐ IL Y A DES MOIS . . . . . 3 ☐☐ IL Y A DES ANNÉES . . . . . 4 ☐☐	→ 429
416	La dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels, est-ce que vous ou votre partenaire avez fait quelque chose ou utilisé une méthode pour retarder ou éviter une grossesse ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 418
417	Connaissez-vous un endroit où vous pouvez vous procurer une méthode de planification familiale ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 419
418	Quelle méthode avez-vous, ou votre partenaire, utilisé ? ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ. SI LES CODES 'G' OU 'H' SONT ENCERCLÉS, PASSEZ À 420, MÊME SI UNE AUTRE MÉTHODE A ÉTÉ AUSSI UTILISÉE.	STÉRILISATION FÉMININE . . . . . A STÉRILISATION MASCULINE . . . . . B DIU . . . . . C INJECTABLES . . . . . D IMPLANTS . . . . . E PILULE . . . . . F CONDOM . . . . . G CONDOM FÉMININ . . . . . H CONTRACEPTION D'URGENCE . . . . . I MÉTHODE DES JOURS FIXES . . . . . J MAMA . . . . . K MÉTHODE DU RYTHME . . . . . L RETRAIT . . . . . M AUTRE MÉTHODE MODERNE . . . . . X AUTRE MÉTHODE TRADITIONNELLE . . . . . Y	→ 420

SECTION 4. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
419	La dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels, est-ce qu'un condom masculin ou féminin a été utilisé ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 422
420	Quelle était la marque du condom utilisé ? SI LA MARQUE N'EST PAS CONNUE, DEMANDEZ À VOIR L'EMBALLAGE.	PRUDENCE . . . . . 01 PROTECTOR . . . . . 02 DUREX . . . . . 03 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 98	
421	Où vous étiez-vous procuré le condom la dernière fois ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ PAS DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ OU SI C'EST UNE ONG, ENREGISTREZ '96' ET ÉCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.	**SECTEUR MÉDICAL PUBLIC** HÔPITAL NATIONAL . . . . . 11 HÔPITAL RÉGIONAL . . . . . 12 CENTRE DE SANTÉ DE RÉFÉRENCE . . 13 CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE . . 14 DISPENSAIRE/MATERNITÉ . . . . . 15 INFIRMERIE DE GARNISON MILITAIRE . . 16 CENTRE MEDICAUX INTER-ENTREPRISES (CMIE/INPS) . . . . . 17 AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ 18 (PRÉCISEZ) **SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ** HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ . . . . . 21 CENTRE CONFESSIONNEL . . . . . 22 CABINET MÉDICAL . . . . . 23 CABINET DE SOIN PRIVÉ . . . . . 24 PHARMACIE . . . . . 25 AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC)/RELAIS . . 26 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ 27 (PRÉCISEZ) **SECTEUR MÉDICAL ONG** HÔPITAL ONG . . . . . 31 CLINIQUE ONG . . . . . 32 AUTRE SECTEUR MÉDICAL ONG _____ 36 (PRÉCISEZ) **AUTRE SOURCE** BOUTIQUE . . . . . 41 BAR/BOÎTE DE NUIT . . . . . 42 KIOSQUE/TABLIER . . . . . 43 VENDEUR AMBULANT . . . . . 44 AMIS/PARENTS . . . . . 45 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	

SECTION 4. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
422	Quelle était votre relation avec cette personne avec qui vous avez eu des rapports sexuels ? SI PETITE AMIE : Viviez-vous ensemble comme si vous étiez marié ? SI OUI, ENCERCLEZ '2'. SI NON, ENCERCLEZ '3'.	ÉPOUSE . . . . . 1 PARTENAIRE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉ . . 2 PETITE AMIE NE VIVANT PAS AVEC L'ENQUÊTÉ . . . . . 3 RENCONTRE OCCASIONNELLE . . . . . 4 TRAVAILLEUSE DU SEXE . . . . . 5 AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ)	
423	À part cette personne, avez-vous eu des rapports sexuels avec une autre personne au cours des 12 derniers mois ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 429
424	La dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels avec cette deuxième personne, est-ce qu'un condom masculin ou féminin a été utilisé ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
425	Quelle était votre relation avec cette seconde personne avec qui vous avez eu des rapports sexuels ? SI PETITE AMIE: Viviez-vous ensemble comme si vous êtiez marié ? SI OUI, ENREGISTREZ '2'. SI NON, ENREGISTREZ '3'.	ÉPOUSE . . . . . 1 PARTENAIRE AVEC QUI IL VIT . . . . . 2 PETITE AMIE NE VIVANT PAS AVEC L'ENQUÊTÉ . . . . . 3 RENCONTRE OCCASIONNELLE . . . . . 4 TRAVAILLEUSE DU SEXE . . . . . 5 AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ)	
426	À part ces deux personnes, avez-vous eu des rapports sexuels avec d'autres personnes au cours des 12 derniers mois ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 429
427	La dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels avec cette troisième personne, est-ce qu'un condom masculin ou féminin a été utilisé ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
428	Quelle était votre relation avec cette troisième personne avec qui vous avez eu des rapports sexuels ? SI PETITE AMIE : Viviez-vous ensemble comme si vous étiez marié ? SI OUI, ENCERCLEZ '2'. SI NON, ENCERCLEZ '3'.	ÉPOUSE . . . . . 1 PARTENAIRE AVEC QUI IL VIT . . . . . 2 PETITE AMIE NE VIVANT PAS AVEC L'ENQUÊTÉ . . . . . 3 RENCONTRE OCCASIONNELLE . . . . . 4 TRAVAILLEUSE DU SEXE . . . . . 5 AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ)	
429	En tout, durant votre vie, avec combien de personnes différentes avez-vous eu des rapports sexuels ? DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION. SI LE NOMBRE DE FOIS EST 95 OU PLUS, INSCRIVEZ '95'.	NOMBRE DE PARTENAIRES SUR LA DURÉE DE VIE . . . . . [ ][ ] NE SAIT PAS 98	

SECTION 5. PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
501	VÉRIFIEZ 401 : ACTUELLEMENT MARIÉ OU VIVANT AVEC UNE PARTENAIRE ↓ NON MARIÉ ACTUELLEMENT ET NE VIVANT PAS AVEC UNE PARTENAIRE →		514
502	VÉRIFIEZ 418 : HOMME NON STÉRILISÉ OU QUESTION NON POSÉE ↓ HOMME STÉRILISÉ →		514
503	VÉRIFIEZ 407 : UNE ÉPOUSE/ PARTENAIRE ↓ PLUS D'UNE ÉPOUSE/ PARTENAIRE →		509
504	Est-ce que votre (épouse/partenaire) est actuellement enceinte ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	507
505	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Après l'enfant que vous et votre (épouse/partenaire) attendez maintenant, souhaiteriez-vous un autre enfant ou préféreriez-vous ne plus avoir d'enfants ?	AVOIR UN AUTRE ENFANT . . . . . 1 PAS D'AUTRE ENFANT . . . . . 2 INDÉCIS/NE SAIT PAS 8	514
506	Après la naissance de l'enfant que vous attendez, combien de temps voudriez-vous attendre avant la naissance d'un autre enfant ?	MOIS . . . . . 1 ☐☐ ANNÉES . . . . . 2 ☐☐ BIENTÔT/MAINTENANT . . . . . 993 AUTRE _____ (PRÉCISEZ) 996 NE SAIT PAS 998	514
507	VÉRIFIEZ 208 : A EU DES ENFANTS ↓ a) Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Voudriez-vous avoir un autre enfant ou préféreriez-vous ne plus avoir d'enfant ? N'A PAS D'ENFANT ↓ b) Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Voudriez-vous avoir un enfant ou préféreriez-vous ne pas avoir d'enfant ?	VEUT (UN/UN AUTRE) ENFANT . . . . . 1 PLUS D'ENFANT/AUCUN . . . . . 2 DIT QUE LE COUPLE NE PEUT PAS AVOIR D'ENFANT . . . . . 3 ÉPOUSE/PARTENAIRE STÉRILISÉE . . . . . 4 ENQUÊTÉ STÉRILISÉ . . . . . 5 INDÉCIS/NE SAIT PAS 8	514
508	VÉRIFIEZ 208 : A DES ENFANTS ↓ a) Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissance d'un autre enfant ? N'A PAS D'ENFANT ↓ b) Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissance d'un enfant ?	MOIS . . . . . 1 ☐☐ ANNÉES . . . . . 2 ☐☐ BIENTÔT/MAINTENANT . . . . . 993 DIT QUE LE COUPLE NE PEUT PAS AVOIR D'ENFANT . . . . . 994 AUTRE _____ (PRÉCISEZ) 996 NE SAIT PAS 998	514
509	Est-ce que l'une de vos (épouses/partenaires) est actuellement enceinte ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	512

SECTION 5. PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
510	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Après la naissance de l'enfant que vous et votre (épouse/partenaire) attendez, voudriez-vous avoir un autre enfant ou préféreriez-vous ne plus avoir d'enfant ?	AVOIR UN AUTRE ENFANT . . . . . 1 NE PLUS EN AVOIR . . . . . 2 INDÉCIS/NE SAIT PAS 8	→ 514
511	Après la naissance de l'enfant que vous attendez, combien de temps voudriez-vous attendre avant la naissance d'un autre enfant ?	MOIS . . . . . 1 ☐☐ ANNÉES . . . . . 2 ☐☐ BIENTÔT/MAINTENANT . . . . . 993 AUTRE _____ 996 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 998	→ 514
512	VÉRIFIEZ 208: A DES ENFANTS ☐ → a) Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Voudriez-vous avoir un autre enfant ou préféreriez-vous ne plus avoir d'enfant ? N'A PAS D'ENFANT ☐ → b) Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Voudriez-vous avoir un enfant ou préféreriez-vous ne pas avoir d'enfant ?	AVOIR (UN/UN AUTRE) ENFANT . . . . . 1 PLUS D'ENFANT/AUCUN . . . . . 2 DIT QUE LE COUPLE NE PEUT PAS AVOIR D'ENFANT . . . . . 3 ÉPOUSE (ÉPOUSES/PARTENAIRES) STÉRILISÉES . . . . . 4 ENQUÊTÉ STÉRILISÉ . . . . . 5 INDÉCIS/NE SAIT PAS 8	→ 514
513	VÉRIFIEZ 208 : A DES ENFANTS ☐ → a) Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissance d'un autre enfant ? N'A PAS D'ENFANT ☐ → b) Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissance d'un enfant ?	MOIS . . . . . 1 ☐☐ ANNÉES . . . . . 2 ☐☐ BIENTÔT/MAINTENANT . . . . . 993 DIT QUE LE COUPLE NE PEUT PAS AVOIR D'ENFANT . . . . . 994 AUTRE _____ 996 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS 998	
514	VÉRIFIEZ 203 ET 205 : A DES ENFANTS VIVANTS ☐ → a) Si vous pouviez revenir à l'époque où vous n'aviez pas d'enfant et que vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien auriez-vous voulu en avoir ? AUCUN ENFANT VIVANT ☐ → b) Si vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien en voudriez-vous ? INSISTEZ POUR OBTENIR UNE RÉPONSE NUMÉRIQUE.	AUCUN . . . . . 00 → 601 NOMBRE . . . . . ☐☐ AUTRE _____ 96 → 601 (PRÉCISEZ)	
515	Parmi ces enfants, combien souhaiteriez-vous de garçons, combien souhaiteriez-vous de filles et pour combien d'entre eux, le sexe n'aurait-il pas d'importance ?	GARÇONS FILLES PEU IMPORTE NOMBRE . . ☐☐ ☐☐ ☐☐ AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	

SECTION 6. EMPLOI ET RÔLE DES SEXES

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
601	Avez-vous fait un travail quelconque au cours des 7 derniers jours ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 604
602	Bien que vous n'ayez pas travaillé au cours des 7 derniers jours, est-ce que vous avez un travail ou une affaire dont vous avez dû vous absenter pour congé, maladie, vacances ou pour une autre raison ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 604
603	Avez-vous fait un travail quelconque au cours des 12 derniers mois ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 607
604	Quelle est votre occupation ? C'est-à-dire quel genre de travail faites-vous principalement ?	_____ _____ _____ ☐☐	
605	Travaillez-vous habituellement toute l'année, ou de manière saisonnière ou travaillez-vous seulement de temps en temps ?	TOUTE L'ANNÉE . . . . . 1 SAISONNIER/PARTIE DE L'ANNÉE . . . . . 2 DE TEMPS EN TEMPS 3	
606	Êtes-vous payé en argent ou en nature pour ce travail ou n'êtes-vous pas payé du tout ?	ARGENT SEULEMENT . . . . . 1 ARGENT ET NATURE . . . . . 2 NATURE SEULEMENT . . . . . 3 PAS PAYÉ 4	
607	VÉRIFIEZ 401 : ACTUELLEMENT MARIÉ OU VIVANT AVEC UNE PARTENAIRE ☐ ↓ NON MARIÉ ACTUELLEMENT ET NE VIVANT PAS AVEC UNE PARTENAIRE ☐ →		→ 612
608	VÉRIFIEZ 606 : CODE '1' OU '2' ENCERCLÉ ☐ ↓ AUTRE ☐ →		→ 610
609	Habituellement, qui décide comment l'argent que vous gagnez va être utilisé : c'est vous, votre (épouse/partenaire), ou conjointement vous et votre (épouse/partenaire) ?	ENQUÊTÉ . . . . . 1 ÉPOUSE/PARTENAIRE . . . . . 2 ENQUÊTÉ ET ÉPOUSE/ PARTENAIRE ENSEMBLE . . . . . 3 AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ)	
610	Habituellement, qui prend les décisions en ce qui concerne vos propres soins de santé : vous, votre (épouse/partenaire), vous et votre (épouse/partenaire) conjointement ou quelqu'un d'autre ?	ENQUÊTÉ . . . . . 1 ÉPOUSE/PARTENAIRE . . . . . 2 ENQUÊTÉ ET ÉPOUSE/ PARTENAIRE CONJOINTEMENT . . . . . 3 QUELQU'UN D'AUTRE . . . . . 4 AUTRE 6	
611	Qui prend habituellement les décisions concernant les achats importants pour le ménage ?	ENQUÊTÉ . . . . . 1 ÉPOUSE/PARTENAIRE . . . . . 2 ENQUÊTÉ ET ÉPOUSE/ PARTENAIRE CONJOINTEMENT . . . . . 3 QUELQU'UN D'AUTRE . . . . . 4 AUTRE 6	

SECTION 6. EMPLOI ET RÔLE DES SEXES

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
612	Est-ce que vous possédez cette maison ou une autre maison seul ou conjointement avec quelqu'un d'autre ?	SEUL SEULEMENT . . . . . 01 CONJOINTEMENT AVEC ÉPOUSE/PARTENAIRE SEULEMENT . . . . . 02 CONJOINTEMENT AVEC QUELQU'UN D'AUTRE SEULEMENT . . . . . 03 CONJOINTEMENT AVEC ÉPOUSE/ PARTENAIRE ET QUELQU'UN D'AUTRE . . 04 SEUL ET CONJOINTEMENT . . . . . 05 N'EN POSSÈDE PAS 06	→ 615
613	Avez-vous un titre de propriété ou un autre document reconnu par le gouvernement pour une maison que vous possédez ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 615
614	Est-ce que votre nom figure sur ce document ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
615	Est-ce que vous possédez de la terre agricole ou non agricole, seul ou conjointement avec quelqu'un d'autre ?	SEUL SEULEMENT . . . . . 01 CONJOINTEMENT AVEC ÉPOUSE/PARTENAIRE SEULEMENT . . . . . 02 CONJOINTEMENT AVEC QUELQU'UN D'AUTRE SEULEMENT . . . . . 03 CONJOINTEMENT AVEC ÉPOUSE/ PARTENAIRE ET QUELQU'UN D'AUTRE . . 04 SEUL ET CONJOINTEMENT . . . . . 05 N'EN POSSÈDE PAS 06	→ 617A
616	Avez-vous un titre de propriété ou un autre document reconnu par le gouvernement pour des terres que vous possédez ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 617A
617	Est-ce que votre nom figure sur ce document ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
617A	Avez-vous un compte dans une banque ou dans une autre institution financière que vous pouvez utiliser vous-même ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 617C
617B	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vous-même déposé de l'argent sur ce compte ou en avez-vous retiré ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
617C	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé un téléphone portable pour effectuer des transactions financières comme envoyer ou recevoir de l'argent, payer des factures, acheter des biens ou des services ou recevoir un salaire ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
618	Selon vous, est-il justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes : a) Si elle sort sans le lui dire ? b) Si elle néglige les enfants ? c) Si elle argumente avec lui ? d) Si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui ? e) Si elle brûle la nourriture ?	OUI NON NSP a) SORT SANS LE LUI DIRE 1 2 8 b) NÉGLIGE LES ENFANTS 1 2 8 c) ARGUMENTE 1 2 8 d) REFUSE RAP. SEXUELS 1 2 8 e) BRÛLE NOURRITURE 1 2 8	
619	À votre connaissance, est-ce qu'il est arrivé que votre père batte votre mère ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	

SECTION 7. VIH/SIDA

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
700	Je voudrais maintenant parler avec vous du VIH et du sida.		
701	Avez-vous déjà entendu parler du VIH ou du sida ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 729
702	VÉRIFIEZ 111 : ÂGE 15-24 ANS ☐ ↓ 25 ANS OU PLUS ☐ →		708
703	Le VIH est le virus qui cause le sida. Est-ce qu'on peut réduire le risque de contracter le VIH en ayant juste un seul partenaire sexuel qui n'est pas infecté et qui n'a aucun autre partenaire sexuel ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
704	Est-ce qu'on peut contracter le virus du sida par les piqûres de moustiques ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
705	Est-ce qu'on peut réduire le risque de contracter le virus du sida en utilisant des condoms au cours de chaque rapport sexuel ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
706	Est-ce qu'on peut contracter le virus du sida en partageant la nourriture avec une personne qui a le sida ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
707	Est-il possible qu'une personne paraissant en bonne santé ait, en fait, le virus du sida ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
708	Avez-vous entendu parler des TAR, c' est-à-dire des médicaments antirétroviraux qui traitent le VIH ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
709	Est-ce qu'il y a des médicaments spéciaux qu'un médecin ou une infirmière peut donner à une femme ayant contracté le VIH pour réduire le risque de transmission au bébé ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
710	Avez-vous entendu parler de la PrEP, c'est-à-dire un médicament que l'on prend tous les jours pour éviter qu'une personne ne contracte le VIH ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 712
711	Est-ce que vous approuvez les gens qui prennent un comprimé tous les jours pour éviter de contracter le VIH ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS/PAS SÛRE/CA DÉPEND 8	
712	**VÉRIFIEZ LA PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES. AVANT DE CONTINUER, FAITES TOUT VOTRE POSSIBLE POUR VOUS TROUVER EN PRIVÉ.**		
713	Avez-vous déjà fait un test du VIH ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 721
714	De quel mois et de quelle année date votre test du VIH le plus récent ?	MOIS . . . . . ☐☐ NE CONNAÎT PAS LE MOIS . . . . . 98 ANNÉE . . . . . ☐☐☐☐ NE CONNAÎT PAS L'ANNÉE 9998	

SECTION 7. VIH/SIDA

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
715	Où le test a-t-il été fait ? INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT. SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC, PRIVÉ, OU UNE ONG, ENREGISTREZ '96' ET ÉCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.	**SECTEUR MÉDICAL PUBLIC** HÔPITAL NATIONAL . . . . . 11 HÔPITAL RÉGIONAL . . . . . 12 CENTRE DE SANTÉ DE RÉFÉRENCE . . 13 CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE . . 14 DISPENSAIRE/MATERNITÉ . . . . . 15 INFIRMERIE DE GARNISON MILITAIRE . . 16 CENTRE MEDICAUX INTER-ENTREPRISES (CMIE/INPS) . . . . . 17 CENTRE DE CONSEILS ET DE DEPISTAGE VOLONTAIRE . . . . . 18 AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ 19 (PRÉCISEZ) **SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ** HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ . . . . . 21 CENTRE CONFESSIONNEL . . . . . 22 CABINET MÉDICAL . . . . . 23 CABINET DE SOIN PRIVÉ . . . . . 24 PHARMACIE . . . . . 25 AGENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE (ASC)/RELAIS . . 26 CENTRE DE CONSEILS ET DE DEPISTAGE VOLONTAIRE . . . . . 27 AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ 28 (PRÉCISEZ) **SECTEUR MÉDICAL ONG** HÔPITAL ONG . . . . . 31 CLINIQUE ONG . . . . . 32 CENTRE DE CONSEILS ET DE DEPISTAGE VOLONTAIRE . . . . . 33 ORGANISATION A BASE COMMUNAUTAIRE AUTRE SECTEUR MÉDICAL ONG _____ 36 (PRÉCISEZ) **AUTRE SOURCE** MAISON . . . . . 41 LIEU DE TRAVAIL . . . . . 42 CENTRE DE DÉTENTION . . . . . 43 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
716	Avez-vous eu les résultats du test ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 720
717	Quel était le résultat du test ?	POSITIF . . . . . 1 NEGATIF . . . . . 2 INDÉTERMINÉ . . . . . 3 N'A PAS VOULU RÉPONDRE 4	→ 720

SECTION 7. VIH/SIDA

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
718	En quel mois et en quelle année avez-vous reçu votre premier résultat positif au test du VIH ?	MOIS . . . . . ☐☐ NE CONNAÎT PAS LE MOIS . . . . . 98 ANNÉE . . . . . ☐☐☐☐ NE CONNAÎT PAS L'ANNÉE . . . . . 9998 MÊME DATE QUE TEST VIH LE PLUS RÉCENT 95	
719	Est-ce que vous prenez actuellement des TAR qui sont des médicaments antirétroviraux ? Par actuellement, je veux dire que vous avez peut-être oublié certaines doses mais vous êtes toujours en train de prendre des TAR .	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
720	Combien de fois, dans votre vie, avez-vous fait un test du VIH ? DANS LE CAS D'UNE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION, SI LE NOMBRE DE TESTS EST 95 OU PLUS, ENREGISTREZ '95'.	NOMBRE DE TESTS DU VIH . . . . ☐☐	
721	Avez-vous entendu parler de kits de tests que les gens peuvent utiliser pour se tester eux-mêmes pour le VIH ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 723
722	Vous êtes-vous testé vous-même en utilisant un kit de test ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
723	Est-ce que vous achèteriez des légumes frais à un marchand ou à un vendeur si vous saviez que cette personne a le VIH ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS/PAS SÛR/CELA DÉPEND 8	
724	Pensez-vous que des enfants vivant avec le VIH devraient être autorisés à aller à l'école avec des enfants qui n'ont pas le VIH ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS/PAS SÛR/CELA DÉPEND 8	
725	VÉRIFIEZ 717 : CODE '1' ENCERCLÉ ☐ ↓ AUTRE ☐		→ 729
726	Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur votre vie en tant que personne vivant avec le VIH . Avez-vous révélé à quelqu'un d'autre que moi que vous avez le VIH ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
727	Êtes-vous d'accord ou non avec la déclaration suivante: J'ai eu honte parce que j'ai le VIH.	D'ACCORD . . . . . 1 PAS D'ACCORD 2	

SECTION 7. VIH/SIDA

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
728	Dites-moi, s'il vous plait, si au cours des 12 derniers mois, il vous est arrivé les choses suivantes ou si vous pensez qu'elles vous sont arrivées parce que vous avez le VIH :	OUI NON	
	a) Les gens ont mal parlé de moi parce que j'ai le VIH.	a) LES GENS ONT MAL PARLÉ . . 1 2	
	b) Quelqu'un a révélé que j'avais le VIH sans ma permission.	b) RÉVÉLÉ SANS PERMISSION . . 1 2	
	c) J'ai été insulté, harcelé ou menacé parce que j'ai le VIH.	c) INSULTÉ 1 2	
	d) Le personnel de santé a mal parlé de moi parce que j'ai le VIH.	d) PERSONNEL DE SANTÉ A MAL PARLÉ 1 2	
	e) Le personnel de santé a crié sur moi, m'a grondé, m'a traité de tous les noms ou m'a agressé verbalement parce que j'ai le VIH.	e) PERSONNEL DE SANTÉ A AGRESSÉ VERBALEMEN˙ . . 1 2	

SECTION 7. VIH/SIDA

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
729	VÉRIFIEZ 701 : A ENTENDU PARLER DU VIH OU DU SIDA ☐ → a) À part le sida, avez-vous entendu parler d'autres infections qui peuvent se transmettre par contact sexuel ? N'A PAS ENTENDU PARLER DU VIH OU DU SIDA ☐ → b) Avez-vous entendu parler d'infections qui peuvent se transmettre par contact sexuel ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
730	VÉRIFIEZ 414 : A DÉJÀ EU DES RAPPORTS SEXUELS ☐ N'A JAMAIS EU DE RAPPORTS SEXUELS ☐ →		735
731	VÉRIFIEZ 729 : A ENTENDU PARLER D'AUTRES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES ? OUI ☐ NON ☐ →		733
732	J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur votre santé au cours des 12 derniers mois. Durant les 12 derniers mois, avez-vous eu une maladie que vous avez contractée par contact sexuel ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
733	Il arrive parfois que les hommes aient un écoulement du pénis qui n'est pas normal. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un écoulement anormal du pénis ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
734	Il arrive parfois que les hommes aient une plaie ou un ulcère sur leur pénis ou à côté. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu une plaie ou un ulcère sur votre pénis ou à côté ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
735	Si une femme sait que son mari est atteint d'une maladie qu'elle peut contracter au cours de rapports sexuels, pensez-vous qu'il est justifié qu'elle lui demande qu'ils utilisent un condom quand ils ont des rapports sexuels ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
736	Est-ce que vous pensez qu'il est justifié qu'une femme refuse d'avoir des rapports sexuels avec son mari quand elle sait qu'il a des relations sexuelles avec une femme autre que ses épouses?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	

SECTION 8. AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
801	Certains hommes sont circoncis. Êtes-vous circoncis ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 806
802	Certains hommes ont été traditionnellement circoncis par un praticien traditionnel, un membre de la famille ou un ami. Avez-vous été traditionnellement circoncis ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 804
803	Quel âge aviez-vous quand vous avez été traditionnellement circoncis ?	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES . . . . [ ][ ] PENDANT L'ENFANCE (<5 ANS) . . . . . 95 NE SAIT PAS 98	
804	Certains hommes ont été médicalement circoncis, c'est-à-dire qu'un prestataire de santé leur a enlevé entièrement le prépuce du pénis. Avez-vous été médicalement circoncis ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 806
805	Quel âge aviez-vous quand vous avez été médicalement circoncis ?	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES . . . . [ ][ ] PENDANT L'ENFANCE (<5 ANS) . . . . . 95 NE SAIT PAS 98	
806	Fumez-vous actuellement du tabac tous les jours, certains jours ou pas du tout ?	TOUS LES JOURS . . . . . 1 CERTAINS JOURS . . . . . 2 PAS DU TOUT 3	→ 809 → 808
807	Dans le passé, est-ce que vous fumiez tous les jours ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 810
808	Dans le passé, est-ce que vous fumiez tous les jours, certains jours ou est-ce que vous ne fumiez pas ?	TOUS LES JOURS . . . . . 1 CERTAINS JOURS . . . . . 2 PAS DU TOUT 3	→ 811
809	En moyenne, parmi les produits suivants, combien en fumez-vous actuellement par jour ? Dites-mois aussi si vous consommez ces produits, mais pas chaque jour. SI L'ENQUÊTÉ DÉCLARE UTILISER UN PRODUIT, MAIS PAS TOUS LES JOURS, INSCRIVEZ '888'. SI LE PRODUIT N'EST PAS UTILISÉ DU TOUT, INSCRIVEZ '000'.	NOMBRE PAR JOUR a) CIGARETTES COMMERCIALES . . . . [ ][ ][ ] b) CIGARETTES ROULÉES . . [ ][ ][ ] c) KRETEKS . . . . . [ ][ ][ ] d) PIPES REMPLIES TABAC . . . . . [ ][ ][ ] e) CIGARES, CHEROOTS OU CIGARILLOS . . . . [ ][ ][ ] f) NOMBRE DE SÉANCES DE PIPE À EAU/NARGUILÉ [ ][ ][ ] g) AUTRE CHOSE . . . . . [ ][ ][ ]	→ 811
	a) Des cigarettes fabriquées commercialement ? b) Des cigarette roulées à la main ? c) Des Kreteks ? d) Des pipes remplies de tabac ? e) Des cigares, cheroots ou cigarillos ? f) Nombre de séances de pipe à eau/narguilé ? g) Autre chose ? _____ (PRÉCISEZ)		

SECTION 8. AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
810	En moyenne, parmi les produits suivants, combien en fumez-vous actuellement par semaine ? Dites-mois aussi si vous consommez ces produits, mais pas chaque semaine. SI L'ENQUÊTÉ DÉCLARE UTILISER UN PRODUIT, MAIS PAS CHAQUE SEMAINE, INSCRIVEZ '888'. SI LE PRODUIT N'EST PAS UTILISÉ DU TOUT, INSCRIVEZ '000'. a) Des cigarettes fabriquées commercialement ? b) Des cigarette roulées à la main ? c) Des Kreteks ? d) Des pipes remplies de tabac ? e) Des cigares, cheroots ou cigarillos ? f) Nombre de séances de pipe à eau/narguilé ? g) Autre chose ? _____ (PRÉCISEZ)	NOMBRE PAR SEMAINE a) CIGARETTES COMMERCIALES . . . . [ ][ ][ ] b) CIGARETTES ROULÉES . . [ ][ ][ ] c) KRETEKS . . . . . [ ][ ][ ] d) PIPES REMPLIES TABAC . . . . . [ ][ ][ ] e) CIGARES, CHEROOTS OU CIGARILLOS . . . . [ ][ ][ ] f) NOMBRE DE SÉANCES DE PIPE À EAU/NARGUILÉ [ ][ ][ ] g) AUTRE CHOSE . . . . . [ ][ ][ ]	
811	Consommez-vous actuellement du tabac non-fumé chaque jour, certains jours ou pas du tout ?	TOUS LES JOURS . . . . . 1 CERTAINS JOURS . . . . . 2 → 813 PAS DU TOUT . . . . . 3 → 814	
812	En moyenne, combien de fois par jour utilisez-vous les produits suivants ? Dites-moi aussi si vous utilisez le produit, mais pas chaque jour. SI L'ENQUÊTÉ DÉCLARE UTILISER UN PRODUIT, MAIS PAS TOUS LES JOURS, INSCRIVEZ '888'. SI LE PRODUIT N'EST PAS UTILISÉ DU TOUT, INSCRIVEZ '000'. a) Du tabac à chiquer, dans la bouche ? b) Du tabac à priser, à inhaler par le nez ? c) Du tabac à mâcher ? d) Du Betel à mâcher ? e) Autre chose ? _____ (PRÉCISEZ)	NOMBRE PAR JOUR a) TABAC À CHIQUER . . . . [ ][ ][ ] b) TABAC À PRISER . . . . . [ ][ ][ ] c) TABAC À MÂCHER . . . . [ ][ ][ ] d) BETEL À MÂCHER . . . . [ ][ ][ ] e) AUTRE CHOSE . . . . . [ ][ ][ ]	→ 814

SECTION 8. AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
813	En moyenne, combien de fois par semaine utilisez-vous les produits suivants ? Dites-mois aussi si vous utilisez ce produit, mais pas chaque semaine. SI L'ENQUÊTÉ DÉCLARE UTILISER UN PRODUIT , MAIS PAS TOUTES LES SEMAINES, INSCRIVEZ '888'. SI LE PRODUIT N'EST PAS UTILISÉ DU TOUT, INSCRIVEZ '000'. a) Du tabac à chiquer, dans la bouche ? b) Du tabac à priser, à inhaler par le nez ? c) Du tabac à mâcher ? d) Du Betel à mâcher ? e) Autre chose ? _____ (PRÉCISEZ)	NOMBRE PAR SEMAINE a) TABAC À CHIQUER . . . . [ ][ ][ ] b) TABAC À PRISER . . . . . [ ][ ][ ] c) TABAC À MÂCHER . . . . [ ][ ][ ] d) BETEL À MÂCHER . . . . [ ][ ][ ] e) AUTRE CHOSE . . . . . [ ][ ][ ]	
814	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur la consommation d'alcool. Est-ce que vous avez déjà bu de l'alcool, comme de la bière, du vin, des liqueurs, du dolo ou du baandjii?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 817
815	Au cours du dernier mois, quel est le nombre de jours pendant lesquels vous avez bu une boisson alcoolisée ? DANS LE CAS D'UNE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION. SI L'ENQUÊTÉ RÉPOND 'CHAQUE JOUR' OU 'PRESQUE CHAQUE JOUR,' ENTOUREZ CODE '95'.	N'A PAS BU D'ALCOOL . . . . . 00 NOMBRE DE JOURS . . . . . [ ][ ] CHAQUE JOUR/PRESQUE CHAQUE JOUR . . 95	→ 817
816	Nous considérons qu'une canette ou une bouteille de bière, un verre de vin, un verre de liqueur ou une calebassée de dolo ou de baandjii est un verre d'alcool. Au cours du dernier mois, les jours où vous avez bu de l'alcool, combien de verres buviez-vous habituellement par jour ? MONTREZ LES PHOTOS DE VERRES STANDARD DES BOISSONS ALCOOLISÉES.	MOINS D'UN VERRE STANDARD . . . . . 00 NOMBRE DE VERRES . . . . . [ ][ ]	

SECTION 8. AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
817	Êtes-vous couvert par une assurance médicale ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 819
818	Par quel type d'assurance médicale êtes-vous couvert ? ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE (AMO) A REGIME D'ASSISTANCE MEDICALE (RAMED) B ASSURANCE MALADIE VOLONTAIRE (AMV) C MUTUELLE DE SANTE COMMUNAUTAIRE (MSC) . . . . . D ASSURANCE MALADIE DES COMPAGNIES D'ASSURANCE PRIVÉE (STANE, NSIA, SONAVIE,..) . . . . . E AUTRE ASSURANCE PRIVÉE . . . . . F AUTRE _____ X (PRÉCISEZ)	
819	Je voudrais maintenant vous parler d'une pratique que l'on appelle l'excision. Avez-vous déjà entendu parler de l'excision ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 821
820	Dans certains pays, il existe une pratique qui consiste à couper une partie des organes génitaux externes des filles. Avez-vous déjà entendu parler de cette pratique ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 900
821	Pensez-vous que l'excision est exigée par votre religion ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 PAS DE RELIGION . . . . . 3 NE SAIT PAS 8	
822	Pensez-vous que la pratique de l'excision doit continuer ou qu'elle doit être abandonnée ?	CONTINUER . . . . . 1 ABANDONNER . . . . . 2 CELA DÉPEND . . . . . 3 NE SAIT PAS 8	

SECTION 9. ACTIVITÉ PHYSIQUE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
900	Je vais maintenant vous poser quelques questions sur le temps que vous consacrez à différents types d'activité physique lors d'une semaine typique. Veuillez répondre à ces questions même si vous ne vous considérez pas comme quelqu'un d'actif. Pensez tout d'abord au temps que vous y consacrez au travail, qu'il s'agisse d'un travail rémunéré ou non, de tâches ménagères, de cueillir ou récolter des aliments, de pêcher ou chasser, de chercher un emploi. Dans les questions suivantes, les activités physiques de forte intensité sont des activités nécessitant un effort physique important et causant une augmentation conséquente de la respiration ou du rythme cardiaque, et les activités physiques d'intensité modérée sont des activités qui demandent un effort physique modéré et causant une petite augmentation de la respiration ou du rythme cardiaque.		
901	Est-ce que votre travail implique des activités physiques de forte intensité qui nécessitent une augmentation conséquente de la respiration ou du rythme cardiaque, comme soulever des charges lourdes, travailler sur un chantier, effectuer du travail de maçonnerie pendant au moins 10 minutes d'affilée ? UTILISER LA BOÎTE À IMAGES POUR DONNER DES EXAMPLES D'ACTIVITÉS PHYSIQUES DE FORTE INTENSITÉ.	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 904
902	Habituellement, combien de jours par semaine effectuez-vous des activités physiques de forte intensité dans le cadre de votre travail ?	NOMBRE DE JOURS . . . . . ☐	
903	Lors d'une journée habituelle durant laquelle vous effectuez des activités physiques de forte intensité, combien de temps en minutes consacrez-vous à ces activités ?	MINUTES . . . . . ☐☐☐☐	
904	Est-ce que votre travail implique des activités physiques d'intensité modérée, comme une marche rapide ou soulever une charge légère durant au moins 10 minutes d'affilée ? UTILISER LA BOÎTE À IMAGES POUR DONNER DES EXAMPLES D'ACTIVITÉS PHYSIQUES D' INTENSITÉ MODÉRÉE.	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 907
905	Habituellement, combien de jours par semaine effectuez-vous des activités physiques d'intensité modérée dans le cadre de votre travail ?	NOMBRE DE JOURS . . . . . ☐	
906	Lors d'une journée habituelle durant laquelle vous effectuez des activités physiques d'intensité modérée, combien de temps en minutes consacrez-vous à ces activités ?	MINUTES . . . . . ☐☐☐☐	
907	Les questions suivantes excluent les activités physiques dans le cadre de votre travail, que vous avez déjà mentionnées. Maintenant, je voudrais connaître votre façon habituelle de vous déplacer d'un endroit à l'autre ; par exemple pour aller au travail, faire des courses, aller au marché, aller à votre lieu consacré au culte?		
908	Est-ce que vous effectuez des trajets d'au moins 10 minutes à pied, à vélo, ou par pirogue ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 911
909	Habituellement, combien de jours par semaine effectuez-vous des trajets d'au moins 10 minutes à pied, à vélo, ou par pirogue ?	NOMBRE DE JOURS . . . . . ☐	

SECTION 9. ACTIVITÉ PHYSIQUE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
910	Lors d'une journée habituelle, combien de temps en minutes consacrez-vous à vos déplacements à pied, à vélo, ou par pirogue ?	MINUTES . . . . . ☐☐☐☐	
911	Les questions suivantes excluent les activités liées au travail et aux déplacements que vous avez déjà mentionnées. Maintenant je souhaiterais vous poser des questions sur le sport, le fitness et les activités de loisirs		
912	Est-ce que vous pratiquez des sports, du fitness ou des activités de loisirs de forte intensité qui nécessitent une augmentation importante de la respiration ou du rythme cardiaque comme courir ou jouer au football pendant au moins dix minutes d'affilée ? UTILISER LA BOÎTE À IMAGES POUR DONNER DES EXAMPLES	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 915
913	Habituellement, combien de jours par semaine pratiquez-vous une activité sportive, du fitness ou d'autres activités de loisirs de forte intensité ?	NOMBRE DE JOURS . . . . . ☐	
914	Lors d'une journée habituelle, combien de temps en minutes consacrez-vous à une activité sportive, du fitness ou d'autres activités de loisirs de forte intensité?	MINUTES . . . . . ☐☐☐☐	
915	Est-ce que vous pratiquez des sports, du fitness ou des activités de loisirs d'intensité modérée qui nécessitent une petite augmentation de la respiration ou du rythme cardiaque comme la marche rapide faire du vélo, nager, jouer au volley pendant au moins dix minutes d'affilée ? UTILISER LA BOÎTE À IMAGES POUR DONNER DES EXAMPLES	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 918
916	Habituellement, combien de jours par semaine pratiquez-vous une activité sportive, du fitness ou d'autres activités de loisirs d'intensité modérée ?	NOMBRE DE JOURS . . . . . ☐	
917	Lors d'une journée habituelle, combien de temps en minutes consacrez-vous à une activité sportive, du fitness ou d'autres activités de loisirs d'intensité modérée ?	MINUTES . . . . . ☐☐☐☐	
918	La question suivante concerne le temps passé en position assise ou couchée, au travail, à la maison, en déplacement, à rendre visite à des amis, et inclut le temps passé [assis devant un bureau, se déplacer en voiture, en bus, en train, à lire, jouer aux cartes ou à regarder la télévision] mais n'inclut pas le temps passé à		
919	Combien de temps en minutes passez-vous en position assise ou couchée lors d'une journée habituelle ?	MINUTES . . . . . ☐☐☐☐	

SECTION 10. MALADIES CHRONIQUES

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
1001	Est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé a déjà vérifié votre tension artérielle ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
1002	Est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé vous a déjà dit que vous aviez une tension artérielle élevée ou de l'hypertension ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1006
1003	Dans les 12 derniers mois, est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé vous a dit que vous aviez une tension artérielle élevée ou de l'hypertension ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1004	Est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé vous a prescrit des médicaments pour contrôler votre tension artérielle ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1005	Est-ce que vous prenez actuellement des médicaments pour contrôler votre tension artérielle ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1006	Est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé a déjà mesuré le niveau de sucre dans votre sang ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
1007	Est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé vous a déjà dit que vous aviez un niveau élevé de sucre dans le sang ou du diabète ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1011
1008	Dans les 12 derniers mois, est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé vous a dit que vous aviez un niveau élevé de sucre dans le sang ou du diabète ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1009	Est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé vous a prescrit des médicaments pour contrôler votre niveau de sucre ou de diabète ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1010	Est-ce que vous prenez des médicaments pour contrôler votre niveau élevé de sucre dans le sang ou votre diabète ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1011	Est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé vous a déjà dit que vous aviez une maladie cardiaque ou un problème cardiaque chronique ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1013
1012	Suivez-vous actuellement un traitement pour une maladie cardiaque ou un problème cardiaque chronique ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1013	Est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé vous a déjà dit que vous aviez une maladie pulmonaire ou un problème pulmonaire chronique ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1015
1014	Suivez-vous actuellement un traitement pour une maladie pulmonaire ou un problème pulmonaire chronique ?	OUI . . . . . 1 NON 2	

SECTION 10. MALADIES CHRONIQUES

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
1015	Est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé vous a déjà dit que vous aviez un cancer ou une tumeur ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1017
1016	Suivez-vous actuellement un traitement pour un cancer ou une tumeur ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1017	Est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé vous a déjà dit que vous faisiez de la depression?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1019
1018	Suivez-vous actuellement un traitement pour la dépression ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1019	Est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé vous a déjà dit que vous faisiez de l'anxiété?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1021
1020	Suivez-vous actuellement un traitement pour l'anxiété ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1021	Est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé vous a déjà dit que vous souffriez de troubles épileptiques ou d'épilepsie ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1023
1022	Suivez-vous actuellement un traitement pour l'épilepsie?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1023	Est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé vous a déjà dit que vous aviez de l'arthrite?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1025
1024	Suivez-vous actuellement un traitement pour l'arthrite ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1025	Est-ce qu'un médecin ou du personnel de santé vous a déjà dit que vous aviez une autre maladie chronique, c'est-à-dire une maladie qui dure depuis longtemps?	OUI . . . . . 1 _____ (SPÉCIFIEZ LA MALADIE CHRONIQUE) NON 2	→ 1027
1026	Suivez-vous actuellement un traitement pour (MALADIE CHRONIQUE À 1025) ?	YES . . . . . 1 NO 2	
1027	Avez-vous déjà reçu un vaccin contre la COVID-19 ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	→ 1100
1028	Quand a eu lieu votre dernière vaccination contre le COVID-19 ?	MOIS . . . . . ☐☐ NE CONNAÎT PAS LE MOIS . . . . . 98 ANNÉE . . . . . ☐☐☐☐ NE CONNAÎT PAS L'ANNÉE 9998	

SECTION 11. MODULE SUR LA VIOLENCE DOMESTIQUE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSEZ À
1100	VÉRIFIER LA PAGE DE COUVERTURE: L'HOMME EST SÉLECTIONNÉ POUR LE MODULE VD ? HOMME SÉLECTIONNÉ POUR CETTE SECTION ☐ ↓ HOMME NON SÉLECTIONNÉ ☐ →		1138
1101	VÉRIFIER LA PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES: NE PAS CONTINUER TANT QUE VOUS N'ÊTES PAS SÛRE D'ÊTRE EN PRIVÉ. VOUS ÊTES EN PRIVÉ . . . . . 1 ↓ IMPOSSIBLE D'ÊTRE EN PRIVÉ . . . . . 2 →		1137
1102	LISEZ À L'ENQUÊTÉE : Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions concernant certains autres aspects importants de la vie d'un homme. Vous allez trouver certaines de ces questions très personnelles. Cependant, vos réponses sont très importantes pour nous aider à connaître la condition des hommes au Mali. Je vous garantis que vos réponses resteront complètement confidentielles et qu'elles ne seront divulguées à personne. Je tiens aussi à vous assurer que personne d'autre que vous dans votre ménage ne saura que l'on vous a posé ces questions. S'il arrivait que je pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, dites-le moi et je passerai à la question suivante.		
1103	VÉRIFIER 401 ET 402: ACTUELLEMENT MARIÉ/ VIVANT AVEC UNE FEMME ☐ →		1106
	JAMAIS MARIÉ/ JAMAIS VÉCU AVEC UNE FEMME ☐ ↓		
	PRÉCÉDEMMENT MARIÉ/ A VÉCU AVEC UNE FEMME (À LIRE AU PASSÉ ET UTILISER'DERNIÈRE' AVEC 'FEMME/ PARTENAIRE FEMINE') ☐ →		1106
1104	Vous avez déclaré que vous n'êtiez pas marié et que vous ne viviez pas avec un femme comme si vous êtiez marié. Êtez-vous engagé actuellement dans une relation intime avec une femme bien que vous ne viviez pas avec elle ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→1106
1105	Avez-vous déjà été engagé dans une relation intime avec une femme bien que vous n'ayez jamais vécu avec elle ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→1122
1106	Maintenant, je vais vous poser des questions sur des situations qui peuvent se produire entre certains hommes et leur conjointe (épouse/ partenaire féminine).		

	A. Dites-moi, s'il vous plait, si les situations suivantes s'appliquent à vos relations avec votre (dernière) (épouse/partenaire féminine) ?	DÉJÀ ARRIVÉ	B. Combien de fois cela est-il arrivé au cours des 12 derniers mois : souvent, de temps en temps ou pas du tout ?		
			SOUVENT	PARFOIS	PAS DANS 12 DERNIERS MOIS
a)	Elle (est/était) jalouse ou en colère si vous (parlez/parliez) à d'autres femmes ?	OUI 1 → / NON 2 ↓	1	2	3
b)	Elle vous (accuse/accusait) d'être infidèle ?	OUI 1 → / NON 2 ↓	1	2	3
c)	Elle ne vous (permet/permettait) pas de voir vos amis ?	OUI 1 → / NON 2 ↓	1	2	3
d)	Elle (essaye/essayait) de limiter vos contacts avec votre famille ?	OUI 1 → / NON 2 ↓	1	2	3
e)	Elle (insiste /insistait) pour savoir où vous (êtes/êtiez) à tous moments ?	OUI 1 → / NON 2 ↓	1	2	3

SECTION 11. MODULE SUR LA VIOLENCE DOMESTIQUE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSEZ À
1107	Maintenant, je voudrais vous poser d'autres questions sur vos relations avec votre (dernière) (épouse/partenaire féminine).		
	A. Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre (dernière) (épouse/partenaire féminine) :	B. Combien de fois cela est-il arrivé au cours des 12 derniers mois : souvent, parfois seulement ou pas du tout ?	
		DÉJÀ ARRIVÉ / SOUVENT / PARFOIS / PAS DANS 12 DERNIERS MOIS	
	a) Vous dise ou fasse quelque chose pour vous humilier devant d'autres	OUI 1 → 1 2 3 / NON 2 ↓	
	b) Vous menace de vous blesser ou de vous faire du mal, vous ou quelqu'un qui vous est proche ?	OUI 1 → 1 2 3 / NON 2 ↓	
	c) Vous insulte ou vous rabaisse ?	OUI 1 → 1 2 3 / NON 2 ↓	
1108	A. Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre (dernière) (épouse/partenaire féminine) vous ait fait l'une des choses suivantes :	B. Combien de fois cela est-il arrivé au cours des 12 derniers mois : souvent, parfois seulement ou pas du tout ?	
		DÉJÀ ARRIVÉ / SOUVENT / PARFOIS / PAS DANS 12 DERNIERS MOIS	
	a) vous bouscule, secoue ou vous jette quelque chose ?	OUI 1 → 1 2 3 / NON 2 ↓	
	b) vous gifle ?	OUI 1 → 1 2 3 / NON 2 ↓	
	c) vous torde le bras ou vous tire les cheveux ?	OUI 1 → 1 2 3 / NON 2 ↓	
	d) vous frappe à coups de poings ou avec quelque chose qui pouvait vous	OUI 1 → 1 2 3 / NON 2 ↓	
	e) vous donne des coups de pied, vous traîne par terre ou vous batte ?	OUI 1 → 1 2 3 / NON 2 ↓	
	f) essaye de vous étrangler ou de vous brûler avec l'intention de le faire ?	OUI 1 → 1 2 3 / NON 2 ↓	
	g) vous attaque avec un couteau, un fusil ou une autre arme ?	OUI 1 → 1 2 3 / NON 2 ↓	
	h) vous force physiquement à avoir des rapports sexuels avec elle quand vous ne le vouliez pas ?	OUI 1 → 1 2 3 / NON 2 ↓	
	i) vous force physiquement à pratiquer d'autres actes sexuels que vous ne vouliez pas ?	OUI 1 → 1 2 3 / NON 2 ↓	
	j) vous force en vous menaçant ou d'une autre manière à pratiquer des actes sexuels que vous ne vouliez pas ?	OUI 1 → 1 2 3 / NON 2 ↓	

SECTION 11. MODULE SUR LA VIOLENCE DOMESTIQUE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSEZ À
1109	VÉRIFIER 1108A (a-j): AU MOINS UN OUI' ↓ PAS UN SEUL OUI' →		1111
1110	Est-ce qu'à la suite d'actes commis envers vous par votre (dernière) (épouse/partenaire féminine), il vous est arrivé d'avoir :		
	a) des coupures, des hématomes ou des douleurs ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
	b) des hématomes aux yeux, des entorses, des luxations ou des brûlures ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
	c) des blessures profondes, des os cassés, des dents cassées ou d'autres blessures graves ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1111	Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de battre, de gifler, de donner des coups de pied ou de faire quelque chose d'autre avec l'intention de blesser physiquement votre (dernière) (épouse/partenaire féminine) alors qu'elle ne vous battait pas et ne vous faisait pas de mal physiquement ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1113
1112	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois vous est-il arrivé de faire cela à votre (dernière) (épouse/partenaire féminine) : souvent, parfois seulement ou pas du tout ?	SOUVENT . . . . . 1 PARFOIS . . . . . 2 PAS DU TOUT 3	
1113	Est-ce que votre (dernière) (épouse/partenaire féminine) boit (buvait) de l'alcool ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1115
1114	Combien de fois lui arrive-t-il (lui est-il arrivé) d'être ivre : souvent, parfois seulement ou jamais ?	SOUVENT . . . . . 1 PARFOIS . . . . . 2 PAS DU TOUT 3	
1115	Vous est-il arrivé d'avoir peur (d'avoir eu peur) de votre (dernière) (épouse/partenaire féminine) : la plupart du temps, parfois ou jamais ?	PEUR LA PLUPART DU TEMPS . . . . 1 PEUR PARFOIS . . . . . 2 JAMAIS PEUR 3	

SECTION 11. MODULE SUR LA VIOLENCE DOMESTIQUE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSEZ À
1116	A. Jusqu'ici, nous avons parlé du comportement de votre (actuelle/dernière) (épouse/partenaire féminine). Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur le comportement d'une de vos précédentes épouses ou de toute autre partenaire feminine actuelle ou précédente que vous avez pu avoir .	B. Il y a combien de temps que cela s'est produit ?	
		DÉJÀ ARRIVÉ / IL Y A 0-11 MOIS / IL Y A 12 MOIS OU PLUS / NE SE SOUVIENT PAS	
		N'A JAMAIS EU UN AUTRE MARI/ PARTENAIRE MASCULIN 6	→ 1117
	a) Est-ce qu'il est arrivé qu'une épouse précédente ou une autre partenaire féminine actuelle ou précédente vous batte, vous gifle, vous donne des coups de pied ou vous fasse quelque chose pour vous blesser physiquement ?	OUI 1 → 1 2 3 NON 2 ↓	
	b) Est-ce qu'il est arrivé qu'une épouse précédente ou une autre partenaire féminine actuelle ou précédente vous force physiquement à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer des actes sexuels contre votre volonté ?	OUI 1 → 1 2 3 NON 2 ↓	
	c) Est-ce qu'il est arrivé qu'une épouse précédente ou une autre partenaire féminine actuelle ou précédente vous a humilié devant d'autres personnes, vous menace de vous blesser, vous ou quelqu'un qui vous est proche, vous insulte ou cherche à vous rabaisser ?	OUI 1 → 1 2 3 NON 2 ↓	
1117	VÉRIFIER 1108A (h-j) ET 1116A (b):	AU MOINS UN OUI' ☐ ↓ / PAS UN SEUL OUI ☐ →	→ 1122
1118	Quel âge aviez-vous la première fois qu'une épouse ou une partenaire féminine, actuelle ou précédente, vous a forcé à avoir des rapports sexuels ou de pratiquer des actes sexuels que vous ne vouliez pas ?	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES . . . . . ☐☐ NE SAIT PAS 98	
1122	VÉRIFIER 401 ET 402 ET 1104 ET 1105:		
	A DÉJÀ ÉTÉ MARIÉE/ A VÉCU AVEC UN HOMME/ A DÉJÀ EU UN PARTENAIRE MASCULIN ☐ ↓	N'A JAMAIS ÉTÉ MARIÉE/ N'A JAMAIS EU UN PARTENAIRE MASCULIN ☐ ↓	
	a) Depuis l'âge de 15 ans, est-ce que quelqu'un d'autre qu'une épouse ou partenaire féminine vous a battu, giflé, donné des coups de pieds ou fait quelque chose pour vous faire mal physiquement ? N'oubliez pas, je ne parle pas ici d'une épouse ou d'une partenaire féminine.	b) Depuis l'âge de 15 ans, est-ce que quelqu'un vous a battu, giflé ou donné des coups de pieds ou fait quelque chose d'autre pour vous faire mal physiquement ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 A REFUSÉ DE RÉPONDRE/ PAS DE RÉPONSE . . . . . 3 → 1125

SECTION 11. MODULE SUR LA VIOLENCE DOMESTIQUE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSEZ À
1123	Qui vous a agressé de cette façon ? Quelqu'un d'autre ? ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	MÈRE/FEMME DU PÈRE . . . . . A PÈRE/MARI DE LA MÈRE . . . . . B SOEUR/FRÈRE . . . . . C FILLE/FILS . . . . . D AUTRE PERSONNE APPARENTÉE . . E PETITE AMIE ACTUELLE . . . . . F ANCIENNE PETITE AM . . . . . G BELLE-MÈRE . . . . . H BEAU-PÈRE . . . . . I AUTRE BEAU-PARENT . . . . . J ENSEIGNANT . . . . . K CAMARADE D'ÉCOLE/DE CLASSE . . L EMPLOYEUR/QUELQU'UN AU TRAVAIL . . . . . M POLICE/SOLDAT . . . . . N AUTRE _____ X (PRÉCISER)	
1124	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-il arrivé que (cette personne/ces personnes) vous agresse (vous agressent) physiquement : souvent, seulement de temps en temps ou pas du tout ?	SOUVENT . . . . . 1 PARFOIS . . . . . 2 PAS DU TOUT 3	
1125	VÉRIFIER 401 ET 402 ET 1104 ET 1105: A DÉJÀ ÉTÉ MARIÉE/ A VÉCU AVEC UN HOMME/ A DÉJÀ EU UN PARTENAIRE MASCULIN ☐ ↓ N'A JAMAIS ÉTÉ MARIÉE/ N'A JAMAIS EU UN PARTENAIRE MASCULIN ☐ → 1127		
1126	À n'importe quel moment dans votre vie, quand vous étiez enfant ou adulte, est-ce que quelqu'un d'autre qu'une épouse précédente ou une partenaire actuelle ou précédente vous a forcé à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer d'autres actes sexuels contre votre volonté ? N'oubliez pas, je ne parle pas ici d'une épouse ou d'une partenaire féminine.	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 A REFUSÉ DE RÉPONDRE/ PAS DE RÉPONSE 3	→ 1128 → 1131
1127	À n'importe quel moment dans votre vie, quand vous étiez enfant ou adulte, est-ce que quelqu'un vous a forcé de quelque manière que ce soit à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer d'autres actes sexuels que vous ne vouliez pas ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 A REFUSÉ DE RÉPONDRE/ PAS DE RÉPONSE 3	→ 1131
1128	VÉRIFIER 401 ET 402 ET 1104 ET 1105: A DÉJÀ ÉTÉ MARIÉE/ A VÉCU AVEC UN HOMME/ A DÉJÀ EU UN PARTENAIRE MASCULIN ☐ ↓ a) Quel âge aviez-vous la première fois que quelqu'un d'autre qu'une épouse ou une autre partenaire féminine, vous a forcé à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer d'autres actes sexuels contre votre volonté? N'A JAMAIS ÉTÉ MARIÉE/ N'A JAMAIS EU UN PARTENAIRE MASCULIN ☐ ↓ b) Quel âge aviez-vous la première fois que l'on vous a forcé à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer d'autres actes sexuels contre votre volonté?	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES . . . . . ☐☐ NE SAIT PAS 98	

SECTION 11. MODULE SUR LA VIOLENCE DOMESTIQUE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSEZ À
1129	Qui vous a forcé à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer des actes sexuels que vous ne vouliez pas ? Quelqu'un d'autre ? ENREGISTRER TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	PÈRE/MARI DE LA MÈRE . . . . . A FRÈRE/DEMI-FRÈRE . . . . . B AUTRE PERSONNE APPARENTÉE . . C PETITE AMIE ACTUELLE . . . . . D ANCIENNE PETITE AM . . . . . E BEAU-PARENT . . . . . F AMIE/RENCONTRE . . . . . G AMI DE LA FAMILLE . . . . . H ENSEIGNANTE . . . . . I CAMARADE D'ÉCOLE/CLASSE . . . . . J EMPLOYEUR/QUELQU'UN AU TRAVAIL . . . . . K POLICE/SOLDAT . . . . . L PRÊTRE/RESPONSABLE RELIGIEUX M ÉTRANGER . . . . . N AUTRE _____ X (PRÉCISEZ)	
1130	VÉRIFIER 401 ET 402 ET 1104 ET 1105: A DÉJÀ ÉTÉ MARIÉE/ A VÉCU AVEC UN HOMME/ A DÉJÀ EU UN PARTENAIRE MASCULIN ☐ ↓ a) Au cours des 12 derniers mois, est-ce que quelqu'un d'autre qu'une épouse précédente ou une partenaire féminine actuelle ou précédente vous a forcé à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer des actes sexuels contre votre volonté? N'A JAMAIS ÉTÉ MARIÉE/ N'A JAMAIS EU UN PARTENAIRE MASCULIN ☐ ↓ b) Au cours des 12 derniers mois, est-ce que quelqu'un vous a forcé à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer des actes sexuels que vous ne vouliez pas ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
1131	VÉRIFIEZ 1108A (a-j), 1116A (a,b), 1120, 1122, 1126, ET 1127: AU MOINS UN OUI' ☐ ↓ PAS UN SEUL OUI' ☐ →		1135
1132	Pensez à ce qui vous est arrivé parmi les choses dont nous venons de parler. Vous est-il arrivé de rechercher de l'aide ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 1134
1133	Auprès de qui avez-vous recherché de l'aide ? Personne d'autre ? ENREGISTRER TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	PROPRE FAMILLE . . . . . A FAMILLE DU MARI/PARTENAIRE . . B MARI/PARTENAIRE ACTUEL/ANCIEN . . . . . C PETIT AMI ACTUEL/ANCIEN . . . . . D AMI . . . . . E VOISIN . . . . . F RESPONSABLE RELIGIEUX . . . . . G MÉDECIN/PERSONNEL MÉDICAL . . . H POLICE . . . . . I AVOCAT . . . . . J ORGANISATION SERVICE SOCIAL . . . K AUTRE _____ X (PRÉCISER)	→ 1135
1134	Avez-vous parlé de cela à quelqu'un ?	OUI . . . . . 1 NON 2	

SECTION 11. MODULE SUR LA VIOLENCE DOMESTIQUE

N°	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSEZ À
1135	Pour autant que vous le sachiez, est-ce que votre père battait votre mère ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS 8	
	REMERCIEZ L'ENQUÊTÉE DE SA COOPÉRATION ET RÉAFFIRMEZ-LUI QUE SES RÉPONSES RESTERONT CONFIDENTIELLES. COMPLÉTEZ LES QUESTIONS CI-DESSOUS CONCERNANT LE MODULE SUR LA VIOLENCE DOMESTIQUE SEULEMENT.		
1136	AVEZ-VOUS DÛ INTERROMPRE L'INTERVIEW PARCE QU'UN ADULTE A ESSAYÉ D'ÉCOUTER, EST VENU DANS LA PIÈCE OU A ESSAYÉ D'INTERVENIR D'UNE AUTRE MANIÈRE ?	OUI, UNE FOIS / OUI, PLUS D'UNE FOIS / NON MARI . . . . . 1 2 3 AUTRE HOMME ADULT . . 1 2 3 FEMME ADULTE 1 2 3	
1137	COMMENTAIRES DE L'ENQUÊTRICE / SI L'ENQUÊTE SUR LA VIOLENCE DOMESTIQUE N'A PAS PU ÊTRE MENÉE, DONNEZ LES RAISONS.		
1138	ENREGISTREZ L'HEURE.	HEURE . . . . . [ ][ ] MINUTES . . . . . [ ][ ]	

OBSERVATION DE L'ENQUÊTEUR

À REMPLIR UNE FOIS L'INTERVIEW TERMINÉE

COMMENTAIRES SUR L'INTERVIEW :

COMMENTAIRES SUR DES QUESTIONS PARTICULIÈRES :

AUTRES COMMENTAIRES :

OBSERVATION DU CHEF D'ÉQUIPE

DATE DE FORMATAGE: 30 nov 2023

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INSTAT)

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE SECTEUR SANTÉ, DEVELOPPEMENT SOCIAL ET PROMOTION DE LA FAMILLE (CPS/SSDSPF)

SEPTIÈME ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ AU MALI
EDSM-VII
QUESTIONNAIRE BIOMARQUEUR

IDENTIFICATION

NOM DE LA LOCALITÉ _____

NOM DU CHEF DE MÉNAGE _____

NUMÉRO DE GRAPPE . . . . . | | | | |

NUMÉRO DE CONCESSION . . . . . | | | | |

NUMÉRO DU MÉNAGE . . . . . | | | | |

MÉNAGE SÉLECTIONNÉ POUR L'ENQUÊTE HOMME? (1=OUI, 2=NON) . . . . . |_|

VISITES DU TECHNICIEN DE SANTÉ

	1	2	3	VISITE FINALE
DATE	_____	_____	_____	JOUR
NOM DU TECHNICIEN DE SANTÉ	_____	_____	_____	MOIS ANNÉE
PROCHAINE DATE VISITE	_____	_____		NOMBRE TOTAL DE VISITES
HEURE	_____	_____		

NOTES DU TECHNICIEN DE SANTÉ :

_____

_____

_____

_____

TOTAL D'ENFANTS ÉLIGIBLES

TOTAL DE FEMMES ÉLIGIBLES

LANGUE DU QUESTIONNAIRE** **0 1** | LANGUE DE L'INTERVIEW** | | LANGUE MATERNELLE DE L'ENQUÊTÉ** | | INTERPRÈTE (OUI = 1, NON = 2) |_|

LANGUE DU QUESTIONNAIRE** **FRANÇAIS**

**CODES LANGUES :

01 FRANÇAIS	07 DOGON
02 BAMBARA/MALINKÉ	08 MINIANKA
03 SONRAÏ/DJERMA	09 TAMACHECK
04 PEUHL/FOULFOULDÉ	10 BOBO/DAFING
05 SÉNOUFO	11 BOZO
06 MARKA/SONINKÉ	96 AUTRE

_____
(PRÉCISEZ)

ÉQUIPE
| | |
NUMÉRO

CHEF D'ÉQUIPE
_____ | | | | |
NOM NUMÉRO

MESURE DU POIDS, DE LA TAILLE ET DU NIVEAU D'HÉMOGLOBINE DES ENFANTS DE 0-4 ANS

101	VÉRIFIEZ LA "LISTE DES INDIVIDUS/BIOMARQUEURS ÉLIGIBLES" FOURNIE PAR CAPI. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE ET LE NOM DE TOUS LES ENFANTS ÉLIGIBLES DE 0-5 ANS À LA QUESTION 102 SUR CETTE PAGE ET SUR LES PAGES SUIVANTES EN COMMENÇANT PAR LE PREMIER ENFANT SUR LA LISTE. S'IL Y A PLUS DE TROIS ENFANTS, UTILISER UN (DES) QUESTIONNAIRE(S) SUPPLÉMENTAIRE(S).		
	ENFANT 1		ALLEZ À
102	VÉRIFIEZ LE RÉSULTAT CAPI: ENREGISTREZ LE NOM ET LE NUMÉRO DE LIGNE DE L' ENFANT.	NOM _____ NUMÉRO DE LIGNE . . . ☐☐	
103	SI LA MÈRE EST ENQUÊTÉE : COPIEZ LA DATE DE NAISSANCE DE L' ENFANT (JOUR , MOIS ET ANNÉE) DE L'HISTORIQUE DES GROSSESSES. SI LA MÈRE N'EST PAS ENQUÊTÉE, DEMANDEZ : Quelle est la date de naissance de (NOM) ?	JOUR . . . . . ☐☐ MOIS . . . . . ☐☐ ANNÉE . . . . . ☐☐☐☐	
104	SI LA MÈRE EST ENQUÊTÉE : COPIEZ L'ÂGE DE L'ENFANT À PARTIR DE L'HISTORIQUE DES GROSSESSES. SI LA MÈRE N'EST PAS ENQUÊTÉE, DEMANDEZ : Quel âge avait (NOM) à son dernier anniversaire? COMPAREZ ET CORRIGEZ 103 ET/OU 104 SI INCOHÉRENT.	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES ☐	
105	VÉRIFIEZ 104 : L'ENFANT A 0-4 ANS? OUI ☐ NON ☐		→ 125
106	POIDS EN KILOGRAMMES.	KG. . . . . ☐☐.☐☐ ABSENT . . . . . 9994 REFUS . . . . . 9995 AUTRE 9996	→ 108
107	L'ENFANT ÉTAIT-IL HABILLÉ LÉGÈREMENT?	OUI . . . . . 1 NON 2	
108	TAILLE EN CENTIMÈTRES. SI L' ENFANT A 0-1 AN, MESUREZ EN POSITION ALLONGÉE. SI L' ENFANT A 2, 3, OU 4 ANS, MESUREZ EN POSITION DEBOUT.	CM. . . . . ☐☐☐.☐ ABSENT . . . . . 9994 REFUS . . . . . 9995 AUTRE 9996	→ 113
109	L'ENFANT A T-IL ÉTÉ MESURÉ EN POSITION ALLONGÉE OU DEBOUT?	ALLONGÉE . . . . . 1 DEBOUT 2	
110	VÉRIFIEZ 104 ET 109: SUR LA BASE DE L'ÂGE DE L'ENFANT, LA PROCÉDURE CORRECTE POUR LA MESURE A T-ELLE ÉTÉ SUIVIE ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 112
111	SI L'ENFANT A 0-1 AN : POURQUOI (NOM) A-T-IL ÉTÉ MESURÉ EN POSITION DEBOUT? SI L'ENFANT A 2-4 ANS : POURQUOI (NOM) A-T-IL ÉTÉ MESURÉ EN POSITION ALLONGÉE? _____ _____		
112	LA MESURE ENREGISTRÉE A-T-ELLE ÉTÉ GÊNÉE PAR DES CHEVEUX TRESSÉS OU COIFFÉS ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
113	INSCRIVEZ LE NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ MESUREUR.	☐☐☐☐ NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ	
114	INSCRIVEZ LE NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ ASSISTANT MESUREUR	☐☐☐☐ NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ	
115	DATE DU JOUR	JOUR . . . . . ☐☐ MOIS . . . . . ☐☐ ANNÉE . . . . . ☐☐☐☐	

MESURE DU POIDS, DE LA TAILLE ET DU NIVEAU D'HÉMOGLOBINE DES ENFANTS DE 0-4 ANS

	ENFANT 1		ALLEZ À
116	INSCRIVEZ LA TAILLE/LONGUEUR ET LE POIDS DANS LA BROCHURE SUR L'ANTHROPOMÉTRIE ET L'ANÉMIE.		
116A	VÉRIFIEZ LA PAGE DE COUVERTURE: LE MÉNAGE EST-IL SÉLECTIONNÉ POUR L'ENQUÊTE HOMME?	OUI ☐ ↓ NON ☐ →	125
117	VÉRIFIEZ 103 : L'ENFANT A-T-IL 0-5 MOIS OU L'ENFANT EST-IL PLUS ÂGÉ?	PLUS ÂGÉ ☐ ↓ 0-5 MOIS ☐ →	125
118	INSCRIVEZ LE NOM DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE DE L'ENFANT	NOM _____ NUMÉRO DE LIGNE DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE NUMÉRO DE LIGNE . . . ☐☐	
119	DEMANDEZ LE CONSENTEMENT DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE POUR LE TEST D'ANÉMIE : Dans cette enquête, nous demandons à des gens dans tout le pays de participer au test d'anémie. L'anémie est un problème de santé sérieux qui résulte généralement d'une alimentation pauvre, d'infection ou de maladie chronique. Les résultats de cette enquête permettront d'aider le gouvernement à développer des programmes pour prévenir et traiter l'anémie. Nous demandons que tous les enfants de moins de 5 ans participent au test d'anémie. Le test d'anémie nécessite quelques gouttes de sang d'un doigt ou du talon. Pour ce test, on utilise un équipement propre et sans risque. Il n'a jamais été utilisé auparavant et il sera jeté après chaque test. Le sang sera testé pour l'anémie immédiatement et le résultat vous sera communiqué tout de suite. Les résultats sont strictement confidentiels et ne seront transmis à personne en dehors de l'équipe de l'enquête. Avez-vous des questions à me poser ? Vous pouvez dire oui ou non pour le test. C'est votre décision. Autorisez-vous (NOM DE L'ENFANT) à participer au test d'anémie ?		
120	ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIÉ.	ACCORDÉ . . . . . 1 REFUS . . . . . 2 ABSENT/AUTRE 3	
121	SIGNEZ ET INSCRIVEZ LE NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ MESUREUR DU NIVEAU D'HÉMOGLOBINE.	_____ (SIGNATURE) ☐☐☐☐ NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ	
122	INSCRIVEZ LE NIVEAU D'HÉMOGLOBINE ICI ET DANS LA BROCHURE SUR L'ANTHROPOMÉTRIE ET L'ANÉMIE.	G/DL . . . . . ☐☐.☐ PAS PRÉSENT . . . . . 994 REFUSÉ . . . . . 995 → AUTRE 996	125
123	VÉRIFIEZ 122 : RÉSULTAT DE L'HÉMOGLOBINE	EN-DESSOUS DE 8.0 G/DL, ANÉMIE SEVÈRE . . . . . 1 8.0 G/DL OU PLUS . . . . . 2 →	125
124	Le test pour le diagnostic d'anémie montre que (NOM DE L'ENFANT) a une anémie sévère. Votre enfant est sérieusement malade et doit être emmené à un établissement de santé immédiatement. ENREGISTREZ LE RÉSULTAT DU TEST D'ANÉMIE SUR LA FICHE DE RÉFÉRENCE POUR L'ANÉMIE SÉVÈRE.		
125	SI IL Y A UN AUTRE ENFANT, ALLEZ À 102 À LA PAGE SUIVANTE; S'IL N'YA PLUS D'ENFANTS, ALLEZ À 201.		

ENFANT 2

			ALLEZ À
102	VÉRIFIEZ LE RÉSULTAT CAPI: ENREGISTREZ LE NOM ET LE NUMÉRO DE LIGNE DE L' ENFANT.	NOM _____ NUMÉRO DE LIGNE . . .	
103	SI LA MÈRE EST ENQUÊTÉE : COPIEZ LA DATE DE NAISSANCE DE L' ENFANT (JOUR , MOIS ET ANNÉE) DE L'HISTORIQUE DES GROSSESSES. SI LA MÈRE N'EST PAS ENQUÊTÉE, DEMANDEZ : Quelle est la date de naissance de (NOM) ?	JOUR . . . . . . MOIS . . . . . . ANNÉE	
104	SI LA MÈRE EST ENQUÊTÉE : COPIEZ L'ÂGE DE L'ENFANT À PARTIR DE L'HISTORIQUE DES GROSSESSES. SI LA MÈRE N'EST PAS ENQUÊTÉE, DEMANDEZ : Quel âge avait (NOM) à son dernier anniversaire? COMPAREZ ET CORRIGEZ 103 ET/OU 104 SI INCOHÉRENT.	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES	
105	VÉRIFIEZ 104 : L'ENFANT A 0-4 ANS? OUI ☐ NON ☐		→ 125
106	POIDS EN KILOGRAMMES.	KG. . . . . . ABSENT . . . . . 9994 REFUS . . . . . 9995 AUTRE 9996	→ 108
107	L'ENFANT ÉTAIT-IL HABILLÉ LÉGÈREMENT?	OUI . . . . . 1 NON 2	
108	TAILLE EN CENTIMÈTRES. SI L' ENFANT A 0-1 AN, MESUREZ EN POSITION ALLONGÉE. SI L' ENFANT A 2, 3, OU 4 ANS, MESUREZ EN POSITION DEBOUT.	CM. . . . . . ABSENT . . . . . 9994 REFUS . . . . . 9995 AUTRE 9996	→ 113
109	L'ENFANT A T-IL ÉTÉ MESURÉ EN POSITION ALLONGÉE OU DEBOUT?	ALLONGÉ . . . . . 1 DEBOUT 2	
110	VÉRIFIEZ 104 ET 109: SUR LA BASE DE L'ÂGE DE L'ENFANT, LA PROCÉDURE CORRECTE POUR LA MESURE A T-ELLE ÉTÉ SUIVIE ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 112
111	SI L'ENFANT A 0-1 AN : POURQUOI (NOM) A-T-IL ÉTÉ MESURÉ EN POSITION DEBOUT? SI L'ENFANT A 2-4 ANS : POURQUOI (NOM) A-T-IL ÉTÉ MESURÉ EN POSITION ALLONGÉE? _____ _____		
112	LA MESURE ENREGISTRÉE A-T-ELLE ÉTÉ GÊNÉE PAR DES CHEVEUX TRESSÉS OU COIFFÉS ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
113	INSCRIVEZ LE NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ MESUREUR.	NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ	
114	INSCRIVEZ LE NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ ASSISTANT MESUREUR	NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ	
115	DATE DU JOUR	JOUR . . . . . . MOIS . . . . . . ANNÉE	

MESURE DU POIDS, DE LA TAILLE ET DU NIVEAU D'HÉMOGLOBINE DES ENFANTS DE 0-4 ANS

	ENFANT 2		ALLEZ À
116	INSCRIVEZ LA TAILLE/LONGUEUR ET LE POIDS DANS LA BROCHURE SUR L'ANTHROPOMÉTRIE ET L'ANÉMIE.		
116A	VÉRIFIEZ LA PAGE DE COUVERTURE: LE MÉNAGE EST-IL SÉLECTIONNÉ POUR L'ENQUÊTE HOMME?	OUI ☐ NON ☐	→ 125
117	VÉRIFIEZ 103 : L'ENFANT A-T-IL 0-5 MOIS OU L'ENFANT EST-IL PLUS ÂGÉ?	PLUS ÂGÉ ☐ 0-5 MOIS ☐	→ 125
118	INSCRIVEZ LE NOM DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE DE L'ENFANT	NOM _____ NUMÉRO DE LIGNE DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE NUMÉRO DE LIGNE . . . . . ☐☐	
119	DEMANDEZ LE CONSENTEMENT DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE POUR LE TEST D'ANÉMIE : Dans cette enquête, nous demandons à des gens dans tout le pays de participer au test d'anémie. L'anémie est un problème de santé sérieux qui résulte généralement d'une alimentation pauvre, d'infection ou de maladie chronique. Les résultats de cette enquête permettront d'aider le gouvernement à développer des programmes pour prévenir et traiter l'anémie. Nous demandons que tous les enfants de moins de 5 ans participent au test d'anémie. Le test d'anémie nécessite quelques gouttes de sang d'un doigt ou du talon. Pour ce test, on utilise un équipement propre et sans risque. Il n'a jamais été utilisé auparavant et il sera jeté après chaque test. Le sang sera testé pour l'anémie immédiatement et le résultat vous sera communiqué tout de suite. Les résultats sont strictement confidentiels et ne seront transmis à personne en dehors de l'équipe de l'enquête. Avez-vous des questions à me poser ? Vous pouvez dire oui ou non pour le test. C'est votre décision. Autorisez-vous (NOM DE L'ENFANT) à participer au test d'anémie ?		
120	ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIÉ.	ACCORDÉ . . . . . 1 REFUS . . . . . 2 ABSENT/AUTRE 3	
121	SIGNEZ ET INSCRIVEZ LE NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ MESUREUR DU NIVEAU D'HÉMOGLOBINE.	_____ (SIGNATURE) ☐☐☐☐ NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ	
122	INSCRIVEZ LE NIVEAU D'HÉMOGLOBINE ICI ET DANS LA BROCHURE SUR L'ANTHROPOMÉTRIE ET L'ANÉMIE.	G/DL . . . . . ☐☐.☐ PAS PRÉSENT . . . . . 994 REFUSÉ . . . . . 995 AUTRE 996	→ 125
123	VÉRIFIEZ 122 : RÉSULTAT DE L'HÉMOGLOBINE	EN-DESSOUS DE 8.0 G/DL, ANÉMIE SEVÈRE . . . . . 1 8.0 G/DL OU PLUS 2	→ 125
124	Le test pour le diagnostic d'anémie montre que (NOM DE L'ENFANT) a une anémie sévère. Votre enfant est sérieusement malade et doit être emmené à un établissement de santé immédiatement. ENREGISTREZ LE RÉSULTAT DU TEST D'ANÉMIE SUR LA FICHE DE RÉFÉRENCE POUR L'ANÉMIE SÉVÈRE.		
125	SI IL Y A UN AUTRE ENFANT, ALLEZ À 102 À LA PAGE SUIVANTE; S'IL N'Y A PLUS D'ENFANTS, ALLEZ À 201.		

	ENFANT 3		ALLEZ À
102	VÉRIFIEZ LE RÉSULTAT CAPI: ENREGISTREZ LE NOM ET LE NUMÉRO DE LIGNE DE L' ENFANT.	NOM _____ NUMÉRO DE LIGNE	
103	SI LA MÈRE EST ENQUÊTÉE : COPIEZ LA DATE DE NAISSANCE DE L' ENFANT (JOUR , MOIS ET ANNÉE) DE L'HISTORIQUE DES GROSSESSES. SI LA MÈRE N'EST PAS ENQUÊTÉE, DEMANDEZ : Quelle est la date de naissance de (NOM) ?	JOUR . . . . . MOIS . . . . . ANNÉE	
104	SI LA MÈRE EST ENQUÊTÉE : COPIEZ L'ÂGE DE L'ENFANT À PARTIR DE L'HISTORIQUE DES GROSSESSES. SI LA MÈRE N'EST PAS ENQUÊTÉE, DEMANDEZ : Quel âge avait (NOM) à son dernier anniversaire? COMPAREZ ET CORRIGEZ 103 ET/OU 104 SI INCOHÉRENT.	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES	
105	VÉRIFIEZ 104 : L'ENFANT A 0-4 ANS? OUI ☐ NON ☐		→ 125
106	POIDS EN KILOGRAMMES.	KG. . . . . . ABSENT . . . . . 9994 REFUS . . . . . 9995 AUTRE 9996	→ 108
107	L'ENFANT ÉTAIT-IL HABILLÉ LÉGÈREMENT?	OUI . . . . . 1 NON 2	
108	TAILLE EN CENTIMÈTRES. SI L' ENFANT A 0-1 AN, MESUREZ EN POSITION ALLONGÉE. SI L' ENFANT A 2, 3, OU 4 ANS, MESUREZ EN POSITION DEBOUT.	CM. . . . . . ABSENT . . . . . 9994 REFUS . . . . . 9995 AUTRE 9996	→ 113
109	L'ENFANT A T-IL ÉTÉ MESURÉ EN POSITION ALLONGÉE OU DEBOUT?	ALLONGÉ . . . . . 1 DEBOUT 2	
110	VÉRIFIEZ 104 ET 109: SUR LA BASE DE L'ÂGE DE L'ENFANT, LA PROCÉDURE CORRECTE POUR LA MESURE A T-ELLE ÉTÉ SUIVIE ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 112
111	SI L'ENFANT A 0-1 AN : POURQUOI (NOM) A-T-IL ÉTÉ MESURÉ EN POSITION DEBOUT? SI L'ENFANT A 2-4 ANS : POURQUOI (NOM) A-T-IL ÉTÉ MESURÉ EN POSITION ALLONGÉE? _____ _____		
112	LA MESURE ENREGISTRÉE A-T-ELLE ÉTÉ GÊNÉE PAR DES CHEVEUX TRESSÉS OU COIFFÉS ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
113	INSCRIVEZ LE NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ MESUREUR.	NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ	
114	INSCRIVEZ LE NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ ASSISTANT MESUREUR	NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ	
115	DATE DU JOUR	JOUR . . . . . MOIS . . . . . ANNÉE	

MESURE DU POIDS, DE LA TAILLE ET DU NIVEAU D'HÉMOGLOBINE DES ENFANTS DE 0-4 ANS

	ENFANT 3		ALLEZ À
116	INSCRIVEZ LA TAILLE/LONGUEUR ET LE POIDS DANS LA BROCHURE SUR L'ANTHROPOMÉTRIE ET L'ANÉMIE.		
116A	VÉRIFIEZ LA PAGE DE COUVERTURE: LE MÉNAGE EST-IL SÉLECTIONNÉ POUR L'ENQUÊTE HOMME?	OUI ☐ ↓ NON ☐	→ 125
117	VÉRIFIEZ 103 : L'ENFANT A-T-IL 0-5 MOIS OU L'ENFANT EST-IL PLUS ÂGÉ?	PLUS ÂGÉ ☐ ↓ 0-5 MOIS ☐	→ 125
118	INSCRIVEZ LE NOM DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE DE L'ENFANT	NOM _____ NUMÉRO DE LIGNE DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE NUMÉRO DE LIGNE . . . . . ☐☐	
119	DEMANDEZ LE CONSENTEMENT DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE POUR LE TEST D'ANÉMIE : Dans cette enquête, nous demandons à des gens dans tout le pays de participer au test d'anémie. L'anémie est un problème de santé sérieux qui résulte généralement d'une alimentation pauvre, d'infection ou de maladie chronique. Les résultats de cette enquête permettront d'aider le gouvernement à développer des programmes pour prévenir et traiter l'anémie. Nous demandons que tous les enfants de moins de 5 ans participent au test d'anémie. Le test d'anémie nécessite quelques gouttes de sang d'un doigt ou du talon. Pour ce test, on utilise un équipement propre et sans risque. Il n'a jamais été utilisé auparavant et il sera jeté après chaque test. Le sang sera testé pour l'anémie immédiatement et le résultat vous sera communiqué tout de suite. Les résultats sont strictement confidentiels et ne seront transmis à personne en dehors de l'équipe de l'enquête. Avez-vous des questions à me poser ? Vous pouvez dire oui ou non pour le test. C'est votre décision. Autorisez-vous (NOM DE L'ENFANT) à participer au test d'anémie ?		
120	ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIÉ.	ACCORDÉ . . . . . 1 REFUS . . . . . 2 ABSENT/AUTRE 3	
121	SIGNEZ ET INSCRIVEZ LE NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ MESUREUR DU NIVEAU D'HÉMOGLOBINE.	_____ (SIGNATURE) ☐☐☐☐ NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ	
122	INSCRIVEZ LE NIVEAU D'HÉMOGLOBINE ICI ET DANS LA BROCHURE SUR L'ANTHROPOMÉTRIE ET L'ANÉMIE.	G/DL . . . . . ☐☐.☐ PAS PRÉSENT . . . . . 994 REFUSÉ . . . . . 995 AUTRE 996	→ 125
123	VÉRIFIEZ 122 : RÉSULTAT DE L'HÉMOGLOBINE	EN-DESSOUS DE 8.0 G/DL, ANÉMIE SEVÈRE . . . . . 1 8.0 G/DL OU PLUS 2	→ 125
124	Le test pour le diagnostic d'anémie montre que (NOM DE L'ENFANT) a une anémie sévère. Votre enfant est sérieusement malade et doit être emmené à un établissement de santé immédiatement. ENREGISTREZ LE RÉSULTAT DU TEST D'ANÉMIE SUR LA FICHE DE RÉFÉRENCE POUR L'ANÉMIE SÉVÈRE.		
125	SI IL Y A UN AUTRE ENFANT, ALLEZ À 102 À DU QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE; S'IL N'YA PLUS D'ENFANTS, ALLEZ À 201.		

MESURE DU POIDS, DE LA TAILLE ET DU NIVEAU D'HÉMOGLOBINE DES FEMMES DE 15-49 ANS

201	VÉRIFIEZ LA "LISTE DES INDIVIDUS/BIOMARQUEURS ÉLIGIBLES" FOURNIE PAR CAPI. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE, LE NOM, L'ÂGE ET L'ÉTAT MATRIMONIAL DE TOUTES LES FEMMES ÉLIGIBLES À 202, 203 ET 204 SUR CETTE PAGE ET SUR LES PAGES SUIVANTES À PARTIR DE LA PREMIÈRE INSCRITE. SI IL Y A PLUS DE DEUX FEMMES, UTILISEZ UN (DES) QUESTIONNAIRE (S) SUPPLÉMENTAIRE (S).		
	FEMME 1		ALLEZ À
202	VÉRIFIEZ LE RÉSULTAT CAPI : ENREGISTREZ LE NOM ET LE NUMÉRO DE LIGNE DE LA FEMME.	NOM _____ NUMÉRO DE LIGNE . . . ☐☐	
203	VÉRIFIEZ LE RÉSULTAT CAPI POUR L'ÂGE :	15-17 ANS . . . . . 1 18-49 ANS 2	
204	VÉRIFIEZ LE RÉSULTAT CAPI POUR L'ÉTAT MATRIMONIAL :	JAMAIS EN UNION . . . . . 1 AUTRE 2	
205	POIDS EN KILOGRAMMES.	KG. . . . . ☐☐☐.☐☐ ABSENTE . . . . . 99994 REFUS . . . . . 99995 AUTRE 99996	→ 207
206	LA FEMME PORTAIT-ELLE UNIQUEMENT DES VÊTEMENTS LÉGERS ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
207	TAILLE EN CENTIMÈTRES.	CM. . . . . ☐☐☐.☐ ABSENTE . . . . . 9994 REFUS . . . . . 9995 AUTRE 9996	→ 209
208	LA MESURE ENREGISTRÉE A-T-ELLE ÉTÉ GÊNÉE PAR DES CHEVEUX TRESSÉS OU COIFFÉS ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
209	INSCRIVEZ LE NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ MESUREUR.	☐☐☐☐ NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ	
210	INSCRIVEZ LE NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ ASSISTANT MESUREUR SI PAS DE MESUREUR ASSISTANT, INSCRIRE 9999.	☐☐☐☐ NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ	
211	DATE DU JOUR :	JOUR . . . . . ☐☐ MOIS . . . . . ☐☐ ANNÉE . . . . . ☐☐☐☐	
212	VÉRIFIEZ 203 : AGÉE DE 15-17 ANS ☐ ↓	AGÉE DE 18-49 ANS ☐	→ 214
213	VÉRIFIEZ 204 : AUTRE ☐ ↓	JAMAIS EN UNION ☐	→ 217

	FEMME 1	ALLEZ À

CONSENTEMENT ADULTE

CONSENTEMENT DE L'ENQUÊTÉE ADULTE POUR LE TEST D'ANÉMIE

214	DEMANDEZ LE CONSENTEMENT POUR LE TEST D'ANÉMIE : Dans cette enquête, nous demandons à des gens dans tout le pays de participer au test d'anémie. L'anémie est un problème de santé sérieux qui résulte généralement d'une alimentation pauvre, d'infection ou de maladie chronique. Les résultats de cette enquête permettront d'aider le gouvernement à développer des programmes pour prévenir et traiter l'anémie. Pour le test d'anémie, nous avons besoin de gouttes de sang d'un doigt. Pour ce test, on utilise un équipement propre et sans risque. Il n'a jamais été utilisé auparavant et sera jeté après chaque test. Le sang sera testé pour l'anémie immédiatement et le résultat vous sera communiqué tout de suite. Les résultats sont strictement confidentiels et ne seront transmis à personne en dehors de l'équipe de l'enquête. Avez-vous des questions à me poser? Vous pouvez dire oui ou non. C'est votre décision. Voulez-vous participer au test d'anémie ?		
215	ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIÉ.	ACCORDÉ . . . . . 1 REFUSÉ . . . . . 2 ABSENT/AUTRE 3	
216	SIGNEZ ET INSCRIVEZ LE NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ MESUREUR DU NIVEAU D'HÉMOGLOBINE.	_____ (SIGNATURE) ☐☐☐☐ NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ	→ 225

	FEMME 1	ALLEZ À

PARENT/ADULTE RESPONSABLE

217	INSCRIVEZ LE NOM DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE DE L'ENQUÊTÉE MINEURE.	NOM _____ NUMÉRO DE LIGNE DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE ☐☐

CONSENTEMENT DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE POUR LE TEST D'ANÉMIE

218	DEMANDEZ LE CONSENTEMENT DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE POUR LE TEST D'ANÉMIE : Dans cette enquête, nous demandons à des gens dans tout le pays de participer au test d'anémie. L'anémie est un problème de santé sérieux qui résulte généralement d'une alimentation pauvre, d'infection ou de maladie chronique. Les résultats de cette enquête permettront d'aider le gouvernement à développer des programmes pour prévenir et traiter l'anémie. Pour le test d'anémie, nous avons besoin de gouttes de sang d'un doigt. Pour ce test, on utilise un équipement propre et sans risque. Il n'a jamais été utilisé auparavant et sera jeté après chaque test. Le sang sera testé pour l'anémie immédiatement et le résultat vous sera communiqué à vous et à (NOM DE LA MINEURE} tout de suite. Les résultats sont strictement confidentiels et ne seront transmis à personne en dehors de l'équipe de l'enquête. Avez-vous des questions à me poser? Vous pouvez dire oui ou non. C'est votre décision. Autorisez-vous (NOM DE LA MINEURE) à participer au test d'anémie?	
219	ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIÉ.	ACCORDÉ . . . . . 1 PARENT/ADULTE RESPONSABLE A REFUSÉ . 2 ABSENT/AUTRE 3
220	SIGNEZ ET INSCRIVEZ LE NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ MESUREUR DU NIVEAU D'HÉMOGLOBINE.	_____ (SIGNATURE) ☐☐☐☐ NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ
221	VÉRIFIEZ 219 : CONSENTEMENT ACCORDÉ ☐ CONSENTEMENT REFUSÉ OU ABSENT/AUTRE ☐	→ 225

CONSENTEMENT ENQUÊTÉE MINEURE

CONSENTEMENT DE L'ENQUÊTÉE MINEURE POUR LE TEST

222	DEMANDEZ LE CONSENTEMENT POUR UN TEST D'ANÉMIE À L'ENQUÊTÉE MINEURE : Dans cette enquête, nous demandons à des gens dans tout le pays de participer au test d'anémie. L'anémie est un problème de santé sérieux qui résulte généralement d'une alimentation pauvre, d'infection ou de maladie chronique. Les résultats de cette enquête permettront d'aider le gouvernement à développer des programmes pour prévenir et traiter l'anémie. Pour le test d'anémie, nous avons besoin de gouttes de sang d'un doigt. Pour ce test, on utilise un équipement propre et sans risque. Il n'a jamais été utilisé auparavant et sera jeté après chaque test. Le sang sera testé pour l'anémie immédiatement et le résultat vous sera communiqué à vous et à (NOM DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE) tout de suite. Les résultats sont strictement confidentiels et ne seront transmis à personne en dehors de l'équipe de l'enquête. Avez-vous des questions à me poser? Vous pouvez dire oui ou non. C'est votre décision. Voulez-vous participer au test d'anémie?	
223	ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIÉ	ACCORDÉ . . . . . 1 ENQUÊTÉE MINEURE A REFUSÉ . . . . . 2 ABSENTE/AUTRE 3
224	SIGNEZ ET INSCRIVEZ LE NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ MESUREUR DU NIVEAU D'HÉMOGLOBINE.	_____ (SIGNATURE) ☐☐☐☐ NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ

MESURE DU POIDS, DE LA TAILLE ET DU NIVEAU D'HÉMOGLOBINE DES FEMMES DE 15-49 ANS

	FEMME 1		ALLEZ À
225	INSCRIVEZ LE NIVEAU D'HÉMOGLOBINE ICI ET DANS LA BROCHURE SUR L'ANTHROPOMÉTRIE ET L'ANÉMIE.	G/DL . . . . . □□.□ ABSENTE . . . . . 994 REFUS . . . . . 995 AUTRE 996	→ 228
226	VÉRIFIEZ 225 : RÉSULTAT HÉMOGLOBINE	EN-DESSOUS 8.0 G/DL, ANÉMIE SÉVÈRE . . . . . 1 8.0 G/DL OU PLUS 2	→ 228
227	Le test pour le diagnostic d'anémie montre que vous avez une anémie sévère. Vous êtes très malade et vous devez vous rendre immédiatement dans un établissement de santé. ENREGISTREZ LE RÉSULTAT DU TEST D'ANÉMIE SUR LA FICHE DE RÉFÉRENCE POUR L'ANÉMIE SÉVÈRE.		
228	SI IL Y A UNE AUTRE FEMME, ALLEZ À 202 À LA PAGE SUIVANTE; S'IL N'Y A PLUS DE FEMMES, METTEZ FIN À L'INTERVIEW.		

	FEMME 2		ALLEZ À
202	VÉRIFIEZ LE RÉSULTAT CAPI : ENREGISTREZ LE NOM ET LE NUMÉRO DE LIGNE DE LA FEMME.	NOM _____ NUMÉRO DE LIGNE . . . ☐☐	
203	VÉRIFIEZ LE RÉSULTAT CAPI POUR L'ÂGE :	15-17 ANS . . . . . 1 18-49 ANS 2	
204	VÉRIFIEZ LE RÉSULTAT CAPI POUR L'ÉTAT MATRIMONIAL :	JAMAIS EN UNION . . . . . 1 AUTRE 2	
205	POIDS EN KILOGRAMMES.	KG. . . . . ☐☐☐.☐☐ ABSENTE . . . . . 99994 REFUS . . . . . 99995 AUTRE 99996	→ 207
206	LA FEMME PORTAIT-ELLE UNIQUEMENT DES VÊTEMENTS LÉGERS ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
207	TAILLE EN CENTIMÈTRES.	CM. . . . . ☐☐☐.☐ ABSENTE . . . . . 9994 REFUS . . . . . 9995 AUTRE 9996	→ 209
208	LA MESURE ENREGISTRÉE A-T-ELLE ÉTÉ GÊNÉE PAR DES CHEVEUX TRESSÉS OU COIFFÉS ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
209	INSCRIVEZ LE NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ MESUREUR.	☐☐☐☐ NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ	
210	INSCRIVEZ LE NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ ASSISTANT MESUREUR SI PAS DE MESUREUR ASSISTANT, INSCRIRE 9999.	☐☐☐☐ NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ	
211	DATE DU JOUR :	JOUR . . . . . ☐☐ MOIS . . . . . ☐☐ ANNÉE . . . . . ☐☐☐☐	
212	VÉRIFIEZ 203 : AGÉE DE 15-17 ANS ☐ ↓	AGÉE DE 18-49 ANS ☐	→ 214
213	VÉRIFIEZ 204 : AUTRE ☐ ↓	JAMAIS EN UNION ☐	→ 217

	FEMME 2	ALLEZ À

CONSENTEMENT ADULTE

CONSENTEMENT DE L'ENQUÊTÉE ADULTE POUR LE TEST D'ANÉMIE

214	DEMANDEZ LE CONSENTEMENT POUR LE TEST D'ANÉMIE : Dans cette enquête, nous demandons à des gens dans tout le pays de participer au test d'anémie. L'anémie est un problème de santé sérieux qui résulte généralement d'une alimentation pauvre, d'infection ou de maladie chronique. Les résultats de cette enquête permettront d'aider le gouvernement à développer des programmes pour prévenir et traiter l'anémie. Pour le test d'anémie, nous avons besoin de gouttes de sang d'un doigt. Pour ce test, on utilise un équipement propre et sans risque. Il n'a jamais été utilisé auparavant et sera jeté après chaque test. Le sang sera testé pour l'anémie immédiatement et le résultat vous sera communiqué tout de suite. Les résultats sont strictement confidentiels et ne seront transmis à personne en dehors de l'équipe de l'enquête. Avez-vous des questions à me poser? Vous pouvez dire oui ou non. C'est votre décision. Voulez-vous participer au test d'anémie ?		
215	ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIÉ.	ACCORDÉ . . . . . 1 REFUSÉ . . . . . 2 ABSENT/AUTRE 3	
216	SIGNEZ ET INSCRIVEZ LE NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ MESUREUR DU NIVEAU D'HÉMOGLOBINE.	_____ (SIGNATURE) ☐☐☐☐ NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ	→ 225

	FEMME 2	ALLEZ À

PARENT/ADULTE RESPONSABLE

217	INSCRIVEZ LE NOM DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE L'ENQUÊTÉE MINEURE.	NOM _____ NUMÉRO DE LIGNE DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE ☐☐

CONSENTEMENT DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE POUR LE TEST D'ANÉMIE

218	DEMANDEZ LE CONSENTEMENT DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE POUR LE TEST D'ANÉMIE : Dans cette enquête, nous demandons à des gens dans tout le pays de participer au test d'anémie. L'anémie est un problème de santé sérieux qui résulte généralement d'une alimentation pauvre, d'infection ou de maladie chronique. Les résultats de cette enquête permettront d'aider le gouvernement à développer des programmes pour prévenir et traiter l'anémie. Pour le test d'anémie, nous avons besoin de gouttes de sang d'un doigt. Pour ce test, on utilise un équipement propre et sans risque. Il n'a jamais été utilisé auparavant et sera jeté après chaque test. Le sang sera testé pour l'anémie immédiatement et le résultat vous sera communiqué à vous et à (NOM DE LA MINEURE} tout de suite. Les résultats sont strictement confidentiels et ne seront transmis à personne en dehors de l'équipe de l'enquête. Avez-vous des questions à me poser? Vous pouvez dire oui ou non. C'est votre décision. Autorisez-vous (NOM DE LA MINEURE) à participer au test d'anémie?	
219	ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIÉ.	ACCORDÉ . . . . . 1 PARENT/ADULTE RESPONSABLE A REFUSÉ . 2 ABSENT/AUTRE 3
220	SIGNEZ ET INSCRIVEZ LE NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ MESUREUR DU NIVEAU D'HÉMOGLOBINE.	_____ (SIGNATURE) ☐☐☐☐ NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ
221	VÉRIFIEZ 219 : CONSENTEMENT ACCORDÉ ☐ CONSENTEMENT REFUSÉ OU ABSENT/AUTRE ☐	→ 225

CONSENTEMENT ENQUÊTÉE MINEURE

CONSENTEMENT DE L'ENQUÊTÉE MINEURE POUR LE TEST

222	DEMANDEZ LE CONSENTEMENT POUR UN TEST D'ANÉMIE À L'ENQUÊTÉE MINEURE : Dans cette enquête, nous demandons à des gens dans tout le pays de participer au test d'anémie. L'anémie est un problème de santé sérieux qui résulte généralement d'une alimentation pauvre, d'infection ou de maladie chronique. Les résultats de cette enquête permettront d'aider le gouvernement à développer des programmes pour prévenir et traiter l'anémie. Pour le test d'anémie, nous avons besoin de gouttes de sang d'un doigt. Pour ce test, on utilise un équipement propre et sans risque. Il n'a jamais été utilisé auparavant et sera jeté après chaque test. Le sang sera testé pour l'anémie immédiatement et le résultat vous sera communiqué à vous et à (NOM DU PARENT/ADULTE RESPONSABLE) tout de suite. Les résultats sont strictement confidentiels et ne seront transmis à personne en dehors de l'équipe de l'enquête. Avez-vous des questions à me poser? Vous pouvez dire oui ou non. C'est votre décision. Voulez-vous participer au test d'anémie?	
223	ENCERCLEZ LE CODE APPROPRIÉ	ACCORDÉ . . . . . 1 ENQUÊTÉE MINEURE A REFUSÉ . . . . . 2 ABSENTE/AUTRE 3
224	SIGNEZ ET INSCRIVEZ LE NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ MESUREUR DU NIVEAU D'HÉMOGLOBINE.	_____ (SIGNATURE) ☐☐☐☐ NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ

MESURE DU POIDS, DE LA TAILLE ET DU NIVEAU D'HÉMOGLOBINE DES FEMMES DE 15-49 ANS

	FEMME 2		ALLEZ À
225	INSCRIVEZ LE NIVEAU D'HÉMOGLOBINE ICI ET DANS LA BROCHURE SUR L'ANTHROPOMÉTRIE ET L'ANÉMIE.	G/DL . . . . . □□.□ ABSENTE . . . . . 994 REFUS . . . . . 995 AUTRE 996	→ 228
226	VÉRIFIEZ 225 : RÉSULTAT HÉMOGLOBINE	EN-DESSOUS 8.0 G/DL, ANÉMIE SÉVÈRE . . . . . 1 8.0 G/DL OU PLUS 2	→ 228
227	Le test pour le diagnostic d'anémie montre que vous avez une anémie sévère. Vous êtes très malade et vous devez vous rendre immédiatement dans un établissement de santé. ENREGISTREZ LE RÉSULTAT DU TEST D'ANÉMIE SUR LA FICHE DE RÉFÉRENCE POUR L'ANÉMIE SÉVÈRE.		
228	SI IL Y A UNE AUTRE FEMME, ALLEZ À 202 DU QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE; S'IL N'Y A PLUS DE FEMMES, METTEZ FIN À L'INTERVIEW		

OBSERVATIONS DU TECHNICIEN DE SANTÉ

À REMPLIR, UNE FOIS L'ENQUÊTE SUR LES BIOMARQUEURS TERMINÉE

OBSERVATIONS DU CHEF D'ÉQUIPE

Date: 03 dec 2023

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INSTAT)

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE SECTEUR SANTÉ, DEVELOPPEMENT SOCIAL ET PROMOTION DE LA FAMILLE (CPS/SSDSPF)

SEPTIÈME ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ AU MALI
EDSM-VII
QUESTIONNAIRE DE L'AGENT DE TERRAIN

LANGUE DU QUESTIONNAIRE FRANÇAIS

NO.	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
100	Quel est votre nom ? INSCRIVEZ VOTRE NOM ET PRENOM	NOM _____ _____	
101	INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE L'AGENT DE TERRAIN	NUMÉRO	

INSTRUCTIONS

Dans le cadre de EDSM-VII, nous collectons des informations sur tous les agents de terrain de l'EDSM-VII. Veuillez répondre aux questions ci-dessous. Les informations que vous fournirez feront partie du fichier de données de l'enquête ; cependant, votre nom sera supprimé et ne fera pas partie du fichier de données. Merci de fournir les informations nécessaires.

102	Dans quelle région vivez-vous ?	KAYES . . . . . 01 KOULIKORO . . . . . 02 SIKASSO . . . . . 03 SÉGOU . . . . . 04 MOPTI . . . . . 05 TOMBOUCTOU . . . . . 06 GAO . . . . . 07 KIDAL . . . . . 08 BAMAKO . . . . . 09 TAOUDENIT . . . . . 10 MÉNAKA . . . . . 11 EN DEHORS DU MALI/À L'ÉTRANGER 96	
103	Vivez-vous à Bamako, dans une autre ville ou en zone rurale ?	BAMAKO . . . . . 1 AUTRE VILLE . . . . . 2 ZONE RURALE 3	
104	Quel âge avez-vous ? INSCRIVEZ L'ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES	ÂGE	
105	Êtes-vous un homme ou une femme ?	HOMME . . . . . 1 FEMME 2	
106	Quel est votre état matrimonial actuel ?	ACTUELLEMENT MARIÉ . . . . . 1 VIT AVEC UN HOMME/UNE FEMME . . . . . 2 VEUF/VEUVE . . . . . 3 DIVORCÉ . . . . . 4 SÉPARÉ . . . . . 5 JAMAIS MARIÉ OU N'A JAMAIS VÉCU AVEC HOMME/FEMME 6	
107	Combien d'enfants vivants avez-vous ? INCLURE SEULEMENT VOS ENFANTS BIOLOGIQUES.	ENFANTS VIVANTS	
108	Avez-vous eu un enfant qui est décédé ?	OUI . . . . . 1 NON 2	

NO.	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
109	Quel est le plus haut niveau d'études que vous avez atteint : fondamental 1 (1er cycle), fondamental 2 (2nd cycle), secondaire (lycée, technique, professionnel) ou supérieur ?	FONDAMENTAL 1er Cycle . . . . . 1 FONDAMENTAL 2nd Cycle . . . . . 2 SECONDAIRE (Lycée/Technique/Professionnel) 3 SUPÉRIEUR 4	
110	Quelle est la [CLASSE/ANNÉE] la plus élevée que vous avez atteint à ce niveau ? SI MOINS D'UNE ANNÉE A ÉTÉ ACHEVÉE À CE NIVEAU, INSCRIVEZ '00'.	[CLASSE/ANNÉE] . . . . . ☐☐	

FONDAMENTAL 1er Cycle = 1	FONDAMENTAL 2nd Cycle = 2	SECONDAIRE Lycée, Enseignement Technique/Professionnel =3	SUPÉRIEUR = 4
MOINS D'1 AN. . = 0	MOINS D'1 AN. . = 0	MOINS D'1 AN. . = 0	MOINS D'1 AN. . = 0
1ère année . = 1	7ème année . = 1	1ère/10ème année . = 1	1ère année . = 1
2ème année . = 2	8ème année . = 2	2ème/11ème année . = 2	2ème année . = 2
3ème année . = 3	9ème année . = 3	3ème/12ème année . = 3	3ème année . = 3
4ème année . = 4		4ème année . . = 4	4ème année . = 4
5ème année . = 5			5ème année+ . = 5
6ème année . = 6			

110A	Avez-vous déjà reçu une formation clinique, médicale ou de laboratoire ou travaillé dans le secteur de la santé ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 111
110B	Quelle est votre activité professionnelle ou votre qualification actuelle ? Par exemple, êtes-vous une infirmière diplômée, un médecin ou un technicien de laboratoire ?	MÉDECIN/DOCTEUR EN MÉDECINE . . . . . 01 ASSISTANT MÉDICAL . . . . . 02 CLINICIEN(NE) . . . . . 03 ASSISTANT CLINICIEN(NE) . . . . . 04 INFIRMIÈRE/SAGE-FEMME DIPLÔMÉE . . . . . 05 INFIRMIÈRE LICENCIÉ(E)/BREVETÉ(E) . . . . . 06 AIDE-SOIGNANT(E)/INFIRMIÈRE AUXILIAIRE/ AIDE-INFIRMIER(E) . . . . . 07 CHERCHEUR EN LABORATOIRE . . . . . 08 TECHNOLOGISTE BIOMÉDICAL(E) . . . . . 09 TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE . . . . . 10 ASSISTANT(E) DE LABORATOIRE . . . . . 11 AUCUNE QUALIFICATION TECHNIQUE . . . . . 95 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
111	Quelle est votre religion ?	MUSULMANE . . . . . 01 CATHOLIQUE . . . . . 02 PROTESTANT . . . . . 03 AUTRE RELIGION CHRÉTIENNE 04 ANIMISTE . . . . . 05 SANS RELIGION . . . . . 06 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	

NO.	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
112	Quelle est votre ethnie ?	**CODE ETHNIE (Pour les MALIENS)** BAMBARA . . . . . 01 MALINKE . . . . . 02 PEULH . . . . . 03 SARAKOLE/SONINKE/MARKA . . . . . 04 KASSONKE . . . . . 05 SONRAÏ . . . . . 06 DOGON . . . . . 07 TOUAREG/BELLA . . . . . 08 SÉNOUFO/MINIANKA . . . . . 09 BOBO . . . . . 10 BOZO . . . . . 11 ARABE/MAURE . . . . . 12 AUTRE ETHNIE MALIENNE _____ 16 (PRÉCISEZ) **CODE NATIONALITÉ (Pour les ÉTRANGERS)** PAYS CEDEAO . . . . . 21 AUTRES PAYS AFRICAINS . . . . . 22 AUTRES NATIONALITÉS 23	
113	Quelles langues parlez-vous ? INSCRIVEZ TOUTES LES LANGUES QUE VOUS PARLEZ.	FRANÇAIS . . . . . A BAMBARA/MALINKÉ . . . . . B SONRAÏ/DJERMA . . . . . C PEUHL/FOULFOULDÉ . . . . . D SÉNOUFO . . . . . E MARKA/SONINKÉ . . . . . F DOGON . . . . . G MINIANKA . . . . . H TAMACHECK . . . . . I BOBO/DAFING . . . . . J BOZO . . . . . K AUTRE _____ X (PRÉCISEZ)	
114	Quelle est votre langue maternelle/natale (langue parlée à la maison quand vous étiez jeune) ?	FRANÇAIS . . . . . 01 BAMBARA/MALINKÉ . . . . . 02 SONRHAÏ/DJERMA . . . . . 03 PEUHL/FOULFOULDÉ . . . . . 04 SÉNOUFO . . . . . 05 MARKA/SONINKÉ . . . . . 06 DOGON . . . . . 07 MINIANKA . . . . . 08 TAMACHECK . . . . . 09 BOBO/DAFING . . . . . 10 BOZO . . . . . 11 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
115	Avez-vous déjà travaillé sur: a) une Enquête Démographique de Santé (EDS) ? b) une Enquête sur les Indicateurs du Paludisme (EIP) c) une autre enquête avant celle-ci ?	OUI NON a) EDS . . . . . 1 2 b) EIP . . . . . 1 2 c) UNE AUTRE ENQUETE 1 2	
116	Est-ce que vous travailliez déjà pour l'INSTAT au moment où vous étiez employé pour travailler sur cette EDSM-VII ?	OUI, INSTAT . . . . . 1 NON 3	→ 118
117	Êtes-vous un employé permanent ou temporaire de l'INSTAT ?	PERMANENT . . . . . 1 TEMPORAIRE 2	
118	Si vous avez des commentaires, s'il vous plait, écrivez-les ici.		

DATE : 30 nov 2023

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INSTAT)

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE SECTEUR SANTÉ, DEVELOPPEMENT SOCIAL ET PROMOTION DE LA FAMILLE (CPS/SSDSPF)

SEPTIÈME ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ AU MALI
EDSM-VII
QUESTIONNAIRE RE-MESURE

IDENTIFICATION

NOM DE LA LOCALITÉ _____

NOM DU CHEF DE MÉNAGE _____

NUMÉRO DE GRAPPE . . . . . | | | | |

NUMÉRO DE CONCESSION . . . . . | | | | |

NUMÉRO DU MÉNAGE . . . . . | | | | |

VISITES DU TECHNICIEN DE SANTÉ

	1	2	3	VISITE FINALE
DATE	_____	_____	_____	JOUR | |
				MOIS | |
NOM DU TECHNICIEN DE SANTÉ	_____	_____	_____	ANNÉE | | | |
PROCHAINE DATE VISITE	_____	_____		NOMBRE TOTAL DE VISITES | |
HEURE	_____	_____		

NOTES DU TECHNICIEN DE SANTÉ :

TOTAL D'ENFANTS ÉLIGIBLES \| \|

LANGUE DU QUESTIONNAIRE** **0 1** | LANGUE DE L'INTERVIEW** \| \| | LANGUE MATERNELLE DE L'ENQUÊTÉ** \| \| | INTERPRÈTE (OUI = 1, NON = 2) \|

LANGUE DU QUESTIONNAIRE** **FRANÇAIS**

**CODES LANGUES :

01 FRANÇAIS	07 DOGON
02 BAMBARA/MALINKÉ	08 MINIANKA
03 SONRAÏ/DJERMA	09 TAMACHECK
04 PEUHL/FOULFOULDÉ	10 BOBO/DAFING
05 SÉNOUFO	11 BOZO
06 MARKA/SONINKÉ	96 AUTRE

_____ (PRÉCISEZ)

ÉQUIPE \| \| NUMÉRO

CHEF D'ÉQUIPE

_____ NOM

\| \| \| \| NUMÉRO

MESURE DU POIDS ET DE LA TAILLE DES ENFANTS SELECTIONNÉS DE 0-4 ANS

101	VÉRIFIEZ LE RAPPORT CAPI POUR LES ENFANTS SELECTIONNÉS POUR LA RE-MESURE. INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE LIGNE ET LE NOM POUR LE PREMIER ENFANT SELECTIONNÉ À LA QUESTION 102 SUR CETTE PAGE. S'IL Y A PLUS D'UN ENFANT SELECTIONNÉ DANS UN MÉNAGE, UTILISER UN (DES) QUESTIONNAIRE(S) SUPPLÉMENTAIRE(S).		
	ENFANT À RE-MESURER		ALLEZ À
102	VÉRIFIEZ LE RAPPORT CAPI: ENREGISTREZ LE NOM ET LE NUMÉRO DE LIGNE DE L' ENFANT.	NOM _____ NUMÉRO DE LIGNE . . . ☐☐	
103	VÉRIFIEZ LE RAPPORT CAPI: ENREGISTREZ LA DATE DE NAISSANCE DE L' ENFANT.	JOUR . . . . . ☐☐ MOIS . . . . . ☐☐ ANNÉE . . . . . ☐☐☐☐	
104	VÉRIFIEZ LE RAPPORT CAPI: ENREGISTREZ L'ÂGE DE L'ENFANT. COMPAREZ ET CORRIGEZ 103 ET/OU 104 SI INCOHÉRENT.	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES ☐	
105	VÉRIFIEZ 104 : L'ENFANT A 0-4 ANS? OUI ☐ NON ☐		→ 116
106	POIDS EN KILOGRAMMES.	KG. . . . . ☐☐.☐☐ ABSENT . . . . . 9994 REFUS . . . . . 9995 AUTRE 9996	→ 108
107	L'ENFANT ÉTAIT-IL HABILLÉ LÉGÈREMENT?	OUI . . . . . 1 NON 2	
108	TAILLE EN CENTIMÈTRES. SI L' ENFANT A 0-1 AN, MESUREZ EN POSITION ALLONGÉE. SI L' ENFANT A 2, 3, OU 4 ANS, MESUREZ EN POSITION DEBOUT.	CM. . . . . ☐☐☐.☐ ABSENT . . . . . 9994 REFUS . . . . . 9995 AUTRE 9996	→ 113
109	L'ENFANT A T-IL ÉTÉ MESURÉ EN POSITION ALLONGÉE OU DEBOUT?	ALLONGÉ . . . . . 1 DEBOUT 2	
110	VÉRIFIEZ 104 ET 109: SUR LA BASE DE L'ÂGE DE L'ENFANT, LA PROCÉDURE CORRECTE POUR LA MESURE A T-ELLE ÉTÉ SUIVIE ?	OUI . . . . . 1 NON 2	→ 112
111	SI L'ENFANT A 0-1 AN : POURQUOI (NOM) A-T-IL ÉTÉ MESURÉ EN POSITION DEBOUT? SI L'ENFANT A 2-4 ANS : POURQUOI (NOM) A-T-IL ÉTÉ MESURÉ EN POSITION ALLONGÉE? _____ _____		
112	LA MESURE ENREGISTRÉE A-T-ELLE ÉTÉ GÊNÉE PAR DES CHEVEUX TRESSÉS OU COIFFÉS ?	OUI . . . . . 1 NON 2	
113	INSCRIVEZ LE NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ MESUREUR.	☐☐☐☐ NUMÉRO DU TECHNICIEN DE	
114	INSCRIVEZ LE NUMÉRO DU TECHNICIEN DE SANTÉ ASSISTANT MESUREUR	☐☐☐☐ NUMÉRO DU TECHNICIEN DE	
115	DATE DU JOUR	JOUR . . . . . ☐☐ MOIS . . . . . ☐☐ ANNÉE . . . . . ☐☐☐☐	
116	S' IL Y A UN AUTRE ENFANT, ALLEZ À 102 À DU QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE; S'IL N'Y A PLUS D'ENFANTS, TERMINEZ L'INTERVIEW.		

AUTRES OUTILS DU DHS PROGRAM

Le site web du DHS Program – Télécharger gratuitement les rapports EDS, la documentation standard, les données sur les indicateurs clés ainsi que les outils de formation et les annonces.	DHSprogram.com	
STATcompiler – Créer des tableaux, des graphiques et des cartes personnalisés, en utilisant les données de 90 pays et des milliers d'indicateurs.	Statcompiler.com/fr/	
L'application mobile du DHS Program – Accéder aux indicateurs clés EDS pour 90 pays sur votre appareil mobile (Apple et Android).	Recherchez DHS Program dans iTunes ou Google Play store	
Le forum des utilisateurs du DHS Program – Poser vos questions sur les données EDS et consultez les archives de notre foire aux questions.	userforum.DHSprogram.com	
Vidéos didacticiels – Découvrir les principaux aspects des enquêtes EDS, notamment les modes d'échantillonnage et de pondération, le téléchargement des bases de données, et la manière de lire les tableaux EDS.	www.youtube.com/DHSProgram	
Bases de données – Télécharger des bases de données pour les analyser.	DHSprogram.com/Data	
Dépôt de données spatiales – Télécharger des données EDS liées à la géographie pour établir une cartographie dans un système d'information géographique (SIG).	spatialdata.DHSprogram.com	
Le Centre d'apprentissage – Accéder à des cours en ligne pour un apprentissage autonome et la participation à des ateliers, à des communautés de pratique et à d'autres ressources de formation.	Learning.DHSprogram.com	
GitHub – Accès libre au code Stata, SPSS et R pour les indicateurs EDS pour une utilisation publique.	Github.com/DHSprogram	

YouTube
www.youtube.com/DHSprogram

Blog
Blog.DHSprogram.com