

CAPÍTULO 10

CONOCIMIENTOS Y FORMAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES VAGINALES, DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS) Y SIDA

En los cuestionarios individual de mujeres y de hombres se incluyó un módulo especial para el estudio de aspectos relacionados con las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y el SIDA. Este capítulo contiene la información sobre el conocimiento general que poseían las(os) entrevistadas(os) acerca de estas enfermedades, las principales fuentes de información sobre SIDA, y los cambios de conducta sexual, entre otros aspectos.

10.1 CONOCIMIENTO, PADECIMIENTO, Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES VAGINALES, DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS) Y SIDA

En el Cuadro 10.1 se presentan los porcentajes de mujeres en edad fértil que conocen cada una de las enfermedades vaginales, de transmisión sexual y el SIDA según características seleccionadas. Prácticamente todas las mujeres entrevistadas, sin importar su edad, estado conyugal, nivel de educación o residencia, han oído hablar sobre el SIDA. Asimismo, se observa un conocimiento relativamente elevado sobre las enfermedades vaginales y sobre otras enfermedades de transmisión sexual. El conocimiento de las diferentes enfermedades es más elevado conforme aumenta la edad de la mujer. Con relación a la situación conyugal, las mujeres solteras presentan menores niveles de conocimientos que las algunas vez casadas o unidas. Según residencia, las mujeres de las zonas urbanas, el Distrito Nacional y la región I poseen un mayor conocimiento. Como es de esperarse, el mayor nivel educativo está asociado con un conocimiento más elevado sobre cada una de estas enfermedades.

En relación a la incidencia de enfermedades vaginales y de transmisión sexual (Cuadro 10.2), el 33 por ciento de las mujeres entrevistadas tuvo una enfermedad vaginal o ETS durante los 12 meses anteriores a la encuesta. La mayor frecuencia corresponde a las infecciones vaginales (27 por ciento), seguida por las enfermedades pélvicas inflamatorias (9 por ciento), clamidia (6 por ciento) y úlceras o llagas genitales (2 por ciento) (Véase Gráfico 10.1).

Un 93 por ciento de las mujeres que presentaron enfermedades vaginales o de transmisión sexual buscó consejo o tratamiento médico y el 82 por ciento tomó alguna medida de precaución (Cuadro 10.3). Entre las medidas tomadas, el 72 por ciento informó a su compañero, 42 por ciento evitó las relaciones sexuales, un 1 por ciento usó condones y el 46 por ciento tomó medicamentos.

Cuadro 10.1. Conocimiento de enfermedades de transmisión sexual

Porcentaje de entrevistadas por conocimiento específico de enfermedades vaginales y de transmisión sexual según características seleccionadas, República Dominicana 1996

Características	Sífilis	Gono- rea	SIDA	Úlceras genitales	Infec- ción vaginal	Enfer- medad pélvica inflam.	Cla- mia	Herpes genital	Chan- croide	Condi- loma	Otra enferme- dad	No conoce ninguna	Total de mujeres
Edad													
15-19	48.5	67.0	99.6	41.3	77.3	40.3	27.3	23.4	21.8	26.3	21.0	8.4	1,801
20-24	68.3	85.1	99.9	55.4	91.2	58.2	34.6	27.8	35.8	37.1	20.6	2.7	1,584
25-29	77.9	86.9	99.8	61.6	94.1	67.7	38.0	29.8	46.0	40.9	20.1	1.5	1,400
30-39	83.3	88.3	99.6	71.2	95.7	72.9	45.1	36.6	55.2	52.7	22.8	1.1	2,224
40-49	84.9	88.2	99.5	74.2	95.3	77.2	45.4	37.1	60.2	57.7	18.2	1.6	1,412
Estado marital actual													
Actualmente unida	74.1	84.6	99.6	65.1	93.2	68.1	39.8	30.7	47.9	46.2	19.3	2.3	4,983
Alguna vez en unión	79.7	88.7	99.7	65.4	94.1	67.8	43.0	32.7	50.5	50.7	22.5	1.9	1,287
Nunca en unión	63.9	75.5	99.8	47.7	82.4	48.4	31.7	31.0	29.9	31.1	23.1	5.9	2,152
Ha tenido sexo	74.2	83.5	99.9	58.4	91.1	59.8	45.1	42.0	42.3	40.4	21.3	1.8	287
No ha tenido sexo	62.3	74.3	99.8	46.1	81.0	46.7	29.6	29.3	28.0	29.6	23.4	6.5	1,865
Zona													
Urbana	78.3	85.6	99.9	61.5	91.9	64.5	39.8	34.9	45.4	44.4	21.4	2.3	5,613
Rural	60.5	77.5	99.2	59.2	88.0	60.2	34.9	23.4	40.3	40.2	19.5	9.7	2,809
Región													
Distrito Nacional	79.4	85.3	99.9	63.7	91.4	62.8	40.4	36.7	41.9	42.0	17.3	2.4	2,848
Región I	72.6	87.3	99.7	66.2	91.4	70.0	38.1	29.2	50.7	45.3	31.9	2.2	1,152
Región II	71.4	82.0	99.9	57.4	92.2	63.4	35.0	27.8	39.1	41.6	20.6	3.1	1,587
Región III	66.0	79.0	99.8	58.1	91.0	62.6	39.0	27.5	39.6	46.3	17.4	2.9	719
Región IV	67.5	79.2	99.1	57.6	87.1	56.5	33.0	25.7	43.2	40.2	14.2	5.6	357
Región V	68.0	79.5	99.0	56.5	88.3	60.6	37.5	30.2	47.7	41.9	24.0	4.0	962
Región VI	54.5	74.9	98.7	55.1	85.3	55.7	39.0	26.7	43.3	41.6	13.3	6.7	401
Región VII	69.2	82.9	99.9	60.1	89.5	62.6	39.4	27.1	53.5	49.9	26.6	3.5	394
Nivel de educación¹													
Sin educación	50.1	66.3	96.9	48.0	79.2	51.6	32.5	19.2	35.6	35.7	10.4	10.9	592
Primaria 1-4	59.1	77.2	99.5	57.7	88.6	61.1	37.4	23.3	41.6	43.8	17.1	4.7	1,523
Primaria 5-8	65.7	80.4	99.9	59.2	89.0	61.0	35.9	25.2	39.9	41.8	18.1	3.6	2,634
Secundaria	82.1	87.4	100.0	61.9	93.1	62.6	37.7	33.6	43.4	41.3	23.4	1.1	2,561
Superior	96.0	95.3	100.0	72.6	97.3	77.5	49.0	56.4	60.6	52.5	31.9	0.4	1,111
Total	72.4	82.9	99.7	60.7	90.6	63.0	38.2	31.1	43.7	43.0	20.8	3.1	8,422

¹ Se excluyen 2 casos sin información


Cuadro 10.2 Enfermedades de transmisión sexual en el último año

Porcentaje de entrevistadas con infecciones vaginales y enfermedades de transmisión sexual durante los 12 meses anteriores a la encuesta por enfermedad sexual específica transmitida, según características sociodemográficas, República Dominicana 1996

Característica	Enfermedad										Tuvo alguna	No tuvo ninguna	Total de mujeres
	Sífilis	Gono- rrea	Ulceras genitales	Infec- ción vaginal	Infec- ción pélvica inflamato- ria	Clamidia	Herpes genital	Chan- croide	Condi- loma	Otro			
Edad													
15-19	0.0	0.0	0.2	15.2	2.3	3.5	0.9	0.0	0.1	0.0	18.0	82.0	1,801
20-24	0.2	0.1	1.4	25.2	6.7	5.0	0.4	0.1	0.2	0.2	30.9	69.1	1,584
25-29	0.2	0.0	2.9	32.8	10.7	6.1	1.0	0.0	0.2	0.2	39.8	60.2	1,400
30-39	0.6	0.0	3.1	32.5	11.7	8.2	1.1	0.0	0.2	0.1	40.7	59.3	2,224
40-49	0.4	0.1	3.8	28.8	11.9	7.7	1.0	0.0	0.2	0.1	35.0	65.0	1,412
Estado marital actual													
Actualmente unida	0.4	0.0	3.1	32.7	11.0	7.8	0.9	0.1	0.2	0.2	39.7	60.3	4,983
Alguna vez en unión	0.4	0.0	2.9	25.4	9.4	5.1	0.9	0.0	0.3	0.1	32.1	67.9	1,287
Nunca en unión	0.1	0.0	0.0	14.1	2.8	3.1	0.7	0.0	0.1	0.0	17.6	82.4	2,152
Zona													
Urbana	0.3	0.0	2.7	26.9	9.3	6.2	0.9	0.0	0.2	0.1	33.8	66.2	5,613
Rural	0.2	0.0	1.4	26.7	7.3	6.1	0.9	0.0	0.1	0.1	31.1	68.9	2,809
Región													
Distrito Nacional	0.6	0.0	4.5	29.5	10.5	6.8	1.1	0.1	0.3	0.1	38.0	62.0	2,848
Región I	0.0	0.0	0.9	19.9	5.7	5.3	0.9	0.0	0.1	0.1	24.6	75.4	1,152
Región II	0.0	0.1	1.0	26.2	7.2	5.3	0.5	0.0	0.0	0.1	30.5	69.5	1,587
Región III	0.3	0.1	1.3	30.1	9.3	7.2	0.7	0.0	0.2	0.1	34.5	65.5	719
Región IV	0.3	0.2	1.6	27.2	9.3	4.9	0.6	0.1	0.1	0.0	32.6	67.4	357
Región V	0.4	0.0	0.8	25.6	8.9	5.7	1.2	0.0	0.3	0.1	31.1	68.9	962
Región VI	0.3	0.0	1.8	24.5	7.0	6.9	0.4	0.0	0.2	0.2	30.3	69.7	401
Región VII	0.3	0.2	1.2	30.3	8.5	7.3	0.8	0.1	0.2	0.1	34.6	65.4	394
Nivel de educación¹													
Sin educación	0.2	0.1	1.3	24.3	8.2	6.3	2.4	0.1	0.1	0.0	29.8	70.2	592
Primaria 1-4	0.7	0.0	1.8	31.0	8.5	7.9	0.6	0.0	0.3	0.2	36.7	63.3	1,523
Primaria 5-8	0.3	0.0	2.6	27.4	9.6	7.0	1.0	0.1	0.3	0.1	33.4	66.6	2,634
Secundaria	0.1	0.1	2.7	24.5	8.1	4.8	0.7	0.0	0.1	0.1	30.9	69.1	2,561
Superior	0.1	0.0	1.5	26.9	8.0	4.8	0.5	0.0	0.0	0.2	33.0	67.0	1,111
Total	0.3	0.0	2.3	26.9	8.6	6.2	0.9	0.0	0.2	0.1	32.9	67.1	8,422

¹ Se excluyen 2 casos sin información

Gráfico 10.1
Porcentaje de Mujeres Padeciendo Enfermedades de Transmisión Sexual Durante el Último Año



10.2 MEDIOS DE INFORMACIÓN SOBRE EL SIDA

La televisión es el medio principal a través del cual las mujeres entrevistadas han aprendido más sobre el SIDA. El 80 por ciento de las entrevistadas señaló este medio como principal fuente de información, seguida por la radio (72 por ciento), amigos o parientes (46 por ciento), prensa escrita (33 por ciento), folletos (17 por ciento), trabajadores de la salud (11 por ciento, ver Cuadro 10.4).

En la zona rural, la radio y los amigos o familiares son los medios más importantes en la transmisión de conocimientos acerca del SIDA. Los demás medios han tenido mayor receptividad en las zonas urbanas. De acuerdo a la región de residencia, la radio es la principal fuente de información en la región V (85 por ciento), mientras que en la región VI es donde ha tenido menos impacto en la transmisión de conocimientos sobre la enfermedad. La televisión, los periódicos, revistas, folletos han jugado un papel muy importante en el aprendizaje acerca del SIDA en el Distrito Nacional. En tanto, los amigos y parientes han aportado al conocimiento en las demás regiones, visto que más de un 50 por ciento de las mujeres declaró que fue a través de esta fuente que se enteró sobre dicha enfermedad.

Cuadro 10.3 Enfermedad sexual transmitida en el último año

Entre las entrevistadas que tuvieron una enfermedad sexual transmitida en los 12 meses anteriores a la encuesta, el porcentaje que buscó consejo o tratamiento, el porcentaje que avisó a su compañero y el porcentaje de medidas tomadas para evitar infectar al compañero, según características sociodemográficas, República Dominicana 1996

Características	Porcentaje		Evitó sexo	Usó condones	Tomó medicina	Compañero infectado			Número de mujeres
	buscó tratamiento	informó compañero				Otro	ninguna medida	medida	
Edad									
<30	90.3	64.0	37.0	0.9	40.8	2.7	0.9	15.9	1,371
30+	94.8	79.5	46.3	0.4	51.8	3.3	1.0	19.1	1,400
Estado marital actual									
Actualmente unido	94.5	88.6	51.4	0.8	56.8	3.6	1.0	19.2	1,980
Nunca en unión	87.8	29.7	17.3	0.5	20.2	1.4	0.8	13.2	791
Zona									
Urbana	93.4	70.3	40.2	0.9	43.4	2.8	1.1	17.6	1,897
Rural	90.8	75.1	45.0	0.3	52.6	3.4	0.7	17.4	874
Nivel de educación									
Sin educación	84.6	75.4	43.1	0.0	51.7	2.2	0.4	25.0	176
Primaria 1-4	91.2	78.4	44.4	0.7	51.2	3.6	1.5	21.2	559
Primaria 5-8	92.8	72.1	40.6	0.5	46.6	3.7	0.4	18.1	879
Secundaria	93.1	68.0	41.2	0.6	44.5	2.6	0.7	14.2	790
Superior	96.9	67.6	40.6	1.9	39.6	1.4	2.3	13.9	366
Total	92.6	71.8	41.7	0.7	46.3	3.0	1.0	17.5	2,771

10.3 FORMAS DE PREVENCIÓN

Las cifras del Cuadro 10.5 presentan las respuestas dadas por las entrevistadas a la pregunta sobre cómo evitar el SIDA. Proporciones elevadas de mujeres mencionaron formas correctas de evitar la enfermedad: evitar transfusiones de sangre (90 por ciento); tener un sólo compañero sexual (89 por ciento); usar el condón (81 por ciento). El 4 y el 8 por ciento de las entrevistadas respondió que no se puede hacer nada, o que no sabe qué hacer para prevenir el SIDA respectivamente.

De otro lado, una proporción importante de la misma población mencionan formas inadecuadas o incorrectas de prevención, en particular "evitar picaduras de mosquitos" (56 por ciento), "evitar baños públicos" (55 por ciento), "no compartir comidas con enfermos de SIDA" (28 por ciento), "no tocar los enfermos de SIDA" (26 por ciento). Las mujeres de la zona rural y con menores niveles de educación son las que señalan, con más frecuencia, ideas equivocadas sobre la prevención y transmisión de esta enfermedad. A nivel de región no se observan diferencias importantes.

10.4 PERCEPCIONES SOBRE EL SIDA

Cuando se les preguntó a las entrevistadas si una persona que parece saludable puede tener SIDA, el 90 por ciento contestó afirmativamente (Cuadro 10.6). Las menos informadas son las adolescentes y de menor instrucción, de la zona rural y de las región VI.

Cuadro 10.4. Conocimiento de SIDA

Porcentaje de entrevistadas por conocimiento de SIDA por fuente de conocimiento, según características seleccionadas, República Dominicana 1996

Características	Fuente de conocimiento												Número de mujeres	Pro-medio de fuentes
	Conoce SIDA	Radio	TV	Periódico/Revista	Pan-fletos	Trabajador de salud	Iglesia	Escuela	Reunión co-munitaria	Amigos/Padres	Lugar de trabajo	Otras fuentes		
Edad														
15-19	99.6	67.7	78.0	33.4	18.6	6.3	2.1	26.4	5.9	43.3	1.5	1.7	1,801	2.9
20-24	99.9	74.1	81.1	37.9	19.0	9.7	2.0	10.3	5.4	41.7	4.4	1.7	1,584	2.9
25-29	99.8	73.3	82.5	34.9	17.3	11.9	1.4	3.9	6.3	44.1	5.1	1.5	1,400	2.8
30-39	99.6	71.6	80.6	32.3	17.4	13.6	2.7	2.9	7.2	46.2	6.1	1.9	2,224	2.8
40-49	99.5	72.7	77.9	25.4	13.2	11.3	4.4	2.4	7.5	55.4	5.7	1.1	1,412	2.8
Estado marital actual														
Actualmente unida	99.6	71.6	78.0	27.3	14.5	12.2	2.5	3.5	7.0	49.7	4.3	1.5	4,983	2.7
Soltera no tuvo sexo	99.7	73.5	82.7	33.9	16.7	11.0	2.2	3.8	6.3	48.0	6.8	1.0	1,287	2.9
Nunca en unión	99.8	70.8	83.1	45.1	23.8	6.9	2.6	26.4	5.6	35.8	3.9	2.2	2,152	3.1
Zona														
Urbana	99.9	70.2	85.5	40.1	21.0	11.3	2.7	10.8	6.8	40.0	5.7	1.8	5,613	3.0
Rural	99.2	74.7	69.0	18.4	9.7	9.3	2.1	6.5	5.9	57.8	2.3	1.2	2,809	2.6
Región														
Distrito Nacional	99.9	64.0	85.1	42.4	23.1	11.1	3.0	10.4	5.3	31.7	5.2	2.4	2,848	2.8
Región I	99.7	76.6	79.7	25.7	14.5	9.3	2.6	11.8	3.1	57.8	5.3	1.8	1,152	2.9
Región II	99.9	75.6	81.1	29.9	13.8	8.9	2.1	8.1	8.4	55.5	5.3	1.0	1,587	2.9
Región III	99.8	72.7	77.9	24.0	10.4	10.3	2.2	9.8	8.5	52.0	2.4	1.4	719	2.7
Región IV	99.1	67.2	66.8	20.7	15.2	11.1	2.7	7.5	8.9	49.5	2.7	1.5	357	2.6
Región V	99.0	85.3	80.0	36.4	16.7	13.5	2.3	7.7	7.3	45.4	4.7	0.8	962	3.0
Región VI	98.7	62.0	57.0	19.7	13.7	8.7	2.1	6.2	7.6	53.5	1.7	1.2	401	2.4
Región VII	99.9	75.8	79.1	28.5	15.8	13.8	1.0	8.7	9.1	54.6	3.7	0.6	394	2.9
Nivel de educación¹														
Sin educación	96.9	65.5	51.9	3.5	1.6	4.3	2.3	0.5	5.2	61.1	1.4	2.9	592	2.1
Primaria 1-4	99.5	67.6	65.4	10.9	5.5	10.3	2.2	1.4	6.2	63.6	2.0	1.0	1,523	2.4
Primaria 5-8	99.9	72.2	81.8	26.6	12.6	11.1	2.5	6.6	5.8	48.7	3.5	1.9	2,634	2.7
Secundaria	100.0	74.0	89.3	51.2	27.9	11.4	2.7	16.1	7.4	34.1	7.0	1.5	3,672	3.2
Total	99.7	71.7	80.0	32.9	17.2	10.6	2.5	9.4	6.5	45.9	4.6	1.6	8,422	2.8

¹ Se excluyen 2 casos sin información

Al preguntarles si la gente que tiene SIDA puede morir a causa de esa enfermedad el 92 por ciento contestó que es una enfermedad fatal, un 6 por ciento respondió que algunas veces y el 1 por ciento dijo que casi nunca mueren de esa enfermedad. Ese elevado conocimiento sobre la letalidad de esta enfermedad pareciera ser independiente de la edad, estado conyugal, residencia y nivel de instrucción de la mujer.

Cuadro 10.5. Conocimiento de formas para evitar el SIDA

Porcentaje de mujeres con conocimiento de formas para evitar el SIDA, según características seleccionadas, República Dominicana 1996

Características	Nada puede hacerse nada	Lleva buena dieta	Una sola pareja fiel	Evitar baño público	Usar condón	No tocar enfermo de SIDA	Caricias sin penetración	No comer con enfermo de SIDA	Evitar picadura mosquito	Inyección con agujas nuevas	No tener relaciones	Evitar transfus. de sangre	No conoce como evitar	Sin información	Total
Edad															
15-19	5.5	18.3	86.3	52.7	79.3	23.5	38.8	27.2	53.6	87.4	72.3	85.8	5.5	0.3	1,793
20-24	4.4	22.1	89.3	55.4	82.2	25.0	37.5	27.0	55.3	91.6	76.6	90.4	2.8	0.2	1,582
25-29	4.5	23.0	89.3	55.3	84.0	25.0	40.7	29.2	54.0	91.7	78.7	91.0	2.2	0.2	1,398
30-39	3.4	22.7	90.0	55.0	81.0	27.1	43.0	28.0	56.0	92.7	80.5	91.6	3.1	0.2	2,215
40-49	3.7	27.8	89.8	56.5	78.8	28.1	42.3	31.5	62.5	91.9	81.3	91.2	3.7	0.2	1,405
Estado marital actual															
Actualmente unida	4.5	24.8	88.7	55.7	79.4	27.3	41.3	28.9	58.6	90.4	78.7	89.4	3.8	0.2	4,961
Alguna vez en unión	4.1	22.5	88.4	56.5	84.1	27.7	42.0	31.2	57.4	92.8	80.7	91.9	2.3	0.3	1,284
Nunca en unión	3.8	17.4	89.8	52.1	82.8	21.1	38.0	25.7	49.7	91.5	74.3	90.2	3.6	0.2	2,148
Zona															
Urbana	3.2	20.6	91.0	55.0	83.1	23.5	39.3	27.7	53.9	93.4	77.4	92.5	2.3	0.2	5,607
Rural	6.3	26.4	84.8	54.7	76.8	30.4	43.0	29.9	60.5	86.4	78.7	84.9	6.0	0.3	2,786
Región															
Distrito Nacional	3.5	21.3	90.7	55.7	83.2	21.6	38.5	28.8	54.0	93.2	73.8	92.4	2.4	0.0	2,844
Región I	4.5	16.0	88.8	54.5	81.2	22.5	40.1	20.3	60.2	90.7	82.5	90.8	3.3	0.5	1,149
Región II	3.3	22.7	89.3	53.4	82.1	28.7	45.4	31.9	54.9	91.5	81.9	90.1	4.2	0.3	1,586
Región III	4.9	29.1	88.7	58.7	79.0	32.8	43.5	32.3	61.8	90.5	79.8	88.4	3.5	0.3	718
Región IV	5.5	29.1	87.5	56.9	78.0	28.4	41.1	24.5	56.4	88.2	72.7	86.8	4.8	0.2	354
Región V	5.6	23.7	88.2	52.2	79.2	27.9	38.0	28.8	54.9	90.3	77.9	88.3	2.6	0.1	952
Región VI	6.6	27.9	78.8	52.4	72.8	29.4	37.4	27.2	56.9	81.1	72.6	80.2	10.8	0.5	396
Región VII	5.0	23.6	88.8	56.6	78.9	30.3	40.4	31.5	56.3	90.3	83.4	88.7	3.2	0.2	394
Nivel de educación¹															
Sin educación	8.9	30.6	75.0	52.3	65.3	31.1	40.9	31.0	60.0	77.1	70.8	76.4	12.0	0.2	574
Primaria 1-4	7.5	30.6	81.4	59.0	73.8	33.9	40.3	34.3	64.2	83.4	76.5	82.4	7.3	0.4	1,515
Primaria 5-8	5.0	25.6	88.4	56.9	80.5	30.2	41.5	30.7	62.1	90.6	78.7	88.4	3.4	0.2	2,631
Secundaria	1.7	15.8	94.6	52.2	86.7	18.4	39.9	23.9	47.9	96.8	78.8	96.3	0.7	0.2	3,672
Total	4.3	22.6	88.9	54.9	81.0	25.8	40.5	28.4	56.1	91.1	77.8	90.0	3.5	0.2	8,394

¹ Se excluyen 2 casos sin información

Cuadro 10.6. Percepción del riesgo del SIDA

Percepción del riesgo del SIDA y riesgo sentido de contraer SIDA según características seleccionadas, República Dominicana 1996

Característica	Una persona saludable puede tener SIDA			El SIDA es una enfermedad mortal				Posibilidades que tiene de adquirir el SIDA					El SIDA puede curarse			El SIDA puede ser transmitido de madre a hijo			Conoce alguien con SIDA			Total de mujeres	
	No	Si	NS/SI ¹	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	NS/SI ¹	Nin-guna	Pe-queñas	Mo-derada	Grandes	NS/SI ¹	No	Si	NS/SI ¹	No	Si	NS/SI ¹	No	Si	NS/SI ¹		
Edad																							
15-19	11.2	86.0	2.8	0.6	7.6	90.5	1.3	84.0	11.3	2.9	1.5	0.3	94.5	4.1	1.4	4.0	93.7	2.3	38.0	61.4	0.1	1,793	
20-24	7.3	90.8	1.9	0.9	6.5	91.9	0.6	71.8	16.7	8.6	2.7	0.2	95.4	3.4	1.1	2.5	95.4	2.2	36.9	62.4	0.1	1,582	
25-29	6.6	91.4	2.0	1.1	6.4	91.6	0.9	64.4	24.1	8.3	2.9	0.2	93.7	4.3	2.0	1.8	96.0	2.2	33.5	65.8	0.3	1,398	
30-39	7.9	90.8	1.3	0.5	6.1	92.7	0.7	65.1	23.6	8.0	3.1	0.2	93.5	4.9	1.5	1.2	97.8	1.1	31.6	68.0	0.1	2,215	
40-49	9.2	88.5	2.2	1.2	3.5	94.7	0.6	71.3	17.1	7.8	3.4	0.4	92.9	4.8	2.3	1.6	96.5	1.9	28.0	71.4	0.3	1,405	
Estado marital actual																							
Actualmente unida	9.5	88.0	2.5	0.7	5.8	92.6	0.9	67.1	21.2	8.1	3.2	0.3	93.8	4.4	1.7	2.0	96.0	2.0	33.7	65.8	0.2	4,961	
Alguna vez en unión	6.8	92.3	0.9	1.1	4.9	93.6	0.4	71.8	18.5	7.6	1.9	0.1	95.0	3.6	1.3	1.7	96.9	1.4	30.4	69.1	0.2	1,284	
Nunca en unión	7.2	91.1	1.6	0.9	7.6	90.6	0.9	80.8	12.9	4.2	2.0	0.2	93.8	4.7	1.5	2.8	95.2	2.0	35.7	63.6	0.1	2,148	
Zona																							
Urbana	5.3	93.7	1.0	0.9	6.5	92.2	0.5	68.6	21.1	7.2	2.8	0.2	93.4	5.0	1.6	2.1	96.4	1.5	32.9	66.6	0.1	5,607	
Rural	15.0	81.0	4.0	0.7	5.5	92.3	1.5	76.8	13.8	6.6	2.5	0.3	95.2	3.0	1.7	2.4	95.0	2.6	35.3	63.9	0.4	2,786	
Región																							
Distrito Nacional	4.6	94.7	0.7	1.0	6.4	92.2	0.3	65.6	24.8	6.4	3.0	0.1	91.7	6.6	1.7	1.9	96.9	1.2	35.7	63.8	0.1	2,844	
Región I	9.2	88.8	2.0	0.9	6.0	92.5	0.5	74.9	13.6	8.1	2.8	0.5	96.3	2.2	1.5	1.6	95.8	2.6	27.4	72.2	0.1	1,149	
Región II	8.6	89.2	2.2	0.7	5.9	92.4	1.0	74.5	16.2	7.1	2.1	0.2	95.1	3.4	1.3	2.0	96.1	1.9	27.4	72.0	0.1	1,586	
Región III	10.2	87.9	1.9	0.9	6.9	91.6	0.6	73.6	16.5	7.5	2.2	0.3	93.1	5.2	1.6	2.3	96.8	0.9	34.9	64.5	0.2	718	
Región IV	11.2	85.5	3.3	0.4	4.5	93.4	1.6	74.8	14.1	6.6	3.7	0.8	95.9	3.5	0.6	2.0	95.7	2.3	39.8	59.3	0.3	354	
Región V	11.5	86.0	2.5	0.4	6.3	91.7	1.6	72.1	17.2	8.0	2.5	0.3	94.6	3.1	2.2	3.3	93.8	2.9	38.9	60.3	0.5	952	
Región VI	19.9	72.6	7.5	0.7	5.0	92.5	1.8	81.1	11.8	4.3	2.3	0.5	94.8	3.1	2.2	4.4	91.8	3.8	54.6	45.0	0.2	396	
Región VII	10.2	86.9	3.0	1.1	6.3	91.6	0.9	70.1	18.1	7.5	3.7	0.5	97.2	1.6	1.0	1.5	96.6	1.8	21.6	78.0	0.3	394	
Nivel de educación²																							
Sin educación	25.9	66.1	8.0	1.1	5.2	90.5	3.2	82.4	10.7	4.0	2.7	0.3	94.0	2.4	3.6	2.8	92.3	4.8	51.5	47.3	1.1	574	
Primaria 1-4	17.8	78.0	4.2	1.0	4.4	93.2	1.4	77.0	13.8	6.1	2.6	0.5	94.5	3.5	1.9	2.7	94.3	3.0	39.6	59.8	0.1	1,515	
Primaria 5-8	8.9	89.3	1.7	0.8	6.6	91.9	0.7	75.6	15.5	5.8	2.8	0.3	94.1	4.5	1.4	2.6	95.9	1.5	31.4	68.1	0.0	2,631	
Secundaria	1.7	98.0	0.4	0.7	6.7	92.3	0.3	64.2	24.2	8.7	2.7	0.1	94.2	4.4	1.4	1.9	96.9	1.3	29.9	69.5	0.2	3,672	
Total	8.5	89.5	2.0	0.8	6.1	92.2	0.8	71.3	18.7	7.0	2.7	0.3	94.0	4.3	1.6	2.2	95.9	1.9	33.7	65.7	0.2	8,394	

¹ NS/SI = No sabe o sin información² Se excluyen 2 casos sin información

10.5 RIESGO SENTIDO DE CONTRAER SIDA

En el Cuadro 10.6 se presentan también las proporciones de mujeres según el riesgo sentido de adquirir SIDA. Siete de cada diez mujeres (71 por ciento) contestaron que no tenían ninguna posibilidad de contraer la enfermedad, 19 por ciento se consideran en riesgo bajo, el 7 por ciento reconoció una probabilidad moderada y el 3 por ciento una probabilidad grande. Las que consideran que tienen algún riesgo moderado o grande son mujeres de 20 años y más, actualmente unidas, de las regiones I y VII y con educación secundaria y más.

10.6 CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO SEXUAL

A las entrevistadas se les preguntó si desde que se enteraron de la existencia del SIDA han cambiado su conducta sexual y qué han hecho. (Cuadro 10.7). El 58 por ciento con o sin relaciones sexuales no ha cambiado su comportamiento sexual o sus decisiones acerca de sus relaciones sexuales. Entre las respuestas a las medidas tomadas un 16 por ciento informó que conservó su virginidad, el 3 por ciento se abstuvo de tener relaciones sexuales, el 1 por ciento comenzó a usar condón, el 8 por ciento resolvió tener un solo compañero sexual, el 1 por ciento redujo el número de compañeros sexuales y el 11 por ciento le exigió fidelidad a su esposo, el 7 por ciento dió otras respuestas.

Las mujeres que más han cambiado su comportamiento sexual son las que se sienten en riesgo moderado o grande, sea que sepan o no que el SIDA es fatal, las algunas vez unidas, las residentes en el Distrito Nacional y las de menor nivel de educación. Las que dejaron de tener relaciones sexuales son principalmente mujeres algunas vez casadas o unidas (15 por ciento), el 60 por ciento de las solteras que no han tenido relaciones sexuales resolvió no tenerlas, en mayor medida las adolescentes (47 por ciento) y aquellas con estudios secundarios o más (23 por ciento).

10.7 CONOCIMIENTO Y USO DEL CONDÓN

En el Cuadro 10.8 se presenta la proporción de mujeres que han tenido relaciones sexuales que conocen dónde pueden conseguir los condones o preservativos, la proporción de las que usaron condones en la última relación, y la proporción que los usan como método de planificación familiar.

Las farmacias son la fuente más importante mencionada por el 46 por ciento de las entrevistadas, seguida por las centros de salud públicos (22 por ciento). El 2 por ciento de las mujeres consideradas usó condones en la última relación o los ha usado como método de planificación familiar, lo que indica que apenas un 0.3 por ciento lo hicieron para prevenir ETS y SIDA.

Por otro lado, sólo uno por ciento de las entrevistadas declaró haber tenido relaciones sexuales con más de una persona en los 12 meses anteriores a la encuesta (Cuadro 10.9). De este subgrupo, el 29 por ciento usó preservativo en la última relación sexual. Quienes más han usado condón en las relaciones extramaritales son las mujeres que se declaran en riesgo moderado o alto de contraer SIDA, las mujeres de 40-49 años, las que residen en las regiones V y I y las que tienen más de 5 años de educación (ver Cuadro 10.10).

Cuadro 10.7. Comportamiento para prevenir el SIDA

Porcentaje de mujeres según cambio en el comportamiento para evitar el SIDA, de acuerdo a percepción del riesgo del SIDA y características seleccionadas, República Dominicana 1996

Características	No cambió comportamiento	Conservó virginidad	Dejó de tener relaciones	Empezó a usar condón	Sexo con solo compañero	Redujo el número de compañeros sexuales	Evite al esposo ser fiel	Otras razones	Número de mujeres
Percepción del SIDA									
<i>Cree que el SIDA es fatal</i>									
Sin riesgo o pequeño	58.5	17.0	3.1	1.3	7.6	1.1	10.5	6.3	6,984
Riesgo moderado/grande	54.6	6.8	2.0	3.2	10.4	1.8	20.0	8.7	741
No sabe/Sin información	41.2	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	33.7	14.0	17
<i>Cree que el SIDA no es fatal</i>									
Sin riesgo o pequeño	53.9	22.4	2.1	1.3	8.6	2.0	9.0	6.4	570
Riesgo moderado/grande	67.5	4.9	0.0	0.8	11.6	0.0	10.7	7.5	77
No sabe/Sin información	80.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	5
Edad									
15-19	41.2	47.4	1.6	1.0	4.0	0.6	3.6	3.7	1,793
20-24	55.3	17.8	3.2	1.9	9.0	1.7	11.2	5.8	1,582
25-29	63.6	7.5	1.9	1.3	9.5	1.5	13.3	7.4	1,398
30-39	64.1	3.5	2.5	1.8	10.0	1.4	15.2	8.9	2,215
40-49	66.8	4.0	5.8	1.1	7.1	0.8	13.0	6.8	1,405
Estado marital actual									
Actualmente unida	69.6	0.2	0.4	0.9	9.3	0.8	17.2	8.8	4,961
Alguna vez unida	52.5	6.3	14.5	4.7	11.8	3.7	6.7	4.6	1,284
Nunca en unión	34.2	59.7	1.6	0.7	2.5	0.5	0.3	2.7	2,148
Zona									
Urbana	56.6	17.5	3.0	1.6	8.4	1.4	10.4	6.9	5,607
Rural	60.6	14.0	2.6	1.1	7.1	0.8	13.0	5.9	2,786
Región									
Distrito Nacional	55.7	16.3	3.3	1.9	11.0	1.8	10.1	6.7	2,844
Región I	55.4	20.2	1.5	1.2	3.7	1.8	13.0	5.7	1,149
Región II	60.3	18.1	2.9	1.3	4.7	0.2	11.2	6.3	1,586
Región III	63.4	14.9	2.4	1.0	6.8	0.6	10.2	6.3	718
Región IV	56.6	14.0	3.0	1.0	10.0	1.1	14.9	7.5	354
Región V	56.9	14.2	3.7	1.7	9.8	1.2	11.9	8.0	952
Región VI	63.4	12.3	2.7	0.3	8.7	0.6	11.4	4.4	396
Región VII	60.0	12.5	3.3	0.9	6.3	0.7	12.1	8.3	394
Nivel de educación¹									
Sin educación	69.2	3.2	3.6	2.1	8.9	1.0	12.4	6.4	574
Primaria 1-4	60.4	8.0	3.3	1.1	10.3	1.5	13.9	7.1	1,515
Primaria 5-8	56.2	15.4	3.6	1.8	8.9	1.3	12.9	6.5	2,631
Secundaria	56.4	22.6	2.1	1.2	6.1	1.0	8.9	6.5	3,672
Total	57.9	16.3	2.9	1.4	7.9	1.2	11.3	6.6	8,394

¹ Se excluyen 2 casos sin información

Cuadro 10.8 Conocimiento de fuente para condones y uso de ellos

Porcentaje de entrevistadas que han tenido relaciones sexuales por conocimiento de fuentes y uso de condones, según la percepción del riesgo del SIDA y características seleccionadas, República Dominicana 1996

Características	Fuente para condones					Usó condones			Número de mujeres
	Conoce condones	Pública	Privada médica	Farmacia	Otra fuente	Sin información	Última relación	Para planificación familiar	
Percepción del SIDA									
<i>Cree que el SIDA es fatal¹</i>	99.2	22.5	4.8	44.7	4.7	23.5	1.7	1.5	5,381
Sin riesgo o pequeño	99.8	24.2	4.8	51.5	5.3	14.1	2.9	1.9	664
Moderado/Grande	97.8	13.1	0.0	25.2	11.1	50.6	0.0	0.0	14
<i>Cree que el SIDA no es fatal²</i>	96.4	13.8	4.8	47.0	7.7	26.8	3.6	2.4	399
Sin riesgo o pequeño	100.0	14.3	6.0	49.0	4.7	26.0	0.0	0.0	69
Moderado/Grande	85.8	10.4	0.0	10.4	0.0	79.1	0.0	0.0	4
Edad									
15-19	97.5	14.5	3.8	42.6	8.5	30.6	1.1	1.8	583
20-24	99.4	18.5	4.3	50.4	5.1	21.7	2.4	1.6	1,159
25-29	99.3	22.6	5.6	47.1	5.4	19.2	1.8	2.0	1,254
30-39	99.4	24.2	4.4	45.8	4.8	20.8	2.0	1.6	2,146
40-49	98.7	24.1	5.4	40.7	3.0	26.9	2.0	1.1	1,390
Estado marital actual									
Actualmente unida	99.0	22.5	5.1	42.9	4.5	25.1	0.5	1.4	4,961
Alguna vez en unión	99.4	22.1	4.0	52.0	5.1	16.9	5.6	1.6	1,284
Nunca en unión	99.5	13.9	3.0	61.6	10.9	10.7	10.6	4.6	287
Zona									
Urbana	99.7	19.0	4.9	54.0	5.3	16.8	2.7	1.7	4,251
Rural	97.9	27.6	4.6	29.5	4.2	34.0	0.5	1.4	2,281
Región									
Distrito Nacional	99.7	15.6	5.1	57.6	7.2	14.5	2.8	2.1	2,210
Región I	99.6	16.9	7.3	51.5	4.3	20.1	2.1	2.0	876
Región II	99.1	19.3	4.9	44.9	5.0	26.0	1.5	1.7	1,209
Región III	98.7	28.1	1.7	34.7	2.7	32.9	1.3	0.4	553
Región IV	98.2	38.8	7.3	18.8	1.9	33.3	0.5	1.1	290
Región V	98.5	28.8	2.4	39.1	3.9	25.9	1.9	1.9	741
Región VI	96.2	32.5	3.1	19.8	2.3	42.2	0.7	0.4	330
Región VII	99.0	38.0	5.6	31.5	2.1	22.7	1.5	0.5	322
Nivel de educación³									
Sin educación	94.1	19.7	3.8	21.4	1.5	53.6	0.2	0.6	554
Primaria 1-4	98.2	25.3	4.0	30.7	3.6	36.4	0.9	0.9	1,375
Primaria 5-8	99.9	23.1	4.4	45.4	4.4	22.6	2.0	1.2	2,090
Secundaria	100.0	19.4	5.4	57.5	6.8	10.8	3.0	2.7	1,685
Cambio en el comportamiento sexual									
No cambió el comportamiento	98.9	21.6	4.6	45.9	4.3	23.6	1.1	1.3	4,287
Conservó virginidad	100.0	24.4	3.7	45.1	4.0	22.8	7.3	0.0	98
Dejó de tener las relac. sexuales	100.0	18.5	7.2	42.8	5.3	26.3	9.6	0.3	242
Empezó a usar condón	100.0	13.1	5.2	60.6	16.4	4.7	23.9	18.8	121
Sexo con un sólo compañero	98.6	21.7	4.9	44.8	7.8	20.8	2.2	2.8	667
Redujo los compañeros sexuales	100.0	13.8	6.3	66.5	5.2	8.2	6.2	3.2	100
Otras respuestas	99.7	24.9	4.5	42.3	4.9	23.3	0.9	1.1	1,103
Total	99.1	22.0	4.8	45.5	4.9	22.8	1.9	1.6	6,532

¹ Se excluyen 14 casos sin información

² Se excluyen 4 casos sin información

³ Se excluyen 2 casos sin información

Cuadro 10.9 Número de compañeros sexuales

Distribución porcentual de mujeres por número de personas con quienes ellas tuvieron relaciones sexuales en los últimos 12 meses según características seleccionadas, República Dominicana 1996

Características	0	1	2-3	4+	Sin información	Total	Número de mujeres
Edad							
15-19	0.5	99.1	0.4	0.0	0.0	100.0	404.1
20-24	1.2	97.8	0.6	0.0	0.4	100.0	826.4
25-29	1.9	97.2	0.6	0.2	0.1	100.0	989.5
30-39	2.3	95.7	1.5	0.0	0.5	100.0	1,715.9
40-49	4.1	94.2	0.8	0.0	0.8	100.0	1,046.8
Duración de unión							
0-4	1.1	98.2	0.4	0.0	0.2	100.0	1,030.7
5-9	2.1	97.3	0.4	0.0	0.2	100.0	1,125.7
10-14	1.6	96.1	1.9	0.2	0.2	100.0	890.3
15+	3.3	94.8	1.1	0.0	0.8	100.0	1,936.0
Zona							
Urbana	2.7	95.6	1.1	0.1	0.5	100.0	3,026.6
Rural	1.6	97.4	0.7	0.0	0.4	100.0	1,956.1
Nivel de educación							
Sin educación	1.3	97.9	0.6	0.0	0.2	100.0	476.2
Primaria 1-4	2.3	95.8	1.3	0.0	0.6	100.0	1,121.4
Primaria 5-8	2.3	96.4	0.7	0.1	0.5	100.0	1,572.8
Secundaria	2.6	96.1	0.9	0.0	0.4	100.0	1,240.4
Superior	2.3	96.2	1.2	0.0	0.3	100.0	570.1
Total	2.3	96.3	0.9	0.0	0.4	100.0	4,982.7

¹ Se excluyen 6 casos sin información

10.8 EXPOSICIÓN A ANUNCIOS SOBRE SIDA

El 74 por ciento de las entrevistadas ha visto, durante los últimos meses, algún anuncio por televisión sobre el SIDA. Las mujeres menores de 35 años, las residentes en la zona urbana y en el Distrito Nacional y con mayor nivel de educación son las que han tenido mayor exposición a anuncios televisivos sobre el SIDA. En relación a los anuncios específicos el 38 por ciento declaró haber visto el "Interactivo," un 19 por ciento se refirió al anuncio "Fiesta," 10 por ciento recordó "Solamente una Vez," 10 por ciento informó sobre el anuncio de "Padres" y 11 por ciento se refirió a otros anuncios.

La proporción de mujeres que ha oído mensajes sobre el SIDA a través de la radio fué de 51 por ciento. El 23 por ciento ha oído el anuncio "Interactivo," un 9 por ciento el anuncio "Fiesta" Alrededor del 5 por ciento informaron haber oído los anuncios "Solamente una Vez" y "Padres"(no se incluye el cuadro).

Cuadro 10.10 Uso de condones

Porcentaje de mujeres entrevistadas que han usado condones, y porcentaje que uso condones en su última relación sexual según la percepción del riesgo del SIDA, características seleccionadas y cambio en el comportamiento sexual, República Dominicana 1996

Características	Uso condón PF ¹	Uso condón ETS ¹	Uso condón PF/ETS	Uso condón en última relación con:			Número de mujeres
				Esposo	Otro	Total	
Percepción del SIDA							
<i>Cree que el SIDA es fatal</i>	19.6	2.5	20.6	2.0	26.2	2.2	3,962
Sin riesgo o pequeño	26.0	4.9	28.6	4.1	8.1	4.1	351
Riesgo moderado	23.0	4.6	23.7	1.5	61.2	2.9	144
Alto riesgo/con SIDA	7.6	0.0	7.6	0.0	-	0.0	11
<i>Cree que el SIDA no es fatal</i>							
Sin riesgo o pequeño	20.7	3.9	21.6	3.6	48.4	4.2	300
Riesgo moderado	28.8	6.0	30.2	0.0	100.0	1.4	44
Alto riesgo/con SIDA	15.6	0.0	15.6	2.6	100.0	2.6	12
Edad							
15-19	11.2	3.6	13.0	1.2	0.0	1.2	398
20-24	18.5	1.5	19.0	1.7	0.0	1.7	812
25-29	23.9	3.7	25.5	2.8	33.1	3.0	969
30-39	23.1	2.8	24.1	2.4	25.9	2.7	1,660
40-49	17.1	2.6	18.1	2.0	54.7	2.6	990
Zona							
Urbana	24.3	3.4	25.7	2.5	29.2	2.8	2,925
Rural	14.0	1.8	14.8	1.7	29.6	1.9	1,903
Región							
Distrito Nacional	30.3	3.9	31.6	2.9	27.3	3.3	1,504
Región I	21.6	3.2	23.0	2.1	37.5	2.8	677
Región II	16.6	1.9	17.5	2.2	0.0	2.2	930
Región III	12.6	1.9	14.1	1.2	22.2	1.4	427
Región IV	10.1	2.2	10.8	1.8	33.3	1.8	227
Región V	17.2	3.2	18.5	2.5	50.0	2.7	553
Región VI	7.8	1.0	8.2	1.0	20.0	1.0	264
Región VII	11.8	1.6	12.6	1.1	16.7	1.1	246
Nivel de educación							
Sin educación	8.5	2.3	9.2	1.3	0.0	1.3	453
Primaria 1-4	14.6	1.9	15.6	1.0	12.3	1.1	1,088
Primaria 5-8	19.1	3.7	20.8	1.7	57.5	2.2	1,527
Secundaria	24.9	2.7	26.0	3.3	26.1	3.5	1,204
Superior	34.1	2.8	34.5	4.2	30.6	4.4	555
Cambio en el comportamiento sexual							
No cambió el comportamiento	18.9	1.4	19.5	2.0	19.8	2.1	3,359
Conservó virginidad	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	3
Dejó de tener las relac. sexuales	17.0	8.5	17.0	0.0	-	0.0	15
Empezó a usar condón	62.8	76.8	95.7	32.6	91.1	46.3	43
Sexo con una sólo compañera	27.6	6.1	29.9	1.6	28.4	2.4	448
Redujo los compañeros sexuales	35.1	5.8	39.7	1.1	20.6	5.8	42
Esposa fiel	21.1	4.5	22.7	2.4	27.7	2.6	839
Otra conducta sexual	23.7	11.5	28.5	0.5	23.9	1.0	123
Ninguna conducta sexual	22.6	0.9	23.2	1.8	31.1	2.4	313
Total	20.2	2.8	21.4	2.2	29.3	2.5	4,828

¹ PF: Planificación Familiar. ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

10.9 RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE HOMBRES

10.9.1 Conocimientos de Enfermedades de Transmisión Sexual y Prevención del SIDA

En el Cuadro 10.11 se presentan los porcentajes de hombres que conocen cada una de las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA según características seleccionadas. La gran mayoría de los hombres (90 por ciento), sin importar la edad, estado conyugal, nivel de educación o zona de residencia, han oído hablar del SIDA. Asimismo, en lo relacionado con enfermedades de transmisión sexuales observa un conocimiento relativamente alto de la gonorrea (72 por ciento), más no así para la sífilis y las úlceras genitales (25 y 26 por ciento respectivamente). El conocimiento de las diferentes enfermedades es más elevado conforme aumenta la edad del hombre. Con relación a la situación conyugal, los hombres solteros presentan un mayor conocimiento de estas últimas enfermedades que los alguna vez casados. Sin embargo el conocimiento del SIDA es mayor entre los solteros que han tenido sexo anteriormente. Los hombres de la zona urbana poseen un mayor conocimiento de las enfermedades de transmisión sexual (91 versus 88 por ciento para los de la zona rural). Como es de esperarse, el mayor nivel educativo está asociado con un conocimiento más elevado sobre cada una de estas enfermedades.

Cuadro 10.11 Conocimiento de enfermedades de transmisión sexual: los hombres							
Porcentaje de mujeres entrevistadas por conocimiento específico de enfermedades de transmisión sexual según características sociodemográficas, República Dominicana 1996							
Características	Sífilis	Gonorrea	SIDA	Úlceras genitales	Otro	No conoce ninguna	Número
Edad							
15-19	10.5	48.0	93.1	4.5	9.1	3.6	455
20-24	26.3	73.6	93.2	19.0	19.4	2.5	381
25-29	33.8	79.6	90.7	19.8	34.4	2.4	299
30-39	34.8	81.8	89.3	24.6	29.9	1.4	488
40-49	28.9	80.3	88.5	28.5	36.0	1.2	329
50-64	17.2	70.7	81.3	23.6	33.4	2.1	328
Estado marital actual							
Actualmente unido	29.3	78.9	87.7	24.0	33.0	1.5	1,182
Alguna vez en unión	23.0	79.4	89.2	24.0	35.9	0.4	231
Nunca en unión	19.9	59.7	92.4	12.0	13.5	3.6	859
Ha tenido sexo	25.7	72.7	94.0	15.4	18.8	1.2	571
No ha tenido sexo	8.3	34.1	89.4	5.2	3.0	8.2	288
Zona							
Urbana	35.7	79.8	90.7	21.3	28.5	1.1	1,311
Rural	10.6	60.5	88.2	17.0	22.5	3.8	968
Nivel de educación							
Sin educación	2.6	55.6	79.5	19.5	18.2	9.2	246
Primaria 1-4	11.6	64.1	87.2	17.8	24.1	3.5	532
Primaria 5-8	18.1	70.4	92.1	18.2	26.3	1.1	798
Secundaria	43.1	81.7	90.9	21.6	28.2	0.2	512
Superior	71.9	91.0	95.4	23.5	33.2	0.0	191
Total	25.0	71.6	89.6	19.4	25.9	2.2	2,279

PF: Planificación Familiar. ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

Al igual que en la mujer, está generalizado entre los hombres el conocimiento sobre la existencia del SIDA ya que el 100 por ciento declaró haber oído hablar sobre esta enfermedad. En el Cuadro 10.12 se presenta el conocimiento o comprensión que tiene los hombres entrevistados sobre las medidas para evitar la transmisión de esta enfermedad. Se observa que un alto porcentaje de los entrevistados mencionó formas correctas de protección frente al virus del SIDA, como ser fiel a su pareja o usar agujas nuevas (93 por ciento, en cada caso) evitar transfusiones de sangre (92 por ciento), usar condones (84 por ciento).

Sin embargo, hay que destacar que proporciones significativas de entrevistados mostraron estar en cierta medida desinformados: 25 por ciento respondió que llevar una buena dieta protege del SIDA, 48 por ciento cree que evitar baños de lugares públicos, 60 por ciento que evitando picaduras de mosquitos y 86 por ciento cree que no teniendo sexo se previene la enfermedad. Las concepciones erróneas son más frecuentes entre los hombres residentes en la zona rural y en las personas de edades más avanzadas. Finalmente, es importante destacar que entre 30 a 50 por ciento de los entrevistados con estudios secundarios y superiores tienen ideas equivocadas sobre la transmisión y prevención de esta enfermedad.

10.9.2 Medios de Información sobre el SIDA

En el Cuadro 10.13 se presenta las fuentes o medios de información mediante las cuales los entrevistados se han informado acerca del SIDA. Al igual que para las mujeres, la principal fuente de información ha sido la televisión (60 por ciento), seguida por la radio (54 por ciento), amigos y parientes (46 por ciento), la prensa escrita (25 por ciento), folletos (10 por ciento). Como es de esperarse, la televisión y los periódicos y revistas han llegado más a los hombres residentes en la zona urbana. En la zona rural en cambio, los parientes y amigos y la radio son los de mayor receptividad. Se observan también importantes diferenciales según nivel de educación, principalmente en lo que respecta a la televisión, prensa escrita, folletos, afiches y los amigos y parientes.

10.9.3 Percepciones sobre el SIDA

El 93 por ciento de los entrevistados sabe que una persona de apariencia saludable puede ser seropositiva (véase Cuadro 10.14). Los que tienen menor información al respecto son aquellos sin instrucción (78 por ciento). Igualmente un porcentaje elevado de hombres informó que casi siempre el SIDA es una enfermedad fatal (91 por ciento) y un 7 por ciento dijo que algunas veces puede ser una enfermedad fatal, menos del 2 por ciento respondió que nunca o que no sabe. No se observan grandes diferencias entre los subgrupos estudiados.

10.9.4 Riesgo Sentido de Contraer SIDA

El 62 por ciento de los hombres respondió que no tiene ninguna posibilidad de contraer el SIDA (ver Cuadro 10.14), la tercera parte (33 por ciento) se siente en riesgo bajo, el 3 por ciento informó tener una probabilidad moderada y menos del uno por ciento reconoció una alta probabilidad. Los que se consideran en riesgo moderado o alto de contraer el SIDA son aquellos que tienen entre 25 y 39 años, los alguna vez en unión y de residencia urbana. Según nivel educativo los que informaron sentirse en riesgo moderado o alto son los que tienen educación secundaria o más.

Cuadro 10.12. Conocimiento de formas para evitar el SIDA: los hombres

Porcentaje de hombres con conocimiento de formas para evitar el SIDA, según características seleccionadas, República Dominicana 1996

Características	Nada puede hacerse nada	Lleva buena dieta	Una sola pareja fiel	Evitar baño público	Usar condón	No tocar enfermo de SIDA	Caricias sin penetración	No comer con enfermo de SIDA	Evitar picadura mosquito	Inyección con agujas nuevas	No tener relaciones	Evitar transfus. de sangre	No conoce como evitar	Sin información	Total
Edad															
15-19	1.5	24.1	90.9	49.5	87.1	30.3	56.3	40.2	56.9	92.0	83.9	87.6	5.0	0.5	454
20-24	4.7	23.7	92.0	44.8	85.7	27.6	52.3	30.4	54.7	91.4	85.4	92.0	1.0	1.0	381
25-29	0.1	18.5	98.0	46.0	89.4	23.7	50.1	37.2	56.0	97.7	87.0	97.0	1.1	0.0	299
30-39	1.6	23.6	95.8	47.2	85.9	26.4	52.2	41.4	62.7	95.3	87.8	93.5	1.5	0.0	485
40-49	0.8	28.3	95.6	46.0	81.2	29.6	51.1	46.2	65.7	95.5	90.9	95.5	2.0	0.0	329
50-64	1.7	32.8	90.1	53.4	72.1	32.4	44.1	50.5	66.1	90.9	82.4	89.7	6.4	0.1	326
Estado marital actual¹															
Actualmente unido	1.5	25.3	94.4	48.0	81.4	28.6	47.9	42.5	63.6	94.7	86.7	93.5	2.8	0.2	1,181
Alguna vez en unión	1.1	30.5	93.4	48.1	83.3	30.6	56.8	48.2	63.1	94.6	88.2	94.8	2.4	0.0	237
Nunca en unión	2.3	23.2	92.6	47.5	87.6	27.4	54.8	36.3	54.9	92.1	84.9	89.9	3.1	0.5	855
Nivel de educación															
Sin educación	2.8	37.2	84.3	50.4	66.8	30.0	47.9	51.8	69.0	82.0	80.6	82.1	10.8	0.8	242
Primaria 1-4	2.8	34.8	92.0	54.4	79.5	37.2	53.1	49.5	68.5	91.9	84.6	89.5	3.2	0.4	530
Primaria 5-8	1.6	25.1	94.0	48.9	85.9	31.8	51.9	42.3	63.9	94.9	87.9	92.4	2.5	0.4	798
Secundaria+	0.9	13.4	97.6	40.7	90.9	17.3	50.8	28.7	46.9	97.8	87.4	97.8	0.2	0.0	703
Total	1.8	25.0	93.6	47.8	83.9	28.3	51.4	40.8	60.2	93.7	86.2	92.3	2.8	0.3	2,273

¹ Se excluyen 6 casos sin información

Cuadro 10.13 Conocimiento de SIDA: los hombres

Porcentaje de hombres entrevistados por conocimiento de SIDA por fuente de conocimiento, según características seleccionadas, República Dominicana 1996

Características	Fuente de conocimiento												Número de hombres	Promedio de fuentes
	Conoce SIDA	Radio	TV	Periódico/Revista	Pan-fletos	Trabajador de salud	Iglesia	Escuela	Reunión co-munitaria	Ami-gos/Parientes	Lugar de trabajo	Otras fuentes		
Edad														
15-19	99.7	44.7	60.5	20.8	9.3	1.5	0.8	16.8	0.6	47.5	1.7	7.3	455	2.1
20-24	100.0	59.1	65.4	27.2	9.9	3.4	2.3	12.9	1.6	50.9	4.7	9.8	381	2.5
25-29	100.0	52.0	65.8	28.8	10.3	2.5	1.7	3.6	4.2	39.5	7.6	11.3	299	2.3
30-39	99.4	55.3	60.5	28.4	12.7	8.3	1.2	0.3	1.5	41.1	4.2	10.9	488	2.3
40-49	100.0	59.4	59.8	27.0	9.6	8.1	1.1	1.4	1.5	45.7	4.0	11.2	329	2.3
50-64	99.5	56.5	48.5	19.4	5.1	3.8	1.6	0.1	2.5	54.5	3.8	5.9	328	2.0
Estado marital actual¹														
Actualmente unido	99.8	57.6	60.8	26.9	10.3	6.4	1.3	1.7	2.6	44.1	5.3	10.0	1,182	2.3
Alguna vez en unión	100.0	49.9	48.2	22.1	9.4	6.1	1.8	0.6	2.1	57.4	4.2	10.2	231	2.1
Nunca en unión	99.5	50.7	62.5	24.0	9.0	2.0	1.4	14.1	0.8	46.3	2.6	8.3	859	2.2
Zona														
Urbana	100.0	52.7	70.0	34.7	13.5	4.5	1.7	8.0	2.5	38.9	4.5	10.8	1,311	2.4
Rural	99.4	56.1	46.9	12.5	4.5	4.9	1.0	4.0	1.0	56.6	3.6	7.4	968	2.0
Nivel de educación														
Sin educación	98.6	41.5	20.3	0.7	0.2	0.3	0.2	0.0	0.4	78.9	3.7	6.8	246.0	1.6
Primaria 1-4	99.6	54.1	44.7	9.9	5.1	4.1	1.1	0.5	1.4	62.6	3.4	6.2	532.0	1.9
Primaria 5-8	100.0	58.0	64.4	23.3	7.0	5.5	1.1	4.9	1.6	47.8	4.7	8.6	798.0	2.3
Secundaria	99.9	52.8	80.5	42.2	16.4	5.0	2.4	15.0	3.5	23.5	3.7	11.0	512.0	2.6
Superior	100.0	58.3	82.3	62.4	28.2	7.7	2.3	12.9	1.4	14.8	5.7	20.3	191.0	3.0
Total	99.7	54.2	60.2	25.3	9.7	4.7	1.4	6.3	1.9	46.4	4.2	9.4	2,279	2.2

¹ Se excluyen 6 casos sin información

10.9.5 Cambios en el Comportamiento Sexual

En el Cuadro 10.15 se presentan las respuestas dadas por los entrevistados cuando se les preguntó si habían cambiado su comportamiento sexual después que se enteraron de la existencia del SIDA y qué medidas de precaución tomaron. Se observa que un 15 por ciento no ha cambiado su comportamiento sexual. En relación a las medidas tomadas, una cuarta parte informó que redujo el número de parejas, una cifra similar dejó de tener relaciones con prostitutas, el 23 por ciento comenzó a usar condones y el 29 por ciento respondió que tiene relaciones sexuales con una sola pareja, el resto dio otra respuesta.

En lo que se refiere a los cambios de conducta sexual según características sociodemográficas se nota que los hombres residentes en la zona urbana y de mayor nivel de instrucción y los que se sienten en riesgo moderado o grande de contraer la enfermedad han recurrido más al uso de condones y a reducir el número de parejas.

Cuadro 10.14 Percepción del riesgo del SIDA: los hombres

Porcentaje de hombres que conocen del SIDA y percepción del riesgo del SIDA según características seleccionadas, República Dominicana 1996

Características	Una persona saludable puede tener SIDA			El SIDA es una enfermedad mortal				Posibilidad de adquirir el SIDA					Número de hombres
	No	Si	SI ¹	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	SI ¹	Nin-guna	Pe-queñas	Mo-derada	Grandes	SI ¹	
Edad													
15-19	8.0	89.6	2.4	0.5	10.6	87.0	1.9	74.3	21.2	2.8	0.9	0.8	454
20-24	3.9	94.7	1.3	0.2	9.6	89.7	0.5	59.7	36.7	2.6	0.5	0.5	381
25-29	2.5	96.6	1.0	1.6	5.9	92.3	0.2	51.7	42.2	4.4	1.6	0.0	299
30-39	3.8	93.9	2.3	1.2	5.3	93.5	0.1	54.2	39.6	5.2	0.8	0.1	485
40-49	2.3	96.9	0.8	0.3	7.0	91.2	1.4	60.9	34.3	3.6	1.0	0.1	329
50-64	9.2	85.5	5.3	0.6	4.6	93.1	1.7	70.6	27.8	1.1	0.5	0.0	326
Estado marital actual²													
Actualmente unido	3.9	94.1	2.0	0.8	5.6	92.8	0.8	61.7	34.2	3.3	0.7	0.1	1,181
Alguna vez en unión	7.3	89.0	3.7	1.0	6.4	91.8	0.8	54.0	37.0	8.0	1.0	0.0	231
Nunca en unión	6.1	91.9	2.0	0.5	9.9	88.3	1.2	64.8	31.2	2.2	1.1	0.7	855
Zona													
Urbana	3.4	95.3	1.3	0.7	6.7	92.0	0.6	59.2	35.7	3.8	1.0	0.3	1,311
Rural	7.2	89.3	3.5	0.7	8.1	89.7	1.5	66.1	30.1	2.7	0.8	0.3	962
Región													
Distrito Nacional	3.7	95.5	0.8	0.6	3.9	94.9	0.6	55.3	38.5	4.8	0.8	0.6	694
Región I	4.2	94.8	0.9	0.0	8.0	92.0	0.0	61.0	37.1	0.9	0.9	0.0	330
Región II	4.7	93.9	1.5	0.3	12.0	85.4	2.3	69.0	26.0	2.9	1.8	0.3	473
Región III	6.8	90.3	2.9	1.0	7.1	90.9	1.0	67.9	27.6	3.9	0.6	0.0	192
Región IV	6.9	90.1	3.0	0.7	4.0	93.7	1.7	69.3	25.1	4.3	0.3	1.0	97
Región V	2.6	90.6	6.8	2.1	8.3	89.6	0.0	55.2	40.6	4.2	0.0	0.0	246
Región VI	18.6	78.0	3.4	1.1	9.1	87.9	1.9	74.6	22.7	1.9	0.8	0.0	123
Región VII	3.4	92.5	4.1	1.7	5.4	92.2	0.7	63.9	33.3	2.0	0.3	0.3	118
Nivel de educación													
Sin educación	14.0	77.6	8.4	0.5	7.4	89.3	2.8	73.5	22.4	2.2	1.1	0.8	242
Primaria 1-4	7.9	88.7	3.5	0.5	7.4	91.4	0.8	67.3	30.3	2.0	0.4	0.0	530
Primaria 5-8	3.8	94.7	1.4	0.8	6.7	91.3	1.3	64.6	31.7	2.4	1.0	0.3	798
Secundaria	1.2	98.8	0.0	0.2	9.3	90.4	0.1	56.8	35.8	5.7	1.3	0.4	512
Superior	1.0	99.0	0.0	2.6	4.4	92.9	0.0	37.5	55.7	6.9	0.0	0.0	191
Total	5.0	92.8	2.2	0.7	7.3	91.0	0.9	62.1	33.3	3.4	0.9	0.3	2,273

¹ No sabe o sin información

² Se excluyen 6 casos sin información

10.9.6 Conocimiento y Uso del Condón

De los hombres que han tenido relaciones sexuales el 11 por ciento usa condones para planificación familiar y el 10 por ciento lo uso en la última relación (Cuadro 10.16). Generalmente los hombres dominicanos usan mayormente los preservativos para evitar embarazos que para prevención de enfermedades de transmisión sexual y SIDA. Sin embargo, los adolescentes (9 por ciento), los de 30-39 años (6.2 por ciento), los alguna vez en unión (7 por ciento) y con los que tienen educación superior (15.2 por ciento) usan mayormente los condones para evitar las ETS y el SIDA.

Cuadro 10.15 Comportamiento para prevenir el SIDA: los hombres

Porcentaje de hombres según cambio en el comportamiento para evitar el SIDA, de acuerdo a percepción del riesgo del SIDA y características seleccionadas, República Dominicana 1996

Características	No cambió comportamiento	Conservó virginidad	Dejó de tener relaciones	Empezó a usar condón	Sexo con una sola compañera	Redujo el número de compañeros sexuales	Exige esposa fiel	Otras razones	Número de hombres
Percepción del SIDA									
<i>Cree que el SIDA es fatal¹</i>									
Sin riesgo o pequeño	14.7	6.0	1.2	22.6	31.2	24.7	0.0	6.5	1,693
Riesgo moderado/grande	15.0	2.9	0.0	40.9	5.8	35.7	0.0	9.2	67
<i>Cree que el SIDA no es fatal²</i>									
Sin riesgo o pequeño	17.3	5.4	3.0	21.4	28.9	23.7	0.1	5.3	476
Riesgo moderado/grande	10.9	5.3	0.0	19.1	4.7	39.7	4.4	19.5	29
Edad									
15-19	27.2	22.9	1.9	19.2	6.2	12.8	0.3	10.9	454
20-24	11.9	5.6	1.4	39.0	17.7	22.5	0.1	7.3	381
25-29	8.9	1.0	1.2	33.5	27.5	41.1	0.0	7.4	299
30-39	11.7	0.5	0.4	25.4	37.8	30.6	0.0	5.3	485
40-49	14.1	0.2	1.3	11.5	42.1	23.3	0.0	4.1	329
50-64	14.3	0.0	3.2	6.7	52.4	23.1	0.0	3.8	326
Estado marital actual³									
Actualmente unido	12.4	0.0	0.6	15.3	48.6	26.0	0.0	4.2	1,181
Alguna vez unido	10.6	0.1	3.0	37.6	10.8	35.5	0.1	5.2	231
Nunca en unión	20.2	15.3	2.3	29.2	8.4	20.4	0.2	10.5	855
Zona									
Urbana	17.0	4.4	1.8	26.1	28.1	27.1	0.1	6.9	1,311
Rural	12.6	7.6	1.2	18.3	31.5	21.9	0.0	6.2	962
Nivel de educación									
Sin educación	14.1	4.7	2.3	11.6	17.3	27.7	0.0	4.9	242
Primaria 1-4	13.6	6.7	1.6	16.9	22.3	28.1	0.0	4.5	530
Primaria 5-8	14.6	6.7	1.2	24.6	25.4	26.6	0.0	6.6	798
Secundaria	15.1	5.7	1.5	30.5	28.0	23.9	0.3	8.7	512
Superior	23.3	0.7	1.3	25.3	31.7	18.6	0.0	9.5	191
Total	15.2	5.8	1.5	22.8	29.5	24.9	0.1	6.6	2,273

¹ Se excluyen 2 casos sin información

² Se excluyen 5 casos sin información

³ Se excluyen 6 casos sin información

A aquellos hombres, en unión, que habían tenido relaciones con alguna persona diferente de su pareja se les preguntó si habían usado condón en dicha relación y los resultados se presentan en el Gráfico 10.2. Del total de hombres en unión al momento de la encuesta, 295 por ciento indicaron haber tenido relaciones extramaritales, siendo mayor entre los más jóvenes, de residencia urbana, y con mayor nivel educativo. El uso de condón durante estas relaciones es bastante bajo ya que menos de la mitad de ellos utilizó preservativo (44 por ciento). Sin embargo el uso es mayor entre los hombres de 20-24 años de edad (64 por ciento) y con educación superior (60 por ciento).

Cuadro 10.16. Conocimiento de fuente para condones y uso de ellos: los hombres


Porcentaje de hombres entrevistados que han tenido relaciones sexuales por conocimiento y uso de condones, según la percepción del riesgo del SIDA y características seleccionadas, República Dominicana 1996

Características	Fuente para condones					Usó condones			Número de hombres
	Conoce condones	Pública	Privada médica	Farmacia	Otra fuente	Sin información	Última relación	Para planificación familiar	
Percepción del SIDA¹									
<i>Cree que el SIDA es fatal</i>									
Sin riesgo o pequeño	99.3	15.3	3.8	59.1	6.4	15.4	10.5	11.0	1,480
Moderado/Grande	100.0	14.0	1.1	56.2	19.2	9.6	7.3	16.6	65
<i>Cree que el SIDA no es fatal</i>									
Sin riesgo o pequeño	99.8	14.7	4.1	61.2	9.1	10.9	6.1	10.8	411
Moderado/Grande	100.0	16.9	1.4	66.0	15.7	0.0	11.2	17.7	28
Edad									
15-19	100.0	13.5	5.3	63.2	9.4	8.5	30.4	21.2	223
20-24	100.0	12.6	4.9	68.5	6.3	7.7	18.8	20.4	338
25-29	99.6	14.1	2.9	64.2	11.2	7.7	6.9	12.7	293
30-39	99.4	16.7	4.2	58.7	9.1	11.3	3.9	10.1	480
40-49	99.9	19.4	3.2	58.0	4.4	15.1	3.0	4.5	328
50-64	97.7	13.3	1.9	46.3	4.9	33.6	2.7	2.0	326
Estado marital actual²									
Actualmente unido	99.1	16.1	3.3	57.5	6.2	16.8	0.0	3.0	1,181
Alguna vez en unión	99.3	13.8	5.5	52.3	11.6	16.8	14.4	21.4	231
Nunca en unión	100.0	13.7	4.0	66.5	8.5	7.4	27.3	24.0	570
Zona									
Urbana	99.8	9.9	4.0	68.9	8.5	8.7	10.4	13.9	1,173
Rural	98.8	22.6	3.3	46.1	6.1	21.9	8.2	7.4	814
Nivel de educación									
Sin educación	98.4	14.7	3.0	31.9	7.1	43.3	7.5	4.5	219
Primaria 1-4	98.8	18.5	2.3	48.4	6.9	23.9	10.0	6.6	457
Primaria 5-8	99.7	16.4	5.5	61.8	6.6	9.8	9.8	11.4	679
Secundaria	99.8	11.6	3.3	74.4	8.4	2.3	9.8	13.9	451
Superior	99.8	11.1	2.6	75.5	10.7	0.0	8.6	23.8	182
Cambio en el comportamiento sexual									
No cambió el comportamiento	99.7	10.3	4.0	55.2	6.4	24.1	3.3	5.5	229
Conservó virginidad	95.5	5.3	6.9	60.7	100.0	28.2	0.0	71.8	0.0
Dejó de tener las relac. sexuales	0.0	0.0	0.0	3	1.8	25.3	8.4	0.0	34
Empezó a usar condón	100.0	14.3	4.9	67.3	12.4	1.1	23.7	26.9	516
Sexo con una sólo compañera	99.3	14.2	3.5	56.9	5.5	19.9	2.0	6.4	671
Redujo los compañeros sexuales	99.9	18.3	5.3	60.8	8.8	6.8	8.7	12.4	560
Otras respuestas	98.9	11.0	2.8	64.9	10.5	10.7	15.3	12.2	149
Total	99.4	15.1	3.7	59.5	7.5	14.1	9.5	11.2	1,988

¹ Se excluyen 2 casos sin información

² Se excluyen 6 casos sin información

Gráfico 10.2
Porcentaje de Hombres en Unión que Han Tenido Extramarital
Relaciones y que Usaron Condón por Características
Seleccionadas



10.9.7 Exposición a Anuncios sobre SIDA

El 58 por ciento de los hombres entrevistados ha visto en la televisión algún anuncio sobre SIDA y el 43 por ciento lo ha escuchado a través de la radio. Los más expuestos a anuncios sobre ese tema son los menores de 35 años, los residentes en la zona urbana y en Distrito Nacional y los de estudios secundarios y superiores. De los entrevistados que declara haber visto información sobre el SIDA, el mayor porcentaje se refirió al anuncio "Interactivo" (24 por ciento) seguido por el anuncio "Fiesta" (8 por ciento). Los anuncios "Solamente una vez" y "Padres" fueron reportados por el 5 y 4 por ciento de los entrevistados. El 16 por ciento de los hombres informó haber oído a través de la radio el anuncio "Interactivo," y 3 por ciento o menos informó haber oído los demás anuncios. (no se incluye el cuadro).

