

## CHAPITRE 11

### MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES ET SIDA

*Georges Gonzales, Jocelyne Andriamiadana, et Adeline Ranaivo*

Malgré un faible taux de prévalence de l'infection par VIH à Madagascar (estimé à 0,07 % en 1995) (PNLS, 1995), le risque d'explosion demeure considérable en raison de la prévalence élevée des Maladies Sexuellement Transmissibles (MST) classiques (prévalence de 12 % de la syphilis chez les femmes enceintes selon la même étude) et des comportements sexuels à risque de la population.

Depuis la mise en place du Programme National de Lutte contre les MST et le sida (PNLS) en 1988 et avec l'appui des divers partenaires nationaux et internationaux, le Ministère de la Santé s'est mobilisé en vue d'informer la population sur les MST et le sida et d'assurer la prise en charge correcte des MST classiques.

Le module "sida et autres MST" de cette enquête permet d'avoir des données nationales disponibles sur les comportements, les attitudes et les pratiques des femmes malgaches de 15 à 49 ans vis-à-vis de ces affections.

Ainsi, l'INSTAT a collecté auprès de ces femmes des informations sur :

- la connaissance et les épisodes antérieurs de MST;
- la connaissance et les principales sources d'information relatives au sida;
- la connaissance des moyens de prévention et de transmission du sida;
- les attitudes et opinions des femmes sur les MST et le sida;
- la perception du risque individuel vis-à-vis du sida;
- le nombre de partenaires sexuels;
- l'utilisation du condom.

#### 11.1 MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (MST)

##### 11.1.1 Niveau de connaissance des MST

Au moment de l'enquête, on a demandé aux femmes si elles avaient déjà entendu parler des maladies qui se transmettent sexuellement et si elles pouvaient citer celles qu'elles connaissaient. Les résultats présentés dans le tableau 11.1 indiquent que 54 % des femmes interrogées ont déjà entendu parler d'au moins une MST.

On note une différence significative du niveau de connaissance des MST selon le milieu de résidence de la femme : les femmes urbaines sont mieux informées (près de trois femmes sur quatre disent avoir entendu parler d'au moins une MST) que les femmes rurales (46 % sont dans le même cas). La différence est encore plus nette dans la capitale où près de 90 % des femmes ont déjà entendu parler des MST. On note également une différence significative de la connaissance des MST selon le niveau d'instruction : 86 % des femmes de niveau secondaire ou supérieur ont entendu parler des MST contre moins de 48 % de celles de niveau primaire et seulement 29 % de celles n'ayant aucune instruction. Les femmes de Fianarantsoa et Toliary semblent être les moins informées. Les différences de niveau de connaissance ne paraissent être liées ni à l'âge, ni au statut matrimonial de la femme.

**Tableau 11.1 Connaissance des Maladies Sexuellement Transmissibles (MST)**

Pourcentage de femmes qui connaissent certaines Maladies Sexuellement Transmissibles (MST), par MST spécifique et selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDS Madagascar 1997

Caractéristique	Connaissances des MST					N'en connaît aucune	Effectif
	Syphilis	Gonorrhée/ Blennorragie	Sida	Condylome/ Tumeur génitale	Autre		
<b>Groupe d'âges</b>							
15-19	17,6	18,9	36,8	0,1	0,9	55,1	1 553
20-24	21,2	23,3	43,7	0,7	1,0	46,2	1 325
25-29	25,8	29,1	44,4	0,6	1,4	41,9	1 196
30-39	25,8	27,8	45,9	0,9	1,1	41,5	1 856
40-49	20,7	26,5	42,0	0,9	1,5	44,6	1 130
<b>État matrimonial</b>							
En union actuellement	21,3	25,3	41,4	0,7	1,3	46,4	4 438
En union auparavant	23,2	26,1	37,4	0,9	1,4	46,5	974
Jamais mariée	24,5	23,6	49,0	0,5	0,8	44,4	1 648
<b>Milieu de résidence</b>							
Capitale	56,9	43,9	86,9	0,9	1,0	10,3	636
Autres villes	28,9	29,0	58,3	1,3	0,8	32,6	1 351
Ensemble urbain	37,9	33,8	67,5	1,2	0,9	25,5	1 987
Rural	16,2	21,6	32,8	0,4	1,3	53,9	5 073
<b>Province (Faritany)</b>							
Antananarivo	25,2	25,3	59,3	0,6	0,5	38,2	2 387
Fianarantsoa	11,5	19,3	28,7	0,1	0,8	58,3	1 432
Toamasina	18,1	22,4	39,5	0,5	4,8	48,9	1 007
Mahajanga	28,5	32,7	36,2	0,9	0,2	41,7	852
Toliary	23,4	17,7	31,7	1,5	0,9	53,1	876
Antsiranana	35,9	44,2	39,2	1,0	0,1	36,0	506
<b>Niveau d'instruction</b>							
Aucun	13,6	15,0	12,8	0,4	0,9	70,9	1 499
Primaire	13,3	19,4	36,0	0,4	1,4	52,3	3 662
Secondaire ou supérieur	46,5	43,8	79,0	1,3	1,0	13,9	1 897
Ensemble	22,3	25,0	42,6	0,6	1,2	45,9	7 060

Le sida est la maladie la plus citée (43 %), devant la gonorrhée ou blennorragie (citée par 25 % des femmes) et la syphilis ou vérole (22 %). Les maladies telles que le condylome, aussi appelé tumeur génitale ou crête de coq, ou les autres maladies sont peu citées (moins de 2 %). De toutes les MST, c'est le sida qui est la mieux connue, et cela quelles que soient les caractéristiques socio-démographiques des femmes.

### 11.1.2 Prévalence des MST

Le tableau 11.2 présente les pourcentages de femmes ayant déclaré avoir eu une MST au cours des douze derniers mois précédant l'enquête, par type de maladie. Parmi toutes les femmes enquêtées, 2,2 % ont déclaré avoir contracté, au moins, une MST : 1,2 % ont déclaré avoir eu une gonorrhée et 0,8 % la syphilis.

**Tableau 11.1 Connaissance des Maladies Sexuellement Transmissibles (MST)**

Pourcentage de femmes qui connaissent certaines Maladies Sexuellement Transmissibles (MST), par MST spécifique et selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDS Madagascar 1997

Caractéristique	Connaissances des MST					N'en connaît aucune	Effectif
	Syphilis	Gonorrhée/ Blennorragie	Sida	Condylome/ Tumeur génitale	Autre		
<b>Groupe d'âges</b>							
15-19	17,6	18,9	36,8	0,1	0,9	55,1	1 553
20-24	21,2	23,3	43,7	0,7	1,0	46,2	1 325
25-29	25,8	29,1	44,4	0,6	1,4	41,9	1 196
30-39	25,8	27,8	45,9	0,9	1,1	41,5	1 856
40-49	20,7	26,5	42,0	0,9	1,5	44,6	1 130
<b>État matrimonial</b>							
En union actuellement	21,3	25,3	41,4	0,7	1,3	46,4	4 438
En union auparavant	23,2	26,1	37,4	0,9	1,4	46,5	974
Jamais mariée	24,5	23,6	49,0	0,5	0,8	44,4	1 648
<b>Milieu de résidence</b>							
Capitale	56,9	43,9	86,9	0,9	1,0	10,3	636
Autres villes	28,9	29,0	58,3	1,3	0,8	32,6	1 351
Ensemble urbain	37,9	33,8	67,5	1,2	0,9	25,5	1 987
Rural	16,2	21,6	32,8	0,4	1,3	53,9	5 073
<b>Province (Faritany)</b>							
Antananarivo	25,2	25,3	59,3	0,6	0,5	38,2	2 387
Fianarantsoa	11,5	19,3	28,7	0,1	0,8	58,3	1 432
Toamasina	18,1	22,4	39,5	0,5	4,8	48,9	1 007
Mahajanga	28,5	32,7	36,2	0,9	0,2	41,7	852
Toliary	23,4	17,7	31,7	1,5	0,9	53,1	876
Antsiranana	35,9	44,2	39,2	1,0	0,1	36,0	506
<b>Niveau d'instruction</b>							
Aucun	13,6	15,0	12,8	0,4	0,9	70,9	1 499
Primaire	13,3	19,4	36,0	0,4	1,4	52,3	3 662
Secondaire ou supérieur	46,5	43,8	79,0	1,3	1,0	13,9	1 897
Ensemble	22,3	25,0	42,6	0,6	1,2	45,9	7 060

Le sida est la maladie la plus citée (43 %), devant la gonorrhée ou blennorragie (citée par 25 % des femmes) et la syphilis ou vérole (22 %). Les maladies telles que le condylome, aussi appelé tumeur génitale ou crête de coq, ou les autres maladies sont peu citées (moins de 2 %). De toutes les MST, c'est le sida qui est la mieux connue, et cela quelles que soient les caractéristiques socio-démographiques des femmes.

### 11.1.2 Prévalence des MST

Le tableau 11.2 présente les pourcentages de femmes ayant déclaré avoir eu une MST au cours des douze derniers mois précédant l'enquête, par type de maladie. Parmi toutes les femmes enquêtées, 2,2 % ont déclaré avoir contracté, au moins, une MST : 1,2 % ont déclaré avoir eu une gonorrhée et 0,8 % la syphilis.

Les réponses aux questions concernant les MST dépendent bien sûr de la sincérité de la personne interrogée, les MST étant toujours considérées comme des maladies honteuses. Les différences notées reflètent-elles la réalité? Seule une enquête de surveillance épidémiologique pourrait vraiment confirmer ces écarts. Or, une telle enquête ne constitue pas une priorité immédiate tant que des médicaments anti-MST ne sont pas disponibles sur tout le territoire.

## 11.2 CONNAISSANCE ET ATTITUDES FACE AU SIDA

Cette section présente les données sur la connaissance du sida ainsi que sur les sources d'information, les moyens de prévention, les opinions et la perception du risque de contracter la maladie.


### 11.2.1 Connaissance du sida et sources d'informations sur le sida

Selon les informations disponibles dans le tableau 11.3, 69 % des femmes ont déclaré avoir déjà entendu parler du sida.

Caractéristique	Connait le sida	Sources d'information sur le sida												Effectif
		Radio	TV	Jour-naux	Bro-chure	Agent de santé	Mosquée/Église	École	Animation de Quartier	Parents	Amis	Vidéo clubs	Autres sources	
<b>Groupe d'âges</b>														
15-19	62,5	32,2	9,0	3,8	4,7	4,3	0,5	11,2	4,8	1,1	20,7	1,1	0,3	1 553
20-24	69,6	40,6	9,5	4,5	5,2	8,0	0,5	4,2	5,3	0,2	24,7	0,4	0,6	1 325
25-29	70,2	43,5	7,5	5,5	7,9	9,8	1,4	1,5	5,6	0,9	20,9	1,0	0,6	1 196
30-39	72,0	46,0	10,4	5,4	5,7	11,5	0,9	0,7	5,4	0,7	19,7	0,6	0,9	1 856
40-49	70,6	47,3	10,0	5,0	5,1	9,4	1,3	0,9	6,5	0,6	19,7	0,4	1,1	1 130
<b>État matrimonial</b>														
En union actuellement	68,6	42,3	8,1	4,7	5,4	9,8	0,9	1,3	5,1	0,6	20,7	0,5	0,7	4 438
En union auparavant	66,0	36,8	6,1	3,9	5,3	8,3	0,6	0,9	7,8	0,4	24,0	0,7	0,7	974
Jamais mariée	71,7	43,2	14,8	5,7	6,6	5,5	1,0	12,5	4,9	1,0	20,3	1,1	0,7	1 648
<b>Milieu de résidence</b>														
Capitale	98,0	79,1	43,3	13,0	12,8	3,8	1,5	9,5	4,6	0,5	8,2	0,6	2,5	636
Autres villes	81,1	54,1	17,4	6,5	9,5	11,5	0,8	7,4	6,9	1,1	21,5	1,2	0,9	1 351
Ensemble urbain	86,5	62,1	25,7	8,6	10,5	9,0	1,0	8,1	6,1	0,9	17,2	1,0	1,4	1 987
Rural	62,1	33,8	3,0	3,4	3,7	8,4	0,9	2,2	5,2	0,6	22,5	0,6	0,4	5 073
<b>Province (Faritany)</b>														
Antananarivo	80,3	63,0	17,4	8,0	6,6	5,2	1,1	5,5	3,7	0,7	11,7	0,4	1,0	2 387
Fianarantsoa	46,1	22,7	2,7	2,2	5,2	8,3	0,9	1,8	2,4	0,5	15,0	0,4	0,7	1 432
Toamasina	76,3	43,2	5,6	4,1	3,7	13,1	1,2	4,0	10,4	1,0	20,0	1,2	0,3	1 007
Mahajanga	66,8	35,0	6,8	4,3	4,7	6,9	0,3	2,6	2,9	0,4	33,6	0,6	0,4	852
Toliary	59,1	23,0	6,7	2,8	6,0	10,2	1,0	1,9	3,1	1,0	30,5	1,6	0,5	876
Antsiranana	86,0	36,3	7,1	3,3	7,3	16,7	0,3	6,8	20,7	0,8	46,9	0,6	0,5	506
<b>Niveau d'instruction</b>														
Aucun	39,8	14,1	0,6	0,5	1,1	5,1	0,6	0,2	3,3	0,7	22,1	0,3	0,3	1 499
Primaire	67,3	37,0	3,6	2,3	4,1	8,0	0,8	0,9	6,4	0,6	24,0	0,6	0,5	3 662
Secondaire ou supérieur	95,0	72,8	27,4	13,1	12,3	12,6	1,4	12,4	5,3	0,9	14,5	1,2	1,3	1 897
Ensemble des femmes	68,9	41,7	9,4	4,8	5,7	8,6	0,9	3,8	5,5	0,7	21,0	0,7	0,7	7 060

Cette connaissance varie selon les caractéristiques socio-démographiques des femmes comme on peut le constater au graphique 11.1.

Les différences entre les catégories de femmes sont particulièrement nettes selon le niveau d'instruction. En effet, presque toutes les femmes de niveau, au moins, secondaire (95 %) ont répondu avoir déjà entendu parler du sida, contre les deux tiers de celles ayant un niveau primaire (67 %) et moins de la moitié de celles qui ne sont jamais allées à l'école (40 %). Par ailleurs, le milieu ou la province de résidence de la femme influe aussi sur le niveau de connaissance du sida puisque la quasi-totalité des femmes de la capitale (98 %) connaissent le sida contre 81 % de celles résidant dans les autres villes et 62 % des femmes rurales. La connaissance du sida est moins bonne dans les provinces de Fianarantsoa (46 %) et de Toliary (59 %), où des campagnes d'information, d'éducation et de communication méritent d'être intensifiées.




Le graphique 11.2 présente une comparaison internationale sur la connaissance du sida par les femmes de 15 à 49 ans. On note que le niveau de connaissance du sida à Madagascar est plus faible que dans les autres pays. Généralement, les niveaux de connaissance sont élevés dans les pays à forte prévalence du VIH. Par contre, le pourcentage aux Comores est nettement supérieur à celui de Madagascar, bien qu'on y trouve une prévalence comparable.

Le graphique 11.3 présente également les principales sources d'information des femmes sur le sida.


La principale source d'information sur le sida est la radio (42 %). Cette source d'information est plus fréquemment citée par les femmes urbaines (62 %) et plus particulièrement par celles de la capitale (79 %) que par celles du milieu rural (qui ne la citent que dans 34 % des cas). Le niveau d'instruction joue également un rôle important puisque 73 % des femmes du niveau secondaire et supérieur citent la radio contre seulement 14 % des femmes n'ayant jamais fréquenté l'école. Par contre, on note que la télévision n'est citée que par 9 % des femmes, ce qui peut s'expliquer par la faible proportion de ménages disposant d'un téléviseur.

Graphique 11.2  
 Connaissance du sida par les femmes de 15-49 ans  
 dans divers pays



Source: Enquêtes EDS

Graphique 11.3  
 Principales sources d'information sur le sida  
 citées par les femmes



EDS 1997

Les amis constituent la seconde plus importante source d'information sur le sida (21 %) ce qui prouve l'efficacité de la communication par les pairs. On note, par contre, une très faible proportion de femmes (moins de 1 %) qui citent leurs parents. La sexualité constitue encore un sujet tabou dans la majorité des familles malgaches. Il convient de remarquer que les agents de santé n'ont été cités que par 9 % des femmes interrogées, ce qui nous amène à souligner la nécessité d'un renforcement des activités de prévention des MST/sida dans les centres de santé.

Les données sur la connaissance des modes de transmission du virus figurent au tableau 11.4. La transmission sexuelle a été citée par la quasi-totalité des femmes connaissant le sida (95 %). De même, tous les modes de transmission par voie sanguine sont assez bien connus : 76 % des femmes ont déclaré connaître la transmission par transfusion et 71 % par le contact avec le sang (il s'agit en particulier de la pratique traditionnelle du *fatidra*, ou liens de sang conclus entre amis). Par contre, on relève la persistance de nombreuses fausses croyances : celle relative à la transmission par piqûre de moustique (30 %), par les baisers (42 %), en partageant la nourriture ou la vaisselle avec un sidéen (47 %) ou encore en touchant une personne atteinte du sida (47 %).

Tableau 11.4 Connaissance des modes de transmissions du sida								
Proportion de réponses obtenues sur les modes de transmission du sida selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDS Madagascar 1997								
Caractéristique	Connaissance des modes de transmission du sida							Effectif de femmes connaissant le sida
	Pourcentage de femmes qui disent que le sida ne peut pas être transmis				Pourcentage de femme qui disent que le sida peut être transmis par			
	Touchant une personne	Partageant la vaisselle	Par des baisers	Par piqûres d'insectes	Rapports sexuels	Contact avec du sang	Transfusions	
<b>Groupe d'âges</b>								
15-19	47,0	47,1	42,4	31,0	93,3	68,2	75,5	970
20-24	49,4	49,7	45,5	31,4	94,3	70,3	73,7	923
25-29	48,3	48,4	43,4	30,1	95,9	73,5	76,2	839
30-39	46,5	46,9	43,0	29,9	95,5	72,1	76,4	1 337
40-49	41,2	42,4	35,7	28,8	95,7	71,1	75,9	798
<b>État matrimonial</b>								
En union actuellement	44,8	44,9	40,6	29,4	94,8	70,1	73,9	3 040
En union auparavant	40,8	41,7	33,8	28,6	95,1	70,0	73,5	643
Jamais en union	54,3	55,4	51,0	33,4	95,2	74,1	80,9	1 183
<b>Milieu de résidence</b>								
Capitale	75,8	75,2	68,9	39,4	98,2	86,3	88,9	623
Autres villes	58,7	56,9	51,5	29,9	96,5	76,3	82,2	1 096
Ensemble urbain	64,9	63,6	57,8	33,4	97,1	80,0	84,6	1 719
Rural	36,6	37,9	33,7	28,6	93,8	66,2	70,6	3 148
<b>Province (Faritany)</b>								
Antananarivo	51,3	54,2	48,9	31,3	96,4	78,6	81,5	1 917
Fianarantsoa	47,5	45,0	42,5	35,5	95,2	56,7	57,1	660
Toamasina	51,4	50,7	44,6	33,7	91,9	62,0	72,4	768
Mahajanga	39,2	36,0	34,2	22,4	95,1	77,6	79,1	569
Toliary	30,7	33,7	27,9	17,8	89,7	72,0	69,9	517
Antsiranana	44,5	41,7	35,9	36,4	99,7	66,3	85,4	435
<b>Niveau d'instruction</b>								
Aucun	23,8	23,5	18,5	21,4	87,6	56,4	58,0	597
Primaire	35,4	36,4	31,4	27,0	93,9	65,4	70,2	2 466
Secondaire ou supérieur	69,4	69,2	64,9	37,7	98,8	83,6	88,8	1 803
Effectif	46,6	47,0	42,2	30,3	94,9	71,1	75,6	4 867

## 11.2.2 Connaissance des moyens de prévention contre le sida

Parmi les femmes ayant déjà entendu parler du sida, pratiquement un tiers (30 %) affirme qu'il n'y a aucun moyen d'éviter de contracter cette maladie et un autre tiers n'a aucune idée sur la question. En milieu rural la proportion de femmes pensant que le sida ne peut être évité est beaucoup plus élevée qu'en milieu urbain (36 % contre 20 %); de même, 39 % des femmes du milieu rural déclarent ne pas savoir si le sida est évitable ou comment il peut être évité, alors que cette proportion n'est que de 21 % en milieu urbain. On retrouve les mêmes types d'écarts selon le niveau d'instruction : plus de la moitié des femmes sans instruction (57 %) partagent l'opinion selon laquelle le sida n'est pas évitable contre 13 % des femmes ayant un niveau secondaire ou supérieur. En outre, 59 % des femmes sans instruction ne savent pas si le sida est évitable ou comment l'éviter, contre 14 % des femmes ayant un niveau secondaire ou supérieur.

Au tableau 11.5, qui présente des réponses multiples, la limitation à un partenaire vient en tête des moyens de prévention cités (38 %). Les femmes, à partir de 25 ans, citent plus fréquemment ce moyen que les plus jeunes. Se limiter à un seul partenaire est également le mode de prévention le plus cité dans toutes les provinces, à l'exception de Toliary où ce moyen de prévention n'est cité que par 22 % des femmes.

Tableau 11.5 Connaissance par les femmes des moyens d'éviter de contracter le sida

Parmi les femmes qui connaissent le sida, pourcentage de celles qui connaissent différents moyens d'éviter de contracter le sida selon les caractéristiques socio-démographiques, EDS Madagascar 1997

Caractéristique	Impossible d'éviter	Abstinence sexuelle	Utiliser condoms	Un seul partenaire	Éviter la prostitution	Éviter l'homosexualité	Éviter les transfusions	Éviter les injections	Autres moyens	NSP	Effectif
<b>Groupe d'âges</b>											
15-19	35,2	5,7	27,4	30,6	7,3	0,3	3,1	2,8	2,5	38,5	970
20-24	29,8	4,2	30,2	36,2	5,4	0,1	2,7	3,2	3,1	32,0	923
25-29	29,7	3,2	27,8	38,0	8,1	0,1	4,1	5,6	2,8	31,7	839
30-39	27,5	3,0	27,5	44,6	7,2	0,4	4,3	4,7	3,4	29,2	1 337
40-49	31,2	3,9	22,1	38,2	8,3	0,1	2,8	4,6	5,6	32,8	798
<b>État matrimonial</b>											
En union actuellement	30,6	2,5	24,6	41,6	7,2	0,2	3,1	4,3	3,6	32,4	3 043
En union auparavant	33,3	6,2	25,1	30,9	9,8	0,0	3,9	3,4	3,4	34,8	643
Jamais mariée	28,6	6,6	34,9	32,6	5,8	0,3	4,1	4,4	2,9	31,8	1 181
<b>Milieu de résidence</b>											
Capitale	14,4	5,3	47,9	51,6	4,2	0,7	4,6	9,2	2,1	15,1	623
Autres villes	23,1	4,3	42,5	38,0	6,8	0,4	4,3	6,2	3,4	24,6	1 096
Ensemble urbain	20,0	4,7	44,5	42,9	5,8	0,5	4,4	7,3	2,9	21,1	1 719
Rural	36,2	3,6	17,7	35,3	7,9	0,1	3,0	2,5	3,7	38,9	3 148
<b>Province (Faritany)</b>											
Antananarivo	26,2	3,4	30,7	42,8	3,3	0,2	2,6	4,8	3,4	28,1	1 917
Fianarantsoa	31,5	5,0	19,7	33,9	8,3	0,3	2,0	2,3	4,8	33,8	660
Toamasina	31,6	0,9	31,9	38,7	1,8	0,0	2,3	3,3	3,3	35,1	768
Mahajanga	36,8	2,6	22,6	29,9	16,6	0,5	3,3	5,5	2,7	38,8	569
Toliary	43,1	9,8	22,5	21,9	3,8	0,2	3,0	3,9	4,3	44,8	517
Antsiranana	22,3	5,4	25,9	51,5	23,9	0,1	12,7	4,5	1,6	23,5	435
<b>Niveau d'instruction</b>											
Aucun	56,9	4,7	5,1	23,7	7,9	0,1	1,8	1,5	2,9	59,3	597
Primaire	37,1	3,6	16,8	34,7	6,8	0,1	2,6	1,6	3,8	40,0	2 466
Secondaire ou supérieur	12,6	4,3	48,5	47,2	7,4	0,5	5,3	8,7	3,1	13,7	1 803
Ensemble des femmes	30,4	4,0	27,2	38,0	7,2	0,2	3,5	4,2	3,4	32,6	4 867



L'utilisation du condom vient ensuite en deuxième position (27 %). Il est plus fréquemment cité par les jeunes femmes de 20-24 ans (30 %) que par les plus âgées ainsi que par l'ensemble des femmes urbaines (44 %) par rapport aux femmes rurales (18 %). Plus le niveau d'instruction est élevé, plus le condom est cité : 49 % des femmes de niveau secondaire ou supérieur contre 5 % seulement chez celles n'ayant aucune instruction.

Les autres moyens tels le fait d'éviter la prostitution (7 %), le fait d'éviter les injections (4 %) ou les transfusions (3 %), ainsi que l'abstinence sexuelle (4 %) sont moins fréquemment cités.

### 11.2.3 Opinions sur le sida

Le tableau 11.6 et le graphique 11.4 fournissent des informations quant à la perception de la gravité du sida par les enquêtées, notamment sur le fait qu'une personne apparemment en bonne santé peut, en fait, être atteinte du sida, ainsi que sur l'incurabilité et la létalité de cette maladie. On a également demandé aux enquêtées si elles pensaient que le sida pouvait se transmettre de la mère à l'enfant et si elles connaissaient personnellement quelqu'un atteint ou décédé du sida.

La moitié des femmes (50 %) ont déclaré qu'une personne qui semble être en bonne santé peut néanmoins avoir le sida. Cette proportion est plus élevée chez les femmes de niveau secondaire ou supérieur (67 %) que chez celles qui n'ont aucune instruction (31 %). En ce qui concerne les provinces, on constate des écarts importants, variant d'un maximum de 71 % à Antsiranana à un minimum de 36 % à Toliary.

À l'opposé, l'opinion selon laquelle une personne qui semble bien portante ne peut être atteinte du sida est partagée par 23 % des femmes. Il faut cependant noter que plus d'une femme sur cinq a été incapable de donner une réponse (27 %).

À la question de savoir si le sida est mortel ou non, la très grande majorité des femmes (83 %) ont déclaré que le sida est presque toujours mortel. Cette proportion est pratiquement identique quelles que soient les caractéristiques socio-démographiques des femmes. Par contre, 13 % des femmes pensent que le sida n'est pas toujours mortel et 4 % n'ont aucune idée sur la question.

Les trois quarts des femmes interrogées (76 %) pensent que le sida ne peut être guéri. Ici aussi, on ne constate pratiquement pas de différences selon les caractéristiques socio-démographiques. Par ailleurs, 13 % des femmes pensent que le sida peut être guéri et 10 % n'ont aucune idée sur la question.

Concernant la transmission du sida de la mère à l'enfant, une grande majorité de femmes connaissant le sida (84 %) connaissent ce mode de transmission. Les femmes vivant en milieu urbain (90 %), celles d'Antsiranana (89 %) et celles ayant un niveau d'instruction, au moins, secondaire (92 %) sont les mieux informées à ce sujet.


Moins d'une femme sur dix (7 %) a déclaré connaître une personne atteinte ou décédée du sida. Du point de vue des caractéristiques socio-démographiques, il faut noter que la proportion de femmes ayant déclaré connaître quelqu'un ayant le sida ou mort du sida est beaucoup plus élevée dans la Capitale (13 %) que partout ailleurs.

Globalement, on peut conclure à une assez bonne connaissance par les femmes malgaches des éléments essentiels caractéristiques de la maladie du sida. Cette connaissance varie essentiellement selon le niveau d'instruction et le milieu de résidence de la femme.

Tableau 1.1.6 Perception du sida par les femmes

Répartition (en %) des femmes qui connaissent le sida selon leur opinion sur l'apparence des malades, sur la létalité du sida, sur la possibilité de guérison du sida et selon leur connaissance de la transmission du sida mère/enfant et pourcentage de femmes connaissant quel qu'un ayant le sida ou mort du sida, par caractéristiques socio-démographiques, EDS Madagascar 1997

Caractéristique	Personne qui paraît en bonne santé peut avoir le sida				Le sida est mortel				Personne avec le sida peut être guérie				Transmission mère/enfant				Pourcentage connaissant une personne ayant le sida/morte du sida		Effectif de femmes connaissant le sida
	Non		Oui		Presque jamais		Presque toujours		Non		Oui		Non		Oui		Total	NSP	
	NSP	Total	NSP	Total	NSP	Total	NSP	Total	NSP	Total	NSP	Total	NSP	Total	NSP	Total			
<b>Groupe d'âges</b>																			
15-19	23,5	51,6	24,8	100,0	0,3	12,9	83,2	3,5	100,0	79,9	10,7	8,8	100,0	4,3	82,3	13,1	100,0	6,7	970
20-24	24,2	50,1	25,5	100,0	0,5	13,2	83,9	2,3	100,0	78,3	13,3	8,0	100,0	3,9	85,9	9,9	100,0	6,7	923
25-29	27,3	47,4	25,3	100,0	0,8	13,5	81,2	4,5	100,0	77,7	13,0	8,7	100,0	5,0	82,9	11,4	100,0	5,5	839
30-39	20,0	51,0	29,0	100,0	0,3	14,1	81,5	3,9	100,0	73,8	13,0	12,5	100,0	2,9	84,3	11,9	100,0	7,6	1 337
40-49	19,9	48,5	31,5	100,0	0,5	12,3	84,3	2,8	100,0	72,3	14,8	12,5	100,0	1,6	86,5	11,0	100,0	7,4	798
<b>État matrimonial</b>																			
En union actuellement	23,4	47,7	28,9	100,0	0,6	13,3	82,1	3,9	100,0	74,8	12,9	11,7	100,0	3,7	83,2	12,4	100,0	7,1	3 042
En union auparavant	20,7	47,3	31,8	100,0	0,0	15,0	82,1	2,8	100,0	75,1	14,2	10,1	100,0	3,2	85,5	10,6	100,0	5,0	645
Jamais mariée	22,2	57,0	20,7	100,0	0,3	12,3	84,8	2,6	100,0	80,8	12,1	6,6	100,0	3,1	86,6	9,9	100,0	7,4	1 181
<b>Milieu de résidence</b>																			
Capitale	26,7	60,6	12,5	100,0	0,4	6,0	91,5	1,9	100,0	86,2	9,9	3,6	100,0	3,3	90,2	5,6	100,0	13,1	623
Autres villes	17,8	59,9	22,3	100,0	0,3	10,6	86,5	2,6	100,0	81,7	10,3	7,6	100,0	2,9	89,3	7,6	100,0	6,9	1 096
Ensemble urbain	21,0	60,1	18,8	100,0	0,3	9,0	88,3	2,4	100,0	83,3	10,2	6,1	100,0	3,0	89,6	6,9	100,0	9,2	1 719
Rural	23,7	44,3	31,9	100,0	0,6	15,6	79,7	4,0	100,0	72,5	14,4	12,5	100,0	3,8	81,4	14,1	100,0	5,6	3 148
<b>Province (Faritany)</b>																			
Antananarivo	29,4	49,9	20,6	100,0	0,5	20,1	76,5	2,9	100,0	76,3	15,1	8,1	100,0	3,0	85,6	10,5	100,0	9,0	1 917
Fianarantsoa	19,3	47,2	33,5	100,0	1,0	9,6	83,7	5,6	100,0	71,2	15,6	12,5	100,0	3,8	78,7	17,1	100,0	6,8	660
Toamasina	19,8	50,4	29,6	100,0	0,3	6,0	90,8	2,6	100,0	74,0	12,9	12,5	100,0	3,3	86,7	9,6	100,0	5,7	768
Mahajanga	17,8	49,5	32,7	100,0	0,3	16,1	80,2	3,4	100,0	76,2	11,9	11,4	100,0	2,8	86,4	10,4	100,0	4,6	569
Toliary	24,2	35,7	40,2	100,0	0,4	6,6	87,3	5,7	100,0	73,0	11,4	14,9	100,0	6,2	77,2	15,7	100,0	7,3	517
Antsiranana	8,2	70,8	21,0	100,0	0,0	6,2	92,1	1,6	100,0	92,3	2,3	5,4	100,0	3,6	88,6	7,4	100,0	2,1	435
<b>Niveau d'instruction</b>																			
Aucun	20,1	30,9	49,0	100,0	0,6	11,9	80,6	6,9	100,0	63,4	12,5	23,2	100,0	5,3	72,8	21,2	100,0	5,5	597
Primaire	25,4	41,7	32,9	100,0	0,5	15,9	79,3	4,4	100,0	72,1	15,0	12,3	100,0	3,5	81,5	14,3	100,0	6,1	2 466
Secondaire ou supérieur	20,0	67,4	12,5	100,0	0,4	10,2	88,1	1,1	100,0	86,4	10,1	3,2	100,0	2,9	92,0	4,6	100,0	8,4	1 803
Ensemble des femmes	22,7	49,9	27,3	100,0	0,5	13,3	82,7	3,5	100,0	76,3	12,9	10,3	100,0	3,5	84,3	11,5	100,0	6,9	4 867



#### 11.2.4 Perceptions du risque d'être atteint du sida

Le tableau 11.7 et le graphique 11.5 présentent la répartition des enquêtées selon leur perception du risque de contracter le sida. Ceci est en quelque sorte un diagnostic personnel de son propre comportement ou de celui de son partenaire.

Plus de la moitié des femmes (56 %) affirment ne courir aucun risque ou un faible risque de contracter le sida. Environ un tiers des femmes (31 %) ne sont pas en mesure d'évaluer leur risque vis-à-vis du sida. Par contre, un peu plus d'une femme sur dix (13 %) déclare présenter un risque moyen (5 %) ou important (8 %) de contracter le sida.


C'est dans la capitale (67 %) et dans la province d'Antananarivo (61 %), que les proportions de femmes qui ont déclaré ne courir aucun risque sont les plus élevées. À l'opposé, c'est dans la province d'Antsiranana que cette proportion est la plus faible (31 %). Parallèlement, les femmes qui déclarent courir un risque moyen ou important sont proportionnellement plus nombreuses à Antsiranana (24 %) qu'à Antananarivo (6 %). Par ailleurs, les femmes qui ont déclaré avoir eu deux partenaires sexuels ou plus au cours des douze derniers mois sont proportionnellement moins nombreuses à déclarer ne courir aucun risque (36 %) que celles qui n'ont eu qu'un partenaire (48 %).

Tableau 11.7 Perception du risque de contracter le sida

Répartition (en %) des femmes connaissant le sida par perception du risque de contracter le sida, par caractéristiques socio-démographiques, EDS Madagascar 1997

Caractéristique	Risques de contracter le sida						Total	Effectif de femmes
	Aucun	Faible	Modéré	Important	A le sida	NSP		
<b>Groupe d'âges</b>								
15-19	44,8	8,5	4,4	6,0	0,7	35,6	100,0	970
20-24	48,3	8,2	6,0	8,3	0,6	28,6	100,0	923
25-29	49,8	9,3	4,6	8,6	0,3	27,5	100,0	839
30-39	49,2	7,3	4,6	8,5	0,9	29,4	100,0	1 337
40-49	47,8	6,1	5,0	8,2	1,0	31,9	100,0	798
<b>État matrimonial</b>								
En union actuellement	49,4	7,2	4,9	8,0	0,6	29,7	100,0	3 043
En union auparavant	42,8	8,8	5,6	10,1	1,0	31,7	100,0	643
Jamais mariée	47,2	9,0	4,4	6,5	0,7	32,1	100,0	1 181
<b>Nombre de partenaires sexuels</b>								
1	48,0	7,8	5,1	8,3	0,8	30,1	100,0	3 595
2-3	36,1	11,7	9,5	10,0	1,0	31,6	100,0	260
4 +	36,6	7,3	7,7	11,0	0,0	37,4	100,0	65
NSP/ND	52,2	7,1	2,7	5,7	0,5	31,8	100,0	945
<b>Milieu de résidence</b>								
Capitale	67,1	7,5	2,1	9,3	0,3	13,7	100,0	623
Autres villes	47,8	8,9	6,8	9,0	0,7	26,7	100,0	1 096
Ensemble urbain	54,8	8,4	5,1	9,1	0,6	22,0	100,0	1 719
Rural	44,3	7,6	4,8	7,3	0,8	35,3	100,0	3 148
<b>Province (Faritany)</b>								
Antananarivo	60,7	4,2	1,1	5,3	0,1	28,6	100,0	1 917
Fianarantsoa	48,5	7,5	4,5	7,9	2,9	28,7	100,0	660
Toamasina	37,7	4,1	7,1	12,8	0,7	37,5	100,0	768
Mahajanga	39,0	8,8	7,2	14,9	0,0	30,0	100,0	569
Toliary	40,2	15,4	4,1	2,7	1,5	36,0	100,0	517
Antsiranana	30,7	20,9	16,1	8,1	0,0	24,2	100,0	435
<b>Niveau d'instruction</b>								
Aucun	35,5	8,4	5,6	7,1	0,6	42,7	100,0	597
Primaire	44,5	7,0	4,9	6,9	0,9	35,8	100,0	2 466
Secondaire ou supérieur	56,9	8,9	4,6	9,7	0,5	19,4	100,0	1 803
Ensemble	48,0	7,9	4,9	7,9	0,7	30,6	100,0	4 867

Graphique 11.5  
Perception du risque de contracter le sida  
par les femmes connaissant le sida



EDS 1997

Le tableau 11.8 présente les raisons selon lesquelles le risque de contracter le sida est perçu comme étant nul ou faible. Pour une large majorité des femmes (72 %), la fidélité à un seul partenaire expliquerait cette perception du risque nul ou faible de contracter le sida. Les autres raisons évoquées sont l'abstinence (17 %), la fidélité du conjoint (5 %), puis l'utilisation du condom (3 %).

Tableau 11.8 Raisons pour lesquelles les risques de contracter le sida sont perçus comme nuls/minimes

Parmi les femmes qui pensent ne courir aucun risque ou courir des risques minimes de contracter le sida, raisons de la perception de ces risques, selon l'état matrimonial, EDS Madagascar 1997

Caractéristique	Abstinence	Utilise condom	Un seul partenaire	Epoux est fidèle	Pas de transfusion	Pas d'injection	Effectif
<b>État matrimonial</b>							
Jamais en union	48,0	4,3	38,1	1,4	3,3	2,1	664
Actuellement en union	1,4	2,0	88,4	6,5	1,8	1,2	1 722
En union auparavant	37,7	4,0	50,5	1,3	2,3	1,3	332
<b>Milieu de résidence</b>							
Capitale	26,1	2,2	66,8	7,2	3,7	2,3	465
Autres villes	17,4	7,0	69,2	5,2	2,6	1,4	621
Ensemble urbain	21,1	4,9	68,2	6,0	3,1	1,8	1 086
Rural	14,6	1,4	73,8	3,7	1,7	1,1	1 634
<b>Province (Faritany)</b>							
Antananarivo	19,6	1,6	72,1	4,3	1,7	1,4	1 244
Fianarantsoa	14,0	5,6	72,9	4,7	1,0	1,4	370
Toamasina	15,3	2,6	74,1	6,9	4,1	1,8	321
Mahajanga	14,4	2,7	76,2	5,4	1,9	2,6	272
Toliary	15,8	4,3	62,9	4,7	2,0	0,8	288
Antsiranana	17,2	3,3	68,0	2,2	5,1	0,5	225
<b>Niveau d'instruction</b>							
Aucun	10,8	0,0	76,4	1,3	1,7	1,3	262
Primaire	16,6	1,7	72,3	4,2	1,4	0,6	1 270
Secondaire ou supérieur	19,3	4,6	69,6	5,8	3,3	2,3	1 187
Ensemble	17,2	2,8	71,5	4,6	2,3	1,4	2 719

Le tableau 11.9 présente les raisons évoquées par les femmes pour expliquer leur perception du risque moyen ou important de contracter le sida. Le multipartenariat de l'homme et celui de la femme semblent expliquer majoritairement cette perception du risque plus élevé (cités par, respectivement, 32 % et 22 % des femmes interrogées). Le multipartenariat du conjoint est une raison plus fréquemment avancée dans les provinces de Toamasina et Mahajanga (46 % dans les deux cas); par contre, cette raison est peu fréquemment citée dans la province de Fianarantsoa (13 %). C'est pourtant dans cette province que les femmes ont fréquemment expliqué leur perception de courir un risque moyen ou important par le fait qu'elles ont plusieurs partenaires. Il serait intéressant d'analyser plus en profondeur ces résultats au premier abord étonnants.

Par ailleurs, seulement 15 % des femmes interrogées ont déclaré qu'elles pensaient courir des risques moyens ou importants de contracter le sida parce qu'elles n'utilisaient pas le condom. Il faut remarquer que, par rapport aux autres provinces, à Toamasina et Antsiranana, la non utilisation du condom est plus fréquemment avancée comme raison de la perception du risque moyen ou important de contracter le sida (respectivement, 28 % et 36 %). Est-ce à dire que les femmes sont plus sensibilisées à l'usage du condom dans ces deux provinces ou que les campagnes de promotion du condom y auraient été plus efficaces qu'ailleurs?

**Tableau 11.9 Raisons pour lesquelles les risques de contracter le sida sont perçus comme modérés ou importants**

Parmi les femmes qui pensent avoir des risques modérés ou importants de contracter le sida, raisons de la perception de ces risques, selon l'état matrimonial et les caractéristiques socio-démographiques, EDS Madagascar 1997

Caractéristique	Pas de condom	Plusieurs partenaires	Epoux n'est pas fidèle	Trans-fusions	Injections	Autre	Effectif
<b>État matrimonial</b>							
Jamais en union	12,1	42,1	24,2	6,3	9,5	20,7	129
Actuellement en union	15,3	14,8	38,2	4,5	5,0	30,0	395
En union auparavant	17,8	23,4	19,6	3,7	6,0	35,7	101
<b>Milieu de résidence</b>							
Capitale	3,5	28,7	16,8	16,8	19,6	36,4	71
Autres villes	19,8	18,5	39,7	5,3	9,3	15,3	174
Ensemble urbain	15,1	21,4	33,1	8,6	12,3	21,4	245
Rural	15,0	22,1	31,8	2,2	2,1	34,0	379
<b>Province (Faritany)</b>							
Antananarivo	2,0	33,4	20,8	10,8	11,2	36,6	123
Fianarantsoa	1,5	46,7	12,9	1,5	10,0	30,4	81
Toamasina	28,4	10,4	45,5	4,1	1,6	14,0	153
Mahajanga	5,3	14,2	45,6	3,6	6,2	33,2	126
Toliary	6,8	16,7	40,6	9,9	9,9	36,0	35
Antsiranana	35,8	16,5	22,9	0,6	2,3	33,8	105
<b>Niveau d'instruction</b>							
Aucun	6,5	13,5	40,2	4,9	3,7	38,2	76
Primaire	16,3	22,3	33,4	2,1	2,7	29,0	290
Secondaire ou supérieur	16,2	23,7	28,7	7,6	10,6	26,4	258
Ensemble	15,1	21,8	32,3	4,7	6,1	29,0	624

## 11.3 ACTIVITÉ SEXUELLE ET UTILISATION DU CONDOM

Cette section concerne le comportement sexuel des femmes par le biais de questions sur le nombre de partenaires sexuels qu'elles ont déclaré avoir eu dans les douze derniers mois précédant l'enquête; des questions sur la connaissance et l'utilisation du condom par les femmes ont également été posées.

### 11.3.1 Activité sexuelle des femmes dans les douze derniers mois

Le comportement des femmes a été appréhendé à partir de l'information sur le nombre de partenaires sexuels qu'elles ont eus au cours des douze derniers mois. Le tableau 11.10 présente ces données selon la situation matrimoniale de l'enquêtée.

D'après le tableau 11.10, 46 % des femmes non mariées ont déclaré n'avoir eu aucun partenaire au cours des douze derniers mois, 35 % ont déclaré en avoir eu un, 9 % en avoir eu deux ou trois et 3 % en avoir eu, au moins, quatre. En moyenne, ces femmes ont eu 0,8 partenaire au cours des douze derniers mois.

Tableau 11.10 Nombre de partenaires sexuels

Répartition (en %) des femmes par nombre de personnes avec qui elles ont eu des rapports sexuels dans les 12 mois ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDS Madagascar 1997

Caractéristique	Femmes mariées (mari inclu)							Femmes non mariées							
	1	2-3	4+	NSP/ ND	Total	Moyenne	Effec- tif	0	1	2-3	4+	NSP/ ND	Total	Moyenne	Effec- tif
<b>Groupe d'âges</b>															
15-19	91,9	4,9	1,5	1,6	100,0	1,1	434	62,9	23,4	8,8	2,2	2,8	100,0	0,6	1 119
20-24	92,3	4,2	1,5	1,9	100,0	1,1	822	28,4	50,9	10,6	3,4	6,6	100,0	1,0	503
25-29	95,2	3,1	0,8	0,9	100,0	1,1	886	26,7	45,2	12,0	4,7	11,3	100,0	1,3	310
30-39	96,1	1,7	0,4	1,8	100,0	1,1	1 444	31,0	44,7	8,8	2,5	12,9	100,0	1,0	412
40-49	96,1	1,4	0,1	2,5	100,0	1,0	848	53,1	29,7	6,9	2,3	7,9	100,0	0,7	281
<b>Durée de mariage (en années)</b>															
0-4	92,4	4,2	1,7	1,7	100,0	1,1	1 014	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	94,3	3,4	0,6	1,6	100,0	1,1	927	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	95,7	2,8	0,6	0,9	100,0	1,1	808	-	-	-	-	-	-	-	-
15 ou +	96,1	1,3	0,3	2,3	100,0	1,0	1 686	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Milieu de résidence</b>															
Capitale	98,2	0,7	0,3	0,7	100,0	1,1	336	63,0	31,7	3,6	0,3	1,3	100,0	0,4	300
Autres villes	91,9	3,5	1,6	3,0	100,0	1,1	796	43,8	38,8	9,3	3,4	4,7	100,0	0,8	555
Ensemble urbain	93,8	2,7	1,2	2,3	100,0	1,1	1 132	50,5	36,3	7,3	2,3	3,5	100,0	0,7	855
Rural	95,1	2,7	0,6	1,6	100,0	1,1	3 302	43,7	34,8	10,3	3,0	8,2	100,0	0,9	1 771
<b>Province (Faritany)</b>															
Antananarivo	98,3	0,9	0,3	0,6	100,0	1,0	1 481	66,2	25,1	3,4	0,8	4,6	100,0	0,4	906
Fianarantsoa	91,4	4,7	0,5	3,4	100,0	1,1	893	42,4	34,7	10,7	1,9	10,2	100,0	0,8	540
Toamasina	94,7	2,6	0,6	2,1	100,0	1,1	602	34,3	46,5	9,8	1,2	8,2	100,0	0,9	405
Mahajanga	95,2	2,8	0,0	2,0	100,0	1,0	564	32,7	43,1	13,9	2,5	7,8	100,0	1,0	287
Toliary	91,0	3,8	3,1	2,1	100,0	1,2	599	27,3	40,3	15,8	12,1	4,6	100,0	1,7	277
Antsiranana	94,7	3,7	0,6	1,0	100,0	1,1	295	33,0	41,4	15,9	4,8	4,8	100,0	1,2	211
<b>Niveau d'instruction</b>															
Aucun	92,8	3,0	1,1	3,1	100,0	1,1	1 066	39,3	36,1	9,7	4,5	10,5	100,0	1,0	433
Primaire	94,9	2,8	0,7	1,6	100,0	1,1	2 275	44,0	33,9	11,4	3,1	7,7	100,0	0,9	1 387
Secondaire ou supérieur	96,6	2,2	0,4	0,8	100,0	1,0	1 093	53,0	37,2	5,7	1,4	2,8	100,0	0,6	805
Ensemble des femmes	94,8	2,7	0,7	1,8	100,0	1,1	4 435	46,0	35,3	9,3	2,8	6,6	100,0	0,8	2 625

Parmi les femmes non mariées de 15-19 ans, 63 % n'ont eu aucun partenaire sexuel, ce qui concorde bien avec l'âge médian au premier rapport sexuel évalué à 17 ans. Le pourcentage de femmes non mariées n'ayant eu aucun partenaire sexuel dans les douze derniers mois est beaucoup plus élevé dans la province d'Antananarivo (66 %) par rapport aux autres provinces dans lesquelles le taux s'échelonne de 42 % (Fianarantsoa) à 27 % (Toliary).

Le pluripartenariat (plus de trois partenaires) est nettement plus fréquent dans les province de Toliary (12 % des femmes) et d'Antsiranana (5 %) par rapport à Antananarivo et Toamasina (autour de 1 %). Le pluripartenariat est également plus fréquent chez les femmes n'ayant jamais fréquenté l'école (5 %) que chez les femmes ayant un niveau d'instruction.

Au tableau 11.10, figure également le nombre de partenaires des femmes mariées. En moyenne, 95 % des femmes mariées ont déclaré n'avoir eu qu'un seul partenaire, probablement leur mari, dans les douze derniers mois. La proportion de ces femmes augmente avec la durée maritale : 92 % des femmes en union depuis moins de quatre ans n'ont eu qu'un seul partenaire contre 96 % des femmes en union depuis plus de dix ans. Parallèlement, la proportion de femmes n'ayant déclaré qu'un seul partenaire augmente au fur et à mesure que l'âge de la femme augmente (92 % à 20-24 ans contre 96 % à 30-39 ans). Selon le milieu de résidence, on constate que les proportions de femmes n'ayant déclaré qu'un seul partenaire sont légèrement plus élevées dans la capitale qu'en milieu rural et surtout que dans les autres Villes (98 % contre, respectivement, 95 % et 92 %). De plus, c'est dans la province de Toliary que les femmes ayant déclaré avoir eu, au moins, 4 partenaires sont proportionnellement les plus nombreuses (3 %), contre moins de 1 % dans les autres provinces. Enfin, on constate également de légers écarts selon le niveau d'instruction, 93 % des femmes sans instruction n'ayant déclaré qu'un seul partenaire contre 95 % et 97 % de celles ayant, respectivement, un niveau primaire et un niveau, au moins, secondaire.

### 11.3.2 Connaissance du condom

Le tableau 11.11 présente les proportions de femmes qui connaissent le condom. Notons que ce tableau ne porte que sur les femmes qui ont déjà entendu parler du sida et qui ont déjà eu des rapports sexuels. Parmi cette catégorie de femmes, 73 % connaissent le condom. Précisons que le condom peut être considéré ici comme un simple contraceptif et/ou comme un moyen de protection contre les MST. Ceci, associé au fait que le niveau de connaissance est calculé ici sur la sous-population de femmes qui ont entendu parler du sida et ont déjà eu des rapports sexuels, explique le fait que ce niveau de connaissance est beaucoup plus élevé que celui présenté au chapitre 4, en ce qui concerne la planification familiale.

La proportion de femmes qui connaissent le condom atteint 99 % dans la capitale et 88 % dans l'ensemble de la province d'Antananarivo. Ces résultats sont peut-être à mettre à l'actif du programme de marketing social du préservatif qui a été particulièrement intensif dans cette *province* depuis 1996. Dans les autres provinces, où ce même programme n'a été initié qu'en 1997, les proportions sont moins élevées, notamment dans la province de Toliary (49 % seulement).

La proportion de femmes connaissant le préservatif est fonction du niveau d'instruction. Plus le niveau d'études est élevé, plus la connaissance du condom est élevée, puisqu'elle atteint 94 % chez les femmes de niveau secondaire ou supérieur contre 37 % chez les femmes n'ayant jamais fréquenté l'école.

Près des deux tiers des femmes interrogées ne savent pas où s'adresser pour se procurer des condoms (61 %). Ceci nous amène à nous interroger sur les raisons de cette méconnaissance : est-ce dû à la non-accessibilité des condoms, à un manque d'information ou à un désintérêt pour le condom? La réponse la plus plausible semble être la non-disponibilité des préservatifs dans la plus grande partie du pays. On note en effet que les trois quarts (74 %) des femmes rurales ne savent où trouver des condoms contre seulement 14 % des femmes de la capitale.



**Tableau 11.11 Connaissance du condom**

Parmi les femmes qui connaissent le sida et qui ont déjà eu des rapports sexuels, pourcentage de femmes qui connaissent le condom et répartition (en %) de celles qui connaissent le condom selon la connaissance d'une source d'approvisionnement pour le condom selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDS Madagascar 1997

Caractéristique	Connaît le condom	Connaissances d'une source					NSP/ND	Effectif
		Établissement public	Établissement privé	Pharmacie	Autre source			
<b>Groupe d'âges</b>								
15-19	62,0	12,8	3,2	8,4	5,7	70,0	535	
20-24	73,7	17,1	5,0	8,1	11,4	58,4	832	
25-29	76,4	15,9	5,7	9,8	11,6	56,9	812	
30-39	75,1	15,4	5,5	10,0	10,3	58,8	1 323	
40-49	71,1	12,4	4,9	10,3	9,7	62,7	788	
<b>État matrimonial</b>								
En union actuellement	72,3	14,6	5,9	8,9	9,3	61,3	3 042	
En union auparavant	71,0	14,2	2,8	9,3	8,5	65,1	645	
Jamais mariée	76,6	17,3	3,3	12,2	15,7	51,5	603	
<b>Milieu de résidence</b>								
Capitale	99,3	11,3	9,2	27,3	38,1	14,2	478	
Autres villes	84,4	24,8	6,1	17,5	9,3	42,3	954	
Ensemble urbain	89,4	20,3	7,2	20,8	18,9	32,9	1 432	
Rural	64,3	12,3	4,0	3,8	5,6	74,3	2 857	
<b>Province (Faritany)</b>								
Antananarivo	87,9	9,7	6,3	14,3	19,9	49,9	1 560	
Fianarantsoa	58,2	14,9	3,2	3,6	5,7	72,5	607	
Toamasina	76,2	24,7	7,4	9,7	4,9	53,4	705	
Mahajanga	60,8	14,9	3,0	5,9	5,8	70,3	526	
Toliary	48,9	19,6	2,4	5,1	3,1	69,8	490	
Antsiranana	74,4	12,8	4,9	9,0	1,4	71,9	401	
<b>Niveau d'instruction</b>								
Aucun	36,7	6,1	0,8	1,3	2,2	89,7	573	
Primaire	67,7	11,8	4,1	4,0	6,7	73,3	2 227	
Secondaire ou supérieur	94,1	23,0	8,1	20,6	18,1	30,1	1 489	
Ensemble	72,7	14,9	5,1	9,5	10,1	60,5	4 290	

L'établissement public est la source d'approvisionnement la plus fréquemment citée (15 %). Par ailleurs, une femme sur dix a cité la pharmacie comme lieu d'approvisionnement. L'établissement privé n'est connu que par une faible proportion de femmes (5 %).

Selon les résultats du tableau 11.12, on constate que, parmi les femmes connaissant le sida et ayant déjà eu des rapports sexuels, seulement une sur dix a déjà utilisé, au moins une fois, un préservatif. C'est en fonction du milieu de résidence, des provinces et surtout du niveau d'instruction que l'on constate les variations les plus importantes. En effet, la proportion d'utilisatrices est cinq fois plus élevée dans la capitale qu'en milieu rural (26 % contre 5 %). De même, la province d'Antananarivo se caractérise par une proportion d'utilisatrices environ deux fois plus élevée que celle de la province de Fianarantsoa (12 % contre 7 %). Enfin, c'est selon le milieu d'instruction que l'on constate les écarts les plus importants : moins de 1 % des femmes sans aucun niveau ont déclaré avoir utilisé le condom contre 21 % de celles ayant un niveau, au moins, secondaire.

Parmi les utilisatrices du condom, près d'une sur deux (46 %) a déclaré l'avoir utilisé en tant que contraceptif, 28 % comme moyen de protection contre les MST et 26 % de ces femmes ont utilisé le condom, à la fois, en tant que contraceptif et en tant que moyen de protection.

Tableau 11.12 Utilisation du condom par les femmes

Parmi les femmes qui connaissent le sida et qui ont déjà eu des rapports sexuels, pourcentage de celles qui ont déjà ou jamais utilisé le condom selon les caractéristiques socio-démographiques et la perception des risques de contracter le sida, EDS Madagascar 1997

Caractéristique	Pourcentage ayant déjà utilisé le préservatif	Effectif	Raison d'utilisation			Total	Effectif
			Contraceptif	Éviter MST	Éviter MST et contraceptif		
<b>Exposition au sida</b>							
Pas/Faibles risques	12,5	2 030	43,8	32,1	24,1	100,0	254
Risque modéré	13,4	211	(36,8)	(28,2)	(35,0)	100,0	28
Gros risques/A le sida	16,0	352	40,2	24,9	34,8	100,0	56
<b>Groupes d'âges</b>							
15-19	6,9	535	31,4	51,0	17,6	100,0	37
20-24	11,6	832	36,7	29,6	33,7	100,0	96
25-29	9,8	812	46,0	33,8	20,1	100,0	80
30-39	11,1	1 323	53,2	21,0	25,8	100,0	147
40-49	7,1	788	51,4	20,2	28,4	100,0	56
<b>État matrimonial et sexuel</b>							
En union actuellement	9,2	3 042	53,9	25,1	21,0	100,0	281
En union auparavant	9,0	645	25,4	35,8	38,8	100,0	58
Jamais mariée	12,6	603	31,5	33,0	35,4	100,0	76
<b>Milieu de résidence</b>							
Capitale	25,5	478	63,2	13,0	23,9	100,0	122
Autres villes	16,8	954	29,2	38,9	31,9	100,0	161
Ensemble urbain	19,7	1 432	43,8	27,7	28,5	100,0	283
Rural	4,6	2 857	50,1	28,7	21,3	100,0	133
<b>Province (Faritany)</b>							
Antananarivo	12,3	1 560	59,8	16,2	24,0	100,0	191
Fianarantsoa	6,6	607	(15,0)	(63,0)	(22,0)	100,0	40
Toamasina	10,1	705	44,3	28,5	27,2	100,0	71
Mahajanga	7,4	526	(45,4)	(34,6)	(20,1)	100,0	39
Toliary	9,4	490	(21,2)	(48,8)	(30,0)	100,0	46
Antsiranana	7,1	401	(38,9)	(15,3)	(45,8)	100,0	29
<b>Niveau d'instruction</b>							
Aucun	0,8	573	*	*	*	*	5
Primaire	4,5	2 227	40,4	33,4	26,2	100,0	99
Secondaire ou supérieur	20,9	1 489	48,1	25,9	26,0	100,0	311
Effectif des femmes	9,7	4 290	45,8	28,0	26,2	100,0	415

() Basé sur un faible nombre de cas (entre 25 et 49)

\* Basé sur moins de 25 cas