



VIH/Sida dans l'Enquête Démographique et de Santé du Rwanda 2005

Au cours de l'Enquête Démographique et de Santé du Rwanda 2005, plus que 10 000 personnes ont été testées pour le VIH. D'après l'enquête, 3,0 % des adultes de 15-49 ans sont infectés par le VIH.




Le niveau d'infection des femmes est plus élevé de celui des hommes. La prévalence est nettement plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural (7,3 % contre 2,2 %).




Les femmes sont infectées à un plus jeune âge que les hommes. Chez les femmes la prévalence augmente avec l'âge pour atteindre 6,9 % à 35-39 ans ; chez les hommes, 7,1 % à 40-44 ans.

Prévalence du VIH par province




La prévalence dans la ville de Kigali est plus que deux fois le taux national (6,7 %). C'est dans le Nord que l'on enregistre la valeur la plus faible (2,0 %).

Prévalence du VIH selon le niveau d'instruction




C'est parmi les femmes les plus instruites que la prévalence du VIH est la plus élevée (6,4%). On observe la même tendance chez les hommes.

Prévalence du VIH selon le statut matrimonial




Les divorcées/séparées et plus particulièrement les veuves sont plus fréquemment infectées que les femmes en union ou célibataires. Presque une veuve sur six est positive.

Prévalence du VIH selon le niveau de bien-être économique du ménage




La prévalence est plus élevée chez les femmes et les hommes des ménages les plus riches.

Prévalence du VIH et nombres de partenaires sur la durée de vie



La prévalence augmente avec le nombre de partenaires sexuels. Les hommes qui en ont eu au moins 10 partenaires sexuelles au cours de leur vie ont un niveau de prévalence dix fois plus élevé que ceux qui n'ont eu qu'une partenaire au cours de leur vie.

Prévalence du VIH parmi les jeunes



La prévalence du VIH chez les jeunes de 15–24 ans est estimée à 1,0 %. Chez les jeunes, la prévalence est plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural.

Méthodologie et taux de réponse :

Lorsqu'un sujet acceptait de participer au test du VIH, du sang capillaire était prélevé au moyen d'une piqûre faite au doigt. La population éligible pour le test du VIH est constituée d'un sous-échantillon de 5 837 femmes de 15-49 ans et 4 959 hommes de 15-59 ans qui ont été interviewés lors de l'EDSR-III 2005. De ce total, 96,5 % ont accepté de donner du sang. Les taux de réponse sont plus élevés en milieu rural qu'en milieu urbain (respectivement, 97 % et 94 %).

Pour toute autre information sur les résultats de l'Enquête Démographique et de Santé du Rwanda 2005, veuillez contacter :

Au Rwanda :

Institut National de la Statistique du Rwanda (INSR)
BP 6139
Kigali, Rwanda
Téléphone : (250) 55104164
e-mail : snr@rwanda1.com

Aux États-Unis :

MEASURE DHS
ORC Macro
11785 Beltsville Drive
Calverton, MD 20705 USA
Téléphone : 301-572-0200
Fax : 301-572-0999
www.measuredhs.com

L'EDSR-III a été réalisée par la Direction de la Statistique (devenue depuis septembre 2005 l'Institut National de la Statistique du Rwanda). Elle a été réalisée avec l'appui financier de l'USAID et le Commission Nationale de Lutte contre le SIDA (CNLS) à travers le Projet d'Appui au Programme Multisectoriel de Lutte contre le SIDA de la Banque Mondiale (MAP). D'autres sources de financements comprennent l'UNICEF, l'UNFPA, le DFID et le GTZ. L'étude a aussi bénéficié de l'expertise d'autres organismes nationaux tels que le Centre de Recherche et de Traitement sur le Sida (TRAC), le Laboratoire National de Référence et le Service National de Recensement (SNR). L'assistance technique a été apporté du programme mondial des Enquêtes Démographiques et de Santé (Demographic and Health Surveys - MEASURE DHS) de ORC Macro.



Enquête Démographique et de Santé Rwanda 2005 EDSR-III

Prévalence du VIH