




Prevalência do VIH, conhecimento sobre o VIH e comportamento

Resultados do Segundo Inquérito Demográfico e de Saúde Reprodutiva (IDSR-II), 2005


Durante o Segundo Inquérito Demográfico e de Saúde Reprodutiva (IDSR-II, 2005) cerca de 5500 homens e mulheres realizaram o teste do VIH. O IDSR-II mostrou que 0,8 por cento dos cabo-verdianos de 15-49 anos estão infectados pelo VIH-1 ou VIH-2. A prevalência do VIH-1 é de 0,4%.

Prevalência do VIH




A prevalência do VIH é mais elevada entre os homens (1,1%) do que entre as mulheres (0,4%). A prevalência é ligeiramente superior no meio urbano do que no meio rural (0,9% contra 0,6%).

Prevalência do VIH-1




A prevalência do VIH-1 é apenas de 0,4%. O VIH-1 é mais frequente entre os homens do que entre as mulheres e mais comum no meio urbano do que rural.

Prevalência do VIH por grupo etário



Em todas as idades os homens têm taxas de prevalência do VIH mais elevadas. Nas mulheres, a taxa máxima regista-se no grupo etário de 25-29 anos, enquanto que nos homens atinge um máximo de 5% aos 45-49 anos.

Prevalência do VIH-1 por grupo etário




A prevalência do VIH-1 entre os homens é superior em quase todas as idades. Tanto para os homens como para as mulheres, a prevalência do VIH-1 atinge o seu máximo nas idades de 25-29 anos.

Conhecimento sobre a prevenção do VIH

Mulheres de 15-49 anos Homens de 15-49 anos


Percentagem de mulheres e homens que sabe que o risco de contrair o VIH pode ser reduzido através de:



Embora quase todos os homens e mulheres sabem que podem reduzir os riscos de contrair o VIH através do uso do preservativo, apenas metade considera que a abstinência de relações sexuais reduz os riscos e a maioria considera que reduz o risco limitando as relações sexuais a um único parceiro não infectado e fiel.

Crenças acerca do VIH/SIDA

Mulheres de 15-49 anos Homens de 15-49 anos



Enquanto que a grande maioria das pessoas sabe que uma pessoa que aparenta boa saúde pode ter o VIH, e que não se pode contrair o VIH compartilhando alimentos com uma pessoa infectada, apenas a metade sabe que o vírus da SIDA não pode ser transmitido pelas picadas do mosquito.



Teste de despistagem do VIH durante consultas do pré-natal



Somente 13 por cento das mulheres que tiveram filhos nos dois anos anteriores ao inquérito, fizeram um teste de despistagem do VIH e receberam o resultado.

Relações sexuais pré maritais e uso do preservativo entre os jovens

Percentagem de jovens solteiros que teve relações sexuais no ano anterior ao inquérito



Praticamente metade das jovens mulheres e mais de seis jovens homens em cada dez tiveram relações sexuais pré maritais no ano anterior ao inquérito. Mais de metade desses jovens usou um preservativo da última vez que teve relações sexuais.

Metodologia e taxa de resposta:

A prevalência do VIH foi obtida a partir de uma amostra de sangue seco recolhida mediante picada no dedo (Dried Blood Sample) após consentimento esclarecido de mulheres de 15-49 anos e homens de 15-59 anos. Das 6699 pessoas elegíveis para o inquérito (3351 mulheres de 15-49 anos e 3348 homens de 15-59 anos), 88 por cento das mulheres e 79 por cento dos homens deram sangue.

Para informações adicionais acerca dos resultados do Inquérito Demográfico e de Saúde, 2005, contactar:

Em Cabo Verde:

Instituto Nacional de Estatística
Av. Amílcar Cabral, CP 116 Plateau Praia, Cabo Verde
Telefone: (238) 261 38 27
Fax: (238) 261 1656
E-mail: inecv@ine.gov.cv
Internet: www.ine.cv

Ministério da Saúde
Serviço de Vigilância Epidemiológica
Palácio do Governo, C P. 47, Praia, Cabo Verde
Telefone: (238) 261 01 61/ (238) 2 61 01 16
Fax : (238) 261 01 25


Nos EU:

MEASURE DHS
Macro International Inc
11785 Beltsville Drive
Calverton, MD 20705 USA
Telephone: 301-572-0200
Fax: 301-572-0999
Internet: www.measuredhs.com

O IDSR-II foi realizado pelo Instituto Nacional de Estatística e pelo Ministério da Saúde, com a assistência técnica da Macro Internacional Inc. O IDSR-II foi financiado pelo Governo de Cabo Verde, CCS-SIDA, Cooperação Portuguesa, Sistema das NU.



Segundo Inquérito Demográfico e de Saúde Reprodutiva (IDSR-II), 2005



Prevalência do VIH, conhecimento sobre o VIH e comportamento