


Taux de couverture et méthodologie : Tous les enfants de 6-59 mois des ménages sélectionnés étaient éligibles au test d'hémoglobine et à celui de dépistage du paludisme. Pour le diagnostic du paludisme, un Test de Diagnostic Rapide (TDR) a été effectué. Parmi les enfants éligibles, 95 % ont été testés pour le paludisme.



Gabon


Enquête Démographique et de Santé 2019-21



Paludisme

Prévalence du paludisme par région

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois ayant testés positifs pour le paludisme selon le TDR



Diagnostic et recherche de soins pour des enfants avec de la fièvre

Parmi les enfants de moins de 5 ans avec de la fièvre, pourcentage pour lesquels



Pour tous renseignements concernant l'EDSG-III, contacter :

Au Gabon :
 La Direction Générale de la Statistique, Gabon. ; OLOUMI, Immeuble Ancienne Planification ; B.P. 2119-Libreville-Gabon ;
 Téléphone : (+241) 0172 04 55/0172 13 69/01 76 06 71 ;
 Fax : (+241) 01 72 04 57 ;
 Email : infodgstat@gmail.com ;
 www.stat-gabon.ga.

Aux États-Unis :
 The DHS Program
 530 Gaither Road, Suite 500; Rockville, MD 20850 USA
 Téléphone : +1-301-407-6500 ; Fax : +1-301-407-6501
 Email : info@DHSprogram.com ;
 www.DHSprogram.com

Ce rapport présente les résultats clés de la troisième Enquête Démographique et de Santé au Gabon (EDSG-III), conduite dans le cadre du programme des activités « Gabon-Banque mondiale (feuille de route) 2015–2020 ».

L'EDSG-III 2019-21 réalisée par la Direction Générale de la Statistique (DGS) du Ministère de l'Économie et de la Relance, en étroite collaboration avec le Programme de Lutte contre les IST et le VIH/Sida (PLIST/VIHSIDA), le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) du Ministère de la Santé et des Affaires Sociales (MSAS), et les services techniques du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Le financement de l'EDSG-III a été assuré par la Banque mondiale, l'UNFPA et le Gouvernement de la République Gabonaise. ICF a fourni l'assistance technique à l'ensemble du projet par le biais du DHS Program, dont l'objectif est de fournir un support et une assistance technique à des pays à travers le monde pour la réalisation des enquêtes sur la population et la santé.

Le contenu de ce dépliant relève de la seule responsabilité de la Direction Générale de la Statistique, Gabon et d'ICF et ne reflète pas nécessairement les opinions des organismes donateurs.



Enquête Démographique et de Santé au Gabon 2019-21

La troisième Enquête Démographique et de Santé au Gabon (EDSG-III) 2019-21 fournit des données pour effectuer le suivi et l'évaluation de la situation sanitaire au Gabon. Les résultats de l'enquête sont représentatifs au niveau national, pour les neuf provinces, ainsi que la capitale politique, Libreville, et la capitale économique, Port-Gentil.


Avec une mortalité de 11 pour 100 000 habitants en 2021, le paludisme représente la première cause de consultation (24 %) et d'hospitalisation au Gabon. Le paludisme est classé parmi les problèmes de santé prioritaires dans la Politique nationale de santé.

Ce dépliant présente quelques données utiles pour évaluer l'efficacité des stratégies de contrôle du paludisme qui ont été mises en place.

Accès et utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII)

Pourcentage de la population des ménages ayant accès aux MII et pourcentage ayant dormi sous une MII la nuit avant l'interview


■ Accès à une MII ■ A dormi sous une MII



Note: Dans l'EDSG-II 2012 la définition d'une MII incluait les moustiquaires ayant été trempées dans un insecticide contre les moustiques au cours des 12 derniers mois.


Possession de MII par province

Pourcentage de ménages possédant au moins une MII



Possession de MII par bien-être du ménage


Pourcentage de ménages possédant au moins une MII



Tendances de l'utilisation du traitement préventif intermittent pendant la grossesse (TPIg)

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années avant l'enquête qui ont reçu un, deux ou trois doses ou plus de SP/Fansidar/Maloxine

■ 1+ dose ■ 2+ doses ■ 3+ doses



Parmi les femmes de 15-49 enceintes, **14 %** ont dormi sous une MII la nuit avant l'enquête. Dans les ménages possédant au moins un MII, ce pourcentage est **63 %** des femmes enceintes.

Utilisation des moustiquaires par les femmes enceintes par résidence

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont dormi sous une MII la nuit dernière

