


Santé de l'enfant : résultats de l'EDSC-II 2011-2012

L'Enquête Démographique et de Santé du Congo de 2011-2012 (EDSC-II) fournit des informations sur la population et la santé. Au cours de l'EDSC-II, 10 819 femmes de 15-49 ans et 5 145 hommes de 15-59 ans ont été interviewés. De plus, les informations ont été collectés sur la santé des enfants nés au cours des cinq dernières années.

Mortalité des enfants


Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période de cinq ans ayant précédé l'enquête



Durant les cinq dernières années, sur 1 000 naissances vivantes, 39 meurent avant d'atteindre leur premier anniversaire. Globalement, le risque de décès entre la naissance et le cinquième anniversaire est de 68 pour 1 000 naissances vivantes.

Couverture vaccinale par antigène

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois vaccinés




Les résultats de l'EDSC-II montrent que 94 % des enfants de 12-23 mois ont reçu le vaccin du BCG, 72 % ont reçu les trois doses de DTCQ, 57 % ont reçu les trois doses de polio et 75 % ont été vaccinés contre la rougeole.

Tendances de couverture vaccinale

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois

■ EDSC-I 2005 ■ EDSC-II 2011-2012




*Le BCG, le vaccin contre la rougeole, trois doses de vaccin contre la poliomyélite, et trois doses de DTCQ

La proportion d'enfants qui sont complètement vaccinés est passée de 52 % à l'EDSC-I de 2005 à 46 % en 2011-2012.

Près d'un enfant sur quinze meurt avant son cinquième anniversaire au Congo.

Vaccination des enfants par département

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois complètement vaccinés




C'est dans le département de Niari que la couverture vaccinale est la plus élevée (63 %) et dans le département de Plateaux qu'elle est la plus faible (14 %).

Tendances du traitement des maladies de l'enfance

Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans pour lesquels on a recherché un traitement*

■ EDSC-I 2005 ■ EDSC-II 2011-2012




*Non compris les pharmacies, les boutiques et les praticiens traditionnels.

La proportion d'enfants ayant eu des maladies de l'enfance au cours des deux semaines ayant précédé l'enquête pour lesquels on a recherché un traitement a augmenté depuis l'EDSC-I de 2005.

69 % de mères de 15-49 ans connaissent les sachets de SRO utilisés pour le traitement de la diarrhée

Pratiques alimentaires durant la diarrhée

Répartition des enfants de moins de cinq ans ayant eu la diarrhée au cours des deux semaines précédant l'enquête par quantité de liquides donnés



Pour plus d'un tiers des enfants (36 %) ayant eu la diarrhée, on a augmenté les quantités de liquides pendant la diarrhée, comme recommandé.



Prévalence et traitement de la fièvre chez les enfants

Pour tous renseignements concernant l'EDSC-II, contacter:

Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans qui :

Ont eu la fièvre au cours des deux semaines ayant précédé l'enquête **25**

Parmi les enfants qui ont eu de la fièvre au cours des deux semaines précédant l'enquête, pourcentage :

À qui on a prélevé du sang au doigt ou au talon pour être testé **29**


Qui ont pris des antipaludéens **25**

Qui ont bénéficié d'une combinaison thérapeutique à base d'artémisinine (CTA) **14**

Parmi les enfants de moins de cinq ans qui ont eu de la fièvre au cours des deux semaines ayant précédé l'enquête, on a prélevé du sang pour être testé auprès de 29 % et 14 % des enfants ont bénéficié d'une CTA.

Utilisation des MIILDA par département

Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans qui ont dormi sous une MIILDA la nuit dernière*



*MIILDA : moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action

Environ un quart (26 %) des enfants de moins de cinq ans ont dormi sous une MIILDA la nuit précédant l'enquête.


Au Congo :
Centre National de la Statistique et des Études Économiques
BP 2031, Brazzaville, Congo
Téléphone/Fax (242) 81 59 09
email : cnsee@hotmail.fr
Internet : www.cnsee.org

Aux États-Unis :
MEASURE DHS, ICF International
11785 Beltsville Drive
Calverton, MD 20705 USA
Téléphone : 301-572-0200
Fax : 301-572-0999
Site web : www.measuredhs.com

L'Enquête Démographique et de Santé du Congo (EDSC-II) a été réalisée de septembre 2011 à février 2012 par le Centre National de la Statistique et des Études Économiques (CNSEE) (Ministère de l'Économie, du Plan, de l'Aménagement du Territoire et de l'Intégration), en collaboration avec le Ministère de la Santé et de la Population. L'EDSC-II a été financée par le Gouvernement du Congo, le Programme de Développement des Services de Santé (PDSS) sous financement de la Banque Mondiale, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) et le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA). En outre, ICF International a fourni l'assistance technique dans le cadre du projet DHS.

Enquête Démographique et de Santé

Congo 2011-2012



Santé de l'enfant

