


**Taux de couverture et méthodologie :** Tous les enfants de 6-59 mois des ménages sélectionnés étaient éligibles au test d'hémoglobine et à celui de dépistage du paludisme. Pour le diagnostic du paludisme, un Test de Diagnostic Rapide (TDR) et la goutte épaisse ont été effectués. Parmi les enfants éligibles, 97 % ont été testés pour le paludisme.


### Prévalence du paludisme par TDR chez les enfants selon la région

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont le résultat du test de paludisme par TDR est positif



### Prévalence du paludisme par microscopie chez les enfants selon la région

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont le résultat du test de paludisme par microscopie est positif



Pour tous renseignements concernant l'EDSBF-V, contacter :

#### Au Burkina Faso :

Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD),  
Ouagadougou 01 BP 374 Ouaga 2000 Burkina Faso ; téléphone : +226 25 49 85 00 ; fax : + 226 25 37 62 26 ; email : insd@insd.bf ; internet : <https://www.insd.bf>

#### Aux États-Unis :

The DHS Program  
530 Gaither Road, Suite 500; Rockville, MD 20850 USA  
Téléphone : +1-301-407-6500; Fax : +1-301-407-6501  
Email : [info@DHSprogram.com](mailto:info@DHSprogram.com); [www.DHSprogram.com](http://www.DHSprogram.com)

La cinquième Enquête Démographique et de Santé du Burkina Faso (EDSBF-V) réalisée sur le terrain du 30 juillet au 30 novembre 2021 a été mise en œuvre par l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) en collaboration avec l'Institut National de Santé Publique (INSP). Le financement de l'EDSBF-V a été assuré par le Gouvernement du Burkina Faso, l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), l'Initiative Présidentielle des États-Unis contre le Paludisme (PMI), la Banque Mondiale, le Fonds Mondial à travers le PADS, l'UNICEF et l'UNFPA. Par ailleurs, le Centre National de Recherche et de Formation sur le Paludisme (CNRFP) a apporté son expertise dans l'analyse des prélèvements sanguins afin d'estimer la prévalence du paludisme parmi les enfants. ICF a fourni l'assistance technique par le biais du DHS Program, un projet financé par l'USAID qui fournit un support et une assistance technique pour la réalisation d'enquêtes dans les domaines de la population et de la santé dans de nombreux pays dans le monde.

Le contenu de ce dépliant relève de la seule responsabilité de l'INSD et d'ICF et ne reflète pas nécessairement les opinions de l'USAID, du Gouvernement des États-Unis ou d'autres organismes donateurs.

Photo de couverture: © UNICEF/UNI394622/Dejongh



# Enquête Démographique et de Santé 2021

# Burkina Faso



## Mortalité et paludisme


# Enquête Démographique et de Santé du Burkina Faso 2021 (EDSBF-V)

La 5ème Enquête Démographique et de Santé au Burkina Faso (EDSBF-V) fournit des données pour effectuer le suivi et l'évaluation de la situation sanitaire au Burkina Faso. Les résultats de l'enquête sont représentatifs au niveau national, pour Ouagadougou, les autres villes, l'ensemble urbain et pour le rural, ainsi que pour chacune des 13 régions du Burkina Faso. Les résultats des régions du Sahel et de l'Est doivent être interprétés avec prudence, car plusieurs grappes dans ces régions n'ont pas pu être enquêtées pour des raisons d'insécurité.

**Plus d'1 enfant sur 20 meurt avant d'atteindre l'âge de 5 ans.**

## Tendances de la mortalité des enfants de moins de 5 ans


Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période de 5 ans avant l'enquête



**Au Burkina Faso, le rapport de mortalité maternelle est estimé à 198 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes pour la période des sept dernières années (IC : 137-258).**


## Tendances de la possession des MII\*

Pourcentage de ménages possédant au moins une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)



## Tendances de l'utilisation des MII\*


Pourcentage de la population de fait des ménages, d'enfants de moins de 5 ans et de femmes enceintes ayant dormi sous une MII la nuit avant l'interview



\*Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Dans les EDS précédentes, les MII étaient appelées moustiquaires imprégnées à longue durée d'action (MILDA). Depuis 2014, toutes les MII au Burkina Faso sont presque exclusivement des MILDA.

## Tendances du traitement préventif intermittent par les femmes enceintes

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années précédant l'enquête ayant pris une, deux, ou trois doses ou plus de SP/Fansidar



**22 % d'enfants de moins de 5 ans ont eu de la fièvre au cours des 2 semaines précédant l'interview.**

## Diagnostic et recherche de soins pour des enfants avec de la fièvre

Parmi les enfants de moins de 5 ans avec de la fièvre, pourcentage pour lesquels

